
Жәңгір хан атындағы Батыс Қазақстан аграрлық-техникалық университеті

Западно-Казахстанский аграрно-технический университет имени Жангир хана

West Kazakhstan Agrarian-Technical University of Zhangir Khan



"Ғылым, зерттеулер, білім: даму тенденциялары" атты XXV Халықаралық ғылыми – практикалық конференцияның ЖИНАҒЫ

2025 жылғы 10 сәуір

COLLECTED PAPERS

XXV International scientific and practical conference "Science, research, education: development trends"

April 10, 2025

СБОРНИК

XXV Международной научно-практической конференции «Наука, исследования, образование: тенденции развития»

10 апреля 2025 года

ӘОЖ 001
КБЖ 72
Ғ96

"Ғылым, зерттеулер, білім: даму тенденциялары" атты XXV Халықаралық ғылыми – практикалық конференцияның жинағы = Collected papers XXV International scientific and practical conference **"Science, research, education: development trends"**
= СБОРНИК XXV Международной научно-практической конференции **«Наука, исследования, образование: тенденции развития»**: - Орал: Жәңгір хан атындағы Батыс Қазақстан аграрлық-техникалық университеті, 2025, - 805 б.

Конференция материалдары жинағында университет ғалымдарының ғылыми-зерттеу жұмыстарының нәтижелері жинақталған. Ғылыми мақалалар экономика мен агроөнеркәсіптік кешен, биотехнология, ветеринария, мал шаруашылығы, экология, мұнай-газ техникасы мен құрылыс материалдары әндірісіндегі мәселелерді кең қамтиды. Жинақ оқу және ғылыми мекемелердің, әндірістік мамандардың, докторанттардың, магистранттардың және студенттердің кең ауқымына арналған.

ISBN 978-601-319-620-6

ӘОЖ 001
КБЖ 72
© «Жәңгір хан атындағы Батыс Қазақстан аграрлық-техникалық университеті» КеАҚ, 2025

АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫ ҒЫЛЫМЫ ЖӘНЕ ВЕТЕРИНАРИЯ

ӘОЖ 619:616.995.1
ҒТАХР 34.33.02

Абирова И. М., PhD докторы, https://orcid.org/0000-0001-9310-2118
«Жәңгір хан атындағы Батыс Қазақстан аграрлық-техникалық университеті» КЕАҚ, Орал қ., Жәңгір Хан 51 көш., 090009, Қазақстан, тел.: +77715954741, Zarina029@mail.ru
Абдуллина З. Д., магистрант, https://orcid.org/0009-0007-9517-5493
«Жәңгір хан атындағы Батыс Қазақстан аграрлық-техникалық университеті» КЕАҚ, Орал қ., Жәңгір Хан 51 көш., 090009, Қазақстан, тел.:+77762549159, dahzahree@mail.ru
Абирова Н. А., магистрант, https://orcid.org/0000-0001-5190-6142,
Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, Астана қ., Сатыбаева 2, 010017, Қазақстан, тел.: +77772612628, nairaabirova@gmail.com

Abirova I. M., PhD., https://orcid.org/0000-0001-9310-2118
NJSC «West Kazakhstan Agrarian and Technical University named after Zhangir khan», Uralsk, st. Zhangir khan 51, 090009, Kazakhstan, phone.:+77715954741 Zarina029@mail.ru
Abdullina Z. D., master's student, https://orcid.org/0009-0007-9517-5493
NJSC «West Kazakhstan Agrarian and Technical University named after Zhangir khan», Uralsk, st. Zhangir khan 51, 090009, Kazakhstan, phone.:+77762549159, dahzahree@mail.ru
Abirova N. A., master's student, https://orcid.org/0000-0001-5190-6142
«L.N. Gumilyov Eurasian National University», Astana, st. 2 Satbaev, 010017, Kazakhstan, phone.: +77772612628, nairaabirova@gmail.com

УРБАНИЗАЦИЯЛАНҒАН АЙМАҚТАРДАҒЫ ЕТҚОРЕКТІ ЖАНУАРЛАРДЫҢ ГЕЛЬМИНТОЦЕНОЗ ҚҰРЫЛЫМЫ

STRUCTURE OF CARNIVORE HELMINTHOCENOSIS IN URBANIZED AREAS

АНДАТПА

Жануарлардың ағзалары мен тіндерінде бір уақытта бірнеше түрлі гельминттер паразиттік тіршілік етіп, гельминтоценоз деп аталатын қауымдастық түзеді.

Оның қалыптасу процесінде иесінің ағзасында гельминтоценоз құрамындағы мүшелер арасында өзара қарым-қатынастар қалыптасады. Бұл жағдайда кейбір түрлердің дамуы тежеліп, олар биологиялық қуыстан ығыстырылады немесе жеке дарақтар түрінде қалады, ал басқа гельминт түрлері қарқынды дамып, басымдыққа ие болады.

Гельминтоценоздардың құрылымын білу, оның өзгерістерін мониторингтік зерттеу нәтижелерін талдау, қалыптасу және жұмыс істеу заңдылықтарын анықтау жалпы биологиялық және қолданбалы маңызға ие.

Біздің зерттеулеріміздің нәтижесінде барлық иттерден үш түрлі цестод-тениид анықталды: Taenia hydatigena, Multiceps multiceps, Dipylidiidae тұқымдасынан – асқабақ тәрізді таспа құрт Dipylidium caninum; нематодтардан – екі түрлі аскаридат: Toxocara canis және Toxascaris leonina, сондай-ақ бір анкилостоматид түрі – Uncinaria stenocephala.

Иттердің түрлі инвазиялармен зақымдануы орта есеппен Post morbi кезінде – 42,0%, ал In vivo кезінде – 28,2% құрады.

Қаланың әртүрлі аумақтарынан (балалар алаңдары, мектеп аулалары, саябақтар, аллеялар, көшелер және үй жануарларын серуендету орындары) алынған 75 топырақ үлгісін зерттеу барысында аскарид жұмыртқалары – 32,1%, токсокар жұмыртқалары – 21,6% мөлшерінде анықталды.

ANNOTATION

Several helminth species may simultaneously parasitize in the organs and tissues of animals, forming a community - helminthocenosis. In the process of its formation in the host organism, relationships arise between members of helminthocenosis, in which the development of some species is restrained, they are displaced from the biological niche or remain in single copies, while other helminth species develop intensively and become dominant.

Knowledge of the structure of helminthocenoses, analysis of the results of monitoring studies of its changes, identification of regularities of formation and functioning are of general biological and applied importance.

As a result of our studies in all dogs we noted three species of cestodes-teniidae: Taenia hydatigena, Multiceps multiceps, from the family Dipylidiidae - pumpkin-shaped chain Dipylidium caninum; from nematodes - two species of ascaridates: Toxocara canis and Toxascaris leonina and one species of ankylostomatids - Uncinaria stenocephala. Infestation of dogs with different invasions averaged 42.0% in Post morbi and 28.2% in In vivo.

During the study of 75 soil samples from different areas of the city: playgrounds, school yards, parks, squares, streets and places of walking of domestic carnivores. Most of all the soil contained eggs of ascarids 32.1% and toxocarias - 21.6%.

Кілт сөздер: *гельминттер, экология, паразиттер, жыртқыштар, популяция, зооноздар.*

Key words: *helminths, ecology, parasites, carnivores, population, zoonoses.*

Кіріспе. Паразиттік қауымдастықтың құрылымын қалыптастыратын механизмдерді анықтау иесінің денсаулығына, инфекциялық аурулардың таралуына, сондай-ақ жалпы биологиялық қауымдастықтарды түсінуге маңызды әсер етеді [1].

Әрбір тірі организм және олардың қауымдастықтары биогеоценозда белгілі бір орынды иеленеді, бұл олардың тарихи дамуы мен эволюциялық бейімделуіне байланысты қалыптасады.

Ландшафттық – климаттық және зоогеографиялық жағдайлар түрдің қалыптасуын анықтайды, ал осы жағдайлардың өзгерістері түрлердің әртүрлілігіне, яғни биологиялық алуантүрлілікке әкеледі.

Экологиялық икемділікке мысал ретінде ит тұқымдас жануарларды келтіруге болады, олардың түрлік құрамы осы топтың бейімделу эволюциясын көрсетеді.

Практикалық маңыздылық тұрғысынан алғанда, үй итінің (Canis lupus familiaris) ішкі түрлік әртүрлілігінің қалыптасуы ерекше өзекті мәселе болып табылады. Оның тұқымдарының саны бүкіл ит тұқымдасының барлық түрлерінің санынан әлдеқайда көп. Иттер (Canis lupus familiris) алғашқы үй жануарларының бірі бола отырып, адаммен тығыз қарым-қатынаста болады.

Иттердің адаммен өзара әрекеттестігін, адамның олардың мінез-құлқы мен денсаулығына әсерін, сондай-ақ үй және жабайы иттердің экологиясын зерттеу маңызды бағыттардың бірі болып табылады. Бұл өзара байланыстарды түсіну жануарлардың экожүйедегі рөлін бағалауға мүмкіндік береді.

Иттердің экологиясын талдау олардың морфологиялық әртүрлілігін, осы түрдің жоғары санын, елдер мен құрлықтар бойынша кең таралуын, сондай-ақ мыңдаған жылдар бойы адамның серігі болып келген ерекшеліктерін түсіндіруге көмектеседі.

Экологиялық тұрғыдан алғанда, ит тұқымдас жануарлар тек өздерінің түрлік және тұқымдық құрамымен ғана емес, басқа қырларымен де қызықты.

Барлық тіршілік иелерінен биіктей отырып әрі тірі табиғаттың ажырамас бөлігі болып қала отырып, саналы адам өзінің көпғасырлық даму тарихында қолға үйрету процесі барысында көптеген жабайы жануарларды саналы және бейсаналы түрде түрлендірді.

Ит – түр атауында «үй» деген анықтамасы бекітілген жануар, яғни ол қолға үйретілген түр болып табылады. Оны қолға үйрету мен доместикациялау адамзаттың материалдық және рухани мәдениетінің дамуына орасан зор әсер етті.

Дәстүрлі түрде ит Canis lupus familiaris Linnaeus (1758) эпизоотологиялық, эпидемиологиялық, этологиялық, кейде әлеуметтік аспектілерде зерттеу нысаны болып табылады.

Ит – адам алғаш қолға үйреткен жануар, ол адамдармен өте ұзақ уақыт бойы қатар өмір сүріп келеді [2].

Әлемдегі иттердің саны орасан зор және үздіксіз өсуде. Гиннес рекордтар кітабының мәліметтері бойынша, АҚШ-та иттердің саны 41 миллионға жетсе, Ұлыбританияда – 5,5 миллион.

Францияда жыл сайын 750 мың адам дүниеге келсе, иттердің күшіктері 1 миллионға көбейеді. Парижде мектеп жасындағы 350 мың балаға 500 мың иттен келеді. Жалпы, бұл елде 60 миллион тұрғынға шамамен 9 миллион ит ресми тіркелген, яғни әр 7,5 адамға бір иттен келеді. Бұл көрсеткіш 38% француз кем дегенде бір ит ұстайтынын білдіреді [3].

АҚШ-та иттердің саны халық санының өсу қарқынынан да жоғары. Олардың ішінде қаңғыбас иттердің саны 10-20 миллионға бағаланады. Жекелеген штаттарда, мысалы, Джорджия мен Миннесотада олардың саны 200-300 мыңға дейін жетеді [3].

Олардың келтірген шығыны 500 миллион долларды құрайды [4].

Тарихи тұрғыдан алғанда, үй жануарлары зооноздық аурулардың ықтимал көзі ретінде қарастырылған. Дегенмен, соңғы жылдары еркін жүретін жануарлар мен құстар жаңа адам патогендерінің негізгі көзі екені анықталды [5,6].

Зооноздар – жануарлар мен адамдар арасында табиғи жолмен берілетін аурулар немесе инфекциялар деп анықталады [7,8].

Итті қолға үйретудің артықшылығы аңшылар мен терімшілер қоғамында ерекше маңызды болды. Олар аңшылықта серіктес, жыртқыштардан қорғайтын қорғаушы, сондай-ақ әлеуметтік және эмоционалдық серік ретінде бағаланды. Алайда, итті қолға үйретудің кемшіліктерінің бірі – зооноздық паразиттердің, әсіресе гельминттердің, таралу мүмкіндігі болып табылады.

Иттердің ең кең таралған зооноздық гельминттеріне Strongyloides stercoralis, Ancylostoma caninum, Dipylidium caninum, Toxocara canis және Echinococcus granulosus жатады. Бұл паразиттер адамға жұғу қаупі бар және эхинококкоз, висцералды личинка мигранты, терілік личинка мигранты сияқты әртүрлі ауруларды тудыруы мүмкін [9].

Иттер мен адамдардың бір кеңістікте тығыз өмір сүруі салдарынан тамақтың, судың немесе қолдың осы асқорыту жүйесі гельминттерінің жұқпалы сатыларымен ластануы адам үшін өмірге қауіпті инфекцияларға әкелуі мүмкін. Бұл мәселе әсіресе дамушы елдерде, онда бақылау шаралары жиі қолданылмайтын жағдайларда аса өзекті [10,11,12].

Сондықтан ит популяциясындағы гельминтоздарды бақылау стратегиясын сәтті әзірлеу және іске асыру үшін белгілі бір аймақтағы бұл паразиттермен жұқтыру деңгейін ұдайы бағалау қажет [13,14,15].

Зерттеудің мақсаты – жыртқыш жануарлар паразиттерінің гельминтоценоз құрылымын анықтау және паразиттік жүйенің жекелеген құрамдас бөліктерінің эпизоотологиялық маңыздылығын бағалау.

Зерттеу әдістемесі мен материалдары. Гельминтологиялық зерттеу әдістері

Ғылыми-өндірістік және эксперименттік зерттеулер 2024-2025 жылдар аралығында жүргізілді. Жұмыс Жәңгір хан атындағы Батыс Қазақстан аграрлық-техникалық университеті және «Жәрдем-Вет» клиникасы базасында орындалды. Иттердің гельминтологиялық және овоскопиялық зерттеулері қала аумағы бойынша жүргізілді.

Зерттеу барысында постмортальды әдістер (асқазан-ішек жолының толық және толық емес гельминтологиялық ашылуы) және витальды әдістер (диагностикалық

дегельминтизация бромсутекті ареколинмен, асқазан-ішек жолдарының толық босатылуымен) қолданылды.

Зерттеуге 54 ит (оның ішінде диагностикалық дегельминтизациядан өткендер) және 75 топырақ үлгісі алынды. Үлгілер қаланың әртүрлі аймақтарынан: балалар ойын алаңдарынан, мектеп ауласынан, жағажайлардан, саябақтардан, скверлерден, көшелерден және үй жануарларын серуендететін орындардан жиналды.

Гельминттердің түрлік құрамын анықтау К.И. Скрябин мен А.М. Петровтың (1964), А.А. Мозговойдың (1953), К.И. Абуладзенің (1964) және Д.П. Козловтың (1977) анықтағыштары мен монографиялары негізінде жүргізілді.

Топырақты гельминт жұмыртқаларымен ластануын зерттеу «Қоршаған орта нысандарын гельминтологиялық зерттеу әдістемелік нұсқауларына және гельминт жұмыртқаларымен ластанудан қорғау мен оларды залалсыздандыру бойынша санитарлық шараларға» (1982) сәйкес жүргізілді.

Гельминтоздардың өлімнен кейінгі диагностика әдістері. К.И. Скрябин әдісі бойынша толық гельминтологиялық ашу.

К.И. Скрябин әдісі бойынша толық гельминтологиялық ашу – жануардың жұқтырылған барлық гельминттерін сандық және сапалық тұрғыдан есепке алуға мүмкіндік беретін ең сенімді әдіс болып табылады.

Бұл әдіс келесідей жүргізіледі: өлекседен тері сылынып алынғаннан кейін теріасты шелмайы мұқият тексеріледі, содан кейін кеуде және құрсақ қуыстары ашылып, барлық жүйе мүшелері (ас қорыту, тыныс алу, қан айналым, зәр-жыныс және т.б.) алынады. Әрбір жүйенің мүшелері жеке бөлініп, зерттеледі, бұл ретте бірізді шаю әдісі қолданылады.

Барлық түтікті ағзалар олардың бойымен жарып ашылады, ішіндегі заттар арнайы ыдыстарға салынады, ал шырышты қабықтарынан қырынды алынады. Қажет болған жағдайда ашылған ағзаның қабырғасы компрессориум көмегімен зерттеледі.

Паренхиматозды ағзалар әрқайсысы жеке ыдыстарға салынып, ұсақтау әдісімен детрит (фарш) күйіне келтіріледі. Детрит, қырынды және ағза ішіндегі заттар дистилденген су немесе физиологиялық ерітіндімен жуылып, бірізді шаю әдісі арқылы өңделеді.

Алынған материалдар (тұнбалар) алдымен қара, содан кейін ақ кюветаларда ұсақ бөліктермен зерттеледі.

Ірі гельминттерді визуалды түрде таңдап алады, ал ұсақ гельминттерді қолдық немесе маңдайлық лупа (8-10 есе үлкейту) көмегімен анықтайды. Гельминттерді тек қылқалам немесе препараттық инелер арқылы жинайды.

Жекелеген ағзалардың толық гельминтологиялық зерттеуі. Бұл әдіс белгілі бір гельминттің нақты орналасуын анықтау қажет болған жағдайда қолданылады. Ол анағұрлым практикалық және қарапайым әдіс болып табылады.

Жыртқыш жануарлардың гельминтоздарын тірі кезінде диагностикалау әдістері. Гельминттерді анықтау үшін келесі әдістер қолданылды:

Флотация әдісі (аммоний нитраты ерітіндісі – түйіршікті аммиак селитрасы, тығыздығы 1,3). Фекалий үлгісі (3 г) стақанда 0,5-1,0 г натрий карбонатымен езгіленеді.

Содан кейін аммоний нитратының ерітіндісі бөліктермен қосылып, 50 мл-ге дейін толтырылады, бұл кезде үнемі араластырып отыру қажет.

Алынған суспензия таза електен басқа стаканға сүзгіленеді (фильтр ретінде ұяшық өлшемі 0,25-0,3 мм болатын металл тор немесе капрон шұлық матасынан жасалған тор қолданылады).

Сүзілген суспензия 5-10 минутқа қалдырылады. Осыдан кейін диаметрі 8-10 мм металл ілмекпен 3-тен 6 тамшыға дейін бетінен алынып, заттық шыныға орналастырылады және қоздырғыш жұмыртқаларын анықтау мақсатында микроскоп арқылы зерттеледі.

Комбинацияланған әдіс (аммоний нитраты ерітіндісі, тығыздығы 1,3). Бұл әдіс трихоцефалез және тениидозды диагностикалауда тиімдірек.

Фекалий үлгісі (3 г) стаканға салынып, 0,5-1,0 г натрий карбонаты қосылып езгіленеді. Араластыру кезінде су аздап қосылып, 50 мл-ге дейін толтырылады.

Алынған суспензия таза стаканға сүзгіленеді. 5 минут тұндырғаннан кейін жоғарғы қабат төгіледі, ал түбінде центрифуга пробиркасына сыйатын мөлшерде сұйықтық қалдырылады.

Қалған суспензия араластырылып, центрифуга пробиркасына құйылады. Барлық пробиркалар бірдей деңгейге дейін толтырылғаннан кейін, олар 3-5 минут бойы 3000 айн/мин жылдамдықта центрифугаланады. Осыдан кейін сұйықтық төгіледі, ал тұнбаға аммоний нитраты ерітіндісі қосылады.

Тұнбаны шайқап, сол жылдамдықпен қайтадан центрифугалайды. Содан кейін ілмекпен суспензияның беткі қабатынан 3-тен 6 тамшыға дейін алып, оларды заттық шыныға микроскопиялық зерттеу және гельминт жұмыртқаларын анықтау үшін орналастырады.

Комбинацияланған әдіс (тығыздығы 1,78 мырыш хлориді ерітіндісі). Бұл әдіс описторхозды диагностикалау үшін қолданылады. Жануарлардан алынған 3,0 г, адамнан алынған 1,0 г нәжіс сынамасы стақанға салынады, оған 0,5-1,0 г натрий карбонаты қосылып, араластырылады. Араластыру кезінде су аз мөлшерде қосылып, 50 мл-ге дейін толтырылады. Содан кейін алынған суспензия таза стаканға сүзгіленеді.

Суспензия 5 минутқа тұндырылады, содан кейін жоғарғы қабаты төгіледі, тұнбаның үстінде аз мөлшерде су қалады. Қайтадан 50 мл су қосылып, тағы 5 минут тұндырылады.

Осыдан кейін жоғарғы қабат төгіліп, қалған тұнба центрифуга пробиркасына сыятындай көлемде қалады. Барлық пробиркалар бірдей деңгейге дейін толтырылғаннан кейін, олар 1,5-2 минут бойы 1000 айн/мин жылдамдықта центрифугаланады. Сұйықтық төгіліп, тұнбаға мырыш хлориді ерітіндісі қосылады. Тұнба ерітіндіде шайқалып, сол режимде қайтадан центрифугаланады.

Содан кейін диаметрі 6 мм ілмекпен беткі қабаттан кемінде 6 тамшы алынып, оларды заттық шыныға описторхис жұмыртқаларын анықтау үшін орналастырады. Микроскопия алдында әр тамшыға глицерин мен судың 1:1 қатынасында сұйылтылған қоспасын қосып, оны жабын шынымен жабу ұсынылады.

Диагностикалық дегельминтизация әдісі. Ағзада гельминттердің бар-жоғына күдік туындаған жағдайда, жануарларға гельминттерге қарсы дәрілер емдік немесе сәл төмендетілген дозада беріледі, содан кейін оларды бақылау жүргізіледі.

Барлық бөлінген экскременттер гельминттерді немесе олардың фрагменттерін анықтау мақсатында тексеріледі.

Зерттеу нәтижелері. Жүргізілген зерттеулер мен әдеби деректердің нәтижелеріне сүйене отырып, Орал қаласы көптеген гельминтоздардың табиғи ошағы орналасқан аймақта екенін анықтадық. Зерттелген жануарлар популяциясының жалпы жұқпалылығы 1 және 2-кестелерде көрсетілген.

Жүргізілген зерттеулер нәтижесінде барлық иттерден үш түрлі цестод-тениидтер анықталды: Taenia hydatigena, Multiceps multiceps, Dipylidium caninum (асқабақ тәрізді цепень, Dipylidiidae тұқымдасы). Сонымен қатар, екі түрлі аскаридаттар: Toxocara canis және Toxascaris leonina, сондай-ақ бір анкилостоматид түрі – Uncinaria stenocephala тіркелді. 1-кестеден көрініп тұрғандай, иттердің түрлі инвазиялармен жұқтыру деңгейі орта есеппен Post morbi – 42,0%, In vivo – 28,5%.

Taenia hydatigena (Pallas, 1766) гидатигенді тениоз – кең таралған гельминтоз. Оның қоздырғышы – Taenia hydatigena цестодасы. Жұқтыру деңгейі Post morbi – 33,3%, In vivo – 25,0%.

Taenia multiceps (Leske, 1780) таспа құртының ішектегі ересек сатысы иттер мен жыртқыштардың аш ішегінде тіршілік етеді. Жұқтыру деңгейі Post morbi – 22,2%, In vivo – 5,55%.

Echinococcus granulosus біздің зерттеулерде анықталған жоқ.

Dipylidium caninum (Linnaeus, 1758). Қоздырғышы – таспа құрты «қияр цепені» (лат. Dipylidium caninum). Экстенсивті инвазия деңгейі post morbi – 77,7% және in vivo – 38,8%.

Toxocara canis (Werner, 1782). Токсокароз (toxocariasis) – нематодоздар тобына жататын гельминтоз, ол қызбамен, бронхитпен, пневмониямен, гепатоспленомегалиямен және эозинофилиямен сипатталады.

Личинкалық токсокароз әлемнің көптеген елдерінде тіркелген. Адамда личинкалық (висцеральды, көздік) және имагиналдық (ішектік) түрлері ажыратылады.

Қала жағдайында токсокароз иттерде ең кең таралған аурулардың бірі болып табылады. Жұқтыру деңгейі постмортальды диагностика бойынша – 66,6%, тірі кезінде жүргізілген диагностика бойынша – 75,0%.

Toxascaris leonina (Linstow, 1902). Қоздырғышы – Toxascaris leonina нематодасы. Аталығының ұзындығы – 40-60 мм, аналығының ұзындығы – 55-120 мм. Бұл гельминт иттер мен басқа да жыртқыш жануарлардың, сондай-ақ адамның паразиті болып табылады. Экстенсивті инвазия деңгейі post morbi – 83,3% және in vivo – 52,7%.

Uncinaria stenocephala (Railliet, 1854). Ұзындығы 1,0 см-ге дейін жететін ұсақ гельминт. Қаладағы жыртқыш жануарларда унцинариоз жұқтыру деңгейі post morbi – 11,1% болып анықталды.

Кесте 1– Қалалық иттердің гельминтоздармен инвазиялануы

Гельминт түрі	Post morbi			In vivo	
	Инвазияланған бас саны	Э.И. (%)	И.И.	Инвазияланған бас саны	Э.И. (%)
1	2	3	4	5	6
Taenia hydatigena	6	33,3	1-12	9	25,0
Taenia multiceps	4	22,2	1-17	2	5,55
Echinococcus granulosus	-	-	2-10	-	-
1	2	3	4	5	6
Dipylidium caninum	14	77,7	1-23	25	38,8
Toxocara canis	12	66,6	1-23	27	75,0
Toxascaris leonina	15	83,3	1-23	19	52,7
Uncinaria stenocephala	2	11,1	1-6		-

Полиинвазия көбінесе Taenia hydatigena және Dipylidium caninum, сондай-ақ Toxocara canis, Dipylidium caninum және Toxascaris leonina комбинациясында кездескен.

Қаланың әртүрлі аймақтарындағы топырақтың гельминт жұмыртқаларымен ластану деңгейін толығырақ анықтау үшін біз 75 топырақ сынамасын зерттедік. Бұл сынамалар балалар алаңдарынан, мектеп аулаларынан, саябақтардан, сквелрдерден, көшелерден және үй жануарларын серуендету орындарынан алынды.

Иттер мен мысықтар бірнеше жолмен жұқтырылуы мүмкін. Көбінесе олар инфекциялық бастаманы азық пен сумен бірге жұтады. Ауру көбінесе жануарлардың бір-бірімен байланысуы арқылы немесе ластанған күтім заттары арқылы беріледі.

Көптеген ауруларды қан сорғыш буынаяқтылар таратады. Сонымен қатар, буаз ұрғашылардың ішіндегі ұрықтарға инфекция ананың жүкті кезінде жұғуы мүмкін.

Жануарлардың жұқпалы ауруларға шалдығуына және олардың таралуына ықпал ететін негізгі факторлар – паразиттердің инвазиялық элементтерімен ластанған топырақ, шөп және сыртқы ортаның басқа да нысандары.

Кесте 2 – Орал қаласындағы топырақтың гельминттердің инвазиялық элементтерімен ластану деңгейі

Зерттеу орны	Зерт. сынамалар	Анықталған оң сынамалар		Анықталған жұмыртқалар			
Көрсеткіштер		абс.	%	токсокар	токсаскарид	аскарид	басқалары
Серуендеу орындары	15	8	53,3	20,0	20,0	33,3	26,6
Балалар алаңдары	20	4	20,0	10,0	25,0	45,0	20,0
Мектеп аулалары	10	2	20,0	30,0	10,0	20,0	40,0
Саябақтар және	30	21	70,0	26,6	26,6	30,0	16,6
Барлығы	75	35	41,0	21,6	20,4	32,1	25,8

Зерттеу нәтижелері (2-кесте) бойынша, топырақ үлгілерінің 41,1%-ында гельминт жұмыртқалары анықталды. Оның ішінде 21,6%-ы токсокар жұмыртқалары, 20,4%-ы токсаскарид жұмыртқалары, 32,1%-ы аскарид жұмыртқалары және 25,8%-ы басқа да паразиттік жұмыртқалар болып табылады.

Қорытынды. Біздің зерттеулеріміздің нәтижесінде барлық иттерден үш түрлі цестод-тениид анықталды: Taenia hydatigena, Multiceps multiceps, Dipylidiidae тұқымдасынан – асқабақ тәрізді таспа құрт Dipylidium caninum; нематодтардан – екі түрлі аскаридат: Toxocara canis және Toxascaris leonina, сондай-ақ бір анкилостоматид түрі – Uncinaria stenocephala.

1-кестеден көрініп тұрғандай, иттердің түрлі инвазиялармен зақымдануы орта есеппен Post morbi кезінде – 42,0%, ал In vivo кезінде – 28,2% құрады.

Қаланың әртүрлі аумақтарынан (балалар алаңдары, мектеп аулалары, саябақтар, аллеялар, көшелер және үй жануарларын серуендету орындары) алынған 75 топырақ үлгісін зерттеу барысында аскарид жұмыртқалары – 32,1%, токсокар жұмыртқалары – 21,6% мөлшерінде анықталды.

Иттер мен адамдардың гельминтикалық ауруларының таралу аймағы жыл сайын артып келеді, бұл қаланың өсіп келе жатқан аудандарын басып алуда. Иттердің негізгі гельминтоздарының эпизоотологиясын білу гельминтикалық іс-шараларға қарсы ғылыми негізделген әзірлемелерді жүргізу үшін өте маңызды. Гельминтоздан иттерді сауықтыру адамның алдын алудың маңызды элементі болып табылады.

ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

1. 1 Dallas, T. Relative importance of host environment, transmission potential and host phylogeny to the structure of parasite metacommunities [Text]/ T. Dallas [and etc.] // Oikos. - 2014. - 123, - P. 866–874.

2. 2 Morand, S. Domesticated animals and human infectious diseases of zoonotic origins: domestication time matters. [Text]/ S. Morand [and etc.] // Infection, Genetics and Evolution. - 2014. - 24, P.76–81.

3. 3 Poulin, R. Decay of similarity with host phylogenetic distance in parasite faunas. Parasitology. [Text]/ R. Poulin// Trends Parasitol. -2010. - 137, P. 733–741.

4. 4 Mc Knight, T. Feral livestock in Anglo-America. [Text]/ T.Mc Knight // Berkeley: Los Angeles: Univ. California press. -1964. - 87 pp.

5. 5 Mc Neal, J. Dog flesh as a potential food resource for carnivores : an exploratory study. [Text]/ J. Mc Neal [and etc.] // J. Sci. - 1977. - 29. - N 1-2 - P. 101-108.

6. 6 Daszak, P. (2000) Emerging infectious diseases of wildlife-threats to biodiversity and human health. [Text]/ P. Daszak [and etc.] // Science.- 2000.- 287, P. 443 – 449.

7. 7 Daszak, P. Anthropogenic environmental change and the emergence of infectious diseases in wildlife. [Text]/ P. Daszak [and etc.] // Acta Tropica. -2001. - 78, P. 103 – 116.

8. 8 Hundal, J.S. Awareness, knowledge, and risks of zoonotic diseases among livestock farmers in Punjab. [Text]/ J.S. Hundal [and etc.] // Vet. World.- 2016.- 9(2), P. 186-191.

9. 9 Lappin, M. Pet ownership by immunocompromised people. . [Text]/ M./Lappin // Bayer Zoonosis Symposium. North American Veterinary Conference.- 2002.-24(5), P.16-25.

10. 10 MacDonald, A.S. Immunology of parasitic helminth infections. [Text]/ A.S. MacDonald [and etc.] //Infection and Immunity. -2002.- 70(2), P. 427–433.

11. 11 Palmer, C. National study of the gastrointestinal parasites of dogs and cats in Australia. [Text]/ C. Palmer [and etc.] //Veterinary Parasitology. 2008.-151(2-4), P.181–190.

12. 12 Oliveira-Sequeira, T. Prevalence of intestinal parasites in dogs from Sao Paulo state, Brazil. [Text]/ T.Oliveira-Sequeira [and etc.] //Veterinary Parasitology.- 2002.-103(1–20), P.19-27.

13. 13 Yacob, H.T. Gastrointestinal nematodes in dogs from Debre Zeit, Ethiopia. [Text]/ H.T. Yacob [and etc.] // Veterinary Parasitology. -2007.-148(2), P.144–148.

14. 14 Mekonnen, A. Prevalence of gastrointestinal helminthes among dogs and owners perception about zoonotic dog parasites in Hawassa town, Ethiopia. [Text]/ A.Mekonnen [and etc.] // Journal of Public Health and Epidemiology .- 2012.-4(8), P. 205–209.

15. Getahun, Z. Prevalence of gastrointestinal helminthes among dogs in Bahir Dar town, Ethiopia. Text]/ Z. Getahun [and etc.]//World Applied Sciences Journal.- 2012.-19(5), P. 595–601.

REFERENCES

1. 1 Dallas, T. Relative importance of host environment, transmission potential and host phylogeny to the structure of parasite metacommunities [Text]/ T. Dallas [and etc.] // Oikos. - 2014. - 123, - P. 866–874.

2. 2 Morand, S. Domesticated animals and human infectious diseases of zoonotic origins: domestication time matters. [Text]/ S. Morand [and etc.] // Infection, Genetics and Evolution. - 2014. - 24, P.76–81.

3. 3 Poulin, R. Decay of similarity with host phylogenetic distance in parasite faunas. Parasitology. [Text]/ R. Poulin// Trends Parasitol. -2010. - 137, P. 733–741.

4. 4 Mc Knight, T. Feral livestock in Anglo-America. [Text]/ T.Mc Knight // Berkeley: Los Angeles: Univ. California press. -1964. - 87 pp.

5. 5 Mc Neal, J. Dog flesh as a potential food resource for carnivores : an exploratory study. [Text]/ J. Mc Neal [and etc.] // J. Sci. - 1977. - 29. - N 1-2 - P. 101-108.

6. 6 Daszak, P. (2000) Emerging infectious diseases of wildlife-threats to biodiversity and human health. [Text]/ P. Daszak [and etc.] // Science.- 2000.- 287, P. 443 – 449.

7. 7 Daszak, P. Anthropogenic environmental change and the emergence of infectious diseases in wildlife. [Text]/ P. Daszak [and etc.] // Acta Tropica. -2001. - 78, P. 103 – 116.

8. 8 Hundal, J.S. Awareness, knowledge, and risks of zoonotic diseases among livestock farmers in Punjab. [Text]/ J.S. Hundal [and etc.] // Vet. World.- 2016.- 9(2), P. 186-191.

9. 9 Lappin, M. Pet ownership by immunocompromised people. . [Text]/ M./Lappin // Bayer Zoonosis Symposium. North American Veterinary Conference.- 2002.-24(5), P.16-25.

10. 10 MacDonald, A.S. Immunology of parasitic helminth infections. [Text]/ A.S. MacDonald [and etc.] //Infection and Immunity. -2002.- 70(2), P. 427–433.

11. 11 Palmer, C. National study of the gastrointestinal parasites of dogs and cats in Australia. [Text]/ C. Palmer [and etc.] //Veterinary Parasitology. 2008.-151(2-4), P.181–190.

12. 12 Oliveira-Sequeira, T. Prevalence of intestinal parasites in dogs from Sao Paulo state, Brazil. [Text]/ T.Oliveira-Sequeira [and etc.] //Veterinary Parasitology.- 2002.-103(1–20), P.19-27.

13. 13 Yacob, H.T. Gastrointestinal nematodes in dogs from Debre Zeit, Ethiopia. [Text]/ H.T. Yacob [and etc.] // Veterinary Parasitology. -2007.-148(2), P.144–148.

14. 14 Mekonnen, A. Prevalence of gastrointestinal helminthes among dogs and owners perception about zoonotic dog parasites in Hawassa town, Ethiopia. [Text]/ A.Mekonnen [and etc.] // Journal of Public Health and Epidemiology .- 2012.-4(8), P. 205–209.

15. Getahun, Z. Prevalence of gastrointestinal helminthes among dogs in Bahir Dar town, Ethiopia. Text]/ Z. Getahun [and etc.]//World Applied Sciences Journal.- 2012.-19(5), P. 595–601.

РЕЗЮМЕ

В органах и тканях животных могут одновременно паразитировать несколько видов гельминтов, формируя сообщество - гельминтоценоз.

В процессе его формирования в организме хозяина между сочленами гельминтоценоза возникают взаимоотношения, при которых развитие одних видов сдерживается, они вытесняются из биологической ниши или остаются в единичных экземплярах, тогда как другие виды гельминтов интенсивно развиваются и становятся доминирующими. Знание структуры гельминтоценозов, анализ результатов мониторинговых исследований ее изменений, выявление закономерностей формирования и функционирования имеют общебиологическое и прикладное значение.

В результате проведенных нами исследований у всех собак нами было отмечено три вида цестод-тениид: Taenia hydatigena, Multiceps multiceps, из семейства Dipylidiidae – тыквовидный цепень Dipylidium caninum; из нематод – два вида аскаридат: Toxocara canis и Toxascaris leonina и один вид анкилостоматид – Uncinaria stenocephala. Зараженность собак различными инвазиями составила в среднем в Post morbi - 42,0 % и в In vivo- 28,2% . При исследовании 75 проб почвы с различных территорий города: детских площадок, школьных дворов, парков, скверов, улиц и мест выгула домашних плотоядных. Больше всего в почве содержаться яйца аскарид 32,1% и токсокар- 21,6%.

ӘОЖ: 619:578.828.11:636.2
ҒТАХР: 68.41.41; 68.41.53; 68.41.63; 68.41.67;68.41.05

Канатбаев С.Г., биология ғылымдарының докторы, профессор, https://orcid.org/0000-0003-0640-4316
«Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық университеті», Орал қ, Достық д., 194, 090000, Қазақстан, serik_kg@mail.ru
Петропавловский М.В., ветеринария ғылымдарының докторы, https://orcid.org/0000-0002-9892-6092
Ресей ғылым академиясының Урал филиалының Урал федералдық аграрлық ғылыми-зерттеу орталығы, Екатеринбург қаласы, Белинский көшесі, 112а, 620142, Ресей, petropavlovsky_m@mail.ru
Кадыркулова М.М., маман, https://orcid.org/0009-0007-4927-155
«Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық университеті», Орал қ, Достық д., 194, 090000, Қазақстан, maralo4ka_81@mail.ru
Кужебаева У.Ж., ветеринария ғылымдарының магистрі, https://orcid.org/0000-0002-7887-3376
«Жәңгір хан атындағы Батыс Қазақстан аграрлық-техникалық университеті», Орал қ, Жәңгір хан 51 көшесі, 090009, Қазақстан, usya_999@mail.ru
Тажбаева Д.Т., ветеринария ғылымдарының магистрі, https://orcid.org/0000-0001-7429-7781
«Жәңгір хан атындағы Батыс Қазақстан аграрлық-техникалық университеті», Орал қ, Жәңгір хан 51 көшесі, 090009, Қазақстан, t_dauriya_t@inbox.ru

Мартынов Н.А., геномдық зерттеулер және жануарлар селекциясы кафедрасының лаборанты https://orcid.org/0000-0001-9251-0056
Ресей ғылым академиясының Урал филиалының Урал федералдық аграрлық ғылыми-зерттеу орталығы, Екатеринбург қаласы, Белинский көшесі, 112а, 620142, Ресей, martynov_kolya98@mail.ru

Kanatbayev S.G., doctor of Biological Sciences, professor, https://orcid.org/0000-0003-0640-4316
West Kazakhstan innovative and technological University, Uralsk, Kazakhstan, serik_kg@mail.ru
Petropavlovskiy M.V., doctor of Veterinary Sciences, https://orcid.org/0000-0002-9892-6092
Ural Federal Agrarian Scientific Research Center of Ural Branch of the Russian Academy of Sciences, Yekaterinburg, 112a Belinsky str., 620142, Russia, Petropavlovsky_m@mail.ru
Kadyrkulova M.M., specialist, https://orcid.org/0009-0007-4927-155
West Kazakhstan innovative and technological University, Uralsk, Kazakhstan, maralo4ka_81@mail.ru
Kuzhebayeva U. Zh., Master of Veterinary Sciences, https://orcid.org/0000-0002-7887-3376
NCJSC «Zhangir Khan West Kazakhstan Agrarian Technical University», Uralsk, Zhangir Khan street, 51, 090009, Kazakhstan, usya_999@mail.ru
Tazhbayeva D.T., Master of Veterinary Sciences, https://orcid.org/0000-0001-7429-7781
NCJSC «Zhangir Khan West Kazakhstan Agrarian Technical University», Uralsk, Zhangir Khan street, 51, 090009, Kazakhstan, t_dauriya_t@inbox.ru
Martynov N.A., Laboratory assistant at the Department of Genomic Research and Animal Breeding https://orcid.org/0000-0001-9251-0056
Ural Federal Agrarian Scientific Research Center of Ural Branch of the Russian Academy of Sciences, Yekaterinburg, 112a Belinsky str., 620142, Russia, martynov_kolya98@mail.ru

ІРІ ҚАРА МАЛДЫҢ BOLA-DRB3.2 ГЕНЕТИКАЛЫҚ МАРКЕРІ БОЙЫНША ГЕНОТИПТЕУ

GENOTYPING OF CATTLE INDIVIDUALS BY THE GENETIC MARKER BOLA-DRB3.2

АНДАТПА

BoLA-DRB3 гені – ірі қара малдың иммундық жауабын ұйымдастыруда маңызды рөл атқаратын, жоғары полиморфты басты гистосәйкестік кешеніне (БГК) кіретін ген. Осы ерекшелігіне байланысты бұл ген лейкоз вирусын (BLV) қоса алғанда, әртүрлі ауруларға генетикалық төзімділікті зерттеуде кандидаттық ген ретінде қарастырылады және популяциялық-генетикалық талдауда қолданылады. BoLA-DRB3 генінің полиморфизмі малдың әртүрлі ауруларға, соның ішінде BLV инфекциясының клиникалық түрі – персистентті лимфоцитозға (PL) сезімталдығын немесе төзімділігін анықтауы мүмкін.

Осы зерттеуде BoLA-DRB3 генінің Қазақстандағы жергілікті ірі қара мал тұқымдарындағы генетикалық өзгергіштігі зерттелді. Аллельдерді анықтау үшін RsaI, BstYI және HaeIII рестриктазаларымен ПТР-ПДРФ әдісі қолданылды. Аллельдік жиіліктер мен ауытқулар есептелді. Идентификацияланған 54 аллельді талдау олардың тұқымдар арасында әртүрлі таралуын көрсетті, бұл зерттелген популяциялардың генетикалық әртүрлілігін дәлелдейді.

BoLA-DRB3 генінің жоғары полиморфизмі, ауруларға төзімділікпен байланысты аллельдердің болуы, сондай-ақ оның өнімділік белгілерімен байланысы бұл генді малды инфекциялық ауруларға төзімділігін арттыруға бағытталған селекциялық бағдарламалар үшін перспективті нысанға айналдырады. BoLA-DRB3.2 локусын талдауда қолданылатын ПТР-ПДРФ әдісі генетикалық өзгергіштікті тиімді анықтауға, гетерозиготты және

гомозиготты аллельдерді ажыратуға мүмкіндік береді, бұл оны ірі қара малдың генетикалық және эволюциялық зерттеулерінде құнды құралға айналдырады.

ANNOTATION

The BoLA-DRB3 gene, part of the major histocompatibility complex (MHC), plays a key role in organizing the immune response in cattle and exhibits high polymorphism. Due to this, it is considered a candidate gene in studies of genetic resistance to diseases, including bovine leukemia virus (BLV), and is used in population genetic analysis. The polymorphism of BoLA-DRB3 may determine an animal's susceptibility or resistance to various diseases, including persistent lymphocytosis (PL), a clinical manifestation of BLV infection.

This study examines the genetic variability of the BoLA-DRB3 gene in local cattle breeds in Kazakhstan. The PCR-RFLP method with restriction enzymes RsaI, BstYI, and HaeIII was used to identify alleles. Allelic frequencies and deviations were calculated. The analysis of 54 identified alleles revealed differences in their distribution among breeds, indicating the genetic heterogeneity of the studied populations.

The high level of polymorphism in BoLA-DRB3, the presence of alleles associated with disease resistance, and its link to productive traits make this gene a promising target for breeding programs aimed at improving cattle resistance to infectious diseases. The PCR-RFLP method used for analyzing the BoLA-DRB3.2 locus effectively detects genetic variability, differentiates heterozygous and homozygous alleles, and serves as a valuable tool in genetic and evolutionary studies of cattle.

Кілт сөздер: *лейкоз вирусы, ірі қара мал, генотиптеу, генетикалық маркер, шектеу.*
Key words: *leukemia virus, cattle, genotyping, genetic marker, restriction.*

Кіріспе. Ірі қара малдың лейкозы – Retroviridae тұқымдасының Deltaretrovirus тегіне жататын лейкоз вирусы (BLV) қоздыратын кең таралған созылмалы инфекциялық ауру. Инфекция жұқтырған ірі қара малдарында ауру белгілері ешқандай симптомсыз өтеді, алайда инфекциялық процестің үдеуі ауыр неопластикалық өзгерістерге әкеледі. Вирус иммундық жүйенің жасушаларын, сондай-ақ кейбір деректер бойынша өкпе эпителийінің жасушалары мен тромбоциттерді зақымдайды. Қазіргі уақытта BLV-ге қарсы тиімді дәрілік препараттар мен вакциналар жоқ, алайда молекулалық-генетикалық маркерлер негізінде селекциялық жұмыстар жүргізу аурумен күресудің перспективті бағыты болып табылады [1-3].

Лейкоз қоздырғышымен инфекцияланған жануарлар өмір бойы оның тасымалдаушысы болып қалады. Қазіргі уақытта BLV-ге бағытталған тиімді дәрілік препараттар мен вакциналар жоқ. Дегенменде, жапон ғалымдарының пікірінше, ірі қара мал табындарында аурудың таралуын төмендетудің баламалы әдістерінің бірі – қоздырғышқа төзімділікпен байланысты молекулалық-генетикалық маркерлер негізінде селекциялық жұмыстар жүргізу [4]. Лейкоз қоздырғышына төзімділікпен байланысты мұндай генетикалық маркерлердің бірі – ірі қараның лейкоцитарлық адгезия жүйесі (BoLA).

Ген BoLA адамның HLA (Human Leukocyte Antigen) геніне ұқсас және иммундық жүйе жасушаларына антигендерді танып-білу мен ұсынуға қатысады, осылайша бейімделген иммундық жауаптарды реттейді.

BoLA-DRB3 генінің жоғары полиморфизмі инфекцияларға, соның ішінде вирустық ауруларға әртүрлі деңгейде қорғанысын қамтамасыз етеді [5, 6]. Қазақстандағы ірі қара малдың генетикалық алуандылығы әртүрлі тұқымдардың кеңінен қолданылуы мен түрлі климаттық жағдайларға бейімделуімен байланысты, бұл BoLA-DRB3 генінің полиморфизмін және оның лейкозға бейімділік немесе төзімділікпен байланысын зерттеудің маңыздылығын көрсетеді.

Көптеген елдерде жүргізілген зерттеулерінің нәтижесі бойынша BoLA-DRB3 генінің кейбір аллельдері BLV-ге төзімділік немесе сезімталдықпен байланысты болуы мүмкін

екенін айқындады. DRB30902 және DRB31201 аллельдері лейкозға төзімділікпен ассоциацияланған, ал DRB31501 және DRB31101 аллельдері ауруға жоғары сезімталдықпен байланысты. Мұндай аллельдердің тасымалдаушылары тұрақты лимфоцитоз немесе ісік процестерінің даму қауіпінің жоғарылауымен сипатталады. Бұл вирустық антигендердің тиімді ұсынылуының төмендігімен және Т-жасушаларының жеткіліксіз белсендірілуімен түсіндіріледі [7, 8].

Бірқатар зерттеуші ғалымдар BoLA-DRB3 генотипі мен лейкозға төзімділік арасындағы маңызды байланыстың барын анықтады. Бұл геннің белгілі бір аллельдері (*11, *23, *28) бар жануарлардың лейкоздың тұрақты лимфоцитоз (гематологиялық кезең) сатысына ауысу ықтималдығы төмен екені анықталды [9-11]. Керісінше, *22, *24, *16, *8 аллельдерінің тасымалдаушылары аурудың гематологиялық формасы бар жануарлардың арасында жиірек кездеседі [12, 13]. Тұрақты лимфоцитозға төзімділік басым белгі ретінде көрінеді, ал сезімталдық күрделі рецессивті механизм арқылы беріледі. Сонымен қатар, зерттеулер көрсеткендей, жануар генотипіндегі белгілі бір аллельдердің болуы оның өнімділігімен де байланысты [14].

BoLA-DRB3 полиморфизмін зерттеу белгілі бір аллельдерді төзімділік немесе сезімталдық маркерлері ретінде пайдалануға мүмкіндік береді. Бұл, әсіресе, BLV жұқтыру деңгейі жоғары популяцияларда ауруға төзімді жануарларды селекциялық іріктеу мүмкіндігін ашады. Алайда бұл ассоциациялар туралы мәліметтер әлі де қарама-қайшы және, әсіресе, әртүрлі ірі қара популяцияларында қосымша зерттеулерді қажет етеді. Қазақстанда ірі қара малдың генетикалық әртүрлілігі жоғары болғандықтан, аллельдердің таралуын зерттеу эпидемиологиялық жағдайды бағалауға және аймақтық селекциялық бағдарламаларды әзірлеуге көмектеседі.

Зерттеу материалдары мен тәсілдері. Жұмыс жануарлардың инфекциялық ауруларын мониторингтеу және болжау бөліміне қарасты лейкоз зертханасында, сондай-ақ Урал ғылыми-зерттеу ветеринариялық институтының жануарлардың геномдық зерттеулері және селекциясы зертханасында жүргізілді. Бұл институт Ресей Федерациясының Екатеринбург қаласындағы ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН құрылымдық бөлімшесі болып табылады. Зерттеу нысаны - қазақтың ақбас тұқымды ірі қара малы. Молекулалық-генетикалық және гематологиялық зерттеулер үшін стерильді, бір реттік вакуумдық жүйелі ЭДТА К3 типті пробиркаларына жануарлардың қан сынамалары алынды.

ДНҚ бөліп алу «Diatom DNA Prep 200» (ЖШҚ «ИзоГен», Ресей) коммерциялық жинағы көмегімен жүзеге асырылды. Зерттелген үлгілердегі ДНҚ концентрациясы Qubit 4 флуориметрі (Invitrogen, АҚШ) және «QuDye dsDNA HS екі тізбекті ДНҚ мөлшерін анықтау жиынтығы» (ЖШҚ "Люмипроб РУС") арқылы өлшенді.

BoLA-DRB3.2 маркерін қолдану арқылы ірі қара малды бастапқы генотиптеу бұрын Ван Эйк және т.б. ұсынған ПТР- ПДРФ әдісі негізінде жүргізілді.

Мақсатты ген фрагментін өндіру келесі олигонуклеотидтерді қолдану арқылы 2 кезеңмен жүргізілді (1-кесте).

1-кесте – BoLA-DRB3.2 күшейту үшін пайдаланылатын праймерлердің нуклеотидтер тізбегі

Олигонуклеотидтердің белгіленуі	Праймерлер (5'-3')	ПТР өнімінің ұзындығы	Әдебиеттер көзі
HL030	ATCCTCTCTCTGCAGCACATTTCC	284 ж.н.	Van Eijk және т.б.[15]
HL031	TTTAAATTCGCGCTCACCTCGCCGC		
HL032	TCGCCGCTGCACAGTGAAACTCTC		


Реакциялық қоспаны дайындау және амплификация параметрлерін анықтау ПТР HS-Taq(2^X) (diaGene, Ресей) экстра-миксін пайдалана отырып, нұсқаулыққа сәйкес жүргізілді.

Генотиптеу үшін алынған ПТР өнімі келесі рестрикция нуклеазаларымен өңдеуге ұшыратылды: *Rsa I, BstY I* және *Hae III.* ПТР реакциясы аяқталғаннан кейін зерттелетін үлгі 5 бірлік ферменттік белсенділікпен өңделді.

Rsa I және *Hae III* ферменттерімен өңделген үлгілер 37 °С температурада термостатталды, ал *BstY I* 65 °С температурада инкубацияланды. Реакция 12 сағат бойы жүргізілді. ПТР-ПДРФ талдау өнімдерінің бөлінуі горизонталды электрофорез жүйесі көмегімен 5%-дан 7%-ға дейінгі концентрациядағы агароза гелінде жүзеге асырылды (1, 2, 3-суреттер). Интеркалирлеуші бояу ретінде бромды этидий реагенті қолданылды.


Зерттеу нәтижелері. Ірі қара малдың BoLA-DRB3.2 генетикалық маркері бойынша бастапқы генотиптеуі ПТР-ПДРФ әдісімен жүргізілді. Барлығы 54 ірі қара мал зерттелді, олардың 49-ы коммерциялық тест-жүйені пайдалана отырып жүргізілген ПТР сынағы негізінде оң нәтиже көрсетті.

1-3 суреттерде BoLA-DRB3.2 гені бойынша ірі қара малды типтеу нәтижелерінің электрофореграммасы ұсынылған, ПТР өнімі Rsa I, BstY I және Hae III рестрикциялық эндонуклеазаларымен өңделгеннен кейін.




Сурет 1 – BoLA-DRB3.2 гені бойынша ірі қара мал үлгілерінің типтеу нәтижелерінің электрофореграммасы, ПТР өнімі Rsa I эндонуклеазасымен өңделгеннен кейінгі рестрикциясы

Белгілеулер: 1-8 – сынама нөмірлері, М – өлшемдік стандарт 50-1500 ж.н., қадам 50 ж.н.



Сурет 2 – Hae III гені бойынша ірі қара мал үлгілерінің типтеу нәтижелерінің электрофореграммасы

Белгілеулер: 1-8 – сынама нөмірлері, М – өлшемдік стандарт 50-1500 ж.н., қадам 50 ж.н.



Сурет 3 – BoLA-DRB3.2 гені бойынша ірі қара мал үлгілерін типтеу нәтижелерінің электрофореграммасы, ПТР өнімі BstY I рестрикция эндонуклеазасымен өңделгеннен кейін

Белгілеулер: 1-8 – сынама нөмірлері, М – өлшемдік стандарт 50-1500 ж.н., қадам 50 ж.н.

BoLA-DRB3 полиморфизмін талдау аллельдердің айтарлықтай әртүрлілігін көрсетті. Зерттелген үлгілер арасында BLV-ге төзімділікпен де, бейімділікпен де байланысты аллельдер анықталды. Бұл деректер инфекциялық ауруларға төзімділікті арттыруға бағытталған селекциялық бағдарламаларға генетикалық талдауды енгізудің маңыздылығын растайды.

Ірі қара малдың бастапқы генотиптеуі ПТР-ПДРФ әдісімен жүргізіліп, зерттелген сынамаларда (N=54) ең жиі кездесетін аллельдер *24 (n=16) және *9 (n=14) екені анықталды. Ал *4, *6, *8, *10, *13, *20, *27, *28, *29 аллельдері айтарлықтай сирек кездескендігі көрсетілді (2-кесте).

Кесте 2 – ПТР-ПДРФ әдісі бойынша BoLA-DRB3.2 генетикалық маркеріне ірі қара малды генотиптеу нәтижелері

Сынама №	Коммерциялық ПТР жинағы арқылы лейкозды тексеру нәтижелері	Аллельді нұсқасы BoLA-3.2, ПЦР-ПДРФ	Сынама №	Коммерциялық ПТР жинағы арқылы лейкозды тексеру нәтижелері	Аллельді нұсқасы BoLA-3.2, ПЦР-ПДРФ
1	+	*24/*24	28	теріс	*15/*16
2	+	*23/*8	29	+	*2/*2
3	+	*23/*8	30	+	*24/*29
4	+	*24/*24	31	+	*28/*9
5	+	*24/*22	32	+	*15/*10
6	+	*24/*24	33	+	*9/*9
7	+	*24/*9	34	+	*28/*17
8	+	*24/*9	35	+	*15/*22
9	+	*16/*8	36	+	*15/*22
10	+	*28/*4	37	+	*27/*17
11	+	*24/*9	38	теріс	*27/*23
12	+	*28/*28	39	теріс	*15/*22
13	+	*10/*16	40	+	*15/*22
14	+	*24/*9	41	+	*18/*17
15	+	*24/*9	42	+	*18/*23
16	+	*24/*9	43	+	*23/*24
17	теріс	*18/*8	44	теріс	*23/*9
18	+	*24/*10	45	+	*15/*22
19	+	*24/*18	46	+	*9/*9
20	теріс	*20/*15	47	теріс	*16/*16
21	+	*24/*24	48	+	*23/*24
22	+	*16/*6	49	мәлімет жоқ	*2/*3

23	теріс	*17/*17	50	+	*9/*9
24	теріс	*18/*17	51	+	*2/*2
25	+	*18/*17	52	+	*17/*13
26	теріс	*23/*29	53	+	*18/*23
27	+	*16/*16	54	+	*18/*11

Қорытынды. BoLA-DRB3 гені бойынша ірі қара мал үлгілерін типтеу нәтижелерінің электрофореграммаларында *Rsa I, BstY I* және *Hae III* рестрикция эндонуклеазаларымен өңделген ПТР өнімі рестрикция өнімдерін түзді, олар эндонуклеаз рестрикциясымен бөлінген өнімдердің аллельдік нұсқаларына сәйкес келді.

ПТР-ПДРФ әдісі бойынша ірі қара малдарының бірінші реттік генотиптеу жүргізу арқылы зерттелген сынамаларда (N=54) ең жиі кездесетін аллельдер *24 (n=16) және *9 (n=14) екені анықталды. Ал *4, *6, *8, *10, *13, *20, *27, *28, *29 аллельдері айтарлықтай сирек кездескендігі көрсетілді

Зерттеу BoLA-DRB3.2 генінің BLV-ге төзімділік маркері ретіндегі маңыздылығын растады. Алынған нәтижелер ірі қара мал популяцияларында лейкоздың таралуын азайтуға бағытталған селекциялық стратегияларды әзірлеу үшін пайдаланылуы мүмкін.

Бұл протоколдар болашақта Қазақстан Республикасының әртүрлі өңірлерінен алынған биоматериалға қолданылатын болады.

Қаржыландыру. Зерттеу жұмысы Қазақстан Республикасы Ғылым және жоғары білім министрлігі Ғылым Комитетінің гранттық қаржыландыру жобасы шеңберінде 2023-2025 жылдарға арналған AP19678641 «Маркерге бағытталған ірі қара өсірудің ғылыми негізделген тәсілдерін әзірлеу үшін лейкозға төзімділікпен байланысты BoLA - DRB3 генінің полиморфизмін бағалау» (№0123РК00262) жобасы бойынша орындалды.

ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

1. Bartlett, P. C., et al. Bovine leukemia virus and enzootic bovine leukosis [Text] // Journal of the American Veterinary Medical Association. – 2013. – V. 243(4). – P.475-481.

2. 2 Felmer, R., et al. Association of bovine leukocyte antigen (BoLA) DRB3 alleles with resistance and susceptibility to bovine leukemia virus infection in Holstein cattle [Text] // Veterinary Immunology and Immunopathology. – 2011.-V. 144(1-2). – P.102-110.

3. 3 Salomón-Torres, R., et al. Economic impact of bovine leukemia virus in dairy herds. [Text] // Research in Veterinary Science. – 2019. – V.119. – P.10-16.

4. 4 Rola-Luszczak M. Development of an improved real time PCR for the detection of bovine leukaemia provirus nucleic acid and its use in the clarification of inconclusive serological test results / M. Rola-Luszczak et al. [Text] // Journal of Virological Methods. – 2013. – T. 189. – №. 2. – C. 258-264.

5. 5 Xu, A., et al. BoLA-DRB3 gene polymorphism and its association with disease resistance and production traits in dairy cattle [Text] // Journal of Dairy Science. – 2009. – V. 92(2). – P.596-602.

6. 6 Maillard, J. C., et al. BoLA-DRB3 gene: association with productivity and disease resistance. [Text] // Animal Genetics. – 1999. – V. 30(4). - P. 257-264.

7. 7 Menezes, P. C., et al. Polymorphism of the BoLA-DRB3 gene and its association with enzootic bovine leukosis resistance. Research in Veterinary Science, 119, 115-121.

8. 8 Yoshida, T., et al. (2020). Functional implications of BoLA-DRB3 polymorphism in bovine immunity. [Text] // Immunogenetics. – 2020. – V. 72(3). P.179-189.

9. 9 Juliarena MA, Poli M, Sala L, Ceriani C, Gutierrez S, Dolcini G, Rodríguez EM, Mariño B, Rodríguez-Dubra C, Esteban EN. Association of BLV infection profiles with alleles of the BoLA-DRB3.2 gene [Text] // Anim Genet.- 2008. – V. 39(4). – P.432-440.

10. 10 Nikbakht Brujeni G, Ghorbanpour R, Esmailnejad A. Association of BoLA-DRB3.2 Alleles with BLV Infection Profiles (Persistent Lymphocytosis/Lymphosarcoma) and

Lymphocyte Subsets in Iranian Holstein Cattle [Text] // Biochem Genet. – 2016. – V. 54(2). – P.194-207.

11. 11 Borjigin L, Watanuki S, Hamada R, Bai L, Hirose T, Sato H, Yoneyama S, Yasui A, Yasuda S, Yamanaka R, Mimura M, Baba M, Inokuma M, Fujita K, Shinozaki Y, Tanaka N, Takeshima SN, Aida Y. Effectiveness of integrated bovine leukemia virus eradication strategies utilizing cattle carrying resistant and susceptible major histocompatibility complex class II DRB3 alleles [Text] // J Dairy Sci.- 2023. – V. 106(12). - P.9393-9409.

12. Le TD, Nguyen VS, Lo CW, Dao DT, Bui NV, Ogawa H, Imai K, Sugiura K, Aida Y, Haga T. Association between BoLA-DRB3 polymorphism and bovine leukemia virus proviral load in Vietnamese Holstein Friesian cattle [Text] // HLA. – 2022. – V. 99(2). – P.105-112

13. Nakatsuchi A, Matsumoto Y, Aida Y. Influence of BoLA-DRB3 Polymorphism and Bovine Leukemia Virus (BLV) Infection on Dairy Cattle Productivity [Text] // Veterinary Sciences. – 2023. – V. 10(4). – P.250

14. Galdino A.TE, Scavassini P.M., Fiorotti J., de Souza Bin R, Rodrigues C.A, Connelley T, Ferreira de Miranda S.IK. Graduate Student Literature Review: The DRB3 gene of the bovine major histocompatibility complex-Discovery, diversity, and distribution of alleles in commercial breeds of cattle and applications for development of vaccines [Text] // J Dairy Sci. – 2024. –V. 107(12). – P.11324-11341

15. Van Eijk M. J. T., Stewart-Haynes J. A., Lewin H. A. Extensive polymorphism of the BoLA-DRB3 gene distinguished by PCR-RFLP [Text] // Animal genetics. – 1992. – Т. 23. – №. 6. – P. 483-496.

REFERENCES

1 Bartlett, P. C., et al. Bovine leukemia virus and enzootic bovine leukosis [Text] // Journal of the American Veterinary Medical Association. – 2013. – V. 243(4). – P.475-481.

2 Felmer, R., et al. Association of bovine leukocyte antigen (BoLA) DRB3 alleles with resistance and susceptibility to bovine leukemia virus infection in Holstein cattle [Text] // Veterinary Immunology and Immunopathology. – 2011.-V. 144(1-2). – P.102-110.

3 Salomón-Torres, R., et al. Economic impact of bovine leukemia virus in dairy herds. [Text] // Research in Veterinary Science. – 2019. – V.119. – P.10-16.

4 Rola-Luszczak M. Development of an improved real time PCR for the detection of bovine leukaemia provirus nucleic acid and its use in the clarification of inconclusive serological test results / M. Rola-Luszczak et al. [Text] // Journal of Virological Methods. – 2013. – Т. 189. – №. 2. – С. 258-264.

5 Xu, A., et al. BoLA-DRB3 gene polymorphism and its association with disease resistance and production traits in dairy cattle [Text] // Journal of Dairy Science. – 2009. – V. 92(2). – P.596-602.

6 Maillard, J. C., et al. BoLA-DRB3 gene: association with productivity and disease resistance. [Text] // Animal Genetics. – 1999. – V. 30(4). - P. 257-264.

7 Menezes, P. C., et al. Polymorphism of the BoLA-DRB3 gene and its association with enzootic bovine leukosis resistance. Research in Veterinary Science, 119, 115-121.

8 Yoshida, T., et al. (2020). Functional implications of BoLA-DRB3 polymorphism in bovine immunity. [Text] // Immunogenetics. – 2020. – V. 72(3). P.179-189.

9 Juliarena MA, Poli M, Sala L, Ceriani C, Gutierrez S, Dolcini G, Rodríguez EM, Mariño B, Rodríguez-Dubra C, Esteban EN. Association of BLV infection profiles with alleles of the BoLA-DRB3.2 gene [Text] // Anim Genet.- 2008. – V. 39(4). – P.432-440.

10 Nikbakht Brujeni G, Ghorbanpour R, Esmailnejad A. Association of BoLA-DRB3.2 Alleles with BLV Infection Profiles (Persistent Lymphocytosis/Lymphosarcoma) and Lymphocyte Subsets in Iranian Holstein Cattle [Text] // Biochem Genet. – 2016. – V. 54(2). – P.194-207.

11 Borjigin L, Watanuki S, Hamada R, Bai L, Hirose T, Sato H, Yoneyama S, Yasui A, Yasuda S, Yamanaka R, Mimura M, Baba M, Inokuma M, Fujita K, Shinozaki Y, Tanaka N,

Takeshima SN, Aida Y. Effectiveness of integrated bovine leukemia virus eradication strategies utilizing cattle carrying resistant and susceptible major histocompatibility complex class II DRB3 alleles [Text] // J Dairy Sci.- 2023. – V. 106(12). - P.9393-9409.

12 Le TD, Nguyen VS, Lo CW, Dao DT, Bui NV, Ogawa H, Imai K, Sugiura K, Aida Y, Haga T. Association between BoLA-DRB3 polymorphism and bovine leukemia virus proviral load in Vietnamese Holstein Friesian cattle [Text] // HLA. – 2022. – V. 99(2). – P.105-112

13 Nakatsuchi A, Matsumoto Y, Aida Y. Influence of BoLA-DRB3 Polymorphism and Bovine Leukemia Virus (BLV) Infection on Dairy Cattle Productivity [Text] // Veterinary Sciences. – 2023. – V. 10(4). – P.250

14 Galdino A.TE, Scavassini P.M., Fiorotti J., de Souza Bin R, Rodrigues C.A, Connelley T, Ferreira de Miranda S.IK. Graduate Student Literature Review: The DRB3 gene of the bovine major histocompatibility complex-Discovery, diversity, and distribution of alleles in commercial breeds of cattle and applications for development of vaccines [Text] // J Dairy Sci. – 2024. –V. 107(12). – P.11324-11341

15 Van Eijk M. J. T., Stewart-Haynes J. A., Lewin H. A. Extensive polymorphism of the BoLA-DRB3 gene distinguished by PCR-RFLP [Text] // Animal genetics. – 1992. – Т. 23. – №. 6. – P. 483-496.

РЕЗЮМЕ

Ген BoLA-DRB3, входящий в главный комплекс гистосовместимости (ГКГ), играет ключевую роль в организации иммунного ответа у крупного рогатого скота и обладает высокой полиморфностью. В связи с этим он рассматривается как кандидатный ген в исследованиях генетической устойчивости к заболеваниям, включая вирус лейкемии крупного рогатого скота (BLV), и используется в популяционном генетическом анализе. Полиморфизм BoLA-DRB3 может определять восприимчивость или устойчивость животных к различным заболеваниям, в том числе к персистентному лимфоцитозу (PL) — клинической форме проявления BLV-инфекции.

В данной работе изучена генетическая изменчивость гена BoLA-DRB3 у местных пород крупного рогатого скота в Казахстане. Для идентификации аллелей использован метод ПЦР-ПДРФ с рестриктазами RsaI, BstYI и HaeIII. Были рассчитаны аллельные частоты и отклонения. Анализ 54 идентифицированных аллелей выявил различия в их распределении между породами, что свидетельствует о генетической неоднородности изученных популяций.

Высокий уровень полиморфизма BoLA-DRB3, наличие аллелей, ассоциированных с устойчивостью к заболеваниям, а также его связь с продуктивными признаками делают данный ген перспективным объектом для селекционных программ, направленных на улучшение устойчивости скота к инфекционным заболеваниям. Метод ПЦР-ПДРФ, используемый для анализа локуса BoLA-DRB3.2, позволяет эффективно выявлять генетическую изменчивость, различать гетерозиготные и гомозиготные аллели, что делает его ценным инструментом в генетических и эволюционных исследованиях крупного рогатого скота.

UDC 636.3.033
MRNTI 68.41

Sengaliyev Y.M., candidate of Sciences in Veterinary Sciences, https://orcid.org/0000-0002-1492-8577
NJSC «West Kazakhstan Agrarian and Technical University named after Zhangir Khan», Uralsk,st. Zhangir khan 51,090009, Kazakhstan, s_erbol89@mail.ru.
Kushmukhanov Zh.S., Doctor of Philosophy (PhD), https://orcid.org/0000-0001-8843-9939

NJSC «West Kazakhstan Agrarian and Technical University named after Zhangir Khan», Uralsk, st. Zhangir khan 51,090009, Kazakhstan, jenis.90@mail.ru
Duimbaev D.A., master of Agricultural Sciences, https://orcid.org/0000-0003-1533-898X
NJSC «West Kazakhstan Agrarian and Technical University named after Zhangir khan», Uralsk, st. Zhangir khan 51, 090009, Kazakhstan, e-mail: dulat_18@mail.ru
Muldagaliyev M. Kh., master, https://orcid.org/0009-0003-4579-0050
Terekti college 091115, Republic of Kazakhstan, WKO, Terektinsky district, Podstepnoe village Virgin street, 71,A, miras_muldagaliev@mail.ru

THE EFFECT OF KETONE BODIES ON SOME BLOOD PARAMETERS IN PREGNANT SHEEP

ANNOTATION

One of the main issues currently in veterinary medicine is the problem of obtaining high fertility and increasing the longevity of queens in animal husbandry. Currently, in sheep farming, we observe the tension of the functional systems of the sheep's body, which work at the peak of a pathological condition that contributes to the development of new diseases.

Due to disorders in the body of pregnant animals, the syndrome of feto placenta insufficiency develops, which triggers changes in the fetus / fetuses in the uterus of the mother.

In our study, the experimental group of pregnant animals with signs of latent ketosis included sheep in which, when studying the composition of urine, we found ketone bodies in urine of more than 0.5 mmol/l.

We have found that when the indicators of ketone bodies increase by 2.3 times more than physiological norms, both the indicators of the fraction — acetoacetic acid with acetone and β-hydroxybutyric acid also increases 5.9 and 1.5 times, respectively, buffer base values decrease to 18.41 ± 1.53 mmol/L, glucose concentrations in animals also decrease to 2.25 ± 0.16 mmol/L, as well as a decrease in the coefficient of acetoacetic acid with acetone and β-hydroxybutyric acid to 1.53± 0.28 indicates that we have studied pregnant animals with changes in metabolism in the body, which corresponds to signs of latent ketosis.

The results of our study also show that the proportionality of the fraction of the studied ketone bodies of VN to AcAs was reduced by 1.9:1 and we take these data into account as a marker of fatty liver dystrophy, which does not depend on the limit of total ketone bodies in the blood.

Changes in the metabolism of the body in pregnant animals disrupt the function of the fetoplacental complex, which leads to stimulation of the metabolic process.

We have confirmed an increase in the proportion of ketodiene products and trione binding in the blood of pregnant animals with latent ketosis by 1.75 times. malondialdehyde values in latent ketosis were in the range of 1.125 ± 0.34 mmol/l.

Accordingly, markers of metabolism that are commonly used in veterinary medicine for diagnostic purposes in pregnant animals with latent ketosis differ in that they show low sensitivity and have low specificity in comparison with these systems of lipid peroxidation and antioxidant protection. In the future, the results of these studies should be taken into account when studying diseases such as latent and clinical ketosis of pregnant animals as a concept of the occurrence of a change in the function of lipid peroxidation – antioxidant protection in this metabolic pathology.

Key words: *ketone bodies, sheep, latent ketosis, metabolic disorders, blood.*

Introduction. Among the many fundamental problems of modern veterinary medicine, the problem of increasing fertility and maintaining productive longevity of the breeding stock in sheep breeding is put forward in one of the first places.

In modern conditions of sheep farming, excessive functional stress of the animal's body, its various organs and systems is noted, in some cases functioning "on the verge of pathology", which leads to the evolution of old and the emergence of new diseases. As a result of changes in the body

of pregnant sheep, fetoplacental insufficiency syndrome develops, which is the main mechanism of fetal/fetal development disorders in the prenatal period.

The causes of ketonuria in pregnant sheep are multifactorial and complex to this day. The timing has not yet been fully determined. Studies by various authors have shown that this complication is the basis. The reason for this is a decrease in blood circulation in the kidneys and the development of metabolic disorders associated with incomplete and unbalanced nutrition.

This has now been convincingly proven. Selenium has antioxidant properties and protects the reproductive health of animals suffering from many diseases. The researchers were interested in the question: do animals need selenium, who received sufficient amounts of vitamin E.

The results of subsequent studies have shown the need to introduce the trace element selenium into the body. Insufficient intake of selenium trace elements into the animal body leads to selenium

deficiency diseases affecting the main physiological systems and internal organs. Therefore, it is important to normalize the selenium content in the animal's body, in accordance with its functional

capabilities, conditions for homeostasis correction.

Among the many fundamental problems of modern veterinary medicine, the problem of increasing fertility and maintaining productive longevity of the breeding stock in sheep breeding is put forward in one of the first places.

In modern conditions of sheep farming, excessive functional stress of the animal's body, its various organs and systems is noted, in some cases functioning "on the verge of pathology", which leads to the evolution of old and the emergence of new diseases. As a result of changes in the body of pregnant sheep, fetoplacental insufficiency syndrome develops, which is the main mechanism of fetal/fetal development disorders in the prenatal period.

Highlighting previously unsolved parts of a common problem. Currently, many issues of the functioning of the system "lipid peroxidation – antioxidant protection" according to V.S. Avdeenko, S.A. Migaenko [1] and V.S. Avdeenko, A.V. Molchanov, R.N. Bulatov [2] concerning the state of metabolic processes in the body of suyag sheep in the presence of subclinical ketosis have not yet been studied.

Analysis of recent research and publications. The mechanism of development of subclinical ketosis in pregnant sheep in the context of metabolic disorders is considered in scientific publications as a factor of homeostasis destabilization in pregnant animals and currently, according to the analysis of studies conducted by V.S. Avdeenko [3] and I.V. Kireev [4], is in the stage of accumulation of factual material. Currently, [5,6,7] the participation of selenium in reducing the level of lipid peroxidation and binding of free radicals has been established, which optimizes immunobiological reactions in the body.

In the works of E.W. Edens [8] and K.A. Jacques [9], it was shown that the metabolism of selenium absorbed into animal tissues is fixed by protein globulins. At the same time, according to J.Kohrle, [10] and J.A.Johannigman [11], with a low content of selenium in the diet of small cattle, the work of the pancreas is disrupted, as a result, its metabolism in the rumen is disrupted with the formation of insoluble forms of the trace element, which are excreted in faeces, which leads to a significant accumulation of free radicals and disruption the "POL-AOZ" system.

The purpose of the article. Determination of changes in the status of the "lipid peroxidation – antioxidant protection" system in pregnant sheep against the background of subclinical ketosis.

Materials and methods. The experimental group of sheep consisted of animals with symptoms of subclinical ketosis. For hematological studies, blood was taken before morning feeding. Biochemical blood tests were performed on a CIBA - CORNING 288 BLOOD GAS SYSTEM analyzer (manufactured in the USA).

A total of 491 cases, or 22.00% of sheep, were recorded between the inspection and planning stages. The molecular signs of this disease "OPG-gestosis" are characterized by an increase in dorsal skin, croup, anogenital area, enlargement of the nasal cavity, tapping movements, lordosis

of the stem. A decrease in blood pressure in the pancreas of the studied mammals was found, which took the entire duration of the study, and the effect of blood and urine Annalysis gave a positive result for subcutaneous ketosis.

The manifestation of "OPG-gestosis" in pregnant pigments against the zone of subcutaneous ketosis, which is associated with depressive states, loss of appetite, blooming of the mucous membrane of vision and sudden disorders of the main nervous system, as well as protein content in urine.

In addition, primary and intermediate products of lipid peroxidation were determined in the blood of sick animals, which were evaluated by the content of isolated double bonds, ketodienes and conjugated trienes (CDiST) and diene conjugates (DC), secondary — by the content of manol dialdehyde (MDA).

The data obtained were expressed in mmol/l, CDiST - in units. The total antioxidant activity was evaluated using a model system representing a suspension of egg yolk lipoproteins, which allows to assess the ability of blood serum to inhibit the accumulation of TBK-active products in suspension. The antioxidant activity was expressed in units. The determination of α -tocopherol was carried out by the fluorimetric method.D, L, α-tocopherol from Serva was used as a standard.

The content of a-tocopherol was expressed in mmol/L. Retinol is determined simultaneously with α-tocopherol.At the same time, α-tocopherol and retinol have intense fluorescence with a maximum of excitation at X = 350 nm and radiation at X = 420 nm.The retinol content was expressed in mmol/L. Determination of reduced glutathione (GSH), oxidized glutathione (GSSG) by the fluorimetric method (Hissin, Hilf, 1976).

GSSG was determined in an alkaline medium (pH = 12). In addition, N-ethylmalienite was added to the samples to prevent the oxidation of GSH in GSSG. The measurements were carried out on a Shimadzu spectrofluorophotometer (RT-5000).

The contents of GSII and GSSG were expressed in mmol/L. Determination of the activity of superoxide dismutase (SOD). The method is based on the ability of SOD to inhibit the reaction of autoxidation of adrenaline at pH = 10.2. The measurement of SOD activity was carried out on a spectrofluorophotometer at X - 320 nm. SOD was expressed in conl.ed.

Standard histological techniques were used for morphological studies of the liver, liver samples were taken from slaughtered animals.

Statistical data analysis was performed using standard Microsoft Excel 2000 SPSS 10.0.5 forWindows programs.

Results and discussion. The results of a biochemical blood test in suyag sheep that respond positively to ketone bodies in urine are presented in the data in Table 1.

Table 1 — Biochemical studies of the blood of suyag sheep that respond positively to ketone bodies in urine

The studied indicator	Reference values	The actual content in the blood
Glucose, mmol/l	2,23 - 3,34	2,26± 0,17
Total protein, g/l	72 - 86	82,0 ± 6,1
Alkaline reserve, mmol/l	19 - 27	19,11 ± 2,13
Common Ketone bodies mmol/l	0,18 - 1,03	2,38 ± 0,22**
Acetoacetic acid with acetone (AcAc), mmol/l	0,03 - 0,24	0,94 ± 0,09**
β-hydroxybutyric acid (VN), mmol/l	0,48 - 0,79	1,44 ± 0,16*
Relationship VN / Acetoacetic acid with acetone	-	1,62 ± 0,31

Note: hereafter * $p<0.05$;** $p<0.01$

The analysis of the obtained materials indicates that there is an increase in the level of ketone bodies above physiological limits by 2.3 times and their fractions — AcAc (acetoacetic acid with acetone, mmol/l) and VN (β-hydroxybutyric acid, mmol/l) by 5.9 times and 1.5 times, respectively, a decrease in buffer bases to 19.11 ± 2.13 mmol/l, glucose concentrations up to 2.26± 0.17 mmol/l, as well as the coefficient of the HH/AcAc ratio up to 1.62 ± 0.31.

The changes obtained indicate a violation of metabolic metabolism in sheep of the type characteristic of subclinical ketosis.

It follows from the materials presented in Table 2 that the highest values of total ketone bodies, mmol/l, VN and VN/AcAs were observed in pregnant sheep with no pronounced fatty infiltration of liver tissue and amounted to 3.2 ± 0.31, 2.53 ± 0.23 mmol/l and 3.8 ± 0.6 mmol/l, respectively.

At the same time, more intense liver damage is accompanied by a decrease in these indicators and an increase in AcAs.

Table 2 — Dependence of fatty liver infiltration on the concentration of ketone bodies in the blood (mmol/l)

The indicator of ketogenesis	Absence of visible (with light microscopy) fatty degeneration	Large-drop fatty dystrophy of centrolobular localization
Common Ketone bodies	3,22 ±0,11.	2,49 ± 0,12*
Acetoacetic acid with acetone AcAc	0,62 ± 0,07	0,96 ± 0,08*
VN	2,53 ± 0,03	1,82 ±0,05**
Relationship VN / Acetoacetic acid with acetone	3,8 ± 0,6	1,9 ±0,43**

Thus, in large-drop fatty dystrophy of predominantly centrolobular localization, which is most characteristic of subclinical ketosis, the concentration of OCT, VN and VN/AcAs amounted to 2.79 ± 0.22, 1.82 ± 0.15 mmol/l and 1.9 ± 0.43 mmol/l, respectively, the level of AcAs in the blood of these animals, on the contrary, was higher and amounted to 0.97 ± 0.07 mmol/l.

Table 3 – Fluctuations of primary, intermediate and final products of lipid peroxidation in the blood of sick sheep

Indicators	Clinically healthy (n = 15)	Subclinical ketosis (n = 15)
Isolated double bonds (cont. units)	1,203 ± 0,22	1, 901 ± 0,13*
Diene conjugates (mmol/l)	0,898 ± 0,11	0,532 ± 0,05*
Ketodienes and conjugated trienes (conl. units)	0,159 ± 0,06	0,171 ± 0,06*
A-tocopherol (mmol/l)	8,69± 0,32	6,62 ± 0,27*
Retinol (mmol/l)	2,581 ± 0,21	1,361 ± 0,26*
Reduced glutathione (mmol/l)	1,438 ± 0,05	1, 685 ± 0,07**
Oxidized glutathione (mmol/l)	2,567 ± 0,17	2,915 ± 0,14*
Superoxide dismutase (conl. units)	1,834 ± 0,18	1,609 ± 0,21**

Based on the above, it can be concluded that fatty liver infiltration is accompanied by an increase in the blood level of the most toxic fraction of ketone bodies — AcAs, a decrease in the concentration of OCT, VN and the VN/AcAs coefficient.

Therefore, the ratio of fractions of ketone bodies of β-hydroxybutyric acid (BH) to acetone with acetoacetic acid (Ac) is lower than 1.9:1, should be considered as a non-specific marker of fatty liver dystrophy regardless of the level of OCT in the blood.

To study the state of lipid peroxidation processes in patients with subclinical ketosis of sheep, concentrations of primary, intermediate and final products of lipid peroxidation were determined (Table 3).

When analyzing the concentration of double bonds in the blood, it should be noted that in pregnant sheep with subclinical ketosis, their increase is observed by 20.46%.

The level of diene conjugates in the blood of sheep with the manifestation of subclinical ketosis in comparison with clinically healthy animals was statistically significantly increased by 1.87 times ($p<0.01$).

The concentration of ketodiene intermediates and conjugated trienes in the blood of sheep with subclinical ketosis was significantly increased by 1.75 times compared with those of clinically healthy animals ($p<0.01$).

As follows from the presented data, the metabolic parameters that are traditionally used in the diagnostic algorithm in animals with subclinical ketosis at the end of pregnancy of animals are less sensitive and specific than the indicators of the "lipid peroxidation – antioxidant protection" system.

Therefore, an increase in the level of lipid peroxidation intermediates (Cysts) has a comparable sensitivity and greater specificity compared with a decrease in blood metabolic parameters.

Conclusion. The mechanism of development of metabolic stress as a developmental factor in pregnant sheep revealed eclampsia, since during this period the indicators of the system of "lipid peroxidation" were revealed the diagnostic value of "antioxidant protection" is quite high.

The mechanism of development of subclinical ketosis in suyag sheep has been revealed, since the indicators of the system "lipid peroxidation – antioxidant protection" have a significantly high diagnostic value in subclinical ketosis in suyag sheep; among the studied indicators, the concentration of isolated double bonds in the blood of pregnant sheep with subclinical ketosis.

The molecular signs of this disease "OPG-gestosis" are characterized by an increase in dorsal skin, croup, anogenital area, enlargement of the nasal cavity, tapping movements, lordosis of the stem. A decrease in blood pressure in the pancreas of the studied mammals was found, which took the entire duration of the study, and the effect of blood and urine Annalysis gave a positive result for subcutaneous ketosis.

Was increased by 20.46%, and the level of diene conjugates was 1.87 times higher; the concentration of ketodiene intermediates and conjugated trienes in the blood of sheep with subclinical ketosis was significantly increased by 1.75 times compared with those of clinically healthy animals. Therefore, an increase in the level of lipid peroxidation intermediates (Cysts) has a comparable sensitivity and greater specificity compared with a decrease in blood metabolic parameters.

In the future, the material obtained in this work should be taken into account when studying the problem of subclinical and clinical ketosis in pregnant sheep and its relationship with fetoplacental insufficiency in domestic animals, as a concept for the development of a violation of the functioning of the "HALF-AOZ" system in these metabolic pathologies.

REFERENCES

1. Bulatov, R. N. Chastota rasprostranenija i klinicheskaja simptomatika gestoza u sujagnyh ovec [Text] / R. N. Bulatov, V. S. Avdeenko, E. U. Bajtlesov // Aktual'nye problemy veterinarnoj hirurgii, onkologii i terapii . –2016. – S. 17–21.

2. Sengaliev, E. M. Biohimicheskie processy v krovi sujagnyh ovec pri razvitii subklinicheskogo ketoza [Text] / V. S. Avdeenko, E. M. Sengaliev, R. N. Bulatov // - Sciences of Europe. Praha. – 2016, №9(9). - Vol 2. – P. 109-113.

3. Migaenko, S. A. Profilaktika giposelenovyh jelementozov u sujagnyh ovcematok [Text] / S. A. Migaenko, V. S. Avdeenko // Veterinarnaja medicina: materialy Mezhdunar. nauch.-prakt. simpoziuma. – Saratov, 2011. – S. 183-184.

4. Zagrekov, A. A. Vlijanie selenolina na produktivnost' cigajskih ovec v uslovijah Saratovskogo Zavolzh'ja [Text]: avtoref. dis. … kand. s.-h. nauk. – Saratov, 2000.

5. Sengaliev, E. M. Metabolicheskie izmenenija v krovi sujagnyh ovec na poslednyh srokah plodonoshenija v norme i prisubklinicheskom ketoze [Text] / E. M. Sengaliev, V. S. Avdeenko, A. V. Molchanov, A. N. Kozin // Ovcy, kozy, sherstjanoe delo. –2017.– №4. – S.44-45.

6. Aboneev, D. V. Korreljacija zhivoj massy jagnjat pri pozhdenii s mopfometpicheskimi pokazateljami posleda, dlinoj i tolshhinoj pupoviny [Text] / D. V. Aboneev // Vestnik Voponezhskogo gosudapstvennogo agpapnogo univepsiteta. – 2011.– № 2 (29). – S. 85-88.

7. Barabanshhikova, L. N. Soderzhanie i raspredelenie selena v agrolandshaftah Severnogo Zaural'ja [Text]: avtoref. dis. ... kand. biol. nauk / L.N.Barabanshhikova. – Tjumen'.– 2013. – 18 s.

8. Sengaliev, E. M. Metabolicheskij stress u sujagnyh ovec na poslednih srokah plodonoshenija kak faktor razvitija jeklampsii [Text] / E. M. Sengaliev, V. S. Avdeenko, A.V. Molchanov // Vestnik Ul'janovskoj gosudarstvennoj sel'skohozjajstvennoj akademii.– 2018.– № 2 (42). – S. 206-209.

9. Pal, D. T. Evaluation of metalloenzymes as biomarkers of copper and zinc status in sheep [Text] / D. T. Pal, C. S. Prasad, N. K. S. Gowda, G. S. Babu, K. T. Sampath // Journal of Veterinary Science and Medical Diagnosis. – 2014, № 10.4172/2325–9590.1000131.

10. Sengaliev, E. M. Mehanizm razvitija subklinicheskogo ketoza u sujagnyh ovec [Text] / E. M. Sengaliev, V. S. Avdeenko, A. V Molchanov, R. N.Bulatov // Uspehi sovremennoj nauk. –2016.– № 11. T.9. – S. 81-86.

11. Sengaliev, E. M. Primenenie antioksidantnyh preparatov dlja profilaktiki patologicheskih rodov u ovec, bol'nyh gestozom na fone ketonurii [Text] / E. M.Sengaliev, V. S Avdeenko, A. V. Molchanov, A. S. Ryhlov, D. V. Krivenko, A. V. Egunova // Agrarnyj nauchnyj zhurnal. Estestvennye nauki. –2017.– №12. – S. 50-52.

12. Sengaliev, E. M. Opredelenie profilakticheskoj dozy vitaminno-mineral'nogo preparata (L-asparginata Si, So, i preparaty Be i vitaminov VA, VE) [Text] / E. M. Sengaliev, V. S. Avdeenko, R. N. Bulatov, V. D. Kocharjachn // Aktual'nye problemy veterinarnoj mediciny, pishhevyh i biotehnologij: Materialy Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferencii. - Saratov: Saratovskij GAU.–2019. - S. 125-129.

13. Chandan, K. Sen. Tocotrienols: Vitamin E beyond tocopherols [Text] / K. Sen. Chandan, K.Savita, R.Sashwati // Life sciences. – 2006.– V. 78.– № 18. – P. 2088–2098.

14. Fouda, T. A. Sheep: Clinical and Laboratory Study / T. A. Fouda, M. A. Youssef, W. M ElDeeb// Veterinary Research. – 2012.– № 5. – R. 16–21.

15. Sengaliev, E.M. Diagnostika, terapija i profilaktika jeklampsii sujagnyh ovec v hozjajstvah Zapadno-Kazahstanskoj oblasti Respubliki Kazahstan [Text]: avtoref.dis... kand.vet. nauk: 06.02.06/ E.M.Sengaliev.–Saratov.–2019.–21s.

16. Rumball, C.W.H. Method for Assessment of Blood Volume Parameters in Pregnant Sheep using Fluorescein-labelled Dextran [Text] /C.W.H. Rumball, P. Van Zijl, M.D. Rutland, F.H. Bloomfield, J.E. Harding// Placenta.–2008.– Volume 29.–Issue.– Pages 15-19. https://doi.org/10.1016/j.placenta.2007.09.002

17. Orengo, Otal, Juan. Characterization of edible biomass of Atriplex halimus L. and its effect on feed and water intakes, and on blood mineral profile in non-pregnant Manchega-breed sheep [Text] / Otal, Juan Orengo, Alberto Quiles, María Luisa Hevia, Francisco Fuentes //Small Ruminant Research.–Volume 91.–Issues2–3.–July 2010.– Pages 208-214. https://doi.org/10.1016/j.smallrumres.2010.03.016

18. Özlem B. Plane of nutrition and FSH-induced superovulation affect the expression of steroid hormone receptors and growth factors in caruncular tissue of non-pregnant sheep [Text] / Özlem Bedir, Aykut Gram, Sheri T. Dorsam, Anna T. Grazul-Bilska, Mariusz P. Kowalewski // Domestic Animal Endocrinology.–2022. Volume 78.–106683. https://doi.org/10.1016/j.domaniend.2021.106683

19. Tomasz Stankiewicz. Morphometric measurements of the umbilical cord and placentomes and Doppler parameters of the umbilical artery through ultrasonographic analysis in pregnant sheep [Text] / Tomasz Stankiewicz, Barbara Błaszczyk, Jan Udała, Pavitra Chundekkad //Small Ruminant Research. 2020.–Volume 184.–106043. https://doi.org/10.1016/j.smallrumres.2019.106043

20. Zhang Lubo. Effect of R(-) 2,5-dimethoxy-4-methylamphetamine on uterine and umbilical blood flow in conscious pregnant sheep [Text]/ Zhang Lubo, Donald C. Dyer, Frederick B. Hembrough, Miguel Isla.. // European Journal of Pharmacology.–1991.–Volume 199.– Issue 2.–25.– Pages 179-184. https://doi.org/10.1016/0014-2999(91)90455-Y.

ТҮЙІН

Қазіргі кезеңде ветеринариядағы негізгі мәселелердің біріне жоғары төлділікті алу және мал шаруашылығында аналықтардың ұзақ өмір сүруін ұзарту мәселесі жатады. Қазіргі уақытта қой шаруашылығындағы жаңа аурулардың дамуына ықпал ететін патологиялық жағдайдың шыңында пайда болатын қой ағзасындағы функционалды жүйелерінің ауытқуын байқаймыз. Буаз жануарлардың денесіндегі бұзылуларға байланысты, фетоплацентарлық жеткіліксіздігі синдромы дамиды, бұл аналықтың жатырындағы ұрықтың даму механизмінің өзгеруін тудырады.

Біздің зерттеуіміздің тәжірибелі тобына жасырын кетоз белгілері бар буаз жануарлар енгізілді, олардан біз зәрдің құрамын зерттеу кезінде несепте 0,5 ммоль/л-ден астам кетон денелерін таптық.

Біз кетон денелерінің көрсеткіштері физиологиялық нормалардан 2,3 есе артқан кезде, фракция көрсеткіштерінің де артқанын байқадық, яғни ацетосірке қышқылы ацетонмен фракциясы 5,9 есе көбейген, β-оксимай қышқылы фракциясы 1,5 есе артқан, ал буферлік негіздердің көрсеткіштері 18,41 ± 1,53 дейін ммоль / л дейін төмендеген, жануарлардағы глюкоза концентрациясының көрсеткіштері де 2,25 ± 0,16 ммоль / л дейін төмендеген, сондай-ақ ацетосірке қышқылы ацетонмен және β-оксимай қышқылы коэффициентінің көрсеткіштері 1,53±0,28 дейін төмендеді, бұл көрсеткіштер біз зерттеген буаз жануарлардың жасырын кетоз белгілеріне сәйкес келетін организмдегі метаболизмнің өзгеруі бар екенін көрсетеді.

Біздің зерттеу нәтижелеріне қарасақ, зерттелген кетон денелерінің фракциясының, яғни ацетосірке қышқылы ацетонмен және β-оксимай қышқылы пропорционалдылығы 1,9:1-ге төмендегенін көрсетеді және біз бұл деректерді бауырдың майлы дистрофиясының маркері ретінде қарастырамыз, бұл жалпы кетон шегіне тәуелді емес қандағы денелер болып саналады. Буаз жануарлардағы дене метаболизміндегі өзгерістер фетоплацентарлы кешеннің қызметін бұзады және бұл метаболизм процесін ынталандыруға әкеледі. Жасырын кетозбен ауыру кезінде буаз жануарлардың қанындағы кетодиен өнімдері мен триондарды байланыстыру үлесінің 1,75 есе артқаны расталды. Жасырын кетоздағы малон диальдегидінің көрсеткіштері 1,125 ± 0,34 мкмоль/л аралығында болды.

Тиісінше, жасырын кетоз кезінде буаз жануарларда диагностикалық мақсатта ветеринарияда жалпы бәрі жиі қолданылатын метаболизм маркерлері төмен сезімталдықты көрсететін және липидтердің тотығуы және антиоксидантты қорғаныс жүйелерінің деректерімен салыстырғанда төмен спецификалық айырмашылықтарға ие екені анықталды. Болашақта осы зерттеулердің нәтижелері буаз жануарлардың жасырын және клиникалық кетозы сияқты ауруларды зерттеу кезінде липидтердің тотығу функциясының өзгеруінің тұжырымдамасы, яғни метаболизмнің осы патологиясындағы антиоксидантты қорғанысы ретінде ескерілуі керек.

РЕЗЮМЕ

Одним из основных вопросов в настоящем времени в ветеринарии является проблема получения высокой плодовитости и увеличения долголетия маток в животноводстве. В настоящее время в овцеводстве наблюдаем напряжение функциональных систем организма овец, которые работают на пике патологического состояния, которое способствует развитию новых заболеваний. Из-за нарушений в организме беременных животных, развивается синдром недостаточности фетоплаценты, который запускает изменения у плода/плодов в матке у матери.

В нашем исследовании в опытную группу беременных животных с признаками скрытого кетоза были включены овцы, у которых мы при изучении состава мочи обнаружили в моче кетоновые тела более 0,5 ммоль/л.

Нами было выявлено, что когда показатели кетоновых тел увеличиваются больше физиологических норм в 2,3 раза и то и показатели фракции — ацетоуксусная кислоты с ацетоном и β-оксимасляной кислоты также увеличивается 5,9 и соответственно 1,5 раза, показатели буферных основании снижаются до 18,41 ± 1,53 ммоль/л, показатели концентрации глюкозы у животных также понижаются до 2,25 ± 0,16 ммоль/л, а также уменьшение показателей коэффициента ацетоуксусная кислоты с ацетоном и β-оксимасляной кислоты до 1,53±0,28 говорит о том что нами исследованных беременных животных имеются изменения метоболизма в организме, что соответствует признакам скрытого кетоза.

Результаты наших исследовании также показывают, что пропрорциональность фракции исследованных кетоновых тел ВН к АсАс было понижено на 1,9:1 и эти данные мы учитываем как маркер жировой дистрофии печени, который не зависит от предела общих кетоновых тела в крови. Изменения в метаболизме организма у беременных животных нарушает функцию фетоплацентарного комплекса что приводит к стимуляции процесса метаболизма. Нами было подтверждено увеличение доли межпродуктов из кетодиенов и связывания триенов в крови беременных животных при скрытом кетозе на 1,75 раза.

Показатели малонового диальдегида при скрытом кетозе были в пределах 1,125 ± 0,34 мкмоль/л. Соответственно, маркеры метаболизма которые общепринято применяются в ветеринарии в диагностических целях у беременных животных при скрытом кетозе имеют различия тем что показывают малую чувствительность и имеют низкую специфичность в сравнении с данными систем перекисное окисление липидов и антиоксидантной защиты. В будущем результаты данных исследований надо принимать во внимание при исследованиях таких болезней как скрытый и клинический кетоз беременных животных как концепцию возникновения изменении функции перекисного окисления липидов – антиоксидатная защита при данной патологии метаболизма.

ӘӨЖ 619:616.993:636.2:599.735.53 (574.1)
ҒТАХР 68.41.53

Ищанова А. С., PhD, доцент м.а., https://orcid.org/0000-0002-7344-5479
«Жәңгір хан атындағы БҚАТУ» КеАҚ, Орал қаласы, Жәңгір хан көшесі, 51, 090009, Қазақстан, aiman_86is@mail.ru
Ертлеуова Б. О., PhD, доцент м.а., https://orcid.org/0000-0003-1990-570X
«Жәңгір хан атындағы БҚАТУ» КеАҚ, Орал қаласы, Жәңгір хан көшесі, 51, 090009, Қазақстан, yertleu87@bk.ru
Жубантаев И.Н., а/ш.ғ.к., қауымд. профессор, https://orcid.org/0000-0002-9218-5414
Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық университеті, Н.Назарбаев даңғылы, 208, Орал қаласы, Қазақстан Республикасы, zhubantayev@mail.ru

Ichshanova A. S., Phd, Acting Associate Professor, https://orcid.org/0000-0002-7344-5479 NJSC «West Kazakhstan Agrarian and Technical University named after Zhangir khan», Uralsk city, Zhangir Khan street 51, Kazakhstan, 090009 aiman_86is@mail.ru
Yertleuova B. O., Phd, Acting Associate Professor**,** https://orcid.org/0000-0003-1990-570X

NJSC «West Kazakhstan Agrarian and Technical University named after Zhangir khan», Uralsk city, Zhangir Khan street 51, Kazakhstan, 090009, yertleu87@bk.ru
Zhubantaev I. N., candidate of Agricultural Sciences, Associate Professor. https://orcid.org/0000-0002-9218-5414
Private Higher Professional Educational Institution West Kazakhstan innovative-technological university, Republic of Kazakhstan, Uralsk, Nursultan Nazarbayev av., 208, *090000*, phone 8 (7112) 50-99-90, zhubantayev@mail.ru

БАТЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫНДАҒЫ ІРІ ҚАРА МАЛ МЕН АҚБӨКЕНДЕР АРАСЫНДА ПАСТЕРЕЛЛЕЗДІҢ ТАРАЛУЫН ЭПИЗООТОЛОГИЯЛЫҚ БАҚЫЛАУ ЖӘНЕ ТАЛДАУ

EPIZOOTOLOGICAL CONTROL AND ANALYSIS OF THE SPREAD OF PASTEURELLOSIS IN CATTLE AND SAIGA IN THE WEST KAZAKHSTAN REGION

АННОТАЦИЯ

Пастереллез – *Pasteurella multocida* және *Pasteurella haemolytica* бактериялары салдарынан туындап, үй және жабайы жануарларын зақымдайтын жұқпалы ауру. Аталмыш жұқпалы ауру ауыл шаруашылығы жануарлары мен жабайы табиғат өкілдеріне үлкен қауіп төндіретін, сонымен бірге экономикалық шығынға ұшыратын індет болып табылады. Бұл микроорганизмдер көптеген жануарлардың ағзасында шартты-патогенді микрофлора ретінде тіршілік етеді. Стресс, дұрыс азықтандырмау, ветеринарлық-гигиеналық талаптарды уақытылы қадағаламау немесе басқа да қолайсыз жағдайлар кезінде бактериялар белсенділігін арттырып, септикалық процестерді, ісінулерді және өкпенің қабынуын тудырады.

Пастереллезбен барлық жабайы тұяқты жануарлар ауырады. Ауру маралдар, солтүстік бұғылары, ақбөкендер, бұлан, еліктер арасында жоғары өлім-жітім көрсеткішімен сипатталады [1].

Батыс Қазақстан облысы ақбөкендердің негізгі мекендейтін аймағы ретінде, олардың ауыл шаруашылығы жануарлармен тығыз байланыста болуына байланысты, нақтырақ айтатын болсақ, ортақ жайылымды пайдалану, ортақ су көздерін тұтыну есебінен эпизоотологиялық ошақтың өршуіне бірден бір себеп болып табылады.

Соған орай Батыс Қазақстан облысында ірі қара мал мен ақбөкендер арасында аталған аурудың жиі тіркелуіне байланысты, эпизоотологиялық жағдайды егжей-тегжейлі талдап, уақытылы эпизоотологиялық бақылау жүргізу індетті алдын алудың басты міндеті болып саналды.

Бұл мақалада Батыс Қазақстан облысы бойынша ірі қара малы мен ақбөкендер арасында пастереллез ауруы бойынша эпизоотологиялық жағдайына зерттеу жүргізілді.

ANNOTATION

Pasteurellosis is an infectious disease caused by the bacteria *Pasteurella multocida* and *Pasteurella haemolytica*, affecting both domestic and wild animals. It poses a serious threat to farm and wild animals and causes significant economic losses. These microorganisms are part of the opportunistic microflora of many animals. However, under the influence of stress factors, improper feeding, non-compliance with veterinary-hygienic norms and other unfavorable conditions, their activity increases, which can lead to septic processes, edema and pneumonia.

Pasteurellosis affects all wild ungulates. The disease is characterized by high mortality among roe deer, reindeer, saiga, moose and other species.

The West Kazakhstan region, being the main saiga habitat, is prone to epizootic outbreaks of the disease. The main reason for this is the close contact of saigas with farm animals, in particular the shared use of pastures and water sources.

Due to the frequent registration of pasteurellosis cases among cattle and saigas in West Kazakhstan Oblast, the main measures to prevent epidemics are a detailed analysis of the epidemiological situation and timely epidemiological surveillance.

The article discusses the epidemiological situation related to pasteurellosis of cattle and saigas in West Kazakhstan region.

Кілт сөздер*: пастереллез, ақбөкен, ірі қара малы, эпизоотологиялық бақылау, эпизоотологиялық ошақ.*

Key words: *pasteurellosis, saiga, cattle, epizootic control, epizootic focus.*

Кіріспе. Жануарлар арасында кеңінен таралған, мал шаруашылығына үлкен экономикалық зиян келтіретін және белгілі бір әлеуметтік маңызы бар жұқпалы аурулардың бірі – пастереллез ауруы болып табылады.

Ақбөкендер арасында пастереллез кеңінен таралған, бұл бірқатар авторлардың еңбектерімен, соның ішінде біздің зерттеулерімізбен де расталды [3-10].

Ақбөкендердің қырылуына пастереллалардың әсері туралы Н.С. Майканов және басқа да зерттеушілер өз жұмыстарында атап өтеді [2]. Ақбөкендердің өлекселерінен, топырақтан, судан және өсімдіктерден алынған зертханалық материалдардың ретроспективті талдауы көрсеткендей, жаппай эпизоотияларды тудыратын негізгі себеп – жұқпалы аурулар, соның ішінде – біріншілік және екіншілік формада кездесетін пастереллез ауруы.

Ақбөкендердің жаппай қырылуына әкелетін жұқпалы аурулардың дәлелденген қоздырғыштары қатарында *Pasteurella haemolytica*, *Pasteurella multocida*, анаэробты клостридиоз (*Clostridium perfringens*), Q-лихорадка (*Coxiella burnetti*) және тейлериоз (*Theileria annulata*) бар.

З.А. Латыпов және т.б. [11] 2021 жылғы пастереллездің эпизоотологиялық жағдайын зерттеді. Нәтижесінде Қазақстанның 4 облысында (Ақтөбе, Ақмола, Алматы және Шығыс Қазақстан) ірі қара мал арасында пастереллездің 6 ошағы анықталды. Әр облыста 1-2 эпизоотиялық ошақ тіркелді. Жалпы 1435 қан сарысу сынамасы зерттеліп, оның 192-сі оң нәтиже көрсетті (13,38%).

Республикамызда жануарлар арасында пастереллез ауруының (*Pasteurella multocida* қоздырғышы) кең таралуына бірқатар факторлар ықпал етеді: аурудың үй жануарларының басқа түрлері арасында айтарлықтай таралуы; жабайы жануарлар арасында бұл аурудың болуы; донорлық шаруашылықтардың эпизоотиялық жағдайын ескермей, мамандандырылған шаруашылықтарды жануарлармен қамтамасыз ету; эпизоотологиялық ерекшеліктерді жете бағаламау және осы аурудың нақты алдын алу шараларын жүргізудегі қателіктер [17].

Пастереллез қоздырғышының көзі жабайы жануарлар болған жағдайлар сипатталған. Осылайша, пастереллезбен ауырған ақбөкендер ауылшаруашылық жануарлары, соның ішінде ірі қара мал үшін пастереллез қоздырғышының көзі бола алады.

Әдеби мәліметтерді талдау нәтижелері көрсеткендей, ақбөкендердің жұқпалы аурулармен аурушаңдық мәселелері жеткілікті түрде зерттелмеген. Жұптұяқты жануарлардың аталған түрінде инфекциялық патологиялардың өзекті мәселелері бүгінгі күнге дейін толыққанды шешімін таппаған [12-16].

Осылайша, келтірілген деректер Батыс Қазақстан облысының аумағында пастереллез қоздырғышының үй және жабайы жануарлар арасында айналымда бар екенін және бұл індетті бақылау қажеттігін көрсетеді. Сонымен қатар, аурудың таралу деңгейіне байланысты облыс аумағын аймақтарға бөлу маңызды, бұл кейінгі талдау жүргізу және түзету шараларын қабылдау үшін қажет.

Соған орай зерттеудің мақсаты – Батыс Қазақстан облысын ірі қара мал мен ақбөкенлер арасында пастереллез ауруының таралу деңгейіне сәйкес аймақтарға бөле отыра, эпизоотологиялық зерттеу жүргізу.

Зерттеу материалдары және тәсілдері. Пастереллездің эпизоотологиялық жағдайын зерттеу келесі деректер негізінде жүргізілді:

- Батыс Қазақстан облысының ветеринариялық қызметтерінің мәліметтері,
- Өлген жануарлардың қан мен мүшелер үлгілерін зертханалық талдау,
- Серологиялық және бактериологиялық зерттеулер,
- Ауа райы мен экологиялық факторларды талдау.


Батыс Қазақстан облысы аумағындағы ірі қара малдың пастереллезі бойынша эпизоотологиялық сипаттаманы зерттеу 2015-2023 жылдар аралығындағы ветеринарлық есеп беру деректерін талдау арқылы жүргізілді. Есептелген көрсеткіштердің графикалық бейнеленуі үшін *Microsoft Paint 2010* бағдарламасы пайдаланылды.

Зерттеу нәтижелері және талдау. Батыс Қазақстан облысына қарасты аудандар бойынша жануарлар пастереллезіне эпизоотологиялық мониторинг жүргізілді, 2015-2023 жылдар аралығында аурудың шығу тегі, дамуы мен байқалу ерекшеліктерін, оның таралу дәрежесін анықтауға және ақбөкендердің қоныс аударуын ескере отырып, облыс аумағының аудандастыру картасын жасауға мүмкіндік берді (1-сурет).



Сурет 1 - Ақбөкендер мекендейтін жақын аудандарда пастереллезді анықтау орындары


Одан әрі талдау және түзету жұмыстарын жүзеге асыру үшін аурудың аудандарда таралу дәрежесіне және т.б. байланысты облыс аумағын аймақтарға бөлу маңызды болып табылды. Батыс Қазақстан облысының аумағында 2015-2023 жылдар аралығында пастереллез инфекциясының 15 ошағы тіркелген. 1-суреттен көріп отырғанымыздай, аймақ шартты түрде жоғары - 5 және одан жоғары ошақтарға, орташа - 1-ден 5-ке дейін ошақтарға және аурудан таза аудандарға бөлінді. Батыс Қазақстан облысында пастереллез ауруының жоғары деңгейі анықталған жоқ.



Сурет 2 - 2015-2023 жылдар аралығында жануарлар арасында пастереллез індетінің таралу дәрежесі бойынша Батыс Қазақстан облысының аумағын аудандастыру картасы

Орташа дәрежеге - Ақжайық, Бәйтерек, Бөкейорда, Бөрлі, Жаңақала, Қаратөбе, Тасқала, Теректі аудандары және Орал қаласы кіреді, онда соңғы 10 жылда 1-ден 4-ке дейінгі аралықта эпизоотиялық ошақтар тіркелген [3, б. 156].

Қалған 4 аудан – Казталов, Жәнібек, Сырым, Шыңғырлау аудандары аурудан таза [11, б. 57]. Бұл ретте статистикалық деректерді талдау негізінде келесідей қорытынды жасалды (3-ші сурет).



Сурет 3 - 2019-2023 жылдары аралығында Батыс Қазақстан облысы бойынша жануарлардың пастереллезбен аурушаңдығының көрсеткіштері

3-ші суретті талдау нәтижесі көрсеткендей, БҚО-ның ауыл шаруашылығы басқармасының 2015-2023 жылдағы статистикалық деректері бойынша Батыс Қазақстан жағдайында ірі қара және ақбөкен арасында пастереллез ауруына шалдыққан жануарлар жалпы саны – 194, оның ішінде мүйізді ірі қара 82% (159 бас) және ақбөкендер 18 %-ды (35

бас) құрайды. Ал ауру себебінен өлген жануарлардың жалпы саны – 182. Оның ішінде: мүйізді ірі қара 80,8% (147), ал ақбөкендер 19,2%-ды (35) құрады.

Қорытынды. Пастереллезге тән белгі эпизоотиялық ошақтардың стационарлылығы екенін айта кеткен жөн. Бұл індеттің стационарлылығы аудандарда пастереллатасымалдаушы ақбөкендердің болуымен де сақталады.

Ауа температурасының кенеттен өзгеруі, басқа ауа райы жағдайларының өзгеруі, күтіп-бағудың төмендеуі және нашар азықтандыру т.б. Пастереллатасымалдаушы болып табылатын жануарларда организмнің төзімділігі төмендейді және осы негізде организмде сақталатын шартты-патогенді пастереллалардың зардапты формаға ауысуы орын алады, аталмыш процесс пастереллездің дамуына әкеледі.

Батыс Қазақстан облысындағы ірі қара мал мен ақбөкендердің пастереллезін эпизоотологиялық зерттеу бұл ауру мал шаруашылығын дамытуға үлкен кедергі болып отырғанын айтуға мүмкіндік береді.

Пастереллез Батыс Қазақстан облысының ауыл шаруашылығы мен жабайы фаунасына айтарлықтай қауіп төндіреді. Эпизоотологиялық бақылаудың тиімділігі, уақытылы вакцинация және биологиялық қауіпсіздік шараларын сақтау инфекцияның таралуын барынша азайтуға көмектеседі. Сонымен қатар, болашақта ақбөкендер мен ірі қара малы арасындағы індеттің алдын алу үшін климаттық және экологиялық факторларды ескеретін кешенді зерттеулер жүргізу қажет.

ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

1. Осипова Н.И. Пастереллез домашних и диких животных // Ветеринария. Реферативный журнал. – 2004. – № 1. – 231 с.

2. Майканов Н. С., Максотов Е. Р., Берденов М. Ж. [и др.] Факторы, лимитирующие численность степной антилопы (Saiga tatarica) Волго-Уральской популяции // Степи Северной Евразии: материалы девятого международного симпозиума. – Оренбург: Оренбургский государственный университет, 2021. – С. 517-520.

3. Абсатиров Г.Г., Ищанова А.С. Ретроспективный анализ массовой гибели и пути сохранения сайгаков в Казахстане Степи Северной Евразии: материалы VIII международного симпозиума/под научной редакцией академика РАН А.А. Чибилёва. – Оренбург: ИС УрО РАН, 2018. – 1181 с.

4. Айкимбаев М.А., Мартиневский И.Л., Алтухов А.А. и др. О случаях выделения пастереллеза от сайгаков в феврале-марте 1984 года в Уральской области // Известия Академии Наук Казахской ССР. - 1985. - № 4. - С. 39-41.

5. Аязбаев Т.З., Майканов Н.С., Рамазанова С.И. и др. Лабораторные исследования павших сайгаков (Saiga tatarica) Волго-Уральской популяции / // Экология носителей и переносчиков. Биологическая безопасность: тезисы Западно-Казахстанской региональной конференции. - Уральск. - 2016. - С. 84-85.

6. Сапанов М.К. Триггерный механизм возникновения пастереллеза у сайгаков в казахстане Вестник ЗКУ. - 2023. - № 2 (90). - С. 165-171.

7. Алиева А.Б. и др. Культурально-морфологические и биохимические свойства штаммов Pasteurella multocida, выделенных от крупного рогатого скота и сайги // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. - 2016. - № 9-3. - С. 414-417.

8. Копеев С.К. и др. Анализ причин гибели сайгаков // Вестник Кыргызского национального аграрного университета им. К.И. Скрябина. - 2021. - № 2 (56). - С. 78-87.

9. Орынбаев М.Б., Рыстаева Р.А., Керимбаев А.А., Копеев С.К., Коспанова М.Н., Кыдырбаев Ж.К. Случаи массовой гибели уральской популяции сайгаков в казахстане Актуальные вопросы ветеринарной биологии. - 2013. - № 1 (17). - С. 20-26.

10. Ищанова А.С., Таубаев У.Б., Монтаева Н.С. Молекулярно-генетическая идентификация Pasteurella multocida // Ғылым және білім. – 2023. - №3-1 (72). — Б. 223-230.

11. Латыпова З.А. Зонирование территории Республики Казахстан по степени распространения заболевания пастереллёзом среди крупного рогатого скота / З.А. Латыпова, А.М. Намет, Б.Ж. Исакулова, З.К. Буйенбаева, Р.А. Керимбаева // Микробиология и вирусология. – 2022. - №38. – С. 55-63.

12. Timoney J.F., Gillespie J.H., Scott F.W., Barlough J.E. The genus Pasteurella. In: Hagan and Bruner's Microbiology and Infectious Diseases of Domestic Animals, Comstock Publishing associates // Ithaca. - New York, 1988. – P. 104-116.

13. Davies R.L. Characterisation of bovine strains of Pasteurella multocida and comparison with isolates of avian, ovine and porcine origin / R.L. Davies, R. MacCorquodale, S. Reilly // Veterinary Microbiology. — 2004. — Vol. 99. — pp. 145–158.

14. Ewers C. Virulence genotype of Pasteurella multocida strains isolated from different hosts with various disease status / C. Ewers, A. Lubke-Becker, A. Bethe et al. // Veterinary Microbiology. — 2006. — Vol. 114. — P. 304–317.

15. Griffin D.M. Bacterial pathogens of the bovine respiratory disease complex / D.M. Griffin, M. Chengappa, J. Kuszak et al. // Veterinary Clinics of North America: Food Animal Practice. — 2010. — Vol. 26. —P . 381–394.

16. Crawshaw W.M. Field study of pneumonia in vaccinated cattle associated with incorrect vaccination and Pasteurella multocida infection / W.M. Crawshaw, G.L. Caldow // Veterinary Record. — 2015. — Vol.176. — P.434–438.

17. Таубаев У.Б., Киркимбаева Ж.С., Абсатиров Г. Г., Мурзабаев К. Е. Ищанова А.С. Изучение пастереллоносительства у сайгаков в Западно-Казахстанской области / Ученые записки Казанской государственной академии ветеринарной медицины им. Н. Э. Баумана. - 2016. - Т. 226, № 2.- С.151-154.

REFERENCES

1. Osipova N.I. Pasteurellosis Of Domestic And Wild Animals // Veterinary Medicine. Abstract Journal. – 2004. – № 1. – 231 C.

2. Maikanov N. S., Maksotov E. R., Berdenov M. J. [Et Al.] Factors Limiting The Abundance Of Steppe Antelope (Saiga Tatarica) Volga-Ural Population // Steppes Of Northern Eurasia : Proceedings Of The Ninth International Symposium. Orenburg: Orenburg State University, 2021. Pp. 517-520.

3. Absatirov G.G., Ishchanova A.S. A Retrospective Analysis Of The Mass Death And Conservation Of Saiga Antelopes In Kazakhstan In The Steppes Of Northern Eurasia: Proceedings Of The Viii International Symposium/Edited By Academician Of The Russian Academy Of Sciences A.A. Chibilev. Orenburg: Institute Of The Ural Branch Of The Russian Academy Of Sciences, 2018. 1181 P.

4. Aikimbaev M.A., Martinevsky I.L., Altukhov A.A. And Others. On Cases Of Isolation Of Pasteurellosis From Saigas In February-March 1984 In The Ural Region // Proceedings Of The Academy Of Sciences Of The Kazakh Ssr, 1985, No. 4, Pp. 39-41.

5. Ayazbaev T.Z., Maikanov N.S., Ramazanova S.I. And Others. Laboratory Studies Of Fallen Saiga Antelopes (Saiga Tatarica) Volga-Ural Population / // Ecology Of Carriers And Vectors. Biological Safety: Abstracts Of The West Kazakhstan Regional Conference. Uralsk, 2016, Pp. 84-85.

6. Sapanov M.K. Trigger Mechanism Of Pasteurellosis In Saigas In Kazakhstan Bulletin Of The Zku. - 2023. - № 2 (90). - Pp. 165-171.

7. Alieva A.B. And Others. Cultural, Morphological And Biochemical Properties Of Plasteurella Multocida Strains Isolated From Cattle And Saiga // International Journal Of Applied And Fundamental Research. - 2016. - No. 9-3. - Pp. 414-417.

8. Kopeev S.K. Et Al. Analysis Of The Causes Of Death Of Saigas // Bulletin Of The Kyrgyz National Agrarian University Named After K.I. Scriabin. - 2021. - № 2 (56). - Pp. 78-87.

9. Orynbaev M.B., Rystaeva R.A., Kerimbaev A.A., Kopeev S.K., Kospanova M.N., Kydyrbaev Zh.K. Cases Of Mass Death Of The Ural Saiga Population In Kazakhstan Current Issues Of Veterinary Biology. - 2013. - № 1 (17). - Pp. 20-26.

10. Ishchanova A.S., Taubaev U.B., Montaeva N.S. Molecular Genetic Identification Of Pasteurella Multocida // Gylym Zhane Bilim. – 2023. - №3-1 (72). -- B. 223-230.

11. Latypova Z.A. Zoning Of The Territory Of The Republic Of Kazakhstan According To The Degree Of Spread Of Pasteurellosis Among Cattle / Z.A. Latypova, A.M. Namet, B.J. Isakulova, Z.K. Buyenbayeva, R.A. Kerimbayeva // Microbiology And Virology. – 2022. - No. 38. – Pp. 55-63.

12. Timoney J.F., Gillespie J.H., Scott F.W., Barlough J.E. The Genus Pasteurella. In: Hagan And Bruner's Microbiology And Infectious Diseases Of Domestic Animals, Comstock Publishing Associates // Ithaca. - New York, 1988. – P. 104-116.

13. Davies R.L. Characterisation Of Bovine Strains Of Pasteurella Multocida And Comparison With Isolates Of Avian, Ovine And Porcine Origin / R.L. Davies, R. Maccorquodale, S. Reilly // Veterinary Microbiology. — 2004. — Vol. 99. — Pp. 145-158.

14. Ewers C. Virulence Genotype Of Pasteurella Multocida Strains Isolated From Different Hosts With Various Disease Status / C. Ewers, A. Lubke-Becker, A. Bethe Et Al. // Veterinary Microbiology. - 2006. — Vol. 114. — P. 304-317.

15. Griffin D.M. Bacterial Pathogens Of The Bovine Respiratory Disease Complex / D.M. Griffin, M. Chengappa, J. Kuszak Et Al. // Veterinary Clinics Of North America: Food Animal Practice. — 2010. — Vol. 26. —Pp. 381-394.

16. Crawshaw W.M. Field Study Of Pneumonia In Vaccinated Cattle Associated With Incorrect Vaccination And Pasteurella Multocida Infection / W.M. Crawshaw, G.L. Caldow // Veterinary Record. — 2015. — Vol.176. — Pp.434-438.

17. Taubaev U.B., Kirkimbayeva Zh.S., Absatirov G. G., Murzabaev K. E. Ishchanova A.S. The Study Of Pasteurel Bearing Among Saigas In The West Kazakhstan Region / Scientific Notes Of The Kazan State Academy Of Veterinary Medicine Named After N. E. Bauman. - 2016. - Vol. 226, No. 2.- Pp.151-154.

РЕЗЮМЕ

Пастереллез — инфекционное заболевание, вызываемое бактериями *Pasteurella multocida* и *Pasteurella haemolytica*, поражающее как домашних, так и диких животных. Оно представляет серьёзную угрозу для сельскохозяйственных и диких животных, а также наносит значительный экономический ущерб. Эти микроорганизмы являются частью условно-патогенной микрофлоры многих животных. Однако под воздействием стрессовых факторов, неправильного кормления, несоблюдения ветеринарно-гигиенических норм и других неблагоприятных условий их активность усиливается, что может привести к септическим процессам, отёкам и воспалению лёгких.

Пастереллёз поражает всех диких копытных животных. Заболевание характеризуется высокой смертностью среди косуль, северных оленей, сайгаков, лосей и других видов.

Западно-Казахстанская область, являясь основным местом обитания сайгаков, подвержена эпизоотическим вспышкам заболевания. Основной причиной этого является тесный контакт сайгаков с сельскохозяйственными животными, в частности совместное использование пастбищ и водоисточников.

В связи с частой регистрацией случаев пастереллеза среди крупного рогатого скота и сайгаков в Западно-Казахстанской области, основными мерами профилактики эпидемий являются детальный анализ эпизоотологической ситуации и своевременный эпидемиологический надзор.

В статье рассматривается эпидемиологическая ситуация, связанная с пастереллезом крупного рогатого скота и сайгаков в Западно-Казахстанской области.

УДК 619:638.152-07
МРНТИ 68.41

Нуржанова Ф. Х., магистр ветеринарных наук, https://orcid.org/0000-0001-8700-6357
НАО «Западно-Казахстанский аграрно-технический университет имени Жангир хана», г. Уральск, ул. Жангир хана 51, 090009, Республика Казахстан, chinnur71@mail.ru
Сатыбаев Б. Г., докторант, https://orcid.org/0000-0002-1170-4041
НАО «Западно-Казахстанский аграрно-технический университет имени Жангир хана», г. Уральск, ул. Жангир хана 51, 090009, Казахстан, barikz@mail.ru
Кушалиев К. Ж., доктор ветеринарных наук, профессор, https://orcid.org/ 0000-0003-3188-1755
НАО «Западно-Казахстанский аграрно-технический университет имени Жангир хана», г. Уральск, ул. Жангир хана 51, 090009, Республика Казахстан, gosha196060@mail.ru
Баянтасова С. М., кандидат ветеринарных наук, и.о. доцента,
https://orcid.org/0000-0001-6616-0179
НАО «Западно-Казахстанский аграрно-технический университет имени Жангир хана», 090009 улица Жангир хана 51, Уральск, Республика Казахстан, bayantasova@mail.ru
Валитова Н. В., кандидат ветеринарных наук, https://orcid.org/0000-0003-4485-7252
НАО "Восточно-Казахстанский технический университет имени Д. Серикбаева", г.Усть-Каменогорск, ул. Серикбаева 19, 070004, Республика Казахстан, valitova-n@mail.ru
Қожаева А.Р., PhD докторант, научный сотрудник, https://orcid.org/0000-0003-4994-5737
НАО «Западно-Казахстанский аграрно-технический университет имени Жангир хана», г.Уральск, ул.Жангир хана 51, 090009, Республика Казахстан, aigerim.kozhayeva@mail.ru
Агишева Э. Р., магистрант, https://orcid.org/my-orcid?orcid=0000-0002-9350-6283
НАО "Западно-Казахстанский аграрно-технический университет имени Жангир хана", 090009 улица Жангир хана 51, Уральск, Республика Казахстан, agisevaelvira70@gmail.com

Nurzhanova F. Kh., Master of Veterinary Sciences, https://orcid.org/0000-0001-8700-6357
NJSC «West Kazakhstan Agrarian and Technical University named after Zhangir khan», Uralsk city, Zhangir Khan street 51, Kazakhstan, 090009, chinnur71@mail.ru
Satybaev B. G., doctoral student, https://orcid.org/0000-0002-1170-4041
NJSC«West Kazakhstan Agrarian and Technical University named after Zhangir khan», Uralsk,st.Zhangir khan 51, 090009, Kazakhstan, barikz@mail.ru
Kushaliyev K. Zh., Doctor of veterinary science, professor, https://orcid.org/ 0000-0003-3188-1755
NJSC «Zhangir Khan West Kazakhstan Agrarian-Technical University», 090009, 51 Zhangir Khan Str., Uralsk, Republic of Kazakhstan, gosha196060@mail.ru
Bayantassova S. M., candidate of veterinary sciences, Acting Associate Professor,
https://orcid.org/0000-0001-6616-0179
NJSC "West Kazakhstan Agrarian and Technical University named after Zhangir khan", Uralsk, st Zhangir khan 51, 090009, Kazakhstan, bayantasova@mail.ru
Valitova N. V., Candidate of Veterinary Sciences, https://orcid.org/0000-0003-4485-7252,
NJSC "D. Serikbayev East Kazakhstan State Technical University", Ust-Kamenogorsk, 19 Serikbayeva str., 070004, Republic of Kazakhstan, valitova-n@mail.ru
Kozhayeva A. R., PhD student, researcher, https://orcid.org/0000-0003-4994-5737
NJSC «West Kazakhstan Agrarian and Technical University named after Zhangir khan», Uralsk, st. Zhangir khan 51, 090009, Kazakhstan, aigerim.kozhayeva@mail.ru
Agisheva E. R., master's student, https://orcid.org/my-orcid?orcid=0000-0002-9350-6283,
NJSC«West Kazakhstan Agrarian and Technical University named after Zhangir khan», Uralsk,st.Zhangir khan 51, 090009, Kazakhstan, agisevaelvira70@gmail.com

ЭПИЗООТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ ПО АСКОСФЕРОЗУ ПЧЕЛ
THE EPIZOOTIC SITUATION OF BEE ASCOSPHEROSIS

АННОТАЦИЯ

Изучена эпизоотологическая обстановка по аскосферозу медоносных пчел на пасеках Западно-Казахстанской области. Установлена зараженность расплода патогенным грибком. Визуальный осмотр сот с расплодом показал наличие зараженных личинок в открытых и закрытых ячейках. Мумифицированные личинки при встряхивании легко выпадают из ячеек. Пчелы ослабленные, расплод пестрый, с пропусками, так как пчелы выбрасывают пораженные личинки из ячеек. При клиническом обследовании пчелосемей установили степень поражения расплода с учетом погибших личинок в ячейках и выброшенных на дно улья от слабой (до 10 личинок) до средней (от 10 до 100 личинок). При обнаружении в ячейках погибших личинок с клиническими признаками аскосфероза с их поверхностей делали соскоб и готовили препараты для микроскопических исследований для постановки предварительного диагноза на аскосфероз. При микроскопическом исследовании в поле зрения наблюдали гифы грибка и споровые шарики со спорами аскосферы. Заболевание чаще наблюдается в активный период жизнедеятельности пчелосемьи, при наличии расплода. Возникновению аскосфероза способствуют такие факторы, как высокая влажность и резкие перепады температуры, отсутствие ветеринарно-санитарного контроля за состоянием пасек.

ANNOTATION

The epizootological situation of ascospherosis of honey bees in the apiaries of the West Kazakhstan region has been studied. Infection of the brood with a pathogenic fungus has been established. Visual inspection of the brood cells showed the presence of infected larvae in open and closed cells. Mummified larvae easily fall out of the cells when shaken. The bees are weakened, the brood is mottled, with gaps, as the bees eject the affected larvae from the cells. During a clinical examination of bee colonies, the degree of brood damage was determined, taking into account the dead larvae in the cells and those thrown to the bottom of the hive from weak (up to 10 larvae) to medium (over 10 to 100 larvae). When dead mummified larvae with clinical signs of ascospherosis were found in the cells, their surfaces were scraped off and preparations for microscopic examinations were prepared to make a preliminary diagnosis of ascospherosis. Microscopic examination revealed fungal hyphae and spore globules with ascospheric spores. The disease is more often observed during the active period of the bee colony, in the presence of brood. The occurrence of ascospherosis is facilitated by such factors as high humidity and sudden temperature changes, the lack of veterinary and sanitary control over the condition of apiaries.

Ключевые слова: *пчела, пчеловодство, расплод, аскосфероз, зараженность*
Keywords: *bee, beekeeping, brood, ascospherosis, infection*

Введение. Пчеловодство является экономически важной и перспективной отраслью агропромышленного комплекса Республики Казахстан. Пчёлы положительно влияют на экономику сельского хозяйства благодаря своему вкладу в опыление сельскохозяйственных культур. Они обеспечивают своевременное и наиболее полное опыление, что повышает урожайность ягод, овощей, фруктов, семян растений и кормовых культур [1, 2].

Вместе с тем, успешному ведению пчеловодства и снижению популяции пчел мешают такие факторы, как загрязнение окружающей среды, отравление пчел пестицидами, уменьшение естественных местообитаний, распространение вредителей и патогенов. В результате массовых завозов пчелосемей из ближнего зарубежья, отсутствия ветеринарного контроля идет распространение многих инфекционных и инвазионных болезней в благополучных пчелохозяйствах [2, 3].

К числу наиболее распространенных заболеваний, поражающих пчел, относится микозное заболевание пчел – аскосфероз (болезнь известкового расплода), вызываемое грибами рода *Ascosphaera.* Поражаются в основном трутневые, пчелиные, маточные личинки 3-4 дневного возраста и их куколки, которые после гибели превращаются в мумифицированные струпы, напоминающие по внешнему виду кусочки мела или извести [4, 5, 6]. Вследствие широкого распространения болезнь наносит значительный экономический ущерб пчеловодству, снижая продуктивность и ослабляя пчелиные семьи, так как поражает расплод. Количество особей в пчелиных семьях снижается в среднем на 23 %, а их способность к медосбору - на 49 %. В случае массового поражения личинок микозом возможна гибель всей пчелиной семьи [7, 8, 9]. Два основных пути заражения - пищеварительный, через употребление пищи, загрязненной спорами гриба, или же через кутикулу потомства, через зародышевую трубку, выходящую из спор. После прорастания спор в личинки пчелиного выводка, вегетативные формы будут проникать во всю личинку в виде мицелия и в последующем личинки мумифицируются [10, 11, 12].

Существуют предрасполагающие факторы, которые способствуют возникновению вспышек аскосфероза, такие как избыточная влажность внутри улья, низкие температуры или чрезмерные манипуляции с пчелиными семьями. Наблюдения показывают, что известковый расплод также увеличивается из-за стресса, вызванного частой транспортировкой ульев для опыления сельскохозяйственных культур, вследствие воздействия пестицидов, используемых на участках опыления, и при поражении пчел тем или иным возбудителем. Все эти факторы подавляют иммунную систему пчел и способствуют развитию патогенов, включая аскосфероз. Заболевание зарегистрировано почти во всех странах мира [13, 14]. Неконтролируемое применение химиопрепаратов также повышает устойчивость к аскосферозу и увеличивает заболеваемость данным патогеном. Аскосфероз отмечается весь активный период, когда в пчелосемьях имеется расплод (с весны до осени), особенно наглядно проявляется и наносит значительный ущерб во время интенсивного наращивания семьи – до главного медосбора [15, 16].

Успешные меры борьбы и профилактики с аскосферозом пчёл невозможны без изучения эпизоотической ситуации. На основе мониторинга можно оценить эпизоотическую обстановку и пути распространения заболевания, разработать определённую стратегию борьбы с ним.

В Западно-Казахстанской области пчеловодческие хозяйства находятся в частной собственности, по имеющимся данным, исследования на зараженность пчел возбудителями тех или иных заболеваний, в том числе и аскосферозом, не проводятся.

В связи с этим изучение эпизоотической ситуации по аскосферозу в пчелохозяйствах области имеет научно-практическую значимость.

Материалы и методы исследования. Исследования с целью определения распространения аскосфероза проводились в пчелохозяйствах области, расположенных в окрестностях города Уральска. Учитывали санитарное состояние и силу развития пчелиных семей. Диагноз на аскосфероз ставили на основании характерных клинических признаков поражения расплода и результатов лабораторных исследований. В полевых условиях при выезде в пчелохозяйства проводили клинический осмотр ульев, сот, оценку состояния разновозрастного расплода (наличие мумифицированных личинок, выраженной «пестроты расплода», специфического запаха, потемневших или продырявленных крышечек над печатным расплодом и др.), наличие погибших личинок на дне улья, прилётной доске или площадке перед ульем.

При подозрении на аскосфероз в пчелиных семьях брали образцы сотов с больным расплодом, а также 20-30 погибших личинок. При проведении лабораторных исследований использовали методические указания по лабораторной диагностике аскосфероза пчел и выделению возбудителя из пыльцы (перги) [17].

Для микроскопического исследования в лабораторных условиях делали соскоб налета мицелия с поверхности пораженной личинки, готовили препарат типа «раздавленная

капля» с использованием смеси спирта, глицерина и воды в соотношении (1:1:1). Микроскопию препарата проводили с использованием микроскопа с цифровой камерой 8МР и сенсорным ЖК экраном.

Результаты исследования. Для выявления зараженных пчелиных семей обращали внимание на поведение пчел, на силу и активность пчелиной семьи, состояние предульевых площадок, сотов, расплода. При осмотре предульевых площадок, дна улья были обнаружены выброшенные пчелами мумифицированные личинки белого, грязно-белого или черного цвета в виде извести (Рисунок1, Рисунок 2).



Рисунок 1- Заплесневевшие личинки на дне улья



Рисунок 2 - Личинки на предульевой площадке

При визуальном осмотре сот с расплодом в ячейках обнаружены зараженные особи и в открытых и в закрытых ячейках (Рисунок3). Личинки, пораженные аскосферозом, твердой консистенции, желтоватого или беловато-сероватого цвета. Инфицированные личинки свободно лежат в ячейках, располагаются беспорядочно, между здоровыми. Мумифицированные личинки при встряхивании легко выпадают из ячеек. Пчелы ослабленные, расплод пестрый, с пропусками, так как пчелы выбрасывают пораженные личинки из ячеек.

При клиническом обследовании пчелосемей установили степень поражения расплода с учетом погибших личинок в ячейках и выброшенных на дно улья от слабой (до 10 личинок) до средней (свыше 10 до 100 личинок).




Рисунок 3 - Пораженные личинки в ячейках сотов

При обнаружении мумифицированных личинок с клиническими признаками аскосфероза с их поверхностей делали соскоб и готовили препараты для микроскопических исследований для постановки предварительного диагноза на аскосфероз.

При микроскопическом исследовании в поле зрения наблюдали гифы грибка и споровые шарики со спорами аскосферы (Рисунок 4).




Рисунок 4 -Споровые цисты со спорами

На основании характерных клинических признаков поражения расплода и микроскопического анализа поставлен предварительный диагноз – аскосфероз. Доля заражения пасек и пчелиных семей аскосферозом составила 65 %.

Заключение. Таким образом, анализ полученных результатов эпизоотологических обследований показал наличие возбудителя аскосфероза на пасеках Западно-Казахстанской области. Заболевание чаще наблюдается в активный период жизнедеятельности пчелосемьи, при наличии расплода. Возникновению аскосфероза способствуют такие факторы, как высокая влажность и резкие перепады температуры, отсутствие ветеринарно-санитарного контроля за состоянием пасек.

Регулярный эпизоотологический мониторинг и своевременная диагностика имеют решающее значение в сохранении благополучного состояния пасек.

Благодарности.

Данные исследования проводились в рамках проекта по грантовому финансированию по научным и (или) научно-техническим проектам на 2024-2026 годы (Комитет науки Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан), ИРН: AP23489173, на тему: «Разработка комплекса ветеринарно-санитарных мероприятий при болезнях пчел в условиях Западно-Казахстанской области и технология получения экологически чистых продуктов пчеловодства».

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Фарманов, Ж.З. Отличительные аспекты и характеристики пчеловодчества [Текст] / Ж.З.Фарманов // Экономика и социум. 2022. №10(101)-1, стр 651-657 www.iupr.ru

2. Рахматуллин, И. Х. Роль пчеловодства в современном мире [Текст] / И. Х. Рахматуллин // Актуальные исследования. 2020. №23 (26). Ч.I. С. 23-25. URL: https://apni.ru/article/1545-rol-pchelovodstva-v-sovremennom-mire

3. Комлацкий, Г.В. Пчеловодство как необходимый фактор развития АПК. [Текст] / Г.В. Комлацкий // Научный журнал КубГАУ, 2020. №157(03), http://ej.kubagro.ru/2020/03/pdf/05.pdf

4. Нуржанова, Ф.Х., Сатыбаев, Б.Г. Основные болезни пчел и их профилактика [Текст] : Учебное пособие / Ф.Х.Нуржанова, Б.Г.Сатыбаев. -Уральск : РИО, ЗКАТУ им. Жангир хана, 2024.-196 с.

5. Землянская, Н. И. Основные инфекционные и инвазионные болезни пчел Приамурья [Текст] : учебное пособие / Н.И. Землянская. - Благовещенск : Дальневосточный государственный аграрный университет, 2015. -93 с.

6. Масленникова, В. И. Болезни и вредители пчёл [Текст] : учебник / В.И. Масленникова. – Москва : Росэнтомофауна, 2020. – 304 с.

7. Кривцов, Н. И. и др. Основные болезни пчёл (профилактика и лечение): [Текст] / Н.И. Кривцов, В.И.Лебедев, О.К. Чупахина, В.И. Чупахин. – Москва : Вереск, 2012. – 208 с.

8. Якубик, О.Л. Инфекционные и инвазионные болезни пчел [Текст] : учебно-методическое пособие / О.Л. Якубик. — Благовещенск : ДальГАУ, 2023. - 102 с.

9. Yoshiyama Mikio, Kiyoshi Kimura, 2021. Presence of Ascosphaera apis, the causative agent of chalkbrood disease, in honeybees Apis mellifera (Hymenoptera: Apidae) in Japan Entomology and Zoology 46(1):31-36·February.

10. Ion Rădoi, Viorica Lagunovschi-luchian, Florentin Milea, Iuliana Codreanu, Stefania Raita, Vasilică Savu, Agripina Şapcaliu, Bogdan Tache, Roxana Zaharia, Luiza Bădic , Dan Bodescu. Studies on the diagnosis of bee ascospherosis on live bees samples and brood comb through morpho-clinical testing and laboratory examination. Scientific Works. Series C. Veterinary Medicine. 2021. Vol. LXVII (1).

11. Yoder JA, Nelson BW, Main RL, Lorenz AL, Jajack AJ, Aronstein KA. Water activity of the bee fungal pathogen Ascosphaera apis in relation to colony conditions. Apidologie 2017;48(2):159-167.

12. Aster Y, Amsalu B, Betre Y, et al. Ecological distribution of honeybee Chalkbrood disease (Ascosphaera Apis) in Ethiopia. Ethiopia Journal Animal Production. 2017; 91(1): 177-191.

13. José María Tapia-Gonzáleza, Gustavo Alcazar-Ocegueraa, José Octavio Macías-Macíasa, Francisca Contreras-Escareño, José Carlos Tapia-Riveraa, Tatiana Petukhovaa, Ernesto Guzmán-Novoaa. Ascospherosis in honey bees and its relationship to environmental factors in Jalisco, Mexico. Revista mexicana de ciencias pecuarias. Version. 2020. vol.11 no.2 Mérida abr./jun. https://doi.org/10.22319/rmcp.v11i2.4926.

14. Flores JM, Spivak M, Gutiérrez I. Spores of Ascosphaera apis contained in wax foundation can infect honey bee brood. Vet Microbiol. 2005;108(1-2):141-144.

15. Christoph Sandrock ,Matteo Tanadini,Lorenzo G. Tanadini,Aline Fauser-Misslin,Simon G. Potts,Peter Neumann. impact of Chronic Neonicotinoid Exposure on Honeybee Colony Performance and Queen Supersedure . PLOS ONE. 2014. V 9 (8). https://doi.org/10.1371/journal.pone.0103592.

16. Bellucci, V.; Lucci, S.; Bianco, P.; Ubaldi, A.; Felicioli, A.; Porrini, C.; Mutinelli, F.; Battisti, S.; Spallucci, V.; Cersini, A.; Pietropaoli, M.; Formato, G. Monitoring honey bee health in five natural protected areas in Italy. Veterinaria Italiana, 2019. 55 (1), p.15 – 25.

17. Методические указания по лабораторной диагностике аскосфероза пчел и выделениювозбудителя из пыльцы (перги), (утверждены 9 апреля 1986 г.).

REFERENCES

1. Farmanov, ZH.Z. Otlichitel'nye aspekty i harakteristiki pchelovodchestva [Tekst] / ZH.Z.Farmanov // Ekonomika i socium. 2022" №10(101)-1, str 651-657 www.iupr.ru

2. Rahmatullin, I. H. Rol' pchelovodstva v sovremennom mire [Tekst] / I. H. Rahmatullin // Aktual'nye issledovaniya. 2020. №23 (26). CH.I. S. 23-25. URL: https://apni.ru/article/1545-rol-pchelovodstva-v-sovremennom-mire

3. Komlackij, G.V. Pchelovodstvo kak neobhodimyj faktor razvitiya APK. [Tekst] / G.V. Komlackij // Nauchnyj zhurnal KubGAU, 2020. №157(03), http://ej.kubagro.ru/2020/03/pdf/05.pdf

4. Nurzhanova, F.H., Satybaev, B.G. Osnovnye bolezni pchel i ih profilaktika [Tekst] : Uchebnoe posobie / F.H.Nurzhanova, B.G.Satybaev. -Ural'sk : RIO, ZKATU im. ZHangir hana, 2024.-196 s.

5. Zemlyanskaya, N. I. Osnovnye infekcionnye i invazionnye bolezni pchel Priamur'ya [Tekst] : uchebnoe posobie / N.I. Zemlyanskaya. -Blagoveshchensk : Dal'nevostochnyj gosudarstvennyj agrarnyj universitet, 2015. -93 c.

6. Maslennikova, V. I. Bolezni i vrediteli pchyol [Tekst] : uchebnik / V.I. Maslennikova. – Moskva : Rosentomofauna, 2020. – 304 s.

7. Krivcov, N. I. i dr. Osnovnye bolezni pchyol (profilaktika i lechenie): [Tekst] / N.I. Krivcov, V.I.Lebedev, O.K. CHupahina, V.I. CHupahin. – Moskva : Veresk, 2012. – 208 s.

8. YAkubik, O.L. Infekcionnye i invazionnye bolezni pchel [Tekst] : uchebno-metodicheskoe posobie / O.L. YAkubik. — Blagoveshchensk : Dal'GAU, 2023. - 102 s.

9. Yoshiyama Mikio, Kiyoshi Kimura, 2011. Presence of Ascosphaera apis, the causative agent of chalkbrood disease, in honeybees Apis mellifera (Hymenoptera: Apidae) in Japan Entomology and Zoology 46(1):31-36·February.

10. Ion Rădoi, Viorica Lagunovschi-luchian, Florentin Milea, Iuliana Codreanu, Stefania Raita, Vasilică Savu, Agripina Șapcaliu, Bogdan Tache, Roxana Zaharia, Luiza Bădic , Dan Bodescu. Studies on the diagnosis of bee ascospherosis on live bees samples and brood comb through morpho-clinical testing and laboratory examination. Scientific Works. Series C. Veterinary Medicine. 2021. Vol. LXVII (1).

11. Yoder JA, Nelson BW, Main RL, Lorenz AL, Jajack AJ, Aronstein KA. Water activity of the bee fungal pathogen Ascosphaera apis in relation to colony conditions. Apidologie 2017;48(2):159-167.

12. Yoder JA, Nelson BW, Main RL, Lorenz AL, Jajack AJ, Aronstein KA. Water activity of the bee fungal pathogen Ascosphaera apis in relation to colony conditions. Apidologie 2017;48(2):159-167.

13. José María Tapia-Gonzáleza, Gustavo Alcazar-Ocegueraa, José Octavio Macías-Macíasa, Francisca Contreras-Escareño, José Carlos Tapia-Riveraa, Tatiana Petukhovaa, Ernesto Guzmán-Novoaa. Ascospherosis in honey bees and its relationship to environmental factors in Jalisco, Mexico. Revista mexicana de ciencias pecuarias. Version. 2020. vol.11 no.2 Mérida abr./jun. https://doi.org/10.22319/rmcp.v11i2.4926

14. Flores JM, Spivak M, Gutiérrez I. Spores of Ascosphaera apis contained in wax foundation can infect honey bee brood. Vet Microbiol 2005;108(1-2):141-144.

15. Christoph Sandrock ,Matteo Tanadini,Lorenzo G. Tanadini,Aline Fauser-Misslin,Simon G. Potts,Peter Neumann. impact of Chronic Neonicotinoid Exposure on Honeybee Colony Performance and Queen Supersedure . PLOS ONE. 2014. V 9 (8). https://doi.org/10.1371/journal.pone.0103592

16. Bellucci, V.; Lucci, S.; Bianco, P.; Ubaldi, A.; Felicioli, A.; Porrini, C.; Mutinelli, F.; Battisti, S.; Spallucci, V.; Cersini, A.; Pietropaoli, M.; Formato, G. Monitoring honey bee health in five natural protected areas in Italy. Veterinaria Italiana, 2019. 55 (1), r.15 - 25

17. Metodicheskie ukazaniya po laboratornoj diagnostike askosferoza pchel i vydeleniyuvozbuditelya iz pyl'cy (pergi), (utverzhdeny 9 aprelya 1986 g.)

ТҮЙІН

Батыс Қазақстан облысының омарталарында бал араларының аскосферозы бойынша эпизоотологиялық жағдай зерттелді. Патогендік саңырауқұлақтармен дернәсілдердің залалдануы анықталды. Балапандары бар бал ұясын визуалды тексеру ашық және жабық ұяларда зақымдалған дернәсілдердің болуын көрсетті. Мумификацияланған дернәсілдер жасушалардан оңай түсіп кетеді. Аралар әлсіреген, балапандары түрлі-түсті, аралары бос, өйткені аралар залалданған дернәсілдерді ұясынан шығарып тастайды. Ара колонияларын клиникалық тексеру кезінде ұяларда өлген дернәсілдерді және ұяның түбіне әлсізден (10 дейін) орташа (10-нан 100 дейін) зақымдану дәрежесі анықталды. Егер ұяларда аскосфероздың клиникалық белгілері бар өлі мумификацияланған дернәсілдер табылса, олардың беттерінен жұғынды алып, аскосферозға алдын-ала диагноз қою үшін микроскопиялық зерттеулерге арналған препараттар дайындалды. Микроскопиялық зерттеу кезінде саңырауқұлақ гифалары мен аскосфералық спорасы бар споралы шарлар байқалды. Ауру көбінесе дернәсілдер болған кезде аралардың белсенді кезеңінде байқалады. Аскосфероздың пайда болуына жоғары ылғалдылық және температураның күрт өзгеруі, омарта жағдайына ветеринарлық-санитарлық бақылаудың болмауы сияқты факторлар ықпал етеді.

УДК 619:616.-002.904:636.2
МРНТИ 61.48.55,68.39.29

Сариев Н.Ж., кандидат ветеринарных наук, и.о. доцента, https://orcid.org/0000-0001-6116-7523
НАО «Западно-Казахстанский аграрно-технический университет имени Жангир хана», г. Уральск, ул. Жангир хана 51, 090009, Республика Казахстан, sariev.nurzhan@mail.ru
Кармалиев Р.С., доктор ветеринарных наук, ассоциированный профессор, https://orcid.org/0000-0003-2565-3107
НАО «Западно-Казахстанский аграрно-технический университет имени Жангир хана», г. Уральск, ул. Жангир хана 51, 090009, Республика Казахстан, karmalyev@mail.ru
Сидихов Б.М., кандидат ветеринарных наук, и.о. доцента, https://orcid.org/0000-0001-6471-3737
НАО «Западно-Казахстанский аграрно-технический университет имени Жангир хана», г. Уральск, ул. Жангир хана 51, 090009, Республика Казахстан, sidihovbm@mail.ru
Усенов Ж.Т., доктор философии (PhD), и.о. доцента, https://orcid.org/0000-0002-2100-1948
НАО «Западно-Казахстанский аграрно-технический университет имени Жангир хана», г. Уральск, ул. Жангир хана 51, 090009, Республика Казахстан, usenov79@mail.ru

Sariyev N. Zh., Candidate of Veterinary Sciences, Acting Associate Professor, https://orcid.org/0000-0001-6116-7523

NJSC «West Kazakhstan Agrarian and Technical University named after Zhangir khan», Uralsk city, Zhangir Khan street 51, Kazakhstan, 090009, sariev.nurzhan@mail.ru
Karmaliyev R. S., Doctor of Veterinary Sciences, Associate Professor, https://orcid.org/0000-0003-2565-3107
NJSC «West Kazakhstan Agrarian and Technical University named after Zhangir khan», Uralsk city, Zhangir Khan street 51, Kazakhstan, 090009, karmalyev@mail.ru
Sidikhov B. M., Candidate of Veterinary Sciences, Acting Associate Professor, https://orcid.org/0000-0001-6471-3737
NJSC «West Kazakhstan Agrarian and Technical University named after Zhangir khan», Uralsk city, Zhangir Khan street 51, Kazakhstan, 090009, sidihovbm@mail.ru
Ussenov Zh. T., Doctor of Philosophy (PhD), Acting Associate Professor, https://orcid.org/0000-0002-2100-1948
NJSC «West Kazakhstan Agrarian and Technical University named after Zhangir khan», Uralsk city, Zhangir Khan street 51, Kazakhstan, 090009, usenov79@mail.ru

ЭПИЗООТОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ ПИРОПЛАЗМИДОЗОВ И ИКСОДИДОЗОВ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА В ЗАПАДНЫХ РЕГИОНАХ КАЗАХСТАНА

EPIZOOTOLOGICAL MONITORING OF PYROPLASMIDOSIS AND IXODIDOSIS IN CATTLE IN THE WESTERN REGIONS OF KAZAKHSTAN

АННОТАЦИЯ

Пироплазмидозы – это облигатно-трансмиссивные заболевания, вызываемые беспигментными эндоглобулярными паразитами крови. Они поражают широкий круг домашних и диких животных, в особенности крупный и мелкий рогатый скот. В Казахстане эпизоотическая ситуация по пироплазмидозам крупного рогатого скота остаётся неблагополучной, что приводит к значительным экономическим потерям в животноводческой отрасли. Наибольшая распространённость этих инфекций отмечается в западных регионах страны.

Целью исследования является всесторонний анализ эпизоотической обстановки по пироплазмидозам и иксодидозам крупного рогатого скота в западных регионах Казахстана. В рамках работы проводится изучение динамики заболеваемости, факторов распространения и идентификация возбудителей с использованием современных диагностических методов.

Исследование проводилось в 2024 году на территории Западного Казахстана. Для оценки уровня инвазированности крупного рогатого скота пироплазмидозами было отобрано 507 проб крови, а также собрано 581 экземпляр иксодовых клещей как с животных, так и с растительности. Идентификацию клещей проводили до рода и вида.

В рамках работы анализировались индекс встречаемости иксодовых клещей (ИВ, %), индекс обилия (ИО, экз.), а также сезонная и возрастная динамика заражённости крупного рогатого скота. Диагностика кровепаразитарных инфекций выполнялась методом ПЦР с применением специфических праймеров для детекции ДНК Theileria annulata, Theileria sergenti, Theileria orientalis и Babesia bovis.

ANNOTATION

Pyroplasmidosis is an obligate-transmissible disease caused by pigmented endoglobular blood parasites. They affect a wide range of domestic and wild animals, especially large and small cattle. In Kazakhstan, the epizootic situation of bovine pyroplasmidosis remains unfavorable, which leads to significant economic losses in the livestock industry. The highest prevalence of these infections is observed in the western regions of the country.

The aim of the study is a comprehensive analysis of the epizootic situation of pyroplasmidosis and ixodidosis in cattle in the western regions of Kazakhstan. The study examines the dynamics of morbidity, the factors of spread and the identification of pathogens using modern diagnostic methods.

The study was conducted in 2024 on the territory of Western Kazakhstan. To assess the level of infection of cattle with pyroplasmidosis, 507 blood samples were taken, and 581 specimens of ixodes mites were collected from both animals and vegetation. Identification of ticks was carried out to the genus and species.

The work analyzed the index of ixodid mites (IV, %), the abundance index (IO, specimens), as well as seasonal and age-related dynamics of infection in cattle. The diagnosis of blood parasitic infections was performed by PCR using specific primers for DNA detection of Theileria annulata, Theileria sergenti, Theileria orientalis and Babesia bovis.

Ключевые слова: *пироплазмидозы, крупный рогатый скот, иксодовые клещи, Theileria, эпизоотическая ситуация, ПЦР-диагностика.*

Key words: *pyroplasmidosis, cattle, ixodes mites, Theileria, epizootic situation, PCR diagnostics.*

Введение. Пироплазмидозы представляют собой облигатно-трансмиссивные заболевания, вызванные беспигментными эндоглобулярными паразитами крови. Эти инфекции поражают широкий спектр домашних и диких животных, однако наибольший ущерб наносят крупному и мелкому рогатому скоту.

Заболевание сопровождается лихорадкой, анемией, желтушностью слизистых оболочек, дисфункцией сердечно-сосудистой и пищеварительной систем, гемоглобинурией и значительным снижением продуктивности животных. Характерной особенностью пироплазмидозов является их сезонная активность, обусловленная циклом развития специфических клещей-переносчиков.

У крупного рогатого скота выявляются возбудители пироплазмоза (Piroplasma bigeminum), франсаиеллеза (Francaiella colchica) и бабезиоза (Babesia bovis) [1].

В Казахстане наблюдается неблагополучная эпизоотическая ситуация по пироплазмидозам крупного рогатого скота, которые наносят серьезный ущерб животноводству региона. В фермерских хозяйствах зарегистрированы четыре вида возбудителей пироплазмидозов: B. bigemina, B. bovis, Th. annulata и A. marginale. Динамика проявлений заболеваний, вызываемых этими патогенами, зависит от расположения хозяйств в природно-хозяйственных зонах страны [2, 3].

Особенно острой эта проблема является в южных регионах Казахстана, где благоприятные климатические условия способствуют развитию паразитов и их переносчиков – иксодовых клещей. В летне-осенний период заболевания, объединяемые под общим названием пироплазмидозы, представляют серьезную опасность для животноводства, требуя постоянного внимания со стороны фермеров и ветеринаров. Пироплазмидозы крупного рогатого скота представляют значительную угрозу для развития животноводства. В последние годы отмечается рост числа заболевших животных, появление новых очагов инфекции, а также массовая гибель скота, что приводит к снижению молочной и мясной продуктивности [4, 5].

Пироплазмидозы животных также широко распространены в Западном Казахстане, где природные условия способствуют развитию как самих паразитов, так и членистоногих переносчиков. В весенне-летне-осенний период эти заболевания представляют серьезную угрозу для животноводов, нанося значительный экономический ущерб. Он выражается в высокой смертности животных при отсутствии своевременного лечения, длительном восстановлении жизненных функций организма, снижении продуктивности, рождении ослабленного приплода, ухудшении репродуктивных показателей, а также значительных затратах на лечение и профилактику заболеваний. Особенно опасны смешанные формы

пироплазмидозов, включающие различные сочетания пироплазмоза, франсаиеллеза и тейлериоза. Смертность при таких формах заболеваний, даже при своевременно начатом лечении, может достигать 40–50 %.

Большую угрозу представляют иксодовые клещи – переносчики возбудителей пироплазмидозов. Они снижают продуктивность скота, вызывают стресс, дерматиты, поражения кожи, а также создают постоянный риск возникновения инфекционных заболеваний. Для эффективной борьбы с ними необходимо регулярно проводить эпизоотологический мониторинг, включая идентификацию доминирующих видов клещей (Boophilus, Rhipicephalus, Haemaphysalis, Dermacentor, Hyalomma) и регистрацию основных переносчиков инфекции.

Западно-Казахстанская область является неблагополучной в эпизоотологическом отношении как по иксодовым клещам, так и по пироплазмидозам, что связано с благоприятными условиями для их развития, высокой численностью прокормителей и плотностью поголовья скота на пастбищах. В связи с этим необходимы комплексные меры профилактики и контроля для снижения заболеваемости и экономических потерь в животноводстве [6, 7].

Наиболее достоверными методами диагностики инвазированности животных и клещей пироплазмидозами являются полимеразная цепная реакция (ПЦР) и иммуноферментный анализ (ИФА). ПЦР обладает высокой чувствительностью и специфичностью, позволяя обнаруживать ДНК возбудителей даже при низкой концентрации в образцах крови или тканей. Этот метод особенно эффективен для диагностики хронических инфекций, где количество паразитов может быть незначительным. ИФА используется для выявления специфических антител против пироплазмид, что помогает определить стадию заболевания и наличие иммунного ответа у животного. Оба метода широко применяются в ветеринарной практике для своевременного выявления и контроля пироплазмидозов [8, 9].

Цель исследований. Цель исследования – комплексное изучение эпизоотической ситуации по пироплазмидозам и иксодидозам крупного рогатого скота на западе Казахстана, включая анализ динамики заболеваемости, факторов распространения и идентификацию возбудителей с применением современных методов диагностики.

Материалы и методы. План исследования включает полевые и лабораторные исследования.

1 Полевые исследования:

Выезд в хозяйства Западно-Казахстанской области, которые находятся в различных природно-климатических зонах (степная, полупустынная и пустынная), в разные сезоны года (зима, весна, лето, осень);

Сбор иксодовых клещей, переносчиков пироплазмидозов, с различных участков тела крупного рогатого скота у разных возрастных групп (до года,1-3 года, 4-5 лет, 6 лет и старше);

Определение индекса встречаемости (распространения) иксодовых клещей в различных природных зонах Западно-Казахстанской области в разные сезоны года (зима, весна, лето, осень);

Установление индекса обилия и общего запаса иксодид в различных природных зонах Западно-Казахстанской области, в разные сезоны года (зима, весна, лето, осень);

Определение сезонной динамики поражённости крупного рогатого скота иксодидами в разные сезоны года (зима, весна, лето, осень);

Определение возрастной динамики поражённости крупного рогатого скота иксодидами.

1.7 Сбор иксодовых клещей с растительности на пастбищах в исследуемых хозяйствах в разные сезоны года (весна, лето, осень);

1.8 Взятие крови у крупного рогатого скота у разных возрастных групп (до года,1-3 года, 4-5 лет, 6 лет и старше).

2 Лабораторные исследования:

2.1 Определение иксодовых клещей по морфологическим признакам до рода и вида;

2.2 Определение инвазированности иксодовых клещей пироплазмидами методом ПЦР;

2.3 Исследование крови у крупного рогатого скота разных возрастных групп (до года,1-3 года, 4-5 лет, 6 лет и старше) на инвазированность пироплазмидами методом ПЦР.

Сезонную динамику заражённости крупного рогатого скота клещами определяли ежеквартальными (зимой, весной, летом и осенью) исследованиями животных, а возрастную - исследованиями различных возрастных групп: до года, 1-3 года, 4-5 лет, 6 лет и старше. Видовую принадлежность определяли, используя атлас иксодовых клещей Ганиева, Аливердиева. Для определения вида имаго клещей использовали микроскоп стереоскопический «Микромед МС-1 вар. 1С LED»

Место проведения исследований.

Полевые исследования проводили в период 2024 года в хозяйствах Западно-Казахстанской области, которые находятся в различных природно-климатических зонах (степная, полупустынная и пустынная).

В степной зоне исследования проводили в Таскалинском районе Западно-Казахстанской области в крестьянском хозяйстве «Оян», расположенное 51°06'28.5" северной широты и 50°17'31.2" восточной долготы.

В полупустынной зоне исследования проводили Акжайкском районе Западно-Казахстанской области в крестьянском хозяйстве «Сажида», расположенное 50°11′15″ северной широты, 51°10′02″ восточной долготы.

В пустынной зоне исследования проводили в Жангалинском районе Западно-Казахстанской области в крестьянском хозяйстве «Нур», расположенное 49°12′54″ северной широты, 50°18′10″ восточной долготы.

Лабораторные исследования проводили в лаборатории испытательного центра Западно-Казахстанского аграрно-технического университета имени Жангир хана, 090009, Западно-Казахстанская область, г. Уральск, ул. Жангир хана 51, Республика Казахстан

Отбор проб.

1. Получения образцов крови

Кровь у крупного рогатого скота отбирали из хвостовой вены

2. Сбор иксодовых клещей с крупного рогатого скота.

Сбор иксодовых клещей с крупного рогатого скота проводили суммарно со всех коров в одном хозяйстве 1 раз в квартал по сезонам года. У крупного рогатого скота осматривали последовательно все тело. Имагинальные фазы развития клеща часто обнаруживали на коже задней части тела животных (паховая область, вымя у коров, мошонка у быков).

Индекс встречаемости (ИВ, %) - число объектов, на которых обнаружены иксодовые клещи, в процентах от общего числа обследованных объектов (проб) (формула 1)

$$ИВ = Np / n \times 100\%,$$

где Np – число зараженных хозяев, n – общее число хозяев.

Индекс обилия (ИО, экз.) – среднее число особей данного вида паразита (или систематической группы), приходящееся на единицу учёта. Наиболее распространено вычисление индекса обилия на одну особь хозяина (формула 2)

$$ИО = Par / n, \quad (2)$$

где Par – общее число обнаруженных паразитов, n количество обследованных животных[10].

Сборы клещей с растительности

Виды клещей с пастбищным типом паразитирования собирали на флаг (flag) протаскивали в ярусах растительности. Принцип действия основан на механической стимуляции клещей, сидящих на растительности в позе пассивного ожидания.

Оценку относительного обилия клещей, рассчитывали на один флаг за единицу пройдённого расстояния (1 флаго-километр) по формуле (3):(3)

$$X0 = \Sigma\ di\ xi,$$

где X0 – средневзвешенное обилие клещей di – доля площади, занимаемой i-м местообитанием, от всей исследуемой, xi – количество, собраных клещей в том же местообитании [11, 12].

Результаты исследований. Видовой состав иксодовых клещей. В Западно-Казахстанской области, в различных природных зонах, включая степи, полупустыни и пустыни, было выявлено 11 видов иксодовых клещей, принадлежащих к пяти родам: Ixodes, Haemophysalis, Dermacentor, Hyalomma, Rhipicephalus.

Род Hyalomma (Рисунок 1) представлен четырьмя видами:



Вид со стороны спины



Вид с брюшной стороны

Рисунок 1 – Клещ рода Hyalomma

Таблица 1 – Видовой состав иксодовых клещей, паразитирующих на крупном рогатом скоте в Западно-Казахстанской области

№ п/п	Вид клеща (семейство Ixodidae)
Род Ixodes	
1	Ixodes ricinus Linnaeus, 1758
Род Haemophysalis	
2	Haemophysalis erinacei Pavesi, 1844
Род Dermacentor	
3	Dermacentor marginatus Sulzer, 1776
4	Dermacentor reticulatus Fabricius, 1794
5	Dermacentor niveus Neumann, 1897
Род Hyalomma	
6	Hyalomma marginatum Koch, 1844
7	Hyalomma scupense Schulze, 1919
8	Hyalomma detritum Schulze, 1919
9	Hyalomma asiaticum Schulze et Schl., 1929
Род Rhipicephalus	
10	Rhipicephalus rossicus Yakimov & Kohl-Yakimova, 1911
11	Rhipicephalus pumilio Schulze, 1935

Сезонная динамика. Анализ сезонной динамики заражённости крупного рогатого скота иксодовыми клещами показал, что индекс встречаемости (ИВ) этих паразитов варьируется в зависимости от времени года.

Зимой заражённость животных во всех природных зонах была минимальной – 21,4%.

Весной наблюдался самый высокий уровень инвазированности: в степной зоне заражены все исследуемые животные -100%, в полупустынной инвазированы – 95,8%, в пустынной зоне поражены -93,6% (Рисунок 2).




Рисунок 2 – Сезонная динамика иксодидозов крупного рогатого скота в Западно-Казахстанской области

Летом интенсивность заражения снизилась: в степной зоне поражены – 93,4%, в полупустынной инфицированы – 91,8%, в пустынной зоне заражены – 89,8%.

Осенью уровень инвазированности был меньше, чем весенне-летний период: в степной зоне клещами инфицированы – 41,6% животных, в полупустынной заражение зафиксировано у 33,6% крупного рогатого скота, в пустынной зоне поражены – 29,4%.

Таким образом, наибольший уровень заражённости крупного рогатого скота иксодовыми клещами приходится на весенне-летний период, а наименьший – на осенне-зимний.

Индекс обилия (ИО) иксодовых клещей (экземпляров на голову) у крупного рогатого скота в разных природных зонах Западно-Казахстанской области зависит от вида клещей.

Наибольшую численность продемонстрировали Hyalomma scupense (49,8 экз/гол в среднем по области), Hyalomma asiaticum (47,5 экз/гол) и Hyalomma detritum (45,0 экз/гол). Их максимальные показатели зарегистрированы в пустынной зоне.

Из рода Dermacentor наиболее распространён D. marginatus (24,9 экз/гол), тогда как D. niveus и D. reticulatus имеют схожие значения, варьирующиеся в пределах 8,6–8,9 экз/гол.

Среди Rhipicephalus, R. pumilio встречается чаще (36,2 экз/гол), чем R. rossicus (9,4 экз/гол).

В целом, индекс обилия клещей увеличивается от пустынной (24,7 экз/гол) к степной зоне (29,6 экз/гол), что свидетельствует о более благоприятных условиях для клещей в аридных ландшафтах.

Возрастная динамика. Исследование возрастной динамики заражённости крупного рогатого скота иксодовыми клещами показало, что паразиты обнаружены у животных всех возрастных групп, при этом индекс встречаемости (ИВ) в среднем составил 61,0%. Однако численность клещей на одно животное (индекс обилия, ИО) варьировалась в зависимости от возраста и природной зоны.

В степной зоне наибольшая численность клещей зафиксирована у молодняка до года (18,3 экз/гол.) и у животных в возрасте 1–3 лет (49,8 экз/гол.).

В полупустынной зоне аналогичная тенденция: максимальный показатель отмечен у молодняка до года (11,7 экз/гол.) и у животных 1–3 лет (21,4 экз/гол.).

В пустынной зоне больше всего клещей было у животных 1–3 лет (17,8 экз/гол.) и в возрастной группе 4–5 лет (13,5 экз/гол.).

В среднем по Западно-Казахстанской области наиболее высокий индекс обилия наблюдался у животных 1–3 лет (44,1 экз/гол.), тогда как у особей 6 лет и старше он оказался минимальным (13,5 экз/гол.) (таб. 2).

Таблица 2 – Возрастная динамика инвазированности КРС иксодидами в зонах Западно-Казахстанской области, n = 500 голов

Возраст животных	Зона					
	Степная		Полупустынная		Пустынная	
	ИВ, %	ИО, экз/гол	ИВ, %	ИО, экз/гол	ИВ, %	ИО, экз/гол
До года	69,8	18,3	68,2	11,7	65,2	16,2
1-3 года	78,2	49,8	76,2	21,4	69,6	17,8
4-5 лет	59,6	17,3	53,2	16,9	53,4	13,5
6 лет и старше	49,0	16,4	45,0	15,4	45,8	11,3
В среднем	64,1	25,5	60,6	16,4	58,5	14,7

Результаты лабораторных анализов иксодовых клещей и крови крупного рогатого скота. Определение кровепаразитарных инфекций у крупного рогатого скота и иксодовых клещей проводили методом ПЦР. На первом этапе исследования 507 образцов крови крупного рогатого скота были проанализированы методом ПЦР с использованием специфических праймеров к 18S рРНК для выявления ДНК кровепаразитов. В результате амплификации в 162 пробах (32%) были получены ПЦР-продукты размером 400 п.о., что свидетельствовало о наличии в этих образцах ДНК кровепаразитов.

Для выявления кровепаразитарных инфекций у переносчиков было исследовано 581 экземпляр иксодовых клещей, которые были объединены в 29 пулов. ПЦР-анализ с использованием специфических праймеров 18S рРНК показал, что два пула клещей дали положительный результат на присутствие ДНК кровепаразитов.

Для окончательной идентификации возбудителей 162 положительных образца крови крупного рогатого скота и два положительных пула клещей дополнительно исследовали методом ПЦР с видоспецифическими праймерами Theileria annulata, Theileria sergenti, Theileria orientalis и Babesia bovis. В результате определили, что в 159 образцах крови крупного рогатого скота и 2 пулах клещей были выявлены ПЦР-продукты размером 250 п.о., характерные для Theileria annulata. ДНК Theileria sergenti, Theileria orientalis и Babesia bovis в исследованных образцах не обнаружены.

Таким образом, из 507 исследованных образцов крови крупного рогатого скота и 581 иксодового клеща Theileria annulata была выявлена в 159 образцах крови (31,4%) и в 2 пулах клещей (6,9%). Эти данные подтверждают значительное распространение возбудителя тейлериоза среди поголовья крупного рогатого скота и его природных переносчиков в изученной популяции.

Заключение. Проведенные исследования показали высокое видовое разнообразие иксодовых клещей в Западно-Казахстанской области, где было идентифицировано 11 видов, относящихся к пяти родам (Ixodes, Haemaphysalis, Dermacentor, Hyalomma, Rhipicephalus). Наибольшее распространение продемонстрировали клещи рода Hyalomma, особенно Hyalomma scupense, Hyalomma asiaticum и Hyalomma detritum, численность которых была максимальной в пустынной зоне.

Анализ сезонной и возрастной динамики заражённости крупного рогатого скота иксодовыми клещами выявил, что пик инвазии приходится на весенне-летний период, с максимальным уровнем зараженности весной (до 100% в степной зоне). Индекс обилия

клещей варьировался в зависимости от природных условий и возраста животных, достигая наибольших значений в степной зоне и у молодняка в возрасте 1–3 лет.

Исследование кровепаразитарных инфекций методом ПЦР выявило наличие ДНК кровепаразитов у 32% исследованных образцов крови крупного рогатого скота и в 6,9% пулов клещей. В результате молекулярно-генетического анализа было установлено, что основным возбудителем инфекции является Theileria annulata, обнаруженная в 159 образцах крови КРС (31,4%) и 2 пулах клещей (6,9%). ДНК *Theileria sergenti, Theileria orientalis и Babesia bovis* в исследованных образцах не выявлены.

Полученные результаты свидетельствуют о значительной распространенности тейлериоза среди крупного рогатого скота в регионе, а также о роли иксодовых клещей в передаче возбудителя. Наибольший уровень заражённости крупного рогатого скота в весенне-летний период и высокая численность клещей, особенно в аридных природных зонах, подтверждают необходимость проведения профилактических мероприятий, направленных на контроль численности клещей и снижение риска распространения тейлериоза среди сельскохозяйственных животных.

Благодарности. Работа выполнена в рамках проекта Грантового финансирования 2024-2026 гг. КН МНВО РК AP23487588 тема проекта: «Совершенствование профилактики пироплазмидозов крупного рогатого скота, передаваемых иксодовыми клещами в степной, полупустынной и пустынной зонах Западно-Казахстанской области».

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Благовещенский, Д. И. Материалы по фауне наружных паразитов животных Казалинского и некоторых других районов Южного Казахстана / Д. И. Благовещенский // Труды КазФАН. Вып. – 1937. - № 2. – С. 11-84.

2. Кожабаев М.К, Аманжол Р., Тулеуханов А. Распространение иксодовых клещей на Юге Казахстана // Теория и практика борьбы с паразитарными болезнями 2024 № 25 С. 242-244.

3. Таурбаева С. Н., Токпан С. С., Шевцов А. Б., Лидер Л. А. Тейлериоз крупного рогатого скота: распространение и диагностика в условиях Кызылординской области // Вестник науки Казахского агротехнического университета им. С. Сейфуллина (междисциплинарный). - 2017. - №4 (95). - С.73-78.

4. Таурбаева С.Н., Лидер Л.А. Степень распространения тейлериоза крупного рогатого скота в Южном Казахстане // Материалы Республиканской научно-теоретической конференции «Сейфуллинские чтения – 13: сохраняя традиции, создавая будущее», посвященная 60-летию Казахского агротехнического университета имени С. Сейфуллина. - 2017. - Т.I, Ч.2. - С.241-244.

5. Сабаншиев, М. С. Кровососущие клещи – переносчики пироплазмидозов на юге Казахстана. / М. С. Сабаншиев, М. Ж. Сулейменов, Т. Т. Сулейменов // Вестник Кыргызского научно–исследовательского института животноводства, ветеринарии и пастбищ имени Арстанбека Дуйшеева. – 2007. – №1 – С. 328–329.

6. Кармалиев Р.С., Сидихов Б.М., Усенов Ж.Т., Нуржанова Ф.Х., Майканов Н.С., Арисов М.В., Сенгалиев Е.М. Иксодиды крупного рогатого скота в Западно-Казахстанской области, видовой состав и распространение // «Наука и образование» Научно-практический журнал Западно-Казахстанского аграрно-технического университета имени Жангир хана Уральск. 2024. Т.1. № 3-1 (76), С. 41-55.

7. Танитовский, В. А. Фауна и распространение иксодовых клещей в Западно-Казахстанской области / Танитовский В. А., Майканов Н. С. // Материалы межрегиональной научно-практической конференции «Эпидемиологический надзор за природно-очаговыми инфекциями. Экология носителей и переносчиков. Биобезопасность», посвящённой 130-летию открытия возбудителя чумы и 110-летию образования Уральской противочумной станции Уральск. – 2024. - С. 72-81.

8. Георгиу Х., В.В. Белименко, Бабезиоз крупного рогатого скота, вызываемый Babesia bovis // Российский ветеринарный журнал. Сельскохозяйственные животные 2015, №2, С. 32-33.)

9. Ляпунов А.В., Хасанатинов МС.А., Манзарова Н.А., Болотова Н.А., Данчинова Г.А. Прирменение метода ПЦР в реальном времени длч диагностики инфекций, передающихся иксодовыми клещами // Бюллетень Восточно-Сибирского научного центра СО РАМН, 2016, том 1, № 6 (112), С. 161-165.

10. Беклемишев, В. Н. Термины и понятия, необходимые при количественном изучении популяций эктопаразитов и нидиколов / В. Н. Беклемишев // Русский орнитологический журнал 2009. - том 18, Экспресс-выпуск 509. – С 1527-1540.

11. Dantas-Torres, F. Efficiency of flagging and dragging for tick collection / F. Dantas-Torres, R. Paolo Lia, G. Capelli, D. Otranto // Exp Appl Acarol, 2013. Vol. 61. P. 119-127.

12. Беспятова Л.А., Бугмырин С.В. Иксодовые клещи Карелии (распространение, экология, клещевые инфекции) Учебно-методическое пособие. Петрозаводск 2012 с. 87.

13. Методы сбора, хранения и определения кровососущих насекомых и клещей: учебное пособие // Ф. И. Василевич, С. Ю. Пигина, А. М. Никанорова, Р. М. Акбаев. М., 2023. — 296 с.

14. Kuotsu N, Kuotsu K, Ozukum S, Ralte L, Jayathangaraj MG, Das G and Vijayashanthi R, 2022. Thelaziasis and theileriosis in a cow – A clinical report from Nagaland, India. Indian Veterinary Journal 99: 45-47.

15. Medjkane S and Weitzman JB, 2020. Intracellular Theileria parasites pin down host metabolism. Frontiers in Cell and Developmental Biology 8: Article # 134. https://doi.org/ 10.3389/fcell.2020.00134

16. Jaja IF, Mushonga B, Green E and Muchenje V, 2017. Financial loss estimation of bovine fasciolosis in Slaughtered Cattle in South Africa. Parasite Epidemiology and Control 2: 27-34. https://doi.org/10.1016/j.parepi.2017.10.001

17. Olsen A, Berg R, Tagel M, Must K, Deksne G, Enemark HL,Alban L, Johansen MV, Nielsen HV, Sandberg M, LundenA, Stensvold CR, Pires SM and Jokelainen P, 2019.Seroprevalence of toxoplasma gondii in domestic pigs,sheep, cattle, wild boars, and moose in the Nordic-BalticRegion: A systematic review and meta-analysis. ParasiteEpidemiology and Control 5: Article # e00100.https://doi.org/10.1016/j.parepi.2019.e00100

18. Hayati MA, Hassan SM, Ahmed SK and Salih DA, 2020. Prevalence of ticks (Acari: Ixodidae) and Theileria annulatainfection of cattle in Gezira State, Sudan. Parasite Epidemiology and Control 10: Article # e00148. https://doi.org/10.1016/j.parepi.2020.e00148

19. Rana G, 2018. Inhibition efficiency of a newly isolated flavonoid compound from Vitex negundo L. leaves against cattle-endosymbiont Setaria cervi: Phytomedicine for lymphatic filariasis. Parasite Epidemiology and Control 3: 88-95. https://doi.org/10.1016/j.parepi.2018.03.002

20. Танитовский В.А., Майканов Н.С. Фауна иксодовых клещей Западного Казахстана и особенности их распределения по территории // Вестник ЗКГУ,г.Уральск. – 2018. - № 2 (70) – С. 294-305.

21. Майканов Н.С. Эпидемиологическое значение иксодовых клещей Казахстана // Материалы Международ. конф. «Животный мир Казахстана и сопредельных территорий». – Алматы, 2012. – С. 134 -135.).

22. Саякова З.З., Абдыбекова А.М.и др. Клещи рода ixodes latreille, 1795 (ixodidae, ixodinae) в Кызылординской области // Journal of Biological Research 2024.- № 1 (4), pp. 15-25.

23. (Sarsenova, B.B., Zholdasbaeva, T.K. Znachenie i biojekologicheskoe izuchenie pastbishhnyh kleshhej v suhoj stepi Zapadno-Kazahstanskoj oblasti (Meaning and bioecological study of pasture ticks in the dry steppe of Zapadno-Kazakhstan region) // Polish Journal of Science. – 2022. – No 50(50). – S. 9-13. https://doi.org/10.5281/zenodo.6557403).

REFERENCES

1. 1 Blagoveshchensky, D. I. Materials on the fauna of external parasites of animals of Kazalinsky and some other regions of Southern Kazakhstan / D. I. Blagoveshchensky // Proceedings of KazFAN. Issue – 1937. - No. 2. – pp. 11-84.

2. Kozhabaev M.K., Amanzhol R., Tuleukhanov A. Distribution of ixodid ticks in the South of Kazakhstan // Theory and practice of combating parasitic diseases 2024 No. 25 pp. 242-244.

3. Taurbayeva S. N., Tokpan S. S., Shevtsov A. B., Leader L. A. Bovine taileriosis: distribution and diagnosis in the Kyzylorda region // Bulletin of Science of the Kazakh Agrotechnical University named after S. Seifullin (interdisciplinary). - 2017. - №4 (95). - Pp.73-78.

4. Taurbayeva S.N., Leader L.A. The extent of the spread of bovine teileriosis in Southern Kazakhstan // Materials of the Republican scientific and theoretical conference "Seifullin readings – 13: preserving traditions, creating the future", dedicated to the 60th anniversary of the Kazakh Agrotechnical University named after S. Seifullin. - 2017. - Vol.I, Part 2. - pp.241-244.

5. Sabanshiev, M. S. Blood–sucking mites – carriers of pyroplasmidosis in the south of Kazakhstan. / M. S. Sabanshiev, M. Zh. Suleimenov, T. T. Suleimenov // Bulletin of the Kyrgyz Scientific Research Institute of Animal Husbandry, Veterinary Medicine and Pastures named after Arstanbek Duisheev. - 2007. – No. 1 – pp. 328-329.

6. Karmaliev R.S., Sidikhov B.M., Usenov Zh.T., Nurzhanova F.H., Maikanov N.S., Arisov M.V., Sengaliev E.M. Ixodids of cattle in the West Kazakhstan region, species composition and distribution // "Science and Education" Scientific and Practical Journal of the West Kazakhstan Agrarian-Zhangir Khan Uralsk Technical University. 2024. Vol. 1. No. 3-1 (76), pp. 41-55.

7. Tanitovsky, V. A. Fauna and distribution of ixodes ticks in the West Kazakhstan region / Tanitovsky V. A., Maikanov N. S. // Proceedings of the interregional scientific and practical conference "Epidemiological surveillance of natural focal infections. Ecology of carriers and vectors. Biosafety", dedicated to the 130th anniversary of the discovery of the plague pathogen and the 110th anniversary of the formation of the Ural anti-plague station Uralsk. – 2024. - pp. 72-81.

8. Georgiu Kh., V.V. Belimenko, Babesiosis of cattle caused by Babesia bovis // Russian Veterinary Journal. Agricultural animals 2015, No. 2, pp. 32-33.)

9. Lyapunov A.V., Khasanatinov M.A., Manzarova N.A., Bolotova N.A., Danchinova G.A. Application of the real-time PCR method for the long-term diagnosis of infections transmitted by ixodes ticks // Bulletin of the East Siberian Scientific Center with Russian Academy of Medical Sciences, 2016, volume 1, No. 6 (112), pp. 161-165.

10. Beklemishev, V. N. Terms and concepts necessary for the quantitative study of ectoparasite and nidicole populations / V. N. Beklemishev // Russian Ornithological Journal 2009. - volume 18, Express issue 509. - From 1527-1540.

11. Dantas–Torres, F. Efficiency of flagging and dragging for tick collection / F. Dantas-Torres, R. Paolo Lia, G. Capelli, D. Otranto // Exp Appl Acarol, 2013. Vol. 61. P. 119-127.

12. Bespyatova L.A., Bugmyrin S.V. Ixodic ticks of Karelia (distribution, ecology, tick-borne infections) Educational and methodical manual. Petrozavodsk, 2012, p. 87.

13. Methods of collecting, storing and determining blood-sucking insects and ticks: a textbook // F. I. Vasilevich, S. Y. Pigina, A.M. Nikanorova, R. M. Akbaev. M., 2023. — 296 p

14. Kuotsu N, Kuotsu K, Ozukum S, Ralte L, Jayathangaraj MG, Das G and Vijayashanthi R, 2022. Thelaziasis and theileriosis in a cow – A clinical report from Nagaland, India. Indian Veterinary Journal 99: 45-47.

15. Medjkane S and Weitzman JB, 2020. Intracellular Theileria parasites pin down host metabolism. Frontiers in Cell and Developmental Biology 8: Article # 134. https://doi.org/ 10.3389/fcell.2020.00134

16. Jaja IF, Mushonga B, Green E and Muchenje V, 2017. Financial loss estimation of bovine fasciolosis in Slaughtered Cattle in South Africa. Parasite Epidemiology and Control 2: 27-34. https://doi.org/10.1016/j.parepi.2017.10.001

17. Olsen A, Berg R, Tagel M, Must K, Deksne G, Enemark HL,Alban L, Johansen MV, Nielsen HV, Sandberg M, LundenA, Stensvold CR, Pires SM and Jokelainen P, 2019.Seroprevalence of toxoplasma gondii in domestic pigs,sheep, cattle, wild boars, and moose in the Nordic-BalticRegion: A systematic review and meta-analysis. ParasiteEpidemiology and Control 5: Article # e00100.https://doi.org/10.1016/j.parepi.2019.e00100

18. Hayati MA, Hassan SM, Ahmed SK and Salih DA, 2020. Prevalence of ticks (Acari: Ixodidae) and Theileria annulatainfection of cattle in Gezira State, Sudan. Parasite Epidemiology and Control 10: Article # e00148. https://doi.org/10.1016/j.parepi.2020.e00148

19. Rana G, 2018. Inhibition efficiency of a newly isolated flavonoid compound from Vitex negundo L. leaves against cattle-endosymbiont Setaria cervi: Phytomedicine for lymphatic filariasis. Parasite Epidemiology and Control 3: 88-95. https://doi.org/10.1016/j.parepi.2018.03.002

20. Tanitovskiy V.A., Maikanov N.S. Fauna of ixodid ticks of Western Kazakhstan and features of their distribution over the territory // Bulletin of the Central State University, Uralsk. – 2018. - № 2 (70) – Pp. 294-305.

21. Maikanov N.S. The epidemiological significance of ixodes ticks in Kazakhstan // Proceedings of the International Conference "Wildlife of Kazakhstan and adjacent territories". – Almaty, 2012. – pp. 134-135.).

22. Sayakova Z.Z., Abdybekova A.M. et al. Ticks of the genus ixodes latreille, 1795 (ixodidae, ixodinae) in the Kyzylorda region // Journal of Biological Research 2024.- No. 1 (4), pp. 15-25.

23. Sarsenova, B.B., Zholdasbaeva, T.K. Znachenie i biojekologicheskoe izuchenie pastbishhnyh kleshhej v suhoj stepi Zapadno-Kazahstanskoj oblasti (Meaning and bioecological study of pasture ticks in the dry steppe of Zapadno-Kazakhstan region) // Polish Journal of Science. – 2022. – No 50(50). – S. 9-13. https://doi.org/10.5281/zenodo.6557403).

ТҮЙІН

Пироплазмидоздар - бұл пигментсіз эндоглобулярлы қан паразиттері тудыратын міндетті векторлық аурулар. Олар үй жануарлары мен жабайы табиғаттың кең ауқымына, әсіресе ірі қара мен ұсақ малға әсер етеді. Қазақстанда ірі қара малдың пироплазмидозы бойынша эпизоотиялық жағдай қолайсыз күйінде қалып отыр, бұл мал шаруашылығы саласында айтарлықтай экономикалық шығындарға алып келеді. Бұл инфекциялардың ең көп таралуы елдің батыс аймақтарында байқалады.

Зерттеудің мақсаты Қазақстанның батыс өңірлеріндегі ірі қара малдың пироплазмидоздары мен иксодидоздары бойынша эпизоотиялық жағдайды жан-жақты талдау болып табылады. Жұмыс шеңберінде сырқаттанушылық динамикасын, таралу факторларын зерделеу және заманауи диагностикалық әдістерді пайдалана отырып, қоздырғыштарды анықтау жүргізіледі.

Зерттеу 2024 жылы Батыс Қазақстан аумағында жүргізілді. Ірі қара малдың пироплазмидозбен инвазиялану деңгейін бағалау үшін 507 қан сынамасы алынды, сонымен қатар жануарлардан да, өсімдіктерден де 581 иксод кенелері жиналды. Кенелерді анықтау тұқым мен түрге дейін жүргізілді.

Жұмыс аясында иксод кенелерінің пайда болу индексі (тал, %), молшылық индексі (ИИ, дана), сондай-ақ ірі қара малдың маусымдық және жасына байланысты жұқтыру динамикасы талданды. Қан паразиттік инфекциялардың диагностикасы ДНҚ-ны анықтауға арналған арнайы праймерлерді қолдана отырып, ПТР әдісімен жүргізілді *Theileria annulata, Theileria sergenti, Theileria orientalis* және *Babesia bovis.*

УДК 619:616-036.5:57.084.1
МРНТИ 68.41.37; 68.41.05

Kadralieva B.T., PhD, https://orcid.org/0000-0002-5161-5561
NJSC «West Kazakhstan Agrarian and Technical University named after Zhangir khan», Uralsk, st. Zhangir khan 51, 090009, Kazakhstan, bkadralieva@mail.ru
Nametov A.M, Doctor of Veterinary Sciences, Professor, https://orcid.org/0000-0002-8113-1912
NJSC «West Kazakhstan Agrarian and Technical University named after Zhangir khan», Uralsk, st. Zhangir khan 51, 090009, Kazakhstan, anametov@mail.ru
Murzabaev K.E., Candidate of Veterinary Sciences, https://orcid.org/0000-0002-8827-6444
NJSC «West Kazakhstan Agrarian and Technical University named after Zhangir khan», Uralsk, st. Zhangir khan 51, 090009, Kazakhstan, murzabaev.k@mail.ru
Dushaeva L. Zh., PhD, Acting Associate Professor, https://orcid.org/0000-0002-7564-2089,
NJSC «West Kazakhstan Agrarian and Technical University named after Zhangir khan», Uralsk, st. Zhangir khan 51, 090009, Kazakhstan, uralsk-laura@mail.ru
Karagulov A. I., PhD, https://orcid.org/0000-0002-2443-5004
NJSC «West Kazakhstan Agrarian and Technical University named after Zhangir khan», Uralsk, st. Zhangir khan 51, 090009, Kazakhstan, adilbaj79@mail.ru
Orynkhanov K.A., Candidate of Veterinary Sciences, Associate Professor, https://orcid.org/0000-0001-6736-0498
Kazakh National Agrarian Research University, Republic of Kazakhstan, Almaty region, Almaty, Abai Avenue, 8, 050010, k_orynkhanov@mail.ru
Marat M.B., Master of Veterinary Sciences, https://orcid.org/0000-0002-2844-5517
NJSC «West Kazakhstan Agrarian and Technical University named after Zhangir khan», Uralsk, st. Zhangir khan 51, 090009, Kazakhstan, magzhan.marat98@mail.ru

ANTISEPTICS OF NATURAL, NON-CHEMICAL ORIGIN, THEIR TOXICOLOGICAL AND ALLERGIC EFFECTS ON THE BODY OF LABORATORY ANIMALS

ANNOTATION

In modern practical disinfectology, It is argued that ideal chemical agents, high disinfecting activity, and some other properties should be characterized by ecological safety, minimum toxicity and environmental safety. Environmental protection minimizes toxic effects on humans and animals, ease of utilization of spent solution. Antiseptics of natural, non-chemical origin are of great importance to solve this. Origin Spilled neutral concentrated anolyte (ANK), Ozone (O3), Shungite carbon and Propolis. These antiseptics of natural origin are environmentally friendly and have bactericidal and fungicidal action. They can be used for disinfection and disinfection of objects in medical and veterinary facilities. Our research aimed to determine the toxicological and allergic properties of anolyte, ozone, shungite, propolis, and their complexes shungite+ozone+anolite. "Shozan", propolis+ozone+anolite "Prozan", and shungite+propolis+ozone+anolite "Shuprozan" on laboratory animals. 1. According to the research results, antiseptics of natural origin and their complexes at single intraperitoneal injection at a dose of 1 ml do not have a toxic effect on laboratory mice. Laboratory mice Do not have an allergic effect on the cornea and conjunctival mucosa of the eye. Skin-resorptive reactions do not have an allergic effect on the skin. Essential antiseptics ethanol in a solution of 20% and hydrogen peroxide in a solution concentration of 1% have a toxic effect at a single intraperitoneal injection at a dose of 1 ml on laboratory mice and cause their death. It has an allergic effect on the cornea and mucosa conjunctiva of the eye, determining the skin-resorptive reaction has an allergic effect on the skin of rabbits.

Keywords: ANK anolyte, ozone (O_3), shungite carbon, propolis, ethanol, hydrogen peroxide toxicological and allergic properties.

Introduction. In the modern era of rapid industrial and agricultural development, one of the most pressing technical, ecological-biological, eco-toxicological, and social issues is environmental pollution. This includes contamination of soil, air, natural water bodies, rivers, seas, and oceans with chemicals, heavy metals, toxic gases, and pathogenic microorganisms resulting from the activities of large state-owned agricultural enterprises.

Modern disinfection science asserts that ideal chemical agents should not only possess high disinfecting activity and certain other properties but also ensure environmental safety, minimal toxicity to humans and animals, and ease of disposal of spent solutions.

To address this issue, antiseptics of natural, non-chemical origin play a crucial role.

In 1987, V.M. Bakhir discovered electrochemically activated (ECA) liquids, including water, which present an alternative to widely used disinfectants of both domestic and foreign production. The production of electrochemically activated solutions at various concentrations in STEL units is based on the electrochemical activation of a low-concentration aqueous solution of table salt. This process occurs in flow-through electrochemical modules under the influence of a high-voltage electric field for a specific duration. The synthesized ECA solutions—anolyte and catholyte—exhibit pronounced oxidative and reductive properties. Additionally, a neutral anolyte (ANK) is produced, a novel solution with unique biocidal properties, combining cleaning, disinfecting, and sterilizing effects [1].

Solutions obtained from STEL units effectively eliminate bacterial and fungal pathogens such as *Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli*, hepatitis B and poliovirus, HIV, adenoviruses, tuberculosis, salmonellosis, and dermatomycosis, among others. Studies have demonstrated that ECA solutions significantly outperform well-known disinfectants like chloramine and sodium hypochlorite in terms of effectiveness [2-4].

A key advantage of electrochemically activated solutions as highly effective disinfectants is their environmental safety. These solutions spontaneously degrade without forming toxic chemical compounds, making them harmless to the environment [3-5]. STEL units, with varying production capacities (from 20 to 100 L/h), produce three types of solutions: alkaline catholyte (a cleaning agent), acidic anolyte (a disinfectant), and neutral anolyte ANK (a combined cleaning-disinfecting agent). Research indicates that anolytes with specific physicochemical properties exhibit bactericidal, sporicidal, and virucidal effects. For example, ANK anolyte with a pH of 8 and an active chlorine concentration of 0.03–0.095% inactivates *E. coli, Staphylococcus aureus, P. aeruginosa*, and others in bacterial suspensions (in vitro) within 5–10 minutes and on surfaces (wood, metal, glass) within 1.5–2.5 hours.

When selecting disinfection methods for industrial premises, livestock, and poultry, social effects are equally important. ANK neutral anolyte is entirely safe for personnel, animals, and the environment. It spontaneously decomposes after disinfection without forming toxic compounds and does not require neutralization. The effectiveness of electrochemically activated solutions in medical and veterinary disinfection has been confirmed in numerous scientific studies [6-8].

Ozone (O_3), which readily releases an oxygen atom, is a powerful oxidant. Many oxidation reactions that require high temperatures with oxygen proceed at normal temperatures with ozone. The formation of ozone from oxygen is an endothermic reaction, requiring 33,000 kcal per molecule, making high energy costs a limiting factor for widespread ozone application. At 15°C and atmospheric pressure, ozone's solubility in water is 50% by volume. Ozonated water, like gaseous ozone (O_3), serves as a potent oxidant used for disinfecting and preserving food products and raw materials, preventing spoilage and extending shelf life [9].

Ozone (O_3), an allotropic triatomic modification of oxygen, functions as a gaseous chemical agent capable of oxidizing various organic and inorganic compounds. Due to constant molecular rearrangement, ozone naturally decomposes into oxygen, preventing accumulation unless continuously generated [10]. Since ozone reverts to oxygen without leaving harmful residues, it is increasingly considered for sterilization purposes [11]. Ozone’s properties allow it to be used alongside conventional disinfectants to minimize side effects. Gaseous ozone is moderately

soluble in water, with its stability depending on factors such as partial pressure, temperature, purity, pH, and hydrodynamic conditions [12]. In water, ozone is even less stable and quickly decomposes into oxygen. While the half-life of gaseous ozone at 20°C is approximately three days, in distilled water at the same temperature, it decomposes by 50% within 20 minutes. During practical applications, it is crucial to maintain ozone concentrations at the lowest effective levels to minimize health risks to personnel and reduce corrosion [13].

Shungite consists of 30% carbon, 45% quartz, and about 20% silicate mica. Shungite carbon is a fossilized fullerene-containing substance derived from organic sedimentary deposits with a high degree of carbonization. Fullerene content varies from 0.0001% to 0.001%. The unique molecular structure of shungite explains its diverse medicinal properties and widespread use in folk medicine. Shungite's beneficial properties stem from the unusual structure of its carbon molecules. Before the discovery of fullerenes in shungite, only three crystalline carbon modifications were known—diamond, carbyne, and graphite. However, research revealed a fourth form—fullerene, a hollow, spherical molecular compound composed of 60–70 carbon atoms. The presence of fullerenes and the unique structure of the carbon matrix distinguish shungite and contribute to its remarkable physical, chemical, and medicinal properties [14].

Shungite, with its rich mineral composition and pronounced sorption, bactericidal, and catalytic properties, has long been used in drinking water purification and activation systems. Shungite-infused water, a molecular-colloidal solution of hydrated fullerenes, has demonstrated anti-inflammatory, bactericidal, antiseptic, analgesic, anti-allergenic, and immunostimulating effects on the human body [15].

Shungite is a natural composite with an amorphous microporous quartz framework filled with highly dispersed (approximately 1 μm) aluminosilicate minerals. Its average composition includes 70% carbon and 30% ash, with 40–50% silicon oxide, 12–25% aluminum oxide, and other trace elements. Shungite's density is 2.1–2.4 g/cm³, with a porosity of up to 5%, compressive strength of 100–120 MPa, electrical conductivity of 1500 S/m, and thermal conductivity of 3.8 W/mK. Its unique properties, including chemical resistance, high density, strength, heat capacity, electrical conductivity, and ability to shield high-frequency electromagnetic radiation, make it a valuable material [16].

The effect of shungite on immune status, hematological, and biochemical parameters in animals was studied in 30 calves and 40 piglets over 60 days using shungite from the Zazhoginsky deposit. Its effectiveness was evaluated based on clinical, hematological, and biochemical indicators, considering overall body mass. By the end of the study, experimental calves showed a 23.2% increase in red blood cells, a 20.45% increase in hemoglobin, and a 35.5% decrease in white blood cells compared to the control group. Total protein levels were 2.18% higher, phagocytic activity increased by 22.6%, phagocytic index by 30%, phagocytic number by 8.7%, and lysozyme activity by 28.9%. Bactericidal activity decreased by 14.5% in the control group but increased by 10.1% in the experimental group [17].

Propolis, derived from the Greek words pro (before) and polis (city), is used by bees to seal hive surfaces, cracks, and as a nutritional reserve. It is a resinous substance collected from plant surfaces and enriched with nectar, pollen, and bee enzymes. Its color varies from dark green to brown depending on local flora.

Propolis exhibits antibacterial and immunomodulatory properties, utilized in both medicine and veterinary science for disease prevention in poultry [21].

Our study developed and tested an anolyte-ozone complex, "Ozan," with antiseptic properties [22]. However, assessing potential side effects of these substances and their combinations on living organisms remains essential.

The aim of our research was to determine the toxicological and allergenic properties of anolyte, ozone, shungite, propolis, and their complexes (shungite + ozone + anolyte, propolis + ozone + anolyte, and shungite + propolis + ozone + anolyte) in laboratory animals.

Materials and Methods. This study was conducted as part of the grant-funded scientific research project AP19679451 (2023-2025) titled "Development of an Environmentally Safe

Antiseptic Preparation Based on Natural Substances and Compounds for Use in Veterinary Medicine and Human Medicine."

Neutral Anolyte (ANK). Neutral anolyte ANK was produced using the STEL-10N-120-01 mod.120 IIP device through electrochemical treatment of a sodium chloride solution with a concentration of 0.9 g/L in distilled water. The resulting liquid was a colorless, transparent solution with a chlorine odor, containing highly active chlorine-oxygen compounds. The primary active substances in this metastable solution were chlorinated oxygen and hydroperoxide oxidants. The total dissolved substances in ANK anolyte, at an oxidant concentration of 500 mg/L, did not exceed 5.0 g/L. The ANK anolyte was stored at room temperature in a tightly sealed glass bottle, protected from direct sunlight. It was used without prior preparation or dilution.

Aqueous Ozone. Aqueous ozone was produced using a DICHO apparatus (model TQ-Z08) by placing the device's nozzle in a container with distilled water for 10–20 minutes. This process resulted in an ozonated solution with a saturation concentration of 1.5 mg/L.

Shungite Infusion. For the preparation of shungite infusion, a 0.5 kg sample was washed multiple times with tap water. The shungite was then placed in a sterile five-liter glass bottle and filled with distilled water. The bottle was tightly sealed with a plastic cap and left to infuse at room temperature for three days. The resulting infusion was stored in the laboratory at room temperature in a tightly sealed glass bottle, protected from direct sunlight, and used without prior preparation or dilution.

Propolis Infusion. A 50 g sample of propolis was frozen in a household freezer and then grated. The grated propolis was added to 500 mL of distilled water and infused in a water bath for one hour, yielding a 10% propolis infusion. The infusion was cooled to room temperature, filtered through sterile gauze, and stored in a tightly sealed glass bottle in a refrigerator at +4°C. It was used without prior preparation or dilution.

Preparation of Complex Solutions

- Shosan (Shungite + Ozone + Anolyte): Equal volumes of shungite infusion and ozonated anolyte were mixed.
- Prozan (Propolis + Ozone + Anolyte): Equal volumes of propolis infusion and ozonated anolyte were mixed.
- Shuprozan (Shungite + Propolis + Ozone + Anolyte): Equal volumes of shungite infusion, propolis infusion, and ozonated anolyte were mixed.

Toxicological Study. The toxicological properties of the natural-origin antiseptics and their complexes were evaluated in a laboratory setting at the veterinary clinic of Zhangir Khan West Kazakhstan Agrarian and Technical University. A total of 100 mature, non-pedigreed white mice weighing 20–27 g were used and divided into 10 groups of 10 animals each. The animals were housed in a vivarium under standard sanitary conditions and fed a standard diet in accordance with established norms.

- Group 1: Aqueous ozone
- Group 2: Anolyte
- Group 3: Shungite infusion
- Group 4: Propolis infusion
- Group 5: Shosan
- Group 6: Prozan
- Group 7: Shuprozan
- Group 8: 20% ethanol solution
- Group 9: 1% hydrogen peroxide solution
- Group 10: Distilled water (control, 1.0 mL)

All substances were administered intraperitoneally at a dose of 1.0 mL, following aseptic and antiseptic procedures. Clinical observations were conducted over three days, monitoring the animals' general condition, activity level, coordination, pain response, presence of tremors, seizures, paresis, paralysis, secretions (eyes, nose, urinary tract), skin color changes, weight changes, and appetite. Mice from each group were housed in separate cages. At the end of the

study, the animals were euthanized, followed by a pathological examination.

Allergic Reaction Study. To study the allergic properties of the natural-origin antiseptics and their complexes, Chinchilla rabbits were used. The animals were housed under standard vivarium conditions and fed a standard diet. Allergic properties were assessed through conjunctival application and dermal absorption tests.

For the conjunctival reaction assessment, 100 rabbits were divided into 10 groups of 10 animals each. The right eye of each rabbit received one drop of the test substance, while the left eye received one drop of distilled water as a control.

- Group 1: Aqueous ozone (right eye) / Distilled water (left eye)
- Group 2: Anolyte (right eye) / Distilled water (left eye)
- Group 3: Shungite infusion (right eye) / Distilled water (left eye)
- Group 4: Propolis infusion (right eye) / Distilled water (left eye)
- Group 5: Shosan (right eye) / Distilled water (left eye)
- Group 6: Prozan (right eye) / Distilled water (left eye)
- Group 7: Shuprozan (right eye) / Distilled water (left eye)
- Group 8: 20% ethanol solution (right eye) / Distilled water (left eye)
- Group 9: 1% hydrogen peroxide solution (right eye) / Distilled water (left eye)
- Group 10: Distilled water in both eyes (control)

Reactions of the conjunctiva and cornea, along with clinical changes, were recorded at 5 minutes, 15 minutes, 1 hour, and 3 hours post-application.

For the dermal absorption reaction assessment, 100 rabbits were divided into 10 groups of 10 animals each. The fur on both sides of the shoulder area (5 × 5 cm) was shaved, dried with sterile gauze, and the test substances were applied to the right side, while distilled water was applied to the left as a control.

- Group 1: Aqueous ozone (right) / Distilled water (left)
- Group 2: Anolyte (right) / Distilled water (left)
- Group 3: Shungite infusion (right) / Distilled water (left)
- Group 4: Propolis infusion (right) / Distilled water (left)
- Group 5: Shosan (right) / Distilled water (left)
- Group 6: Prozan (right) / Distilled water (left)
- Group 7: Shuprozan (right) / Distilled water (left)
- Group 8: 70% ethanol solution (right) / Distilled water (left)
- Group 9: 3% hydrogen peroxide solution (right) / Distilled water (left)
- Group 10: Distilled water (both sides, control)

Skin reactions and clinical changes were recorded at 30 minutes, 1 hour, 3 hours, and 4 hours post-application.

The handling and housing of the experimental animals complied with generally accepted ethical standards and regulations.

Results and Discussion. The study on the toxicological properties of natural-origin antiseptics and their complexes revealed that in groups 1–7 of white mice, which received aqueous ozone, anolyte, shungite infusion, propolis infusion, "Shozan," "Prozan," and "Shuprozan," no clinical abnormalities were observed over three days.

In groups 8 and 9, which received a 20% ethanol solution and a 1% hydrogen peroxide solution, clinical abnormalities were recorded. On the first day, immediately after administration, mice exhibited agitation followed by depression, impaired coordination, unsteady gait, and loss of appetite. Their response to pain stimuli was reduced. On the second day, tremors, seizures, paresis, and paralysis of the limbs were observed, along with cyanosis of the mucous membranes and bluish discoloration of the skin. On the third day, ocular and nasal discharge, involuntary urination, and defecation were recorded. All mice in these groups died due to respiratory muscle paralysis and cardiac arrest.

The results of the postmortem examination showed no pathological changes in the organs and tissues of white mice in groups 1–7 and 10, nor any abnormalities in their anatomical structure.

In groups 8 and 9, necropsy revealed intestinal and gastric bloating, deformation of the abdominal cavity, cyanosis of the mucous membranes, hemorrhages in the liver, gallbladder, and lungs, an overfilled bladder, and jaundice of the serous membranes. These pathological findings indicate poisoning in the affected mice, confirming the toxic properties of the 20% ethanol solution and the 1% hydrogen peroxide solution (Figure 1).

Thus, natural-origin antiseptics and their complexes, when administered intraperitoneally in a single 1 ml dose, do not exhibit toxic effects in laboratory mice.

Allergic Reaction Study. An investigation into allergic reactions of the conjunctival mucosa and cornea revealed that in groups 1–7, where rabbits received aqueous ozone, anolyte, shungite infusion, propolis infusion, "Shozan," "Prozan," and "Shuprozan" in the right conjunctival sac, no clinical abnormalities in the conjunctival and corneal reactions or overall condition of the animals were observed at 5 minutes, 15 minutes, 1 hour, and 3 hours after administration. No abnormalities were noted in the left eye, where distilled water was applied.

In groups 8 and 9, where a 20% ethanol solution and a 1% hydrogen peroxide solution were instilled into the right conjunctival sac, clinical abnormalities were observed.




Figure 1 – Results of the pathological examination of mice:
(A) Groups 1–7 and 10, (B) Groups 8 and 9.

In rabbits, within the first minute after administration, restlessness, increased respiration, and rapid heartbeat were observed. Profuse tearing and frequent eyelid blinking were noted. After 5 minutes, conjunctival hyperemia and an intensified corneal reflex were recorded. After one hour, redness and conjunctival irritation persisted, while after two hours, the irritation gradually subsided and completely disappeared after three hours.

No clinical abnormalities were observed in the left eye, where distilled water was administered.

In the control group, where animals received distilled water in both the right and left conjunctival sacs, no clinical abnormalities were observed (Figure 2).

Thus, natural-origin antiseptics and their complexes do not induce allergic reactions in the cornea or conjunctival mucosa.





Figure 2 – Results of clinical changes in the cornea and conjunctival mucosa: (A) Groups 1–7 and 10, (B) Groups 8 and 9.

When studying the dermal-resorptive reaction, it was determined that in groups 1–7, where rabbits had aqueous ozone, anolyte, shungite infusion, propolis infusion, "Shozan," "Prozan," and "Shuprozan" rubbed into the skin in the right scapular area, no clinical abnormalities in skin reaction or overall condition were observed at 30 minutes, one hour, three hours, and four hours after application. No clinical deviations were noted in the left scapular area, where distilled water was applied.

In groups 8 and 9, where 70% ethanol solution and 3% hydrogen peroxide solution were applied to the right scapular area, respectively, clinical deviations were observed. Within the first 30 minutes after application, rabbits exhibited skin irritation, hyperemia, and increased tactile sensitivity. Their general condition was agitated and restless. After one hour, skin irritation and hyperemia began to subside, and by the third to fourth hour, they had completely disappeared, with the animals calming down. No clinical deviations were noted in the left scapular area, where distilled water was applied.

In group 10 (control), where distilled water was applied to both sides, no clinical abnormalities were observed (Figure 3).

Thus, when assessing dermal-resorptive reactions, natural antiseptics and their complexes do not exhibit allergic effects on the skin.



А Б

Figure 3 – Results of clinical skin changes in groups 1–7 and 10 (A), in groups 8 and 9 (B).

Conclusions

1. Based on the research results, natural-origin antiseptics and their complexes do not exhibit toxic effects on laboratory mice when administered intraperitoneally in a single dose of 1 ml.

2. Natural-origin antiseptics and their complexes do not cause allergic reactions on the cornea and conjunctival mucosa of the eye.

3. Natural-origin antiseptics and their complexes do not cause allergic reactions on the skin when assessing dermal-resorptive reactions.

4. The basic antiseptics, ethanol at a 20% solution concentration and hydrogen peroxide at a 1% solution concentration, exhibit toxic effects on laboratory mice when administered intraperitoneally in a single dose of 1 ml, leading to their death.

5. The basic antiseptics, ethanol at a 20% solution concentration and hydrogen peroxide at a 1% solution concentration, cause allergic reactions on the cornea and conjunctival mucosa of rabbits' eyes.

6. The basic antiseptics, ethanol at a 70% solution concentration and hydrogen peroxide at a 3% solution concentration, cause allergic reactions on the skin of rabbits when assessing dermal-resorptive reactions.

Acknowledgements. This work was carried out within the framework of the Grant Funding Project for 2024-2026, KN MNVOK RK AP23487588. The project topic is: "Improvement of the prevention of bovine babesiosis transmitted by Ixodid ticks in the steppe, semi-desert, and desert zones of the West Kazakhstan region."

REFERENCES

1. Aliev A. A., Shapiev B. I. Shapieva K. B. i dr. Baktericidnaja jeffektivnost' nejtral'nogo anolita v sochetanii s margancovokislym kaliem. // Jekologicheskaja medicina 2018, № 1, S. 81-86.

2. Vanner A. A., Zakomyrdin A. A. Vlazhnaja dezinfekcija poverhnostej pomeshhenij anolitom ANK. // Tretij mezhdunarodnyj simpozium. «Jelektrohimicheskaja aktivacija v medicine, sel'skom hozjajstve, promyshlennosti». Moskva, 28-29 oktjabrja 001 g. Doklady i kratkie soobshhenija. Moskva: VNIIIMT, 2001.

3. Bahir V. M. Mediko-tehnicheskie sistemy i tehnologii dlja sinteza jelektrohimicheski aktivirovannyh rastvorov. M.: VNIIIMT, 1998.

4. Bahir V. M. Jelektrohimicheskaja aktivacija i tehnicheskie jelektrohimicheskie sistemy na osnove protochnyh jelektrohimicheskih modul'nyh jelementov PJeM. Jelektrohimicheskaja aktivacija. // Tezisy dokladov i kratkie soobshhenija. M., 1998.

5. Bujanov V. V., Nikol'skaja V. P., Kanishhev V. V. i dr. Sredstva dezinfekcii dlja likvidacii posledstvij biologicheskogo zarazhenija pri razlichnyh temperaturah okruzhajushhej sredy. // Chernogolovka: Redakcionno-izdatel'skij otdel IPHF. RAN. 2003, 277 s.

6. Kavruk E. A. Ziborova Z. A. Jeffektivnost' primenenija nejtral'nogo anolita pri smetannoj kishechnoj infekcii novorozhdennyh teljat. // Tretij mezhdunarodnyj simpozium. «Jelektrohimicheskaja aktivacija v medicine, sel'skom hozjajstve, promyshlennosti». Moskva, 28-29 oktjabrja 2001 g. Doklady i kratkie soobshhenija. M.: VNIIIMT, 2001.

7. Kuznecova L. S. Primenenie JeHA- rastvorov dlja profilaktiki zabolevanij i lechenija zhivotnyh. // Ministerstvo Sel'skogo hozjajstva i Prodovol'stvija Saratovskoj oblasti Associacija “Agrarnoe obrazovanie i nauka” GU NII sel'skoj gigieny MZ RF OOO “Burservis”. Saratov, 2003. 5 s.

8. Prokopenko A.A., Vanner N.Je., Filipenkova G.V. Izuchenie baktericidnoj i dezinficirujushhej aktivnosti novogo jekologicheski bezopasnogo preparata anolit ANK super. Rossijskij zhurnal «Problemy veterinarnoj sanitarii, gigieny i jekologii» № 3(31), 2019, S. 286 – 293.

9. Burak L.Ch. Ispol'zovanie tehnologii ozonirovanija v pishhevoj promyshlennosti. Sciences of Europe, 2022, № 98, S. 85-100.

10. Bahchevnikov O. N., Braginec A. V. Primenenie ozona dlja obezzarazhivanija kormovogo syr'ja (obzor) // Tavricheskij vestnik agrarnoj nauki. 2021.T.2(26). S.41-61.

11. Burak L. Ch., Sapach A.N. Ozonovaja tehnologija kak sposob sohranenija pishhevyh produktov. //The Scientific Heritage. 2022. V. 86–1(86). R. 21-33.

12. Hromushin V.A., Chestnova T.V., Platonov V.V., Hadarcev A.A., Kireev S.S. Shungity, kak prirodnaja nanotehnologija (obzor literatury) // Vestnik novyh medicinskih tehnologij.

Jelektronnoe izdanie. 2014. №1, S.3-11.

13.Barashkova I.I., Komova N.N., Motjakin M.V., Potapov E.Je., Vasserman A.M. Mezhfaznye sloi na granice shungit–jelastomer // Doklady akademii nauk. 2014. T. 456. № 4. S. 437–439.

14.Golubev E.A. Jelektrofizicheskie svojstva i strukturnye osobennosti shungita (prirodnogo nanostrukturirovannogo ugleroda) // Fizika tverdogo tela. 2013. T.55. №5. S. 995–1002.

15.Tremasova A.M., Beleckij S.O. O primenenii shungita v zhivotnovodstve // Dostizhenija nauki i tehniki APK. 2012. №3. S. 72–74.

16.Karomatov I. D. Antibakterial'nye i protivovospalitel'nye svojstva propolisa // Jelektronnyj nauchnyj zhurnal «Biologija i integrativnaja medicina» 2018, №2 (19) S. 313-325.

17.Kivalkina VP. Propolis, ego antimikrobnye i lechebnye svojstva: avtoref. dis. … d-ra biol. nauk. Kazan'; 1964.

18.Gunar O.V., Sahno N.G., Grigor'eva V.Je., Bulgakova G.M. Analiz antimikrobnoj aktivnosti preparatov propolisa pri provedenii jekspertizy kachestva lekarstvennyh sredstv // Ezhekvartal'nyj recenziruemyj nauchno-prakticheskij zhurnal Vedomosti Nauchnogo centra jekspertizy sredstv medicinskogo primenenija. 2015. № 2, S. 17-19.

19.Saidova L. B., Karomatov I. D., Rahmatova D. B. Propolis v medicine (primenenie propolisa v narodnoj i nauchnoj medicine). – Warsaw: RS Global Sp. z O. O., 2021. 109 s.

20.Dushaeva L. Zh., Marat M. B., Murzabaev K. E., Ishhanova A. S., Ertleuova B.O., Sabyrzhanov A. U., Nametov A. M. Kejbir dəstүrli dezinfekcijalyқ zattar men tabiғi қosylystardan alynғan өnimderdің bakterijaғa қarsy қasietterinің tiimdiligin jeksperimenttik negizdeu // Nauchno-prakticheskij zhurnal ZKATU im. Zhangir hana «Ғylym zhəne bilim» 2022. Tom 1. № 4 (69).S139.

ТҮЙІН

Заманауи практикалық дезинфекцияда идеалды химиялық агенттер, жоғары дезинфекциялық белсенділік және басқа да кейбір қасиеттер экологиялық қауіпсіздікпен, минималды уыттылықпен және экологиялық қауіпсіздікпен сипатталуы керек деген пікір бар. Қоршаған ортаны қорғау адам мен жануарларға уытты әсерді азайтады, жұмсалған ерітіндіні пайдаланудың қарапайымдылығын азайтады. Бұл мәселені шешу үшін табиғи, химиялық емес шыққан антисептиктердің маңызы зор. Origin Төгілген бейтарап концентрацияланған анолит (ANK), Озон (O_3), Шунгит көміртегі және Прополис. Бұл табиғи антисептиктер экологиялық таза және бактерицидтік және фунгицидтік әсерге ие. Оларды медициналық және ветеринарлық мекемелердегі объектілерді дезинфекциялау және дезинфекциялау үшін пайдалануға болады.

Біздің зерттеуіміз анолиттің, озонның, шунгиттің, прополистің және олардың шунгит+озон+анолит кешендерінің токсикологиялық және аллергиялық қасиеттерін анықтауға бағытталған. "Шозан", прополис+озон+анолит "Прозан" және шунгит+прополис+озон+анолит "Шупрозан" зертханалық жануарларда. Зерттеу нәтижелері бойынша табиғи шыққан антисептиктер және олардың кешендері 1 мл дозада бір реттік интраперитонеальді инъекция кезінде зертханалық тышқандарға уытты әсер етпейді. Зертханалық тышқандар көздің қабығына және конъюнктивалық шырышты қабығына аллергиялық әсер етпейді. Тері-резорбциялық реакциялар теріге аллергиялық әсер етпейді. Маңызды антисептиктер 20% ерітіндідегі этанол және 1% ерітіндідегі сутегі асқын тотығы зертханалық тышқандарға 1 мл дозада бір реттік интраперитонеальді инъекция кезінде уытты әсер етеді және олардың өліміне әкеледі. Көздің қабығы мен шырышты қабығының конъюнктивасына аллергиялық әсер етеді, терінің резорбциялық реакциясын анықтау қояндардың терісіне аллергиялық әсер етеді.

РЕЗЮМЕ

В современной практической дезинфектологии утверждается, что идеальные химические средства, обладающие высокой дезинфицирующей активностью и некоторыми

другими свойствами, должны характеризоваться экологической безопасностью, минимальной токсичностью и сохранностью для окружающей среды. Защита окружающей среды сводит к минимуму токсическое воздействие на человека и животных, простота утилизации отработанного раствора. Для решения этой проблемы большое значение имеют антисептики натурального, нехимического происхождения. В состав средства входят нейтральный концентрированный анолит (ANK), озон (O_3), шунгитовый уголь и прополис. Эти антисептики природного происхождения безвредны для окружающей среды и обладают бактерицидным и фунгицидным действием. Их можно использовать для дезинфекции и обеззараживания предметов в медицинских и ветеринарных учреждениях. Целью нашего исследования было определение токсикологических и аллергических свойств анолита, озона, шунгита, прополиса и их комплексов шунгит+озон+анолит. "Шозан", прополис+озон+анолит "Прозан" и шунгит+прополис+озон+анолит "Шупрозан" на лабораторных животных.

Согласно результатам исследований, антисептики природного происхождения и их комплексы при однократном внутрибрюшинном введении в дозе 1 мл не оказывают токсического действия на лабораторных мышей. Лабораторные мыши не оказывают аллергического воздействия на роговицу и слизистую оболочку конъюнктивы глаза. Кожно-резорбтивные реакции не оказывают аллергического воздействия на кожу. Эфирные антисептики этанол в концентрации 20% и перекись водорода в концентрации 1% оказывают токсическое действие при однократном внутрибрюшинном введении в дозе 1 мл на лабораторных мышей и вызывают их гибель. Оказывает аллергическое действие на роговицу и слизистую оболочку конъюнктивы глаза, определяя кожно-резорбтивную реакцию, оказывает аллергическое действие на кожу кроликов.

УДК 636.2.082:619.4
МРНТИ 68.41.35

Габдуллин Д.Е., PhD, и.о., доцента, **основной автор,** https://orcid.org/0000-0002-6523-1905
НАО «Западно-Казахстанский аграрно-технический университет имени Жангир хана», г. Уральск, ул. Жангир хана 51, 090009, Республика Казахстан, dosya_gabdullin@mail.ru
Джуланов М.Н., доктор ветеринарных наук, профессор, https://orcid.org/ 0000-0003-4471-391
НАО «Казахский национальный аграрный исследовательский университет» г.Алматы, пр. Абая 26 каб.126, 050010, Республика Казахстан, mardan_58@mail.ru
Жолдасбеков А.К., магистр ветеринарных наук, https://orcid.org/0000-0003-0060-9513
ЧВПОУ «Западно- Казахстанский инновационно-технологический университет», г. Уральск, ул. Жангир хана 51/4, Казахстан, adilzhol@mail.ru.
Джуланова Н.М., PhD, старший преподаватель, https://orcid.org/ 0000-0003-6737-5718
НАО «Казахский национальный аграрный исследовательский университет» г.Алматы, пр. Абая 26 каб.126, 050010, Республика Казахстан, nuramirayat@mail.ru

Gabdullin D., PhD, associate professor, the main author, https://orcid.org/0000-0002-6523-1905
West Kazakhstan Agricultural and Technical University named after Zhangir Khan, Zhangir Khan 51, Uralsk, Republic of Kazakhstan, dosya_gabdullin@mail.ru
Julanov M., Doctor of Veterinary Sciences, Professor, https://orcid.org/0000-0003-4471-3910
NJSC «Kazakh national agrarian research university», Almaty, Abaya Avenue., 8, 050010, Kazakhstan, mardan_58@mail.ru
Zholdasbekov A., Master of Veterinary Sciences, https://orcid.org/0000-0003-0060-9513
«West Kazakhstan Innovative-Technological University» The Republic of Kazakhstan, 090009, Uralsk, 51/4, Jangir Khan, adilzhol@mail.ru.
Julanova N., PhD, Senior lecturer, https://orcid.org/ 0000-0003-6737-5718

NJSC «Kazakh national agrarian research university», Almaty, Abaya Avenue., 8, 050010, Kazakhstan, nuramirayat@mail.ru

ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ЭНДОМЕТРИТОВ У КОРОВ
DIAGNOSIS AND TREATMENT OF ENDOMETRITIS IN COWS

Аннотация

В статье даны результаты мониторинга воспроизводительной функции коров голштино-фризской и симментальской породы в условиях ТОО «Агрофирма «АКАС» Западно-Казахстанской области, КХ «Анисан» Актюбинской области и КХ «Есбол» Актюбинской области, Района Мартук.

Даны сведения о особенности течения послеродового периода, этиология, диагностика и лечение послеродового эндометрита. Авторы указывают, что ранняя диагностика эндометритов посредством комплексного использования клинического осмотра, УЗИ и микробиологического анализа позволяет своевременно выявлять патологию в послеродовой период. Применение комплексного лечения, включающее промывание матки, антимикробную и патогенетическую терапию способствует выздоровлению коров и успешному осеменению. При этом улучшаются репродуктивные показатели животных, такие как сокращение сервис периода и индекса осеменения, что подтверждает значимость комплексного подхода в терапии эндометритов коров.

Причиной распространения указанных патологий является скудное кормление, ухудшение содержания, несоответствие помещений гигиеническим требованиям, грубое нарушение технологии эксплуатации и недостаточная гиподинамия. С целью интенсивного развития молочного скотоводства можно предотвратить вышеуказанные патологии, постоянно контролируя состояние репродуктивных органов коров и телок. Поэтому планомерное проведение акушерско-гинекологического диспансеризации способствует увеличению стада.

ANNOTATION

The article presents the results of monitoring the reproductive function of Holstein-Frisian and Simmental cows in the conditions of Agrofirma AKAS LLP in the West Kazakhstan region, Anisan farm in the Aktobe region and Esbol farm in the Aktobe region, Martuk district.

Information is given on the features of the course of the postpartum period, etiology, diagnosis and treatment of postpartum endometritis. The authors point out that early diagnosis of endometritis through the integrated use of clinical examination, ultrasound and microbiological analysis allows timely detection of pathology in the postpartum period. The use of complex treatment, including uterine lavage, antimicrobial and pathogenetic therapy, contributes to the recovery of cows and successful insemination. At the same time, the reproductive performance of animals is improved, such as a reduction in the service period and insemination index, which confirms the importance of an integrated approach to the treatment of endometritis in cows.

The reason for the spread of these pathologies is poor feeding, poor maintenance, non-compliance of premises with hygienic requirements, gross violation of operating technology and insufficient physical inactivity. In order to intensively develop dairy cattle breeding, the above pathologies can be prevented by constantly monitoring the condition of the reproductive organs of cows and heifers. Therefore, the systematic obstetric and gynecological medical examination helps to increase the herd.

Ключевые слова: *бесплодие, эндометриты, диагностика, лечение, оплодотворяемость, антимикробные средства, индекс осеменения, сервис период.*

Keywords: *infertility, endometritis, diagnosis, treatment, fertility, antimicrobial agents, insemination index, service period.*

Введение. Чтобы правильно судить и обсуждать вопросы интенсификации воспроизводства стада крупного рогатого скота надо чётко понимать физиологию репродуктивной системы коров. При этом одной из главных проблем является послеродовой период. В основном все акушерские и гинекологические патологии являются следствием нарушений инволюционных процессов послеродового периода. Поэтому изучение физиологии и патологии послеродового периода, является актуальным, позволяющий своевременно диагностировать и разработать способы терапии. Как известно послеродовой период – это период от момента отхождения последа до полного восстановления всех тех изменений, которые были свойственный при беременности. Следует отметить, что в послеродовом периоде происходят нейрогуморальные изменения во всем организме и в том числе в половой сфере.

В послеродовом периоде происходят ретракция мышц матки, жировое перерождение с последующим рассасыванием образовавшихся во время беременности дополнительных мышечных волокон. Последовые сокращения матки после отделения последа переходят в послеродовые схватки, так, если в первый день после родов маточные сокращения происходили через каждые 4-5 минуты с продолжительностью каждой волны сокращения от 80 до 120 секунд, то с четвертого по восьмой день отмечаются уже нерегулярные сокращения.

Моторика матки регулируется за счет местных, гуморальных и нервных механизмов, которые комплексно обеспечивают сократимость органа в зависимости от физиологического состояния. В послеродовом периоде происходит вазоконстрикция карункулов, при этом децидуальная часть материнской части плаценты претерпевает сухой некроз и разрушается.

Слизистая оболочка матки и значительная часть мышечных волокон подвергаются деструктивным процессам. При этом продукты распада тканей материнской и плодной части плаценты, остатки околоплодных вод, кровь скапливаются в полости матки и выделяются наружу через половую щель, так называемые лохием и к 15-и суткам прекращаются. Вследствие деструктивных изменений в матке отмечается уменьшение массы органа укорачиваются маточные связки и постепенное перемещение матки в тазовую полость.

На 18-21-е дни матка возвращается в тазовую полость и где-то на 23-24 дни размер матки соответствует размеру её до беременности. Одновременно в течении послеродового периода происходят микроанатомические изменения в половой сфере.

При патологическом течении послеродового периода у коров слизистая пробка на шейке матки не формируется.

Несмотря на многочисленные исследования ученые до сих пор не пришли к единому мнению относительно сроков физиологического завершения послеродового периода. Одни авторы утверждают, что послеродовой период завершается в течение в среднем на 24-30 дней после родов (А.П. Студенцов (1953), Неждановым А.Г. (1987), Г.Ф. Медведев (1988), другие - на 35-50-й день после отела А.К. Сеглиньш (1977), М.В. Емельянова указывают на 44-50, а А.М. Чомаева (2003) считает, что полное восстановление маточных структур отмечается лишь на 50-60 сутки после отела [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8].

У половины отелённых коров замедленному течению послеродового периода способствуют родовые и послеродовые патологии (А.Г. Нежданов, 1987). По данным Тереньтевой Н.Ю. (2004), у 45,5% высокопродуктивных коров после родов отмечается патологии (субинволюция матки - 36,4% случаев, острый послеродовой эндометрит – в 9,1% случаев) [9, 10].

Для лечения коров и телок, больных гнойно-катаральным эндометритом, применялись протоколы лечения. Проводилось сравнительное исследование эффективности различных схем лечения гнойно-катарального эндометрита с применением комплекса антибактериальных, сокращающих и внутриматочных препаратов. В ходе

ректального и ультразвукового обследования половых органов коров оценивалась эффективность схем лечения с использованием препаратов «Айнил», «Цефтимаг», «Эндометромаг-Грин», «Ветом 1.1» и «Витамин Е» в сравнении с традиционной схемой, применяемой в хозяйствах области. На основе проведённых исследований, схема лечения, предложенная авторами, признана эффективной в лечении эндометрита у коров [11, 12, 13, 14, 15].

Считаем, что причинами расхождений указанных сроков продолжительности послеродового периода явилось применение различных методов исследований, оценка разных критериев степени завершенности инволюционных процессов в матке.

В послеродовом периоде в полости матки создаются определённые условия для развития патологического процесса, что является угрозой развития эндометрита. Для диагностики эндометрита разработаны различные тест системы, приборы и оборудования (УЗИ, Эндоскопы, Ph-метры и мн. другое). Также разработаны множество схем лечения данной патологии. Исходя из вышеизложенного, целью нашей работы было провести мониторинговые исследования распространённости послеродовых эндометритов у коров и разработать схемы лечения с учётом этиологии и патогенеза течения послеродовых эндометритов.

Материал и методы исследований. Исследования проведены в 2021-2022 гг. в ТОО «Агрофирма «АКАС» Западно-Казахстанской области, КХ «Анисан» и КХ «Есбол» Актюбинской области. Объектами исследований явились коровы голштино-фризской и симментальской пород.

Для диагностики эндометритов применялись следующие методы: клинический осмотр и ректальная пальпация. Оценивался тонус, размеры и положение матки; ультразвуковое исследование, использовались УЗИ-сканер DRAMINSKI 4 VETSLIM и прибор Alpha vision для визуализации внутренних структур, микробиологический анализ.

Лечебная схема при эндометрите включала: промывание матки с использованием Эндометрамаг - Био для удаления продуктов распада тканей и снижения бактериальной нагрузки, в том числе для стимуляции регенерации тканей, нормализации тонуса матки и улучшения кровоснабжения репродуктивных органов. Применение препаратов широкого спектра действия Айнил и Цефтимаг.

Эффективность лечения оценивалась по следующим показателям: индекс осеменения: отношение числа коров, у которых после искусственного осеменения подтвердили беременность, к общему числу осемененных; сервис период: время от завершения курса лечения до наступления беременности; статус животных: «выздоровело и осеменено», количество стельных коров и доля животных, оставшихся бесплодными.

Результаты собственных исследований. Всего акушерско-гинекологической диспансеризации были подвергнуты 445 голов коров, результаты этих исследований представлены в таблице 1.

Как видно из представленной таблицы во всех хозяйствах были выявлены коровы с нормальным состоянием полового аппарата. Так, в КХ «Есбол» таких коров было 117 голов (60,6%), КХ «Анисан» - 109 (71,2%), в ТОО «Агрофирма АКАС» - 65 голов (65,6%).

Вместе с тем были выявлены животные с патологиями в гениталиях. Так, у коров КХ «Есбол» эндометритом болели 7,7%, субинволюция матки - 10,3%, вульвиты и вестибулиты – 8,2%, киста яичников 2,0%, персистентное желтое тело – 4,1%, гипофункция яичников – 6,7%. Следовательно, можно с уверенностью утверждать, что животных с эндометритом, субинволюцией матки и вульво-вестибулитом следует объединить в одну группу 51 коров (26,4% голов) и проводить лечение как коров, больных эндометритом.

В КХ «Анисан» эндометритом болели 4,5%, субинволюция матки – 8,4%, вульвиты и вестибулиты – 8,2%, киста яичников 5,2%, персистентное желтое тело – 6,5%. В этом хозяйстве животных с воспалительными процессами в гениталиях было 28 голов (18,3%) и, следовательно, их также можно лечить одной схемой.

В ТОО «Акгрофирма АКАС» коров с патологиями матки (эндометрит 3,0% и субинволюция матки – 9,0%) было выявлено 12,1%, которых также решили лечить одной схемой. Вместе с тем, было выявлено коров с патологиями вульвы и преддверья – 9,0%, киста яичников 4,0%, персистентное желтое тело – 3,0%, гипофункция яичников – 6,0%.

Таблица 1 - Результаты акушерско-гинекологического исследования

Показатель	КХ «Есбол»		КХ «Анисан»		ТОО «Агрофирма «АКАС»		Итого голов
	голов	%	голов	%	голов	%	
Эндометрит	15	7,7	7	4,5	3	3,0	25
Субинволюция матки	20	10,3	13	8,4	9	9,0	42
Вульвит и вестибулит	16	8,2	8	5,2	9	9,0	33
Киста яичников	4	2,0	10	6,5	4	4,0	18
Персистентное желтое тело	8	4,1	6	4	3	3,0	17
Гипофункция яичника	13	6,7	-	-	6	6,0	19
Состояние репродуктивны х органов в норме, в том числе стельные	117	60,6	109	71,2	65	65,6	291
Итого	193	100	153	100	99	100	445

Также коров данного хозяйства 21 коров (21,2%) лечили одной схемой, как животных с воспалительными процессами в гениталиях (таблица 2).

Таблица 2 – Схема лечения коров с воспалительными процессами в гениталиях

Наименование препаратов	Место введения и доза	Дни					
		1	2	3	4	5	6
Айнил 10%	3мл/100 кг внутримышечно	+	+				
Цефтимаг	1мл/100 кг внутримышечно	+	+	+	+	+	
Эндометромаг - Био	Внутри-маточно	150 мл.	50 мл.	50 мл.	20 мл.	20 мл.	
Витамин Е	5 мл. на голову	+					+

Примечание: + – дни лечения.

Анализы результатов лечения коров с воспалительными процессами в гениталиях показали, что в основном коровы выздоравливали на 12-15 день применения комплексной терапии, а уже на 18-24 дни приходили в охоту и подвергались искусственному осеменению.

Таблица 3 – Результаты лечения коров с воспалительными процессами в гениталиях

Показатели	КХ «Есбол» n = 193		КХ «Анисан» n = 153		ТОО «Агрофирма «АКАС» n = 99	
	К-во	%	К-во	%	К-во	%
Всего больных коров	76	39,3	44	28,7	34	34,3

Выздоровело	70	92,1	39	88,6	31	91,1
Осеменено	70	100	39	100	31	100
Стельных	48	68,5	26	66,6	21	67,7
Остались бесплодными	28	36,8	18	40,9	13	38,2

Из 193 коров КХ «Есбол» с воспалительными процессами в гениталиях было 76 голов, что составила 39,3%. В процессе лечения выздоровела 92,1% животных, которые были искусственно осеменены. При диагностике беременности выявлено 48 стельных коров, что составила 68,5%. В этом хозяйстве из пролеченных коров остались бесплодными 28 коров или 36,8%.

В КХ «Анисан» из 153 голов заболеваемость гинекологическими патологиями была на 10,6% меньше, и составило 44 коров или 28,7%, из которых вылечено 39 голов 88,6% и искусственно осеменено. При диагностике стельности беременность подтвердилась у 21 голов, что составила 67,7%. Всего бесплодных осталось в данном хозяйстве - 40,9% коров.

Также в ТОО «Агрофирма АКАС» из 99 коров 34 голов были гинекологический больных (34,3%). Больные животные с воспалениями в гениталиях были подвергнуты к лечению, из которых было вылечено 31 голов, то есть 91,1%, в последующем они были искусственно осеменены. Из осемененных коров 21 (67,7%) оказались стельными. Остались бесплодными 13 коров или (38,2%).

Терапевтическая действие схемы лечения объясняется тем, что препарат Айнил являясь нестероидным противовоспалительным препаратом, оказывает противовоспалительное, обезболивающее и жаропонижающее действие, подавляет восприятие боли. Препарат Цефтимаг – это антибиотиком третьего поколения, оказывает бактерицидное действие на грамотрицательные и грамположительныемикроорганизмы, он подавляет функциональной активность бактериальных ферментов, приводя к нарушению осмотического баланса и разрушению бактериальной клетки. Применение препарата Эндометрамаг-Био обеспечивает антисептическое и сократительное действие на миометрию и способствует регенерации эндометрия.

Таким образом применённый схема лечения была эффективной, так как выздоровливаемость составила 88,6-92,1%. Все пролеченные животные выздоравливали в течение 10-13 дней после завершения курса лечения.

Заключение. Таким образом, ранняя диагностика эндометритов посредством комплексного использования клинического осмотра, УЗИ и микробиологического анализа позволяет своевременно выявлять патологию в послеродовой период.

Комплексное лечение, включающее промывание матки, антимикробную терапию и патогенетическую терапию с использованием Айнил 10%, Цефтимаг, Эндометрамаг – Био и Витамин Е демонстрирует высокую эффективность (выздоровляемость 88,6–92,1%) и способствует успешному осеменению пролеченных коров.

Улучшение репродуктивных показателей, таких как сокращение сервис периода и индекса осеменения, подтверждают значимость комплексного подхода в терапии эндометритов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Куликова Н.И., Черечеча А.А. Проблемы воспроизводства крупного рогатого скота, методы их решения // Научный электронный журнал Меридиан. – 2020. – №7. – С. 270-272.

2. Нежданов А.Г., Лободин К.А. Воспроизводство высокопродуктивного молочного скота: эффективность ветеринарного контроля // Молочная промышленность. – 2015. – №11. – С. 64-65.

3. Джакупов И.Т., Есжанова Г.Т., Кузербаева А.Т. Послеродовые патологии и их диагностика у импортных коров в условиях Северного региона Казахстана // Ветеринария. – 2015. – №7. – С. 47-50.

4. Джакупов И.Т., Карабаева Ж.З. Мониторинг воспроизводительной функции коров различных пород молочного направления продуктивности / И.Т. Джакупов, Ж.З. Карабаева // Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік университетінің хабаршысы Вестник государственного университета имени Шакарима г. Семей. – 2017. – Т. 2, № 1. – С. 35-41.

5. Асатбаева Г.К., Абдрахманов Т.Ж., Конвишер А.Н. Сравнительная оценка методов диагностики катарального эндометрита коров // Селекционно-генетические аспекты развития молочного скотоводства: сб. науч. труд. всеросс. науч.-практ. с междунар. уч., посв. 90-летию Ш.И. Шихсаидова. – Махачкала, 2019. – С. 166-174.

6. Горелов Ю.М., Телеляева М.В. Мониторинг эндометритов у коров в условиях молочно-товарных ферм Алматинской области // Проблемы теории и практики современной ветеринарной науки: сб. науч. труд. – Алматы, 2015. – С. 15-18.

7. Узынтлеуова А.Д., Джуланова Н.М., Джуланов М.Н. Распространенность и этиология гинекологических патологий у коров // Аграрная наука - сельскому хозяйству. Сборник мат. XV Междунар. науч.-практ. конф. в 2 кн. Том 2. – 2020. – С. 365-366.

8. Бозымов К.К., Насамбаев Е.Г., Султанова А.К. Из опыта использования ультрасонографии в диагностике заболеваний органов воспроизводства мясных коров в условиях Западно-Казахстанской области // Вестник Брянской государственной сельскохозяйственной академии. – 2015. – № 2-1. – С. 37-41.

9. Нежданов А.Г., Шахов А.Г. Послеродовые гнойно-воспалительные заболевания матки у коров // Ветеринарная патология. – 2005. – №3. – С. 61-64.

10. Джакупов И.Т., Карабаева Ж.З. Мониторинг воспроизводительной функции коров различных пород молочного направления продуктивности // Шәкәрім атындағы СМУ. – 2017. – Т. 2, №1. – С. 35-41.

11. Габдуллин Д.Е., Ертлеуова Б.О., Айтпаева З.С., Сатыбаев Б.Г. Сравнительная эффективность схем лечения больных коров послеродовым гнойно-катаральным эндометритом // Наука и образование. – 2021. - № 4 (65). - С.10-16.

12. Джуланов, М.Н., Какишев М.Г., Габдуллин Д.Е., Жолдасбеков А.К. Сравнительная оценка схем лечения гнойно – катарального эндомерита у коров черно – пестрых пород в хозяйстве ЗКО // Наука и образование. – 2019. - № 4 (57). - С.113-118.

13. Габдуллин Д.Е. Эффективность препарата «Эндометрамаг-Грин» при лечении гнойно-катарального эндометрита у коров черно-пестрых пород в ЗКО / Д.Е. Габдуллин., В.Ю. Стефаник. А.К. Жолдасбеков., Р.Г. Абдрахманов // Мат. междунар. науч. практ. конф. VII. «Наука и образование в современном мире: вызовы XXI века» Октябрь 2022. - Нур-Султан, 2020. - С. 38-42.

14. Малыгина Н.А. Лечение острого послеродового эндометрита у коров // Вестник АГАУ. - 2016. - № 3. - С. 140-142.

15. Малыгина Н.А., Булаева А.В. Профилактика и лечение гнойно-катарального эндометрита у коров // Вестник АГАУ. - 2017. - № 1(147). - С.116-120.

REFERENCES

1. Kulikova N.I., Cherechecha A.A. Problemy vosproizvodstva krupnogo rogatogo skota, metody ih reshenija // Nauchnyj jelektronnyj zhurnal Meridian. – 2020. – №7. – P. 270-272.

2. Nezhdanov A.G., Lobodin K.A. Vosproizvodstvo vysokoproduktivnogo molochnogo skota: jeffektivnost' veterinarnogo kontrolja // Molochnaja promyshlennost'. – 2015. – №11. – P. 64-65.

3. Dzhakupov I.T., Eszhanova G.T., Kuzerbaeva A.T. Poslerodovye patologii i ih diagnostika u importnyh korov v uslovijah Severnogo regiona Kazahstana // Veterinarija. – 2015. – №7. – P. 47-50.

4. Dzhakupov I.T., Karabaeva Zh.Z. Monitoring vosproizvoditel'noj funkcii korov razlichnyh porod molochnogo napravlenija produktivnosti / I.T. Dzhakupov, Zh.Z. Karabaeva // Semej қalasynyң Shәkәrim atyndaғy memlekettik universitetinің habarshysy Vestnik gosudarstvennogo universiteta imeni Shakarima g. Semej. – 2017. – T. 2, № 1. – P. 35-41.

5. Asatbaeva G.K., Abdrahmanov T.Zh., Konvisher A.N. Sravnitel'naja ocenka metodov diagnostiki kataral'nogo jendometrita korov // Selekcionno-geneticheskie aspekty razvitija molochnogo skotovodstva: sb. nauch. trud. vseross. nauch.-prakt. s mezhdunar. uch., posv. 90-letiju Sh.I. Shihsaidova. – Mahachkala, 2019. – P. 166-174.

6. Gorelov Ju.M., Teleljaeva M.V. Monitoring jendometritov u korov v uslovijah molochno tovarnyh ferm Almatinskoj oblasti // Problemy teorii i praktiki sovremennoj veterinarnoj nauki: sb. nauch. trud. – Almaty, 2015. – P. 15-18.

7. Uzyntleuova A.D., Dzhulanova N.M., Dzhulanov M.N. Rasprostranennost' i jetiologija ginekologicheskih patologij u korov // Agrarnaja nauka - sel'skomu hozjajstvu. Sbornik mat. XV Mezhdunar. nauch.-prakt. konf. v 2 kn. Tom 2. – 2020. – P. 365-366.

8. Bozymov K.K., Nasambaev E.G., Sultanova A.K. Iz opyta ispol'zovanija ul'trasonografii v diagnostike zabolevanij organov vosproizvodstva mjasnyh korov v uslovijah Zapadno-Kazahstanskoj oblasti // Vestnik Brjanskoj gosudarstvennoj sel'skohozjajstvennoj akademii. – 2015. – № 2-1. – P. 37-41.

9. Nezhdanov A.G., Shahov A.G. Poslerodovye gnojno-vospalitel'nye zabolevanija matki u korov // Veterinarnaja patologija. – 2005. – №3. – P. 61-64.

10. Dzhakupov I.T., Karabaeva Zh.Z. Monitoring vosproizvoditel'noj funkcii korov razlichnyh porod molochnogo napravlenija produktivnosti // Shəkərim atyndarу SMU. – 2017. – T. 2, №1. – P. 35-41.

11. Gabdullin D.E., Ertleuova B.O., Ajtpaeva Z.S., Satybaev B.G. Sravnitel'naja effektivnost' shem lechenija bol'nyh korov poslerodovym gnojno-kataral'nym jendometritom // Nauka i obrazovanie. – 2021. - № 4 (65). - P.10-16.

12. Dzhulanov, M.N., Kakishev M.G., Gabdullin D.E., Zholdasbekov A.K. Sravnitel'naja ocenka shem lechenija gnojno – kataral'nogo jendomerita u korov cherno – pestryh porod v hozjajstve ZKO // Nauka i obrazovanie. – 2019. - № 4 (57). - P.113-118.

13. Gabdullin D.E. Jeffektivnost' preparata «Jendometramag-Grin» pri lechenii gnoĭno-kataral'nogo jendometrita u korov cherno-pestryh porod v ZKO / D.E. Gabdullin., V.Ju. Stefanik. A.K. Zholdasbekov., R.G. Abdrahmanov // Mat. mezhdunar. nauch. prakt. konf. VII. «Nauka i obrazovanie v sovremennom mire: vyzovy XXI veka» Oktjabr' 2022. - Nur-Sultan, 2020. - P. 38-42.

14. Malygina N.A. Lechenie ostrogo poslerodovogo jendometrita u korov // Vestnik AGAU. - 2016. - № 3. - P. 140-142.

15. Malygina N.A., Bulaeva A.V. Profilaktika i lechenie gnojno-kataral'nogo jendometrita u korov // Vestnik AGAU. - 2017. - № 1(147). - P.116-120.

ТҮЙІН

Мақалада Батыс Қазақстан облысының ЖШС «Агрофирма «Ақас» Ақтөбе облысының «Анисан» ШҚ және Ақтөбе облысы, Мәртөк ауданының «Есбол» ШҚ жағдайларында голштейн-фриз және симментал тұқымды сиырлардың көбею мүшелеріне мониторингі нәтижелері келтірілген.

Мақалада туғаннан кейінгі кезеңнің, эндометриттің этиологиясы, балау әдістері және емдеу хаттамалары туралы толық ақпарат берілген. Авторлар жатыр ауруларын ерте анықтау, клиникалық балау, ультрадыбысты және микробиологиялық талдауды кешенді қолдану арқылы туғаннан кейінгі кезеңде жануарда кездесестін патологиялық үрдісті уақытылы анықтауға мүмкіндік беретінін көрсетеді.

Кешенді емдеу хаттамаларын тиімді қолдану оның ішінде жатырішілік препараттар және микробқа қарсы дәрі-дәрмектерді қолдану келешекте жануарлардың репродуктивті мүшелерінің қалпына келуіне және сәтті ұрықтандыруға мүмкіндік беретіні көрсетілген.

Бұл патологиялардың таралу себебі азықтың нашарлығы, ұстап – бағу, қора - жайлардың гигиеналық талаптарға сәйкес келмеуі, пайдалану технологиясының өрескел бұзылуы және жеткіліксіз гиподинамия болып табылады. Сүтті мал шаруашылығын

қарқынды дамыту мақсатында сиырлар мен қашарлардың репродуктивті органдарының жай-күйін үнемі бақылау арқылы жоғарыда аталған патологияларды алдын алуға болады. Сол себептен акушерлік-гинекологиялық диспансерлеуді жоспарлы жүргізу табынның өсуіне ықпал етеді.

УДК: 619: 615: 638.1
МРНТИ 68:41:55

Суюнов Р.У., ассистент, https://orcid.org/0000-0002-9496-5932
Самаркандский государственный университет ветеринарной медицины, животноводства и биотехнологий, г. Самарканд ул. М.Улугбека 77, Республика Узбекистан, +998 91 547 87 22, Suyunovr96@gmail.com
Юнусов Х.Б., доктор биологических наук, профессор, https://orcid.org/0000-0001-6458-7128
Самаркандский государственный университет ветеринарной медицины, животноводства и биотехнологий, г. Самарканд ул. М.Улугбека 77, Республика Узбекистан, +9985570776-86,Yunusovxudoynazar@gmail.com
Ибрагимов Ф.Б., кандидат ветериарных наук, доцент, https://orcid.org/0009-0002-9050-663X
Самаркандский государственный университет ветеринарной медицины, животноводства и биотехнологий, г. Самарканд ул. М.Улугбека 77, Республика Узбекистан, +998 91 555 06 95, ibragimov0724@gmail.com
Дускулов В.М., кандидат ветериарных наук, доцент, https://orcid.org/0000-0002-9496-5932
Самаркандский государственный университет ветеринарной медицины, животноводства и биотехнологий, г. Самарканд ул. М.Улугбека 77, Республика Узбекистан, +998 995972879, dvoxid@mail.ru

Suyunov R.U., assistant, main author, https://orcid.org/0000-0002-9496-5932
Samarkand State University of Veterinary Medicine, Animal Husbandry and Biotechnology, Samarkand, 77 M.Ulugbek str., Republic of Uzbekistan, +998 91 547 87 22 , Suyunovr96@gmail.com
Yunusov H.B., Doctor of Biological Sciences, Professor, https://orcid.org/0000-0001-6458-7128
Samarkand State University of Veterinary Medicine, Animal Husbandry and Biotechnology, Samarkand, 77 M.Ulugbek str., Republic of Uzbekistan, +9985570776-86,Yunusovxudoynazar@gmail.com
Ibragimov F.B., Candidate of Veterinary Sciences, Associate Professor, https://orcid.org/0009-0002-9050-663X
Samarkand State University of Veterinary Medicine, Animal Husbandry and Biotechnology, Samarkand, 77 M.Ulugbek str., Republic of Uzbekistan, +998 91 555 06 95, ibragimov0724@gmail.com
Duskulov V.M., Candidate of Veterinary Sciences, Associate Professor, https://orcid.org/0000-0002-9496-5932
Samarkand State University of Veterinary Medicine, Animal Husbandry and Biotechnology, Samarkand, 77 M.Ulugbek str., Republic of Uzbekistan, +998 995972879, dvoxid@mail.ru

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА АПИФЛОКС ПРОТИВ ИНФЕКЦИОННЫХ БОЛЕЗНЕЙ ПЧЕЛ
EFFECTIVENESS OF THE USE OF APIFLOX AGAINST INFECTIOUS DISEASES IN BEES

АННОТАЦИЯ

На сегодняшний день в пчеловодстве активно применяются различные антибиотики для лечения инфекционных заболеваний (бактериозов). Особенно широко используются тетрациклин, окситетрациклин, стрептомицин, синтомицин, пенициллин и другие антибиотики. Однако, из-за чрезмерного применения этих препаратов пчеловодами без надлежащего контроля врачей, микроорганизмы развивают устойчивость к ним, и в некоторых случаях препараты перестают действовать, что приводит к гибели пчелиных семей. Самым серьезным последствием является то, что мед, зараженный антибиотиками, не соответствует мировым стандартам. Поэтому для борьбы с этими заболеваниями необходимы новые антибиотики с совершенно иной химической структурой. Препарат Апифлокс (действующее вещество - энрофлоксацин), растворенный в 2 л сахарного сиропа (1 л воды + 1 кг сахара), назначают пчелам в дозе 100 мл ежедневно в течение 3 дней. Повторный курс через 7 дней позволяет лечить американскую и европейскую плодожорку, а также асцит, при полном выздоровлении пчел.

ANNOTATION

Today, various antibiotics are actively used in beekeeping to treat infectious diseases (bacteriosis). Especially tetracycline, oxytetracycline, streptomycin, syntomycin, penicillin and other antibiotics are widely used. However, due to excessive use of these drugs by beekeepers without proper medical supervision, microorganisms develop resistance to them, and in some cases the drugs stop working, which leads to the death of bee families. The most serious consequence is that honey contaminated with antibiotics does not meet global standards. Therefore, new antibiotics with a completely different chemical structure are needed to fight these diseases. The drug Apiflox (active substance - enrofloxacin) dissolved in 2 liters of sugar syrup (1 liter of water + 1 kg of sugar) is administered to bees in a dose of 100 ml daily for 3 days. Repeated course after 7 days allows to treat American and European moth, as well as ascites, with full recovery of bees.

Keywords: *Apiflox, tetracycline, oxytetracycline, streptomycin, syntomycin, solution, drug, syrup, worker bees, treatment, prevention.*

Ключевые слова*: Апифлокс, тетрациклин, окситетрациклин, стрептомицин, синтомицин, раствор, препарат, сироп, рабочие пчелы, лечение, профилактика.*

Введение. В годы независимости в нашей республике было предпринято много мер для развития пчеловодства.

Включая реформирование системы управления отраслью, научное обоснование племенной работы, повышение эффективности деятельности пчеловодческих хозяйств, увеличение объемов и видов производства меда, внедрение современных технологий переработки меда и расширение экспортных возможностей, а также внедрение передового опыта пчеловодства во всех регионах Узбекистана.

Программа, утвержденная Указом Президента Республики Узбекистан № PQ-3327 от 16 октября 2017 года, направлена на дальнейшее развитие этой отрасли.

На сегодняшний день в пчеловодстве активно применяются различные антибиотики для лечения инфекционных заболеваний (бактериозов).

Особенно широко используются тетрациклин, окситетрациклин, стрептомицин, синтомицин, пенициллин и другие антибиотики.

Однако, из-за чрезмерного применения этих препаратов пчеловодами без надлежащего контроля врачей, микроорганизмы развивают устойчивость к ним, и в некоторых случаях препараты перестают действовать, что приводит к гибели пчелиных семей.

Самым серьезным последствием является то, что мед, зараженный антибиотиками, не соответствует мировым стандартам. Поэтому для борьбы с этими заболеваниями необходимы новые антибиотики с совершенно иной химической структурой.

В животноводстве и птицеводстве для борьбы с острыми инфекционными заболеваниями широко применяются препараты, содержащие 10% энрофлоксацина, относящиеся к группе фтор-хинолов, и показывающие хорошие результаты в лечении и профилактике острых инфекций. Мы решили испытать этот препарат для лечения американского и европейского гнильца, которые наносят значительный ущерб пчеловодству.

Материалы и методы исследования. Исследования проводились в пчеловодческом фермерском хозяйстве Амонова Ашрафхона в Кашкадарьинской области, в районе Китоб. В ходе эксперимента каждая пчелиная семья получала 2 литра сахарного сиропа с добавлением 1 мл препарата Апифлокс, который давался в течение 3 дней по 100 мл ежедневно. Это был первый курс лечения.

Апифлокс - это раствор для внутреннего применения, содержащий 10% энрофлоксацина, гидроксид кальция, бензоловый спирт и воду. Препарат имеет желтоватый цвет. Период полураспада энрофлоксацина в организме составляет около 4 часов.

Инструкция к препаратам, произведенным в Испании и Германии, рекомендует давать 0,5 мл препарата на 1 литр воды в течение 3-5 дней. Мы использовали дозы от 0,1 мл до 1 мл, растворяя их в 2 литрах сиропа (1 литр воды + 1 кг сахара), и ежедневно давали 100 мл сиропа 10 семьям пчел в течение 3 дней.

Таким образом, мы проверяли, обладает ли препарат свойствами лечения и профилактики заболеваний пчел.

Американский гнилец. Американский гнилец - это смертельно опасная и широко распространенная болезнь расплода у личинок медоносных пчел, которая приводит к их гибели и появлению неприятного запаха. Болезнь вызывается спорообразующей бактерией, называемой Paenibacillus larvae подвид личинки. Доктор Г. Ф. Уайт был первым, кто идентифицировал его в 1906 году [1,2,3,4].

Это заболевание вызывается споровыми грамположительными палочками Bacillus larvae. Диагноз ставится на основе визуального осмотра, а также оценки состояния личинок.

Также из пораженного расплода готовится мазок, который исследуется под микроскопом. Признаки заболевания включают гнилостный запах от погибших личинок. Также важно отличать американский гнилец от европейского, мезотчатого расплода и варроатоза.

Европейский гнилец. Европейский гнилец - еще одно заболевание гнильца, которое встречается во всем мире, за исключением Новой Зеландии. Это название было дано потому, что первые исследования этого заболевания были проведены в Европе [5]. Возбудителем заболевания является грам (+) бактерия, называемая Мелиссококк плутон, который не образует спор [6,7].

Это заболевание поражает личинок на 4-й день их жизни. Причинителями заболевания могут быть различные микроорганизмы, включая Streptococcus pluton, S. apis, Bacillus alvei и другие. Для диагностики используется визуальный осмотр расплода и микроскопия мазков [8,9,10].

Результаты исследования. Эксперименты начались в конце апреля, когда инфекции, такие как гнилец, чаще всего проявляются. Мы обнаружили, что дозы препарата Апифлокс в 0,1–0,3 мл на 2 литра сиропа недостаточны для профилактики заболеваний, так как в 8 семьях был зафиксирован американский гнилец и в 1 семье — европейский. При дозах выше 0,3 мл заболеваний не наблюдалось. В контрольной группе, где не применялся Апифлокс, 2 из 30 семей пострадали от американского гнильца, а 1 - от европейского.

Таблица 1 - Эффективность препарата Апифлокс в профилактике американского и европейского гнильца

Количество семей пчел	Количество Апифлокса, мл	Сироп растворенный из апифлокса, л.	Препарат доза мл 3 дня	Заболеваемость в течение 1 месяца после обработки

			непрерывный. 1 семье	Американс кий гнилец	Европейс кий гнилец
30	0,1	2	100	3	-
30	0,2	2	100	1	-
30	0,3	2	100	-	-
30	0,4	2	100	-	-
30	0,5	2	100	-	-
30	0,6	2	100	-	-
30	0,7	2	100	-	-
30	0,8	2	100	-	-
30	0,9	2	100	-	-
30	1,0	2	100	-	-
Контроль 30	-	-	100 чистый сироп	2	1

Заключение. Стадии роста медоносных пчел могут стать идеальной средой для различных причин болезней и вредителей. По этой причине многие патогены и вредители могут вызывать болезни медоносных пчел.

Однако из-за быстрого глобального перемещения, торговли пчелами, продуктами пчеловодства и пчеловодческими материалами между континентами и странами болезни пчел быстро распространяются во всех странах.

Аналогичным образом, быстрое распространение болезней и вредителей внутри страны является важным фактором в миграционном пчеловодстве. Одной из наиболее существенных проблем, задерживающих рост пчеловодства и ограничивающих эффективность производства в Узбекистане, являются болезни и вредители медоносных пчел.

Болезни пчел приводят к большим потерям в турецком пчеловодстве, и невозможно установить, используются ли лекарства намеренно.

Кроме того, ущерб окружающей среде, вызванный использованием химических пестицидов, огромен. При применении 1 мл препарата Апифлокс на 2 литра сахарного сиропа, пчелы получают 100 мл сиропа в течение 3 дней, что предотвращает заболевания американским и европейским гнильцом в течение 1 месяца. Если курс лечения повторяется через 7 дней, пчелы излечиваются от этих заболеваний и полностью восстанавливаются.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Hansen, H. American foulbrood: A review of its biology, diagnosis and control. [Текст] / H. Hansen [и др.] // Bee World. -1999;80(1):- P. 5-23.
2. Zeybek, H. Hayvan Hastalıkları Arastırma Müdürlügü. [Текст] / H. Zeybek [и др.] // Etlik, Ankar;- 1991;96 s.;S: - P.36-53
3. Farghaly, DS. Antimicrobial activity of some honey bee products treated in controlling the American foulbrood, Paenibacillus larva. [Текст] /DS. Farghaly [и др.] // Egyptian Journal of Chemistry. -2023;66(3)-P.351-358.
4. Genç, F. Bal Arılarında Koloni Performansını Etkileyen Faktörler. [Текст] / F. Genç //Teknik Arıcılık. - 1990;27: - P.18-26.
5. Öztürk, Aİ. Balarılarında yavru çürüklüğü hastalıklarının kontrolü ve mücadelesi. [Текст] /Aİ. Öztürk //TYUAP Ege- Marmara Dilimi. - 2000 Yılı Hayvancılık Bilgi Alışveriş Toplantısı Bildirileri; -P. 25-27.
6. Bailey, L. Honey bee pathology. [Текст] / L. Bailey [и др.] //In: Chapter 10 The Treatment of Bee Diseases. London, UK: Academic Press; -1991.- pp. 132-153
7. Russenova, N. European foulbrood disease-aetiology, diagnostics and control. [Текст] / N. Russenova [и др.] // Trakia Journal of Sciences. -2005;3(2):-P.10-16.

8. Давидов, С. Асалари касалликларига қарши доривор ўсимликлар. [Текст] / С. Давидов [и др.] // Зооветеринария.-Тошкент, -2017. -№4. -С.39-40.

9. Дўскулов, В.М. Асалари касалликларини даволашда маҳаллий доривор ўсимликлардан тайёрланган воситалар самарадорлиги. Текст] / В.М. Дўскулов [и др.] // Ветеринария Медитсинаси.-Тошкент, 2018.-№9. -Б.33-35. (16.00.00; №4)

10. Ибрагимов, Ф.Б. Асалари касалликларига қарши сулфаниламидлар самарадорлиги [Текст] / Ф.Б. Ибрагимов [и др.] // Ветеринария медитсинаси илмий-оммабоп журнали, (148) .- 2020 С .29-30.

REFERENCES

1. Hansen, H. American foulbrood: A review of its biology, diagnosis and control. [Text] / H. Hansen [and etc.] // Bee World. -1999;80(1):- P. 5-23.

2. Zeybek, H. Hayvan Hastalıkları Arastırma Müdürlügü. [Text] / H. Zeybek [and etc.] // Etlik, Ankar;- 1991;96 s.;S: - P.36-53

3. Farghaly, DS. Antimicrobial activity of some honey bee products treated in controlling the American foulbrood, Paenibacillus larva. [Text] /DS. Farghaly [and etc.] // Egyptian Journal of Chemistry. -2023;66(3)-P.351-358.

4. Genç, F. Bal Arılarında Koloni Performansını Etkileyen Faktörler. [Text] / F. Genç //Teknik Arıcılık.- 1990;27:-P.18-26.

5. Öztürk, Aİ. Balarılarında yavru çürüklüğü hastalıklarının kontrolü ve mücadelesi. [Text] /Aİ. Öztürk //TYUAP Ege- Marmara Dilimi.- 2000 Yılı Hayvancılık Bilgi Alışveriş Toplantısı Bildirileri; -P. 25-27.

6. Bailey, L. Honey bee pathology. [Text] / L. Bailey [and etc.] //In: Chapter 10 The Treatment of Bee Diseases. London, UK: Academic Press; -1991.- pp. 132-153

7. Russenova, N. European foulbrood disease-aetiology, diagnostics and control. [Text] / N. Russenova [and etc.] // Trakia Journal of Sciences. -2005;3(2):-P.10-16.

8. Davidov, S. Asalari kasalliklariga karshi dorivor ўsimliklar. [Text] / S. Davidov [and etc.] // Zooveterinary medicine.-Toshkent, -2017. -№4. -P.39-40.

9. Duskulov, V.M. Asalari kasalliklarini davolashda maҳaliy dorivor ўsimliklardan tayurlangan vositalar samaradorligi. Text] / V.M. Dўskulov [and etc.] // Veterinary Meditsinasi.-Toshkent, 2018.- № 9. -P. 33-35.

10. Ibragimov, F.B. Asalari kasalliklariga karshi sulfanilamidlar samaradorligi [Text] / F.B. Ibragimov [and etc.] // Veterinary Meditsinasi ilmiy-ommabop journalist, (148) .- 2020 P .29-30.

ТҮЙІН

Бүгінгі күні ара шаруашылығында жұқпалы ауруларды (бактериоздарды) емдеу үшін әртүрлі антибиотиктер белсенді қолданылады. Әсіресе тетрациклин, окситетрациклин, стрептомицин, синтомицин, пенициллин және басқа да антибиотиктер кеңінен қолданылады. Алайда, осы препараттарды омарташылардың тиісті дәрігерлердің бақылауынсыз шамадан тыс қолдануынан микроорганизмдер оларға төзімділігі дамиды және кейбір жағдайларда препараттар әрекетін тоқтатады, бұл бал ара ұяларының өліміне әкеп соқтырады. Антибиотиктермен зақымданған бал әлемдік стандарттарға сәйкес келмейді. Сондықтан бұл аурулармен күресу үшін мүлде басқа химиялық құрылымы бар жаңа антибиотиктер қажет. 2 л қант шәрбатында (1 л су + 1 кг қант) ерітілген Апифлокс препараты (әсер етуші зат - энрофлоксацин) бал араларына күн сайын 3 күн бойы 100 мл мөлшерінде тағайындалады. 7 күннен кейін қайталанған курс американдық және еуропалық жеміс бездерін, сондай-ақ бал аралары толық сауыққан кезде асцитті емдеуге мүмкіндік береді.

УДК. 637,1:614,3
МРНТИ 65:63:03

Расулов У.И., доктор ветеринарных наук, доцент, https://orcid.org/0009-0001-8944-7372
Самаркандский государственный университет ветеринарной медицины, животноводства и биотехнологий, г. Самарканд ул. М.Улугбека 77, Республика Узбекистан тел: +99895-834-35-36, utkirr1966@gmail.com
Мирзаева Н., студент, https://orcid.org/0009-0008-8069-6226
Самаркандский государственный университет ветеринарной медицины, животноводства и биотехнологий, г. Самарканд ул. М. Улугбека 77, Республика Узбекистан, тел: +99895-834-35-36, Nmirzoyeva543@gmail.com

Rasulov U.I., Doctor of Veterinary Sciences, Associate Professor, main author, https://orcid.org/0009-0001-8944-7372
Samarkand State University of Veterinary Medicine, Animal Husbandry and Biotechnology, Samarkand, 77 M. Ulugbek str., Republic of Uzbekistan tel: +99895-834-35-36, utkirr1966@gmail.com
Mirzayeva N., student, https://orcid.org/0009-0008-8069-6226
Samarkand State University of Veterinary Medicine, Animal Husbandry and Biotechnology, Samarkand, 77 M. Ulugbek str., Republic of Uzbekistan, tel: +99895-834-35-36, Nmirzoyeva543@gmail.com

МОЛОКО-КАК ЦЕННЫЙ ПРОДУКТ ДЛЯ ПИТАНИЯ
(Основные аспекты и значимость)
MILK AS A VALUABLE PRODUCT FOR NUTRITION
(Main aspects and significance)

АННОТАЦИЯ

Молоко, с его уникальным составом и питательными свойствами, играет важную роль в питании человека. Поэтому не удивительно, что лабораторное исследование молока имеет огромное значение для обеспечения эго качества и безопасности. Эти исследования позволяют не только оценивать пищевую ценность продукта, но и выявлять возможные загрязнения, а также контролировать процесс производства.

В статье подчеркивается важность лабораторного анализа в обеспечении качества и безопасности молока. Роль микробиологических и химических анализов, авторы обсудили методы мониторинга микробного загрязнения и наличия химических загрязнителей в молоке.

ANNOTATION

Milk, with its unique composition and nutritional properties, plays an important role in human nutrition. Therefore, it is not surprising that laboratory testing of milk is of great importance to ensure its quality and safety. These tests allow not only to assess the nutritional value of the product, but also to identify possible contaminants and to control the production process.

The article emphasizes the importance of laboratory analysis in ensuring the quality and safety of milk. The role of microbiological and chemical analyses, the authors discussed methods for monitoring microbial contamination and the presence of chemical contaminants in milk.

Ключевые слова: *молоко, анализ, лабораторное исследование, качество, микроб, редуктазная проба.*

Key words: *milk, analysis, laboratory test, quality, microbe, reductase test.*

Введение. В настоящее время перерабатывающие предприятия предъявляют повышенные требования к качеству молока. Для производства всего разнообразия молочных продуктов требуется молоко с высокими технологическими показателями. Основное внимание уделяется санитарно-гигиеническим показателям молока, которые, в первую очередь, обусловлены технологическими факторами [1,2,3].

Молоко известно как самая полная пища природы на протяжении тысячелетий, и в настоящее время играет важную роль в рационе более 6 миллиардов человек в мире [4,5,6,7].

Молоко и молочные продукты являются продуктами, богатыми питательными веществами, снабжающими организм энергией и высококачественным белком с рядом необходимых микроэлементов (особенно кальцием, магнием, калием, цинком и фосфором) в легкоусвояемой форме [8,9,10].

Молоко, с его уникальным составом и питательными свойствами, играет важную роль в питании человека. Поэтому не удивительно, что лабораторное исследование молока имеет огромное значение для обеспечения эго качества и безопасности. Эти исследования позволяют не только оценивать пищевую ценность продукта, но и выявлять возможные загрязнения, а также контролировать процесс производства.

Химический анализ молока. Химический анализ молока – считается один из основных видов лабораторного исследования. Он включает оценку содержания белка, жира, лактозы, витаминов, минеральных веществ и др. Эти параметры имеют прямое отношение к питательной ценности молока и эго качеству. Например, содержание белка может указывать на его полезност для потребителя, а содержание жира влияет на вкус и текстуру продукта.

Микробиологическое тестирование. Еще одним важным аспектом лабораторного исследования молока является микробиологическое тестирование. Оно направлено на выявление наличия бактерий, патогенных микроорганизмов или других загрязнений, которые могут представлять угрозу здоровью потребителя.

Это особенно важно в контексте безопасности пищевых продуктов, так как неправильное хранение или обработка молока может способствовать размножению микроорганизмов.

Лабораторного исследования молока. Лабораторное исследование молока имеет огромную значимость, как для потребителей, так и для производителей. Для потребителей это гарантия безопасности и качества продукта, который они употребляют. Для производителей это возможность контролировать производственные процессы, оптимизировать качество продукции и соответствовать стандартам безопасности пищевых продуктов.

Одним из основных аспектов микробиологических анализов молока является обеспечение эго безопасности для потребления. Определение уровня обсемененности молока позволяет выявлять потенциально опасные микроорганизмы, которые могут привести к заболеваниям у потребителей, и принимать меры по предотвращению их попадания в продукт.

Микробиологические анализы молока также играют важную роль в контроле качества продукции. Высокий уровень обсемененности молока может свидетельствовать о недостаточной гигиене при эго сборе, хранении или транспортировке, а также о проблемах с оборудованием на молочных фермах. Проведение регулярных анализов позволяет выявлять, и устранят такие проблемы, обеспечивая высокое качество продукции.

В большинстве стран существуют строгие стандарты качества и безопасности для молочных продуктов. Микробиологические анализы молока позволяют производителям и регулирующим органам следить за соблюдением этих стандартов и принимать меры в случае их нарушения. Микробное загрязнение молока может произойти из-за различных факторов, таких как неправильные условия хранения, неправильная обработка оборудования, а также контакт с инфицированными животными или окружающей средой.

При наличии микробного загрязнения молоко может стать источником пищевых инфекций и отравлений для потребителей, что представляет серьезную угрозу для общественного здоровья. Поэтому определение микробного загрязнения молока необходимо для обеспечения безопасности пищевых продуктов и защиты здоровья потребителей.

Материалы и методы исследования. Для проверки качества молока в лабораторных условиях мы провели ряд исследований, включая редуктазную пробу. Проба была взята из молочной фермы "Бону" из Нуробадского района Самаркандской области.

Результаты исследования. Для этого эксперимента мы использовали чистые пробирки, в которые добавили 10 мл молока и 0,5 мл метиленового синего. После тщательного смешивания растворы были закрыты ватной пробкой и помещены в термостат при температуре 37-39˚С. Мы наблюдали за реакцией до полного обесцвечивания раствора, поскольку время завершения реакции указывает на степен бактериальной загрязненности молока и эго классификацию (Рисунок1). Однако стоит, отметит, что небольшое окрашенное пятно в нижней части пробирки не учитывается при анализе.




Рисунок 1 - Лабраторные исследование молока

Результаты нашего исследования показали, что молоко относится к первому классу по уровню бактериальной загрязнений. Время сохранения молока составило более часа, а полное обесцвечивание произошло через 3,2 часа. Эти данные указывают на приблизительное количество бактерий в 1 см³ молока от 300 тыс. до 500 тыс., что соответствует первому классу. Таким образом, среди всех методов оценки бактериальной контаминации молока, редуктазная проба является самым простым в исполнении, мало затратным и проверенным многолетними исследованиями. Наши результаты показывают, что молоко из молочной фермы "Бону" соответствует первому классу по бактериальной контаминации, что подтверждает эго безопасно для потребления.

Заключение. Лабораторное исследование молока играет ключевую роль в обеспечении эго качества и безопасности. Это необходимая составляющая процесса производства и потребления молочной продукции. Благодаря этим исследованиям потребители могут быть уверены в том, что молоко, которое они выбирают, соответствует высоким стандартам качества, а производители могут, обеспечит надежный и безопасный продукт для своих клиентов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Попов, П.А. Микробиологический состав молока и пути его контаминации. [Текст] / П.А. Попов // Научный журнал, Куб ГАУ. 2021. №168. С. 112-114.
2. Скоркин, В.К. Инновационная технология контроля качества молока методом анализа результатов лабораторных исследований с применением компьютерной программы. [Текст] / В.К. Скоркин // Вестник ВНИИМЖ. 2017. № 4. С. 154-157.
3. Суюнов, Р.У. Сут ва сут маҳсулотларидан наъмуналар олиш ва уни ветеринария санитария жиҳатдан баҳолаш. [Текст] /Р.У.Суюнов [и др.] // Перспективы развития ветеринарной науки и ее роль в обеспечении пищевой безопасности, 1(2), С. 119-123.

4. Bonjour, J.P. Dietary protein: an essential nutrient for bone health. [Текст] / J.P. Bonjour// J. Am. Coll. Nutr. -2005;24:526S –536S.-P.2-19.

5. Adegboye, A.R.A. Intake of dairy products in relation to periodontitis in older danish adults. [Текст] / A.R.A. Adegboye [и др.] // Nutrients. -2012;4:12.-P .19–1229.

6. Lee, K. Dairy food consumption is inversely associated with the prevalence of periodontal disease in Korean adults. [Текст] / K. Lee [и др.] // Nutrients.- 2019;11:.-P.1035.

7. Al-Zahrani, M.S. Increased intake of dairy products is related to lower periodontitis prevalence. [Текст] / M.S. Al-Zahrani // J. Periodontol. -2006;77:P.289–294.

8. Schifferle, R.E. Nutrition and periodontal disease. [Текст] / R.E. Schifferle // Dent. Clin. North Am. 2005;49: P.595–610.

9. Nilsen, R. Effect of a high intake of cheese on cholesterol and metabolic syndrome: Results of a randomized trial. [Текст] / R. Nilsen [и др.] // Food Nutr. Res. 2015;59:27651.

10. Engel, S. Tholstrup T. Effect of whole milk compared with skimmed milk on fasting blood lipids in healthy adults: A 3-week randomized crossover study. [Текст] / S. Engel [и др.] // Eur. J. Clin. Nutr. -2018;72:P.249–254.

REFERENCES

1. Popov, P.A. Microbiological composition of milk and ways of its contamination. [Text] / P.A. Popov // Scientific Journal, Kub GAU. 2021. №168. P. 112-114.

2. Skorkin, V.K. Innovative technology of milk quality control by analyzing the results of laboratory tests using a computer program. [Text] / V.K. Skorkin // Vestnik VNIIMZh.- 2017. № 4. P. 154-157.

3. Suyunov, R.U. Sut va sut maҳsulotlaridan na'munalar olish va uni veterinary sanitation zhizhiҳatdan baҳolash. [Text] / R.U.Suyunov [and etc] // Prospects of development of veterinary science and its role in ensuring food safety, 1(2), P.119-123.

4. Bonjour, J.P. Dietary protein: an essential nutrient for bone health. [Text] / J.P. Bonjour// J. Am. Coll. Nutr. -2005;24:526S –536S.-P.2-19.

5. Adegboye, A.R.A. Intake of dairy products in relation to periodontitis in older danish adults. [Text] / A.R.A. Adegboye [and etc] // Nutrients. -2012;4:12.-P .19–1229.

6. Lee, K. Dairy food consumption is inversely associated with the prevalence of periodontal disease in Korean adults. [Text] / K. Lee [and etc]// Nutrients.- 2019;11:.-P.1035.

7. Al-Zahrani, M.S. Increased intake of dairy products is related to lower periodontitis prevalence. [Text] / M.S. Al-Zahrani // J. Periodontol. -2006;77:P.289–294.

8. Schifferle, R.E. Nutrition and periodontal disease. [Text]/ R.E. Schifferle //Dent. Clin. North Am. 2005;49: P.595–610.

9. Nilsen, R. Effect of a high intake of cheese on cholesterol and metabolic syndrome: Results of a randomized trial. [Text] / R. Nilsen [and etc] // Food Nutr. Res. 2015;59:27651.

10. Engel, S. Tholstrup T. Effect of whole milk compared with skimmed milk on fasting blood lipids in healthy adults: A 3-week randomized crossover study. [Text] / S. Engel [and etc] // Eur. J. Clin. Nutr. -2018;72:P.249–254.

ТҮЙІН

Сүттің бірегей құрамы мен қоректік қасиеттері адамның тамақтануында маңызды рөл атқарады. Сондықтан сүтті зертханалық зерттеу сапа мен қауіпсіздікті қамтамасыз етуде үлкен мәнге ие. Бұл зерттеулер өнімнің тағамдық құндылығын бағалауға ғана емес, сондай-ақ ықтимал ластануларды анықтауға, сондай-ақ өндіріс процесін бақылауға мүмкіндік береді. Мақалада сүттің сапасы мен қауіпсіздігін қамтамасыз етуде зертханалық талдаудың маңыздылығы атап өтіледі. Микробиологиялық және химиялық талдаулардың рөлі, авторлар микробтық ластануды және сүттегі химиялық ластауыштардың болуын мониторингілеу әдістерін талқылады.

UDC.: 636.5:591.1:636.087.7
IRSTI 68.41

Ilyosov Z.I., independent researcher, https://orcid.org/0009-0005-7024-8196,
Samarkand state university of veterinary medicine, animal husbandry and biotechnology, Samarkand city, M. Ulugbek street 77, Republic of Uzbekistan, ilyosov_zafar@mail.ru
Yunusov X.B., doctor of biological sciences, professor, https://orcid.org/0000-0001-6458-7128
Samarkand state university of veterinary medicine, animal husbandry and biotechnology, Samarkand city, ul. M.Ulugbeka 77, Republic of Uzbekistan, Yunusovxudoynazar@gmail.com
Ibragimov F.B., candidate of Veterinary Science, Associate Professor https://orcid.org/0009-0002-9050-663X
Samarkand state university of veterinary medicine, animal husbandry and biotechnology, Samarkand city, ul. M.Ulugbeka 77, Republic of Uzbekistan, ibragimov0724@gmail.com

PHYSIOLOGICAL OF HEN IN EGG DIRECTION INFLUENCE OF INNOPROVET PROBIOTICS ON INDICATIONS

ANNOTATION

In the decision of the President of the Republic of Uzbekistan dated June 14, 2021 “On additional measures aimed at the development of poultry farming and strengthening of the network feed base” and the Decree of the President of the Republic of Uzbekistan dated February 08, 2022 -Decision № 120 “On approving the program for the development of the livestock industry and its industries in the Republic of Uzbekistan for 2022-2026” provides for the rapid development of the livestock industry and its industries, providing the population of the Republic with food products priority goals and tasks for sustainable supply and expansion of production capabilities are defined. In this decision, tasks are given for further development of the poultry industry and increasing the volume of product production based on the cooperative system. Within the framework of this priority, it is envisaged to raise the level of consumption of quality poultry meat in the country and to increase its share in the total volume of meat products in the Republic. This article presents the results of studying the growth indicators, morphological indicators and composition of the blood of chickens when the probiotic "Innoprovet" is given to laying hens.

Key words: *slaughter yield, tissue, peptone, cell, live weight, growth index, probiotic, hematocrit, immunity, leukocyte, hemoglobin.*

Introduction. In the decision of the President of the Republic of Uzbekistan dated June 14, 2021 “On additional measures aimed at the development of poultry farming and strengthening of the network feed base” [1] and the Decree of the President of the Republic of Uzbekistan dated February 08, 2022 -Decision № 120 “On approving the program for the development of the livestock industry and its industries in the Republic of Uzbekistan for 2022-2026” provides for the rapid development of the livestock industry and its industries, providing the population of the Republic with food products priority goals and tasks for sustainable supply and expansion of production capabilities are defined [2]. In this decision, tasks are given for further development of the poultry industry and increasing the volume of product production based on the cooperative system. Within the framework of this priority, it is envisaged to raise the level of consumption of quality poultry meat in the country and to increase its share in the total volume of meat products in the Republic. Improving the activities of family farms engaged in poultry farming, developing mechanisms for their encouragement and state support, increasing the volume of poultry meat production from 210 thousand tons to 536 thousand tons, the amount of egg production from 8.1 million It is planned to reach 12.8 million units, and increase from 236 units to 329 units per capita [2,4,5].

Materials and research methods. The experimental part of our research 30 heads of 4.5-month-old “Lohman Sandi” breed chickens were allocated for experiment in “Korasuv Parranda Fayz” poultry farm of Jomboy district of Samarkand region. The chickens taken for the experiment were given the probiotic “Innoprovet” produced on the basis of the innovation project PZ - 2020123121, and the control group was fed the same as the experimental group. Chickens in the experimental and control groups were continuously monitored by observation, measurement and live weight control. The morphological changes of the blood of chickens were examined at the beginning, in the middle and at the end of the experiments and the results were obtained. Morphological and biochemical indicators of chicken blood were examined in the Clinical Diagnostic Laboratory of Samarkand State Medical University and the results were studied.

Research results. The results of the study show that the Innoprovet probiotic given to the experimental group has a growth-stimulating effect, and in the first 135 days, chickens of the same age, weight, nutrition and living conditions gained 1310.67 ± 9.8 g the change in weight was 1312.26 ± 9.5 g in the control group and in the experimental group. During our experiments, chickens were weighed every 30 days and the following results were obtained (Table 1):

Table 1 - Live weight dynamics of chickens

Age, per day	Control group	Experimental group
	Indicators	
	m, gr	m, gr
135 days at the beginning of experiments	1310.67 ±9.8	1312.26 ±9.5
210 days at the end of the experiments	1610 ±19.64	1622 ±11.64

m - average live weight of chickens in groups;

As a result of our research, by calculating the daily changes of the growth rate, it was found that the growth rate is high in the 210-day period. Optimum growth at 135 days was found to be an average daily gain of 4.11 g in the experimental group and 3.9 g in the control group.

As can be seen from the table given above, the best period of growth of chickens corresponds to the period of 210 days.



Figure 1- The process of measuring live weight in chickens

Experimental and control groups and monitored their morphological indicators at the beginning, in the middle and at the end of our experiments. The response of the body to the influence of any external or internal factors with the stimulation of tissues, organs and organs is manifested as a result of morphophysiological, biochemical and immunological changes in blood composition. At the beginning of the experiment, we found that hemoglobin index, red blood cells,

white blood cells, platelets and hematocrit in the blood of chickens of all groups corresponded to the physiological norm (Table 2).

Table 2 – Chicken blood indicators

Indicators	Control group	Experimental group
120 days at the beginning of the experiment		
Erythrocyte, million/µl	2.22	2.43
Leukocyte, thousand/µl	92.2	109
Hemoglobin, g/l	103	106
150 days in the middle of the experiment		
Erythrocyte, million/µl	2.27	2.39
Leukocyte, thousand/µl	100.1	111
Hemoglobin, g/l	106	109
180 days at the end of the experiment		
Erythrocyte, million/µl	2.34	2.87
Leukocyte, thousand/µl	112.5	141.2
Hemoglobin, g/l	112	127

According to the data presented in the table, in the first 30 days of our research, the number of erythrocytes in the experimental group was higher by 0.21 million/µl, the number of leukocytes by 16.8 thousand/µl, and the hemoglobin level by 3 g/l. At the end of our research, it was found that the amount of erythrocytes in the experimental group was 0.23 % higher, the amount of leukocytes was 0.25 % higher, and the amount of hemoglobin was 0.13 % higher than in the control group.

At the same time, the biochemical changes in the blood of chickens in the experimental and control groups were also investigated. The levels of iron, potassium, magnesium, and total calcium in the blood of experimental and control chickens were studied and the following results were obtained (Table 3).

Table 3 – Biochemical indicators of chicken blood

Indicators	Try it	In the control group	In the Experimental group
Iron, mg	In the beginning	23	25.2
	At the end	145	148
Potassium mmol/l	In the beginning	3.2	3.3
	At the end	3.85	4.7
Magnesium mmol/l	In the beginning	0.86	1.02
	At the end	1.27	1.66
Total calcium mmol/l	In the beginning	2.3	2.55
	At the end	7.75	7.8

According to the table above, we can see that the changes in the blood have partially changed as a result of the research. At the end of the experiment, it was found that the change in iron content was on average 145 mg in the control group and 148 mg in the experimental groups. Potassium changed to 3.85 mmol/l in the control group and 4.7 mmol/l in the experimental group.



Figure 2 - The process of obtaining blood parameters in chickens



Figure 3 - Laboratory studies of materials

It should be noted that the morphological indicators of the chickens supplemented with Innoprovet probiotic have changed quantitatively, and we can see that the weight of the chickens has increased compared to the control group.

Conclusion. According to the results of the study, it was found that the growth rate was higher than the control group as a result of a positive effect on the cells and tissues of the internal organs in chickens supplemented with probiotics. It was found that the increase in live weight of chickens in the experiment was 4.11 % higher than the control group.

Due to the increase in the amount of erythrocytes in the blood of chickens supplemented with probiotics, there was no significant change in the amount of leukocytes in the blood of chickens in the experimental group compared to the control group, but the amount of hemoglobin increased and their physiological condition was found to be better.

REFERENCES

1. The decision of the President of the Republic of Uzbekistan dated June 14, 2021 “On additional measures aimed at the development of poultry farming and strengthening of the network feed base”.
2. Decision of the President of the Republic of Uzbekistan dated 08.02.2022 № PQ-120 “On approval of the program for the development of the livestock sector and its branches in the Republic of Uzbekistan for 2022-2026”.
3. Ilyosov, Z.I. X.B. Yunusov and F.B. Ibragimov. Evaluation of Egg Quality in Poultry. International journal of biological engineering and agriculture (2023-12-06, № 2, 9-13 P.).
4. Ilyosov, Z.I. Role of laying hens in food security (Literature review). [Text] / Z.I. Ilyosov [and etc.] // Popular scientific journal of veterinary medicine, Tashkent - 2023, № 3, -P. 108-109.
5. Xolmatov, A.X. Poultry in the field of eggs “Agrobank” ATB. [Text] / A.X. Xolmatov // Tashkent: “TASVIR” publishing house,- 2021.-P.25-28.
6. Rakhmatillayev, P.E. “Care of chickens in the direction of eggs”. [Text] / P.E. Rakhmatillayev [and etc.] // “TASVIR” publishing house,- 2023.-P.20-23.
7. Ibragimov, F.B. “Veterinary Sanitary Expertise” training manual. [Text] / F.B. Ibragimov // “TASVIR” publishing house,- 2023.-P.28-32.
8. Muradov, S. “Veterinary sanitary expertise” Samarkand-2006.
9. Moripovich, I. F. (2023). Innoprovet probiotigi berilgan quyonlarning tirik vazni, etologik ko ‘rsatkichlarini o ‘rganish natijalari. [Text] / I. F. Moripovich [and etc.] // Образование, наука и инновационные идеи в мире.-2023, 34(6), P.152-158.
10. Неъматуллаева, А. Б. (2023). Ветеринарно-санитарная экспертиза говядины выпускаемое для потребления. [Text] / А. Б. Неъматуллаева [and etc.] // Евразийский журнал медицинских и естественных наук, -2023,3(2), P. 55- 61.

РЕЗЮМЕ

В постановлении Президента Республики Узбекистан от 14 июня 2021 года «О дополнительных мерах, направленных на развитие птицеводства и укрепление кормовой базы сети» и Указе Президента Республики Узбекистан от 08 февраля 2022 года № 120 «Об утверждении программы развития животноводства и отраслей промышленности в Республике Узбекистан на 2022-2026 годы» предусмотрено ускоренное развитие животноводства, 2022 г. - Постановление № 120 «Об утверждении Программы развития животноводства и его отраслей в Республике Узбекистан на 2022-2026 годы» предусматривают ускоренное развитие животноводства и его отраслей, обеспечение населения республики продуктами питания, определены приоритетные цели и задачи по устойчивому снабжению и расширению производственных возможностей. В данном решении поставлены задачи по дальнейшему развитию птицеводческой отрасли и увеличению объемов производства продукции на основе кооперативной системы. В рамках этого приоритета предполагается повысить уровень потребления качественного мяса птицы в стране и увеличить его долю в общем объеме мясной продукции в республике. В данной статье представлены результаты изучения показателей роста, морфологических показателей и состава крови цыплят при даче пробиотика «Иннопровит» курам-несушкам.

ТҮЙІН

Өзбекстан Республикасы Президентінің «Құс шаруашылығын дамытуға және желінің азықтық базасын нығайтуға бағытталған қосымша шаралар туралы» 2021 жылғы 14 маусымдағы қаулысында және «Өзбекстан Республикасында мал шаруашылығын және өнеркәсіп салаларын дамытудың 2022-2026 жылдарға арналған бағдарламасын бекіту туралы» 2022 жылғы 8 ақпандағы № 120 Жарлығында мал шаруашылығын жедел дамыту көзделген. - «Өзбекстан Республикасында мал шаруашылығын және оның салаларын дамытудың 2022-2026 жылдарға арналған бағдарламасын бекіту туралы» № 120 қаулысы мал шаруашылығын және оның салаларын жедел дамытуды, республика халқын азық-түлік өнімдерімен қамтамасыз етуді көздейді, тұрақты жабдықтау және өндірістік мүмкіндіктерді кеңейту жөніндегі басым мақсаттар мен міндеттер айқындалды. Бұл шешімде құс өсіру саласын одан әрі дамыту және кооперативтік жүйе негізінде өнім өндіру көлемін ұлғайту бойынша міндеттер қойылған. Осы басымдық шеңберінде елде сапалы құс етін тұтыну деңгейін арттыру және оның республикадағы ет өнімінің жалпы көлеміндегі үлесін ұлғайту көзделеді. Бұл мақалада жұмыртқа тауықтарға «Иннопровит» пробиотигін беру кезінде балапандардың өсу көрсеткіштерін, морфологиялық көрсеткіштерін және қан құрамын зерделеу нәтижелері ұсынылған.

UDC:637.54:591.4
IRSTI 65.59.03

Achilov O., Candidate of Veterinary Sciences, Associate Professor, https://orcid.org/0009-0009-7970-1937
Samarkand State University of Veterinary Medicine, Animal Husbandry and Biotechnology, Samarkand city, M. Ulugbek street 77, Republic of Uzbekistan, ssuv@edu.uz

MORPHOLOGY OF POULTRY MEAT (LITERATURE REVIEW)

ANNOTATION

Poultry farming is one of the fastest growing and most profitable agricultural sectors in the world. This industry provides an opportunity to produce ecologically clean and high-quality poultry meat, dietary meat products made from it, eggs, and feathers for industry. Today, poultry

meat ranks second in the world in terms of production and consumption of meat products. Poultry meat is rich in various chemical elements in terms of its composition and is superior to livestock meat in terms of its easy digestibility. Therefore, the effective use of poultry farms, the continuous provision of the population with high-quality poultry meat and egg products, and the development of a system of measures aimed at increasing the sales of local poultry products to domestic and foreign markets are of great scientific and practical importance.

The article presents the morphological composition of poultry meat and its differences from other farm animals, as well as an analysis of the literature on the positive effects of maturation processes on the quality and organoleptic characteristics of poultry meat.

Key words. *Poultry, meat quality, stressors, autolysis, pH, glycogen, protein, lactic acid, meat maturation.*

Introduction. Poultry farming is one of the fastest growing and most profitable agricultural sectors in the world. This industry provides an opportunity to produce ecologically clean and high-quality poultry meat, dietary meat products made from it, eggs, and feathers for industry. Today, poultry meat ranks second in the world in terms of production and consumption of meat products. Poultry meat is rich in various chemical elements in terms of its composition and is superior to livestock meat in terms of its easy digestibility. Therefore, the effective use of poultry farms, the continuous provision of the population with high-quality poultry meat and egg products, and the development of a system of measures aimed at increasing the sales of local poultry products to domestic and foreign markets are of great scientific and practical importance.

The morphological composition of poultry meat differs from that of other agricultural animals in that the bones of the poultry skeleton are thin and light, but very strong.

The skeleton of birds consists of the skull, spine, chest, pelvis, wings and leg bones. The tubular bones are hollow and filled with air, which allows them to fly. Bones make up 14% of the live weight.

The muscle tissue of birds is quite dense, thin-fibered and contains a small amount of connective tissue (softer than that of animals). In meat-producing birds, the muscle fibers are thicker than in egg-producing birds. The color of the muscles characterizes the breed and type of bird. In chickens and turkeys, the color of the muscles is white or light pink, and in geese and ducks it is darker [3,4]. The mass of the muscles of the chest is greater, sometimes heavier than the mass of the thighs and legs. The chest is 24.7%, the legs are 32.85%, the shoulder blades are 24.2%, the neck is 7.3%, and the wings are 10.5%.

In poultry, fat is mainly stored under the skin (in the loin, chest, abdomen). If the fat is evenly distributed throughout the muscles, the meat will be tastier and more tender. Older poultry are fatter than young ones. The total fat content in geese and ducks is higher than in chickens, up to 45%. The skin of poultry is thin, mobile, white or yellow [10].

The ratio of edible and inedible parts depends on the type of poultry, its fatness, age, feeding method, and especially on the accumulation of fat.

Depending on the fatness category of poultry, edible parts account for 59.6% to 65.6%, including muscle tissue up to 55.2% and edible internal organs up to 10%. Uneatable parts make up 35-40%, of which bones account for 14-18%, feathers and scales, and blood account for 22% [9].

Factors shaping the quality of poultry meat.The quality of poultry meat is influenced by a number of factors: type and breed, storage conditions, post-slaughter processing technology, storage, etc.

In addition to hereditary factors (species, breed, etc.), sex and age, environmental factors, in particular nutrition, also affect the quality of meat. Protein level, energy metabolism, the combination of nutrients in the diet, etc. are important in poultry feeding [1]. For example, the amino acid composition of feed and vitamin-mineral premixes affects the intensity of metabolism

and the formation of lipids in the body, and the fatty acid composition of meat is associated with the addition of vegetable and animal fats.

The conditions of keeping poultry also affect the quality of its meat. Broilers grown in cages have fatter meat than birds kept on the ground and in deep litter. Exposure of chicks to a certain amount of ultraviolet radiation can lead to an increase in lipids and dry matter in muscle tissue, thereby improving the quality of meat and its nutritional value.

V.V. Gushin's classification allows you to systematize any defects and deviations that occur in the technological chain according to general principles and determine their impact on the quality of poultry meat. The impact of negative factors on the quality indicators of poultry meat is classified in the following areas: nutritional and biological value, consumer acceptability, food safety and functional and technical properties.

The production and processing of poultry meat includes a number of interrelated stages, namely, the transformation of farm poultry into ready-to-eat products, individual parts of the carcass or various types of boneless meat products. Factors during the period of poultry feeding affect not only the growth of muscle mass, their composition and level of development, but also determine the condition of the bird at the time of slaughter.

In addition, all the processes that occur before and after the slaughter of poultry have a significant impact on the quality of meat. Biochemical changes in poultry meat have not been studied enough, there are no clear ideas about the importance and timing of its maturation [2]. However, the latest research in this area shows that the maturation process has a positive effect on the quality of the product, improving its organoleptic characteristics.

Changes in poultry meat after slaughter (solidification, maturation, deep autolysis) occur in the same way as in the meat of slaughtered animals, but are distinguished by their higher intensity. This is due to the specific features of the morphological and chemical composition of poultry meat.

During maturation, the juiciness, tenderness, aroma and digestibility of the meat improve. This process occurs faster in the breast muscles of poultry. The entire process of changes in meat after slaughter lasts from 3 to 6 days, depending on the fatness of the poultry: the fatter the carcass, the longer the hardening and maturation takes. During maturation, the content of sulfur-containing amino acids (during the breakdown of proteins), aromatic hydrocarbons, etc. increases [10].

According to the classification proposed by Fletcher, factors affecting meat quality during poultry storage can be divided into two categories according to their duration of action: long-term and short-term effects. Long-term factors have a constant effect throughout the life of the poultry - these are genetic and physiological characteristics, diet and feeding time, storage conditions, and the course of diseases.

Short-term factors affecting poultry meat quality occur during the last 24 hours of a bird’s life. These include: assembly (deprivation of feed and water before slaughter, catching birds), transportation, storage at the slaughterhouse, loading and unloading processes, restraint and immobilization on the slaughter line, stunning and slaughter.

Many pre-slaughter factors affect the quality of poultry meat, especially those that affect the last 24 hours of a bird’s life. These short-term factors affect carcass yield (live weight loss), carcass defects (bleeding, bone fractures, etc.), carcass contamination with microbes and muscle metabolism [5]. Stress factors affecting birds and their cage placement affect the functional properties of muscles after slaughter.

In recent years, due to the increasing problems associated with food poisoning and feed infections, special attention is paid to the conditions of keeping live poultry in order to meet the principle of ensuring food safety "from farm to fork".

Slaughtered poultry carcasses are processed on special mechanized or automated lines. Slaughtered poultry carcasses are transported by overhead conveyors equipped with speed-controlled devices, which contributes to increasing the productivity of the poultry processing line.

The poultry processing line consists of several conveyors:

- primary processing;
- cleaning the body from feathers and down;

- removal of internal organs;
- cooling;
- sorting

Primary processing of poultry carcasses includes all technological operations, from the preparation of the carcass to the removal of internal organs.

In cases of poor-quality stunning or improper slaughter of poultry, the blood vessels in the body become filled with blood, which leads to redness of the skin on the surface of the body. Such carcasses are considered defective or sent for processing.

Industrial methods of slaughtering poultry are based on cutting the carotid artery and jugular vein.

Removal of internal organs is the process of removing the intestines, edible organs (liver, heart, gizzard), lungs and kidneys.

In industry, the removal of poultry carcasses from internal organs includes cutting along the trachea, esophagus, oviduct, abdominal cavity and removing internal organs, removing the heart, liver, muscular stomach, intestines, glandular stomach, lungs, neck, kidneys.

After the removal of internal organs, the carcass is washed, sorted, thermally treated (chilling or freezing) and packaged.

The quality of meat can change under the influence of natural factors, storage conditions and transportation processes, slaughter and primary processing conditions, and the parameters of refrigerators for special storage.

After the cessation of vital activity of the organism, the supply of oxygen also stops, the lack of blood circulation, the cessation of synthesis and energy production, leads to the accumulation of end products of metabolism in the tissue and disruption of the enzymatic process [8]. As a result, tissue components are broken down, the quality properties of meat (mechanical strength, taste, color, aroma) and resistance to microbes change.

Poultry meat maturation is the process of changing the chemical composition, structure and properties of meat raw materials after slaughter under the influence of the meat's own enzymes. The change in meat properties occurs in a certain sequence in accordance with the main stages of autolysis (not completely cooled carcass → solidification → maturation → deep autolysis), and its quality indicators differ significantly.

Not completely cooled carcasses include meat after slaughtering poultry and during the process of skinning (up to 30 minutes for poultry). In it, muscle tissue is relaxed, the meat has a soft consistency, relatively low mechanical strength. The taste and smell of such meat are not sufficiently expressed. Usually, in not completely cooled carcasses, the pH is equal to 7.2 [6,7]. After slaughter, during the maturation of the meat and the accumulation of lactic and phosphoric acids, the pH in healthy poultry meat decreases to 5.6-5.8; in sick poultry meat - to 6.3-6.5, and in agonal and dead conditions - to 6.8-7.0.

Approximately 3 hours after slaughter, the hardening process begins, which leads to a decrease in pH to 5.5-5.6, deterioration of color and smell. The meat gradually loses its elasticity and begins to harden. Such meat retains its hardness even after boiling. Complete hardening occurs at different times, depending on the characteristics of the poultry and the influence of environmental factors.

After complete hardening, the muscles relax and the firmness properties of the meat decrease. However, in this case, the palatability of the meat (tenderness, juiciness, taste, smell and digestibility) does not reach the optimal level and is manifested by the further development of autolytic processes.

In technological practice, there are no clear indicators of the full maturation and maturation periods of meat. This is primarily due to the fact that the changes that occur in meat during maturation do not occur simultaneously.

Carcass hardness decreases significantly 5-7 days after slaughter (at 0-4 ° C) and then continues to gradually decrease. Organoleptic indicators reach optimal levels after 10-14 days.

Autolysis of meat is based on changes in the state of the carbohydrate system, ATP system and proteins.

Since the body's oxygen supply stops, glycogen resynthesis in meat after slaughter does not occur and its anaerobic decomposition begins. This occurs with the formation of lactic acid and glucose during phosphorolysis and amylolysis.

The rate of glycolysis can be controlled: the introduction of sodium chloride into a carcass that has not been completely cooled slows down the process; the use of electrical stimulation accelerates it. Intensive glycogen breakdown can occur due to the effects of stress factors on poultry.

After 24 hours, glycolysis stops due to the depletion of ATP reserves and the accumulation of lactic acid.

The enzymatic breakdown of glycogen causes the development of subsequent physicochemical and biochemical processes. The accumulation of lactic acid leads to a change in the pH of meat from 7.2-7.4 to 5.4-5.8, as a result of which:

- the resistance of meat to the action of putrefactive microorganisms increases;
- the solubility of muscle proteins (isoelectric point 4.7-5.4) and the degree of their hydration decrease;
- the activity of cathepsins increases (5.3), leading to the hydrolysis of proteins in the final stages of autolysis;
- conditions are created for the intensification of color formation reactions due to the transition of iron in myoglobin from divalent to trivalent;
- the taste of meat changes;
- the oxidation process of lipids is activated.

The accumulation of lactic (and phosphoric) acid, as mentioned above, has a significant effect on the state of muscle proteins, which in turn determines the technological parameters of meat. In the first stages of maturation, partial dissociation of actomyosin occurs, one of the reasons for this is the increase in the amount of easily hydrolyzed phosphates during this period and the action of tissue proteases. During long-term maturation, the organoleptic and technological parameters of meat improve significantly.

In the early stages of autolysis, the taste and smell of meat are not well manifested, which, depending on the storage temperature, appear within 3-4 days due to the formation of enzymatic breakdown products of proteins and peptides (glutamic acid, threonine, sulfur-containing amino acids), nucleotides (inosine, hypoxanthine, etc.), carbohydrates (glucose, fructose, pyruvic acid and lactic acid), lipids (low molecular weight fatty acids), as well as creatine, creatinine and other nitrogenous extractives. Currently, the issue of targeted use of raw materials, taking into account the autolysis process, is of particular importance, since the share of poultry coming from industrial complexes for processing is significantly increasing, due to which significant deviations from the norm are detected in the development of autolysis processes in muscle tissue after slaughter. Accordingly, meat with a high pH value and exudate meat with a low pH value are distinguished. Poultry meat is matured intensively, improving the taste and digestibility of these products.

Conclusions

1. The morphological composition of poultry meat and the fact that poultry bones are thin and light differ from other farm animals.

2. The quality of poultry meat is affected by many factors during storage, especially during the last 24 hours of the bird's life, which significantly changes the meat.

3. During long-term maturation of meat, its organoleptic characteristics, namely juiciness, tenderness, aroma and digestibility, significantly improve, and this also has a positive effect on technological indicators.

REFERENCES

1. Abilov, B.T. Energy feed additive in cow feeding. [Text] / B.T. Abilov [and etc.]// Agricultural journal. - 2014. - No. 7 (1). - P. 78-82.

2. Boruk, V.V. Efficiency of using complex preparations of amino acids ("abiopeptide") and microelements ("ferropeptide") at different stages of broiler ontogenesis: [Text] / V.V. Boruk// dis. ... Cand. of Biological Sciences. Moscow, - 2012. - 162 p.

3. Budtueva, O.D. Use of the feed additive "Nutovit" in the diets of laying hens News of the Lower Volga Agrarian University Complex [Text] /O.D. Budtueva [and etc.]// Science and Higher Professional Education. - 2018. No. 1 (49). - P. 237-243.

4. Buren, V.M. Microbiological probiotics will improve the safety of animals. [Text] / V.M. Buren [and etc.]// Agricultural News 2002. - No. 3. - P. 16.

5. Volkova, I. Probiotics as an alternative to feed antibiotics [Text] / I. Volkova // Combined feed. - 2014. - No. 2. - P. 63-64.

6. Gavrilenko, D.V. Biotechnology for obtaining a complex feed additive for poultry [Text] / D.V. Gavrilenko // Collection of scientific papers of the Krasnodar Scientific Center for Animal Science and Veterinary Medicine. - 2019. - No. 8 (3). - P. 165-168.

7. Galiev D.M. Feed additives with sorption action in broiler chicken diets [Text] / D.M. Galiev// Perm Agrarian Bulletin. - 2018. - №1 (21). - P. 111-116.

8. Grozina, A.A. Composition of the microflora of the gastrointestinal tract in broiler chickens under the influence of a probiotic and an antibiotic [Text]/A.A. Grozina // Agricultural biology. - 2014. - No. 6. -P.45- 58.

9. Gulyushin, S. Efficiency of using the probiotic Agrimos in compound feed for broilers S. Gulyushin, [Text] / S. Gulyushin// Poultry farming. - 2010. - No. 5. - pp. 11-12.

10. Egorov, N. Efficacy of the probiotic teracid-S [Text] / N. Egorov [and etc.]// Poultry farming. - 2007. - No. 6. - P. 56.

ТҮЙІН

Құс шаруашылығы - әлемдегі ең жылдам өсетін және табысты ауыл шаруашылығы салаларының бірі. Бұл сала экологиялық таза және жоғары сапалы құс етін, одан диеталық ет өнімдерін, өнеркәсіпке арналған жұмыртқа мен қауырсын өндіруге мүмкіндік береді. Бүгінде құс еті ет өнімдерін өндіру және тұтыну бойынша әлемде екінші орында тұр. Құс еті өз құрамы бойынша әртүрлі химиялық элементтерге бай және жеңіл сіңімділігі бойынша ірі қара малдың етінен асып түседі. Сондықтан құс фабрикаларын тиімді пайдалану, халықты жоғары сапалы құс етімен және жұмыртқа өнімдерімен үздіксіз қамтамасыз ету, ішкі және сыртқы нарықтарда отандық құс шаруашылығы өнімдерін өткізуді ұлғайтуға бағытталған шаралар жүйесін әзірлеу үлкен ғылыми және практикалық мәнге ие. Мақалада құс етінің морфологиялық құрамы және оның басқа ауыл шаруашылығы жануарларының етінен айырмашылығы ұсынылған, сондай-ақ жетілу процестерінің құс етінің сапасы мен органолептикалық көрсеткіштеріне оң әсері туралы әдеби деректерге талдау жүргізілген.

РЕЗЮМЕ

Птицеводство - одна из самых быстрорастущих и прибыльных отраслей сельского хозяйства в мире. Эта отрасль дает возможность производить экологически чистое и высококачественное мясо птицы, диетические мясные продукты из него, яйца и перья для промышленности. Сегодня мясо птицы занимает второе место в мире по производству и потреблению мясных продуктов. Мясо птицы богато различными химическими элементами по своему составу и превосходит мясо крупного рогатого скота по легкоусвояемости. Поэтому эффективное использование птицефабрик, бесперебойное обеспечение населения высококачественным мясом птицы и яйцепродуктами, разработка системы мер, направленных на увеличение реализации продукции отечественного птицеводства на внутреннем и внешнем рынках, имеют большое научное и практическое значение. В статье представлен морфологический состав мяса птицы и его отличия от мяса других сельскохозяйственных животных, а также проведен анализ литературных данных о положительном влиянии процессов созревания на качество и органолептические показатели мяса птицы.

UDC.: 619.616.993.192.084
IRSTI 68.41.55

Duskulov V.M., candidate of Veterinary Sciences, Associate Professor, https://orcid.org/0000-0002-9496-5932.
Samarkand State University of Veterinary Medicine, Animal Husbandry and Biotechnology, Samarkand city, M. Ulugbek street 77, Republic of Uzbekistan, voxid_duskulov@ssuv.uz.
Rahimov M.Y., Doctor of Philosophy (PhD) in Veterinary Sciences, https://orcid.org/0009-0003-2609-8077
Samarkand State University of Veterinary Medicine, Animal Husbandry and Biotechnology, Samarkand city, M. Ulugbek street 77, Republic of Uzbekistan, muhamadyunusovich@gmail.com.

METHODS OF THERAPY AND PROPHYLAXIS OF PYROPLASMOSIS AND TEYLERIOSIS OF LARGE CATTLE

ANNOTATION

Among the invasive diseases pyroplasmosis, cattle theilerosis are the most insidious diseases, the causative agents of which are transmitted by the animals to certain species of pasture blood-sucking ticks. The study of these diseases was started from the first days of the organization of the institute. At the same time, the great attention of Native scientists was focused on the study of the fauna of ixodic ticks in the republic, the identification of ticks of carriers of pathogens of pyroplasmidosis of animals and the study of fauna and biology. A large amount of work has been done to develop methods of struggle against ixodic ticks that are introduced into production. Simultaneously, there were conducted studies pyroplasmidosis causative agents of cattle and the search for means of struggle and prevention in these diseases. Along with this, measures of struggle, diagnostics, therapy, special and chemical prophylaxis, control of the epizootic state of pyroplasmidosis were also developed and improved. In treating Piropilazmidoz disease of cattle it was defined the efficiency of uzbicarb applied per 3 mg / kg of cow's body weight. Effectiveness of the policarb preparation produced in order to prevent from theilerosis made 15 days, it was received 7.6 sums of economic benefits for the spent 1 sum.

ТҮЙІН

Пироплазмоздың инвазиялық ауруларының ішінде ірі қара малдың тейлерозы қоздырғыштары жайылымдық қан сорғыш кенелердің кейбір түрлеріне берілетін мейлінше жалған аурулар болып табылады. Бұл ауруларды зерттеу институттың алғашқы күндерінен басталды. Сонымен қатар, отандық ғалымдардың үлкен назары республикадағы иксод кенелері фаунасын зерттеуге, жануарлар пироплазмидоздары қоздырғыштарын тасымалдаушы кенелерді анықтауға және фауна мен биологияны зерттеуге бағытталды. Өндіріске енгізілетін иксод кенелеріне қарсы күрес әдістерін әзірлеу жөнінде үлкен жұмыс жүргізілді. Бір мезгілде ірі қара малдың пироплазмидоз қоздырғыштарын зерттеу және осы аурулар кезінде күрес және алдын алу құралдарын іздеу жүргізілді. Сонымен қатар, пироплазмидоздарға қарсы күрес, диагностика, терапия, арнайы және химиялық профилактика, эпизоотиялық жағдайды бақылау шаралары әзірленіп, жетілдірілді. Ірі қара малдың пироплазмидоздарын емдеу кезінде сиыр дене салмағының 3 мг/кг мөлшерінде узбикарбаны қолдану тиімділігі айқындалған. Тейлероздың алдын алу мақсатында дайындалған поликарб препаратының тиімділігі 15 күнді құрады, жұмсалған 1 сомға 7,6 сом экономикалық пайда алынды.

Key words: *theilerosis, pyroplasmosis, prophylaxis, diamidin, uzbicarb, polycarb, berenil, infection, azidin.*

Түйін сөздер: *тейлероз, пироплазмоз, профилактика, диамидин, узбикарб, поликарб, беренил, инфекция, азидин.*

Introduction. Among the invasive diseases pyroplasmosis, cattle theilerosis are the most insidious diseases, the causative agents of which are transmitted by the animals to certain species of pasture blood-sucking ticks. The study of these diseases was started from the first days of the organization of the institute. At the same time, the great attention of Native scientists was focused on the study of the fauna of ixodic ticks in the republic, the identification of ticks of carriers of pathogens of pyroplasmidosis of animals and the study of fauna and biology. A large amount of work has been done to develop methods of struggle against ixodic ticks that are introduced into production. Simultaneously, there were conducted studies pyroplasmidosis causative agents of cattle and the search for means of struggle and prevention in these diseases. Along with this, measures of struggle, diagnostics, therapy, special and chemical prophylaxis, control of the epizootic state of pyroplasmidosis were also developed and improved [1].

Taking into consideration that such work is needed and necessary for the development of livestock, many domestic scientists have developed various ways and means against pyroplasmidosis of cattle. So, in 1936-1941 and 1946-1955 years, Head of the laboratory of protozoology, Professor A.V. Bogoroditsky established the therapeutic and prophylactic properties of the preparations of ihtargan, albargen, tripanblau, hemosporidin in pyroplasmidosis of cattle and introduced them into veterinary practice [10].


P.A. Lavrentev in 1956-1958 years studied the morphology, biology, immunobiological properties of the causative agents of pyroplasmidosis, developed a number of means and ways to struggle against these diseases [11].

In the period 1959-1965 years P.N. Lee and I.Kh. Rasulov approved the therapeutic and prophylactic properties of the drugs berenil, azidine, which they introduced into the production practice. This is a huge contribution of scientists, concerning the protection of animals from pyroplasmidosis [2].

The scientific activity of the staff of the laboratory of protozoology under the guidance of Professor T.Kh. Rakhimov (1969-1993) was directed to the study of epizootology of protozoan diseases of cattle, biology, morphology of pathogens and the development of means and methods of treatment. Based on the results of the research, methods of treatment with diamidin, ABP (acrichin + bigumal + plasmacid), delagilum, which have been introduced into veterinary practice, have been developed. After the independence of the Republic, all these developments and means lost their importance. Therefore, the need arose to create domestic antiprotozoal drugs in the Republic of Uzbekistan [2].

Scientists of the Faculty of Chemistry of the National University synthesized the antiprotozoal drug Uzbicarb (patent for invention of the Republic of Uzbekistan No. 1AP03933). Uzbicarb is an analogue of diamidin, which was previously produced in the Russian Federation, and then synthesized in our Republic.

Along with this, preparations of polyamidine, and then polycarb have been developed which have prophylactic properties in pyroplasmosis and teilerosis. The polymeric complex of polycarb (this is a conditional name) is a 4% solution of uzbicarb with an apple pectin:



The antiprotozoal preparation of polycarb leads to deformation of the parasite, disrupts the metabolism, stops the synthesis of DNA. As a result, the life cycle of the parasite is disrupted.

The purpose of the research. The study of the therapeutic and prophylactic properties of uzbicarb and polycarb in pyroplasmosis and the theilerosis of cattle.

Tasks:

1. Study of the medicinal properties of uzibicarb in pyroplasmosis and theilerosis of large stock.

2. Study of the prophylactic properties of polycarb in pyroplasmosis and the theilerosis of cattle.

3. Conduction of production tests of polycarb.

4. Determination of economic efficiency.

Materials and methods. Scientific-Research works on the study of the therapeutic properties of uzibicarb in pyroplasmosis was performed both in experimental and in production conditions. Under experimental conditions, the animals were infected with blood from spontaneously sick animals. Before and during the experiments, the experimental animals underwent clinical and parasitological examinations. During the clinical examination, the body temperature, pulse and respiration rate were measured, the condition of visible mucous membranes, the presence of bloody urine, the condition of the superficial lymph nodes were observed. For the detection of bloodparasites, smears were prepared from peripheral blood and the degree of erythrocyte involvement by parasites was determined. The smears were fixed with ethyl alcohol and stained using Romanovsky's method by Azur-Eosin.

Results of the research. The study of the therapeutic efficiency of uzbicarb in pyroplasmosis under experimental conditions was carried out on 6 heads of experimental animals aged 10-12 months. The animals were infected with the invasive blood of pyroplasmosis. Every day a clinical and parasitological study was carried out in the result of which on the 8th day after infection in the experimental animals appeared clinical signs of pyroplasmosis and parasitemia in the blood. After that, the experimental animals were divided into 2 groups in each of 3 animals.

1-group was treated with uzibicarb in a dose of 2 mg / kg of animals, and the second 3 mg/kg. As a result, clinical and parasitological studies established that uzbicarb at a dose of 2 mg / kg of animal mass was not very effective, and at that time the use of a dose of 3 mg / kg was effective.

Production trials of uzibicarb were carried out on 14 spontaneously deceased with pyroplasmosis animals in the Umed-B farm of the Djizak region.

Before treatment, the body temperature of animals was 40.4-40.6 C, the pulse and respiration rates were frequent, hemoglobinuria and depression were observed. In smears taken from the transfusion blood, 2-3% of erythrocyte involvement was detected by pyroplasm. Patients were subcutaneously injected with uzbicarb at a dose of 3 mg/kg. 24 hours after treatment, the condition of animals improved, body temperature decreased to physiological norm, and in smears taken from peripheral blood, pyroplasm were not detected.

Consequently, the use of uzbicarb in a dose of 3 mg/kg was accompanied by a pronounced therapeutic efficiency in pyroplasmosis of large cattle.

Comparative studies of the therapeutic efficiency of uzbicarb and the combination with buprolex in teilerosis were performed in 3 groups of animals in each of 3 heads. The animals were infected with blood taken from a spontaneously diseased animal body, subcutaneously in a dose of 10 ml.

After the appearing of clinical signs and parasitemia in the blood, the first group of animals was treated with uzbicarb, a second with buproplex at a dose of 5.0 ml per 100 kg of live weight of animals and a third with buprolex in combination with uzbicarb.

As a result of clinical and parasitological studies, it was found that the general condition did not change for the first group of animals in 2-3 days after the treatment, in the second group slightly improved, and in the third group the general condition improved, the parasitemia in the blood and body temperatures decreased to 40, 2 0C, there appeared an appetite and a chewing.

Therefore, izbicarb in the applied dose did not give a positive effect, buprolex gave weak and buprolex in combination with uzbicarb gave expressed therapeutic efficiency (Table-1).

Table 1 -A study of the comparative therapeutic efficiency of uzbicarb in combination with buprolex

Gr. of animals	Number of animals	Method of treatment	Clinical condition and parasitemia on the first day of	Clinical condition and parasitemia on the third day of	Results

			treatment	treatment	
1	3	Uzbicarb in a dose of 3 mg/kg	General condition of the depressed, T040,6-41,0 parasite reaction 6-8%	The general condition is depressed, T040,6-41,0 parasitic reactions 6-8%	There is no curative effectiveness
2	3	Buprollex in a dose of 5.0ml per 100 kg of live weight of animals	General condition of the depressed, T040,6-41,0 parasite reaction 6-8%	The general condition slightly improved, T0 40.6-40.7 parasitic reaction 5-6%	Therapeutic efficiency is weak
3	3	Buprolex at a dose of 5.0 ml per 100 kg and Uzbicarb at a dose of 3 mg / kg of live weight of animals	The general condition is depressed, T040,6-41,0 parasitic reactions 6-8%	The general condition improved, T0 decreased to 40.2 and the parasitic response to 3%	Therapeutic efficiency is expressed

Experiments on studying the prophylactic properties of polycarb in experimental pyroplasmosis and theilerosis were carried out in 2 groups of animals in each of 3 heads.

Experimental animals of both groups were injected subcutaneously with 5.0 ml of polycarb per 100 kg of live weight of animals. Then, after 15 days, the first group was infected with pyroplasmosis and 2nd with theilerosis. Within 30 days, daily clinical and parasitological studies were performed.

As a result of the conducted studies, it was established that the polycarb when modified based on uzbicarb with apple pectin has prophylactic efficiency for pyroplasmosis and theilerosis during 15 days (Table-2).

Table 2-Study of prophylactic properties of polycarb in pyroplasmosis and theilerosis

Gr. of animals	Number of animals	Method of prevention	Ways of infection	Results
1	3	Subcutaneously injected polycarb in a dose of 5.0 ml per 100 kg of live weight of animals	Infected with pyroplasmosis	Within 15 days after infection, the clinical and parasitic reactions of pyroplasmosis were not detected
2	3	Subcutaneously injected polycarb in a dose of 5.0 ml per 100 kg of live weight of animals	Infected with Teilerosis	Within 30 days after infection, the clinical and parasitic reactions of the theilerosis behind were not manifested

Thus, the preventive efficiency of polycarb in pyroplasmosis and theilerosis is up to 15 days.

Consequently, the application of polycarb with the preventive purpose of pyroplasmosis and theilerosis is advisable.

Experiments on the production test of polycarb were carried out in the Agroistiklol farm of the Kamashinsky district of the Kashkadarya region on 284 adult heads and 150 head of young animals.

The drug was applied every 15 days to 5.0 ml per 100 kg of live weight of animals. As a control, Dungsanchikul farms were used on which no drug was used (Table-3).

Table-3 Results of the application of polycarb in production conditions

Group	Economy	Heads	Epizootic state in 2015	Results of applying polycarb in the current year					
				April	May	June	July	August	Sptember
Experimental.	Agroistiklol	434	Brought in February of 2016from Australia	-	-	-	2 heads fell ill with teilerosis	-	-
Control	Dungsan chukul	140	Twelve headaches were caused by the disease, pyroplasmosis of 2 heads	2 heads fell ill with teilerosis	2 headss fell ill with Piroplasmosis	3 heads fell ill with teileros is	5 heads fell ill with teilerosis	1 head fell ill with teilerosis	-

As a result of the production experience, it has been established that the polycarb used in every 15 days in active life of the tick mites has a pronounced preventive effect in pyroplasmosis and the theilerosis of cattle.

Conclusions.

- the application of uzbicarb in a dose of 3 mg / kg has therapeutic efficiency in pyroplasmosis, and does not possess in the case of theilerosis;
- a one-time application of buprolix in a dose of 5.0 ml per 100 kg of live weight of animals has weak therapeutic effectiveness;
- the use of uzbicarb in a dose of 3 mg / kg and the combination of buprolix in a dose of 5.0 ml per 100 kg of live weight of animals has high therapeutic efficiency;
- the use of polycarb in a dose of 5.0 ml per 100 kg of live weight of animals prevents pyroplasmosis and theilerosis during 15 days;
- 99% of efficiency was obtained from the use of polycarb in production experiments and 7.6 sums of economic benefit was received for the spent 1 sum.

REFERENCES

1. Gafurov, A.G. Development of protozoological science in Uzbekistan [Text] / A.G. Gafurov // Agriculture of Uzbekistan. - 1999. -№ 3.- P.26-27.
2. Gafurov, A.G. The main results and prospects of scientific research on the study of epizootic situations, development of methods of therapy and prevention of protozoan animal diseases in Uzbekistan [Text] / A.G. Gafurov // Monitoring of the spread and prevention of especially dangerous diseases of animals and birds: Sat. Materials of the 4th international. Sci. Conf. - Samarkand, 2011. - P. 66-69.
3. Karimov, O. Pyroplasmidosis diseases of cattles. [Text] / O. Karimov // U. U. Economical magazine, 2001.- No. 1. -P.58-59.
4. Turaboev, N.J. Epizootic state of Pyroplamidosis disease Agriculture of Uzbekistan [Text] / N.J. Turaboev // Tashkent, -2001.-No. 4- P.62-63.
5. Muhitdinovich, D. V. Methods of therapy and prophylaxis of pyroplasmosis and tayleriosis of large cattle. [Text] / D. V. Muhitdinovich [and etc.] //ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal,11(9). -2021.- P.680-686.
6. Duskulov, V. M. Novые sposobы terapii i profilaktiki piroplazmoza i teylerioza krupnogo rogatogo skota. [Text] / V. M. Duskulov [and etc.]// InОbщestvo XXI veka: vыzovы i perspektivы.- 2017.- pp. 12.
7. Gafurov, A.G. Mer-borbы piroplazmidozov krs ot kroveparazitarnых bolezney. [Text] / A.G. Gafurov // Zooveterinariya (Tashkent), (3), -2013. -P- 21.
8. Gafurov, A.G. Mer-borbы piroplazmidozov krs ot kroveparazitarnых bolezney. [Text] / A.G. Gafurov [and etc.] // Zooveterinariya (Tashkent). - 2013.- P. 21.

9. Duskulov, V. M. Covremennыe metodы terapii i profilaktiki piroplazmidozov krupnogo rogatogo skota. [Text] / V. M. Duskulov [and etc.]// Veterinarna meditsina, (97), -2013.- P. 379-380.

10. Seredkin, V.A. Methodological recommendations for determining the economic damage from diseases of farm animals. [Text]/ V.A. Seredkin [and etc.]// Samarkand. Taylak. -1994. -P.132.

11. Shatokhin, Yu.E. A technique for determining the economic efficiency of veterinary measures [Text] / Yu.E. Shatokhin // M: MGAVMiB im. KI Skriabin, -1997. -p.36.

РЕЗЮМЕ

Среди инвазионных болезней пироплазмоз, тейлероз крупного рогатого скота являются наиболее коварными заболеваниями, возбудители которых передаются животными некоторым видам пастбищных кровососущих клещей. Изучение этих болезней было начато с первых дней организации института. В то же время большое внимание отечественных ученых было направлено на изучение фауны иксодовых клещей в республике, выявление клещей переносчиков возбудителей пироплазмидозов животных и изучение фауны и биологии. Проведена большая работа по разработке методов борьбы с иксодовыми клещами, внедряемыми в производство. Одновременно проводились исследования возбудителей пироплазмидозов крупного рогатого скота и поиски средств борьбы и профилактики при этих заболеваниях. Наряду с этим разрабатывались и совершенствовались меры борьбы, диагностики, терапии, специальной и химиопрофилактики, контроля эпизоотического состояния пироплазмидозов. При лечении пироплазмидозов крупного рогатого скота определена эффективность применения узбикарба в дозе 3 мг/кг массы тела коровы. Эффективность препарата поликарб, изготовленного с целью профилактики от тейлероза, составила 15 дней, получено 7,6 сумов экономической выгоды на затраченный 1 сумов.

ӘОЖ: 636.2:636.082.12
ҒТАХР: 34.23.59

Ульянова Т.В., PhD, **негізгі авторы,** https://orcid.org/0000-0002-4814-2601
«Жәңгір хан атындағы Батыс Қазақстан аграрлық-техникалық университеті» КеАҚ, Орал қ., Қазақстан, tatyana.poddudinskaya@gmail.com
Ковальчук А.М., PhD, https://orcid.org/0000-0002-4106-4954
«Жәңгір хан атындағы Батыс Қазақстан аграрлық-техникалық университеті» КеАҚ, Орал қ., Қазақстан, kovalchuk_s89@mail.ru
Ульянов В.А., PhD, https://orcid.org/0000-0002-7500-1601
«Жәңгір хан атындағы Батыс Қазақстан аграрлық-техникалық университеті» КеАҚ, Орал қ., Қазақстан, vadimkst@mail.ru
Бейшов Р.С., PhD, https://orcid.org/0000-0002-6114-0002
«А. Байтұрсынов атындағы Қостанай өңірлік университеті» КеАҚ, Қостанай қ., Қазақстан, mr.rus.kvn@mail.ru

Ulyanova T.V., PhD, **the main author,** https://orcid.org/0000-0002-4814-2601
NJSC «West Kazakhstan Agrarian and Technical University named after Zhangir khan», Uralsk, Kazakhstan, tatyana.poddudinskaya@gmail.com
Kovalchuk A.M., PhD, https://orcid.org/0000-0002-4106-4954
NJSC «West Kazakhstan Agrarian and Technical University named after Zhangir khan», Uralsk, Kazakhstan, kovalchuk_s89@mail.ru
Ulyanov V.A., PhD, https://orcid.org/0000-0002-7500-1601

NJSC «West Kazakhstan Agrarian and Technical University named after Zhangir khan», Uralsk, Kazakhstan, vadimkst@mail.ru
Beishov R.S., PhD, https://orcid.org/0000-0002-6114-0002
NJSC «Akhmet Baitursynuly Kostanay Regional University», Kostanay, Kazakhstan, mr.rus.kvn@mail.ru

ҚАЙТА СЕКВЕНИРЛЕУ ӘДІСІМЕН ҚАЗАҚТЫҢ АҚБАС ТҰҚЫМДЫ ІРІ ҚАРА МАЛЫНЫҢ ТОЛЫҚ ГЕНОМЫН ТАЛДАУ

ANALYSIS OF THE COMPLETE GENOME OF KAZAKH WHITE-HEADED CATTLE BY RESEQUENCING METHOD

АНДАТПА

Мақалада Қазақстанда толық геномдық секвенирлеу нәтижесінде алынған қазақтың ақбас тұқымды ірі қара малы геномының алғашқы сипаттамасы ұсынылған. Қазақтың ақбас тұқымының эталондық бұқаларынан қан мен қыл сынамалары жиналды. ДНҚ «ДНК Экстран-2» (ООО «Синтол» ЖШС, Ресей) және «PureLink Genomic DNA Mini Kit» (Invitrogen, АҚШ) коммерциялық жиынтықтары арқылы бөлініп алынды. ДНҚ-ның сапалық бағалау агарозды гель-электрофорез көмегімен, ал сандық бағалау Agilent Cary 60 спектрофотометрінде жүргізілді. Үлгілер cPAS түрі бойынша DNBSEQ-G400 платформасында жұптық ұштары 150 ж.н. ұзындығымен секвенирленді, әр үлгіге кемінде 9 ГБ дерек генерацияланды. BWA 0.7.17 бағдарламасы арқылы қазақтың ақбас тұқымының геномы Bos taurus ARS-UCD2.0 (GCF_002263795.3) соңғы қолжетімді эталондық тізбегімен салыстырылды. Геномда 21 742 полиморфты вариант анықталды, транзициялар/трансверсиялар арақатынасы 1,79-ді құрады. Осылайша, қазақтың ақбас тұқымының геномын қайта секвенирлеу етті ірі қара шаруашылығын дамыту және бұл тұқымның генетикалық қорын сақтау үшін маңызды рөл атқарады. Бұл жұмыстың нәтижелері қазақтың ақбас тұқымды ірі қара малының негізгі шаруашылыққа пайдалы белгілерінің қалыптасу негізінде жатқан генетикалық механизмдерді одан әрі зерттеуге, сондай-ақ тиісті генетикалық маркерлерді әзірлеуге негіз болады.

ANNOTATION

The article presents the first characterisation of the genome of Kazakh white-headed cattle obtained as a result of complete genomic sequencing in Kazakhstan. Blood and hair bulb samples were collected from reference bulls of the Kazakh white-headed breed. DNA was extracted using commercial DNA kits ‘Extran-2’ (Syntol LLC, Russia) and ‘PureLink Genomic DNA Mini Kit’ (Invitrogen, USA). DNA was qualitatively assessed by agarose gel electrophoresis and quantitatively assessed on an Agilent Cary 60 spectrophotometer. Samples were sequenced by cPAS typing on a DNBSEQ-G400 platform in paired-end mode with a read length of 150 bp, generating at least 9 GB of data per sample. Using the BWA 0.7.17 programme, the genome of the Kazakh white-headed breed was compared with the latest available Bos taurus ARS-UCD2.0 reference sequence (GCF_002263795.3). A total of 21,742 polymorphic variants were identified in the genome, and the transitions/transversions ratio was 1.79. Thus, resequencing of the Kazakh white-headed breed genome plays an important role in the development of beef cattle breeding and preservation of the gene pool of this breed. The results of this work provide a basis for further studies of genetic mechanisms underlying the formation of key economically useful traits of the Kazakh white-headed cattle breed, as well as for the development of appropriate genetic markers.

Түйінді сөздер: *ірі қара мал, қазақтың ақбас тұқымы, ДНҚ, геном, қайта секвенирлеу*
Key words: *cattle, Kazakh white-headed breed, DNA, genome, resequencing*

Кіріспе. 2009 жылы ірі қара мал (ІҚМ) геномын секвенирлеу және жинақтау толық аяқталды [1]. Генотиптеудің жаңа жоғары өнімді технологияларының дамуы ІҚМ геномын зерттеуде бір нуклеотидті полиморфизмдерге (single nucleotide polymorphism, SNP) негізделген ДНҚ маркерлерін кеңінен қолдануға алып келді [2]. Олардың талдауына негізделген қазіргі заманғы геномдық бағалау әдісі жануар ДНҚ-сын зерттеп, оның тізбегіндегі нуклеотидтердің ауысуын анықтауды көздейді.

Қазіргі уақытта жергілікті тұқымдарды шетелдік коммерциялық тұқымдармен алмастыру немесе оларды жетілдіру үрдісі белең алуда. Осыған байланысты жергілікті тұқымдардың генетикалық әртүрлілігі, жергілікті жағдайларға бейімделу іздері мен тарихи байланыстар жөніндегі ақпарат геномдарында шифрланған күйінде қалып, зерттеліп үлгермей жойылып кету қаупі бар [3]. Екінші жағынан, жергілікті популяциялар коммерциялық тұқымдарды жетілдіру үшін бағалы генетикалық вариациялардың көзі бола алады [4, 5, 6].

Секвенирлеу – ірі қара мал популяцияларының генетикалық әртүрлілігін сипаттау және табиғи, әрі қолдан сұрыптау жағдайындағы геномдық аймақтарды анықтау үшін үлкен көлемде геномдық мәлімет берді [7, 8].

Жергілікті ІҚМ тұқымдары селекция жүргізу және жаңа тұқымдар шығару үшін бағалы генетикалық әлеуетке ие болуы мүмкін [6]. Қазақстан Республикасы үшін осындай тұқымдардың бірі – қазақтың ақбас тұқымы. Бұл тұқым 1930-1950 жылдар аралығында Қазақ КСР аумағында туран-монғолдық қазақ және қалмақ ірі қарасын герефордтармен будандастыру арқылы қалыптастырылған [9]. Бүгінгі таңда ол еліміздегі ең кең таралған ет бағытындағы ІҚМ тұқымдарының бірі. Қазақтың ақбас тұқымы Қазақстанда мамандандырылған етті мал шаруашылығының қалыптасуы мен дамуына үлкен үлес қосты және оны елдің көптеген аймақтарында табысты өсіруде [10].

Қолда бар әдебиеттерде жергілікті ІҚМ популяцияларына қатысты осындай зерттеулер кездеспейді. Алайда, қазақтың ақбас тұқымының тек Ресейдегі популяциясының құрылымын заманауи геномдық технологияларды қолдану арқылы зерттеуге және олардың геномдарындағы сұрыптау іздерін іздеуге арналған жұмыстар бар [11-13]. Осы зерттеудің мақсаты – Қазақстан Республикасында өсірілетін қазақтың ақбас ірі қара малының геномын қайта секвенирлеу.

Материалдар және зерттеу әдістері. Зерттеу нысаны ретінде қазақтың ақбас ірі қара малының іріктемесі алынды. Бұл топ жасы мен жынысы бойынша теңестірілген, фенотиптік көрсеткіштері тұқым стандартына сәйкес құралды. Зерттеу үшін ең типтік эталондық бұқалардың қаны мен қыл үлгілері: «Әлем» ШҚ (Батыс Қазақстан облысы, Жәнібек ауданы, Жәнібек ауылы, n=12) және «Нарын» ШҚ (Батыс Қазақстан облысы, Бөкейорда ауданы, Бөрлі ауылы, n=15) жиналды.

ДНҚ бөлінуі «ДНК Экстран-2» («Синтол» ЖШС, Ресей) және «PureLink Genomic DNA Mini Kit» (Invitrogen, АҚШ) жинақтарының көмегімен жүзеге асырылды. ДНҚ сапасы 1%-дық агарозды гельде тексерілді. Концентрациясы Agilent Cary 60 спектрофотометрінде өлшенді. Секвенирлеуге дайындық VAHTS Universal DNA Library Prep Kit for MGI (Vazym) жинағы арқылы жүргізілді. Алынған кітапханалар пулдарының сапасын бақылау Qsep400 (BiOptic, Тайвань) жүйесі арқылы жүзеге асырылды, ал олардың сандық бағалауы Qubit2.0 құрылғысында HS dsDNA HS Assay (ThermoFisher Scientific) реактивтер жинағын қолдану арқылы жүргізілді.

Үлгілерді секвенирлеу DNBSEQ-G400 платформасында CPAs типі бойынша ұзындығы 150 ж.н. жұп ұшты секвенирлеу режимінде жүргізілді, бір үлгіге кемінде 9 ГБ дерек алынды.

Алынған секвенирлеу деректері келесі протокол бойынша талданды. Адаптерлік тізбегі бар немесе сапасы төмен тізбектер SOAPnuke (BGI әзірлеген) бағдарламалық жасақтамасының көмегімен сүзіліп алынды. Оқылымдарды ІҚМ эталонды геномымен сәйкестендіру BWA 0.7.17 бағдарламасы арқылы орындалды. ІҚМ геномының эталондық жинағы ретінде ARS-UCD2.0 (GCF_002263795.3) қолданылды. SamTools 1.19.2

бағдарламасы индекс жасау, сұрыптау және қайталанатын оқылымдарды жою үшін пайдаланылды. Нұсқаларды анықтау, олардың сапа бойынша фильтрациясы (DP шегі>= 20) және статистикалық талдауы Bcftools 1.13 бағдарламасы арқылы жүргізілді.

Зерттеу нәтижелері. Алғашқы алынған ДНҚ үлгілері агарозды гельдегі электрофорез әдісімен деградация деңгейі бойынша бағаланды. ДНҚ концентрациясын анықтау үшін Agilent Cary 60 спектрофотометрі қолданылды. ДНҚ-ның орташа концентрациясы 82,5 ng/µl құрады, ал A260/A280 қатынасы 1,6 болды, бұл қайта секвенирлеу үшін жеткілікті көрсеткіш.

Секвенирлеу үшін cPAS (Combinatorial Probe-Anchor Synthesis) әдісі қолданылды, бұл cPAL (Combinatorial Probe-Anchor Ligation) секвенирлеу әдісінің модификацияланған түрі. Секвенирлеудің бастапқы кезеңінде DNB-ге секвенирлеу праймері (Ancor) жалғанды. Кейіннен төрт түрлі нуклеотид, әрқайсысы ерекше флуоресцентті маркермен таңбаланған, реакцияға қосылды. Нуклеотидтер инкорпорацияланғаннан кейін, реакциядан спецификалық емес қалдықтар жойылды. Флуоресцентті белгілер детекцияланып, кейін ажыратылып, ағынды ұяшық жуылды.

Алынған тізбектер бастапқы фильтрациядан өткізіліп, BWA 0.7.17 бағдарламасының көмегімен Ensembl Genome Browser [14] деректер қорындағы ARS-UCD1.2 (GCF_002263795.3) эталонды геномымен сәйкестендірілді. Геномдағы жұп негіздердің жалпы саны – 2 715 853 792. Кодтаушы гендер саны – 21 880, кодталмайтын гендер саны – 5 235. Сонымен қатар, жинақта 492 псевдоген анықталды.

Кесте 1 – Қазақтың ақбас тұқымды ірі қара малында анықталған полиморфты нұсқалардың сипаттамалық статистикасы

№ 5-5 үлгісі	Саны
Нұсқалардың жалпы саны	21742
SNP саны	20130
Делециялар/инсерциялар (indels) саны	1612
Көп аллельді нұсқалардың саны	49
Көп аллельді SNP саны	19
Транзициялар	12935
Трансверсиялар	7226
Транзициялар/трансверсиялар (Ts/Tv)	1.79
Транзициялар (қосымша нұсқалар жоқ)	12930
Трансверсиялар (қосымша нұсқалар жоқ)	7200
Транзициялар/трансверсиялар (қосымша нұсқалар жоқ)	1.80

Референстік геномнен салыстырғанда барлығы 21 742 полиморфты нұсқа анықталды (1-кесте). Нұсқалардың басым бөлігі (92,59%) екіаллельді бірнуклеотидті полиморфизмдер (SNP) болды. Инсерция/делеция (InDels) нұсқалары 7,41%-ды құрады. Қазақтың ақбас тұқымына тән SNP-лерді болашақта тұқымдық сипаттамаларды зерттеуде қолданып, ал тұқымдар арасындағы туыстық деңгейі жалпы SNP саны бойынша анықталуы мүмкін.


Анықталған SNP сапасын бағалау үшін транзиция/трансверсия (Ts/Tv) қатынасы есептелді және ол 1,79-ға тең болды (1-кесте). Бұл мән ірі қара малдың әртүрлі тұқымдары бойынша жүргізілген алдыңғы зерттеулердің нәтижелерімен сәйкес келеді [15], бұл осы зерттеуде алынған SNP деректерінің жоғары сапасын көрсетеді.

1-суретте сапа бойынша сұрыпталған генетикалық нұсқалар үшін транзиция/трансверсия (Ts/Tv) қатынасын көрсететін график берілген. Графиктен транзиция/трансверсия қатынасы 1.0-ден 2.75-ке дейін өзгеретіні көрінеді.

Графиктегі тұтас сызық (Cumulative Ts/Tv) сайттар санының артуына қарай жалпы Ts/Tv қатынасын көрсетеді. Бұл сызық бастапқыда шамамен 2.2 мәнінен басталып,

біртіндеп төмендеп, 1.5-тен төмен деңгейде аяқталады, бұл сапа төмендеген сайын қатынастың да төмендейтінін көрсетеді.

Пунктирлі сызық (Per 1% bins) әр 1% сайт аралығындағы Ts/Tv қатынасын көрсетеді. Ол 1.0-ден 2.75-ке дейінгі аралықта тербеліс жасап, шыңдау мен төмендеу байқалады, бұл сапаға байланысты Ts/Tv қатынасының өзгергіштігін көрсетеді.



Сурет 1 – Нұсқалардың сапасына қарай сұрыпталған транзиция/трансверсия қатынасының графигі

Жоғары сапалы сайттарда (графиктің сол жақ бөлігі) Ts/Tv қатынасы жоғары, бұл күтілетін жағдай, өйткені транзициялар эволюциялық тұрғыдан жиі кездеседі және бейтарап болады. Ts/Tv қатынасы сапасы төмен сайттарға ауысқан сайын төмендейді, бұл әдетте сирек кездесетін және қателерге бейім трансверсиялар санының артуына байланысты болуы мүмкін.

Қорытынды. Біз жүргізген зерттеу барысында қазақтың ақбас тұқымды ірі қара малының толық геномдық қайта секвенирлеу әдісімен талдауы ұсынылды. Бұл үшін DNBSEQ-G400 платформасы қолданылды. Таңдалған секвенирлеу әдісі зерттелген ірі қара мал үлгілерінде 20 130 SNP және 1 612 InDels нұсқаларын анықтауға мүмкіндік берді. Осылайша, қазақтың ақбас тұқымының геномын қайта секвенирлеу бұл тұқымды сақтау және ет бағытындағы мал шаруашылығын дамытуда маңызды рөл атқарады. Бұл зерттеу қазақтың ақбас тұқымды ірі қара малының негізгі шаруашылыққа пайдалы белгілерінің қалыптасуында жатқан генетикалық механизмдерді әрі қарай зерттеу үшін негіз болады. Сондай-ақ, ол тиісті генетикалық маркерлерді әзірлеуге мүмкіндік береді.

Алғыс. Бұл жұмыс Қазақстан Республикасы Ғылым және жоғары білім министрлігінің 2023-2025 жылдарға арналған гранттық қаржыландыру жобасы AP19680057 «Қайта секвенирлеу және транскриптомдық талдау әдісімен қазақтың ақбас тұқымды ірі қара малының шаруашылыққа пайдалы белгілерін және генофондының сипаттамасын зерттеу» (мемлекеттік тіркеу нөмірі: 0123РК00236) аясында орындалды.

ӘДЕБИТТЕР ТІЗІМІ

1. 1 Bovine Genome Sequencing and Analysis Consortium. The genome sequence of taurine cattle: a window to ruminant biology and evolution [Text] / Bovine Genome Sequencing and Analysis Consortium // Science. – 2009. – V. 324(5926). – P. 522-528. doi: 10.1126/science.1169588.

2. Shen, R. High-throughput SNP genotyping on universal bead arrays [Text] / R. Shen, J.B. Fan, D. Campbell, et al. // Mutation Research. – 2005. – V. 573(1-2). – P. 70-82. doi: 10.1016/j.mrfmmm.2004.07.022.

3. Gaouar, S.B. Admixture and local breed marginalization threaten Algerian sheep diversity [Text] / S.B. Gaouar, A. Da Silva, E. Ciani, et al. // PLoS One. – 2015. – V. 10(4). – P. e0122667-1- e0122667-13. doi: 10.1371/journal.pone.0122667.

4. Gao, Y. Single Cas9 nickase induced generation of NRAMP1 knockin cattle with reduced off-target effects [Text] / Y. Gao, H. Wu, Y. Wang, et al. // Genome Biol. – 2017. – V. 18(1). – P. 13-1-13-15. doi: 10.1186/s13059-016-1144-4.

5. Beynon, S.E. Population structure and history of the Welsh sheep breeds determined by whole genome genotyping [Text] / S.E. Beynon, G.T. Slavov, M. Farré, et al. // BMC Genet. – 2015. – V. 16. – P. 65-1-65-15. doi: 10.1186/s12863-015-0216-x.

6. Kantanen, J. Utilization of farm animal genetic resources in a changing agro-ecological environment in the Nordic countries [Text] / J. Kantanen, P. Lovendahl, E. Strandberg, et al. // Front. Genet. – 2015. – V. 6. – P. 52-1-52-9. doi: 10.3389/fgene. 2015.00052.

7. Chen, N. BGVD: An Integrated Database for Bovine Sequencing Variations and Selective Signatures [Text] / N. Chen, W. Fu, J. Zhao, et al. // Genomics Proteomics Bioinformatics. - 2020. - V. 18(2). - P. 186-193. doi: 10.1016/j.gpb.2019.03.007.

8. van Binsbergen, R. Genomic prediction using imputed whole-genome sequence data in Holstein Friesian cattle [Text] / R. van Binsbergen, M.P. Calus, M.C. Bink, et al. // Genet. Sel. Evol. - 2015. - V. 47. - P. 71-1-71-13. doi: 10.1186/s12711-015-0149-x.

9. Dmitriev, N.G. Animal genetics resources of the USSR [Text] / N.G. Dmitriev, L.K. Ernst // Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome, Italy. - 1989. - http://www.fao.org/docrep/009/ah759e/ah759e00.html.

10. Омбаев, А.М. Современные тенденции развития аграрной науки Казахстана в области животноводства [Текст] / А.М. Омбаев // Известия Национальной академии наук Республики Казахстан. - 2013. - № 6. - С. 3-18.

11. Yudin, N.S. Population structure and phylogeny of the Russian cattle breeds determined by whole genome genotyping [Text] / N.S. Yudin, A. Yurchenko, R. Aitnazarov, A. Plyusnina, D.M. Larkin // Plant & Animal Genome XXV (PAGXXV). - 2017. – P. 1069.

12. Igoshin, A. Genome-wide association study for body temperature maintenance under the cold stress in Siberian cattle [Text] / A. Igoshin, N. Belonogova, A. Yurchenko, Yudin N., et al. // 11-ая Международная конференция по биоинформатике регуляции и структуры геномов и системной биологии. – 2018. - 10.18699/BGRSSB-2018-183.

13. Yurchenko, A.A. Scans for signatures of selection in Russian cattle breed genomes reveal new candidate genes for environmental adaptation and acclimation [Text] / A.A. Yurchenko, H.D. Daetwyler, N. Yudin, et al. // Sci Rep. - 2018. – V. 8. – P. 12984-1-12984-16. doi: 10.1038/s41598-018-31304-w.

14. Martin, F.J. Ensembl [Text] / F.J. Martin, M.R.Amode, A. Aneja, et al. // Nucleic Acids Res. – 2023. – V. 51(D1). – P. D933-D941. doi:10.1093/nar/gkac958.

15. Das, A. Deep sequencing of Danish Holstein dairy cattle for variant detection and insight into potential loss-of-function variants in protein coding genes [Text] / A. Das, F. Panitz, V.R. Gregersen, et al. // BMC genomics. - 2015. – V. 16(1). – P. 1-12. doi: 10.1186/s12864-015-2249-y.

REFERENCES

1. 1 Bovine Genome Sequencing and Analysis Consortium. The genome sequence of taurine cattle: a window to ruminant biology and evolution [Text] / Bovine Genome Sequencing and Analysis Consortium // Science. – 2009. – V. 324(5926). – P. 522-528. doi: 10.1126/science.1169588.

2. Shen, R. High-throughput SNP genotyping on universal bead arrays [Text] / R. Shen, J.B. Fan, D. Campbell, et al. // Mutation Research. – 2005. – V. 573(1-2). – P. 70-82. doi: 10.1016/j.mrfmmm.2004.07.022.

3. Gaouar, S.B. Admixture and local breed marginalization threaten Algerian sheep diversity [Text] / S.B. Gaouar, A. Da Silva, E. Ciani, et al. // PLoS One. – 2015. – V. 10(4). – P. e0122667-1- e0122667-13. doi: 10.1371/journal.pone.0122667.

4. Gao, Y. Single Cas9 nickase induced generation of NRAMP1 knockin cattle with reduced off-target effects [Text] / Y. Gao, H. Wu, Y. Wang, et al. // Genome Biol. – 2017. – V. 18(1). – P. 13-1-13-15. doi: 10.1186/s13059-016-1144-4.

5. Beynon, S.E. Population structure and history of the Welsh sheep breeds determined by whole genome genotyping [Text] / S.E. Beynon, G.T. Slavov, M. Farré, et al. // BMC Genet. – 2015. – V. 16. – P. 65-1-65-15. doi: 10.1186/s12863-015-0216-x.

6. Kantanen, J. Utilization of farm animal genetic resources in a changing agro-ecological environment in the Nordic countries [Text] / J. Kantanen, P. Lovendahl, E. Strandberg, et al. // Front. Genet. – 2015. – V. 6. – P. 52-1-52-9. doi: 10.3389/fgene. 2015.00052.

7. Chen, N. BGVD: An Integrated Database for Bovine Sequencing Variations and Selective Signatures [Text] / N. Chen, W. Fu, J. Zhao, et al. // Genomics Proteomics Bioinformatics. - 2020. - V. 18(2). - P. 186-193. doi: 10.1016/j.gpb.2019.03.007.

8. van Binsbergen, R. Genomic prediction using imputed whole-genome sequence data in Holstein Friesian cattle [Text] / R. van Binsbergen, M.P. Calus, M.C. Bink, et al. // Genet. Sel. Evol. - 2015. - V. 47. - P. 71-1-71-13. doi: 10.1186/s12711-015-0149-x.

9. Dmitriev, N.G. Animal genetics resources of the USSR [Text] / N.G. Dmitriev, L.K. Ernst // Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome, Italy. - 1989. - http://www.fao.org/docrep/009/ah759e/ah759e00.html.

10. Ombaev, A.M. Sovremennye tendencii razvitiya agrarnoj nauki Kazahstana v oblasti zhivotnovodstva [Tekst] / A.M. Ombaev // Izvestiya Nacional'noj akademii nauk Respubliki Kazahstan. - 2013. - № 6. - S. 3-18.

11. Yudin, N.S. Population structure and phylogeny of the Russian cattle breeds determined by whole genome genotyping [Text] / N.S. Yudin, A. Yurchenko, R. Aitnazarov, A. Plyusnina, D.M. Larkin // Plant & Animal Genome XXV (PAGXXV). - 2017. – P. 1069.

12. Igoshin, A. Genome-wide association study for body temperature maintenance under the cold stress in Siberian cattle [Text] / A. Igoshin, N. Belonogova, A. Yurchenko, Yudin N., et al. // 11-aya Mezhdunarodnaya konferenciya po bioinformatike regulyacii i struktury genomov i sistemnoj biologii. – 2018. - 10.18699/BGRSSB-2018-183.

13. Yurchenko, A.A. Scans for signatures of selection in Russian cattle breed genomes reveal new candidate genes for environmental adaptation and acclimation [Text] / A.A. Yurchenko, H.D. Daetwyler, N. Yudin, et al. // Sci Rep. - 2018. – V. 8. – P. 12984-1-12984-16. doi: 10.1038/s41598-018-31304-w.

14. Martin, F.J. Ensembl [Text] / F.J. Martin, M.R.Amode, A. Aneja, et al. // Nucleic Acids Res. – 2023. – V. 51(D1). – P. D933-D941. doi:10.1093/nar/gkac958.

15. Das, A. Deep sequencing of Danish Holstein dairy cattle for variant detection and insight into potential loss-of-function variants in protein coding genes [Text] / A. Das, F. Panitz, V.R. Gregersen, et al. // BMC genomics. - 2015. – V. 16(1). – P. 1-12. doi: 10.1186/s12864-015-2249-y.

РЕЗЮМЕ

В статье представлена первая характеристика генома крупного рогатого скота казахской белоголовой породы, полученная в результате полного геномного секвенирования в Казахстане. От эталонных быков казахской белоголовой породы были собраны пробы крови и волосяных луковиц. ДНК выделяли коммерческими наборами ДНК Экстран-2» (ООО «Синтол», Россия) и «PureLink Genomic DNA Mini Kit» (Invitrogen, США). Качественную оценку ДНК проводили с помощью агарозного гель-электрофореза, а количественную оценку - на спектрофотометре Agilent Cary 60. Образцы секвенировали по типу cPAS на платформе DNBSEQ-G400 в режиме парных концов с длиной чтения 150 п.н., генерируя не менее 9 ГБ данных на образец. С использованием программы BWA 0.7.17 геном казахской белоголовой породы сопоставляли с последней доступной эталонной последовательностью Bos taurus ARS-UCD2.0 (GCF_002263795.3). В геноме было идентифицировано 21 742 полиморфных варианта, соотношение транзиций/трансверсий составило 1,79. Таким образом, ресеквенирование генома казахской белоголовой породы

играет важную роль в развитии мясного скотоводства и сохранении генофонда этой породы. Результаты данной работы предоставляют базу для дальнейших исследований генетических механизмов, лежащих в основе формирования ключевых хозяйственно-полезных признаков казахской белоголовой породы крупного рогатого скота, а также для разработки соответствующих генетических маркеров.

УДК: 636.082.22
МРНТИ 68.39.13

Елеугалиева Н. Ж., кандидат сельскохозяйственных наук, https://orcid.org/0000-0002-3845-9031
НАО «Западно-Казахстанский аграрно-технический университет имени Жангир хана», г. Уральск, ул. Жангир хана, 51, 090009, Казахстан nur_el70@mail.ru

Yeleugaliyeva N. Zh., Candidate of Agricultural Sciences, https://orcid.org/0000-0002-3845-9031
NJSC «West Kazakhstan Agrarian and Technical University named after Zhangir khan», Uralsk, st. Zhangir khan 51, 090009, Kazakhstan, nur_el70@mail.ru

КАЧЕСТВО МЯСА И КУРДЮКА МОЛОДНЯКА ЭДИЛЬБАЕВСКОЙ ПОРОДЫ ПРИУРАЛЬЯ
QUALITY OF MEAT AND FAT TAIL OF YOUNG ANIMALS OF THE EDILBAEV BREED IN THE URALS REGION

АННОТАЦИЯ

Последние годы в Казахстане наблюдается большой интерес к эдильбаевским овцам как источнику получение молодой баранины при низкой затраты средств. Учитывая это нами проведены исследования мясных качеств молодняка породы на родине выведения в Западно-Казахстанской области, Жангалинском районе. Исследованиями установлены, что баранчики при рождении весят 5,64 кг, а к возрасту 4- месячному возрасту увеличивают живую массу 8,20 раза и достигают 46,27 кг, масса туши с курдюком составил 21,06 кг (вес курдюк -2,48 кг), соответственно в 7- мес. 62,48 кг и 28,09 кг (вес курдюк -5,87 кг). В возрасте 4 и 7 месяцев их показатели по белку находились на уровне 18,36% и 17,61%, по жиру – 16,97% и 19,63%.

Биохимические анализы мяса баранчиков показали, что в возрасте 4 и 7 месяцев показатели по белку находились на уровне 18,36% и 17,61% соответственно, по жиру – 16,97% и 19,63%. Таким образом белково-жировое соотношения у 4-месячных составили 0,92, а 7-месячных 1,11. Это породные особенности эдильбаевских овец, у них в течение жизни содержание влаги у молодняков снижается, а содержание жира, наоборот, – повышается. Жир ягнятины содержит меньшее количество насыщенных и большее количество ненасыщенных жирных кислот в сравнении с бараниной, поэтому ценность его выше.

ANNOTATION

In recent years, there has been great interest in Edilbaev sheep in Kazakhstan as a source of young lamb at low cost. Taking this into account, we have conducted studies of the meat qualities of young animals of the breed in the homeland of breeding in the West Kazakhstan region, Zhangalinsky district. Studies have shown that rams weigh 5.64 kg at birth, and by the age of 4 months they increase their live weight by 8.20 times and reach 46.27 kg, the carcass weight with fat tail was 21.06 kg (fat tail weight - 2.48 kg), respectively, at 7 months 62.48 kg and 28.09 kg (fat tail weight - 5.87 kg). At the age of 4 and 7 months, their protein indicators were at the level

of 18.36% and 17.61%, for fat - 16.97% and 19.63%. Biochemical analyses of the lamb meat showed that at the age of 4 and 7 months, the protein levels were at the level of 18.36% and 17.61%, respectively, and the fat levels were 16.97% and 19.63%. Thus, the protein-fat ratio in 4-month-olds was 0.92, and in 7-month-olds it was 1.11. These are breed characteristics of the Edilbaev sheep; during their life, the moisture content in young animals decreases, while the fat content, on the contrary, increases. Lamb fat contains fewer saturated and more unsaturated fatty acids compared to mutton, so its value is higher.

Ключевые слова: *эдильбаевская порода, курдюк, баранина, овцы, химический анализ*
Key words: *Edilbaevskaya breed, fat tail, lamb, sheep, chemical analysis*

Введение. Мясное овцеводство перспективно для производства полноценного питания людей белками животного происхождения. За последние годы в мире заметны прогрессивный рост производства баранины, вызванные с их лучшими потребительскими качествами. На это указывают выводы P.F.Fennessy, N.Z. Canterbury [11] увеличивающие производства баранины в ряде странах и работы D.R. Notter et. al [12] о эффективности производства ягнятины, исследовании H.Vermeulen et. al [5] увеличения потребительского спроса на южноафриканскую красное мясо. По мнению G.L. Bennett [10] в рыночных условиях производство молодой баранины является актуальным и требует новых подходов к анализу продуктивности и оценке ряда пород овец. Работах P.D. Fourie et. al [13] указаны важность роста и развития овец, а E. Negussie и другие [3] подчеркивают необходимость наличие жировых отложений и жирного хвоста породы при производстве баранины.

Материалы и методы. Работа проводилась в Западно-Казахстанском агротехническом университете имени Жангир хана, Западно-Казахстанском государственном университете имени М. Утемисова и в Жангалинском районе племенном хозяйстве «Бирлик» - на родине эдильбаевских овец. Исследования проводились на кормовом фоне, сложившемся в хозяйстве. Пастбища овец состояла из разнотравных, включающие - ковыль, типчак, мятлик узколистный и другие. Урожайность травостоев в периоды исследования составила 5,0-5,51 ц/га.

Исходным материалом для проведения опыта послужили молодняк полученные от первоклассных маток эдильбаевской породы. Ягнение опытной группы маток проходило в феврале и динамику живой массы баранчиков определяли путем взвешивания животных при рождении, в 1-, 4- и 7-месячном возрасте, утром до кормления.

Убой овец, определение мясных и убойных качеств проводили в Жангалинском мясокомбинате по КР СТ ГОСТ Р 51447-2010 Мясо и мясные продукты [4], а также по методике В.В. Абонеева и других [8], с помощью контрольного убоя трех животных из каждой группы в возрасте 4 и 7 месяцев. Предубойную массу определяли взвешиванием после 24-часовой голодной выдержки. За убойную массу принимали массу туши и массу внутреннего жира. Убойный выход определяли процентным отношением убойной массы к предубойной. Коэффициент мясности определяли отношением мяса к костям, выраженный в процентах. Степень осаливания измерялась по толщине полива между 12 и 13 грудными позвонками молодняка.

Химический состав мяса проводился в условиях биохимической лаборатории университетов. На основании химического состава была рассчитана калорийность мяса. Показатели качества внутреннего жира: йодное число и температуру плавления по методу В.Н. Никитинской [9]. Химический состав жира: массовую долю влаги определяли методом высушивания навески до постоянной массы при t=105 ^{0}C, массовую долю жира – методом Сокслета, массовую долю золы - озолением высушенной навески в муфельной печи при t=500-700 ^{0}C до постоянной массы. Жирнокислотный состав мяса молодняка овец исследовали методом газовой хроматографии по ГОСТ 23042-2015 Мясо и мясные продукты [10]. Определение методом газовой хроматографии массовой доли метиловых эфиров индивидуальных жирных кислот к их сумме. Определение токсичных элементов:

свинец, кадмий, ртуть мышьяк - атомноабсорбционным методом И.А. Рогов и других [11], Ю.Ю.Забалуева и др. [12].

Обработка экспериментально полученного цифрового материала осуществлялась методом вариационной статистики (Е.К. Меркурьева [13] с помощью программного обеспечения корпорации Microsoft – Exel.

Результаты: для мясосальных пород овец показатели мясной продуктивности (предубойная масса, масса туши, масса курдюка, морфологический состав туши) предстают как базовые критерии, благодаря которым можно вычислить следующие величины: убойный выход, коэффициент мясности, процентное содержание разных частей туши и другие. Для комплексной оценки продуктивности мясных овец необходимо учитывать не только основные параметры, такие как убойный выход и морфологический состав туши, но также и биохимический состав мяса. Это позволит судить не только об уровне мясной продуктивности, но и о полноценности баранины

В мясосальном овцеводстве основную массу баранины производят за счёт реализации ягнят после отъёма их от матерей. Это даёт возможность получить не только высококачественную мясную продукцию, но и приводит к снижению затрат, что в свою очередь повышает производительность труда.

За подсосный период эдильбаевские ягнята высасывают около 172-178 кг молока, в котором содержится, %: общего белка – 5,91, жира – 7,48, сахара - 5,12 и всего сухих веществ 18,51. Кроме этого, с месячного возраста до пастбищного периода подкармливают смесью концентрированных кормов. Динамика живой массы баранчиков представлены в таблице 1.

Таблица 1 - Динамика живой массы баранчиков (n=56)

Показатель	Возраст, в мес.	
	4 мес.	7 мес.
Живая масса при рождении, кг	5,64±0,19	
Живая масса в 4 и 7 мес. возрасте, кг	46,27±0,56	62,48±0,46
Абсолютный прирост, кг	40,63±0,38	16,21±0,31
Среднесуточный прирост, г	338,58±7,63	180,11±2,94

Проведенные контрольные взвешивания животных показывают (таблица 1), что при рождении баранчики очень крупные (5,64 кг), а к возрасту 4 месяца увеличили живую массу на 8,20 раза (338,58 г в сутки). Это благодаря высокого генетического потенциала породы по молочности, подкормки с месячного возраста и раннюю пастьбу на травостоях, состоящих из серо-полынной ассоциацей с примесью ромашника, молочная, житняка и эфемеров. С наступлением весны молодняк пасется травостоях с кратковременно-производными сообществами высота которых достигают до 15,4-17,9 см. На этих нажировываются молодняк до 7-месячного возраста в среднем достигая живую массы 62,48 кг.

Мясная продуктивность эдильбаевских овец тесно взаимосвязана с величиной массы тела и убойными качествами, что в свою очередь обусловлено степенью интенсивности роста тканей тела, формирующих мясность туши. Для изучения мясной продуктивности баранчиков в возрасте 4- и 7-месяцев нами были проведены контрольные убои (табл. 2). По оценке качества туши, баранчиков можно отнести к высшей категории упитанности – мышцы развиты хорошо, кости не выступают, подкожный жир покрывает тушу полностью.

Таблица 2 - Результаты контрольного убоя баранчиков (n=6)

Показатель	Возраст, мес.	
	4 мес.	7 мес.
Предубойная масса, кг	46,27±0,52	62,48±0,49

Масса туши с курдюком, кг	21,06±0,41	28,09±0,36
Масса туши без курдюка, кг	18,58±0,34	22,22±0,27
Длина туши, м	1,18±0,01	1,26±0,01
Масса внутреннего жира, кг	0,73±0,04	1,12±0,01
Масса курдюка, кг	2,48±0,03	5,87±±0,05
Убойная масса, кг	24,72±0,29	35,08±0,42
Убойный выход с курдюком, %	45,51±0,61	44,95±0,37
Убойный выход без курдюка, %	41,04±0,43	35,56±0,39
Масса охлажденной туши, кг	18,29±0,36	23,61±0,41
Площадь «мышечного глазка», $см^2$	11,43±0,38	14,86±0,28

Убойный выход с курдюком у баранчиков в 4 месяца составила 45,51 %, соответственно в 7 месяцев 44,95 %. Масса курдюка в 4 месяца составил 5,36% от массы предубойной массы, соответственно в 7 мес. 9,39%.

Таким образом можно отметить, что с возрастом молодняки эдильбаевских пород нажировываются, о чем свидетельствуют массы курдюка внутреннего жира.

Результаты обвалки туш показывают, что при убое баранчиков в 4- и 7- месячном возрасте были выявлены некоторые различия по содержанию мышечной ткани (таблица 3).

Таблица 3 - Морфологический состав туш (n=6)

Возраст, мес.	Мякоть		Кости		сухожилий		Индекс мясности, ед.
	кг	%	кг	%	кг	%	
4 мес.	15,32±0,56	2,77±0,76	5,17±0,23	24,51±0,31	0,57±0,07	2,72±0,02	3,58±0,04
7 мес.	20,91±0,63	74,44±0,69	6,44±0,19	2,93±0,28	0,74±0,03	2,63±0,01	3,42±0,03

Благодаря относительно высокой предубойной живой массе и массе туш, у баранчиков выход мякоти находится в переделах 72,77-74,44%, а наличие определённого количества (5,17-6,44%) костистость показывают о их возможности роста и развития.

Пищевую ценность определяют по показателям химического состава продукта, их которых весомой информацией обладают соотношения составных частей друг к другу и к общему количеству продукта, то есть пропорции воды, жира, белка, минеральных веществ и др. в продукте позволяет судить о его пищевой ценности. Учитывая это нами проведены биохимический анализ состав мяса (таб.4.)

Белково-жировое соотношения влияет на усвояемость мяса, для хорошей усвояемости оптимальным соотношением жира и белка считается 0,8–1,0 [14]. В возрасте 4 и 7 месяцев их показатели по белку находились на уровне 18,36% и 17,61%, по жиру – 16,97% и 19,63%, тем самым эти отношения у 4-месячных 0,92, а 7-месячных 1,11. Это объясняется породной особенностей, у них в течение жизни содержание влаги у молодняков снижается, а содержание жира, наоборот, – повышается. Содержание сухого вещества у 4-мес. молодняка 35,91%, а 7-мес. 38,41 %.

Таблица 4 - Биохимический состав мяса баранчиков (n=6)

Возраст, мес.	Содержание, %					Калорийность кг мякоти, ккал
	влаги	жира	белка	золы	сухого вещества	
4 мес.	63,42±1,47	16,97±0,31	18,36±0,42	1,25±0,08	35,91±0,61	1714,23±21,04

7 мес.	61,67±1,82	19,63±0,28	17,61±0,33	1,09±,07	38,41±0,58	1986,32±28,15

Таким образом анализ химического состава мяса, представленный в таблице 4, показал, что у баранчиков наблюдается снижение влаги за счёт повышенного содержания жира и белка. Но, достигшим своего 7-месячного развития у баранчиков мясо находится достаточно на высоком уровне (74,44%), так как содержало меньше влаги. Содержание золы во всех испытуемых группах находилось практически на одном уровне.

Для определение экологической чистоты проведены концентрация тяжелых металлов в мясе баранчиков (табл. 5).

Таблица 5 - Концентрация тяжелых металлов в мясе баранчиков, (n=6)

Тяжелые металлы, мг/кг	ПДК, мг/кг	Возраст баранчиков, мес	
		4 мес.	7 мес.
Ртуть	0,03	менее 0,001	менее 0,001
Мышьяк	0,5	менее 0,005	менее 0,005
Кадмий	0,05	менее 0,0015	менее 0,0015
Свинец	0,5	0,009±0,008	0,017±0,009

Анализ полученных данных показал (табл. 5), что содержание тяжелых металлов во всех исследуемых образцах мяса соответствовало регламентируемым нормам и не превышало допустимого уровня. По нашим данным среднее содержание тяжелых металлов в мясе баранчиков всех исследуемых групп не превышало предельно допустимой концентрации. Причем, содержание ртути, мышьяка и кадмия не отмечалось в пределах измерения анализатора. Отсюда следует, что в зоне пастьбы овец нет объектов выделяющие ксенобиотиков.

У эдильбаевских овец основной продукцией считается мясо и сало, поэтому нами изучены качества курдючного жира по сбалансированности жирнокислотного состава и определение уровня холестерина. Накопление жира в курдюке (жировой подушке в зоне крестца и хвоста) у эдильбаевских овец является одним из основных наследственных показателей. На жировой состав продукта влияет упитанность животного, его возраст и кормовые факторы. В ранних наших исследованиях [14] установлены, что масса курдюка достигает 20-25 кг.

Проведенные анализы на содержание холестерина *в* курдючном жире 4-мес. баранчиков содержится 50,05 (в мг/100 г), а у 7-мес. 53,57 мг. Биохимические показатели курдючного жира баранчиков показали, что кислотность у 4-мес. баранчиков находится в пределах 5,94, кислотное число 2,34, а перекисное число 0,03 и соответственно у 7-мес. 5,89 и 1,81.

Анализы жирнокислотного состава курдючного жира представлены в табл. 6.

Таблица 6 - Жирнокислотный состав курдючного жира, %

Показатели	Возраст молодняка, мес	
	4	7
Ненасыщенные жирные кислоты		
Олеиновая $C_{18:1}$	38,43	27,63
Линолевая $C_{18:2}$	5,91	3,84
Линоленовая $C_{18:3}$	2,47	2,28

Сумма основных ненасыщенных жирных кислот	46,81	33,75
Насыщенные жирные кислоты		
Пальмитиновая $C_{16:0}$	24,06	19,52
Стеариновая $C_{18:0}$	20,14	14,17
Миристиновая	2,97	1,58
Сумма основных насыщенных жирных кислот	47,17	35,27

Анализ таблицы 6 показывают на высокую насыщенность курдючного жира жирными кислотами и подтверждает, что традиционное присутствие блюд из курдючного жира в рационе людей вполне обосновано.

Обсуждение. По данным М.А. Ермекова., Голоднова А.В. [15] эдильбаевская порода введена в зоне Прикаспийской низменности, в зоне Уральской области (Приуралье) Казахстана, и они отличаются высокой скороспелостью, отличной конституцией, неприхотливостью к уровню кормления и условиям содержания. Эдильбаевские овцы отличаются хорошо сформированным костяком, крупной массой тела (бараны -100-105 кг, овцематки 73-78 кг), высокой степенью созревания, оптимальной молочностью (150-180 кг), значительной способностью к нагулу, использованию пастбищ с малой растительностью и небольшой обеспеченностью водой. Отличительной особенностью породы также является накопление жира в курдюке (жировой подушке в зоне крестца и хвоста), масса которого достигает 20 кг и более.

Раннее в наших исследованиях [14] нами отмечены эффективность реализации эдильбаевских овец на мясо в раннем возрасте. К таким же выводам приходит T.S. Brand et. al [1] проведенных анализах по характеристикам туши и отложения жира у ягнят породы меринос, южноафриканской баранины, мериноса и дорпера. Забой молодняка и получение хорошей баранины в раннем возрасте отмечаются и в работах J.J.E. Cloete et. al [17], A.J. Kempster [18], H.Brzostowski et. al [19]. Подобные выводы сделаны G.Arsenos et. al [20], G.L. Bennett et. al [21] изучая генетическую и экологическую характеристики туши ягнят ряда других пород овец, G.F. Fiss [22] изучая факторы влияющие на продуктивность стада овец в Онтарио.

Биохимические анализы мяса баранчиков показали, что в возрасте 4 и 7 месяцев показатели по белку находились на уровне 18,36% и 17,61% соответственно, по жиру – 16,97% и 19,63%. Таким образом белково-жировое соотношения у 4-месячных составили 0,92, а 7-месячных 1,11. Это породные особенности эдильбаевских овец, у них в течение жизни содержание влаги у молодняков снижается, а содержание жира, наоборот, – повышается. Жир ягнятины содержит меньшее количество насыщенных и большее количество ненасыщенных жирных кислот в сравнении с бараниной, поэтому ценность его выше.

Подобные исследование проводили Sh.R. Adylkanova et. al [23] изучая выход мяса ягнят различных межпородных скрещивании породы дежареско. Ими установлено значительно позитивное соотношение среди структуры мышц, жира и костей в задней поясничной и лопаточной частях туши и общим составом этих тканей в туше. По мнению А.И. Ерохина и др. [24], К.К. Канапин [25], А.И. Любимова и др. [26], формирование мясности с склонностью к ожирению у курдючных овец заложены в генотипе, что и доказывают наши выводы.

Заключение. Обобщая результаты исследования по изучению качество мяса и курдюка молодняка эдильбаевской породы в условиях Приуралья были сделаны следующие выводы:

1. Результаты контрольного убоя показали, что в возрасте 4 месяцев баранчики эдильбаевской породы имели предубойную массу 46,27 кг и массу туши с курдюком 21,06

кг, соответственно у 7 мес. 62,48 и 28,09 кг. Убойный выход с курдюком у баранчиков в 4 месяца составила 45,51 %, соответственно в 7 месяцев 44,95 %. Масса курдюка в 4 месяца составил 5,36% от массы предубойной массы, соответственно в 7 мес. 9,39%.

2. Анализы морфологического состава туши молодняка показали выхода мякоти 72,77-74,44%, кости 24,51-22,93 и сухожилия 2,72-2,68%. Биохимический состав мяса баранчиков показала, что у 4 мес. влаги 63,42%, жира 16,97, белка 18,36 и золы 1,25%, у 7 мес. наблюдается увеличение состава жира до 19,63% и некоторого снижение белка (17,61%).

3. Анализы на содержание холестерина *в* курдючном жире 4-мес. баранчиков установлены, что в нем содержится 50,05 (в мг/100 г), а у 7-мес. 53,57 мг, и насыщенности курдючного жира жирными кислотами.

4. Содержание тяжелых металлов во всех исследуемых образцах мяса молодняка овец соответствовало регламентируемым нормам и не превышало допустимого уровня.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Brand, T.S.; Van Der Westhuizen, E.J.; Van Der Merwe, D.A.; Hoffman, L.C. Analysis of carcass characteristics and fat deposition of Merino, South African Mutton Merino and Dorper lambs housed in a feedlot. *S. Afr. J. Anim. Sci.* 2018, *48*, 477–488.

2. Cloete, J.J.E.; Hoffman, L.C.; Cloete, S.W.P. A comparison between slaughter traits and meat quality of various sheep breeds: Wool, dual-purpose and mutton. *Meat Sci.* 2012, *91*, 318–324.

3. Negussie, E.; Rottmann, O.J.; Pirchner, F.; Rege, J.E.O. Patterns of growth and partitioning of fat depots in tropical fat-tailed Menz and Horro sheep breeds. *Meat Sci.* 2003, *64*, 491–498.

4. КР СТ ГОСТ Р 51447-2010 Мясо и мясные продукты

5. Vermeulen, H.; Schönfeldt, H.C.; Pretorius, B. A consumer perspective of the South African red meat classification system. *S. Afr. J. Anim. Sci.* 2015, *45*, 339–354.

6. Любимова А.И., Фалалеева А.А., Стройнова С.Ю. Рост и развитие молодняка овец эдильбаевской породы от рождения до отбивки в условиях Среднего Поволжья. // Зоотехния. – 2013. – №1. – С. 28.

7. Brzostowski, H. Indexes of nutritive value of meat obtained from Pomeranian lambs and crossbreeds of Pomeranian ewes with meat breed rams / H. Brzostowski, J. Tywonczuk, Z. Tanski // Arch. Tierz., Dummerstorf (2004) Special Issue. P.175 – 182

8. Arsenos G, Kufidis D, Zygoyiannis D, Katsaounis N, Stamataris C. 2006. Fatty acid composition of lambs of indigenous dairy Greek breeds of sheep as affected by post –weaning nutritional management and weight at slaughter. Meat Sci. 73:55–65. doi: 10.1016/j.meatsci.2005.10.017

9. Абонеев, В.В. Методика оценки мясной продуктивности овец / В.В. Абонеев, Ю.Д. Квитко и др. // Ставрополь: СНИИЖК, 2009. - 35 с.

10. Bennett, G.L. Genetic and enviromental effects on carcass characteristics of Soutdown X Romney lambs: I. Growth rate, sex and rearing effects / G. L. Bennett, A. H. Kirton, D. L. Johnson et. al. // J. Anim. Sci, 1991, 69. - P. 1856-1863.

11. Fennessy P.F., Research finding in lean lamb production / P.F. Fennessy, N.Z. Canterbury // Proceedings of the 34th Lincoln college Farmers conference Gore, Southland, N. H. Z. 06-07.06.1984.

12. Notter D.R., Kelly R.F., McClaugherty F.S. Effects of ewe breed and management system on efficiency of lamb production. – P. II: Lamb growth, survival and carcass characteristics // J. Anim. Sci. – 1991. - №69. P. 22-23

13. Fourie, P.D. Growth and development of sheep. II. Effect of breed sex on the growth and carcass composition of the Southdown and Romney and their cross / P.D. Fourie, A.H. Kirton, K.E. Jury // N. Z. J. Agric. Res. - 1970. - Vol 13, No. 4 - P. 753-770.

14. Никитченко, В.Е. Анатомо-химическая характеристика мышечной ткани туш бычков разных пород в постнатальном онтогенезе [Текст] : дис... докт. вет. наук - М.:УДН, 1986. – 387 с.

15. ГОСТ 23042-2015 Мясо и мясные продукты. Методы определения жира.

16. Безопасность продовольственного сырья и пищевых продуктов [Электронный ресурс] / И. А. Рогов, Н. И. Дунченко, В. М. Позняковский, А. В. Бердутина, С. В. Купцова. – Новосибирск: Сибирское университетское издательство, 2007. – 228 с. – 5-94087-058-9; 978-5-94087-058-6. Режим доступа: http://biblioclub.ru/

17. Забалуева Ю.Ю., Павлова С.Н., Лескова С.Ю. Методы исследования мяса и мясных продуктов. Лабораторный практикум. - Улан-Удэ: Изд-во ВСГТУ, 2005. - 78 с.

18. Меркурьева Е.К. Биометрия в селекции животноводстве. – М.: Колос, 1970. – 424 с.

19. Справочник зооинженера. Под редакацией А.Р. Рустенова. Алма-Ата.-1984. -325 с.

20. Ермеков М.А., Голоднов А.В. Курдючные овцы Казахстана. – Алматы: Кайнар, 1976. – 110 с.

21. Kempster, A.J. Fat partition and distribution in the carcasses of cattle, sheep and pigs: A review. *Meat Sci.* 1981, *5*, 83–98.

22. Bennett, G.L. Genetic and enviromental effects on carcass characteristics of Soutdown X Romney lambs: I. Growth rate, sex and rearing effects / G. L. Bennett, A. H. Kirton, D. L. Johnson et. al. // J. Anim. Sci, 1991, 69. - P. 1856-1863.

23. Fiss G.F. Factors affecting productivity of sheep flock in Ontario. // Ganad J. Anim. Sc. – 1991. – №71. – P.13-19.

24. Adylkanova Sh.R., Sadykulov T.S., Dolgopolova S.Yu., Toktarbaeva A.M. Meat Yield and Nutritional Evaluation of Lambs Meat of Different Interbreed Types of Dejaresco Sheep Breed. Biosciences // Biotechnology Research Asia Journal. - India, 2016. – Vol. 13, issue 3. - P. 1373-1377.

25. Ерохин А.И., Магомадов Т.А., Карасев Е.А. Формирование мясности у овец в постнатальном онтогенезе // Москва, 2010. – 192 с.

26. Канапин К.К. Эдильбаевская овца. // Алматы: Бастау. – 2009. – 180с.

REFERENCES

1. Brand, T.S.; Van Der Westhuizen, E.J.; Van Der Merwe, D.A.; Hoffman, L.C. Analysis of carcass characteristics and fat deposition of Merino, South African Mutton Merino and Dorper lambs housed in a feedlot. S. Afr. J. Anim. Sci. 2018, 48, 477–488.

2. Cloete, J.J.E.; Hoffman, L.C.; Cloete, S.W.P. A comparison between slaughter traits and meat quality of various sheep breeds: Wool, dual-purpose and mutton. Meat Sci. 2012, 91, 318–324.

3. Negussie, E.; Rottmann, O.J.; Pirchner, F.; Rege, J.E.O. Patterns of growth and partitioning of fat depots in tropical fat-tailed Menz and Horro sheep breeds. Meat Sci. 2003, 64, 491-498.

4. KR ST GOST R 51447-2010 Meat and meat products

5. Vermeulen, H.; Schönfeldt, H.C.; Pretorius, B. A consumer perspective of the South African red meat classification system. S. Afr. J. Anim. Sci. 2015, 45, 339–354.

6. Lyubimova A.I., Falaleeva A.A., Stroynova S.Y. Growth and development of young sheep of the Edilbaev breed from birth to culling in the conditions of the Middle Volga region. // Animal science. – 2013. – No. 1. – p. 28.

7. Brzostowski, H. Indices of nutritional value of meat obtained from Pomeranian lambs and crossbreeds of Pomeranian ewes with meat breed rams / H. Brzostowski, J. Tywonczuk, Z. Tanski // Arch. Tierz., Dummerstorf (2004) Special Issue. P.175 – 182

8. Arsenos G, Kufidis D, Zygoyiannis D, Katsaounis N, Stamataris C. 2006. Fatty acid composition of lambs of indigenous dairy Greek breeds of sheep as affected by post –weaning

nutritional management and weight at slaughter. Meat Sci. 73:55–65. doi: 10.1016/j.meatsci.2005.10.017

9. Aboneev, V.V. Methodology for assessing sheep meat productivity / V.V. Aboneev, Yu.D. Kvitko et al. / Stavropol: SNIZHK Publ., 2009. 35 p.

10. Bennett, G.L. Genetic and enviromental effects on carcass characteristics of Soutdown X Romney lambs: I. Growth rate, sex and rearing effects / G. L. Bennett, A. H. Kirton, D. L. Johnson et. al. // J. Anim. Sci, 1991, 69. - P. 1856-1863.

11. Fennessy P.F., Research finding in lean lamb production / P.F. Fennessy, N.Z. Canterbury // Proceedings of the 34th Lincoln college Farmers conference Gore, Southland, N. H. Z. 06-07.06.1984.

12. Notter D.R., Kelly R.F., McClaugherty F.S. Effects of ewe breed and management system on efficiency of lamb production. – P. II: Lamb growth, survival and carcass characteristics // J. Anim. Sci. – 1991. - №69. P. 22-23

13. Fourie, P.D. Growth and development of sheep. II. Effect of breed sex on the growth and carcass composition of the Southdown and Romney and their cross / P.D. Fourie, A.H. Kirton, K.E. Jury // N. Z. J. Agric. Res. - 1970. - Vol 13, No. 4 - P. 753-770.

14. Nikitchenko, V.E. Anatomical and chemical characteristics of the muscle tissue of bull calves of different breeds in postnatal ontogenesis [Text] : dis... Doctor of Veterinary Sciences, Moscow: UDN, 1986. – 387 p.

15. GOST 23042-2015 Meat and meat products. Methods of fat determination.

16. Safety of food raw materials and foodstuffs [Electronic resource] / I. A. Rogov, N. I. Dunchenko, V. M. Poznyakovsky, A.V. Berdutina, S. V. Kuptsova. Novosibirsk: Siberian University Publishing House, 2007. 228 p. 5-94087-058-9; 978-5-94087-058-6. Access mode: http://biblioclub.ru/

17. Zabalueva Yu.Y., Pavlova S.N., Leskova S.Y. Methods of meat and meat products research. Laboratory practice. Ulan-Ude: Publishing House of VSSTU, 2005. 78 p.

18. Merkuryeva E.K. Biometrics in animal breeding, Moscow: Kolos Publ., 1970, 424 p.

19. Zooengineer's Handbook. Edited by A.R. Rustenov. Alma Ata. - 1984. -325 p.

20. Ermekov M.A., Golodnov A.V. Fat-tailed sheep of Kazakhstan. Almaty: Kainar Publ., 1976. 110 p.

21. Kempster, A.J. Fat partition and distribution in the carcasses of cattle, sheep and pigs: A review. Meat Sci. 1981, 5, 83–98.

22. Bennett, G.L. Genetic and enviromental effects on carcass characteristics of Soutdown X Romney lambs: I. Growth rate, sex and rearing effects / G. L. Bennett, A. H. Kirton, D. L. Johnson et. al. // J. Anim. Sci, 1991, 69. - P. 1856-1863.

23. Fiss G.F. Factors affecting productivity of sheep flock in Ontario. // Ganad J. Anim. Sc. – 1991. – №71. – P.13-19.

24. Adylkanova Sh.R., Sadykulov T.S., Dolgopolova S.Yu., Toktarbaeva A.M. Meat Yield and Nutritional Evaluation of Lambs Meat of Different Interbreed Types of Dejaresco Sheep Breed. Biosciences // Biotechnology Research Asia Journal. - India, 2016. – Vol. 13, issue 3. - pp. 1373-1377.

25. Erokhin A.I., Magomadov T.A., Karasev E.A. The formation of meat content in sheep in postnatal ontogenesis // Moscow, 2010. 192 p.

26. Kanapin K.K. Edilbaevsky sheep. // Almaty: Bastau. – 2009. – 180c.

ТҮЙІН

Соңғы жылдары Қазақстанда еділбай тұқымынан алынған бағыландарға үлкен қызығушылық танытылуда, оның бір себебі өсіруде аз шығын жұмсалады. Осы жағдайды ескере отырып, еділбай тұқымының төлдеріне Батыс Қазақстан облысы, Жанғала ауданындағы бағыландарының еттік қасиеттеріне зерттеу жүргізілді. Зерттеулер көрсеткендей, еркек қозылар туылғанда салмағы 5,64 кг, ал 4 айлығында тірілей салмағы 8,20 есе өсіп, 46,27 кг-ға жетеді, майлы құйрық ұшасымнг бірге 7 айлығында сәйкесінше

21,06 кг (майлы құйрық салмағы - 2,48 кг) құрады. 62,48 кг және 28,09 кг (майлы құйрықтың салмағы - 5,87 кг). 4 және 7 айлығында олардың етінде ақуыз мөлшері 18,36% және 17,61%, май мөлшері 16,97% және 19,63% болды. Бағылан етіне жүргізілген биохимиялық талдаулар 4 және 7 айлығында белок деңгейі сәйкесінше 18,36% және 17,61%, май мөлшері 16,97% және 19,63% деңгейінде болғанын көрсетті. Осылайша, 4 айлық бағыландарда ақуыз-май қатынасы 0,92, ал 7 айлықтарда 1,11 болды. Бұл еділбай қойының тұқымдық ерекшеліктерінде; олардың өмір сүру барысында жастарының еттерінде ылғалдылығы төмен, ал майлылығы, керісінше, жоғары. Бағыландарының етінің майында ересек қой етіне қарағанда қаныққан және қанықпаған май қышқылдары аз, сондықтан оның құндылығы жоғары екенін дәлелденді.

UDC 636.1:636.082.12
IISTI 68.39.49; 68.39.19

Beishova I.S., Doctor of Biological Sciences, Associate Professor, https://orcid.org/0000-0001-5293-2190
NCJSC «Zhangir Khan West Kazakhstan Agrarian Technical University», Uralsk, Zhangir Khan street, 51, 090009, Kazakhstan, indira_bei@mail.ru
Shamshidin A.S., Candidate of Agricultural Sciences, https://orcid.org/0000-0001-5457-1720
NJSC «West Kazakhstan Agrarian and Technical University named after Zhangir khan», Uralsk, st. Zhangir khan 51, 090009, Kazakhstan, 270180@mail.ru
Muhatai Geminggul I., PhD, https://orcid.org/0009-0000-3208-4403
Tarim University, Alar, Xinjiang 843301, China, gmuhatai@bk.ru
Kuzhebayeva U.Zh., Master of Veterinary Sciences, https://orcid.org/0000-0002-7887-3376, NCJSC «Zhangir Khan West Kazakhstan Agrarian Technical University», Uralsk, Zhangir Khan street, 51, 090009, Kazakhstan, usya_999@mail.ru
Bekova G.S., doctoral student, https://orcid.org/0000-0003-0230-1352
NJSC «West Kazakhstan Agrarian and Technical University named after Zhangir khan», Uralsk, Zhangir Khan st. 51, 090009, Kazakhstan, bek_gulmira@mail.ru
Salimova D.K., doctoral student, https://orcid.org/0000-0003-3197-6586
NJSC «West Kazakhstan Agrarian and Technical University named after Zhangir khan», Uralsk, Zhangir Khan st. 51, 090009, Kazakhstan, salimova.dinara98@gmail.com

Бейшова И.С., д.б.н., ассоциированный профессор, https://orcid.org/0000-0001-5293-2190
НАО «Западно-Казахстанский аграрно-технический университет имени Жангир хана», г. Уральск, ул. Жангир хана,51, 090009, Казахстан, indira_bei@mail.ru
Шәмшідін Ә.С., доктор сельскохозяйственных наук, https://orcid.org/0000-0001-5457-1720
НАО «Западно-Казахстанский аграрно-технический университет имени Жангир хана», г. Уральск, ул. Жангир хана 51, 090009, Республика Казахстан, 270180@mail.ru
Muhatai Geminggul I., PhD, https://orcid.org/0009-0000-3208-4403
Таримский университет, Алар, 843301, Китай, gmuhatai@bk.ru
Кужебаева У.Ж., магистр вет. наук, https://orcid.org/0000-0002-7887-3376
НАО «Западно-Казахстанский аграрно-технический университет имени Жангир хана», г. Уральск, ул. Жангир хана 51, 090009, Казахстан, usya_999@mail.ru
Бекова Г.С., PhD докторант, https://orcid.org/0000-0003-0230-1352
НАО «Западно-Казахстанский аграрно-технический университет имени Жангир хана», г. Уральск, ул. Жангир хана 51, 090009, Казахстан, bek_gulmira@mail.ru
Салимова Д.К., PhD докторант, https://orcid.org/0000-0003-3197-6586
НАО «Западно-Казахстанский аграрно-технический университет имени Жангир хана», г. Уральск, ул. Жангир хана 51, 090009, Казахстан, salimova.dinara98@gmail.com

MORPHOLOGICAL AND GENETIC DIVERSITY OF KAZAKH HORSE BREEDS: FUNDAMENTALS FOR SELECTION AND CONSERVATION OF BIOLOGICAL RESOURCES

МОРФОЛОГИЧЕСКОЕ И ГЕНЕТИЧЕСКОЕ РАЗНООБРАЗИЕ КАЗАХСТАНСКИХ ПОРОД ЛОШАДЕЙ: ОСНОВЫ ДЛЯ СЕЛЕКЦИИ И СОХРАНЕНИЯ БИОРЕСУРСОВ

ANNOTATION

The study is dedicated to the study of domestic horse breeds of Kazakhstan (Kushum, Mugalzhar, Adai, Jabe) in order to identify their morphological and genetic characteristics to improve breeding programs. The paper presents the results of the bonitation work, including the analysis of body weight, measurements (height at the withers, chest circumference, oblique body length) and age and gender characteristics. It has been established that the Kushum breed shows the biggest mass (stallions - up to 650 kg, mares - up to 530 kg) and pronounced sexual dimorphism, while the Mugalzhar breed is characterized by uniformity of measurements (height at the withers – 147-148 cm) and high meat productivity. The Adai and Jabe breeds are compact in size (140-144 cm at the withers) and adaptable to harsh conditions.

The methodology included the collection of biological material and data from farms in Kazakhstan, as well as preparation for genome-wide sequencing to analyze genetic variations. The results showed that the selected individuals (Jabe, Mugalzhar, and Adai stallions) have the best phenotypic characteristics, which makes them valuable for preserving genetic diversity.

The conclusions emphasize the importance of studying local breeds for the development of meat and dairy horse breeding in Kazakhstan. The data obtained opens up prospects for breeding aimed at enhancing productive qualities and resilience to environmental challenges. The work contributes to the conservation of unique genetic resources and the optimization of breeding programs.

АННОТАЦИЯ

Исследование посвящено изучению отечественных пород лошадей Казахстана (кушумская, мугалжарская, адайская, джабе) с целью выявления их морфологических и генетических особенностей для совершенствования селекционных программ. В работе представлены результаты бонитировочных работ, включая анализ живой массы, промеров (высота в холке, обхват груди, косая длина туловища) и половозрастных характеристик. Установлено, что кушумская порода демонстрирует наибольшую массу (жеребцы - до 650 кг, кобылы - до 530 кг) и выраженный половой диморфизм, тогда как мугалжарская порода отличается однородностью промеров (высота в холке – 147-148 см) и высокой мясной продуктивностью. Адайская порода и джабе обладают компактными размерами (высота в холке 140–144 см) и адаптивностью к суровым условиям содержания.

Методология включала сбор биологического материала и данных в хозяйствах Казахстана, а также подготовку к полногеномному ресеквенированию для анализа генетических вариаций. Результаты показали, что отобранные особи (жеребцы пород джабе, мугалжар, адай) обладают наилучшими фенотипическими показателями, что делает их ценными для сохранения генетического разнообразия.

Выводы подчеркивают важность изучения локальных пород для развития мясомолочного коневодства в Казахстане. Полученные данные открывают перспективы для селекции, направленной на усиление продуктивных качеств и устойчивости к экологическим вызовам. Работа вносит вклад в сохранение уникальных генетических ресурсов и оптимизацию программ разведения.

Key words: *horse breeding, horse breeds, live weight, measurements, genetic diversity, Kazakhstan.*

Ключевые слова: *коневодство, породы лошадей, живая масса, промеры, генетическое разнообразие, Казахстан.*

Introduction. Kazakh horse breeding has been one of the most important livestock industries in the country for many centuries [1-3]. Horse breeding is rightly recognized as an industry capable to significantly improve the efficiency of public livestock farming in a number of regions of the country [4,5].

An active search for candidate genes associated with economically beneficial traits of horses, such as athletic performance, meat and dairy productivity, fertility, disease resistance and good adaptive qualities, can significantly improve the effectiveness of breeding programs [6].

In Kazakhstan, the breeding base of horse breeding is represented by five directions: riding, horse-drawn, trotting, heavy-duty, meat and dairy. Meat and dairy products occupy the largest share in the structure of the industry and account for more than 90 %. Representatives of these breeds and types are distinguished by their genetically and biologically determined adaptability to year-round pasture maintenance, have the ability to quickly bait in favorable (2-2.5 months) spring and autumn periods, are quite fertile, high-yielding and have a pronounced seasonal reproduction pattern [7].

Kushum, Mugalzhar, Kazakh Jabe type horses, and Adai type Kazakh horses are of great interest among domestic breeds. The genetic potential in live weight of Kazakh mares of the jabe type reaches 485 kg, and stallions 520 kg. These data show the potential for further improvement of their economically useful characteristics such as body weight [8]. The Kazakh Jabe horse is a specialized breed of herd horses capable of intensively increase live weight during the feeding period and produce high-quality meat, regardless of belonging to the population or offspring [9]. The live weight of Kushum stallions is 540 kg (the best - up to 711 kg), mares - 495 kg (the best - up to 645 kg), young animals up to 2.5 years - 430 kg (the best - up to 495 kg). The live weight of local horses in the area of distribution of Kushum horses (animals of other and, especially, factory breeds simply do not survive in these conditions) is: stallions 420-440 kg, mares - 370-390 kg, young animals 2.5 years 290-310 kg. The live weight of the crossbreeds (Kushum X local) is 50-70 kg more [10]. When breeding the Mugalzhar breed (1998), horses of breeding groups (the Emben intra-breed type of the Aktobe population) of Mugalzhar horses differed from Kazakh horses of the Jabe type with a higher live weight and comparatively better measurements (stallions have an average height at the withers of 145.5 cm, an oblique body length of 159.1 cm, chest circumference of 185.8 cm, metacarpal circumference – 19.9 cm, live weight – 553 kg; mares, respectively: 145,1-155,6-180,6-19,0 cm and 481.2 kg), with high meat productivity (260-280 kg carcass weight) and good slaughter yield (56-58%) under pasture conditions [11]. Adai horses are well adapted to the harsh continental climatic conditions [12]. The Adai horse has good quality meat and has excellent fattening and feeding ability [13].

Advances in genome-wide sequencing have allowed for an in-depth analysis of the genetic variations present in horses. It is known that the history of horse domestication is approximately 5000-6000 years old, during this period the genetic diversity of domesticated animals is gradually changing due to breeding activities in populations [14]. It is worth noting that traditional breeding methods do not provide tangible breeding progress, in this regard, it is of interest to study the genetic profile of domestic horse breeds using new generation sequencing.

Materials and methods of research. The research was conducted on the basis of the Laboratory of biotechnology and diagnostics of infectious diseases of the NJSC "West Kazakhstan Agrarian and Technical University named after Zhangir Khan" and farms in various regions of Kazakhstan. A sample of domestic horse breeds (Mugalzhar, Kushum, Kazakh breed: Jabe and Adai type) was formed based on the collection of the following data: gender, age, body weight. The main measurements of the horses: height at the withers, oblique body length, chest

circumference, metacarpal circumference were taken in accordance with the instructions for bonification [15].

The results and their discussion. In order to achieve our goals, we conducted visits to farms for bonification work and selection of biological material. Figure 1 shows the stallions of domestic horse breeds.



Figure 1 – Stallions of domestic horse breeds
(А – Jabe, Б – Mugalzhar, В – Adai, Г – Kushum)

Based on the results of the bonitation data, we selected the most typical representatives and formed a sample of domestic horse breeds (Table 1).

From the data in Table 1, it can be seen that the live weight of stallions varies from 420 kg (adai) to 650 kg (kushum), depending on the breed. The live weight of mares varies from 385 kg (Adai) to 580 kg (Mugalzhar) depending on the breed. Figure 2 shows a bar chart that represents live weight of horses of different breeds depending on gender.

Table 1 – Measurements and live weight of domestic horse breeds

Breed	Gender and age group	Color	Measurements, cm				Live weight, kg
			height at the withers	oblique body length	chest circumference	metacarpal girth	
Kushum	The mare, 9 years old	Brown	155	161	187	20	530
Kushum	The stallion, 11,5 years old	Dark bay	163	168	197	20	600
Kushum	The stallion, 8,5 years old	Bay	162	165	200	21	650
Kushum	The stallion, 10,5 years old	Dark bay	168	170	200	21	620

Mugalzhar	The mare, 7 years old	Savrasaya	148	154	183	20	530
Mugalzhar	The mare, 8 years old	Savrasaya	148	156	203	20,5	580
Mugalzhar	The mare, 8 years old	Savrasaya	147	158	197	20,0	560
Mugalzhar	The mare, 9 years old	Savrasaya	147	162	190	20,0	550
Mugalzhar	The stallion, 7 years old	Savrasaya	147	153	185	20	492
Mugalzhar	The stallion, 13 years old	Savrasaya	148	157	207	21,5	640
Mugalzhar	The stallion, 8 years old	Savrasaya	148	167	208	21,5	644
Adai	The mare, 9 years old	The chestnut	140	144	164	18	390
Adai	The mare, 9 years old	The Black Horse	142	146	173	18	385
Adai	The stallion, 12 years old	The chestnut	144	147	174	18	420
Jabe	The mare, 9 years old	The Black Horse	142	148	177	18	420
Jabe	The mare, 8 years old	The Black Horse	144	149	180	18	440
Jabe	The stallion, 8 years old	Savrasaya	144	151	205	20,5	560



Figure 2 – Live weight (kg) of domestic horse breeds
(K– kushum, M- mugalzhar, A- adai, J- jabe)

The Kushum horse breed has the largest body weight among all the breeds considered. Stallions reach a weight of 600-650 kg, and mares weigh about 530 kg. This makes them one of the largest and most powerful horses among the four breeds represented. The Mugalzhar breed is similar in its parameters to the Kushum breed. Stallions of this breed weigh from 640 to 644 kg,

and mares can reach 530-580 kg. This weight also indicates good meat and dairy qualities and high productivity. The Adai breed, on the contrary, is the lightest of the listed. The average weight of stallions is about 420 kg, and mares weigh from 385 to 390 kg. Jabe occupy an intermediate position between Kushum and Mugalzhar horses that have a high body weight and Adai horses with a relatively small body weight. The weight of stallions of this breed reaches 560 kg, and mares weigh in the range of 420-440 kg. Thus, it can be concluded that the Kushum and Mugalhar horses are much more massive than the Adai and Jabe horses. This is quite understandable in their meat and dairy direction, since larger sizes contribute to an increase in product output. At the same time, Jabe is a versatile option that combines moderate weight and good endurance.

The average height at the withers of the Kushum horse breed is 162 cm, which is significantly higher than other breeds. At the same time, the range of values in horses of the Kushum breed is maximum - from 155 cm in a 9-year-old female mare to 168 cm in a 10.5-year-old stallion. Such significant variability (standard deviation of 5 cm, coefficient of variation of 3.1%) indicates a wide range of growth characteristics within the breed. The pronounced age dynamics in stallions is particularly noteworthy: if an 8.5-year-old stallion has a height of 162 cm, then by the age of 10.5 this indicator increases to 168 cm, which corresponds to an annual increase of about 1.2 cm. Significant sexual dimorphism is also noteworthy - the difference between a mare (155 cm) and the average stallion (164.3 cm) is 9.3 cm, or 6% of the average (Figure 3).




Figure 3 – Height at the withers (cm) of domestic horse breeds
(K– kushum, M- mugalzhar, A- adai, J- jabe)

A completely different situation is observed in the Mugalzhar breed. These horses show an amazing uniformity of growth characteristics. The average height at the withers is 147.5 cm, with a minimum range of values from 147 to 148 cm. A standard deviation of only 0.5 cm with a coefficient of variation of 0.3% indicates the exceptional stability of this trait in the breed. It is noteworthy that there are practically no sex differences - the difference between the average values of mares (147.5 cm) and stallions (147.7 cm) is only 0.2 cm (0.1%). There is also no pronounced age dynamics.

The Adai breed and the Jabe show similar characteristics, although they have some differences. The average height at the withers of Adai horses is 142 cm (range from 140 to 144 cm), jabe - 143.3 cm (from 142 to 144 cm). Both breeds show moderate variability: a standard deviation of 2 cm (coefficient of variation of 1.4%) for Adai and 1.2 cm (0.8%) for Jabe. Sex

differences expressed weakly: in Adai, the difference is 3 cm (2.1%), in Jabe, it is only 1 cm (0.7%). These breeds have similar growth characteristics.

Figure 4 shows examples of domestic horses depending on their gender. The analysis of measurements of horses of various breeds allows to reveal interesting patterns in their exterior features.




Figure 4 – Measurements of domestic horse breeds depending on gender (cm)
(K– kushum, M- mugalzhar, A- adai, J- jabe)

The Kushum breed shows the most impressive size among all the presented breeds. The height at the withers of these horses varies from 155 cm in mares to 168 cm in stallions, which indicates a pronounced sexual dimorphism - the difference reaches 13 cm. The clear age dynamics is particularly noteworthy: if an 8.5-year-old stallion has a height of 162 cm, then by the age of 10.5 this indicator increases to 168 cm, showing an increase of about 3 cm per year. The large size is confirmed by other examples: the chest circumference ranges from 187 to 200 cm, and the metacarpal circumference is 20-21 cm, which indicates the powerful constitution of these animals.

The Mugalzhar horse breed impresses with its amazing uniformity of indicators. The difference between mares and stallions is minimal - less than 1 cm, which indicates a weakly expressed sexual dimorphism. However, a significant variation in chest circumference is noteworthy - from 183 to 208 cm, while the maximum values are recorded in stallions. The circumference of the pastern at 20-21.5 cm confirms the strong constitution characteristic of locally adapted breeds.

The Adai breed stands out for its most compact size. The height at the withers is only 140-144 cm, and the difference between mares and stallions does not exceed 4 cm. The chest circumference is small (164-174 cm), and the thin limbs (metacarpus circumference 18 cm) indicate adaptability to poor feeding conditions.

The Jabe breed is close to the Adai breed in basic measurements, but it has some interesting features. With a similar height at the withers (142-144 cm), stallions have an unexpectedly large chest circumference - up to 205 cm, which is significantly higher than mares (177-180 cm). The circumference of the pastern is 18-20.5 cm and occupies an intermediate position between the Adai and Mugalzhar breed.

Comparative analysis reveals a clear gradation of rocks according to dimensional characteristics. The Kushum breed is the absolute leader in height at the withers (up to 168 cm), while the Adai breed ranks last (140 cm). Curiously, the oblique length of the body is maximum

in the Kushum breed (up to 170 cm), but in the Mugalzhar breed, individuals also show impressive indicators (up to 167 cm). The chest circumference shows the most paradoxical distribution: the absolute maximum belongs to the Mugalzhar breed (208 cm), although in other dimensions it is inferior to the Kushum breed.

The age dynamics is most pronounced in the Kushum breed, where in two years (from 8.5 to 10.5 years old) stallions add 6 cm at the withers. Other breeds do not have a similar pattern, which can be explained either by the early completion of growth or by insufficient data.

The analysis of gender differences deserves special attention. In the Kushum breed the difference between mares and stallions reaches 9.3 cm (6%), in the Mugalzhar breed it is minimal - only 0.3 cm (0.2%). The Adai and Mugalzhar breeds occupy an intermediate position with differences of 2-4 cm.

The prospects for further research include expanding the sample, especially by age group, studying the correlation between different measurements, as well as analyzing the relationship between exterior features and productive qualities. A detailed study of the unusually large chest circumference of several individuals of the Mugalzhar and Jabe breed is particularly interesting, which may open up new directions in breeding work.

Body measurements of the formed group of domestic horse breeds corresponded to breed standards. It should be noted that all horses met the standards in terms of their exterior characteristics.

Conclusion. In the course of our research, we selected and analyzed domestic horse breeds for genome-wide sequencing. The selection was carried out taking into account the bonus data and qualitative indicators of the extracted DNA. As a result of a thorough analysis, three stallions of the Jabe, Mugalzhar and Adai breeds were selected, which demonstrate the best genetic and phenotypic characteristics for further genome-wide research. These breeds represent valuable genetic resources with high adaptability and productivity, which makes them promising objects for breeding and preserving genetic diversity in the specific environment of Kazakhstan. The results obtained open up new opportunities for improving and preserving domestic horse breeds, which is important for the development of horse breeding in the country.

Financing. The work was carried out within the framework of the scientific project of grant financing of the Ministry of Internal Affairs of the Republic of Kazakhstan for 2023 -2025. IRN No. AP19577616 «Study of breed-specific traits in domestic horse breeds by resequencing and transcriptomic analysis».

REFERENCES

1. Agibayeva A.Zh., Kazhibayeva G.T., Kenzhebai K.M. // Analysis of the development of horse breeding in the Republic of Kazakhstan and the use of horse meat in the food industry // Modern aspects of the production and processing of agricultural products: A collection of articles based on the materials of the V International Scientific and practical Conference dedicated to the 15th anniversary of the Department of Technology of Storage and processing of livestock products of the Kuban GAU, Krasnodar, March 29, 2019 / Ed. by A.A. Nesterenko. Krasnodar: I.T. Trubilin Kuban State Agrarian University, 2019. pp. 3-13. - EDN GQSJCN.

2. Demin V.A. Horse breeding: a textbook for universities [Text] / V.A. Demin, A.R. Akimbekov, D.A. Baymukanov et al. – St. Petersburg: Lan, 2022. – 324 pp.

3. Pozharskiy A. Genetic structure and genome-wide association study of the traditional Kazakh horses [Text] / A. Pozharskiy, A. Abdrakhmanova, I. Beishova, et al. // Animal. – 2023. – V.17(9). – P. 100926-1-100926-12. doi: 10.1016/j.animal.2023.100926

4. Rzabayev T.S. Linebreeding as a system of stock breeding to improve the productive qualities of horses of the Kushum breed [Text] / T.S. Rzabayev, T.S. Assanbayev, S. Rzabayev, et al. // Reprod Domest Anim. – 2022. – V.57(12). – P.1584-1592. doi:10.1111/rda.14235

5. Ombaev A.M. // Some aspects of the development of livestock industries in Kazakhstan // Animal husbandry. – 2018. – No. 3. – pp. 25-28. – EDN XMGPZB.

6. Khrabrova, L.A., Blokhina, N.V. // The use of DNA markers in genotypic assessment and breeding of horses // Divovo: All-Russian Scientific Research Institute of Horse Breeding, 2024. – 164 p. – ISBN 978-5-605-02386-9. – EDN DAJRPD.

7. Sydykov D.A., Sansyzbayev, B.S., Baktybaev, G.T. // The current state of productive horse breeding in Kazakhstan and its prospects // Horse breeding and equestrian sport. – 2023. – No. 2. – pp. 28-33. – DOI 10.25727/HS.2023.2.60011. – EDN DZXLAM.

8. Yuldashbaev Yu.A., Baymukanov D.A., Akimbekov A.R. [and others] // Breeding of Kazakh horses of the toad type using stallions of different lines // Animal science. – 2018. – No. 8. – pp. 5-8. – EDN LYQSWD.

9. Kargaeva M.T., Baymukanov D.A., Dzhunusov A.M., Alikhanov O. // Meat productivity of young Kazakh horses of the jabe type on the Mangyshlak peninsula // Bulletin of the N.F. Katanov Khakass State University. – 2019. – № 2(28). – Pp. 69-73. – EDN ZBINFR.

10. Muldakhanov N. R. The "Golden" Kushum horse // Horse breeding and equestrian sports. – 2019. – No. 3. – pp. 22-27. – DOI 10.25727/HS.2019.3.31359. – EDN LWNEJX.

11. Rzabaev S.S., Rzabaev T.S., Rzabaev K.S. // Mugalzhar horse breed is 25 years old // Horse breeding and equestrian sport. – 2023. – No. 6. – P. 32-36. – DOI 10.25727/HS.2023.6.60125. – EDN EMJOOP.

12. Kargaeva M.T., Yuldashbaev Yu.A., Iskhan K.Zh. [et al.] // Formation of meat productivity of Kazakh horses of the Adai offspring // Agrarian science. - 2021. - No. 9. - P. 47-51. - DOI 10.32634/0869-8155-2021-352-9-47-51. - EDN FBOAZO.

13 Imangaliev A.I. Adai horse // Monograph. – Alma – Ata: Kainar, 1969. – P. 40.

14 Warmuth V. Reconstructing the origin and spread of horse domestication in the Eurasian steppe [Text] / V. Warmuth, A. Eriksson, M.A. Bower, et al. // Proc Natl Acad Sci USA. – 2012. – V. 109(21). – P. 8202-8206. doi:10.1073/pnas.1111122109

15 Instructions for the bonitation of horses of local breeds of Kazakhstan. - Astana, 2014. - 22 p. (date of access September 10, 2023). https://adilet.zan.kz/rus/docs/V14F0009818.

ТҮЙІН

Зерттеу селекциялық бағдарламаларды жетілдіру үшін олардың морфологиялық және генетикалық ерекшеліктерін анықтау мақсатында Қазақстанның отандық жылқы тұқымдарын (көшім, мұғалжар, адай, жабы) зерттеуге арналған. Жұмыста бонитировка нәтижелері: тірі салмақ, дене өлшемдері (шоқтық биіктігі, кеуде айналымы, қиғаш дене ұзындығы) ұсынылып, жыныс-жас ерекшеліктерінің талдауы жасалды. Зерттеу нәтижелері көрсеткендей, көшім тұқымы ең жоғары салмақ көрсеткіштеріне (айғырлар – 650 кг-ға дейін, бие – 530 кг-ға дейін) ие және айқын жыныстық диморфизм байқалады. Мұғалжар тұқымы біркелкі өлшемдерімен (шоқтық биіктігі – 147-148 см) және жоғары ет өнімділігімен ерекшеленеді.

Адай және жабы тұқымдары ықшам дене бітімімен (шоқтық биіктігі 140–144 см) және қатал табиғи жағдайларға бейімділігімен сипатталады. Зерттеу әдістемесі Қазақстан шаруашылықтарында биологиялық материал мен деректер жинауды, сондай-ақ генетикалық вариацияларды талдау үшін толық геномдық қайта секвенирлеуге дайындықты қамтыды. Нәтижелер көрсеткендей, таңдап алынған тұқымдар (жабы, мұғалжар, адай тұқымдарының айғырлары) ең үздік фенотиптік көрсеткіштерге ие, бұл оларды генетикалық әртүрлілікті сақтау үшін құнды.

Қорытынды Қазақстанда ет-сүт жылқы шаруашылығын дамыту үшін жергілікті тұқымдарды зерттеудің маңыздылығын көрсетеді. Алынған мәліметтер өнімді қасиеттерді және экологиялық сын-қатерлерге төзімділікті арттыруға бағытталған селекция үшін мүмкіндіктерді ашады. Жұмыс бірегей генетикалық ресурстарды сақтауға және асылдандыру бағдарламаларын оңтайландыруға ықпал етеді.

УДК: 636.082
МРНТИ 68.39.13.

Каюмов Ф.Г., доктор сельскохозяйственных наук, профессор, https://orcid.org//0000-0002-5155-4295
ФГБНУ «Федеральный научный центр биологических систем и агротехнологий РАН», Оренбург, Россия, 9-Января,29, kserev_1976@mail.ru
Третьякова Р.Ф., кандидат биологических наук, https://orcid.org/0000-0001-9241-9228
ФГБНУ«Федеральный научный центр биологических систем и агротехнологий РАН», Оренбург, Россия, 9-Января,29**,** nazkalms@mail.ru
Ахметалиева А.Б., к.с.-х.н., доцент, https://orcid.org/0000-0003-1788-8336
НАО «Западно-Казахстанский аграрно-технический университет имени Жангир хана», г. Уральск, ул. Жангир хана, 51, 090009, Казахстан, akhmetalieva@mail.ru

Kayumov F.G., Doctor of Agricultural Sciences, Professor https://orcid.org//0000-0002-5155-4295
Federal Research Center for Biological Systems and Agrotechnologies of the Russian Academy of Sciences, Orenburg, Russia**,** January 9, 29**,** kserev_1976@mail.ru
Tretyakova R.F., Candidate of Biological Sciences https://orcid.org//0000-0001-9241-9228, nazkalms@mail.ru
Akhmetalieva A.B., Candidate of agricultural sciences, https://orcid.org/0000-0003-1788-8336
NJSC «West Kazakhstan Agrarian and Technical University named after Zhangir Khan», Uralsk, st. Zhangir khan 51,090009, Kazakhstan, akhmetalieva@mail.ru

КАЧЕСТВО ПОТОМСТВА ОТ БЫКОВ ТИПА АДУЧИ: ОЦЕНКА И АНАЛИЗ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

THE QUALITY OF OFFSPRING FROM BULLS OF THE ADUCHI TYPE: IS AN ASSESSMENT AND ANALYSIS OF PRODUCERS

АННОТАЦИЯ

Данное исследование посвящено всесторонней оценке качества потомства быков-производителей типа Адучи, полученного в результате скрещивания абердин-ангусской и калмыцкой пород. Цель работы – сравнение эффективности двух методик оценки племенной ценности быков, основанных на анализе различных параметров потомства. Результаты исследования позволяют глубже понять генетический потенциал линии Адучи и оптимизировать селекционный процесс, направленный на улучшение мясных качеств и других важных хозяйственно-ценных признаков. Первый метод оценки, традиционный и общепринятый, основывался на анализе прижизненных показателей мясных качеств потомства быков-производителей. В ходе этого исследования были выделены два лидера: быки Царь 7341 и Запад 7393. Потомство этих быков продемонстрировало существенно более высокие показатели прижизненной оценки мясных качеств, а также значительно лучшую конверсию кормов – меньшие затраты кормов на единицу прироста живой массы. Примечательно, что бык Царь 7341 получил наивысшую общую оценку – 48 баллов, а его комплексный индекс составил 103,1%. Это свидетельствует о его выдающемся генетическом потенциале и способности передавать потомству желаемые признаки. Подробный анализ показал превосходство потомков Царя 7341 и Запада 7393 по таким показателям, как выход мяса, соотношение мышечной и жировой ткани, а также интенсивность роста. Статистическая обработка данных подтвердила достоверность полученных результатов ($p<0,05$), что указывает на высокую оценку. Однако,

традиционный метод не всегда позволяет достаточно точно дифференцировать животных, особенно при незначительных различиях в показателях. Поэтому исследователи применили второй, более совершенный метод, включающий в себя комплексный индекс племенной ценности с учетом типа телосложения потомков. Этот подход обеспечивает более точную и выразительную дифференциацию быков по категориям, что критически важно для эффективного отбора. Результаты, полученные с использованием второго метода, подтвердили превосходство быков Царь 7341 и Запад 7393. Потомство этих быков получило наивысшие баллы за телосложение – 20 баллов. В то же время, потомство быков Крот 7789 и Комок 7265 показало значительно худшие результаты – на 2 балла ниже (5,26%), хотя статистическая значимость этой разницы невысока ($p>0,05$). В заключение, бык-производитель Царь 7341, представитель заводской линии Целинного 4127, был признан абсолютным улучшателем и оценен высшей категорией – элита-рекорд, с еще более высоким комплексным индексом – 103,5%. Это подтверждает высокую эффективность обоих методов оценки, при этом второй метод предоставляет более тонкую дифференциацию и позволяет более точно оценить племенную ценность быков-производителей. Оба метода способствуют повышению качества селекции и совершенствованию типа Адучи, обеспечивая целенаправленное улучшение породных качеств и увеличение производительности животных. Полученные данные позволяют рекомендовать быка Царя 7341 для широкого использования в племенном разведении, что способствует дальнейшему улучшению породных качеств и повышению экономической эффективности животноводства.

ANNOTATION

This study is devoted to a comprehensive assessment of the quality of the offspring of bulls-producers of the Aduchi type, obtained as a result of crossing the Aberdeen Angus and Kalmyk breeds. The aim of the work is to compare the effectiveness of two methods for assessing the breeding value of bulls based on the analysis of various offspring parameters. The results of the study allow us to better understand the genetic potential of the Aduchi line and optimize the breeding process aimed at improving meat qualities and other important economically valuable traits. The first assessment method, which is traditional and generally accepted, was based on the analysis of lifetime indicators of meat qualities of the offspring of breeding bulls. In the course of this study, two leaders were identified: bulls Tsar 7341 and West 7393. The offspring of these bulls demonstrated significantly higher indicators of lifetime evaluation of meat qualities, as well as significantly better feed conversion – lower feed costs per unit of live weight gain. It is noteworthy that the bull Tsar 7341 received the highest overall score – 48 points, and its complex index was 103.1%. This indicates its outstanding genetic potential and the ability to transmit desired traits to offspring. A detailed analysis showed the superiority of the descendants of Tsar 7341 and the West 7393 in such indicators as meat yield, the ratio of muscle and fat tissue, as well as the intensity of growth. Statistical data processing confirmed the reliability of the results ($p<0.05$), which indicates a high score. However, the traditional method does not always allow for accurate differentiation of animals, especially with minor differences in performance. Therefore, the researchers applied a second, more advanced method, which includes a comprehensive index of breeding value, taking into account the type of physique of the descendants. This approach provides a more accurate and expressive differentiation of bulls by category, which is crucial for effective selection. The results obtained using the second method confirmed the superiority of the bulls Tsar 7341 and Zapad 7393. The offspring of these bulls received the highest scores for their physique – 20 points. At the same time, the offspring of bulls Mole 7789 and Lump 7265 showed significantly worse results – 2 points lower (5.26%), although the statistical significance of this difference is low ($p>0.05$). In conclusion, the bull-producer Tsar 7341, a representative of the Tselinny 4127 factory line, was recognized as an absolute improver and rated the highest category – elite-record, with an even higher complex index – 103.5%. This confirms the high efficiency of both assessment methods, while the second method provides a more subtle differentiation and

allows for a more accurate assessment of the breeding value of breeding bulls. Both methods contribute to improving the quality of breeding and improving the type of Aduchi, providing targeted improvement of breed qualities and increased productivity of animals. The data obtained make it possible to recommend the Tsar 7341 bull for widespread use in breeding, which contributes to further improvement of breed qualities and increased economic efficiency of animal husbandry.

***Ключевые слова**: быки-производители, оценка по качеству потомства, продуктивность, живая масса, среднесуточный прирост, комплексный индекс.*

***Keywords:** breeding bulls, assessment of the quality of offspring, productivity, live weight, average daily increase, complex index.*

Введение. В разведении мясных пород в воспроизводстве особую роль играет использование высокопродуктивных животных. Включение в программу разведения лучшего генетического материала должно способствовать постоянному улучшению экономически важных наследственных признаков. В этой связи для каждого нового поколения животных необходимо чётко определить приоритеты этих признаков [1-3].

Основным критерием отбора должно быть: живая масса, интенсивность роста молодняка и оплата корма приростом, воспроизводительная способность, конституция и экстерьер, выраженность типа телосложения и генотип животных [4-7].

Для этого в хозяйствах, занимающихся мясным скотоводством, ежегодно проводится комплексная оценка скота, позволяющая выделить наиболее ценных животных, которые будут широко использоваться в селекционно-племенной работе для совершенствования отдельных стад и пород в целом [8-12].

Успех племенной работы зависит от создания хороших условий кормления и содержания животных, которые направлены на выращивания племенного молодняка, организацию оценки производителей по собственной продуктивности и качеству потомства и интенсивное использование быков-улучшателей [13-16].

Материалы и методы исследования. Оценка быков- производителей нового типа Адучи калмыцкой породы была проведена в условиях ООО «Агрофирма Адучи» Республики Калмыкия. Для оценки быков- производителей создаваемого типа по качеству потомства были сформированы четыре группы бычков. Первая группа была представлена бычками – потомками быка-производителя Крота 7789, вторая – потомками быка-производителя Царя 7341, третья – потомками быка-производителя Запада 7393, четвертая – потомками быка-производителя Комка 7265.

Характеристика быков-производителей нового типа Адучи (абердин-ангусская × калмыцкая) пород представлена в таблице 1.

Таблица 1- Характеристика быков-производителей нового типа Адучи

Кличка, инд. № быка	Живая масса в возрасте					Высота в крестце в возрасте 5 лет, см	Оценка конституции и экстерьера, балл	Класс по собст. продуктивности
	8 мес	15 мес	2 года	3 года	5 лет			
Крот 7789	210	426	560	710	839	130	90	Эл/р
Царь 7341	216	438	575	718	886	137	92	Эл/р
Запад 7393	214	430	570	716	874	135	91	Эл/р
Комок 7265	212	429	565	714	842	132	90	Эл/р

Испытание сыновей длилось в течение 212 суток с 8 – до 15 – месячного возраста.

Оценка быков - производителей по качеству потомства проводилось двумя способами. Первый способ — общепринятая в мясном скотоводстве методика оценки генотипа быков, которая включает результаты испытания их потомков по интенсивности роста и затратам кормов на1 кг прироста за период контрольного выращивания с 8 до 15 мес., живой массе и прижизненной оценкемясных форм в возрасте 15 мес.

Второй способ предусматривал включение оценки выраженности типа телосложения. Балльная оценка выраженности типа телосложения произведена по методическим рекомендациям.

Бычков содержали в помещении легкого типа со свободным выходом на выгульный двор. Рационы кормления состояли из кормов собственного производства. В них входили следующие корма: в период доращивания с 8 до 12 месяцев – сено (8-10 кг), солома ячменная (2-4 кг) и концентраты (2,5-3,5 кг). В период с 13-15 месяцев бычки находились на пастбище, потребляя пастбищную траву, и при этом была организована подкормка концентратами в количестве 3-3,5 кг.

В структуре рационов у бычков с 8 до 12 – месячного возраста грубые корма составляли 56,1%, концентраты - 43,9 %, по питательности. На нагуле пастбищная трава составляла 76,04% и 23,96% концентраты, соответственно.

Взвешивание животных проводили на электронных платформенных весах. Взятие промеров осуществлялось с использованием измерительных инструментов.

При статистической обработке экспериментальных данных использовали методы вариационной статистики по А.А. Плохинскому, офисный программный комплекс Microsoft Office, программы Excel и Statistica 10.0.

Цель исследования – провести оценку быков-производителей создаваемого типа «Адучи» по качеству потомства разными методами

Результаты исследования. Бычки типа Адучи в условиях испытательнойстанции проявили достаточно высокую интенсивность роста. Несмотря на то, что отбор молодняка для испытания по собственной продуктивности проводили по принципу аналогов (с учетом возраста, живой массы и генотипа), к концу исследований (15 мес) наблюдались некоторые различия по средней величине живой массы в разрезе генеалогических групп.

Анализируя, полученные при испытании данные, установили, что лучшие показатели в 8-месячном возрасте были у потомков быков – производителей Комка 7265 и Крота 7789. Живая масса их потомков в возрасте 8 мес составляла 225,9 и 227,4 кг и была больше, чем у аналогов от быков – производителей Запада 7393 на 4,3 кг (1,94 %) и 5,8 кг (2,62 %), Царя 7341– 3,5 кг (1,57 %) и 5 кг (2,25%) (табл. 2).

В 15 мес положение изменилось, потомки Запада 7393 и Царя 7341 стали превосходить сверстников от быков Комка 7265 и Крота 7789 на 3,5 кг (0,80 %) и 5,9 кг (1,40 %), 9 кг (2,15 %) и 12 кг (2,76 %), соответственно. Индекс по данному показателю был выше у сыновей Царя 7341, чем у сверстников из других оцениваемых групп и составлял – 101,6.

Установленные различия по живой массе были обусловлены неодинаковой интенсивностью роста. Потомки Царя характеризовались наибольшим среднесуточным приростом за весь период испытания —1047,2 г и превосходили по величине этого показателя потомков Крота и Комка на 67,3 г, 72,4 г (6,87% и 7,42 %).

Сыновья быка-производителя Царя 7341 имели выраженный мясной тип телосложения, туловище растянутое, широкое, задняя его треть была хорошо заполнена мускулатурой. При этом они имели ровный, длинный и мясистый крестец. В результате самая лучшая оценка среди изучаемых генотипов за развитие мясных статей составила 56,1 балла. Экстерьерные показатели, полученные при испытании бычков отЦаря 7341 можно считать оптимальными и вполне соответствующими для животных высших бонитировочных классов.

Таблица 2 - Результаты оценки быков-производителей по качеству потомства по общепринятой методике

Кличка. Индивидуальный № быка	Живая масса в возрасте, кг			Среднесуточный прирост с 8 до 15 мес. возраста		Затраты корма на 1 кг прироста		Прижизненная оценка мясных качеств		Общий балл/ класс	Комплексный индекс
	8 мес.	15 мес.	индекс	г	индекс	корм. ед.	индекс	балл	индекс		%
Крот 7789 (п=12)	227,4	437,1	99,4	979,9	97,4	7,3	98,6	53,7	97,8	46 э/р	98,3
Царь 7341 (п=17)	222,4	446,5	101,6	1047,2	104,1	6,9	104,3	56,1	102,2	48 э/р	103,1
Запад 7393 (п=14)	221,6	440,6	100,2	1023,4	101,7	7,0	102,9	55,4	100,9	48 э/р	101,4
Комок 7265 (п=11)	225,9	434,5	98,8	974,8	96,9	7,4	97,3	54,2	98,7	44 эл.	97,9
В среднем (п=54)	224,5	439,7	100	1006,3	100	7,2	100	54,9	100	-	-

Общая оценка быка-производителя Царя составила 48 баллов, величина комплексного индекса –103,1 %.

В результате использования общепринятой методики оценки быков-производителей нового созданного типа Адучи по качеству потомства (по сыновьям) установлено, что к категории улучшателей можно отнести Царя 7341 и Запада 7393. Также они отличались более высокой прижизненной оценкой мясных качеств, лучшими показателями по затратам кормов на 1 кг прироста.

Потомки Крота 7789 и Комка 7265 отличались сравнительно меньшей живой массой в 15 месяцев и интенсивностью роста. Отставание в развитии мясных форм, а также повышенный расход кормов на 1 кг прироста привели к тому, что комплексный индекс у них был меньше, чем у улучшателей.

Следует отметить, что в общепринятой системе испытания быков — по качеству потомства, а сыновей по собственной продуктивности основные селекционные признаки, в значительной мере, определяющие племенную ценность и результирующую величину комплексного индекса – живая масса и среднесуточный прирост.

Проведена также оценка по качеству потомства быков - производителей, а их сыновей по собственной продуктивности с внедрением дополнительного критерия - выраженность типа телосложения (табл. 3).

Выраженность типа телосложения определяли с учётом высоты в крестце и балльной оценки экстерьера. Худшие величины по этому признаку отмечены у потомков Крота 7789 и Комка 7265. Они уступали сверстникам на 2 балла (5,26 %; $P>0,05$).

Таблица 3 - Результаты оценки быков-производителей по качеству потомства с учетом выраженности типа телосложения

Кличка. Индивидуальный № быка	Живая масса бычков, кг			Среднесуточный прирост в период 8 -15 мес.		Выраженность телосложения		Затраты корма на 1 кг прироста		Прижизненная оценка мясных качеств		Общий балл / класс	Комплексный индекс
	8 мес	15 мес	индекс	г	индекс	балл	индекс	корм. ед.	индекс	балл	индекс		%
Крот 7789 (п=12)	227,4	437,1	99,4	979,9	97,4	18	94,7	7,3	98,6	53,7	97,8	46 э/р	97,6
Царь 7341 (п=17)	222,4	446,5	101,6	1047,2	104,1	20	105,3	6,9	104,3	56,1	102,2	50 э/р	103,5
Запад 7393 (п=14)	221,6	440,6	100,2	1023,4	101,7	20	105,3	7,0	102,9	55,4	100,9	50 э/р	102,7
Комок 7265 (п=11)	225,9	434,5	98,8	974,8	96,9	18	94,7	7,4	97,3	54,2	98,7	46 э/р	97,3
В среднем (п=54)	224,3	439,7	100	1006,3	100	19	100	7,2	100	54,9	100	-	-

При этом сыновья Царя превосходили сверстников от двух других производителей по селекционным индексам. В итоге бык-производитель Царь заводской линии Целинного 4127, признан абсолютным улучшателем и оценен по качеству потомства классом элита-рекорд с высоким комплексным индексом -103,5%.

Вместе с тем индексная оценка выраженности типа телосложения способствовала увеличению комплексного индекса у Запада 7393 и Царя 7341.

Таким образом, на величину комплексного индекса быков-производителей при оценке по качеству потомства, существенно влияют показатели выраженности типа телосложения по высоте в крестце, что является критерием отбора высокорослых, с крупным форматом телосложения животных, обладающих способностью передавать этот признак потомству.

Возможность отбора по высоте в крестце подтверждается, в частности, результатами исследования взаимосвязи этого промера с признаками, определяющими величину туловища у производителей. Так, у взрослых быков типа Адучи между высотой в крестце и живой массой, косой длиной туловища, глубиной и обхватом груди существует достоверная (Р <0,05-0,001) прямолинейная связь, коэффициент корреляции во всех случаях положителен, весьма значим (r=0,72, 0,68 0,62, 0,54) и высоко достоверен (табл.4).

Таблица 4 - Регрессия между высотой в крестце, живой массой и другими линейными промерами у бычков нового типа Адучи

Промер	Коэффициент регрессии (Р±mr)	Критерий достоверности, t	Пределы при Р=0,05	
			минимум	максимум
Живая масса, кг	8,12±1,28	5,47	5,89	10,13
Косая длина туловища, см	0,68±0,19	4,32	0,48	0,98
Обхват груди, см	0,874±0,21	4,21	0,28	1,09

Глубина груди, см	5,12±0,46	5,12	0, 44	0,72

Регрессивный анализ показал, что при возрастании или уменьшении высоты в крестце на 1 см живая м асса быков повышается (снижается) в среднем на 8,12 кг при гарантированном (P=0,05) минимуме 5,89 и возможном максимуме – 10,13 кг.

Таким образом, отбор животных по высоте в крестце в этой популяции неизбежно будет сопровождаться и соответствующим отбором по живой массе.

Заключение. Для повышения достоверности оценки быков по качеству потомства необходимо учитывать балльную оценку типа телосложения по принятым стандартам высоты в крестце, что обеспечит более выраженную дифференциацию животных по категориям и позволит вести более целенаправленную работу по созданию высокорослых типов мясного скота.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Джуламанов К.М., Сафронова А.А., Платонов С.А., Кизаев М.А. Оценка генотипа герефордского скота по племенным и продуктивным качествам. Вестник Бурятской государственной сельскохозяйственной академии им. В.Р. Филиппова. 2022. № 4(69). С. 63-69. [Assessment of the genotype of Hereford cattle by breeding and productive qualities. Bulletin of the Buryat State Agricultural Academy named after V.R. Filippov. 2022; 4(69):63-69. (In Russ.)].

2. Масленникова Е.С. Эффективность использования быков, оцененных по качеству потомства и геному, в хозяйствах Ленинградской области // Молочное и мясное скотоводство. 2020. № 6. С.12-17. [Maslennikova ES. Efficiency of using bulls evaluated by the quality of offspring and genome in farms of the Leningrad region. Dairy and Beef Cattle Farming. 2020;6:12-17. (In Russ.)].

3. Хайнацкий В.Ю. Собственная продуктивность как критерий оценки племенной ценности быков в мясном скотоводстве // Животноводство и кормопроизводство. 2019. Т. 102. № 1. С. 112-120. [Khaynatsky VYu. Own productivity as breeding value evaluation criterion of beef bulls. Animal Husbandry and Fodder Production. 2019;102(1):112-120. (In Russ.)].

4. Каюмов Ф.Г., Третьякова Р.Ф. Результаты оценки быков-производителей абердинангусской породы по качеству потомства, выделение родоначальников новых линий // Известия Оренбургского государственного аграрного университета. 2020. № 4(84). С. 273-277. [Kayumov FG, Tretyakova RF. The results of the Aberdeen-Angus sires assessment by the quality of their offspring and identification of the new pedigree lines. Izvestia Orenburg State Agrarian University. 2020;4(84):273-277. (In Russ.)].

5. Эффективность использования генетического потенциала быков-производителей различных линий // Н.И. Хайруллина, Н.Г. Фенченко, Д.Х. Шамсутдинов, Ф.М. Шагалиев // Молочное и мясное скотоводство. 2020. № 6. С. 24-26. [Khairullina NI, Fenchenko NG, Shamsutdinov DKh, Shagaliev FM. Efficiency of the use of genetic potential of seed bulls from various lines. Dairy and Beef Cattle Farming. 2020;6:24-26. (In Russ.)]

6. Колпаков В. И. Влияние некоторых полиморфных генов на мясную продуктивность и качество мяса у крупного рогатого скота (обзор). Животноводство и кормопроизводство. 2020. Т. 103. № 4. С. 47–64. [Kolpakov V. I. Influence of some polymorphic genes on meat productivity and meat quality in cattle (review). Animal husbandry and feed production. 2020;103(4):47-64. (In Russ.)].

7. Тагиров Х.Х., Николаева Н.Ю., Ишбердина Р.Р. Рост и мясная продуктивность молодняка герефордской породы в условиях юга Западной Сибири. Молочное и мясное скотоводство. 2021. № 2. С. 15-17. [Tagirov Kh.Kh., Nikolaeva N.Y., Ishberdina R.R. Growth and meat productivity of young Hereford breed in the conditions of the South of Western Siberia. Dairy and beef cattle breeding. 2021;2:15-17. (In Russ.)].

8. Сеитов М.С., Левицкая Т.Т. Содержание, кормление и сравнительная оценка показателей роста бычков разных генотипов. Известия Оренбургского государственного

аграрного университета. 2021. № 1(87). С. 256-260. [Seitov M.S., Levitskaya T.T. Maintenance, feeding and comparative assessment of growth indicators of bull calves of different genotypes. Proceedings of the Orenburg State Agrarian University. 2021;1(87):256-260(In Russ.)].

9. Гармаев Д.Ц., Толочка В.В., Косилов В.И. Особенности весового роста бычков специализированных мясных пород в условиях Приморского края. Вестник Бурятской государственной сельскохозяйственной академии им. В.Р. Филиппова. 2021. № 3 (64). С. 23-29. [Garmaev D.Ts., Tolochka V.V., Kosilov V.I. Features of weight growth of gobies of specialized meat breeds in the conditions of Primorsky Krai. Bulletin of the Buryat State Agricultural Academy named after V.R. Filippov. 2021;3 (64): 23-29. (In Russ.)].

10. Герасимов Р.П. Взаимосвязь показателей племенной ценности и мясной продуктивности у бычков казахской белоголовой породы // Животноводство и кормопроизводство. 2022. Т. 105. № 2. С. 28-36. [Gerasimov RP. The relationship between indicators of breeding value and meat productivity in Kazakh White-Headed bull-calves. Animal Husbandry and Fodder Production. 2022;105(2):28- 36. (In Russ.)].

11. Даниленко О.В., Тамаровский М.В. Разведение племенного аулиекольского скота в Казахстане // Аграрная наука. 2017. № 4. С. 21-24. [Danilenko OV, Tamarovsky MV. Breeding auliekolsky cattle in Kazakhstan. Agrarian Science. 2017;4:21-24. (In Russ.)].

12. Герасимов Н.П. Реализация генетического потенциала быков-производителей в герефордских стадах разной племенной ценности // Вестник Бурятской государственной сельскохозяйственной академии им. В.Р. Филиппова. 2019. № 3(56). С. 67-73. [Gerasimov N. Genetical potential of artificial insemination sires in Hereford herds with different breeding value. Vestnik of Buryat State Academy of Agriculture named after V. Philippov. 2019;3(56):67-73. (In Russ.)].

13. Герасимов Н.П., Джуламанов К.М. Племенная оценка и отбор герефордских бычков для селекции // Вестник Бурятской государственной сельскохозяйственной академии им. В.Р. Филиппова. 2020. № 1(58). С. 39-45. [Gerasimov N, Dzhulamanov K. Breeding value estimation and selection of Hereford bull-calves. Vestnik of Buryat State Academy of Agriculture named after V. Philippov. 2020;1(58):39-45. (In Russ.)].

14. Испытание бычков по собственной продуктивности как метод совершенствования селекционно-племенной работы с мясными породами скота / Е.Г. Насамбаев, А.Б. Ахметалиева, А.Е. Нугманова, А.И. Кузьмина, С.Н. Шушаков // Наука и образование. 2023. № 1-2(70). С. 43-56. [Nassambayev E, Akhmetalieva AB, Nugmanova AE, Kuzmin AI, Shushakov SN. Testing of bulls by their own productivity as a method of improving breeding work with meat breeds of cattle. Science and Education. 2023;1-2(70):43-56. (In Russ.)].

15. Кадышева М.Д., Тюлебаев С.Д. Особенности приращения живой массы потомков быков-производителей как продолжателей создаваемых линий // Известия Оренбургского государственного аграрного университета. 2020. № 6(86). С. 270-275. [Kadysheva MD, Tyulebaev SD. Features of the increase in live weight of the offspring of sire bulls as successors of the created lines. Izvestia Orenburg State Agrarian University. 2020;6(86):270-275. (In Russ.)].

16. Каюмов Ф.Г., Третьякова Р.Ф. Селекционно-генетические параметры продуктивности молодняка разных генотипов // Известия Оренбургского государственного аграрного университета. 2020б. № 3(83). С. 301-303. [Kayumov FG, Tretyakova RF. Selection and genetic performance parameters of young cattle with different genotypes. Izvestia Orenburg State Agrarian University. 2020b;3(83):301-303. (In Russ.)].

REFERENCES

1. Dzhulamanov K.M., Safronova A.A., Platonov S.A., Kizaev M.A. Ocenka genotipa gerefordskogo skota po plemennym i produktivnym kachestvam. Vestnik Buryatskoj gosudarstvennoj sel'skohozyajstvennoj akademii im. V.R. Filippova. 2022. № 4(69). S. 63-69.

2. Maslennikova E.S. Effektivnost' ispol'zovaniya bykov, ocenennyh po kachestvu potomstva i genomu, v hozyajstvah Leningradskoj oblasti // Molochnoe i myasnoe skotovodstvo. 2020. № 6. S.12-17.

3. Hajnackij V.Yu. Sobstvennaya produktivnost' kak kriterij ocenki plemennoj cennosti bykov v myasnom skotovodstve // Zhivotnovodstvo i kormoproizvodstvo. 2019. T. 102. № 1. S. 112-120.

4. Kayumov F.G., Tret'yakova R.F. Rezul'taty ocenki bykov-proizvoditelej aberdinangusskoj porody po kachestvu potomstva, vydelenie rodonachal'nikov novyh linij // Izvestiya Orenburgskogo gosudarstvennogo agrarnogo universiteta. 2020. № 4(84). S. 273-277.

5. Effektivnost' ispol'zovaniya geneticheskogo potenciala bykov-proizvoditelej razlichnyh linij // N.I. Hajrullina, N.G. Fenchenko, D.H. Shamsutdinov, F.M. Shagaliev // Molochnoe i myasnoe skotovodstvo. 2020. № 6. S. 24-26.

6. Kolpakov V. I. Vliyanie nekotoryh polimorfnyh genov na myasnuyu produktivnost' i kachestvo myasa u krupnogo rogatogo skota (obzor). Zhivotnovodstvo i kormoproizvodstvo. 2020. T. 103. № 4. S. 47–64.

7. Tagirov H.H., Nikolaeva N.Yu., Ishberdina R.R. Rost i myasnaya produktivnost' molodnyaka gerefordskoj porody v usloviyah yuga Zapadnoj Sibiri. Molochnoe i myasnoe skotovodstvo. 2021. № 2. S. 15-17.

8. Seitov M.S., Levickaya T.T. Soderzhanie, kormlenie i sravnitel'naya ocenka pokazatelej rosta bychkov raznyh genotipov. Izvestiya Orenburgskogo gosudarstvennogo agrarnogo universiteta. 2021. № 1(87). S. 256-260.

9. Garmaev D.C., Tolochka V.V., Kosilov V.I. Osobennosti vesovogo rosta bychkov specializirovannyh myasnyh porod v usloviyah Primorskogo kraya. Vestnik Buryatskoj gosudarstvennoj sel'skohozyajstvennoj akademii im. V.R. Filippova. 2021. № 3 (64). S. 23-29.

10. Gerasimov R.P. Vzaimosvyaz' pokazatelej plemennoj cennosti i myasnoj produktivnosti u bychkov kazahskoj belogolovoj porody // Zhivotnovodstvo i kormoproizvodstvo. 2022. T. 105. № 2. S. 28-36.

11. Danilenko O.V., Tamarovskij M.V. Razvedenie plemennogo auliekol'skogo skota v Kazahstane // Agrarnaya nauka. 2017. № 4. S. 21-24.

12. Gerasimov N.P. Realizaciya geneticheskogo potenciala bykov-proizvoditelej v gerefordskih stadah raznoj plemennoj cennosti // Vestnik Buryatskoj gosudarstvennoj sel'skohozyajstvennoj akademii im. V.R. Filippova. 2019. № 3(56). S. 67-73.

13. Gerasimov N.P., Dzhulamanov K.M. Plemennaya ocenka i otbor gerefordskih bychkov dlya selekcii // Vestnik Buryatskoj gosudarstvennoj sel'skohozyajstvennoj akademii im. V.R. Filippova. 2020. № 1(58). S. 39-45.

14. Ispytanie bychkov po sobstvennoj produktivnosti kak metod sovershenstvovaniya selekcionno-plemennoj raboty s myasnymi porodami skota / E.G. Nasambaev, A.B. Ahmetalieva, A.E. Nugmanova, A.I. Kuz'mina, S.N. Shushakov // Nauka i obrazovanie. 2023. № 1-2(70). S. 43-56

15. Kadysheva M.D., Tyulebaev S.D. Osobennosti prirashcheniya zhivoj massy potomkov bykov-proizvoditelej kak prodolzhatelej sozdavaemyh linij // Izvestiya Orenburgskogo gosudarstvennogo agrarnogo universiteta. 2020. № 6(86). S. 270-275.

16. Kayumov F.G., Tret'yakova R.F. Selekcionno-geneticheskie parametry produktivnosti molodnyaka raznyh genotipov // Izvestiya Orenburgskogo gosudarstvennogo agrarnogo universiteta. 2020b. № 3(83). S. 301-303.

ТҮЙІН

Бұл зерттеу абердин-ангус және қалмақ тұқымдарын будандастыру нәтижесінде алынған адучи типті бұқалардың ұрпақтарының сапасын жан-жақты бағалауға арналған. Жұмыстың мақсаты - ұрпақтың әртүрлі параметрлерін талдауға негізделген бұқалардың

асыл тұқымды құндылығын бағалаудың екі әдісінің тиімділігін салыстыру. Зерттеу нәтижелері Адучи ізінің генетикалық әлеуетін тереңірек түсінуге және ет қасиеттерін және басқа да маңызды экономикалық құнды белгілерді жақсартуға бағытталған селекциялық процесті оңтайландыруға мүмкіндік береді. Бағалаудың бірінші әдісі, дәстүрлі және жалпы қабылданған, бұқалардың ұрпақтарының еттілік қасиеттерінің өмірлік көрсеткіштерін талдауға негізделген. Осы зерттеу барысында екі көшбасшы анықталды: 7341 Царь және 7393 Батыс бұқалары. Бұл бұқалардың ұрпақтары еттілік қасиеттерін өмір бойы бағалаудың едәуір жоғары көрсеткіштерін көрсетті, сонымен қатар жемшөптің конверсиясы едәуір жақсарды – тірі салмақтың өсу бірлігіне аздаған жем шығындары. Бір қызығы, 7341 Царь бұқасы ең жоғары жалпы рейтингке ие болды – 48 балл, ал оның кешенді индексі 103,1% құрады. Бұл оның керемет генетикалық әлеуетін және ұрпаққа қажетті белгілерді беру қабілетін көрсетеді. Егжей-тегжейлі талдау 7341 Царь мен 7393 Батыс ұрпақтарының ет өнімділігі, бұлшықет пен май тінінің арақатынасы және өсу қарқындылығы сияқты көрсеткіштер бойынша артықшылығын көрсетті. Деректерді статистикалық өңдеу алынған нәтижелердің дұрыстығын растады ($p<0,05$), бұл жоғары бағаны көрсетеді. Алайда, дәстүрлі әдіс әрдайым жануарларды дәл ажыратуға мүмкіндік бермейді, әсіресе индикаторларда шамалы айырмашылықтар болған кезде. Сондықтан зерттеушілер ұрпақтардың дене түрін ескере отырып, асыл тұқымды құндылықтың кешенді индексін қамтитын екінші, жетілдірілген әдісті қолданды. Бұл тәсіл бұқаларды санаттар бойынша дәлірек және мәнерлі саралауды қамтамасыз етеді, бұл тиімді таңдау үшін өте маңызды. Екінші әдіспен алынған нәтижелер бұқалардың артықшылығын растады 7341 Царь және 7393 Батыс. Бұл бұқалардың ұрпақтары дене бітімі үшін ең жоғары ұпай жинады – 20 ұпай. Сонымен қатар, бұқалардың ұрпақтары 7789 және 7265 айтарлықтай нашар нәтиже көрсетті-2 баллдан төмен (5,26%), дегенмен бұл айырмашылықтың статистикалық маңыздылығы төмен ($p>0,05$). Қорытындылай келе, өндіруші 7341Царь бұқасы, 4127 зауыттық желісінің өкілі абсолютті жақсартушы ретінде танылды және жоғары санатпен бағаланды-элита – рекорд, одан да жоғары кешенді индексі-103,5%. Бұл бағалаудың екі әдісінің де жоғары тиімділігін растайды, екінші әдіс неғұрлым нәзік дифференциацияны қамтамасыз етеді және өсіруші бұқалардың асыл тұқымды құндылығын дәлірек бағалауға мүмкіндік береді. Екі әдіс те асыл тұқымды қасиеттерді мақсатты түрде жақсартуды және жануарлардың өнімділігін арттыруды қамтамасыз ете отырып, селекция сапасын жақсартуға және Адучи түрін жақсартуға ықпал етеді. Нәтижелер асыл тұқымды өсіруде кеңінен қолдану үшін 7341 Царь бұқасын ұсынуға мүмкіндік береді, бұл асыл тұқымды қасиеттерді одан әрі жақсартуға және мал шаруашылығының экономикалық тиімділігін арттыруға ықпал етеді.

УДК 68.35
МРНТИ: 68.35.47

Булеков Тулеген Ахметович, кандидат сельскохозяйственных наук, https://orcid.org/0000-0001-5975-3232
ТОО «Уральская сельскохозяйственная опытная станция», Республика Казахстан, г. Уральск, ул. Бараева 6, ucxoc.1914@mail.ru
Кузембаев Мирдос Оразбаевич, магистр сельскохозяйственных наук, «https://orcid.org/ 0000-0001-5975-3232»
ТОО «Уральская сельскохозяйственная опытная станция», Республика Казахстан, г. Уральск, ул. Бараева, 6, ucxoc.1914@mail.ru
Бекеев Жаскайрат Галимович, специалист-зоотехник, https://orcid.org/ 0000-0001-5975-3232
ТОО «Уральская сельскохозяйственная опытная станция», Республика Казахстан, г. Уральск, ул. Бараева 6, ucxoc.1914@mail.ru

Bulekov Tulegen Akhmetovich, Candidate of Agricultural Sciences, https://orcid.org/ 0000-0001-5975-3232
«Ural agricultural experimental station» LLP, Republic of Kazakhstan, Uralsk Baraev street, 6. ucxoc.1914@mail.ru
Kuzembaev Mirdos Orazbaevich, Master of Agricultural Sciences https://orcid.org/ 0000-0001-5975-3232
«Ural agricultural experimental station» LLP, Republic of Kazakhstan, Uralsk Baraev street, 6. ucxoc.1914@mail.ru
Bekeev Jaskayrat Galimovich, zootechnician-specialist, https://orcid.org/ 0000-0001-5975-3232
«Ural agricultural experimental station» LLP, Republic of Kazakhstan, Uralsk Baraev street, 6. ucxoc.1914@mail.ru

КУКУРУЗА ОСНОВНОЕ ЗВЕНО КОРМОВОГО КОНВЕЙЕРА
CORN IS THE MAIN LINK OF THE FEED CONVEYOR

АННОТАЦИЯ

Современная классификация кукурузы по группам спелости опирается на шкалу ФАО и заключается в сравнении гибрида со стандартными гибридами, выведенными на Государственной селекционной станции штата Висконсин. Впоследствии наименование класса было присвоено интервалу внутри шкалы в соответствии с климатическими условиями данного региона. Нужно понимать, что чем севернее находится территория возделывания, тем уже интервалы, относящиеся к классу ФАО. Поэтому крайне важно выбирать гибрид не только по показателям ФАО, но и учитывать данные сортоиспытательных участков данного региона. Полезно иметь и собственные опытные участки на территории хозяйства. Гибрид должен максимально использовать вегетационный период климатического района для высокого уровня урожайности.

При выборе гибридов следует учитывать сценарий уборки. Если в хозяйстве планируется заложить силос в течение 2 недель, то можно использовать всю площадь под гибриды одной группы спелости. Если же предполагается убрать кукурузу за 20–25 дней, то сеять следует ранние и поздние гибриды в равных долях. Когда закладка силоса длится до 30–40 дней, то доля ранних гибридов должна составлять 35%, а более поздних — 65%.

Благодаря мощной кормовой системе и экономному расходованию влаги, кукурузы наиболее приспособлен для выращивания в регионах, которые страдают от частых засух в летний период. Это единственная культура, которая дает устойчивый урожай зеленой массы в засушливых условиях Западного Казахстана.

ANNOTATION

The modern classification of corn by maturity groups is based on the FAO scale and consists of comparing the hybrid with standard hybrids bred at the Wisconsin State Breeding Station. Subsequently, the class name was assigned to the interval within the scale in accordance with the climatic conditions of a given region. It is important to understand that the further north the cultivation area is, the narrower the intervals related to the FAO class. Therefore, it is extremely important to choose a hybrid not only according to FAO indicators, but also to take into account the data of the variety testing sites of a given region. It is also useful to have your own experimental sites on the farm. The hybrid must make maximum use of the growing season of the climate zone for a high level of yield.

When choosing hybrids, the harvesting scenario should be taken into account. If the farm plans to lay silage within 2 weeks, then the entire area can be used for hybrids of one maturity group. If it is supposed to harvest corn in 20-25 days, then early and late hybrids should be sown in equal shares. When laying silage lasts up to 30-40 days, the share of early hybrids should be 35%, and later ones - 65%.

Thanks to its powerful feed system and economical use of moisture, corn is best suited for cultivation in regions that suffer from frequent droughts in the summer. It is the only crop that produces a stable harvest of green mass in the arid conditions of Western Kazakhstan.

Ключевые слова: *кукуруза, обработка почвы, урожайность, зеленой массы, минимальной технологии.*

Key words: *corn, soil cultivation, yield, green mass, minimum technology*.

Введение. Добиться устойчивого роста производства продуктов животноводства можно только на основе рационального, научно -обоснованного кормления животных, путем повышения качества кормов. Даже незначительное улучшение качества растениеводческой продукции – это дополнительное количество белка, жира, крахмала, витаминов – веществ, необходимых для питания животных. Чем выше питательная ценность кормов, тем в большей степени они отвечают физиологическим требованиям животных, способствуют росту их продуктивности, снижают себестоимость животноводческой продукции [1,2,3].

Для составление сбалансированных рационов необходимо знать фактическое наличие в зеленной массе качественных показателей. Питательную ценность устанавливают по наличию в них основных элементов питания. Знание химического состава и питательности зеленой массы кормовых культур имеет большое практическое значение, необходима для организации балансированного полноценного кормления сельскохозяйственных животных [4,5].

Кормовая база должна создаваться на внутренних ресурсах хозяйства и включать наиболее дешевые источники питательных веществ [6,7].

Способ возделывания кукурузы, включающий предпосевную культивацию на глубину заделки семян, посев семян, довсходовые культивации с боронованием и последующий уход за посевами путем повсходовой и междурядных обработок почвы, в котором, с целью повышения урожайности за счет эффективного уничтожения сорняков в защитной зоне и сохранения влаги, повсходовую обработку почвы проводят путем первой культивации в фазе 5-6 листьев с образованием свального гребня по оси рядка растений высотой 5-6 см и второй культивации в фазе 8-10 листьев с образованием вала высотой 8-10 см на защитной зоне, а междурядную обработку проводят путем выравнивания почвы и глубокого рыхления на глубину 8-10 см [8,9,10].

Способ выращивания кукурузы на силос, включающий совместный посев кукурузы с викоовсяной смесью, внесение удобрений, междурядную обработку кукурузы, скашивание силосной массы поперек посевов, отличающийся тем, что, с целью повышения продуктивности и улучшения качества силосной массы, в состав викоовсяной смеси дополнительно вводят рапс, причем посев викоовсяно рапсовой смеси проводят в фазу 2-3 листьев кукурузы [11,12,13].

Материал и методы. На базе травопольного севооборота стационара отдела неорошаемого земледелия и кормопроизводства ТОО «Уральская СХОС» были изучены различные агротехнические приемы обработки почвы, изучали раннеспелый гибрид (ФАО 190). Деркульский 150 СВ [14,15].

Варианты основной обработки пласта многолетних трав: а) культиватор ОПО 4,25 на глубину 10-12 см (контроль); б) культиватор ОПО 4,25 + щелевание орудием «РАНЧО» (Ресурсосберегающий Анти Нулевой Чизельное Орудие); в) культиватор ОПО 4,25 + плоскорезная обработка КПГ-250» [16].

Результаты. Способ возделывания кукурузы на силос на темно-каштановой, среднесуглинистой почве для получения стабильных урожаев предусматривает соблюдение всех агротехнологических приемов возделывания.

Для сравнения урожайности зеленой массы кукурузы по вариантам влагоресурсосберегающей минимальной технологии обработки почвы, предшественник

пласт многолетних трав пятого года жизни. Результаты изучения вариантов влагоресурсосберегающей минимальной технологии обработки почвы по накоплению влаги перед посевом в метровом слое приведены в таблице 1 в которой видно, что вариант обработки почвы культиватором ОПО - 4,25 + щелевание «РАНЧО» обеспечивает прибавку продуктивной влаги кукурузы на силос на 28,5%, пшеницы на 10,3%.

Таблица 1 - Запас продуктивной влаги в метровом слое перед посевом по вариантам обработки, мм

Культура	Технология	Годы исследования			Средняя
		2022	2023	2024	
Кукуруза на силос - Первая культура после пласта многолетних трав	Контроль Культивация	135,0	124,6	107,9	122,5±1,3
	Культивация + щелевание	167,5	148,1	138,1	151,2±3,4
	Культивация +Плоскорез	134,6	157,1	125	138,9±1,3
Пшеница - Вторая культура после пласта многолетних трав	Культивация	110,6	116,9	119,4	152,3±1,3
	Культивация + щелевание	124,0	122,5	136,0	127,5±3,7
	Культивация +Плоскорез	120,0	118,5	121,1	119,8±1,2

Из таблицы 2 видно, что в среднем за 3 года вариант обработки почвы культивация + щелевание дает прибавку урожая: 1-й культуры кукурузы на силос – на 11,2%; 2-ая культура пшеница – на 18,5%.

Таблица 2 - Урожайность культур, ц/га

Культура	Технология	Годы исследования			Средняя
		2022	2023	2024	
Кукуруза зеленая масса - Первая культура после пласта многолетних трав	Контроль Культивация	328±21,3	325±22,5	135±12,8	262,6±22,3
	Культивация + щелевание	383±21,4	301±22,8	192±13,5	292,0±24,3
	Культивация +Плоскорез	380±21,4	248± 22,6	105±13,1	244,3±21,3
Пшеница - Вторая культура после пласта многолетних трав	Культивация	4,1±0,9	4±0,7	9,7±0,2	5,9±1,3
	Культивация + щелевание	5,8±1,5	5,1±1,7	10,2±1,5	7,0±1,6
	Культивация +Плоскорез	4,8±1,2	3,5±1,2	8,8±1,4	5,7±1,4

Способ возделывания кукурузы на силос условиях богары Западного Казахстана в звене сырьевого конвейера «пласт многолетних трав пятого года жизни кукурузы на силос - яровая пшеница», включающий способ разделки пласта многолетних трав и посев кукурузы с междурядьем 70 см, основную обработку пласта многолетних трав проводят культиватором ОПО-4,25 на глубину 10-12 см и последующим щелеванием орудием «РАНЧО» на глубину 35 см, проведение предпосевной культивации на глубину 5-7 см, для получения дружных всходов семена заделывают во влажный слой почвы на глубину 7-8 см сеялкой СЗС-2,1 с анкерными сошниками при температуре +10-+12ºС и прикатывают.

Заключение. Установлено, что наиболее эффективный способ обработки почвы травопольного севооборота на темно-каштановой, среднесуглинистой почве является обработка культиватором ОПО 4,25 на глубину 10-12 см с последующим щелеванием орудием «РАНЧО» на глубину 35 см. Экономическая эффективность подтверждает возможность повышения рентабельности производства кукурузы на силос от 25,7 до 31,02 % за счет последействия органических остатков многолетних трав и накопления влаги.

Благодарности. НТП BR21881871 «Разработка технологий и приемов заготовки кормов в кормовых угодьях Казахстана в контексте устойчивого управления» Комитета науки Министерством науки и высшего образования Республики Казахстан.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Панфилова О.Н., Дерунова С. Н., Основные элементы технологии возделывания гибридов кукурузы на зерно на северо-западе Волгоградской области // Орошаемое земледелие. – 2023. – № 1(40). – С. 20-24. – DOI 10.35809/2618-8279-2023-1-5.

2. Антипова К. М., Бачурин А. В., Влияние технологий возделывания на продуктивность гибридов кукурузы // В сборнике: Экология и сельское хозяйство: на пути к инновациям. Материалы Международной научно-практической конференции. – 2019. – С. 17-23.

3. Багринцева В. Н., Шмалько И. А., Ивашененко И. Н., Кузнецова С. В., [и др.] Элементы технологии возделывания раннеспелых и среднеранних гибридов кукурузы в Ставропольском крае / // В книге: Современное состояние, проблемы и перспективы развития аграрной наук. Материалы III Международной научной конференции. – 2018. – С. 96-97.

4. Воронин А. Н., Никитин В. В., Соловиченко В. Д., Навольнева Е. В., Влияние удобрений и способов основной обработки почвы на урожай зерна кукурузы / А. Н. Воронин, // Кукуруза и сорго. – 2018. – № 2. – С. 32-34.

5. Долженко К. С., Загорулько А. В., Способы основной обработки почвы и их эффективность при выращивании кукурузы на зерно // В сборнике: Энтузиасты аграрной науки. Сборник статей по материалам Всероссийской научно-практической конференции, посвящённой 310-летию Йогана Готтшалька Валлериуса и 90-летию академика Ефимова Виктора Никифоровича. – 2019. – С. 113-122.

6. Зеленская Г. М., Носырев С. А., Продуктивность кукурузы в зависимости от технологий выращивания // Вестник Донского государственного аграрного университета. – 2021. – № 3 (41). – С. 17-22.

7. Кушхабиев А. З., Кагермазов А. М., Хачидогов А. В. Научно обоснованная технология возделывания кукурузы // Известия Кабардино-Балкарского научного центра РАН. – 2019. – № 1 (87). – С. 94-97.

8. Мамсиров Н. И., Мнатсаканян А. А. О роли минеральных удобрений и способов основной обработки почвы в формировании продуктивности гибридов кукурузы // Аграрный вестник Урала. – 2021. – № 9 (212). – С. 11-24.

9. Петухов Д. А., Свиридова С. А., Негреба О. Н. Результаты исследований инновационных технологий борьбы с сорняками на посевах кукурузы на зерно // Техника и оборудование для села. – 2018. – № 7. – С. 22-26.

10. Прохорова Л. Н., Волков А. И., Сидоров О. О. Влияние технологии возделывания на урожайность и качество кукурузного зерна // Аграрная Россия. – 2021. – № 10. – С. 26-29.

11. Сотченко В. С., Багринцева В. Л. // Технология возделывания кукурузы Вестник АПК Ставрополья. – 2015. – № 2. – С. 79-84.

12. Стулин, А. Ф. Продуктивность кукурузы при длительном применении различных агротехнических приёмов в условиях стационарных опытов // Новые методы и результаты исследований ландшафтов в Европе, Центральной Азии и Сибири (Монография

в пяти томах). Том 4. Оптимизация сельскохозяйственных ландшафтов / под редакцией В. Г. Сычёва, Л. Мюллера // М.: изд-во ФГБНУ «ВНИИ агрохимии». – 2018. – С. 254-257.

13. Abbas, G. Sowing. Date and Hybrid Choice Matters Production of MaizeMaize System // International Journal of Plant Production. – 2020. – Vol. 14. – Iss. 4. – Pp. 583-595.

14. Тютюнов С. И., Солнцев П. И., Хорошилова Ю. В. [и др.] Изменение качества зерна кукурузы в зависимости от интенсификации элементов технологии возделывания // Сахарная свекла. – 2021. – № 9. – С. 36-38. – DOI 10.25802/SB.2021.99.54.005.

15. Бурлуцкий А. В., Клостер Н. И., Азаров В. Б. Эффективность биологической технологии возделывания кукурузы на // Наука и молодёжь: актуальные вопросы и пути инновационного развития АПК : Материалы национальной научно-практической студенческой конференции «Наука и молодёжь: актуальные вопросы и пути инновационного развития АПК», посвященной 95-летию заслуженного агронома Российской Федерации Н.Р. Асыки, Майский, 24 сентября 2024 года. – Майский: ФГБОУ ВО Белгородский ГАУ, 2024. – С. 47-48.

16. Даниленко Ю. П., Любименко Т. А., Совершенствование технологии возделывания кукурузы - основной путь повышения урожайности / // Кукуруза и сорго. – 2003. – № 6. – С. 2-3.

REFERENCES

1. Panfilova O.N., Derunova S. N., Osnovnye elementy tekhnologii vozdelyvaniya gibridov kukuruzy na zerno na severo-zapade Volgogradskoj oblasti // Oroshaemoe zemledelie. – 2023. – № 1(40). – S. 20-24. – DOI 10.35809/2618-8279-2023-1-5.

2. Antipova K. M., Bachurin A.V., Influence of cultivation technologies on the productivity of corn hybrids // In the collection: Ecology and agriculture: towards innovation. Proceedings of the International scientific and practical conference. - 2019. - P. 17-23.

3. Bagrintseva V. N., Shmalko I. A., Ivashenenko I. N., Kuznetsova S. V., [et al.] Elements of cultivation technology of early and mid-early corn hybrids in the Stavropol Territory / // In the book: Current state, problems and prospects for the development of agricultural sciences. Proceedings of the III International Scientific Conference. - 2018. - P. 96-97.

4. Voronin A. N., Nikitin V. V., Solovichenko V. D., Navolneva E. V., The influence of fertilizers and methods of primary soil cultivation on the yield of corn grain / A. N. Voronin, // Corn and sorghum. - 2018. - No. 2. - P. 32-34.

5. Dolzhenko K. S., Zagorul'ko A. V., Sposoby osnovnoj obrabotki pochvy i ih effektivnost' pri vyrashchivanie kukuruzy na zerno // V sbornike: Entuziasty agrarnoj nauki. Sbornik statej po materialam Vserossijskoj nauchno-prakticheskoj konferencii, posvyashchyonnoj 310-letiyu Jogana Gottshal'ka Valleriusa i 90-letiyu akademika Efimova Viktora Nikiforovicha. – 2019. – S. 113-122.

6. Zelenskaya G. M., Nosyrev S. A., Produktivnost' kukuruzy v zavisimosti ot tekhnologij vyrashchivaniya // Vestnik Donskogo gosudarstvennogo agrarnogo universiteta. – 2021. – № 3 (41). – S. 17-22.

7. Kushkhabiev A. Z., Kagermazov A. M., Hachidogov A. V., Nauchno obosnovannaya tekhnologiya vozdelyvaniya kukuruzy // Izvestiya Kabardino-Balkarskogo nauchnogo centra RAN. – 2019. – № 1 (87). – S. 94-97.

8. Mamsirov N. I., Mnatsakanyan A. A., O roli mineral'nyh udobrenij i sposobov osnovnoj obrabotki pochvy v formirovanii produktivnosti gibridov kukuruzy // Agrarnyj vestnik Urala. – 2021. – № 9 (212). – S. 11-24.

9. Petuhov D. A., Sviridova S. A., Negreba O. N. Rezul'taty issledovanij innovacionnyh tekhnologij bor'by s sornyakami na posevah kukuruzy na zerno // Tekhnika i oborudovanie dlya sela. – 2018. – № 7. – S. 22-26.

10. Prohorova L. N., Volkov A. I., Sidorov O. O. Vliyanie tekhnologii vozdelyvaniya na urozhajnost' i kachestvo kukuruznogo zerna // Agrarnaya Rossiya. – 2021. – № 10. – S. 26-29.

11. Sotchenko V. S., Bagrinceva V. L. // Tekhnologiya vozdelyvaniya kukuruzy Vestnik APK Stavropol'ya. – 2015. – № 2. – S. 79-84.
12. Stulin, A. F. Produktivnost' kukuruzy pri dlitel'nom primenenii razlichnyh agrotekhnicheskih priyomov v usloviyah stacionarnyh opytov // Novye metody i rezul'taty issledovanij landshaftov v Evrope, Central'noj Azii i Sibiri (Monografiya v pyati tomah). Tom 4. Optimizaciya sel'skohozyajstvennyh landshaftov / pod redakciej V. G. Sychyova, L. Myullera // M.: izd-vo FGBNU «VNII agrohimii». – 2018. – S. 254-257.
13. Abbas, G. Sowing. Date and Hybrid Choice Matters Production of MaizeMaize System // International Journal of Plant Production. – 2020. – Vol. 14. – Iss. 4. – Pp. 583-595.
14. Tyutyunov S. I., Solncev P. I., Horoshilova YU. V. [i dr.] Izmenenie kachestva zerna kukuruzy v zavisimosti ot intensifikacii elementov tekhnologii vozdelyvaniya // Saharnaya svekla. – 2021. – № 9. – S. 36-38. – DOI 10.25802/SB.2021.99.54.005.
15. Burluckij A. V., Kloster N. I., Azarov V. B. Effektivnost' biologicheskoj tekhnologii vozdelyvaniya kukuruzy na // Nauka i molodyozh': aktual'nye voprosy i puti innovacionnogo razvitiya APK : Materialy nacional'noj nauchno-prakticheskoj studencheskoj konferencii «Nauka i molodyozh': aktual'nye voprosy i puti innovacionnogo razvitiya APK», posvyashchennoj 95-letiyu zasluzhennogo agronoma Rossijskoj Federacii N.R. Asyki, Majskij, 24 sentyabrya 2024 goda. – Majskij: FGBOU VO Belgorodskij GAU, 2024. – S. 47-48.
16. Danilenko YU. P., Lyubimenko T. A., Sovershenstvovanie tekhnologii vozdelyvaniya kukuruzy - osnovnoj put' povysheniya urozhajnosti / // Kukuruza i sorgo. – 2003. – № 6. – S.2-3.

ТҮЙІН

Жүгерінің жетілу топтарына қазіргі классификациясы FAO шкаласына негізделген және гибридті Висконсин штатының селекциялық станциясында өсірілген стандартты будандармен салыстырудан тұрады. Кейіннен сынып атауы аймақтың климаттық жағдайына сәйкес шкала ішіндегі интервалға берілді. Егістік алаңы неғұрлым солтүстікте болса, FAO класына жататын аралықтар тарылатындығын түсіну керек. Сондықтан гибридті FAO көрсеткіштері бойынша таңдау ғана емес, сонымен қатар белгілі бір аймақтағы сорт сынау алаңдарының мәліметтерін де ескеру өте маңызды. Шаруа қожалығында жеке тәжірибелік учаскелердің болғаны да пайдалы. Гибрид жоғары деңгейде өнім алу үшін климаттық аймақтың вегетациялық кезеңін барынша пайдалануы керек.

Гибридтерді таңдағанда, егін жинау әдісін ескеру керек. Егер шаруашылық 2 апта ішінде сүрлем салуды жоспарласа, онда бүкіл аумақты бір пісу тобының будандары үшін пайдалануға болады. Егер сіз жүгеріні 20-25 күнде жинауды жоспарласаңыз, онда ерте және кеш будандарды тең үлестерге себу керек. Сүрлем салу 30-40 күнге дейін созылатын кезде, ерте пісетін гибридтердің үлесі 35% болуы тиіс, ал кеш пісетіндер – 65%.

Қуатты азықтандыру жүйесі мен ылғалды үнемді тұтынудың арқасында жүгері жазда жиі құрғақшылықтан зардап шегетін аймақтарда өсіруге өте қолайлы. Бұл Батыс Қазақстанның құрғақ жағдайында жасыл массаның тұрақты өнімін беретін жалғыз дақыл.

УДК 628.11 : 633.2.03
МРНТИ 68.35.47

Денизбаев Серик Едресович, магистр сельскохозяйственных наук, https://orcid.org/0000-0001-8696-0288
НАО «Западно-Казахстанский аграрно-технический университет имени Жангир хана», г. Уральск, ул. Жангир хана 51, 090009, Казахстан, serik.edres.denizbaev69@mail.ru
Оңаев Марат Қайрлыұлы, кандидат технических наук, https://orcid.org/0000-0001-5584-1948
НАО «Западно-Казахстанский аграрно-технический университет имени Жангир хана», г. Уральск, ул. Жангир хана 51, 090009, Казахстан, maratonaev@mail.ru

Ожанов Гали Саттибаевич, кандидат сельскохозяйственных наук, https://orcid.org/0000-0002-6852-3890
НАО «Западно-Казахстанский аграрно-технический университет имени Жангир хана», г. Уральск, ул. Жангир хана 51, 090009, Казахстан, gozhanov73@mail.ru
Шадьяров Талап Мнажатович, магистр технических наук, https://orcid.org/0000-0001-6541-9695
НАО «Западно-Казахстанский аграрно-технический университет имени Жангир хана», г. Уральск, ул. Жангир хана 51, 090009, Казахстан, talap_mnazhatovich@mail.ru
Умбеткалиев Нурлан Мендигериевич, магистр биологии, https://orcid.org/0000-0002-5175-2195 НАО «Западно-Казахстанский аграрно-технический университет имени Жангир хана», г. Уральск, ул. Жангир хана 51, 090009, Казахстан, nurlan-72kzt@mail.ru

Denizbayev Serik Yedresovich, Master of Agricultural Sciences, https://orcid.org/0000-0001-8696-0288
NJSC «West Kazakhstan Agrarian and Technical University named after Zhangir khan», Uralsk, st. Zhangir khan 51, 090009, Kazakhstan, serik.edres.denizbaev69@mail.ru
Ongayev Marat Kairlyuly, Candidate of Technical Sciences, https://orcid.org/0000-0001-5584-1948
NJSC «West Kazakhstan Agrarian and Technical University named after Zhangir khan», Uralsk, st. Zhangir khan 51, 090009, Kazakhstan, maratonaev@mail.ru
Ozhanov Gali Sattibayevich, candidate of agricultural sciences, https://orcid.org/0000-0002-6852-3890
NJSC «West Kazakhstan Agrarian and Technical University named after Zhangir khan», Uralsk, st. Zhangir khan 51, 090009, Kazakhstan, gozhanov73@mail.ru
Shadyarov Talap Mnazhatovich, master of technical sciences, https://orcid.org/0000-0001-6541-9695
NJSC «West Kazakhstan Agrarian and Technical University named after Zhangir khan», Uralsk, st. Zhangir khan 51, 090009, Kazakhstan, talap_mnazhatovich@mail.ru
Umbetkaliyev Nurlan Mendigerievich, Master of Biological Sciences, https://orcid.org/0000-0002-5175-2195
NJSC «West Kazakhstan Agrarian and Technical University named after Zhangir khan», Uralsk, st. Zhangir khan 51, 090009, Kazakhstan, nurlan-72kzt@mail.ru

ОБВОДНЕНИЕ ПАСТБИЩ ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПОДЗЕМНЫХ ВОД
WATERING OF PASTURES OF THE WEST KAZAKHSTAN REGION USING GROUNDWATER

АННОТАЦИЯ

Пастбищные угодья Казахстана на протяжении истории играют ключевую роль в экономике, выступая основным источником кормов для животноводческой отрасли. Эффективное использование отгонных пастбищ полупустынной и пустынной зон для развития животноводства зависит главным образом от их обводненности и водообеспеченности. Эффективное решение задач по обводнению определяется объемами потребления воды и доступностью подземных и поверхностных источников, пригодных для обеспечения скота водой. Обеспечение водой из неравномерно распределенных по территории страны поверхностных источников остальной части возможно лишь при сооружении каналов и водопроводов, что связано со значительными затратами сил и средств в течение длительного времени. Альтернативой этим способам представляется вовлечение в хозяйственный оборот любых местных источников воды, включая подземные. В отличие от поверхностных вод, которые нередко подвержены загрязнению, подземные

воды, особенно артезианские, отличаются более высоким качеством, лучше защищены от загрязнения и имеют более обширное распространение.

В статье представлены результаты гидрогеологических исследований пастбищ, проведенных для оценки текущего состояния водных ресурсов путем анализа водозаборных сооружений подземных вод. Проанализированы наиболее перспективные для обводнения пастбищ водоносные горизонты на территории Западно-Казахстанской области.

ANNOTATION

Kazakhstan's pasture lands have historically played a key role in the economy, serving as the main source of feed for the livestock industry. The effective use of pasture pastures in semi-desert and desert zones for the development of animal husbandry depends mainly on their water availability and availability. The effective solution to irrigation problems is determined by the volume of water consumption and the availability of underground and surface sources suitable for providing livestock with water. The provision of water from surface sources unevenly distributed throughout the country is possible only with the construction of canals and water pipes, which is associated with significant expenditure of effort and resources for a long time. An alternative to these methods is to involve any local water sources, including underground ones, in economic circulation. Unlike surface waters, which are often polluted, groundwater, especially artesian water, is of higher quality, better protected from pollution and has a wider distribution.

The article presents the results of hydrogeological studies of pastures conducted to assess the current state of water resources by analyzing groundwater intake structures. The most promising aquifers for irrigation of pastures in the territory of the West Kazakhstan region are analyzed.

Ключевые слова: *пастбище, обводнение, подземные воды, шахтные колодцы, трубчатые колодцы*

Kew words: *pasture, watering, groundwater, mine wells, tubular wells*.

Введение. В Казахстане животноводческая отрасль занимает одно из ключевых мест в структуре сельского хозяйства [1-4]. Обеспечение пастбищ водой выступает важнейшим условием для эффективного использования этих территорий в целях выпаса сельскохозяйственных животных [5-8].

Анализ данных гидротехнических и гидрологических исследований, проведение мониторинга качества воды, а также организация научных изысканий в области водообеспечения отгонного животноводства всегда были и остаются наиболее эффективным подходом к решению задач по обводнению пастбищных земель [9-14].

Гидрогеологические исследования пастбищных территорий, направленные на оценку текущего состояния водных ресурсов через изучение водозаборных сооружений подземных вод, играют важную роль в разработке методов эффективного обводнения пастбищ с применением подземных источников [15, 16].

Материалы и методы исследования. Исследование водозаборных сооружений подземных вод в рамках гидрогеологического обследования пастбищных территорий осуществляется через обследование их фактического состояния в конкретных географических точках с определением параметров: дебита шахтного колодца (скважины), статистического и динамического уровня воды, минерализации воды.

Схема типизации гидрогеологических структур служит основой структурно-гидрогеологического районирования территорий, так как под гидрогеологическим районом подразумевается участок земной оболочки, выделяемый по преобладающему типу подземных вод, определяющему характер оптимальной водоносности данного участка земли, а под элементарным гидрогеологическим районом — бассейн скоплений

подземных вод определенного типа: пластовых, трещинно-жильных, порово-трещинно-покровных и др. [17].

Результаты исследования. Западно-Казахстанская область располагает обширными пастбищами для успешного развития животноводческой отрасли. Полноценно использовать пастбища можно при обводнении всей имеющейся площади этих угодий. Пастбища в нашей области обводняют естественные водные источники, такие как реки, озера, обводнительные каналы, копани, шахтные колодцы и скважины. Неравномерное расположение поверхностных водных источников на территории области, а также территории с сильноминерализованными подземными водами не позволяет полноценно использовать пастбища на значительных площадях области.

Для питьевых целей в соответствии с ГОСТом 2874-82 используются воды с минерализацией до 1 г/дм^3, однако в районах с недостатком пресной воды приходится использовать и минерализованные воды. Скот может пить воду с минерализацией до 5 г/дм^3 (лошади), 8 г/дм^3 (верблюды), 12 г/дм^3 (овцы).

В результате проведенных исследований получены следующие научные данные: были изучены сведения о 455 шахтных колодцах и 340 трубчатых колодцах, а также собрана информация по обводнительным сооружениям на отгонных пастбищах региона (рисунки 1-3).






Рисунок 1 – Распределение источников вод в Западно-Казахстанской области: пунсоны красного цвета – шахтные колодцы, пунсоны желтого цвета – трубчатые колодцы

Многолетними наблюдениями установлено, что формирование режима и баланса подземных вод на рассматриваемой территории происходит под влиянием множества природных факторов: рельефа, климата, поверхностных вод и геолого-гидрогеологических условии территории [18].

В значительных районах области имеются солоноватые подземные воды с минерализацией от 1,5 до 9 г/дм³, а также соленые подземные воды, которые могут быть использованы для обводнения через эксплуатационные скважины и каптажные колодцы после предварительной обработки с помощью опреснительных установок.


Как видно из рисунка 2, по минерализации вода шахтных колодцев пробуренные в нижне-верхнечетвертичном аллювиально-дельтовом и локально-водоносном нижне-среднечетвертичном делювиальном водоносном горизонтах – пресная, воды современного эолового, средне-верхнечетвертичного аллювиального и верхнеплиоценового подсыртового водоносных горизонтов достигают значении сильносолоноватых вод.






1 - современный эоловый; 2 - средне-верхнечетвертичный аллювиальный; 3 - нижне-верхнечетвертичный аллювиально-дельтовый; 4 - верхнечетвертичный морской хвалынский, нижне-среднечетвертичный морской бакино-хазарский; 5 - локально-водоносный нижне-среднечетвертичный делювиальный; 6 - верхнеплиоценовый подсыртовый

Рисунок 2 – Минерализация и дебит шахтных колодцев по водоносным горизонтам





1 - средне-верхнечетвертичный аллювиальный; 2 - нижне-верхнечетвертичный аллювиально-дельтовый; 3 - верхнечетвертичный морской хвалынский, нижне-среднечетвертичный морской бакино-хазарский; 4 - локально-водоносный нижне-среднечетвертичный делювиальный; 5 - локально-водоносный нижне-верхнечетвертичный горизонт верхней части сыртовой толщи ($Q_{I-III}sr_3$); 6 - верхнеплиоценовый подсыртовый; 7 - верхнеплиоценовый акчагыльский; 8 - верхнеплиоценовый апшеронский; 9 - верхнемеловой маастрихтский

Рисунок 3 – Минерализация и дебит трубчатых колодцев по водоносным горизонтам

Как видно из рисунка 3, по минерализации вода трубчатых колодцев (скважин) пробуренные в верхнеплиоценовом апшеронском водоносном горизонте достигают значении сильносоленых вод.

Для обводнения пастбищ экономически выгодно использовать локальные водозаборы из близлежащих горизонтов с пресными или слабоминерализованными подземными водами. Ключевыми критериями при этом являются минерализация грунтовых вод, их дебит и глубина водозаборных сооружений.

Заключение. Пестрота различных по минерализации подземных вод на территории Западно-Казахстанской области определяет степень обводненности пастбищ. В северной и северо-восточной частях области, находящихся в пределах Сыртового гидрогеологического района, основные запасы пресных подземных вод сосредоточены в аллювиальных, плиоценовых и верхнемеловых отложениях, тогда как слабосолоноватые подземные воды обнаруживаются в четвертичных и мезозойских отложениях. В южной и западной частях области, относящихся к Прикаспийскому гидрогеологическому району, для обводнения используются подземные воды, расположенные в четвертичных и плиоценовых отложениях, представленные разрозненными и небольшими по площади линзами пресных и солоноватых вод. Наиболее крупные запасы пресных и слабосолоноватых вод находятся на юго-западе области и связаны с массивами эоловых песков. Соленые и солоноватые подземные воды наиболее широко распространены в слабодренированной равнинной части территории, где наблюдается высокое содержание различных солей. Ограниченные запасы пресных и слабосолоноватых подземных вод формируются в аллювиальных отложениях вдоль долины реки Урал и в западной части области в отложениях неогенового комплекса.

Благодарности. Данное исследование было профинансировано Министерством сельского хозяйства Республики Казахстан в рамках НТП BR22883585 «Разработка эффективных технологий повышения продуктивного потенциала и рационального использования пастбищ».

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Инструкция по бонитировке крупного рогатого скота мясных пород [Текст] // Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан. – Астана, 2008 г.

2. Оңаев, М.Қ. Батыс Қазақстан облысы жағдайында жайылымдық алқаптарды суландыру мәселесі [Текст] / М.Қ. Оңаев, Г.С. Ожанов, С.Е. Денизбаев, Т.М. Шадьяров // Ғылым және білім. - 2020. - №2-2. – С. 54-61.

3. Оңаев, М.Қ. Обводнение пастбищ – залог развития отгонного животноводства [Текст] / М.Қ. Оңаев, С.Е. Денизбаев, Г.С. Ожанов, Т.М. Шадьяров // Ғылым және білім. - 2020. - №4-2 (61). – С. 111-118.

4. Ожанов, Г.С. Жайылымдарды суландырудың қазіргі жағдайы [Текст] / Г.С. Ожанов, Н.М. Умбеткалиев, Т.М. Шадьяров, С.Е. Денизбаев // Наука и образование. – 2022. - № 1-2 (66). – С. 111-118. https://doi.org/10.52578/2305-9397-2022-1-1-110-117

5. Тургумбаев, А.А. О развитии бассейна р. Урал на территории Прикаспийской низменности [Текст] / А.А. Тургумбаев, Г.Т. Турикешев // Юг России: экология, развитие. – 2018. – № 2. - Т. 13. – С. 123-131.

6. Есполов, Т.И. Водные ресурсы в сельском хозяйстве Республики Казахстан: взгляд ученых на рациональное использование, перспективы и управление [Текст] / Т.И. Есполов, К.М. Тиреуов, У.К. Керимова // Проблемы агрорынка. – 2022. - № 3. – С. 155-163.

7. Ongayev, M. Underground Water Supply to Pastures [Text] / M. Ongayev, S. Denizbayev, G. Ozhanov, T. Shadyarov // International Journal of Mechanical Engineering. – 2021. – No. 3. – Vol. 6. – pp. 98-103.

8. Ongayev, M. Engineering and Process Infrastructure of the Agro-Industrial Complex [Text] / M. Ongayev, Z. Sultanova, S. Denizbayev, G. Ozhanov, S. Abisheva // International Journal of Emerging Trends in Engineering Research. – 2019. - Volume 7. - No. 12. - P. 879-885.

9. Tugjamba, N. Climate change impacts on nomadic herders' livelihoods and pastureland ecosystems: a case study from Northeast Mongolia [Text] / N. Tugjamba, G. Walkerden, F. Miller // Reg Environ Change. 2021. - 21, 105. https://doi.org/10.1007/s10113-021-01829-4

10. Halimani, T. Smallholder sheep farmers' perceived impact of water scarcity in the dry ecozones of South Africa: Determinants and response strategies [Text] / T. Halimani, T. Marandure, O.C. Chikwanha, A.H. Molotsi, B.J. Abiodun, K. Dzama, C. Mapive // Climate Risk Management. – 2021. - Volume 34.https://doi.org/10.1016/j.crm.2021.100369

11. Акимов, В.В. Оценка современного состояния пастбищных угодий на основе анализа спутниковых данных [Текст] / В.В. Акимов, С.К. Макенова, М.Р. Шаяхметов, О.С. Музыка // Вестник науки Казахского агротехнического университета имени С. Сейфуллина. – 2021. - №2 (109). – С. 37-49.

12. Абишева, С.Х. Батыс Қазақстан облысындағы кейбір су ресурстарының сипаттамасы [Текст] / С.Х. Абишева, А.Л. Кисметова, Н.К. Досказиева // Ғылым және білім. – 2017. - № 1 (46). – С. 100-103.

13. Khan, M.Y.A. Understanding the potential sources and environmental impacts of dissolved and suspended organic carbon in the diversified Ramganga River, Ganges Basin, India [Text] / M.Y.A. Khan, F. Tian // Proc. Int. Assoc. Hydrol. Sci. – 2018. - 379, 61-66.

14. Sharma, M.K. Study of hydrochemical and geochemical characteristics and solute fluxes in Upper Ganga Basin, India [Text] / M.K. Sharma, P. Kumar, P. Prajapati, K. Bhanot, U. Wadhwa, G. Tomar, R. Goyal, B. Prasad, B. Sharma // Journal of Asian Earth Sciences: X – 2022. - 8 100108 https://doi.org/10.1016/j.jaesx.2022.100108

15. Абсаметов, М.К. Подземные воды: система классификации и управления ресурсами [Текст] / М.К. Абсаметов, Е.Ж. Муртазин, Д.С. Сапаргалиев, А.К. Исаев // Глобальное недропользование. 2019. – С. 20-25.

16. Государственный водный кадастр. Ресурсы поверхностных и подземных вод, их использование и качество. 2017 год. Ежегодное издание. Комитет по водным ресурсам, 2018. Доступно на: http://www.cawater-info.net/water_quality_in_ca/files/water_quality_kz_2017_r.pdf (обращение 10.12.2019).

17. Абсаметов, М.К. Состояние и перспективы использования подземных вод для сельского хозяйства Казахстана [Текст] / М.К. Абсаметов, Е.Ж. Муртазин // Сб. межд. науч.-

прак. конф. «Управление водными ресурсами в условиях глобализации», посвященной 105-летию со дня рождения профессора Тажибаева Л.Е. Алматы: КазНАИУ, 2021. - С.105-110.

18. Саликова, Н.С. Условия формирования и перспективы применения подземных вод Кокшетауского гидрогеологического района [Текст] / Н.С. Саликова, И.В. Квада, С.Р. Хамзина, С.Е. Уразбаева, С.Б. Жакупова // Актуальные научные исследования в современном мире. – 2021. – №4-10 (72). - 10 С. 62-68.

REFERENCES

1. Instrukciya po bonitirovke krupnogo rogatogo skota myasnyh porod [Tekst] // Ministerstvo sel'skogo hozyajstva Respubliki Kazahstan. – Astana, 2008 g.

2. Onaev, M.K. Batys Kazakstan oblysy zhardajynda zhajylymdyk alkaptardy sulandyru maselesЯ [Tekst] / M.K. Onaev, G.S. Ozhanov, S.E. Denizbaev, T.M. Shad'yarov // Rylym zhane bЯlЯm. - 2020. - №2-2. – S. 54-61.

3. Onaev, M.K. Obvodnenie pastbishch – zalog razvitiya otgonnogo zhivotnovodstva [Tekst] / M.K. Onaev, S.E. Denizbaev, G.S. Ozhanov, T.M. Shad'yarov // Rylym zhane bЯlЯm. - 2020. - №4-2 (61). – S. 111-118.

4. Ozhanov, G.S. Zhajylymdardy sulandyrudyn kazЯrgЯ zhardajy [Tekst] / G.S. Ozhanov, N.M. Umbetkaliev, T.M. Shad'yarov, S.E. Denizbaev // Nauka i obrazovanie. – 2022. - № 1-2 (66). – S. 111-118. https://doi.org/10.52578/2305-9397-2022-1-1-110-117

5. Turgumbaev, A.A. O razvitii bassejna r. Ural na territorii Prikaspijskoj nizmennosti [Tekst] / A.A. Turgumbaev, G.T. Turikeshev // Yug Rossii: ekologiya, razvitie. – 2018. – № 2. - T. 13. – S. 123-131.

6. Espolov, T.I. Vodnye resursy v sel'skom hozyajstve Respubliki Kazahstan: vzglyad uchenyh na racional'noe ispol'zovanie, perspektivy i upravlenie [Tekst] / T.I. Espolov, K.M. Tireuov, U.K. Kerimova // Problemy agrorynka. – 2022. - № 3. – S. 155-163.

7. Ongayev, M. Underground Water Supply to Pastures [Text] / M. Ongayev, S. Denizbayev, G. Ozhanov, T. Shadyarov // International Journal of Mechanical Engineering. – 2021. – No. 3. – Vol. 6. – pp. 98-103.

8. Ongayev, M. Engineering and Process Infrastructure of the Agro-Industrial Complex [Text] / M. Ongayev, Z. Sultanova, S. Denizbayev, G. Ozhanov, S. Abisheva // International Journal of Emerging Trends in Engineering Research. – 2019. - Volume 7. - No. 12. - P. 879-885.

9. Tugjamba, N. Climate change impacts on nomadic herders' livelihoods and pastureland ecosystems: a case study from Northeast Mongolia [Text] / N. Tugjamba, G. Walkerden, F. Miller // Reg Environ Change. 2021. - 21, 105. https://doi.org/10.1007/s10113-021-01829-4

10. Halimani, T. Smallholder sheep farmers' perceived impact of water scarcity in the dry ecozones of South Africa: Determinants and response strategies [Text] / T. Halimani, T. Marandure, O.C. Chikwanha, A.H. Molotsi, B.J. Abiodun, K. Dzama, C. Mapive // Climate Risk Management. – 2021. - Volume 34.https://doi.org/10.1016/j.crm.2021.100369

11. Akimov, V.V. Ocenka sovremennogo sostoyaniya pastbishchnyh ugodij na osnove analiza sputnikovyh dannyh [Tekst] / V.V. Akimov, S.K. Makenova, M.R. Shayahmetov, O.S. Muzyka // Vestnik nauki Kazahskogo agrotekhnicheskogo universiteta imeni S. Sejfullina. – 2021. - №2 (109). – S. 37-49.

12. Abisheva, S.H. Batys Kazakstan oblysyndary kejbЯr su resurstarynyn sЯpattamasy [Tekst] / S.H. Abisheva, A.L. Kismetova, N.K. Doskazieva // Rylym zhane bЯlЯm. – 2017. - № 1 (46). – S. 100-103.

13. Khan, M.Y.A. Understanding the potential sources and environmental impacts of dissolved and suspended organic carbon in the diversified Ramganga River, Ganges Basin, India [Text] / M.Y.A. Khan, F. Tian // Proc. Int. Assoc. Hydrol. Sci. – 2018. - 379, 61-66.

14. Sharma, M.K. Study of hydrochemical and geochemical characteristics and solute fluxes in Upper Ganga Basin, India [Text] / M.K. Sharma, P. Kumar, P. Prajapati, K. Bhanot, U. Wadhwa, G. Tomar, R. Goyal, B. Prasad, B. Sharma // Journal of Asian Earth Sciences: X – 2022. - 8 100108 https://doi.org/10.1016/j.jaesx.2022.100108

15. Absametov, M.K. Podzemnye vody: sistema klassifikacii i upravleniya resursami [Tekst] / M.K. Absametov, E.Zh. Murtazin, D.S. Sapargaliev, A.K. Isaev // Global'noe nedropol'zovanie. 2019. – S. 20-25.

16. Gosudarstvennyj vodnyj kadastr. Resursy poverhnostnyh i podzemnyh vod, ih ispol'zovanie i kachestvo. 2017 god. Ezhegodnoe izdanie. Komitet po vodnym resursam, 2018. Dostupno na: http://www.cawater-info.net/water_quality_in_ca/files/water_quality_kz_2017_r.pdf (obrashchenie 10.12.2019).

17. Absametov, M.K. Sostoyanie i perspektivy ispol'zovaniya podzemnyh vod dlya sel'skogo hozyajstva Kazahstana [Tekst] / M.K. Absametov, E.Zh. Murtazin // Sb. mezhd. nauch.-prak. konf. «Upravlenie vodnymi resursami v usloviyah globalizacii», posvyashchennoj 105-letiyu so dnya rozhdeniya professora Tazhibaeva L.E. Almaty: KazNAIU, 2021. - S.105-110.

18. Salikova, N.S. Usloviya formirovaniya i perspektivy primeneniya podzemnyh vod Kokshetauskogo gidrogeologicheskogo rajona [Tekst] / N.S. Salikova, I.V. Kvada, S.R. Hamzina, S.E. Urazbaeva, S.B. Zhakupova // Aktual'nye nauchnye issledovaniya v sovremennom mire. – 2021. – №4-10 (72). - 10 S. 62-68.

ТҮЙІН

Қазақстанның жайылымдық алқаптары тарих бойы мал шаруашылығы саласы үшін жемшөптің негізгі көзі бола отырып, экономикада шешуші рөл атқарады. Мал шаруашылығын дамыту үшін шөлейт және шөлді аймақтардың шалғай жайылымдарын тиімді пайдалану негізінен олардың сулануы мен сумен қамтамасыз етілуіне байланысты. Суландыру жөніндегі міндеттерді тиімді шешу суды тұтыну көлемімен және малды сумен қамтамасыз етуге жарамды жерасты және жер үсті көздерінің қолжетімділігімен айқындалады. Ел аумағы бойынша біркелкі бөлінбеген жер үсті көздерінен қалған бөлігін сумен қамтамасыз ету каналдар мен су құбырларын салу кезінде ғана мүмкін болады, бұл ұзақ уақыт бойы күштер мен қаражаттың айтарлықтай шығындарына байланысты. Бұл әдістерге балама кез-келген жергілікті су көздерін, соның ішінде жер асты су көздерін экономикалық айналымға тарту болып табылады. Көбінесе ластануға бейім жер үсті суларынан айырмашылығы, жер асты сулары, әсіресе артезиан сулары жоғары сапалы, ластанудан жақсы қорғалған және кең таралған.

Мақалада жер асты суларының су алу құрылыстарын талдау арқылы су ресурстарының ағымдағы жай-күйін бағалау үшін жүргізілген жайылымдарды гидрогеологиялық зерттеу нәтижелері келтірілген. Батыс Қазақстан облысының аумағында жайылымдарды суландыру үшін неғұрлым перспективалы су қабаттары талданды.

УДК 630*23:674.031.931.2(574.1)
МРНТИ 68.47.03

Елекешева Мира Манаровна, кандидат сельскохозяйственных наук, и.о. доцента, https://orcid.org/0000-0002-2730-8211
НАО «Западно-Казахстанский аграрно-технический университет им. Жангир Хана», г. Уральск, Жангир хана, 51, elekesheva@inbox.ru , +77769147271

Yelekesheva Mira Manarovna, candidate of Agricultural Sciences, senior lecturer, https://orcid.org/0000-0002-2730-8211
NJSC«West Kazakhstan Agrarian and Technical University named after Zhangir khan», Uralsk, st. Zhangir khan 51, 090009, Kazakhstan,Elekesheva@inbox.ru

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ И ИНВАЗИВНОСТЬ *FRAXINUS PENNSYLVANICA* НА ТЕРРИТОРИИ ЗАПАДНОГО КАЗАХСТАНА

ECOLOGICAL STATE AND INVASIVENESS OF PENNSYLVANIAN ASH IN WESTERN KAZAKHSTAN

Аннотация

В засушливых природно-климатических условиях была оценена способность адвентивного ясеня Пенсильванского (Fraxinus pennsylvanica Marsh.) к длительному существованию и распространению семян с захватом новых территорий в экологическом ареале в зависимости от степени доступности почвенной влаги. Исследованы особенности функционирования ясеня на биологическом и экосистемном уровнях при постоянном и частичном дефиците продуктивной влаги в почве, а также при ее оптимальной доступности. Показано, что на автоморфных типах почв культуры ясеня при соблюдении соответствующих лесохозяйственных технологий могут существовать многие десятилетия даже во время периодических почвенных засух из-за преждевременного безвредного сбрасывания листовой массы. В условиях гидроморфной поймы ясень не только хорошо сохраняется в культурах, но и эффективно внедряется в луговые и лесные экосистемы за счет понижения рельефа. Деревья на новом месте, особенно на лугах, начинают плодоносить через 6-10 лет и разносят семена на другие территории. Такая кочевая стратегия поэтапного и многократного рассеивания ясеня способствует быстрому образованию вторичных очагов ее инвазии и исключает возможность эффективной борьбы с ней. Поэтому использование ясеня в промышленных посадках в поймах рек крайне нецелесообразно.

Ключевые слова: *засушливый регион, лесные культуры, ясень пенсильванский, семенное возобновление, распространение семян, инвазия, вторичная среда обитания.*

Keywords*: arid region, forest plantations, black ash, seed regeneration, dissemination of seeds, invasion, second-generation.*

Annotation

In arid natural and climatic conditions, the ability of the Pennsylvania adventitious ash (Fraxinus pennsylvanica Marsh.) for long-term existence and seed propagation with the capture of new territories in the ecological range was evaluated, depending on the degree of availability of soil moisture. The features of the functioning of ash trees at the biological and ecosystem levels with a constant and partial shortage of productive moisture in the soil, as well as with its optimal availability, have been studied. It has been shown that on automorphic soil types, ash crops can exist for many decades, even during periodic soil droughts, if appropriate forestry technologies are followed due to premature harmless leaf mass shedding. In the conditions of a hydromorphic floodplain, ash is not only well preserved in crops, but also effectively introduced into meadow and forest ecosystems by lowering the relief. Trees in a new location, especially in meadows, begin to bear fruit after 6-10 years and spread the seeds to other territories. Such a nomadic strategy of gradual and repeated dispersal of ash promotes the rapid formation of secondary foci of its invasion and eliminates the possibility of effective control of it. Therefore, the use of ash trees in industrial plantings in floodplains is highly impractical.

Введение. Fraxinus pennsylvanica Marsh. в естественных условиях произрастающий в Северной Америке, уже давно внедрился в ландшафты Европы и Азии. Его использование в культуре обусловлено хорошей приживаемостью в различных условиях обитания. Однако его способность формировать инвазивную среду обитания, особенно в поймах рек, вызывает тревогу. В то же время механизмы его интродукции и распространения на различных типах почв слабо освещены в литературе [1, 2, 3, 4].

В засушливых регионах, на безлесных зональных типах почв, выращивание деревьев и кустарников возможно только в том случае, если они обеспечены дополнительной

влажностью почвы за счет накопления снега, поверхностного притока талых и ливневых вод или наличия пресных грунтовых вод, тогда как для произрастающих здесь местных травяных фитоценозов необходим незначительный запас накопленной влаги. Осенне-зимней влаги в почве достаточно, и при ее истощении растения могут прекратить свой сезонный рост с отмиранием надземной части уже в середине лета [5, 6, 7].

Материалы и методы. Исследуемые участки расположены в долине реки Урал и, судя по почвенным и гидрологическим условиям, являются репрезентативными для пойменных условий ее нижнего течения. Рельеф поймы изрезан бывшими протоками, старыми руслами рек. Высокая часть поймы возвышается на 5-8 м над уровнем воды в реке, низкая - на 1-3 м. Отложения состоят из слоистой толщи суглинка, песка и глины. Периодически пойма затапливается весенними паводковыми водами [8, 9, 10, 11].

Основными доминирующими лесными массивами по видовому составу и расположению в пойме реки Урал являются: тополь белый (Populus alba L.) и тополь черный (P. nigra L.), а также ива белая (Salix alba L.). Травянистые экосистемы развиты на безлесных окололесных полянах и в пойменной зоне пространства, видовое разнообразие которых (от луговых до болотистых сообществ) зависит в первую очередь от степени доступности подземных вод [12, 13, 14, 15, 16].

В условиях поймы изучались особенности роста, состояния и семенного возобновления ясеня в созданных культурах, ивово-тополиных лесах и лугах.

Методологической основой исследования являются сравнительные наблюдения за адвентивным ясенем пенсильванским в пойменных условиях с целью выявления механизмов его инвазивного распространения. Для изучения функционирования ясеневых древостоев использовались традиционные методы лесной экологии и таксации. На участках были заложены пробные площади для посадки ясеневых культур на различных типах почв и в естественных луговых и лесных экосистемах со спонтанно прорастающими образцами семян ясеня пенсильванского.

Результаты исследования. Почвенные и гидрологические условия каждого пойменного участка различны и сложны для изучения из-за неоднородности механического состава почвы, наличия или отсутствия в них погребенных плодородных горизонтов и значительной динамики уровня грунтовых вод. Тем не менее, для адвентивных ясеней вполне возможно определить степень пригодности тех или иных конкретных пойменных экотопов, сравнив особенности их состояния и развития с аналогичными насаждениями, произрастающими на равнинных автоморфных типах почв.

Для выявления механизма инвазии (с точки зрения выживаемости, ареала распространения и характеристик концентрации в разных экотопах) в Уральском лесничестве Управления природных ресурсов и регулирования природопользования Западно-Казахстанской области были изучены два пойменных участка одинаковой структуры, которые отличаются только количеством созданных на них ясеневых культур. из них: в Уральском лесничестве с наибольшим количеством созданных культур (51,21302°N, 51,40996°E) и в Янайкинском лесничестве (50,70244°N, 51,13563°E) с наименьшим их количеством, поскольку там расположен Государственный биологический (зоологический) заповедник имени Бударина.

В Уральском лесничестве исследования проводились в отдельной излучине реки Урал, в так называемой "Перевалочной роще", где лесом покрыто всего 706 гектаров площади в 16 лесных массивах, из которых 103 гектара (12,7%) приходится на чистые и смешанные культуры ясеня. Каждый подкомплекс (57 единиц) занимает небольшую площадь в 2,2±1,53 гектара. Средний возраст культур составляет 58,7±11,0 лет, деревья в них достигли средней высоты 14,9±2,7 м, при среднем диаметре дерева 22,8±6,7 см. Культуры находятся в разреженном состоянии (средняя густота стояния составляет 0,41±0,11).

В Янайкинском лесничестве, территория которого занимает 6707 га, из всей лесопокрытой площади в 2906,8 га на долю тех же ясеневых культур приходится 12,8 га (0,4%), которые посажены на 14 участках.

Лесные работы в долине реки всегда ведутся только на безлесных участках. Старовозрастные лесные насаждения, расположенные на возвышенных участках местности, на так называемой "высокой пойме", обычно находятся в нарушенном состоянии или полностью отмирают, в то время как созданные в условиях низкой поймы успешно растут и развиваются в течение многих десятилетий в соответствии с III-IV классом участка (таблица 1).

Таблица 1 - Таксационные характеристики типичных лесных культур с участием ясеня пенсильванского в Янайкинском лесничестве (по данным лесоустройства за 2016 год).

Квартал /выдел	Площадь, га	Видовой состав	Возраст, лет	Высота, м	Диаметр, см	Класс бонитета	Полнота
39/1	0.2	8В2Я+Лх	В 51 Я 51 Лх 51	9 10 7	10 10 8	4	0.5
40/47	0.6	10Я	41	10	10	3	0.6
43/28	0.7	10Я	33	9	10	3	0.5
127/11	11	10Я	2	2	2	-	0.4

Примечание: Я – Ясень пенсильванский (Fraxinus pennsylvanica Marsh.), В – вяз (Ulmus pumila L.), Лх – лох (Elaeagnus oxycarpa Schltdl.)

У многих культур самосев отсутствует, у других он происходит в количестве 0,8-1,3 шт./м^2, при этом лидирующие всходы могут достигать высоты 3-5 м (рис. 1. A, B). Весенние пожары, которые здесь случаются довольно часто, не уничтожают ясень; восстановление древостоя происходит за счет отрастания наземной части растений в том же году (рис. 1. C).




Рисунок 1 - Самосев 40-летних культур ясеня пенсильванского (осень 2022 г.) и 58-летних культур (лето 2023 г.), выращенных на разных уровнях залегания грунтовых вод (A, B, соответственно), регенерация ясеня в культурах после весеннего пожара (2023 г.) – (C).

К сожалению, мы не можем предсказать тенденции дальнейших сукцессий у всех этих культур, поскольку аналогов с полной дезинтеграцией посаженного древостоя на фоне

постепенной его замены самосевными экземплярами нет. В то же время очевидно, что лучшие культуры еще долго будут служить семенниками.

Выводы. В засушливых природно-климатических условиях изучены особенности функционирования искусственных и естественных экосистем от пенсильванского ясеня в экологическом диапазоне влагообеспеченности почвы от условий с минимальным количеством доступной почвенной влаги (весеннее накопление в верхних почвенных горизонтах мелиорированных солончаковидных солонцов) до аллювиальных пойменных почв с постоянно доступными грунтовыми водами. Сравнительные наблюдения показали, с одной стороны, высокую степень адаптации ясеня к почвенной засухе, с другой – к кратковременному затоплению и выживанию в условиях полного насыщения почвы влагой.

Показано, что использование ясеня при защитном лесоразведении на зональных типах почв вполне оправдано и экологически безопасно. Находясь на внутризональных пойменных почвах, его использование неизбежно приведет к неконтролируемому образованию вторичной инвазионной зоны в результате стремительного распространения крылаток по пойменным лугам с проникновением в естественные лесные экосистемы. Механизм быстрого рассредоточенного распространения заключается в поэтапной, многократной, кочевой стратегии распространения через микро- и мезопоглощения рельефа по мере того, как деревья достигают возраста плодоношения на освоенной территории каждые 6-10 лет. Такой сценарий распространения ясеня исключает возможность эффективной борьбы с ним в поймах рек, поэтому его нельзя использовать на промышленных плантациях в этих районах.

Благодарности: Исследования проводились в рамках проекта AP13268730 «Структурно-функциональные особенности лесных экосистем в засушливых условиях Западного Казахстана на фоне антропогенного прессинга и потепления климата». согласно договору № 135 / ЖҒ-1-22-24 от 21.06.2022 г.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Kennedy Jr, H. E. Fraxinus pennsylvanica Marsh. green ash. Silvics of North America. 1990, 2, 348–354.

2. Drescher A.; Prots B. Fraxinus pennsylvanica – an invasive tree species in middle Europe: Case studies from the Danube basin. Contribuţii Botanice 2016, 51. 55–69.

3. Kholenko M.S.; Semenishchenkov Y.A. Reproductive possibilities of alien species Fraxinus pennsylvanica Marsh. in the forest stands of the city of Bryansk. Russian Journal of Biological Invasions 2021, 12(1), 116–125.

4. Роде А.А. Чистые культуры древесных пород на больших падинах Прикаспийской низменности. 1961, М.: Изд-во АН СССР. - 180 с.

5. Olovyannikova I.N. Dynamics of productivity of vegetation cover in the Trans-Volga clay semi-desert. Botanical Journal 2004, 89(7), 1122–1137.

6. Marina L. Sizemskaya, Jiao Ju-ying, Wang Ning, Mamay K. Sapanov, Wu Qin-xiao, Jia Yan-feng, Alexander V. Kolesnikov, Liu Guo-bin, Pavel M. Sapanov. Specificity of Afforestation under Conditions of Moisture Deficit in South of the Russian Plain and the Loess Plateau of China. Research of soil and water conservation 2009, 16(5), 73–77.

7. Sapanov M.K.; Sizemskaya M.L. Climatogenic restrictions of arid forestry. Contemporary Problems of Ecology 2020, 13, 788–794.

8. Sapanov, M.K. Ecological Features of the Renewal of the Boxelder Maple in Arid Regions of Russia // M.K. Sapanov, M.L. Sizemskaya // Contemporary Problems of Ecology. Vol. 14(7). - 2021. - P. 785–791.

9. Sapanov M.K., Elekesheva M.M., Sizemskaya M.L., Kolesnikov A.V. Ecological condition and invasiveness of Fraxinus pennsylvanica in different ecotopes of the arid Caspian region/ *Brazilian Journal of Biology. 2024, vol. 84. 1- 13 p.*

10. Elekesheva M., Khlyustov V., Dulatbay Y. Ecological Aspects and Methodology for Assessing the Forests of the Ural Floodplain/ Sustainability. 2024, 16(12), 4989. P. 1-21.

11. Никитин, С.А. Лесорастительные условия низовий реки Урал // Труды Института леса. М.: Изд-во АН СССР, 1957. - Т. 34. - С. 7–27.

12. Гальперин, Р.И. Река Жайык (Урал): угроза наводнений в нижнем течении в современных условиях /Р.И. Гальперин, Т.В. Колча, А. Авезова //Гидрометеорология и экология. – 2008. – №. 4. – С. 155-165.

13. Сергалиев, Н.Х. Русловые процессы на реке Урал/ Н.Х. Сергалиев, К.М. Ахмеденов, Г.А. Кабдулова //Новости науки Казахстана. – 2013. – №. 3. – С. 201.

14. Ауезов, Д.У. Динамика уровня грунтовых вод и их связь с влагообеспеченностью насаждений в пойме реки Урал Западно-Казахстанской области [Текст]/ Ауезов Д.У., Н.С. Келгенбаев, М.А. Мамырбай//Лесное хозяйство: актуальные проблемы и пути их решения. – 2022. – С. 142-147.

15. Хлюстов В.К., Елекешева М.М., Токтасынов Ж.Н. Моделирование роста смешанных древостоев пойменных лесов Урала. Аграрный научный журнал. – 2017. - №6. – С.41-45.

16. Хлюстов В.К., Елекешева М.М., Изтелеу Т.С., Байсынова А.Р., Нурадинова Н.К. Рост и продуктивность элементов леса в осокорниках поймы реки Урал. Аграрный научный журнал. 2019, 1, 32–38.

REFERENCES

1. Kennedy Jr, H. E. Fraxinus pennsylvanica Marsh. green ash. Silvics of North America. 1990, 2, 348–354.

2. Drescher A.; Prots B. Fraxinus pennsylvanica – an invasive tree species in middle Europe: Case studies from the Danube basin. Contribuţii Botanice 2016, 51. 55–69.

3. Kholenko M.S.; Semenishchenkov Y.A. Reproductive possibilities of alien species Fraxinus pennsylvanica Marsh. in the forest stands of the city of Bryansk. Russian Journal of Biological Invasions 2021, 12(1), 116–125.

4. Rode A.A. Pure cultures of tree species in large depressions of the Caspian lowland. Publishing House of the USSR Academy of Sciences: Moscow, USSR, 1961; 180.

5. Olovyannikova I.N. Dynamics of productivity of vegetation cover in the Trans-Volga clay semi-desert. Botanical Journal 2004, 89(7), 1122–1137.

6. Marina L. Sizemskaya, Jiao Ju-ying, Wang Ning, Mamay K. Sapanov, Wu Qin-xiao, Jia Yan-feng, Alexander V. Kolesnikov, Liu Guo-bin, Pavel M. Sapanov. Specificity of Afforestation under Conditions of Moisture Deficit in South of the Russian Plain and the Loess Plateau of China. Research of soil and water conservation 2009, 16(5), 73–77.

7. Sapanov M.K.; Sizemskaya M.L. Climatogenic restrictions of arid forestry. Contemporary Problems of Ecology 2020, 13, 788–794.

8. Sapanov, M.K. Ecological Features of the Renewal of the Boxelder Maple in Arid Regions of Russia // M.K. Sapanov, M.L. Sizemskaya // Contemporary Problems of Ecology. Vol. 14(7). - 2021. - P. 785–791.

9. Sapanov M.K., Elekesheva M.M., Sizemskaya M.L., Kolesnikov A.V. Ecological condition and invasiveness of Fraxinus pennsylvanica in different ecotopes of the arid Caspian region/ *Brazilian Journal of Biology. 2024, vol. 84. 1- 13 p.*

10. Elekesheva M., Khlyustov V., Dulatbay Y. Ecological Aspects and Methodology for Assessing the Forests of the Ural Floodplain/ Sustainability. 2024, 16(12), 4989. P. 1-21.

11. Nikitin S.A. Forest-growing conditions of the lower reaches of the Ural River. In Proceedings of the Forest Institute. Publishing House of the USSR Academy of Sciences; Moscow, USSR, 1957; Volume 34, pp. 7–27.

12. Gal`perin R. I.; Kolcha T. V.; Avezova A. Zhaiyk River (Ural): the threat of flooding in the lower reaches in modern conditions. Hydrometeorology and ecology 2008, 4, 155–165.

13. Sergaliev N. Kh.; Akhmedenov K. M.; Kabdulova G. A. Riverbed processes on the Ural River. Kazakhstan Science news 2013, 3, 201–205.
14. Auezov D. U.; Kelgenbaev N. S.; Mamy`rbaj M. A. Dynamics of the groundwater level and their relationship with the moisture supply of plantings in the floodplain of the Ural river in the West Kazakhstan region. In Forestry: Current Problems and Ways for their Solutions. Nighny Novgorod State Agricultural Academy: Nighny Novgorod, Russia, 2022; pp. 142–147.
15. Khlyustov V. K.; Elekesheva M. M.; Toktasy`nov Zh. N. Modeling the growth of mixed stands of floodplain forests of the Urals. Agricultural Scientific Journal 2017, 6, 41-45.
16. Khlyustov V. K.; Elekesheva M.M.; Izteleu T.Zh.; Bajsy`nova A.R.; Nuradinova N.K. Growth and productivity of forest elements in the sedge beds of the ural river floodplain. Agricultural Scientific Journal 2019, 1, 32–38.

ТҮЙІН

Құрғақ табиғи-климаттық жағдайларда адвентивті пенсильваниядық шағанының топырақ ылғалының қолжетімділік дәрежесіне байланысты экологиялық аумақта жаңа аумақтарды басып алып, тұқымдардың ұзақ өмір сүру және таралу қабілеті бағаланды. Топырақтағы өнімді ылғалдың тұрақты және ішінара жетіспеушілігімен, сондай-ақ оның оңтайлы қол жетімділігімен биологиялық және экожүйелік деңгейлерде шағанның жұмыс істеу ерекшеліктері зерттелді. Шаған тұқымдарының автоморфты топырақ түрлерінде, тиісті орман шаруашылығы технологияларын ескере отырып, жапырақ массасының мерзімінен бұрын зиянсыз төгілуіне байланысты топырақтың мерзімді құрғақшылығы кезінде де көптеген онжылдықтар болуы мүмкін екендігі көрсетілген. Гидроморфты жайылма жағдайында шаған тұқымдары жақсы сақталып қана қоймай, жер бедерін төмендету арқылы шалғынды және орман экожүйелеріне тиімді енгізіледі. Жаңа жердегі ағаштар, әсіресе шалғындарда, 6-10 жылдан кейін жеміс бере бастайды және тұқымдарды басқа аумақтарға таратады. Шағанды кезең-кезеңімен және бірнеше рет таратудың мұндай көшпелі стратегиясы оның инвазиясының қайталама ошақтарының тез қалыптасуына ықпал етеді және онымен тиімді күресу мүмкіндігін болдырмайды.

УДК 633.2.03
МРНТИ 68.39.15

Кадашева Жанар Кадырбаевна, PhD, заведующая кафедрой Химии и химической технологии, https://orcid.org/0000-0002-7633-5566
НАО «Атырауский университет имени Х.Досмухамедова», г Атырау, проспект Студентческий, 1 учебный корпус, 060011, Казахстан, zh.kadasheva@asu.edu.kz, +77016765896
Мухамбетов Болат, доктор сельскохозяйственных наук, ассоциированный профессор, основной автор, https://orcid.org/0000-0001-6693-7742
НАО «Атырауский университет имени Х.Досмухамедова», г Атырау, проспект Студентческий, 1 учебный корпус, 060011, Казахстан, b.mukhambetov@asu.edu.kz, +77011971554
Абдинов Рауан Шарипбаевич, PhD, директор НИИ Экологии, био- и нанотехнологий, https://orcid.org/0000-0001-9136-3269
НАО «Атырауский университет имени Х.Досмухамедова», г Атырау, проспект Студентческий, 1 учебный корпус, 060011, Казахстан, r.abdinov@asu.edu.kz, +77017386923

Kadasheva Zhanar Kadyrbaevna, PhD, Head of the Department of Chemistry and Chemical Technology, https://orcid.org/0000-0002-7633-5566
NPJC Atyrau Kh.Dosmukhamedov University, Atyrau, Studencheskiy Avenue, 1 academic building, 060011, Kazakhstan, zh.kadasheva@asu.edu.kz, +77016765896
Mukhambetov Bolat, Doctor of Agricultural Sciences, Associate Professor, Main author, https://orcid.org/0000-0001-6693-7742
NPJC Atyrau Kh.Dosmukhamedov University, Atyrau, Studencheskiy Avenue, 1 academic building, 060011, Kazakhstan, b.mukhambetov@asu.edu.kz, +77011971554

Abdinov Rauan Sharipbayevich, PhD, Director of the Research Institute of Ecology, Bio- and Nanotechnology, https://orcid.org/0000-0001-9136-3269
NPJC Atyrau Kh.Dosmukhamedov University, Atyrau, Studencheskiy Avenue, 1 academic building, 060011, Kazakhstan, r.abdinov@asu.edu.kz, +77017386923

ИЗУЧЕНИЕ АДАПТИВНЫХ И ПРОДУКТИВНЫХ СВОЙСТВ КАМФОРОСМЫ МОНПЕЛИЙСКОЙ *(CAMPHOROSMETA MONSPELIACAE)* В ПОЧВЕННО-КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ АТЫРАУСКОЙ ОБЛАСТИ

STUDY OF ADAPTIVE AND PRODUCTIVE PROPERTIES OF *CAMPHOROSMETA MONSPELIACAE* IN THE SOIL AND CLIMATIC CONDITIONS OF ATYRAU REGION

АННОТАЦИЯ

Аридные районы, характеризующиеся высокими температурами, засушливыми сезонами и дефицитом водных ресурсов, являются сложными для ведения сельского хозяйства, особенно для животноводства. Однако повышение устойчивости кормовых культур к этим экстремальным условиям может стать решением проблемы обеспечения кормами животных. Одним из наиболее перспективных направлений является использование адаптивных видов кормовых растений, таких как прутняк простертый *(Kochia prostrata (L.) Schrad)* и камфоросма монпелийская *(Camphorosmeta monspeliacae)*, которые обладают высокой засухоустойчивостью и могут эффективно расти в условиях дефицита воды.

В этом обзоре мы сосредоточим внимание на Камфоросме монпелийской *(Camphorosma monspeliaca)*, которую можно считать одним из наиболее представительных галофитов. Целью этого обзора является проиллюстрировать адаптивные и продуктивные свойства камфоросмы монпелийской, приспособленные к почвенно-климатическим условиям Атырауской области.

Результаты исследования позволяют значительно улучшить мелиоративное состояние пастбищных угодий и повысить их кормовую продуктивность в 9-13,7 раза, отвечающим требованиям питательности корма. При использовании камфоросмы монпелийской на сено наибольший сбор кормовых единиц (КЕ), переваримого протеина (ПП) и обменной энергии (ОЭ) обеспечивается при зимнем посеве – соответственно 3,62; 0,86; 5,23, затем подзимнем – соответственно 3,08; 0,73; 4,46. Самый низкий сбор обеспечивается при весеннем сроке посева – 2,72 КЕ, 0,64 ПП, 3,94 ОЭ.

ANNOTATION

Arid areas, characterized by high temperatures, dry seasons and scarcity of water resources, are difficult for agriculture, especially for livestock production. However, increasing the resistance of forage crops to these extreme conditions can be a solution to the problem of providing animal feed. One of the most promising areas is the use of adaptive species of forage plants, such as the *Kochia prostrata (L.) Schrad* and *Camphorosmeta monspeliacae*, which have high drought tolerance and can grow effectively in conditions of water scarcity.

In this review, we will focus on *Camphorosmeta monspeliacae*, which can be considered one of the most representative halophytes. The purpose of this review is to illustrate the adaptive and productive properties of the Montpellier camphor adapted to the soil and climatic conditions of the Atyrau region.

The results of the study make it possible to significantly improve the reclamation condition of pasture lands and increase their feed productivity by 9-13.7 times, meeting the nutritional requirements of feed. When using *Camphorosmeta monspeliacae* for hay, the highest collection of feed units (FU), digestible protein (DP) and metabolic energy (ME) is provided during winter sowing – 3.62; 0.86; 5.23, respectively, followed by winter – 3.08; 0.73; 4.46, respectively. The lowest collection is provided during spring sowing – 2.72 FU, 0.64 DP, 3.94 ME.

Ключевые слова: *Камфоросма монпелийская (Camphorosmeta monspeliacae), солеустойчивость, засухоустойчивость, кормовая продуктивность, адаптивные и продуктивные качества, аридный климат*.

Key words: *Camphorosmeta monspeliacae, salt tolerance, drought tolerance, feed productivity, adaptive and productive qualities, arid climate*.

Введение. Атырауская область Казахстана, расположенная в аридной зоне с засушливыми климатическими условиями, требует внедрения устойчивых сельскохозяйственных технологий и культур, способных выживать в условиях дефицита воды и высоких температур. Одним из перспективных направлений является использование камфоросмы монпелийской *(Camphorosmeta monspeliacae)* — растения, обладающего высокой засухоустойчивостью и солеустойчивостью. Изучение её адаптивных и продуктивных качеств в условиях Атырауской области поможет не только повысить эффективность земледелия в регионе, но и обеспечит кормами животноводство, которое является важной отраслью экономики региона [1, 2, 3].

Подбор соле-солнце-засухоустойчивых культур на деградированных землях продиктован тем, что практиков-животноводов прежде всего интересуют зимние корма: сено и зимние пастбища. Ввиду отсутствия зимних пастбищ животноводы вынуждены заготавливать низкокачественные сена с высокой себестоимостью, притом всегда в недостаточном объёме [4].

При успешном внедрении в культуру и производство камфоросмы монпелийской *(Camphorosmeta monspeliacae)* и прутняка простертого *(Kochia prostrata (L.) Schrad)* необходимость заготовки дорогостоящего сена отпадает, так как они будут служить зимне-вегетирующими осенне-зимне-ранневесенними пастбищами, дополняющими друг друга во времени. Произрастает на светло- и среднезасоленных светло-каштановых и бурых почвах различного механического состава (от глинистых до песчаных).

Однако, внедрение в производство аридных кормовых растений сдерживается не разработанностью и отсутствием технологий возделывания кормовых аридных растений, о чем свидетельствует такой факт - несмотря на давность (с 1936 года) изучения посредством проведения научно-исследовательских работ по селекции, семеноводству и агротехнике возделывания аридных растений до сегодняшнего дня, то есть за 88 лет они были внедрены в республике на площади не более 0,5-1,0 млн.га до 1990 года, а в последующие годы камфоросма монпелийская *(Camphorosmeta monspeliacae)* не возделываются.

Прикаспийский регион общей площадью свыше 40 тыс. км^2, в результате нерационального использования ресурсов оказался в настоящее время одним из самых экологически дестабилизированных территорий Казахстана [8, 9]. Широко проявляется сельскохозяйственная, техногенная, радиологическая деградация и опустынивание почвенного покрова.

Атырауская область характеризуется жарким климатом с продолжительными засушливыми периодами и низким уровнем осадков. Среднегодовая температура в регионе составляет около +7°C, а количество осадков не превышает 189 мм в год. Почвы региона преимущественно солончаковые, что создает дополнительные трудности для сельского хозяйства. Однако такие условия создают хорошие перспективы для внедрения устойчивых к засухе и солеустойчивых растений, таких как камфоросма монпелийская *(Camphorosmeta monspeliacae)*.

Биологическая особенность камфоросмы монпелийской *(Camphorosmeta monspeliacae)* как полудревесного полукустарникого растения в процессе онтогенеза такова, что после прорастания семян и в течение первых месяцев своего развития растение формирует розеточную структуру. Это происходит из-за быстрого развития корневой системы, которая проникает глубоко в почву, в то время как рост основного стебля замедляется [5, 6, 7].

Однако в конце апреля происходит ускоренный рост главного стебля, что влияет на дальнейшую форму и структуру растения. Каждый новый лист раскрывается в пазухе, где образуются пазушные почки. Из этих почек начинают расти боковые генеративные и удлиненные вегетативные вторичные побеги. Эти побеги будут определять форму и

структуру растения на протяжении десятилетий. Сначала появляется главный осевой побег (стебель), за которым следуют генеративные вторичные побеги. Вторичные побеги развиваются из очень коротких междоузлий и сначала остаются вегетативными. Однако со временем они начинают интенсивно разрастаться, образуя длинные междоузлия длиной около 1,5–2,0 см. Таким образом, растение формирует новую группу вегетативных побегов и соцветий.

Целью исследования было изучение адаптивных и продуктивных свойств камфоросмы монпелийской *(Camphorosmeta monspeliacae)*, приспособленные к почвенно-климатическим условиям Атырауской области.

Материалы и методы исследования. Исследования проводились на базе опытно-экспериментального участка НАО «Атырауский университет имени Х.Досмухамедова» (поселок Сарайчик, Атырауская область, координаты по GPS 47.487413 сев.ш., 51.741147 вост.д.) в пустынной зоне.

Почвы на этом участке представляют собой бурые пустынные почвы с содержанием солонцов в пределах 5-10%. Почвообразующие породы состоят из лессовидных засоленных суглинков, которые чередуются с засоленными глинами и линзами аллювиальных песков [10, 11, 12]. Глубже метра чаще всего залегают плотные глины с содержанием солей 1-5% [14].

По определению почвоведов института почвоведения АН КазССР [15], ключевые участки представлены лугово-бурыми почвами различной степени засоления и механического состава, которые в настоящее время из-за отсутствия гидрологической связи с грунтовой водой и в связи с аридизацией суши трансформировались в опустыненные бурые почвы.

Количество осадков в этом районе составляет в среднем 180-190 мм, но в отдельные годы этот показатель может быть ниже 150 мм.

Опыт заложен в подзиму 2024 г., площадь делянок 30 м2, повторность четырехкратная. Фенологические наблюдения, биометрический учет роста и развития растений проводились по методике [13].

Результаты исследования. Для оценки адаптивных и продуктивных качеств камфоросмы монпелийской в условиях Атырауской области было проведено несколько полевых экспериментов. В рамках исследования были проанализированы показатели роста, развития и урожайности растений, а также их реакция на изменения климатических факторов.

О влиянии погодно-климатических условий 2023-2024 сельскохозяйственного года на рост и развитие камфоросмы монпелийской следует отметить, оно было неоднозначным в соответствии с характером распределения осадков и тепла в течение года (Рисунок 1, 2).




Рисунок 1 – Среднемесячная температура воздуха по данным метеостанции с. Махамбет Атырауской области, °С




Рисунок 2 – Среднемесячное количество осадков по данным метеостанции с. Махамбет Атырауской области, мм

По общему количеству выпавших осадков 2023-2024 сельскохозяйственный год характеризуется как высокообеспеченный (268,3 против среднемноголетней нормы 189,8), что оказала более благоприятное влияние на рост и развитие аридных культур второго года жизни и они достигли высоты до 59-65 см (Таблица 1).

Таблица 1 – Биометрические показатели роста и развития камфоросмы монпелийской в зависимости от сроков сева в условиях Атырауской области

Варианты	Год закладки	Годы жизни	Густота стояния, шт/м^2		Высота, см	
			всходы весной	осенью	в мае	осенью
Подзимний	В подзиму 2023	2023 I-год жизни	11,6	11,0	14,2	40,3
		2024 II-год жизни	10,4	9,6	18	59
	В подзиму 2024	2024 I-год жизни	53	46	7	65
Зимний	Зимой 2023	2023 I-год жизни	14,4	12,2	17,1	45,4
		2024 II-год жизни	12,0	10,0	21	65
	Зимой 2024	2024 I-год жизни	64,5	61,2	5,4	67
Ранне-весенний	Весной 2023	2023 I-год жизни	10,2	8,4	11,2	38,2
		2024 II-год жизни	18	17,2	4,65	51
	Весной 2024	2024 I-год жизни	7,8	7,0	5,0	68,0

В таблице 1 приведены данные густоты стояния и высоты растений по изучению сроков сева камфоросмы.

Из данных таблицы 4 видно, что густота стояния растений при посеве в подзиму 2023 года, была высокой на варианте с зимним посевом – 14,4-12,2 шт/м^2 в первом году жизни и 12,0 и 10,0 на втором году жизни против подзимнего соответственно 11,6-11,0 и 10,4-9,6 и

весеннего 10,2-8,4 и 7,8-7,0. Такая же закономерность отмечается на вариантах по высоте растений.

При посеве в подзиму 2024 года порядок эффективности незначительно смещен в пользу подзимнего посева, после него наилучшим оказался вариант зимнего посева, а самой низкой высотой охарактеризовался вариант весеннего посева.

Таблица 2 – Продуктивность камфоросмы монпелийской второго года жизни, ц/га

Варианты	Камфоросма монпелийская (пастбищная масса)
Подзимний (ноябрь)	20,6
Зимний (январь)	24,2
Ранневесенний (март)	18,3
$НСР_{05}$	0,26

В таблице 2 приведены данные продуктивности пастбищной массы камфоросмы второго года жизни по изучению сроков сева.

Пастбищная масса камфоросмы монпелийской составляет (в порядке убывания) – 24,2 ц/га при зимнем, 20,6 ц/га подзимнем и 18,3 ц/га весеннем посеве.

Важным аспектом является высокое содержание белка и минералов в растении. Камфоросма монпелийская была признана ценным источником питательных веществ для животных, что подтверждается положительными результатами кормовых испытаний. В таблице 3 представлены результаты химического анализа кормов для сравнительной оценки показателей качества питательности, которая оценивается содержанием протеина, жира, клетчатки и БЭВ (безазотистых экстрактивных веществ) в сухом веществе, полученные в испытательном центре ТОО «Казахский научно-исследовательский институт животноводства и кормопроизводства».

Таблица 3 – Химический состав и питательность кормов камфоросмы монпелийской в условиях Атырауской области, 2024 год

Наименование образца	В натуральном виде, %							Корм, ед. в 1кг	ПП, г	ОЭ МДЖ	ЭКЕ
	Протеин	Жир	Клетчатка	БЭВ	Сахар	Крахмал	Каротин, мг				
Сено камфоросмы 2 года жизни	20,92	3,90	24,72	40,09	з,н	27,18	23,67	0,68	161,09	9,84	0,98

Примечание: БЭВ - Безазотистые экстрактивные вещества, Корм. Ед. - Кормовая единица, ПП - Переваримый протеин, ОЭ - Обменная энергия, ЭКЕ - Энергетическая кормовая единица.

Из таблицы 6 видно, что в сене камфоросмы второго года жизни содержатся 93,82% сухого вещества при натуральной влажности. Показатели питательности сена камфоросмы таковы 20,92% протеина, 3,90% жира и 24,72% клетчатки. В сене камфоросмы содержится 161,09 г переваримого протеина; 9,84 МДж обменной энергии; 0,98 энергетической кормовой единицы.

В соответствии с высоким содержанием питательных веществ в кормах аридных культур, наряду с их высокой урожайностью обеспечивается наибольший сбор с единицы площади обменной энергии, кормовых единиц и переваримого протеина на лучших вариантах (таблица 4).

Из данных таблицы 4 следует отметить, что при использовании камфоросмы на сено наибольший сбор КЕ, ПП и ОЭ обеспечивается при зимнем посеве – соответственно 3,62; 0,86; 5,23, затем подзимнем – соответственно 3,08; 0,73; 4,46. Самый низкий сбор обеспечивается при весеннем сроке посева – 2,72 КЕ, 0,64 ПП, 3,94 ОЭ.

Исходя из полученных данных, можно утверждать, что камфоросма монпелийская *(Camphorosmeta monspeliacae)* представляет собой перспективную кормовую культуру для

выращивания в Атырауской области. Её адаптивные качества к экстремальным климатическим условиям и высокие продуктивные характеристики делают её важным элементом для развития устойчивого сельского хозяйства в регионе.

Таблица 4 – Продуктивность, питательность и энерго-протеиновая ценность адаптивных видов кормовых культур – камфоросмы монпелийской, приспособленных к почвенно-климатическим условиям Атырауской области

Элементы технологии возделывания	Сено, ц/га	Кормовые единицы, ц/га	Переваримый протеин, ц/га	Обменная энергия, ГДж/га
Камфоросма монпелийская 2 год жизни (посев 2023 года) – сроки сева				
Подзимый (ноябрь)	4,53	3,08	0,73	4,46
Зимний (январь)	5,32	3,62	0,86	5,23
Ранневесенний (март)	4,0	2,72	0,64	3,94
$НСР_{05}$	0,26	-	-	-

Кроме того, камфоросма может стать важной составляющей в севооборотах на солончаковых и бедных почвах, помогая улучшить качество почвы и обеспечив кормовую базу для животноводства.

Заключение. Изучение адаптивных и продуктивных качеств камфоросмы монпелийской *(Camphorosmeta monspeliacae)* в условиях Атырауской области показало, что это растение является высокоэффективным и перспективным для выращивания в условиях региона. Её высокая засухоустойчивость, солеустойчивость и питательные свойства делают её идеальным кандидатом для сельскохозяйственного производства в аридных и полузасушливых районах. Внедрение камфоросмы в агротехнологии области может значительно повысить устойчивость сельского хозяйства, улучшить кормовую обеспеченность животноводства и способствовать сохранению экосистемы региона.

Благодарности. Данное исследование было профинансировано за счет программно-целевого финансирования прикладных научных исследований на 2023-2025 годы Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан по приоритету: «Устойчивое развитие агропромышленного комплекса и безопасность сельскохозяйственной продукции» мероприятия: «Разработка технологии производства полноценных кормов в кормовых угодьях полупустынной и пустынной зонах Казахстана» в рамках НТП ПЦФ ИРН BR21881871 «Разработка технологий и приемов заготовки кормов в кормовых угодьях Казахстана в контексте устойчивого управления».

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. FAO. Regional Office for Europe and Central Asia, 2020. Kazakhstan works toward securing precious pastures for future generations. [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://www.fao.org/europe/news/detailnews/ru/c/1317306/

2. Muhambetov, B. Produktivnost' energeticheskoj i ekonomicheskoj effektivnosti vozdelyvaniya aridnyh kul'tur v Kazahstane [Tekst] / B. Muhambetov [i dr] //Agrarnaya nauka na Severe–sel'skomu hozyajstvu. – 2024. – №. VI. – S. 268-276.

3. Shamsutdinov, N. Halophyte utilization for biodiversity and productivity of degraded pasture restoration in arid regions of Central Asia and Russia. [Text] / N. Shamsutdinov, Z. Shamsutdinov, // (2008). 10.1007/978-3-7643-8554-5_21.

4. Muhambetov, B. Nauchnye osnovy podbora kormovyh kul'tur i tekhnologii ih vozdelyvaniya na zasolennyh zemlyah Prikaspijskoj nizmennosti [Tekst] / B. Muhambetov // avtoref.… doktora s/h nauk:-Almaty. – 2010.

5. Hammouda, R.F. Impact of agrarian practices and some pastoral uses on vegetation in Algerian steppe rangelands. [Text] / R.F. Hammouda [and etc.] // The Rangeland Journal, 41(2), (2019). 97-107. https://doi.org/10.1071/RJ18081

6. Shamsutdinov, Z.Sh. Priemy sozdaniya i uluchsheniya vysokoproduktivnyh pastbishch v zone pustyn' i polupustyn'. [Tekst] / Z.Sh. Shamsutdinov // MSH SSSR VNII TEISH. Moskva, 1971.

7. Mukhambetov, B. Influence of soil and climatic conditions on the chemical composition and nutritional value of Kochia prostrata feed in the arid zone of Western Kazakhstan [Tekst] / B. Mukhambetov [and etc.] // Caspian Journal of Environmental Sciences. – 2023. – T. 21. – №. 4. – P. 853-863

8. Ibragimov, K.M. Pitatel'naja i jenergeticheskaja cennost' aridnyh kormovyh kul'tur v uslovijah Zapadnogo Prikaspija. [Tekst] / K.M. Ibragimov // M.: Kormoproizvodstvo, -1, 2022.- S.3-

9. Kadasheva, Z. Studying dwarfism in Kochia Prostrata growth on saline lands of the Northern Caspian desert. [Tekst] / Z. Kadasheva // News of the National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan, Series of Geology and Technical Sciences, 2024, 1(461), pp 143–154

10. Фаизов, К.Ш. Почвы Гурьевской области. [Текст] / К.Ш. Фаизов // Алма-Ата, 1970.- 45 с.

11. Джакишев, Е.Г. Почвенно-мелиоративные условия низовий р. Урал и перспективы освоения (в пределах Гурьевской области): автореф. … канд. с.-х. наук. [Текст] / Е.Г. Джакишев // -Алма-Ата, 1980. -75 с.

12. Аханов, Ж.У. Почвенно-мелиоративные условия междуречья Волга-Урал. [Текст] / Ж.У. Аханов, Л.И. Пачикина, Э.А. Соколенко // Алма-Ата: Наука, 1979. -С. 14-32.

13. Guidelines for the mobilization of plant resources and the introduction of arid forage plants [Text] (2000)

14. Mukhambetov, B. Adaptability of Kochia Prostrata (L.) Schrad and Camphorosma Monspeliaca agricultural ecosystems on saline lands of the Northern Caspian desert. [Tekst] / B. Mukhambetov // News of the National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan, Series of Geology and Technical Sciences, Volume 4. Number 466 (2024), 197–208 https://doi.org/10.32014/2024.2518-170X.435

15. Zhang, R. Toward sustainable grazing management based on biodiversity and ecosystem multifunctionality in drylands. [Text] / R. Zhang, J. Wang, S. Niu // Current Opinion in Environmental Sustainability, 48, (2021). 36-43. http://dx.doi.org/10.1016/J.COSUST.2020.09.005

REFERENCES

1. FAO. Regional Office for Europe and Central Asia, 2020. Kazakhstan works toward securing precious pastures for future generations. [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://www.fao.org/europe/news/detailnews/ru/c/1317306/

2. Muhambetov, B. Produktivnost' energeticheskoj i ekonomicheskoj effektivnosti vozdelyvaniya aridnyh kul'tur v Kazahstane [Tekst] / B. Muhambetov [i dr] //Agrarnaya nauka na Severe–sel'skomu hozyajstvu. – 2024. – №. VI. – S. 268-276.

3. Shamsutdinov, N. Halophyte utilization for biodiversity and productivity of degraded pasture restoration in arid regions of Central Asia and Russia. [Text] / N. Shamsutdinov, Z. Shamsutdinov, // (2008). 10.1007/978-3-7643-8554-5_21.

4. Muhambetov, B. Nauchnye osnovy podbora kormovyh kul'tur i tekhnologii ih vozdelyvaniya na zasolennyh zemlyah Prikaspijskoj nizmennosti [Tekst] / B. Muhambetov // avtoref.… doktora s/h nauk:-Almaty. – 2010.

5. Hammouda, R.F. Impact of agrarian practices and some pastoral uses on vegetation in Algerian steppe rangelands. [Text] / R.F. Hammouda [and etc.] // The Rangeland Journal, 41(2), (2019). 97-107. https://doi.org/10.1071/RJ18081

6. Shamsutdinov, Z.Sh. Priemy sozdaniya i uluchsheniya vysokoproduktivnyh pastbishch v zone pustyn' i polupustyn'. [Tekst] / Z.Sh. Shamsutdinov // MSH SSSR VNII TEISH. Moskva, 1971.

7. Mukhambetov, B. Influence of soil and climatic conditions on the chemical composition and nutritional value of Kochia prostrata feed in the arid zone of Western Kazakhstan [Tekst] / B. Mukhambetov [and etc.] // Caspian Journal of Environmental Sciences. – 2023. – T. 21. – №. 4. – P. 853-863

8. Ibragimov, K.M. Pitatel'naja i jenergeticheskaja cennost' aridnyh kormovyh kul'tur v uslovijah Zapadnogo Prikaspija. [Tekst] / K.M. Ibragimov // M.: Kormoproizvodstvo, -1, 2022.- S.3-8

9. Kadasheva, Z. Studying dwarfism in Kochia Prostrata growth on saline lands of the Northern Caspian desert. [Tekst] / Z. Kadasheva // News of the National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan, Series of Geology and Technical Sciences, 2024, 1(461), pp 143–154

10. Faizov, K.Sh. Pochvy Gur'evskoj oblasti. [Tekst] / K.Sh. Faizov // Alma-Ata, 1970.- 45 s.

11. Guidelines for the mobilization of plant resources and the introduction of arid forage plants [Text] (2000)

12. Mukhambetov, B. Adaptability of Kochia Prostrata (L.) Schrad and Camphorosma Monspeliaca agricultural ecosystems on saline lands of the Northern Caspian desert. [Tekst] / B. Mukhambetov // News of the National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan, Series of Geology and Technical Sciences, Volume 4. Number 466 (2024), 197–208 https://doi.org/10.32014/2024.2518-170X.435

13.Zhang, R. Toward sustainable grazing management based on biodiversity and ecosystem multifunctionality in drylands. [Text] / R. Zhang, J. Wang, S. Niu // Current Opinion in Environmental Sustainability, 48, (2021). 36-43. http://dx.doi.org/10.1016/J.COSUST.2020.09.005

ТҮЙІН

Жоғары температурамен, құрғақ мезгілдермен және су тапшылығымен сипатталатын құрғақ аймақтар егіншілікке, әсіресе мал шаруашылығына қиын. Алайда, жемшөп дақылдарының осы төтенше жағдайларға төзімділігін арттыру жануарларды азықпен қамтамасыз ету мәселесін шешуі мүмкін. Ең перспективалы бағыттардың бірі-құрғақшылыққа төзімділігі жоғары және су тапшылығы жағдайында тиімді өсе алатын жатаған изен *(Kochia prostrata (L.) Schrad)* және қараматау *(Camphorosmeta Monspeliacae)* сияқты бейімделгіш жемдік өсімдік түрлерін пайдалану.

Бұл шолуда біз қараматауға *(Camphorosmeta Monspeliacae)* назар аударамыз, оны ең өкілді галофиттердің бірі деп санауға болады. Бұл шолудың мақсаты Атырау облысының топырақ-климаттық жағдайларына бейімделген қараматаудың бейімделгіш және өнімді қасиеттерін көрсету болып табылады.

Зерттеу нәтижелері жайылымдық жерлердің мелиоративтік жай-күйін едәуір жақсартуға және олардың жемшөп өнімділігін жемшөптің тағамдық талаптарына жауап беретін 9-13,7 есе арттыруға мүмкіндік береді. Қараматауды шөпке пайдаланған кезде жемшөп бірліктерінің (ЖБ), қорытылатын ақуыздың (ҚА) және айырбастау энергиясының (АЭ) ең көп жиналуы қысқы егіс кезінде қамтамасыз етіледі – тиісінше 3,62; 0,86; 5,23, содан кейін қыста – тиісінше 3,08; 0,73; 4,46. Ең төменгі жинау көктемгі егіс кезеңінде қамтамасыз етіледі-2,72 ЖБ, 0,64 ҚА, 3,94 АЭ.

ӘОЖ 633.2.031
МРНТИ 68.35.47

Шаяхметова А.С., қауымдастырылған профессор, ауыл шаруашылығы ғылымдарының кандидаты, https://orcid.org/0000-0002-8446-7446
«М.Қозыбаев атындағы СҚУ» КеАҚ, Петропавл қ., altyn.sh@mail.ru
Савенкова И.В., ауыл шаруашылығы ғылымдарының кандидаты, https://orcid.org/0000-0003-2436-4178
«М.Қозыбаев атындағы СҚУ» КеАҚ, Петропавл қ., inna.vital@mail.ru
Ахметов М.Б., техника ғылымдарының магистрі, https://orcid.org/0000-0002-5359-7272
«М.Қозыбаев атындағы СҚУ» КеАҚ, Петропавл қ., Tompik.m@mail.ru
Темирбулатова А.К., техника ғылымдарының магистрі, https://orcid.org/0000-0002-2624-3823
«М.Қозыбаев атындағы СҚУ» КеАҚ, Петропавл қ., akerke_007@mail.ru
Усеинов А.А., агрохимия және топырақтану магистрі, https://orcid.org/0000-0002-8807-4607
«М.Қозыбаев атындағы СҚУ» КеАҚ, Петропавл қ., ozon_89@mail.ru

Shayakhmetova A.S., candidate of Agricultural Sciences, https://orcid.org/0000-0002-8446-7446
NJSC «North Kazakhstan University named after Manash Kozybayev». Petropavlovsk, st. Pushkin 86. 150000, Kazakhstan, altyn.sh@mail.ru
Savenkova I.V., candidate of Agricultural Sciences, https://orcid.org/0000-0003-2436-4178
NJSC «North Kazakhstan University named after Manash Kozybayev». Petropavlovsk, st. Pushkin 86. 150000, Kazakhstan, inna.vital@mail.ru
Akhmetov M.B., master of technical sciences, https://orcid.org/0000-0002-5359-7272
NJSC «North Kazakhstan University named after Manash Kozybayev». Petropavlovsk, st. Pushkin 86. 150000, Kazakhstan, tompik.m@mail.ru
Temirbulatova A.K., master of technical sciences, https://orcid.org/0000-0002-2624-3823
NJSC «North Kazakhstan University named after Manash Kozybayev». Petropavlovsk, st. Pushkin 86. 150000, Kazakhstan, akerke_007@mail.ru
Useinov A.A., master of Agrochemistry and Agrosoil Science, https://orcid.org/0000-0002-8807-4607
NJSC «North Kazakhstan University named after Manash Kozybayev». Petropavlovsk, st. Pushkin 86. 150000, Kazakhstan, ozon_89@mail.ru

СОЛТҮСТІК ҚАЗАҚСТАННЫҢ ЖЕМШӨП ӨНДІРІСІНДЕ ШИКІЗАТ КОНВЕЙЕРЛЕРІН ҚАЛЫПТАСТЫРУҒА АРНАЛҒАН АГРОТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ШЕШІМДЕР

AGROTECHNOLOGICAL SOLUTIONS FOR THE FORMATION OF RAW MATERIAL CONVEYORS IN FODDER PRODUCTION IN NORTHERN KAZAKHSTAN

АҢДАТПА

Мақалада ауыл шаруашылығы өндірісіне шикізат конвейерлерін енгізудің өзектілігі, олардың мәні мен қазіргі заманғы агротехнологиялық жағдайларда жетілдіру перспективалары қаралады. Көп жылдық шөп қоспалары негізінде шикізат конвейерлерін ұйымдастыруға, олардың өнімділігіне және Солтүстік Қазақстан жағдайында мал шаруашылығының жемшөп базасына әсеріне ерекше көңіл бөлінеді. Топырақ-климаттық факторлардан туындаған жемшөп тапшылығына байланысты негізгі проблемалар талданады, сондай-ақ едәуір күрделі салымдарсыз табиғи ресурстарды ұтымды басқару тәсілдері ұсынылады. Әр түрлі шөпқоспаларының өнімділігі, олардың жемазық сапасына әсері жайлы мәліметтер келтірілген. Шөп қоспалары ретінде жоңышқа + фестулолиум және

әр түрлі дәнді дақылдармен асбұршақтың қоспа комбинациялары қолданылады. Жемшөп өндірісін тұрақтандыру және мал шаруашылығының тиімділігін арттыру үшін мамандандырылған конвейерлік жүйелерді енгізудің маңыздылығы атап өтіледі. Жемшөп дақылдарының егіс алаңдарын ұлғайту және аграрлық секторды тұрақты дамыту үшін оларды өсіру технологияларын оңтайландыру перспективалары қарастырылады. Қорытындыда шикізат конвейерлерін енгізу негізінде жемшөп өндірісін жетілдіру бойынша ұсыныстар берілді, бұл мал шаруашылығының өнімділігін арттыруға, жемшөп алқаптарының құрылымын жақсартуға және жоғары сапалы жемшөп өндірісін тұрақты қамтамасыз етуге мүмкіндік береді.

ANNOTATION

The article examines the relevance of introducing raw material conveyors into agricultural production, their significance, and prospects for improvement in modern agrotechnological conditions. Special attention is given to the organization of green conveyors based on perennial grass mixtures, their productivity, and their impact on the fodder base of livestock farming in the conditions of Northern Kazakhstan. The main problems associated with fodder shortages caused by soil and climatic factors are analyzed, and rational management strategies for natural resources without significant capital investments are proposed. The article provides data on the productivity of various grass mixtures, including cereal and legume-cereal combinations such as bromegrass + wheatgrass and alfalfa + bromegrass, their yield, and their impact on fodder quality. The importance of implementing specialized conveyor systems for stabilizing feed production and improving livestock efficiency is emphasized. The prospects for increasing forage crop acreage and optimizing cultivation technologies for the sustainable development of the agricultural sector are also considered. In conclusion, recommendations are provided for improving feed production based on the introduction of green conveyors. This approach will enhance livestock productivity, improve pasture structure, and ensure stable production of high-quality fodder under various soil and climatic conditions.

Түйінді сөздер: *жемшөп өндірісі, көпжылдық шөптер, бұршақ-дәнді қоспалар, шикізат конвейері, жасыл масса, сүрлем, концентрленген жемазық.*

Keywords*: fodder production, perennial grasses, legume-cereal mixtures, raw material conveyor, green mass, silage, grain forage.*

Кіріспе. Ауыл шаруашылығы өндірісінің қазіргі жағдайларында мал шаруашылығының өнімділігін қамтамасыз ету үшін жемшөп дайындау мен шикізатты қайта өңдеуді ұтымды ұйымдастыру ерекше маңызға ие болады. Перспективалы бағыттардың бірі жасыл азық, пішендеме және сүрлем дайындау процестерінің тиімділігін едәуір арттыруға мүмкіндік беретін шикізат конвейерлерін енгізу болып табылады. Мұндай конвейерлерді пайдалану шикізат ысырабын азайтуға, логистикалық операцияларды оңтайландыруға және дайын өнім сапасын арттыруға ықпал етеді. Жемшөп дайындаудың дәстүрлі әдістері көбінесе жоғары еңбек шығындарымен, шикізаттың біркелкі түсуімен және ауа райы жағдайларына тәуелділікпен ұштасады. Жемшөптің конвейерлік өндірісін енгізу технологиялық процестің үздіксіздігін, шикізаттың біркелкі бөлінуін және жемшөптің өзіндік құнын төмендетуді қамтамасыз ете отырып, осы тәуекелдерді барынша азайтуға мүмкіндік береді [1]. Бұдан басқа, мұндай жүйелер ылғалдылық көрсеткіштерін және мал азығы массасын тығыздалу дәрежесін жақсы бақылауға мүмкіндік береді, бұл сүрлем әзірлеу процесінде шешуші рөл атқарады [2].

Заманауи технологияларды талдау ауыл шаруашылығында шикізат конвейерлерін қолдану мал шаруашылығын белсенді дамытатын бірқатар елдерде өзінің тиімділігін дәлелдегенін көрсетеді. Атап айтқанда, шетелдік ғалымдардың зерттеулері конвейерлік жүйелерді пайдалана отырып жемшөп дайындау процестерін механикаландыру жасыл

массаны пайдалану коэффициентін 90% -ға дейін арттыруға және сақтау процесінде қоректік заттардың ысырабын төмендетуге мүмкіндік беретінін растайды [3].
Шикізат конвейерлерін енгізу отандық ауыл шаруашылығы үшін өзекті болып табылады. Бұл мақалада мұндай жүйелерге күтім жасаудың негізгі қағидаттары, олардың артықшылықтары және қазіргі заманғы агротехнологиялық талаптарға сәйкес жаңғыртудың ықтимал бағыттары келтірілген.

Ауыл шаруашылығы өндірісі ел экономикасын дамытуда негіз қалаушы рөл атқарады. Ауыл шаруашылығы аумақтарының шектеулі кеңеюі жағдайында ауыл шаруашылығы дақылдарының өнімділігін арттыру демографиялық өсу мәселесін шешуге мүмкіндік беретін қазіргі заманғы аграрлық жүйенің маңызды элементіне айналады. Климаттық жағдайлар дәстүрлі түрде ауыл шаруашылығы өндірісінің ауқымын айқындайтын фактор болып табылады, экстремалды ауа райы құбылыстары мен климаттың өзгеруі жыл сайынғы өнімділіктің ауытқуының негізгі себебі болып табылады. Бұл ресурстары шектелмеген тұрақты егіншілік жүйесінің негізі. Алайда, XX ғасырдың екінші жартысында орнықты ауыл шаруашылығы жүйелерін қолдайтын ресурстар мен қоршаған орта мүмкіндіктерінің тапшылығына қатысты қауіптер туындады. Агросектордағы климаттық өзгерістерді түсінуге қосымша бейімделу стратегиялары мен салдарын жұмсарту жөніндегі шараларды әзірлеу қажет [4].
Дәнді дақылдар жануарлармен түтікке шығу кезеңінен бастап, масақтану кезеңі басталғанға дейін жақсы желінетіндігі белгілі. Бұршақ тұқымдас дақылдар бұталану кезеңінен бастап бүрлену және гүлдену фазасының басталуына дейінгі кезеңде жақсы желінеді [5,6].

Солтүстік дала жағдайында аудандастырылған көпжылдық шөптерден шикізат конвейерін өсіру кезінде дәнді шөп қоспалары арасындағы неғұрлым жоғары өнімділік қылтанақсыз арпабас + бидайық қоспасында болды және жасыл массасының өнімділігі 4,0 т/га құрады. Бұршақ-дәнді шөптер қоспаларының ішінде жасыл массасы 4,9 т/га құраған жоңышқа + қылтанақсыз арпабас қоспасы неғұрлым өнімді болып шықты. Жоғары өнімділікті сондай-ақ төрт және бес компонентті шөп қоспалары көрсетті: жоңышқа + қылтанақсыз арпабас + түйежоңышқа + бидайық, сонымен қатар жоңышқа + қылтанақсыз арпабас + түйежоңышқа + бидайық + бетеге қоспасы [7].

Солтүстік Қазақстанда жемшөп дақылдарының ассортименті шектеулі күйінде қалып отыр, бұл қарқынды мал шаруашылығы үшін тұрақты жем-шөп базасын қамтамасыз етуде елеулі мәселелер тудырады. Өңір жалпы ауыл шаруашылығы өнімінің 12,4% -ын өндіре отырып, елдің аграрлық-өнеркәсіптік дамуында шешуші рөл атқарады. Солтүстік Қазақстан облысының әлеуметтік-экономикалық дамуының 2021-2025 жылдарға арналған кешенді жоспары шеңберінде жалпы сыйымдылығы 29,8 мың бас 52 сүтті-тауарлы шаруашылығын қалыптастыру, сондай-ақ үш бордақылау алаңын құру және жаңғырту көзделген [8].

Қазіргі уақытта Қазақстанда бір жылдық және көп жылдық жемшөп дақылдары өндірілетін алқаптардың тапшылығы байқалады. Жемшөптің тапшылығы күрделі топырақ-климаттық жағдайларға байланысты, атап айтқанда жемшөп дақылдарының вегетациясы кезеңінде жылу мен ылғалдың жеткіліксіздігі. Жемшөп тапшылығы жемшөп дақылдарының өсу кезеңінде жылу мен ылғалдың жетіспеушілігін қоса алғанда, қатты топырақ-климаттық жағдайларға байланысты. Осыған байланысты шаруашылықтарда шикізат конвейерлерін құру қажеттілігі туындайды, бұл өңірлердің топырақ-климаттық ерекшеліктеріне сәйкес және едәуір күрделі салымдарсыз орынды табиғи жемшөп ресурстарын пайдалануға мүмкіндік береді.
Қазақстанның далалық және құрғақ далалық аймақтарында жүргізілген зерттеулер [9-11] жартылай жамылғы әдісімен көп жылдық шөптерді ерте көктемде егу тұрақты агрофитоценоздардың қалыптасуын және бүлінген жерлерді біртіндеп қалпына келтіруді қамтамасыз ететінін көрсетеді.
Ірі қара малды жайылымда ұстаудың тиімділігі көбінесе жануарларды жасыл азықпен қамтамасыз етудің тұрақтылығын айқындайды. Бұл үшін әрбір шаруашылықта жасыл

конвейер әзірленеді, оның негізі жайылымдар, ал олар жетіспеген немесе өнімділігі төмен болған жағдайда егістік ауыспалы егістердің көп жылдық және бір жылдық шөптерінің егістері енгізіледі. Жемшөптің сапасын арттыру және өсімдік массасының жасыл жемшөпке, пішендемеге және пішенге үздіксіз түсуі үшін жемшөп дақылдарын мамандандырылған шикізат конвейерлерінде себу ұсынылады.

Зерттеудің материалдары мен әдістері. Солтүстік Қазақстанның орман-дала аймағы жағдайында егістікте өнімділік-сапалық әлеуеті жоғары толыққанды жемшөп өндіру және мал шаруашылығының қажеттілігін қамтамасыз ету жөніндегі шикізат конвейері жүйесінде жемшөп дақылдарын өсіру жөніндегі зерттеулер 2024 жыл кезеңінде (қаңтар-желтоқсан) өндірістік алаңның тәжірибе учаскелерінде (Қызылжар ауданы, СҚО; 54°41'34 «с.е. 69°14'04» ш.б.). Тәжірибелік учаскелердің ауданы 840 м^2 құрады. Бір мөлтектің ені 3,0 м және ұзындығы 10 м, қорғаныш жолақтарының ені 3,0 м құрады.

Тәжірибе жүргізу мерзімінде топырақ-климаттық жағдайлар өсімдіктердің өсуі мен дамуы үшін қолайлы болды. Осылайша, вегетациялық кезеңде орташа айлық жауын-шашын көрсеткіші өткен жылмен салыстырғанда 4,3 мм артық болды, бұл өнімді ылғал қорының көп жиналуына ықпал етті, демек өсімдіктер шектеуші фактор ретінде ылғалдылыққа аз мөлшерде сезімтал болды және жақсы өнімділікті көрсетті.

Солтүстік Қазақстанның кәдімгі қара топырағында негізгі қоректік заттардың жалпы қоры жоғары. Алайда, кейбір зерттеушілердің пікірінше, олардың көпшілігі (әсіресе фосфор) өсімдіктермен нашар сіңіріледі.

Метеорологиялық деректерді есепке алу және бақылау, жайылымдық шөптің сипаттамалары В.Р. Вильямс атындағы жемшөп БҒЗИ әдістемесіне сәйкес жүргізілді [12].

Зертханалық-далалық зерттеулер келесі көрсеткіштерді қамтиды: қар жамылғысының биіктігін анықтау, топырақ сараптамасы, өнімді ылғал қорын анықтау, метеорологиялық бақылаулар, биометриялық зерттеулер

Агротехникалық іс-шаралар. Солтүстік Қазақстанның далалық және орманды далалық аймағы жағдайында толыққанды жемшөп өндіру үшін бір жылдық және көп жылдық жемшөп дақылдарынан шикізат конвейерін құру жөніндегі агротехникалық іс-шаралар өңірдің аймақтық агротехникалық ұсынымына сәйкес жүргізілді.

Зерттеу нәтижелері. Шикізат конвейерлерін құру үшін Солтүстік Қазақстанның орманды далалы аймағында биологиялық әлеуеті мен өнімділігі жоғары дақылдар (асбұршақ, сұлы, судан шөбі, жүгері, күнбағыс, рапс) таңдап алынды.

Дәнді-бұршақ қоспасын (асбұршақ + сұлы, бұршақ + судан шөбі) 21 мамырдан 10 маусымға дейін 4-5 см тереңдікке, жүгері 23 мамырда, бұршақ пен күнбағысты 19 маусымға 5-10 см тереңдікке, рапс 12 шілдеде және 27 шілдеде 2-3 см тереңдікке себілді, себу мөлшері орманды дала аймағына ұсынылатын себу нормаларына сәйкес.

Шөп жамылғысын ору 20 мамырдан 13 қазанға дейінгі кезеңде жүзеге асырылды, МТЗ 82.1 тракторына КРН 2,1 роторлы шалғысы агрегатталып жүргізілді, кесу биіктігі 5-7 см құрады.

Шикізат конвейерлерін әзірлеу үшін дақылдар мен қоспаларды себудің оңтайлы мерзімдері таңдалды, бұл алынатын жемшөптің жоғары өнімдік-сапалық әлеуетін қамтамасыз етті.

Оңтайлы дақылдар мен себу мерзімдерін таңдау дақылдардың өсуінің биометриялық көрсеткіштерінің жақсы нәтижелерін қамтамасыз етті. Жемшөп базасын жақсарту үшін өнімді дақылдар іріктелді (Кесте 1).

Кесте 1 - Толыққанды жемшөп өндіруге арналған шикізат конвейерін әзірлеу

Номері	Шикізат конвейерінің дақылдарының атауы	Қолдану мерзімі
1	Өткен жылғы көпжылдық шөптер (бұршақты-дәнді) *	20.05-15.06
2	Өткен жылғы көпжылдық шөптер (бұршақты-дәнді) *	1.06-10.06
3	Өткен жылғы көпжылдық шөптер (бұршақты-дәнді) *	11.06-5.07
4	Асбұршақ-сұлы қоспасы 1*	6-16.07
5	Асбұршақ-сұлы қоспасы 2*	17-31.07

6	Асбұршақ-сұлы қоспасы 3*	1-14.08
7	Асбұршақ-сұлы қоспасы 3**	1-14.07
8	Асбұршақ-сұлы қоспасы 3***	15.09
9	Судан шөбі + асбұршақ*	15-26.08
10	Жүгері + асбұршақ*	27.08-6.09
11	Жүгері + күнбағыс*	7-18.09
12	Жүгері + күнбағыс****	7-18.07
13	Жаздық рапс 1*	19.09-1.10
14	Жаздық рапс 2*	2.10-25.10

Ескертпе: *- Жасыл азық,**- пішендеме, ***- мал жемі, ****- сүрлем

Көпжылдық бұршақ-дәнді шөптердің екі компонентті қоспалары (1,2,3; жасыл жемшөп) пайдаланудың әртүрлі мерзімдерінде орылу массасын қалыптастырудың жақсы нәтижелерін көрсетті.

Шөптің жамылғысының биіктігі мен тығыздығы 53,7-81,6 см және 349,8-351,2 дана/м^2 шегінде өзгерді.

Өсімдіктердің биіктігі мен тығыздығының көрсеткіштері дайындалатын азықтың түріне қарағанда асбұршақ-сұлы қоспасының нұсқаларында орташа алғанда шамалы ерекшеленеді (± 4,7 см және ± 17,6 дана/м^2). Жүгері нұсқаларындағы биіктігі орташа 191,1 см, қалыңдығы - 18,3 дана/м^2 құрады. Кеш себілген рапстың шөптік нұсқасы ерте себілген рапстың шөптен 8,4 см жоғары болды.

Дамудың негізгі фазаларының басталуы олардың өсімдіктердің кемінде 75% басталуы кезінде тіркелді және осы климаттық жағдайларда дақылдардың биологиялық ерекшеліктеріне сәйкес келді.

Орташа есеппен «себу-ору» кезеңінің ұзақтығы 68,3 күнді құрады. Орым массасын қалыптастырудың ең үлкен кезеңі жүгері + күнбағыс (жасыл жем) нұсқасында - 97/81 күн болып тіркелген.

«Себу-ору» кезеңіндегі күндердің ең аз саны жасыл азыққа асбұршақ-сұлы қоспасының нұсқасында белгіленді - 43-48 күн.

Жасыл және құрғақ массаның ең көп өнімділігі жүгері + асбұршақ (жасыл жемшөп) нұсқаларында байқалды - 455,0 және 200,3 ц/га.

Жасыл массаның ең аз өнімділігін сәйкесінше 32,0-35,7 ц/га асбұршақ-сұлы қоспасы нұсқалары, өткен жылғы көпжылдық шөптер (бұршақ-дәнді дақылдар) нұсқалары (жасыл жемшөп) - орташа алғанда 16,3 ц/га құрады. Тәжірибе нұсқалары бойынша орташа алғанда жасыл массаның түсімділігі 264,6 ц/га құрады, құрғақ массаға шаққанда - 92,6 ц/га. Шикізат конвейері компоненттерінің жасыл массасының жиынтық өнімділігі 3439,7 ц/га, құрғақ масса мөлшері - 1204,2 ц/га, мал жемі - 99,0 ц/га құрады.

Қорытынды. Жүргізілген зерттеулер жасыл жемшөп, пішендеме және сүрлем алу үшін шикізат конвейерлерін қолдану тиімділігін растады. Тәжірибе нұсқалары бойынша орташа алғанда жасыл массаның түсімділігі 264,6 ц/га, ал құрғақ массаға қайта есептегенде - 92,6 ц/га құрады. Салыстыру үшін, табиғи және ескі жастағы учаскелерде бұл көрсеткіш айтарлықтай төмен болды: 43 ц/га жасыл масса және 16,3 ц/га құрғақ масса.

Шикізат конвейерінің құрамында мамандандырылған жемшөп дақылдарын пайдалану агроценоздардың өнімділігін арттыруға мүмкіндік береді. Конвейерлік әдіс жасыл массаны өсірудің барлық вегетациялық кезең бойындағы үздіксіздігін қамтамасыз етеді, бұл әсіресе тұрақты жемшөп өндірісі үшін маңызды. Дақылдарды ұтымды таңдау және оларды пайдаланудың дәйектілігі есебінен топырақ әлеуеті мен климаттық жағдайларды барынша ұтымды пайдалануға болады.

Сонымен қатар, жасыл массаның жоғары өнімділігі бір аудан бірлігінен сіңірілетін ақуыз бен алмаспалы энергияны жинауды ұлғайтуға мүмкіндік береді, бұл жемшөп сапасына оң әсерін тигізеді.

Жасыл және құрғақ массаның ең көп өнімділігі судан шөбі + жүгері, рапс және дәнді-бұршақ қоспалары нұсқаларында байқалды. Шикізат конвейері компоненттерінің алқап бірлігінен жасыл массасының жиынтық өнімділігі 3439,7 ц, құрғақ масса- 1204,2 ц, мал жемі – 99 ц құрады. Шикізат конвейерінің жемшөп дақылдарының энерго-протеиндік құндылығын зерттеу нәтижелері бойынша - шикізат конвейері компоненттерінің аумақ бірлігінен сіңірілетін протеинінің жиынтық өнімділігі 50,24 ц, жемшөп бірліктері - 468,1 ц, алмасу энергиясы - 632,45 ГДж құрады.

Осылайша, жемшөп өндірісі үшін шикізат конвейерлерін қолдану жемшөп өндірісін тұрақты дамытуға ықпал ететін перспективалы бағыт болып табылады. Тәжірибе нәтижелері жер ресурстарын пайдаланудың тиімділігін арттыру және жануарлардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін шаруашылықтарда осы технологияны одан әрі жақсарту қажеттілігін дәлелдейді.

Алғыс. Зерттеулер Қазақстан Республикасы Ғылым және жоғары білім министрлігінің Ғылым комитеті қаржыландыратын BR21881871 «Қазақстанның мал азықтық алқаптарында тұрақты басқару контекстінде жемшөп дайындау технологиялары мен тәсілдерін жасақтау» ҒТБ шеңберінде жүргізілді.

ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

1. Тоболова Г.В. Оптимизация производственных процессов при заготовке растительных кормов в условиях современного рынка / Г.В. Тоболова, В.К. Семенов // Агропродовольственная политика России. 2024. №5. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/optimizatsiya-proizvodstvennyh-protsessov-pri-zagotovke-rastitelnyh-kormov-v-usloviyah-sovremennogo-rynka (дата обращения: 12.03.20

2. Малков Н. Г. Влияние технологических приемов производства зеленой массы на качество заготовки силоса / Н. Г.Малков, А. И.Чухина, А. И.Демидова, В. Д. Чечулина // АгроЭкоИнженерия. 2020. №1 (102). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/vliyanie-tehnologicheskih-priemov-proizvodstva-zelenoy-massy-na-kachestvo-zagotovki-silosa (дата обращения: 12.03.2025)..

3. Smith J. Forage harvesting and conveyor systems: efficiency and sustainability / Smith, J., Brown, R., & Williams, T. // International Journal of Agricultural Engineering, 12(3), 112-125. 2019.

4. Meinke H.B. Climate predictions for better agricultural risk management / H.B. Meinke et al. // Australian Journal of Agricultural Research, 2007, 58(10), 935-938. https://doi.org/10.1071/ARv58n10_PR

5. Lingorski V. Comparative study of sunflower late-spring mixtures for for-age production in a foothill region of Central Balkan mountains (Bulgar-ia) / V. Lingorski //Banats Journal of Bio-technology. – 2015. Vol. 6. – 12. DOI: 10.7904/2068-4738-VI(12)-45

6. Konyukhov G. I. Agriculture of Yakutia / G.I. Konyukhov //RASKHN. Sib. Otd-nie. Yakut. Research Institute of agriculture. - Novosibirsk, 2005. -360 p.

7. Павлова С.А. Организация зеленого конвейера из районированных многолетних трав в условиях Крайнего Севера / С.А. Павлова, Е.С. Пестерева //. Аграрная наука. 2021;(7-8):93-96. https://doi.org/10.32634/0869-8155-2021-351-7-8-93-96

8. Государственная программа развития АПК Республики Казахстан на 2017-2021 гг. // http:www.eurasiancommission.org/.

9. Чекалин С.Г. Агроэкологическое значение полупокровного способа посева многолетних трав / С.Г. Чекалин // Известия Нижневолжского агроуниверситетского комплекса. – 2012. – №2(26). – С. 76-86.

10. Сагалбеков У.М. Технология создания травостоя донника / У.М. Сагалбеков Г.Т. Сейтмаганбетова // Сельскохозяйственные науки. Национальная ассоциация ученых (НАУ). – 2015. – №4(11). – С.5-7.

11. Дридигер В.К. Организация производства кормов для молочно-товарного комплекса / В.К. Дридигер, М.П. Жукова // Кормопроизводство. – 2013. – №3. – С. 45-47.

12. Методические указания по проведению полевых опытов с кормовыми культурами. – М.: ВНИИ кормов им. В.Р. Вильямса, – 1987. – 198 с.

REFERENCES

1. Tobolova G.V. Optimizatsiya proizvodstvennykh protsessov pri prigotovlenii rastitel'nykh kormov v usloviyakh sovremennogo rynka / G.V. Tobolova, V.K. Semenov // Agroprodovol'stvennaya politika Rossii. 2024. №5. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/optimizatsiya-proizvodstvennyh-processov-pri-zagotovke-rastitelnyh-kormov-v-usloviyah-sovremennogo-rynka (data obrashcheniya: 12.03.20)

2. Malkov N. G. Issledovaniye tekhnologicheskikh priyemov proizvodstva zelenoy massy na kachestvo zagotovki silosa / N. G. Malkov, A. I.Chukhina, A. I.Demidova, V. D. Chechulina // AgroEkoInzheneriya. 2020. №1 (102). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/vliyanie-tehnologicheskih-priemov-proizvodstva-zelenoy-massy-na-kachestvo-zagotovki-silosa (data obrashcheniya: 12.03.2025).

3. Smit Dzh. Sistemy sbora kormov i konveyyernyye sistemy: effektivnost' i ustoychivost' / Smith, J., Brown, R., & Williams, T. // International Journal of Agricultural Engineering, 12(3), 112-125. 2019.

4. Meinke H.B. Climate forecasts for better agriculture risk management / H.B. Meinke et al. // Australian Journal of Agricultural Research, 2007, 58(10), 935-938. https://doi.org/10.1071/ARv58n10_PR

5. Lingorski V. Comparative study of sunflower late-live mixes for forfumer production in a prehill region of Central Balkan Mountains (Bulgar-ia) / V. Lingorski //Banats Journal of Bio-technology. – 2015. Vol. 6. – 12. DOI: 10.7904/2068-4738-VI (12)-45.

6. Konyukhov G. I. Sel'skoye khozyaystvo Yakutii / G.I. Konyukhov //RASKHN. Sib. Otd-niye. Yakut. Nauchno-issledovatel'skiy institut sel'skogo khozyaystva. - Novosibirsk, 2005. -360 s.

7. Pavlova S.A. Organizatsiya zelenogo konveyyera iz ayonnykh mnogoletnikh trav v usloviyakh Kraynego Severa / S.A. Pavlova, Ye.S. Pestereva //. Agrarnaya nauka. 2021;(7-8):93-96. https://doi.org/10.32634/0869-8155-2021-351-7-8-93-96

8. Gosudarstvennaya programma razvitiya APK Kazakhstan Respubliki na 2017-2021 gg. // http:www.eurasiancommission.org/.

9. Chekalin S.G. Agroekologicheskoye znacheniye polupokrovnogo puti poseva mnogoletnikh trav / S.G. Chekalin // Izvestiya Nizhnevolzhskogo agrouniversitetskogo kompleksa. – 2012. – №2(26). – S. 76-86.

10. Sagalbekov U.M. Tekhnologiya sozdaniya travostoya donnika / U.M. Sagalbekov G.T. Seytmaganbetova // Sel'skokhozyaystvennyye nauki. Natsional'naya assotsiatsiya uchenykh (NAU). – 2015. – №4(11). – S.5-7.

11. Dridiger V.K. Organizatsiya proizvodstva kormov dlya molochno-tovarnogo kompleksa / V.K. Dridiger, M.P. Zhukova // Kormoproizvodstvo. – 2013. – №3. – S. 45-47.

12. Metodicheskiye ukazaniya po provedeniyu polevykh opytov s kormovymi kul'turami. – M.: VNII kormov im. V.R. Vil'yamsa, – 1987. – 198 s.

РЕЗЮМЕ

В статье рассматривается актуальность внедрения сырьевых конвейеров в сельскохозяйственное производство, их значение и перспективы совершенствования в современных агротехнологических условиях. Особое внимание уделяется организации сырьевых конвейеров на основе многолетних травосмесей, их продуктивности и влиянию на кормовую базу животноводства в условиях Северного Казахстана. Анализируются основные проблемы, связанные с дефицитом кормов, вызванным почвенно-климатическими факторами, а также предлагаются способы рационального управления природными ресурсами без значительных капитальных вложений. Приведены данные о продуктивности различных травосмесей, включая злаковые и бобово-злаковые

комбинации, таких как люцерна + фестулолиум и различные вариации гороха с злаковыми культурами, их урожайность и влияние на качество кормов. Подчеркивается важность внедрения специализированных конвейерных систем для стабилизации кормопроизводства и повышения эффективности животноводства. Рассматриваются перспективы увеличения посевных площадей кормовых культур и оптимизации технологий их возделывания для устойчивого развития аграрного сектора. В заключении представлены рекомендации по усовершенствованию кормопроизводства на основе внедрения сырьевых конвейеров, что позволит повысить продуктивность животноводства, улучшить структуру кормовых угодий и обеспечить стабильное производство высококачественных кормов.

УДК: 633.34:631
МРНТИ:68.01

Тангирова Гулчехра Насридиновна, доктор сельскохозяйственных наук https://orcid.org/0000-0001-8674-733X
Ташкентский государственный аграрный университет, Республика Узбекистан, 100164, Тошкентская область, Кибрайский район, ул. Университетская, 2, tangirova1966@mail.ru

Tangirova Gulchehra Nasredinovnaю., Doctor of Agricultural Sciences, https://orcid.org/0000-0001-8674-733X
Tashkent State Agrarian University, Toshkent provenci, Kibray district, University str. 2, 100164, Uzbekistan, tangirova1966@mail.ru

РАЗДЕЛЕНИЕ НА КЛАСТЕРЫ И ЭЛЕКТРОФОРЕТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПО ХОЗЯЙСТВЕННО-ЦЕННЫМ ПРИЗНАКАМ ИНТРОДУЦИРОВАННЫХ СОРТООБРАЗЦОВ СОИ

CLUSTERING AND ELECTROPHORETIC ASSESSMENT BASED ON ECONOMICALLY VALUABLE CHARACTERISTICS OF INTRODUCED SOYBEAN CULTIVARS

АННОТАЦИЯ

В Узбекистане уделяется пристальное внимание производству качественной экологически чистой продукции зернобобовых культур, а также испытанию и адаптированию к определенным почвенно-климатическим условиям, в частности новых сортов сои. Одновременно с этим разрабатываются агротехнологии с целью повышения и поддержания плодородия почвы.

Впервые нами была изучена адаптация коллекционных сортообразцов сои (CH_{27}(-266), CH_{28}(-268), CH_3(-008), CH_7(-014), CH_{11}(-018), CH_{30}(-969), US-25(-622), US-14(-382), US-44(-641), US-80(-699), US-82(-701), K09(339), KO20, KO3(-214), KO21(RR-1), KO18) из Южной Кореи в условиях типичных сероземных почв Ташкентской области, а также проведен сравнительный анализ содержания белка и масличности семян, определена разделение кластеры и электрофоретическая оценка по хозяйственно-ценным признакам интродуцированных сортообразцов сои. Полевые исследования проводились на опытном участке Научно-исследовательского института селекции, семеноводства и агротехнологии выращивания хлопка.

ANNOTATION

Uzbekistan pays close attention to the production of high-quality, environmentally friendly products of leguminous crops, as well as testing and adapting to certain soil and climatic conditions, in particular new varieties of soybeans. At the same time, agricultural technologies are being developed to increase and maintain soil fertility.

For the first time, we studied the adaptation of soybean collection varieties (CH27(-266), CH28(-268), CH3(-008), CH7(-014), CH11(-018), CH30(-969), US-25(-622), US-14(-382), US-44(-641), US-80(-699), US-82(-701), K09(339), KO20, KO3(-214), KO21(RR-1), KO18) from South Korea in the conditions of typical gray-earth soils of the Tashkent region, and a comparative analysis of the protein content and oil content of seeds was carried out, the separation of clusters was determined and electrophoretic assessment based on economically valuable characteristics of introduced soybean cultivars. Field research was conducted at the experimental site of the Scientific Research Institute of Breeding, Seed Production and Agrotechnology

Ключевые слова. *соя, коллекции, Южно Корейские сортообразцы, семена, биохимический состав, белок, масла*.

Key words. *soybeans, collections, South Korean cultivars, seeds, biochemical composition, protein, oils*.

Введение. В мире, из-за растущей потребности в растительном белке, наблюдается ежегодное расширение площадей, занятых под бобовыми культурами. Соя же, являясь растением с наибольшим содержанием белка в зерне среди бобовых культур, занимает в мире 4-е место по посевной площади. На сегодняшний день в мире всего выращивается 357 млн тонн зерна сои, из которых 156 млн тонн экспортируется. Из выращенного валового урожая около 90 процентов приходится на 5 стран, в частности Бразилию (126,0 млн. тонн), США (124, млн. тонн), Аргентину (38,0 млн. тонн), Китай (15 млн. тонн) и Индию (14 млн. тонн), а по экспорту также лидируют США, Бразилия, Агрентина[1]. В ведущих странах мира с передовым развитым соеводством при выращивании сои в качестве одного из основных направлений достижения высоких результатов, с учетом почвенно-климатических условий каждого региона, особое внимание уделяется выведению высокоурожайных, устойчивых к болезням и вредителям, богатых белком и маслом, скороспелых, а также приспособленных к механизации, использованию современных методов генетики, селекции и биотехнологии. При этом использование в селекционных исследованиях таких методов анализа, как кластер, электрофорез, является довольно быстрым и эффективным. На сегодняшний день в генетико-селекционных исследованиях, направленных на повышение содержания белка и масла в зерне с использованием интродуцированных из разных регионов сортов и образцов сои, важное значение имеет выведение пластичных сортов посредством применения современных методов селекции.

В нашей республике из года в год увеличиваются посевные площади сои, в результате этого также повышается спрос на сорта, приспособленные к различным почвенно-климатическим условиям с высокой урожайностью и качеством зерна. В Узбекистане пристальное внимание уделяется испытанию и адаптированию к определенным почвенно-климатическим условиям, производству большого количества качественной экологически чистой продукции зернобобовых культур, в частности новых сортов сои, а также разработке агротехнологии, повышения и поддерживания плодородия почвы [7]. Семена сои содержат большое количество масла (17…25 %) и белка (35…55 %), который по своей ценности занимает первое место среди важнейших сельскохозяйственных культур, обладает высокими пищевыми качествами [11, 12, 8].

Соя (*Glycine max* L.) считается одной из основных масличных культур в мире, обеспечивающей производство растительным белком и маслом хорошего качества [9, 10]. Изучение влияния агроклиматических факторов показало, что в зависимости от погодных условий и региона выращивания уровень содержания белка в семенах сои может изменяться в пределах 10-15%. Как в нашем исследовании, так и по данным других авторов содержание белка повышается с ростом температур [6]. Свидительствуют, что высокое содержание масла наблюдается при повышенном увлажнении и относительно невысокой

температуре, а белка – при сухой погоде и повышенной температуре [15].

Соя является одной из самых высокобелковых культур [2, 5] Для эффективного решения многих практических и фундаментальных вопросов интродукции сои овощного типа, наряду с традиционными обязательными морфологическими характеристиками, следует использовать анализ её биохимического состава [3, 14, 13]. В научной литературе отмечается, что содержание белка и масла в соевом зерне находится в отрицательной корреляционной зависимости и значительно варьирует от r = -0,25 до r = -0,93 [1].

Ввиду большого сортового разнообразия и широкого спектра изучаемых признаков для их анализа и систематизации актуальное значение имеет использование многомерных статистических методов, в частности кластерного анализа. Методы кластеризации применяются в различных научно-технических областях с целью решения задач сегментации для объединения объектов в группы со схожими характеристиками, а также сжатия большого объема информации и построения научно обоснованных классификаций [4].

Цель и задачи исследования состоят в следующем:

анализ содержания белка и масла в семенах интродуцированных сортообразцов сои;

определение разделения на кластеры интродуцированных сортообразцов сои по морфологическим признакам;

оценка по электрофоретическому анализу интродуцированных сортообразцов сои по морфологическим признакам.

Объектом исследований служили интродуцированные сортообразцы южнокорейской селекции - CH_{27}(-266), CH_{28}(-268), CH_3(-008), CH_7(-014), CH_{11}(-018), CH_{30}(-969), US-25(- 622), US-14(-382), US-44(-641), US-80(-699), US-82(-701), К09(339), КО20, КО3(-214), КО21(RR-1), КО18, в качестве стандартного сорта использован сорт Узбекской селекции Узбекская 2.

Материалы и методы исследования. Постановка лабораторных, полевых и производственных испытаний в исследовании осуществлялись на основе пособий «Методика проведения полевых экспериментов», «Методика Государственного сортоиспытания сельскохозяйственных культур», «Методические указания по изучению коллекции зерновых бобовых культур», разделение на кластеры сортообразцов сои проводили на основе компьютерной программы Rstudio, статистический анализ полученных в исследованиях данных проводили по пособию Б.А.Доспехова «Методика полевого опыта» с помощью программы Microsoft Excel.

Результаты исследования. Анализ содержания белка и масла в семенах коллекционных сортообразцов сои проводился с помощью прибора Инфраскан-3150 в центре агроуслуг AKIS (Национальный центр знаний и инноваций в сельском хозяйстве) в Юкори Чирчикском районе Ташкентской области. Материалом исследований явились сортообразцы сои из Южной Кореи – раннеспелые К 09 (339), CH_{27}(-266), CH_{28} (-268), среднераннеспелые CH_3(-008), CH_7(-014), CH_{30} (-969), US-25 (-622), КО18, среднеспелые CH_{11} (-018), US-14 (-382), US-44 (-641), US-80 (-699), US-82 (-701), КО20, КО3 (-214), КО21(RR-1). В качестве стандарта использовали среднеспелый сорт сои Узбекская-2.

Проведен сравнительный анализ содержания белка и масла в семенах коллекционных сортообразцов сои из Южной Кореи (раннеспелые К 09 (339), CH_{27}(-266), CH_{28}(-268), среднераннеспелые CH_3(-008), CH_7(-014), CH_{30} (-969), US-25 (-622), КО18, среднеспелые CH_{11} (-018), US-14 (-382), US-44 (-641), US-80 (-699), US-82 (-701), КО20, КО3 (-214), КО21(RR-1). Исследования проводились в условиях типичных сероземов Ташкентской области. Выявлены преимущества использования этих сортообразцов в селекционных программах. Лабораторные анализы показали, что среди сортообразцов сои из Южной Кореи высокое содержание белка наблюдалось у сорта КО 21(RR-1) (42 %) и КО18 (41 %), высокомасличным оказался сорт US-44 (-641) (20,27 %), высокое содержание белка и масла отмечено у сортообразцов CH_{28} (-268) и CH_7(-014), где содержание белка было по 40,0 % и масличность 20,19-20,76 % соответственно. На основании результатов полевых

экспериментов из коллекционных сортообразцов Южной Кореи для увеличения белка и масла рекомендованы сортообразцы:

КО21(RR-1), КО18, для увеличения содержания белка;

US-44(-641) увеличения содержания масла;

CH_7(-014), CH_{28}(-268) для одновременного увеличения содержания белка и масла.

Для проведения кластерного анализа в качестве исходных данных были использованы хозяйственно-ценные признаки 17 изученных сортообразцов.




Рисунок 1 - Диаграмма распределения сортообразцов сои на кластеры по хозяйственно-ценным признакам

Южнокорейские образцы: 11-US-82(-701); 12-К09(339); 6-CH_{30}(-969); 10-US-80(-699); 7-US-25(-622); 14-КО3(-214); 15-КО21(RR-1); 17-Узбекская 2 (стандартный сорт); 1-CH_{27}(-266); 3-CH_3(-008); 9-US-44(-641); 2-CH_{28}(-268); 13-КО20; 4-CH_7(-014); 8-US-14 (-382); 5-CH_{11}(-018); 16-КО18.

Установлено, что интродуцированные сортообразцы под номером 4 с широкояйцевидной формой листа, сортообразцы под номером 3 с яйцевидной формой листа, и иногда сортообразцы под номером 2 с копьевидно-яйцевидной формой листа, обладали относительно большим опушением листьев.

По результатам анализов интродуцированные сортообразцы по морфологическим признакам были разделены на 5 кластеров (рисунок 1.).




Рисунок 2 - Анализ электрофореза интродуцированного сортообразцов сои




Рисунок 3 - Анализ электрофореза гибридов сои

По электрофоретическому анализу интродуцированных сортообразцов и гибридов сои определено расположение белковых частиц в гамме (γ) областях и выявлено различие по признакам, т.е. полиморфизм. Это дает возможность использования выделенных сортообразцов в качестве исходного материала для улучшения признаков (рисунок 2,3.).

Заключение. В результате проведенных исследований было установлено, что среди сортообразцов Южнокорейской селекции выделены сортообразцы с высоким содержанием белка КО21(RR-1) (42 %) и КО18 (41 %), с высоким содержанием масла US-44(-641) (23 %), а также одновременно обладающие высокими показателями по содержанию белка и масла CH_7(-014) (40 % и 20,8 %) и CH_{28}(-268) (40 % и 20,2 %). По результатам кластерного анализа изученных коллекционных сортообразцов по форме листьев и количеству волосков сгруппированы в 4-кластер сортообразцы CH_{27}(-266), CH_3(-008), US-44(-641), в 5-кластер сортообразцы CH_{28}(-268), КО20, CH_7(-014), US-14(-382), CH_{11}(-018), КО18 и обоснованы методом кластерной дендрограммы. Показано, что по электрофоретическому анализу интродуцированных сортообразцов и гибридов сои наблюдалось расположение белковых частиц в гамме (γ) областях и отмечен полиморфизм.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Вишнякова М. А. Требования к исходному материалу для селекции сои в контексте современных биотехнологий. [текст] / М. А Вишнякова, И. В Сеферова, М. Г. Самсонова // Агробиология. – 2017.

2. Зотиков В. И. Характеристика сортов зернобобовых и крупяных культур селекции ВНИИЗБК по качеству зерна. [текст] / В.И. Зотиков, С.В. Бобков, Л.Н. Варлахова // Достижения науки и техники АПК. – 2010. – № 11.– С. 17–19.

3. Зотиков В. И. Взаимосвязь интенсивности азотфиксации и фотосинтеза у новых сортов сои северного экотипа. [текст] / В.И. Зотиков, Е.В. Головина // Вестник аграрной науки, *30* (3). – С. 5–8.

4. Иванищев В. В. О возможности приложения метода кластерного анализа к результатам физиолого-биохимических исследований растений. [текст] / В. В. Иванищев // Известия ТулГУ. Естественные науки. – 2018. – С. 69–77

5. Кошкарова Т. С. Продуктивность адаптированных сортов сои различных групп спелости на каштановых почвах Нижнего Поволжья: специальность 06.01.01 «Общее земледелие, растениеводство» : диссертация на соискание ученой степени кандидата сельскохозяйственных наук. [текст] / Кошкарова Татьяна Сергеевна. – Саратов, 2019. – 173 с.

6. Петибская В. С. Соя: химический состав и использование. [текст] / В. С. Петибская. – Краснодар: Всероссийский научно-исследовательский институт масличных культур им. В.С. Пустовойта, 2012. – 432 с.

7. Тангирова, Г. Н. Влияние нормы высева и нитрагина-137 на динамику образования клубеньков в фазах развития различных сортов сои. [текст] / Г. Н. Тангирова // Актуальные проблемы современной науки. – 2017. – № 4(95). – С. 257-261.

8. Xolmurodova G.R. Soya seleksiyasi va urug'chiligi. O'quv qo'llanma. [text] / G.R. Xolmurodova, G.N. Tangirova, S.T. Joraev // Mualliflar jamoasi. T.: «LESSON PRESS» nashriyoti. – 2021.

9. Akande, S. R. Genotype x environment interaction for soybean grain yield and other reproductive characters in the forest and savanna agro-ecologies of South-west Nigeria. [text] / S. R Akande, L. B Taiwo, A.A. Adegbite, O. F. Owolade // African Journal of Plant Science, 3(6). – 2009. – P. 127-132.

10. Abd El-Mohsen, A. A. Agronomical evaluation of six soybean cultivars using correlation and regression analysis under different irrigation regime conditions. [text] / A.A. Abd El-Mohsen., G. O. Mahmoud, S. A. Safina // Journal of plant breeding and crop science, *5*(5). – 2013. – P. 91-102.

11. Bellaloui, N. Agricultural practices altered soybean seed protein, oil, fatty acids, sugars, and minerals in the Midsouth USA. [text] / N. Bellaloui, H. A. Bruns, H. K. Abbas, A. Mengistu, D. K. Fisher, K. N. Reddy, N. Bellaloui, H. A. Bruns, H. K. Abbas, A. Mengistu, D. K. Fisher, K. N. Reddy // Frontiers in plant science. – 2015.

12. Betzelberger, A. M. Effects of chronic elevated ozone concentration on antioxidant capacity, photosynthesis and seed yield of 10 soybean cultivars. [text] / A. M. Betzelberger, K. M. Gillespie, J. M. Mcgrath, R. P. Koester, R. L. Nelson, E. A. Ainsworth // *Plant, Cell & Environment*, *33*(9). – 2010. – P. 1569-1581.

13. Kusano, M. Assessing metabolomic and chemical diversity of a soybean lineage representing 35 years of breeding. [text] / M. Kusano, I. Baxter, A. Fukushima, A. Oikawa, Y. Okazaki, R. Nakabayashi, G. G. Harrigan. Metabolomics. – 2015. – V.11(2). – P. 261-270.

14. Lin, H. Seed metabolomic study reveals significant metabolite variations and correlations among different soybean cultivars. [text] / H. Lin, J. Rao, J. Shi, C. Hu, F. Cheng, Z. A. Wilson, S. Quan // Journal of integrative plant biology. – 2014. – V. *56*(9). – P. 826-836.

15. Lindberg, J. E. Nordic alternative protein potentials: mapping of regional bioeconomy opportunities. [text] / J. E. Lindberg, G. Lindberg, J. Teräs, G. Poulsen, S.Ø. Solberg, K. Tybirk, M. Knudsen // Nordic Council of Ministers. – 2016. – P.1-6.

REFERENCES

1. Vishnyakova M. A. Trebovaniya k iskhodnomu materialu dlya selekcii soi v kontekste sovremennyh biotekhnologij. [tekst] / M. A Vishnyakova, I. V Seferova, M. G. Samsonova // Agrobiologiya. – 2017.

2. Zotikov V. I. Harakteristika sortov zernobobovyh i krupyanyh kul'tur selekcii VNIIZBK po kachestvu zerna. [tekst] / V.I. Zotikov, S.V. Bobkov, L.N. Varlahova // Dostizheniya nauki i tekhniki APK № 11. – 2010. – S. 17–19.

3. Zotikov V. I. Vzaimosvyaz' intensivnosti azotfiksacii i fotosinteza u novyh sortov soi severnogo ekotipa. [tekst] / V.I. Zotikov, E.V. Golovina // Vestnik agrarnoj nauki, 30(3). – S.5-8.

4. Ivanishchev V. V. O vozmozhnosti prilozheniya metoda klasternogo analiza k rezul'tatam fiziologo-biohimicheskih issledovanij rastenij. [tekst] / V. V. Ivanishchev // Izvestiya TulGU. Estestvennye nauki. – 2018. – S. 69–77

5. Koshkarova T. S. Produktivnost' adaptirovannyh sortov soi razlichnyh grupp spelosti na kashtanovyh pochvah Nizhnego Povolzh'ya: special'nost' 06.01.01 «Obshchee zemledelie, rastenievodstvo».[tekst]: dissertaciya na soiskanie uchenoj stepeni kandidata sel'skohozyajstvennyh nauk / Koshkarova Tat'yana Sergeevna. – Saratov, 2019. – 173 s.

6. Petibskaya V. S. Soya: himicheskij sostav i ispol'zovanie. [tekst] / V. S. Petibskaya. –

Krasnodar: Vserossijskij nauchno-issledovatel'skij institut maslichnyh kul'tur im. V.S. Pustovojta, 2012. – 432 s.

7. Tangirova, G. N. Vliyanie normy vyseva i nitragina-137 na dinamiku obrazovaniya kluben'kov v fazah razvitiya razlichnyh sortov soi. [tekst] / G. N. Tangirova // Aktual'nye problemy sovremennoj nauki. – 2017. – № 4(95). – S. 257-261.

8. Xolmurodova G.R. Soya seleksiyasi va urug'chiligi. O'quv qo'llanma. [text] / G.R. Xolmurodova, G.N. Tangirova, S.T. Joraev // Mualliflar jamoasi. T.: «LESSON PRESS» nashriyoti. – 2021.

9. Akande, S. R. Genotype x environment interaction for soybean grain yield and other reproductive characters in the forest and savanna agro-ecologies of South-west Nigeria. [text] / S. R Akande, L. B Taiwo, A.A. Adegbite, O. F. Owolade // African Journal of Plant Science, 3(6). – 2009. – P. 127-132.

10. Abd El-Mohsen, A. A. Agronomical evaluation of six soybean cultivars using correlation and regression analysis under different irrigation regime conditions. [text] / A.A. Abd El-Mohsen., G. O. Mahmoud, S. A. Safina // Journal of plant breeding and crop science, *5*(5). – 2013. – P. 91-102.

11. Bellaloui, N. Agricultural practices altered soybean seed protein, oil, fatty acids, sugars, and minerals in the Midsouth USA. [text] / N. Bellaloui, H. A. Bruns, H. K. Abbas, A. Mengistu, D. K. Fisher, K. N. Reddy, N. Bellaloui, H. A. Bruns, H. K. Abbas, A. Mengistu, D. K. Fisher, K. N. Reddy // Frontiers in plant science. – 2015.

12. Betzelberger, A. M. Effects of chronic elevated ozone concentration on antioxidant capacity, photosynthesis and seed yield of 10 soybean cultivars. [text] / A. M. Betzelberger, K. M. Gillespie, J. M. Mcgrath, R. P. Koester, R. L. Nelson, E. A. Ainsworth // *Plant, Cell & Environment*, *33*(9). – 2010. – P. 1569-1581.

13. Kusano, M. Assessing metabolomic and chemical diversity of a soybean lineage representing 35 years of breeding. [text] / M. Kusano, I. Baxter, A. Fukushima, A. Oikawa, Y. Okazaki, R. Nakabayashi, G. G. Harrigan. Metabolomics. – 2015. – V.11(2). – P. 261-270.

14. Lin, H. Seed metabolomic study reveals significant metabolite variations and correlations among different soybean cultivars. [text] / H. Lin, J. Rao, J. Shi, C. Hu, F. Cheng, Z. A. Wilson, S. Quan // Journal of integrative plant biology. – 2014. – V. *56*(9). – P. 826-836.

15. Lindberg, J. E. Nordic alternative protein potentials: mapping of regional bioeconomy opportunities. [text] / J. E. Lindberg, G. Lindberg, J. Teräs, G. Poulsen, S.Ø. Solberg, K. Tybirk, M. Knudsen // Nordic Council of Ministers. – 2016. – P.1-6.

RESUME

Uzbekistan pays close attention to the production of high-quality environmentally friendly products of leguminous crops, as well as testing and adaptation to certain soil and climatic conditions, in particular, new varieties of soybeans. At the same time, agricultural technologies are being developed with the aim of increasing and maintaining soil fertility. For the first time, we studied the adaptation of collection varieties of soybeans (CH_{27}(-266), CH_{28}(-268), CH_3(-008), CH_7(-014), CH_{11}(-018), CH_{30}(-969), US-25(- 622), US-14(-382), US-44(-641), US-80(-699), US-82(-701), K09(339), KO20, KO3(-214), KO21(RR-1), KO18) from South Korea in the conditions of typical grey-brownish soils of the Tashkent region, and also carried out a comparative analysis of the protein content, the division into clusters and electrophoretic assessment according to economically valuable characteristics of introduced soybean cultivars are determined. Field research was conducted at the experimental site of the Scientific Research Institute of Breeding, Seed Production and Agrotechnology of Cotton Cultivation.

УДК: 633.51:575.21.
МРНТИ:68.01

Холмуродова Гузал Рузиевна., основной автор, доктор с. - х наук., профессор, академик Туранской Научной Академии, https://orcid.org/0000-0002-3986-3861
Ташкентский государственный аграрный университет, Респуублика Узбекистан, 111218, E. mail: guzalruzievna@gmail.com
Мирхамидова Нодирахон Азимовна., PhD, доцент. https://orcid.org/0009-0004-9199-0202, Андижанский институт агротехнологии и сельского хозяйства, Узбекистан, nodirayakubjonova0101@gmail.com

Kholmurodova Guzal Ruzievna., the main author., doctor of Agricultural Sciences, professor, Academician of the Turan Scientific Academy, https://orcid.org/0000-0002-3986-3861
Tashkent State Agrarian University, Uzbekistan111218, E. mail: guzalruzievna@gmail.com
Mirhamidova Nodirakhon Azimovna., doctor of Philosophy (PhD), associate professor, https://orcid.org/0009-0004-9199-0202
Andijan Institute of Agrotechnology and Agriculture, Uzbekistan nodirayakubjonova0101@gmail.com

ДИКИЕ И КУЛЬТИВИРУЕМЫЕ ПОЛИПЛОИДНЫЕ ВИДЫ ХЛОПЧАТНИКА (2N=52, ГЕНОМ AD)
WILD AND CULTIVATED POLYPLOID COTTON SPECIES (2N=52, GENOME AD)

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассматриваются дикие и культивируемые полиплоидные виды хлопчатника (2n=52, геном AD). Приведены основные морфологические, анатомические и генетические характеристики этих видов. Особое внимание уделяется вопросам их происхождения, эволюции и генетического разнообразия. Анализируются селекционные перспективы использования диких полиплоидных форм в создании новых высокоурожайных и устойчивых к стрессовым факторам сортов. Рассматриваются современные методы молекулярно-генетических исследований, направленные на изучение генома хлопчатника и его улучшение в селекционных программах. Данная статья подготовлена в реферативной форме на основе книги А.А. Абдуллаева и других авторов «Атлас рода Gossypium L.».

ANNOTATION

This article discusses wild and cultivated polyploid cotton species (2n=52, AD genome). The main morphological, anatomical and genetic characteristics of these species are given. Special attention is paid to the issues of their origin, evolution and genetic diversity. The breeding prospects of using wild polyploid forms in the creation of new high-yielding and stress-resistant varieties are analyzed. Modern methods of molecular genetic research aimed at studying the genome of cotton and its improvement in breeding programs are considered. This article has been prepared in abstract form based on the book by A.A. Abdullaev and other authors "Atlas of the genus Gossypium L.".

Ключевые слова*: хлопчатник, полиплоидия, геном AD, дикие и культивируемые виды, генетическое разнообразие, эволюция, селекция*.

Keywords*: cotton, polyploidy, AD genome, wild and cultivated species, genetic diversity, evolution, breeding*.

Введение. Хлопчатник (Gossypium L.) является одним из важнейших сельскохозяйственных растений, используемых для производства текстильного волокна.

Среди многочисленных видов хлопчатника особое внимание привлекают полиплоидные виды с числом хромосом 2n=52, относящиеся к геномной группе AD. Они включают как культивируемые, так и дикие формы, играющие ключевую роль в селекции и генетических исследованиях.

Эти виды обладают высокой продуктивностью, широким ареалом распространения и значительным генетическим разнообразием. Они представляют собой особый интерес для молекулярной биологии, геномики и биотехнологии, так как могут служить источником ценных генетических ресурсов для улучшения сельскохозяйственных культур.

Материалы и методы. В ходе исследования были проанализированы морфологические, физиологические и генетические особенности полиплоидных видов хлопчатника с геномом AD. Исследование включало:

Сравнительный анализ морфологических признаков культивируемых и диких видов.

Генетический анализ с использованием молекулярных маркеров. Изучение физиологических характеристик, таких как устойчивость к засухе и болезням. Анализ филогенетических взаимосвязей с использованием методов секвенирования ДНК.

Результаты исследования. *Происхождение и эволюция полиплоидных видов хлопчатника.* Полиплоидные виды хлопчатника (2n=52) возникли в результате аллополиплоидии, вызванной гибридизацией диплоидных видов с геномами A и D. Геном AD характерен для культивируемых видов:

Gossypium hirsutum L. – доминирующий вид, выращиваемый в большинстве стран мира.

Gossypium barbadense L. – отличается тонким и длинным волокном высокого качества.

Кроме того, дикие виды, такие как *Gossypium darwinii, Gossypium tomentosum, Gossypium mustelinum,* обладают ценными адаптивными признаками, включая устойчивость к засухе и вредителям.

Морфологические и физиологические особенности. Культивируемые виды имеют мощную корневую систему, крупные листья и однородное волокно. Дикие виды характеризуются сильным ветвлением, более мелкими размерами и повышенной устойчивостью к неблагоприятным условиям.

Генетическое разнообразие и значение диких видов. Дикие полиплоидные виды являются ценным источником генетического разнообразия. Они содержат гены, обеспечивающие: Устойчивость к вредителям и болезням. Засухоустойчивость. Генетическую устойчивость к грибковым заболеваниям.

Использование диких видов в биотехнологии. Современные методы генной инженерии позволяют внедрять в культурные формы полезные гены диких видов для улучшения характеристик растений. Технологии, такие как CRISPR/Cas9, открывают новые возможности для точного редактирования генома хлопчатника.

Экологическое значение и сохранение генофонда. Урбанизация и климатические изменения угрожают популяциям диких видов хлопчатника. Важные меры по их сохранению включают: Создание банков семян и генетических ресурсов. Организацию природных заповедников. Использование методов *in vitro* для сохранения клеточных культур [14-20].

Получены распространение виды *G.hirsutum* L. (мексиканский хлопчатник), G.barbadense L. (перуанский) и старосветские виды *G.arboreum* L. и *G.herbaceum* L. В настоящее время сорта видов *G.arboreum* L. и *G.herbaceum* L. во многих странах вытеснены сортами видов *G.hirsutum* L. и *G.barbadense* L. Остальные виды в культуре никогда не использовались. К роду *Gossypium* L. относятся многолетние кустарники или небольшие деревца, полукустарники (в основном прямостоячие), редко-полупростертые и стелющиеся. В культуре используются как однолетние [1].

Цитогенетическими исследованиями было установлено, что все виды хлопчатника по количеству хромосом делятся на две группы. Первая группа «диплоидные» виды с гаплоидным числом хромосом n=13, наиболее многочисленная.

В нее входит большинство диких видов из различных частей света, а также два культивируемых вида Старого Света - *G.herbaceum L., G.arboreum L.* Вторая группа «тетраплоидные» виды с количеством хромосом 2n=52, менее богата видами и они более разнообразны. Кроме того было установлено, что виды различаются между собой по морфологии хромосом. Среди диплоидных видов выделено 8-геномных групп: «A, B, C, D, E, F, K, G.»

Хлопчатник (*Gossypium* L.) является одним из важнейших сельскохозяйственных растений, обеспечивающих мировое производство текстильных волокон. Полиплоидные виды обладают высокой продуктивностью и устойчивостью к различным биотическим и абиотическим факторам.

Происхождение и эволюция полиплоидных видов. Полиплоидные виды хлопчатника (2n=52) представляют собой аллополиплоиды, возникшие в результате гибридизации диплоидных предков с последующим удвоением хромосомного набора. Геном этих видов обозначается как AD, где A-геном происходит от африканских или азиатских предков, а D-геном - от американских.

Дикие полиплоидные виды хлопчатника. Среди диких полиплоидных видов хлопчатника можно выделить: *Gossypium darwinii* (Галапагосские острова) – характеризуется высокой засухоустойчивостью и способностью адаптироваться к экстремальным условиям. *Gossypium mustelinum* (Бразилия) – встречается в засушливых районах, обладает устойчивостью к грибковым заболеваниям. *Gossypium tomentosum* (Гавайи) – произрастает в прибрежных зонах, устойчив к засолению почвы.

Эти виды являются ценными источниками генетического разнообразия для селекции культурных сортов.

Вторая группа «тетраплоидные» виды с количеством хромосом 2n=52, менее богата видами, и они более разнообразны. Кроме того, было установлено, что виды различаются между собой по морфологии хромосом

Тетраплоидные виды – *G.hirsutum, G.barbadense, G.mustelinum, G.tomentosum, G.darwinii* – к AD геномной группе.

Культивируемые полиплоидные виды хлопчатника. Наиболее распространёнными возделываемыми видами являются: *Gossypium hirsutum* L. (хлопчатник обыкновенный) – составляет около 90 % мирового производства хлопка, отличается высокой урожайностью и пластичностью. *Gossypium barbadense* L. (длинноволокнистый хлопчатник) – ценится за высококачественное длинное волокно, но менее урожайный по сравнению с G. hirsutum.

Значение полиплоидных видов для селекции. Полиплоидные виды хлопчатника обладают уникальным сочетанием признаков, которые можно использовать для выведения новых сортов с повышенной продуктивностью, устойчивостью к засухе, болезням и вредителям. Включение генов диких видов в программы селекции позволяет значительно расширить генетическое разнообразие культивируемых форм.

Дикий тетраплоидный хлопчатник *войлочный G.tomentosum Nutt. Ex Seem* (2n=52) с геномной формулой «AD_3». Впервые описан Нуттелем в 1865 г., изучается с 1920 г. Эндемичный вид для Гавайских островов, произрастает на островах Оаху, Молокаи, Мауи.

Многолетний моноподиальный кустарник до 2,5 м высоты, серовато-зеленого цвета, войлочно-опушенный, волоски короткие, густые, в виде пепельного налета. Растение без антоцианового загара, сильно облиствлено, с большим количеством мощно развитых моноподиальных ветвей. Симподиальные ветви короткие, с 2-3 плодовыми местами. Коробочка мелкая (масса 6-8 г), трехгнездная, конусовидно-вытянутой формы с длинным шиловидным носиком, сильно раскрывающаяся. Поверхность незрелой коробочки светло-зеленая, гладкая, матовая, покрыта крупными глубоко погруженными смоляными железками. В одной коробочке от 3 до 7 семян, в каждом гнезде 1-2-3 семени.

Биологические особенности: на фотопериод реагирует слабо. В первый год вегетации, при 10-часовом освещении закладывает первую плодовую ветвь на 23-25 узле, в естественных условиях плодовых ветвей не закладывает, засухоустойчив. Устойчив к яссиде. Поражается бактериозом (*Bact.malvacearum*) и вертицилезным вилтом (*Verticillium dahliae*). Пыльники начинают растрескиваться в 11-12 часов дня. Количество пыльников в одном цветке 35-40. Пыльцы мало. Ее жизнеспособность 85-95%. Плодоношение слабое, так как большинство цветков опадает. Время формирования коробочки 43-45 дней. Кожура семян «твердокаменная». Семена набухают и прорастают медленно.

Использование в генетико-селекционных исследованиях: свободно скрещивается и дает высокоплодовитые гибриды с видами хирзутум, барбадензе. С видами армоурианум, харкнессии, трилобум, стуртии гибриды гетерозисные, стерильные. С видом раймондии гибриды стерильны и уродливы. В Индии при участии томентозум получены перспективные линии “Coton”, устойчивые к яссиде.

Дикий тетраплоидный (2n=52) хлопчатник *G.mustelinum Miers ex Watt***.** с геномной формулой «AD_4».

Впервые был найден Гарднером в 1888 г., описан Миерсом и опубликован Уоттом в 1907 г. как дикий вид. В 1967 г. в Северной Бразилии был найден и описан как новый вид G.caicoense Aranha Cond. По мнению П.Валичека *G.mustelinum* и *G.caicoense* синонимы. Произрастает в горных местах Южной Бразилии, в штатах Цеара и Рио-Гранде, до Норте. Коробочки средние (масса 1,5 г), округло-яйцевидные с острым носиком, трехгнездные, сильно раскрывающиеся. Поверхность незрелой коробочки ямчато-бугристая, с неяркими, средней величины и густоты, госсиполовыми вместилищами. В одной коробочке по 12-15 семян. Семена треугольно-грушевидной формы, густо опушенные, подпушек 10-12 мм длины, светло-бурый.

Биологические особенности: строго фотопериодичен, первая плодовая ветвь закладывается только при коротком световом дне на 28-30 узле. В естественных условиях симподиальные ветви не образуются. Пыльники начинают растрескиваться в 9 часов утра. В одном цветке до 120 пыльников, пыльцы много, ее жизнеспособность от 55 до 95%. Плодоношение среднее. Время созревания коробочки 41-46 дней.

Использование в генетико-селекционных исследованиях: свободно скрещивается с видами хирзутум и барбадензе с образованием высокоплодовитых и стерильных гибридов, строго фотопериодичных. С видом раймондии гибриды стерильные.

Культивируемый тетраплоидный (2n=52) хлопчатник *обыкновенный, мексиканский G.hirsutum* L. с геномной формулой «AD_1». Вид описан в 1763 г. К.Линнеем, изучается с 1763 г. Центр происхождения: прибрежные области южной Мексики и Юкатана. Ареал почти по всем хлопкосеющим странам мира: Мексика, Средняя Америка, СССР, Индия, Пакистан, Китай, южные штаты Бразилии, Аргентина, Уганда, Южная Америка, Африка, Азия, Южная Европа, Австралия.

Широко полиморфный по многим морфологическим признакам и биологическим особенностям вид.

Все многообразие форм и сортов данного вида делится на четыре, исторически дифференцировавшиеся и обособившиеся, эволюционные группы или, так называемые, подвиды. 1 – исконно дикие: *скальный ssp.rupestre (Raf.) Mauer*, и мексиканский *ssp.mexicanum (Tod.) Mauer*; 2 – рудеральные или полудикие: точечный *ssp.punctatum (Schum et Thom) Mauer*, краснеющий *ssp.purpuracens (Poir.) Mauer*; 3 – культурно-тропические: голый *ssp.glabrum (Lam.) Mauer*, метельчатый *ssp.paniculatum (Blanco) Mauer*; 4 – культивируемые: *ssp.euhirsutum Mauer*, все промышленные сорта, высеваемые во всех хлопкосеющих странах мира.

Биологические особенности: в связи с большим многообразием форм, различен спектр их биологических особенностей. Формы, относящиеся к исконно диким и рудеральным эволюционным группам, строго фотопериодичны, теплолюбивы, поздеспелы, моноподиального или смешанного типа ветвления, цветут и плодоносят в зимне-весенний

период. Среди них есть устойчивые к вертициллезному вилту – разновидность *ssp.mexicanum var.nervosum*.

Среди форм подвида пунктатум имеются формы устойчивые к бактериозу. Густо опушенные формы и сорта устойчивые к тле (*Aphis gossypii Clov*.) и цикадке (Jassida); к паутинному клещику устойчивые слабо опушенные или совсем голые.

Использование в генетико-селекционныхъ исследованиях: скрещивается почти со всеми видами рода Gossypium L. с образованием фертильных или стерильных гибридов. Биоморфологическое разнообразие этого вида – богатейший банк ценных генов [2-13].

G.hirsutum L. ssp. rupestre (Raf.) Mauer подвид скальный. Исконно дикая форма. Произрастает на островах Вест-Индии и вдоль побережья Южной Америки – от Колумбии до Гвианы, в засушливых местах, в необитаемых пустынных местностях, по берегам морей, скалам, оврагам и утесам. Подвид отличается значительным полиморфизмом.

Моноподиальный низкий кустарник с маленькими листьями, голый, со средним антоциановым загаром. Моноподиальные ветви сильные, симподиальные тонкие, слабо развитые. Листья мелкие, трех-, иногда, пятилопастные с широколанцетовидными лопастями.

Растения ксерофитные, строго фотопериодичные.

*G.hirsutum L. ssp.mexicanum (Tod.)Mauer,var.microcarpum(Tod.) Mauer подвид мексиканум, разновидность мелкоплодная***.** Дикая форма вида G.hirsutum L. распространена в Мексике штате Чиапас.

Коробочка мелкая (1-1,5 г), 3-4 гнездная, округлая с маленьким носиком.

Семена (8 мм длины, 5 мм ширины) «среднекаменистые», средне опушенные бурым подпушком. Волокно короткое, грубое, бурого цвета до 20-22 мм длины.

Растение строго фотопериодичное, в естественных условиях освещения плодовых ветвей не закладывает. При коротком (10 часовом) дне первая плодовая ветвь закладывается на 20-21 узле. Неустойчив к вертициллезному вилту. При гибридизации с некоторыми формами вида G.hirsutum дает большое количество стерильных уродливых растений.

G.hirsutum L., ssp.mexicanum (Tod.) Mauer var. nervosum (Watt.) Mauer подвид мексиканум, разновидность нервированная. Дикая форма G.hirsutum L. произрастает в Южной Мексике в штате Виктория.

Растения ксерофильные, строго фотопериодичные. Семена «каменистые». Форма относительно устойчива к вертициллезному увяданию. Была рекомендована А.А.Абдулаевым в качестве донора и послужила основой создания вилтоустойчивых сортов группы «Ташкент».

G.hirsutum L., ssp.punctatum (Schum. et Thann.) Mauer подвид точечный. Рудеральная форма G.hirsutum L. с острова Ява.

Высокий моноподиальный кустарник, голый, средне облиствленный, со средним антоциановым загаром, покрыт густыми черными точками. Моноподиальные ветви мощно развитые, длинные, симподиальные – средние.

Коробочка средняя (масса 2,0-2,5 г), гладкая, округлой формы с маленьким носиком, 4-х гнездная. Волокно белое до 22-25 мм длины, грубое. Семена (9 мм дл., 4 мм шир.) «среднекаменистые», подпушек на микропиле светло-серый. Растение строго фотопериодичное. В естественных условиях плодвых ветвей не образует, при коротком световом дне они закладываются на 12-ом узле.

Рудеральная форма *G.hirsutum L., ssp.purpurascens (Poir.) Mauer подвид – краснеющий.* Распространена в Вест-Индии и Колумбии.

Моноподиальный древовидный кустарник, слабо опушенный, средне облиствленный. Листья средние глубоко рассеченные, 3-5-7-лопастные с удлиненно-треугольными лопастями.

Коробочки мелкие (масса 1,5-1,8 г), округло-вытянутые с острым длинным носиком. Семена средние (10 мм дл., 5 мм шир.), голые. Волокно белое, до 40 мм длины. Растение мезофитное, строго фотопериодичное.

G.hirsutum L., ssp.paniculatum (Blanco) Mauer подвид метельчатый. Распространение: южная и юго-западная Мексика, центральная Америка, Перу, Бразилия, южная Индия, Индо-Китай, Филиппины, страны тропической Африки.

Коробочки средней величины и крупные, сильно изменчивые по форме, 4-5 гнездные. Поверхность коробочек матовая, гладкая или рябоватая. Семена крупные по 7-8 в гнезде, от голых до сильно опушенных (преобладают густо опушенные). Волокно белое, редко бурое, длинное (до 35 мм и более).

G.hirsutum L., ssp.euhirsutum Mauer подвид euxirzutum. Недолговечные симподиальные крайне симподиальные полутравинистые кустарники с крупными листьями, сильно развитыми симподиальными ветвями и относительно маломощными моноподиями. Коробочка крупная (масса 6,5 г), круглая с очень маленьким носиком, 5-гнездная. Волокно белое (33 мм дл.), выход 36%.

Вегетационный период – 135 дней. Биологические особенности: среднескороспелый, устойчивый к вилту.

Хлопчатник перуанский G.barbadense L. Культивируемый тетраплоидный (2n=52) хлопчатник с геномной формулой «AD_2». Описан Линнеем в 1753 г., изучается с 1753 г.

Географическое распространение: Южная Америка – Перу, Боливия, Бразилия, Эквадор, Колумбия; Вест-Индия, ЮАР, Судан, Нигерия, СНГ – Турмения, Таджикистан, Узбекистан.

Все внутривидовое разнообразие *G. barbadense L*. Ф.М.Мауер разделил на 4 эволюционных группы: 1 – исконно дикие ssp. darwinii (Watt.) Mauer; 2 – руде-ральные ssp. ruderale Mauer; 3 –культурно-тропические *ssp. vitifolium (Lam.) Mauer*; 4 –культивируемые сорта *ssp. eubarbadense (Lam.) Mauer*.

Биологические особенности: тропические формы строго фотопериодичны, теплолюбивы, позднеспелы, плодоносят в осенне-весенний период; субтропические не фотопериодичны, засухоустойчивы, в различной степени скороспелы. Многие формы и сорта поражаются фузариозным вилтом, слабо или совсем не поражаются вертициллезным. Поражаются вирусным заболеванием (скрученность листьев). Сеянцы устойчивы к корневой гнили, форма дарвини устойчива к засолению. Дикие формы имеют «каменистую» кожуру семян.

Использование в генетико-селекционных исследованиях: свободно скрещивается со многими видами рода Gossypium L. с образованием гетерозисных фертильных или стерильных гибридов.

Представители этого вида ценнейший генофонд для выведения сортов с высокими технологическими показателями волокна.

G. barbadense L. ssp. darwinii (Watt.) Mauer подвид Дарвина. Таксономический ранг является спорным. Одни исследователи считают его одним из подвидов *G. barbadense L*, другие самостоятельным видом. В 90-е годы получены данные, подтверждающие статус самостоятельного вида. Дикая форма с Галапагосских островов.

Долговечный невысокий кустарник. Моноподиальтные ветви средние, симподиальные – слаборазвитые, голые, с интенсивным антоциановым загаром, покрыт густыми и яркими черными точками - госсиполовыми вместилищами.

G. barbadense L. ssp. ruderale Mauer подвид рудеральный. Примитивно рудеральная форма вида *G. barbadense L*. из Парагвая. Древовидный кустарник с мощно развитыми моноподиальными ветвями. Плодовые ветви более развиты, чем у диких форм. Стебель средней толщины, устойчивый, голый, с ярким антоциановым загаром. Лист средней величины, темно-зеленый, 4-5-лопастной, с лопастями яйцевидно-треугольной формы.

Коробочка мелкая (масса 2-2,2 г), яйцевидно-конусовидная с маленьким носиком. Волокно белое или бурое до 25-30 мм. Семена (9 мм дл., 5 мм шир.) с темно-бурым подпушком на микропиле. Растения мезоксерофитные, слабо фотопериодичные.

G. barbadense L., ssp. vitifolium (Law.) Mauer f. brasiliense подвид виноградолистный, форма из Бразилии. Высококультурная тропическая форма. Коробочка крупная (масса 5-5,2 г), шиловидно-вытянутая с очень длинным острым носиком, рябая. Волокно белое, 25-30 мм длины.

Растения мезофитного типа, строго фотопериодичные, теплолюбивые, не поражаются бактериозом.

G. barbadense L., ssp. vitifolium (Law.) Mauer f. Algodon Amarillo подвид виноградолистный, форма амарилло из Эквадора. Высококультурная тропическая форма. Мощный древовидный кустарник с большим количеством моноподиальных ветвей в естественных условиях освещения и среднеразвитыми симподиальными ветвями в условиях короткого светового дня. Коробочка средняя (масса 4,5-5 г), часто уродливая. Волокно 25 мм, светло-бурое. Семена (10 мм дл., 5 мм шир.), слабо опушенные бурым подпушком. Форма строго фотопериодичная, теплолюбивая, сеянцы устойчивы к корневой гнили и паутинному клещику.

G. barbadense L., ssp. eubarbadense Mauer подвид эубарбадензе

Симподиальные тропические формы этого подвида – египетские хлопчатники (все формы и сорта), американо-египетские и советские сорта тонковолокнистого хлопчатника. Сорт С-6037, географическое происхождение –Узбекистан.

Коробочки средние (масса 3,7 г), яйцевидно-конусовидные, 3-4-гнездные, мелкоямчатые. Волокно кремовое, шелковистое, длина 41 мм, выход 30%.

Семена крупные (12-13 мм дл., 6-7 мм шир.), обратно-конусовидной формы, слабо опушенные, подпушек зелено-серый на микропиле и халазе.

Заключение. Полиплоидные виды хлопчатника с геномом AD играют важную роль в селекции, обеспечивая генетическое разнообразие для создания устойчивых и высокопродуктивных сортов. Дальнейшие исследования в области геномики и биотехнологии позволят более эффективно использовать генетические ресурсы хлопчатника в сельском хозяйстве.

Благодарности. Авторы выражают благодарность научным учреждениям и коллегам за предоставленные материалы для статьи.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Абдуллаева А.А. «Атлас рода Gossypium L.». [текст] / А.А. Абдуллаева А.С.Дариева, М.В.Омельченко, В.П.Клят, С.М.Ризаевой, Х.Сайдалиева, А.Б.Амантурдиева, М.Б. Халиковой. – Ташкент. – 2010. – 285 с.

2. Холмуродова Г.Р. G‘o’zaning konvergent oilalarida belgilarning o’zaro korrelyatsiyasi. [text] / Г.Р. Холмуродова, N.A. Mirxomidova, Sh.E. Namazov, Niyatov betI., F.F. Tursunbaev // «Xorazm Ma’mun akdemiyasi axboronomasi». – Xiva, 2021. - № 9. – S. 70-73.

3. Namazov Sh.E. G‘o’zada murakkab oilalarning tola chiqimi va tola uzunligi o’rtasidagi korrelyativ bog‘liqligi. [text] / Sh.E. Namazov, Г.Р. Холмуродова, M.M. Xakimova // «Agro kimyo himoya va o’simliklar karantini». – Tashkent. – 2021. - № 5. – S. 84-87.

4. Холмуродова Г.Р. Analizing formation of fiber the length of selection materials created by means of several types of hybridization methods in breeding g. hirsutum l. Varieties. [text] / Г.Р. Холмуродова., Sh.Ye. Namazov., N.A. Mirkhomidova, S.K. Matyakubov, A.Kh. Yusupov., N.S. Rustamov, H.T. Mashrapov // Yeuropean Journal of Molecular & Clinical Medicine. – 2021. –P.1316-1321.

5. Kholmurodova G.R. Analizing formation of fiber the length of selection materials created by means of several types of hybridization methods in breeding G. hirsutum L. Varieties. [text] / G.R. Kholmurodova, Sh.E. Namazov, N.A.Mirkhomidova, S.K. Matyakubov, A.Kh.Yusupov,

N.S. Rustamov, H.T. Mashrapov // European Journal of Molecular & Clinical Medicine. – 2021.- 1316 s.

6. Рустамов Н.С. Анализ формирования признака скороспелости у сортов вида G. hirsutum L. F3 поколения, полученный методами двойной и сложной гибридизатции. [текст] / Н.С. Рустамов , М.С. Рахмонкулов , G.P. Холмуродова, Ф.Р. Абдиев, Б.К. Мадартов // Актуалные проблемы современной науки. – №2(119). – 2021. – 95 с.

7. Mirxomidova N.A. G‘o’zaning konvergent oilalarida belgilarning o’zaro korrelyatsiyasi. [text] / N.A. Mirxomidova, G.R. Xolmurodova, S’h.E. Namazov, B.I. Niyatov, F.F. Tursunbaev // J. Xorazm ma’mun Akademiyasi Axborotnomasi. - Xiva. – 2021. – V. 9.– P.70-72.

8. Mirkhamidova N. A.. Formation of the groWing period indicator in cotton options. [text] / N.A. Mirkhamidova, G.N. Buriboeva, G.R. Kholmurodova // British jornal of global ecology and sustainable Developmentю – 2024. – P.21-27.

9. Xolmurodova G.R. Creation of selected items with high fiber yield and length based on cotton composite hybrids. [text] / G.R Xolmurodova., S.H Namazov., R.A.Yuldasheva, M.M. Jumashev // E3S Web of Conferences 371. – 2023. – P. 9 - 12.

10. Xolmurodova G.R. Creation of goods with high fiber quality from the selection of varieties belonging to G.Hirsutum L. Species. [text] / G.R Xolmurodova, N.A.Mirhamidova, R.A.Yuldasheva, N.B. Nazarova, A.I. Aktamova // IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. – 2023. – P. 7 - 12.

11. Xolmurodova G.R. Correlation betweyen family and range value economic traits in cotton. [text] / G.R. Xolmurodova, R.A. Yuldasheva, M. Hakimova, A.I Aktamova., N.A.Yakubjonova // IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science. – 2023. – P. 8 -12.

12. Xolmurodova G.R. Formation of yield elements in composite hybrid families of cotton. [text] / G.R. Xolmurodova, R.A.Yuldasheva, N.A. Mirhamidova // E3S Web of Conferences. – 2023.

13. Raupov S.A Formation of fastness in the created ridges of the groin. [text] / S. A. Raupov, I. Abdurakhmonov, G.R. Kholmurodova // British Journal of Global Ecology and Sustainable Development. – 2024. – V. 25.

14. Wendel J.F. Polyploidy and the evolutionary history of cotton. [text] / J.F. Wendel, R.C. Cronn // Advances in Agronomy. – 2003. – P. 139-186.

15. Paterson A.H. Cotton: Origin, History, Technology, and Production. [text] / A.H Paterson, C.W. Smith // John Wiley & Sons. – 1999.

16. Fang D.D. Cotton. [text] / D.D. Fang, R.G. Percy // Springer. – 2015.

17. Grover C.E Recent insights into the origin of polyploid cotton. [text] / C.E. Grover, J.F. Wendel // Genome. – 2010. – V. 53(8).– P. 603-617.

18. Liu Q. Genetic diversity in Gossypium species and its implications for cotton improvement. [text] / Q. Liu, H. Liu. Plant Biotechnology Journal, 17(1). – 2019. – P. 101-111.

19. Zhang T.. Advances in genetic modification of cotton for enhanced fiber quality. [text] / T. Zhang, X. Lu // Journal of Cotton Science. – 2018. – V. 22(3).– P. 257-268.

20. Li X. Evolutionary history and ecological significance of wild cotton species. [text] / X. Li, J. Zhang // Ecology and Evolution. – 2017. – V. 8(14). – P. 7103-7112.

REFERENCES

1. Abdullaeva A.A. «Atlas roda Gossypium L.». [text] / A.A. Abdullaeva A.S.Darieva, M.V.Omel'chenko, V.P.Klyat, S.M.Rizaevoj, H.Sajdalieva, A.B.Amanturdieva, M.B. Halikovoj. – Toshkent. – 2010. – 285 s.

2. Holmurodova G.R. G‘o’zaning konvergent oilalarida belgilarning o’zaro korrelyatsiyasi. [text] / Г.Р. Холмуродова, N.A. Mirxomidova, Sh.E. Namazov, Niyatov betI., F.F. Tursunbaev // «Xorazm Ma’mun akdemiyasi axboronomasi». – Xiva, 2021. – V. 9. – S. 70-73.

3. Namazov Sh.E. G‘o’zada murakkab oilalarning tola chiqimi va tola uzunligi o’rtasidagi korrelyativ bog‘liqligi. [text] / Sh.E. Namazov, Г.Р. Холмуродова, M.M. Xakimova // «Agro kimyo himoya va o’simliklar karantini». – Toshkent. – 2021. – V. 5. – S. 84-87.

4. Holmurodova G.R. Analizing formation of fiber the length of selection materials created by means of several types of hybridization methods in breeding g. hirsutum l. Varieties. [text] / Г.Р. Холмуродова., Sh.Ye. Namazov., N.A. Mirkhomidova, S.K. Matyakubov, A.Kh. Yusupov., N.S. Rustamov, H.T. Mashrapov // Yeuropean Journal of Molecular & Clinical Medicine. – 2021. – S.1316-1321.

5. Kholmurodova G.R. Analizing formation of fiber the length of selection materials created by means of several types of hybridization methods in breeding G. hirsutum L. Varieties. [text] / G.R. Kholmurodova, Sh.E. Namazov, N.A.Mirkhomidova, S.K. Matyakubov, A.Kh.Yusupov, N.S. Rustamov, H.T. Mashrapov // European Journal of Molecular & Clinical Medicine. – 2021. – 1316 s.

6. Rustamov N.S. Analiz formirovaniya priznaka skorospelosti u sortov vida G. hirsutum L. F3 pokoleniya, poluchennyj metodami dvojnoj i slozhnoj gibridizatcii. [text] / N.S. Rustamov , M.S. Rahmonkulov , G.R. Holmurodova, F.R. Abdiev, B.K. Madartov // Aktualnye problemy sovremennoj nauki. – 2021. – V. 2(119).– 95 s.

7. Mirxomidova N.A. G‘o’zaning konvergent oilalarida belgilarning o’zaro korrelyatsiyasi. [text] / N.A. Mirxomidova, G.R. Xolmurodova, S’h.E. Namazov, B.I. Niyatov, F.F. Tursunbaev // J. Xorazm ma’mun Akademiyasi Axborotnomasi. - Xiva. – 2021. – V. 9. – S.70-72.

8. Mirkhamidova N. A.. Formation of the groWing period indicator in cotton options / N.A. Mirkhamidova, G.N. Buriboeva, G.R. Kholmurodova. [text] // British jornal of global ecology and sustainable Developmentю – 2024. – S.21-27.

9. Xolmurodova G.R. Creation of selected items with high fiber yield and length based on cotton composite hybrids. [text] / G.R Xolmurodova., S.H Namazov., R.A.Yuldasheva, M.M. Jumashev // E3S Web of Conferences 371. – 2023. – S. 9 - 12.

10. Xolmurodova G.R. Creation of goods with high fiber quality from the selection of varieties belonging to G.Hirsutum L. Species. [text] / G.R Xolmurodova, N.A.Mirhamidova, R.A.Yuldasheva, N.B. Nazarova, A.I. Aktamova // IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. – 2023. – S. 7 - 12.

11. Xolmurodova G.R. Correlation betweyen family and range value economic traits in cotton. [text] / G.R. Xolmurodova, R.A. Yuldasheva, M. Hakimova, A.I Aktamova., N.A.Yakubjonova // IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science. – 2023. – S. 8 -12.

12. Xolmurodova G.R. Formation of yield elements in composite hybrid families of cotton. [text] / G.R. Xolmurodova, R.A.Yuldasheva, N.A. Mirhamidova // E3S Web of Conferences. – 2023.

13. Raupov S.A Formation of fastness in the created ridges of the groin. [text] / S. A. Raupov, I. Abdurakhmonov, G.R. Kholmurodova // British Journal of Global Ecology and Sustainable Development. – 2024. – V. 25.

14. Wendel J.F. Polyploidy and the evolutionary history of cotton. [text] / J.F. Wendel, R.C. Cronn // Advances in Agronomy. – 2003. – S. 139-186.

15. Paterson A.H. Cotton: Origin, History, Technology, and Production. [text] / A.H Paterson, C.W. Smith // John Wiley & Sons. – 1999.

16. Fang D.D. Cotton. [text] / D.D. Fang, R.G. Percy // Springer. – 2015.

17. Grover C.E Recent insights into the origin of polyploid cotton. [text] / C.E. Grover, J.F. Wendel // Genome, 53(8). – 2010. – S. 603-617.

18. Liu Q. Genetic diversity in Gossypium species and its implications for cotton improvement. [text] / Q. Liu, H. Liu. Plant Biotechnology Journal, 17(1). – 2019. – S. 101-111.

19. Zhang T.. Advances in genetic modification of cotton for enhanced fiber quality. [text] / T. Zhang, X. Lu // Journal of Cotton Science. – 2018. – V. 22(3).– S. 257-268.

RESUME

This article examines wild and cultivated polyploid cotton species (2n=52, genome AD). The main morphological, anatomical, and genetic characteristics of these species are presented. Special attention is given to their origin, evolution, and genetic diversity. The selection prospects of using wild polyploid forms to develop new high-yield and stress-resistant varieties are analyzed. Modern molecular genetic research methods aimed at studying the cotton genome and its improvement in breeding programs are considered. This article has been prepared in an abstract form based on the book "Atlas of the Genus Gossypium L." by A.A. Abdullaev and other authors.

УДК 332.6
МРНТИ 68.75.21

Утегалиева Н.Х., магистр, https://orcid.org/0000-0001-9127-5808,
НАО «Западно-Казахстанский аграрно-технический университет имени Жангир хана», г. Уральск, ул. Жангир хана 51, 090009, Казахстан, utegalieva.2013@mail.ru

Utegalieva N.Kh., https://orcid.org/0000-0001-9127-5808, Master of Agricultural Sciences, Zhangir Khan West Kazakhstan Agrarian and Technical University, 51 Zhangir Khan Street, Uralsk, Republic of Kazakhstan, utegalieva.2013@mail.ru

ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ МОНИТОРИНГА ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ В РК: ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ

STATE REGULATION OF LAND RESOURCES MONITORING IN THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN: PROBLEMS AND SOLUTIONS

АННОТАЦИЯ

В статье рассмотрены особенности организации мониторинга земель в Республике Казахстан. Исследование направлено на анализ нормативно-правовой базы, методов и технологий, используемых для мониторинга земельных ресурсов. Основное внимание уделено вопросам и перспективам развития системы мониторинга в условиях современных экологических и экономических изменений. На основе проведенного анализа предложены рекомендации по совершенствованию системы мониторинга земель в Республике Казахстан. Мониторинг земель является важным инструментом управления земельными ресурсами, позволяющим оценивать их состояние, выявлять изменения и прогнозировать возможные риски. В условиях роста антропогенной нагрузки и изменения климата актуальность мониторинга земель возрастает. Земля – ключевой ресурс для сельского хозяйства, промышленности и урбанизации. Эффективное управление земельными ресурсами напрямую влияет на экономику Казахстана, особенно в условиях роста агропромышленного комплекса и необходимости обеспечения продовольственной безопасности. Деградация почв (опустынивание, засоление, эрозия), загрязнение земель и последствия изменения климата требуют системного мониторинга для предотвращения экологических кризисов. Эффективный мониторинг позволит оптимизировать управление сельскохозяйственными угодьями, повысить их продуктивность и предотвратить экологические риски, связанные с загрязнением и деградацией земель.

ANNOTATION

The article discusses the specifics of the organization of land monitoring in the Republic of Kazakhstan. The research is aimed at analyzing the regulatory framework, methods and technologies used for monitoring land resources. The main attention is paid to the issues and prospects of the monitoring system development in the context of modern environmental and economic changes. Based on the analysis, recommendations for improving the land monitoring

system in the Republic of Kazakhstan are proposed. Land monitoring is an important tool for land resource management, which makes it possible to assess their condition, identify changes and predict possible risks. In conditions of increasing anthropogenic pressure and climate change, the relevance of land monitoring is increasing. Land is a key resource for agriculture, industry and urbanization. Effective management of land resources has a direct impact on the economy of Kazakhstan, especially in the context of the growth of the agro-industrial complex and the need to ensure food security. Soil degradation (desertification, salinization, erosion), land pollution, and the effects of climate change require systematic monitoring to prevent environmental crises. Effective monitoring will optimize the management of agricultural land, increase its productivity and prevent environmental risks associated with pollution and land degradation.

Ключевые слова: *мониторинг земель, земельные ресурсы, дистанционное зондирование, деградация земель.*

Key words: *land monitoring, land resources, remote sensing, land degradation*.

Введение. Республика Казахстан, обладая обширными земельными ресурсами, сталкивается с проблемами их устойчивого использования и охраны. Мониторинг земель поможет оптимизировать управление сельскохозяйственными угодьями, повысить их продуктивность и предотвратить деградацию почв, а также позволит вовремя выявить риски, связанные с опустыниванием, эрозией, загрязнением и деградацией земель.

Цель исследования: разработка предложений, направленных на организацию осуществления мониторинга земель.

Задачами являются:

- анализ нормативно-правовой базы и существующих систем и подходов мониторинга земель;
- разработка алгоритмов для сбора, обработки и визуализации данных о состоянии земель, включая методы анализа информации;
- выявление проблем в осуществлении мониторинга земель;
- разработка предложений по совершенствованию порядка осуществления мониторинга земель.

Весь земельный фонд Республики Казахстан, независимо от формы собственности, правового режима и срока использования, подлежит мониторингу. В процессе мониторинга решаются ключевые задачи, включая своевременное выявление и оценку изменений состояния земель, прогнозирование и предотвращение негативных последствий опасных тенденций. Кроме того, он обеспечивает необходимой информацией систему земельного кадастра, государственный контроль за использованием и охраной земель, а также другие функции государственного управления и землеустройства. Важной составляющей мониторинга является информирование граждан о текущем состоянии земельных ресурсов.

Материалы и методы исследования. В соответствии со статьей 159 Земельного Кодекса РК мониторинг земель представляет собой систему базовых (исходных), оперативных, периодических наблюдений за качественным и количественным состоянием земельного фонда, проводимых в целях своевременного выявления происходящих изменений, их оценки, прогноза дальнейшего развития и выработки рекомендаций по предупреждению и устранению последствий негативных процессов [10].

В Казахстане основными нормативно-методическими документами по осуществлению мониторинга земель являются:

- Приказ Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 26 мая 2016 года № 236 «Об утверждении Положения о Комитете по управлению земельными ресурсами Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан»
- «Методика по проведению мониторинга земель» (приказ Министра сельского хозяйства РК от 10 августа 2022 года № 250)

- «Правила ведения мониторинга земель и пользования его данными в РК» (Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 23 декабря 2014 года № 159)

- «Методические рекомендации по выявлению деградированных земель» (1997г.)

- «Методические указания по выявлению химически загрязненных в результате сельскохозяйственной деятельности земель РК» (1997г.).

При исследовании использовали такие методы как анализ нормативно-правовых актов; изучение данных отчетов и статистики; применение ГИС и ДДЗ; сравнительный анализ с международным опытом.

Система мониторинга земель в Казахстане организована по административно-зональному принципу и учитывает целевое назначение земельного фонда. Она включает три основных уровня наблюдений: республиканский, областной, а также уровень городов и районов. На каждом из этих уровней осуществляется контроль за различными категориями земель, среди которых особое внимание уделяется сельскохозяйственным угодьям, территориям населенных пунктов, землям промышленного и специального назначения, особо охраняемым природным территориям, лесному фонду и землям запаса.

Мониторинговая система дифференцируется по нескольким ключевым параметрам. По территориальному охвату различают глобальный, национальный, региональный и локальный мониторинг. По характеру наблюдений выделяют фоновый мониторинг, который проводится на заповедных территориях без антропогенного воздействия, и импактный мониторинг, фиксирующий изменения на землях, подверженных человеческому влиянию.




Рисунок 1 – Схема осуществления государственного мониторинга земель

Наблюдательные программы также классифицируются по временным характеристикам. Эволюционный мониторинг отслеживает долгосрочные исторические изменения, циклический - сезонные и годовые колебания, антропогенный - последствия хозяйственной деятельности, а чрезвычайный - последствия стихийных бедствий и аварийных ситуаций. По периодичности проведения различают основные, временные, оперативные и ретроспективные наблюдения.

Методологически мониторинг земель основывается на четырех основных подходах. Химический мониторинг анализирует состав атмосферы, водных ресурсов и почвенного покрова. Физический мониторинг изучает природные явления и их воздействие на земельные ресурсы. Биологический мониторинг использует живые организмы в качестве индикаторов экологического состояния. Дистанционный мониторинг, включающий

авиационные и космические методы наблюдения, позволяет получать оперативные данные с помощью специального радиометрического оборудования.

Такая многоуровневая система мониторинга обеспечивает комплексный контроль за состоянием земельных ресурсов страны, позволяя своевременно выявлять негативные изменения и принимать управленческие решения по рациональному землепользованию.

Мониторинг земель как инструмент информационной поддержки управления земельными ресурсами активно применяется не только в Казахстане, но и в других странах мира. Его развитие поспособствовало принятием «Стокгольмской декларации по окружающей среде», которая привлекла внимание к экологическим проблемам [3].

Результаты исследования. Однако существующие системы мониторинга, реализуемые в рамках международных и национальных программ, значительно отличаются друг от друга. Эти различия обусловлены спецификой природных условий, законодательства и приоритетов каждой страны.

В таблице 1 рассмотрим международный опыт среди некоторых стран по уровням управления, доступу к данным, частоте обновления, а также программ по борьбе с деградацией.

Таблица 1 - Сравнительная таблица систем мониторинга земель

Критерий	Казахстан	Германия	Швеция	Бельгия	США	Эстония
Уровни управления	3 (респ., обл., местн.)	4 (фед., земель., рег., мун.)	3 (нац., рег., местн.)	3 (фед., рег., местн.)	2 (фед., штаты)	2 (нац., местн.)
Доступ к данным	Ограниченный	Полный (BodenViewer)	Частичный (Markinfo)	Полный (Geopunt)	Условный (USGS)	Полная прозрачность
ГИС-платформы	QGIS, ArcGIS	*BodenViewer*, ATKIS	SwedSurvey	*Geopunt*	*USGS EarthExplorer*	полный доступ к e-Cadastre с историей изменений
Частота обновления	Сельхозземли - 1 раз в 2 года, промзоны - раз в 5 лет.	3–5 дней	Ежегодно раз в 3 года	Ежемесячно	Сплошной покосмический мониторинг (каждые 3–5 дней).	Еженедельно
Борьба с деградацией	«Жасыл Даму» (посадка саксаула)	Federal Soil Protection Act (-15% эрозии за 5 лет)	Swedish Erosion Control (-25% азотных потерь за 3 года)	Walloon Soil Decree (+20% органики в почве за 4 года)	Soil Health Initiative (фермерские гранты) +15% гумуса	Цифровизация кадастра (0 случаев незаконной вырубки)

Данная таблица позволяет сравнить подходы к мониторингу земель в шести странах. Анализ данных позволяет выделить ключевые тенденции и различия между национальными системами. Структура управления земельным мониторингом варьируется от двухуровневой системы в США и Эстонии до четырехуровневой в Германии. Казахстан, Швеция и Бельгия занимают промежуточное положение с тремя уровнями управления. Наибольшая прозрачность данных наблюдается в Эстонии, Германии и Бельгии, где граждане имеют полный доступ к информации через специализированные платформы. В то же время Казахстан и США демонстрируют более ограниченный подход к доступу данных. Меры по борьбе с деградацией земель демонстрируют разнообразие подходов. Германия и Швеция делают акцент на законодательном регулировании, США - на стимулировании фермеров, а Эстония достигла значительных результатов благодаря цифровизации.

Казахстанская программа «Жасыл Даму» сосредоточена на практических мерах по восстановлению земель.

Земельные ресурсы являются основой экономического и экологического благополучия любого государства. В условиях роста антропогенной нагрузки и климатических изменений особую актуальность приобретает система мониторинга земель, позволяющая: оперативно выявлять негативные изменения; прогнозировать развитие опасных процессов; разрабатывать меры по рациональному использованию земель. Проведенный анализ данных мониторинга позволил зафиксировать существенные изменения в структуре земельного фонда. Как видно из рисунка 1, сравнение показателей за 2022 и 2024 годы показывает динамику перераспределения площадей между различными категориями земель [6].




Рисунок 2 – Динамика структуры земельного фонда по категориям земель, %

Изменения площадей по категориям земель связаны с их переводом из одной категории в другую. Это обусловлено предоставлением участков для различных нужд, а также уточнением границ в ходе инвентаризации. Подробнее эти изменения рассмотрены при анализе отдельных категорий.

Для получения точных данных о процессах, влияющих на состояние земельных ресурсов, в Казахстане создается государственная территориально-зональная сеть мониторинга, включающая: стационарные пункты наблюдений (СПН) и полустационарные пункты наблюдений (ПСПН). Данный подход позволяет получать достоверную информацию о состоянии земель, обеспечивать сопоставимость данных по регионам, формировать единую базу для анализа и прогнозирования.

Вопрос организации мониторинга земель сохраняет свою актуальность, особенно в части экологического контроля их состояния. Однако следует отметить, что с 2006 года систематические наблюдения за землями населенных пунктов не проводились в связи с отсутствием необходимого финансирования.

Вместе с тем, начиная с 2022 года, был реализован важный шаг в совершенствовании системы мониторинга - все данные наблюдений за землями сельскохозяйственного назначения, включая полный комплекс химических показателей, были интегрированы в автоматизированную информационную систему государственного земельного кадастра. Особенностью данной системы является визуализация многолетних данных в формате наглядных диаграмм, что существенно облегчает анализ динамики изменений состояния земельных ресурсов [6].

В настоящее время на территории Республики Казахстан функционирует разветвленная сеть мониторинговых пунктов, включающая в общей сложности 1185 объектов наблюдения. В структуре этой сети представлены: стационарные пункты наблюдений (СПН) - 639 единиц, полустационарные пункты наблюдений (ППН) - 546 единиц. Детальное распределение указанных мониторинговых объектов по административным областям страны систематизировано и представлено в таблице 2.


Таблица 2 - Распределение мониторинговых объектов по административным областям

Наименование областей, городов республиканского значения	Существующие на 01.01.2023г.		Проведено повторных наблюдений в 2023 г.	
	СПН	ПСПН	СПН	ПСПН
Акмолинская	39	122	2	12
Актюбинская	40	23	6	-
Алматинская	-	22	-	2
Атырауская	1	22	-	-
В-Казахстанская	3	18	2	4
Жетысу	-	49	-	2
Жамбылская	14	23	-	-
З-Казахстанская	4	19	2	7
Карагандинская	6	51	2	7
Кызылординская	39	-	-	6
Костанайская	60	73	6	-
Мангистауская	-	-	-	-
Павлодарская	7	37	-	6
С-Казахстанская	14	55	2	4
Туркестанская	86	-	-	6
г. Алматы	200	-	-	-
г. Астана	120	-	-	-
Всего	639	546	24	60

Анализ активности наблюдений в 2024 году выявил существенные проблемы. Повторные исследования были проведены лишь на 84 пунктах (7% от общего количества), при этом: по СПН охвачено только 24 объекта (3,8%); по ПСПН - 60 объектов (11%). Наибольшая активность повторных наблюдений зафиксирована в Актюбинской и Костанайской областях (по 6 СПН), а также в Акмолинской (12 ППН), Карагандинской и Западно-Казахстанской (по 7 ППН) областях. В то же время в Алматинской, Атырауской, Жамбылской областях и городах республиканского значения повторные наблюдения на стационарных пунктах не проводились.

Деградация земель, включая засоление и эрозию почв, является одной из ключевых экологических проблем Казахстана. Эти процессы напрямую влияют на сельское хозяйство, биоразнообразие и устойчивость экосистем. В условиях изменения климата и антропогенной нагрузки мониторинг динамики деградации приобретает особую значимость. Для оценки динамики деградации земель на территории Казахстана в период с 2020 по 2024 год был проведен сравнительный анализ карт засоления и эродированности

почв. Использовались спутниковые снимки Landsat 8-9, доступные через платформу USGS EarthExplorer. На рисунках 3 и 4 представлено пространственное распределение засоленных и эродированных земель в 2020 и 2024 годах.



2020/06/10 2024/08/25

Рисунок 3 - Пространственное распределение засоленных и эродированных земель в 2020 г.




Рисунок 4 - Пространственное распределение засоленных и эродированных земель в 2024 г.

Площадь засоленных земель в окрестностях Аральского моря увеличилась на ~15–20% за период 2020–2024 годов. На снимках видно чёткие участки оголённых песков (светло-бежевые пятна) и радиальные следы выдувания вокруг растительных островков в районе озера Балхаш.

Заключение. Использование современных технологий, таких как дистанционное зондирование и ГИС, а также данные Комитета по управлению земельными ресурсами РК за 2020-2024 годы, позволило получить точные данные о состоянии земельных ресурсов. Выявлена площадь деградированных земель в РК составляет 180 млн га, при этом в Южно-Казахстанской области наблюдается увеличение площади опустынивания на 15% за последние 3-5 лет.

Несмотря на активное развитие технологий, мониторинг земель в Казахстане сталкивается с рядом проблем:

- недостаточная интеграция данных между государственными органами;
- ограниченные финансовые и технические ресурсы;
- необходимость совершенствования законодательной базы;
- недостаточная подготовка кадров в области геоинформационных технологий;
- слабая инфраструктура для хранения и обработки больших данных.

Рекомендации по совершенствованию мониторинга земель:

- увеличение финансирования и технического оснащения государственных органов, занимающихся мониторингом земель;

- совершенствование нормативно-правовой базы с учётом современных требований и международного опыта;

- развитие образовательных программ и повышение квалификации специалистов в области кадастра и ГИС;

- в целях эффективного отслеживания динамики состояния земель и оптимального размещения стационарных наблюдательных постов предлагается разработка Республиканской комплексной программы мониторинга земельных ресурсов.

Материалы мониторинга земель служат базой для актуализации сведений Государственного земельного кадастра, документов о качественных характеристиках земельных участков и корректирующих коэффициентов к базовым тарифам. Они также используются для контроля, охраны и выполнения других функций государственного регулирования земельными ресурсами [7].

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Сейфуллин Ж.Т. Земельный кадастр: автоматизированные технологии кадастровых работ : Учебное пособие. / Г.Ж. Сейтхамзина, Г.Н. Нюсупова; КазНУ им. аль-Фараби, Науч. б-ка.- Алматы: Б-ка и компьютер. центр КазНУ, 2011.

2. Республика Казахстан. Закон «Об оценочной деятельности в Республике Казахстан» от 30 ноября 2000 года.

3. Оценка недвижимости: учебное пособие для вузов / под ред. А.Г.Грязновой, М.А.Федотовой. - 2 изд. - М.: Финансы и статистика, 2008. - 560 с.

4. Оценка стоимости земельных участков: учебное пособие / под.ред. В.И. Петрова, М.А. Федотовой. – 2 изд., перераб. – М. : КНОРУС, 2008. – 224 с.

5. Современные проблемы землеустройства, кадастров и природообустройства: матлы Национал. науч. конф. / Краснояр. гос. аграр. ун-т. – Красноярск, 2019. – 331 с.

6. Сводный аналитический отчет о состоянии и использовании РК. Комитет по управлению земельными ресурсами. – Нурсултан, 2023

7. Спектр М.Д. Оценка использования земельных ресурсов. – Астана: Фолиант, 2016. – 300 с.

8. Концепция инвестиционной отраслевой программы развития орошаемого земледелия на 2018-2027 г.г. - Астана, 2018. – 35 с.

9. Статистические данные Республики Казахстан «Сельское, лесное и рыбное хозяйство Казахстана 2018-2020». Статистическое агентство Республики Казахстан.

10. Земельный кодекс Республики Казахстан: офиц.текст. - Алматы : Юрист, 2018. – 116 с.

11. Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) – Алматы, 2017. – 432 с.

12. Постановление Правительства Республики Казахстан от 22 августа 2003 года №890 «Об установлении базовых ставок платы за земельные участки при их предоставлении в частную собственность, при сдаче государством или государственными землепользователями в аренду, а также размера платы за продажу права аренды земельных участков» // Сборник нормативных актов. – Астана : Юрист, 2018. – С. 6-12.

13. Постановление Правительства РК от 10.12.2011г. № 1511 «Об утверждении Порядка купли-продажи находящихся в государственной собственности земельных участков или права постоянного землепользовании. Государственный (национальный) доклад о состоянии. - 2011

14. Оценка недвижимости: учеб. / под ред. А. Г.Грязновой, М. А. Федотовой. - М. : Финансы и статистика, 2007. - 496 с.

15. Варламов, А.А. Земельный кадастр: Т.2. Управление земельными ресурсами. Учебники и учебные пособия для студентов высш.учебных заведений/ А.А. Варламов, С.А. Гальченко [Текст]. - М.: Колос, 2014

16. Спектр, М.Д. Земельная реформа и стратегия развития аула (села) и сельской местности / М.Д. Спектр // Земельные ресурсы Казахстана. –2012. – №2. – С. 20-23.

17. Система ведения сельского хозяйства Западно-Казахстанской области. – Уральск, 2004. – 276 с.

18. «Отчет о наличии земель и распределении их по категориям, собственникам земельных участков, землепользователям и угодьям». - Уральск, 2023-2021.

19. Интернет-ресурс: http://www.stat.gov.kz

20. Интернет-ресурс: http://www.inform.kz/ru

REFERENCES

1. Seifullin, J.T. Zemelnyi kadastr: avtomatizirovannye tehnologii kadastrovyh rabot : Uchebnoe posobie. / G.J. Seithamzina, G.N. Nsupova; KazNU im. al-Farabi, Nauch. b-ka.- Almaty: B-ka i kompter. sentr KazNU, 2011.

2. Respublika Kazahstan. Zakon «Ob osenochnoi deяtelnosti v Respublike Kazahstan» ot 30 noяbrя 2000 goda.

3. Osenka nedvijimosti: uchebnoe posobie dlя vuzov / pod red. A.G.Grяznovoi, M.A.Fedotovoi. - 2 izd. - M.: Finansy i statistika, 2008. - 560 s.

4. Osenka stoimosti zemelnyh uchastkov: uchebnoe posobie / pod.red. V.İ. Petrova, M.A. Fedotovoi. – 2 izd., pererab. – M. : KNORUS, 2008. – 224 s.

5. Sovremennye problemy zemleustroistva, kadastrov i prirodoobustroistva: mat-ly Nasional. nauch. konf. / Krasnoяr. gos. agrar. un-t. – Krasnoяrsk, 2019. – 331 s.

6. Svodnyi analiticheskii otchet o sostoяnii i ispolzovanii RK za 2019-2020 gody. Komitet po upravleni zemelnymi resursami. – Nursultan, 2020

7. Spektr M.D. Osenka ispolzovanія zemelnyh resursov. – Astana: Foliant, 2016. – 300 s.

8. Konsepsія investisionnoi otraslevoi programmy razvitія oroşaemogo zemledelія na 2018-2027 g.g. - Astana, 2018. – 35 s.

9. Statisticheskie dannye Respubliki Kazahstan «Selskoe, lesnoe i rybnoe hozяistvo Kazahstana 2018-2020». Statisticheskoe agentstvo Respubliki Kazahstan.

10. Zemelnyi kodeks Respubliki Kazahstan: ofis. tekst. - Almaty : rist, 2018. – 116 s.

11. Kodeks Respubliki Kazahstan «O nalogah i drugih obяzatelnyh platejah v bdjet» (Nalogovyi kodeks) – Almaty, 2017. – 432 s.

12. Postanovlenie Pravitelstva Respubliki Kazahstan ot 22 avgusta 2003 goda №890 «Ob ustanovlenii bazovyh stavok platy za zemelnye uchastki pri ih predostavlenii v chastnu sobstvennost, pri sdache gosudarstvom ili gosudarstvennymi zemlepolzovatelяmi v arendu, a takje razmera platy za prodaju prava arendy zemelnyh uchastkov» // Sbornik normativnyh aktov. – Astana : rist, 2018. – S. 6-12.

13. Postanovlenie Pravitelstva RK ot 10.12.2011g. № 1511 «Ob utverjdenii Porядka kupli-prodaji nahodяihsя v gosudarstvennoi sobstvennosti zemelnyh uchastkov ili prava postoяnnogo zemlepolzovanii. Gosudarstvennyi (nasionalnyi) doklad o sostoяnii

14. Osenka nedvijimosti: ucheb. / pod red. A. G.Grяznovoi, M. A. Fedotovoi. - M. : Finansy i statistika, 2007. - 496 s.

15. Varlamov, A.A. Zemelnyi kadastr: T.2. Upravlenie zemelnymi resursami. Uchebniki i uchebnye posobія dlя studentov vysş.uchebnyh zavedenii/ A.A. Varlamov, S.A. Galchenko [Tekst]. - M.: Kolos, 2014

16. Spektr, M.D. Zemelnaя reforma i strategiя razvitія aula (sela) i selskoi mestnosti / M.D. Spektr // Zemelnye resursy Kazahstana. –2012. – №2. – S. 20-23.

17. Sistema vedenія selskogo hozяistva Zapadno-Kazahstanskoi oblasti. – Uralsk, 2004. – 276 s.

18. «Otchet o nalichii zemel i raspredelenii ih po kategoriям, sobstvennikam zemelnyh uchastkov, zemlepolzovatelям i ugodям». - Uralsk, 2019-2021.

19. İnternet-resurs: http://www.stat.gov.kz

20. İnternet-resurs: http://www.ınform.kz/ru

ТҮЙІН

Мақалада Қазақстан Республикасында жер мониторингін ұйымдастыру ерекшеліктері қарастырылған. Зерттеу жер ресурстарын бақылау үшін қолданылатын нормативтік-құқықтық базаны, әдістер мен технологияларды талдауға бағытталған. Қазіргі экологиялық және экономикалық өзгерістер жағдайында мониторинг жүйесін дамыту мәселелері мен перспективаларына басты назар аударылады. Жүргізілген талдау негізінде Қазақстан Республикасында жер мониторингі жүйесін жетілдіру бойынша ұсынымдар ұсынылды. Жер мониторингі жер ресурстарын басқарудың олардың жай-күйін бағалауға, өзгерістерді анықтауға және ықтимал тәуекелдерді болжауға мүмкіндік беретін маңызды құралы болып табылады. Антропогендік жүктеме мен климаттың өзгеруі жағдайында жер мониторингінің өзектілігі артып келеді. Жер-ауыл шаруашылығы, өнеркәсіп және урбанизация үшін негізгі ресурс. Жер ресурстарын тиімді басқару Қазақстан экономикасына, әсіресе агроөнеркәсіптік кешеннің өсуі және азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету қажеттілігі жағдайында тікелей әсер етеді. Топырақтың деградациясы (шөлейттену, тұздану, эрозия), жердің ластануы және климаттың өзгеруінің салдары экологиялық дағдарыстардың алдын алу үшін жүйелі бақылауды қажет етеді. Тиімді мониторинг ауыл шаруашылығы алқаптарын басқаруды оңтайландыруға, олардың өнімділігін арттыруға және жердің ластануы мен тозуына байланысты экологиялық тәуекелдердің алдын алуға мүмкіндік береді.

ӘОЖ 338.436.34
МРНТИ 68.29.01. 68.29.08

Асетова А.Ю., а.ш.ғ. магистрі, https://orcid.org/0000-0003-4725-9565
Жәңгір хан атындағы БҚАТУ, Орал қ., Қазақстан Республикасы, Жәңгір хан көшесі, 51
Asetova A.Yu., master of agriculture, https://orcid.org/0000-0003-4725-9565
Zhangir Khan Kazakh State Agricultural Technical University, Uralsk, Republic of Kazakhstan, Zhangir Khan Street, 51

АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫ ЖЕРЛЕРІНІҢ АЙМАҚТАР БОЙЫНША БӨЛІНУІН ТАЛДАУ ЖӘНЕ БАҒАЛАУ
ANALYSIS AND ASSESSMENT OF THE DISTRIBUTION OF AGRICULTURAL LAND BY REGION

АННОТАЦИЯ

Мақалада еліміздің жер қоры, оның жер санаттары бойынша бөлінуі, жер учаскелері мен меншік нысандары, жер учаскелерінің сандық және сапалық жағдайындағы өзгерістер туралы негізгі мәліметтер келтірілген. Жер ресурстарын басқаруды, мемлекеттік жер кадастрын және оның автоматтандырылған ақпараттық жүйесін жүргізуді, жер мониторингін және жерге орналастыру, түсіру, топографиялық-геодезиялық, картографиялық, жерді бағалау және басқа да жұмыстарды орындау. Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шекарасын демаркациялау бойынша қабылданған шаралар. Жерге орналастыруды құқықтық қамтамасыз ету және жер қатынастарын реттеу, жерге орналастыру, жер кадастры, геодезия және картография саласындағы халықаралық ынтымақтастық мәселелері қарастырылады. Тиімділікті арттырудың негізгі бағыттары белгіленді Республиканың жер қорын пайдалану мен қорғау, жер ресурстарын басқаруды жетілдіру. Жер ресурстарын басқаруды қамтамасыз ету, мемлекеттік жер кадастрын және оның автоматтандырылған ақпараттық жүйесін жүргізу, жер мониторингі мен жерге орналастыру, іздестіру, топографиялық-геодезиялық, картографиялық, жерді бағалау және басқа да жұмыстарды орындау жөніндегі іс-шаралар қамтылған.

Жерге орналастыруды құқықтық қамтамасыз ету, жер қатынастарын реттеу, жерге орналастыру, жер кадастры, геодезия және картография саласындағы халықаралық ынтымақтастық мәселелері қарастырылған. Республиканың жер қорын пайдалану мен қорғау тиімділігін арттырудың және жер ресурстарын басқаруды жетілдірудің негізгі бағыттары белгіленді. Осы материалдар мен ақпаратты мемлекеттік органдар, республикалық және облыстық басқармалар мемлекеттік жер саясаты мәселелерін шешу кезінде, жерді пайдалану мен қорғау жөніндегі ұйымдар пайдалана алады. Жергілікті атқарушы органдарға, мүдделі заңды және жеке тұлғаларға жерлерді жақсарту, топырақ құнарлығын арттыру және ландшафттың тұрақтылығын сақтау бойынша шаралар кешенін әзірлеуде ақпараттық көмек көрсете алады.

ANNOTATION

The article provides basic information on the country's land fund, its distribution by land categories, land plots and forms of ownership, changes in the quantitative and qualitative condition of land plots. Land resources management, maintaining the state land cadastre and its automated information system, land monitoring and land management, surveying, topographic and geodetic, cartographic, land assessment and other works. Measures taken to demarcate the State Border of the Republic of Kazakhstan. Issues of legal support for land management and regulation of land relations, international cooperation in the field of land management, land cadastre, geodesy and cartography are considered. The main directions of increasing the efficiency of the use and protection of the land fund of the Republic, improving land resource management are identified. Measures are included to ensure land resource management, maintaining the state land cadastre and its automated information system, land monitoring and land management, surveying, topographic and geodetic, cartographic, land assessment and other works.

The issues of legal support for land management, regulation of land relations, international cooperation in the field of land management, land cadastre, geodesy and cartography are considered. The main directions of increasing the efficiency of the use and protection of the land fund of the republic and improving land resource management are identified. These materials and information can be used by state bodies, republican and regional departments when solving issues of state land policy, organizations for land use and protection. They can provide information assistance to local executive bodies, interested legal entities and individuals in developing a set of measures to improve land, increase soil fertility and maintain landscape stability.

Кілт сөздер: *жерді есепке алу, облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың жер балансы, жер қатынастары, жер кадастры және жер мониторингі деректері, мемлекеттік жүргізу нәтижелері, жерді пайдалану мен қорғауды бақылау заңнама*.

Keywords: *land accounting, land balance of regions, cities of republican significance, land relations, land cadastre and land monitoring data, results of state management, legislation on control over land use and protection*.

Кіріспе. Қазақстан Республикасының Конституциясында жер және оның қойнауы, өсімдіктер мен жануарлар дүниесі, басқа да табиғи ресурстар мемлекеттік меншік болып табылады деп көрсетілген. Жер заңда белгіленген негіздер, шарттар және шектерде жеке меншікте де болуы мүмкін.

Жер учаскелерін жеке меншікке берудің негіздері, шарттары мен шектері Қазақстан Республикасының Жер кодексінде белгіленеді. Кодекстің 23-бабына сәйкес Қазақстан Республикасы азаматтарының жеке меншігінде шаруа немесе фермер қожалығын жүргізуге, жеке қосалқы шаруашылықты жүргізуге, орман өсіруге, бау-бақша өсіруге, жеке тұрғын үй және саяжай құрылысына арналған жер учаскелері, сондай-ақ игерілуге берілген немесе өндірістік және өндірістік емес, оның ішінде тұрғын үйлер, құрылыстар (құрылыстар) мен олардың кешендері, оның ішінде қызмет көрсетуге арналған құрылыстар, құрылыстар, құрылыстар салуға арналған жер учаскелері болуы мүмкін. (құрылымдар,

құрылыстар) олардың мақсатына сәйкес. Қазақстан Республикасының мемлекеттік емес заңды тұлғаларының жеке меншігінде тауарлы ауыл шаруашылығы өндірісіне, орман өсіруге, игеруге немесе игерілетін өндірістік және өндірістік емес жер учаскелері, оның ішінде тұрғын үйлер, ғимараттар (құрылыстар) және олардың кешені, оның ішінде нысаналы мақсатына сәйкес оларды ұстауға арналған жер учаскелері болуы мүмкін.

Зерттеу материалдары мен әдістері. Тауарлы ауыл шаруашылығы өндірісін және орман өсіруді қоспағанда, аталған мақсаттар үшін жер учаскелері шетел азаматтарының, азаматтығы жоқ адамдардың және шетелдік мемлекеттік емес заңды тұлғалардың жеке меншігінде болуы мүмкін. Аталған мақсаттарға арналған жер учаскелері азаматтарға және мемлекеттік емес заңды тұлғаларға ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерлердің, елді мекендердің жерлерінің, өнеркәсіп, көлік, байланыс және ауыл шаруашылығына жатпайтын өзге де мақсаттағы жерлердің арасынан жеке меншікке беріледі.

Нәтижелер мен талқылаулар. Мемлекеттік меншікке мемлекеттік органдарға, мемлекеттік ұйымдар мен мекемелерге барлық санаттағы жерлердің ішінен берілген жер учаскелері де жатады; елді мекендердің жерлерінде ортақ пайдалануға; ауылдар мен ауылдық елді мекендердің жанындағы жайылымдық және шабындық жерлер; босалқы жерлер (арнайы жер қорларын қоса алғанда), сондай-ақ орман және су қоры жерлері. 2023 жылғы 1 қарашадағы жер балансы және басқа да жер есепке алу деректері бойынша әр түрлі санаттағы 2 678,3 мың га жер азаматтар мен мемлекеттік емес заңды тұлғалардың жеке меншігінде. Жер ресурстарының негізгі бағыттары мемлекеттік меншікте шоғырланған. Меншік түрлері бойынша жер ресурстарын жер санаттары бойынша бөлу 1-кестеде көрсетілген.

Кесте 1 - 2025 жылғы 1 қарашадағы жағдай бойынша жерді меншік түрлері бойынша жер санаттары бойынша бөлу, мың. га

№	Жер санаттары мемлекеттік	Ауданы, барлығы	Жеке меншігінде	Мемлекет меншігінде
1	Ауыл шаруашылығы жерлері	116 447.8	1 525.4	114 922.4
2	Елді мекендердің жерлері	25 038.8	1052.7	23 986.1
3	Өнеркәсіпке, көлікке, байланысқа, қорғанысқа және басқа да ауыл шаруашылығына жатпайтын жерлер	2 436.3	99.7	2 336.6
4	Ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың жерлері, сауықтыру, рекреациялық және тарихи-мәдени мақсаттағы жерлер	8 154.6	0.5	8 154.1
5	Орман қоры жерлері	22 979.9		22 979.9
6	Су қоры жерлері	3 907.8		3 907.8
7	Қорық жерлер	83 965.6		83 965.6
	Жалпы жер	262 930.8	2 678.3	260 252.5

Жеке меншіктегі жерлердің жалпы көлемінің ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерлерге – 57,0%, елді мекендердің жерлері – 39,28%, өнеркәсіп, көлік, коммуникация және басқа да ауыл шаруашылығы емес мақсаттағы жерлер – 3,7%, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар жерлері, сауықтыру, рекреациялық және тарихи-мәдени мақсаттағы жерлер – 0,02% келеді [1].

Жергілікті атқарушы органдар жүргізген ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерлерге және өнеркәсіптік, көліктік, коммуникациялық және басқа да ауыл шаруашылығына арналмаған жерлерге жүргізілген аудит нәтижесінде есепті жылы жалпы республика бойынша жеке меншіктегі жер көлемі 155,2 мың гектарға қысқарды. Мәселен, ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерлер 98,8 мың гектарға ұлғайып, өнеркәсіп, көлік, байланыс және басқа да ауыл шаруашылығына арналмаған жерлер 16,1 мың гектарға азайып, ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың жерлері өзгеріссіз қалды. Мемлекеттік жер пайдаланушылардың тұрақты жер пайдалану құқығында жер учаскелері болады. Мемлекеттік емес жер пайдаланушыларға жер учаскелері уақытша жер пайдалану құқығы негізінде, ең алдымен, уақытша өтеулі жер пайдалану құқығы негізінде, яғни жалдау құқығы негізінде беріледі [2-3].

Барлығы 2023 жылғы 1 қарашадағы жер балансы бойынша республикада 2954,5 мың жер учаскесінің меншік иесі бар, оның ішінде елді мекендердегі жер учаскелерінің 39,3 пайызы азаматтардың меншігінде. Азаматтар мен мемлекеттік емес заңды тұлғалардың меншігіндегі ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерлердің 1525,4 мың га, бұл осы санаттағы жерлердің 1,3% ғана; шаруа қожалықтары мен мемлекеттік емес жер пайдаланушылардың уақытша жер пайдалануында – 114 374,4 мың га (98,2%), мемлекеттік заңды тұлғалардың тұрақты жер пайдалануында – 548,0 мың га (0,5%).


Өнеркәсіп, көлік, байланыс, ғарышты игеру, қорғаныс, ұлттық қауіпсіздік және ауыл шаруашылығына жатпайтын өзге де мақсаттағы жерлер санатында 99,7 мың га (4,1 %), мемлекеттік емес заңды тұлғалардың уақытша жер пайдалануындағы 1 388,3 мың га (57,0 %), заңды түрде 948 3 %-ы (38 %) мемлекеттік жер пайдалануда. субъектілері. Жеке жер қорының құрамына кіретін жер учаскелерінің негізгі учаскелері нысаналы мақсаты бойынша мыналар үшін пайдаланылады:

шаруа және фермер қожалықтары – 43,4%
тауарлы ауыл шаруашылығы өнімі – 16,4%
бау-бақша және саяжай құрылысы – 0,9%
жеке қосалқы шаруашылық – 12,3%
жеке тұрғын үй құрылысы – 9,4%
елді мекендердегі басқа, негізінен кәсіпкерлік мақсаттар үшін – 13,9%
өнеркәсіптік және өзге де мақсаттар үшін өнеркәсіп, көлік, байланыс және
ауыл шаруашылығына жатпайтын басқа да мақсаттар – 3,7%

2025 жылғы 1 қарашадағы жағдай бойынша республиканың ауыл шаруашылығы саласына 218 653 шаруа және фермер қожалықтары кіреді, оларға 73,8 млн. 36,6 млн га (31,8%) аумақта. Мемлекеттік ауыл шаруашылығы кәсіпорындары 1-суретте көрсетілгендей 0,5 млн га немесе ауыл шаруашылығы жерлерінің 0,5% алып жатыр [4,5,6].

Республиканың ауыл шаруашылығында жүргізілген реформалардың нәтижесінде қазіргі уақытта ауыл шаруашылығы саласын басқарудың негізгі нысаны ауыл шаруашылығы жерлерінің жартысынан астамын пайдаланатын шаруа немесе фермер қожалықтары болып табылады. Есепті жылы республикада шаруа және фермер қожалықтарының саны 882 шаруашылыққа, шаруашылық серіктестіктері мен акционерлік қоғамдарының саны 276-ға, ауыл шаруашылығы өндірістік кооперативтері 31 шаруашылық жүргізуші субъектілерге өсті. Агроқұрылымдар санының өзгеруі мыналарға байланысты: жаңа шаруашылық субъектілері ұйымдастырылды; агроқұрылымдар ыдырап немесе басқарудың жаңа формаларына айналды; шаруашылық жүргізуден бас тартты. Айта кету

керек, Республикада аграрлық секторда шаруашылық жүргізуші субъектілердің қалыптасу процесі жалғасуда.



Сурет 1 - 2023 жылғы 1 қарашадағы жағдай бойынша Агроөнеркәсіптік кешендегі шаруашылық жүргізу нысандары бойынша жерді бөлу (ауданды бөлу %)

Жаңа шаруашылық жүргізуші субъектілердің құрылуымен қатар бұрын құрылғандардың ыдырауы мен қайта құрылуы жүреді. Шаруа, фермерлік және шаруашылық жүргізудің басқа да нысандарын ұйымдастыру үшін көп мөлшерде ұсақ жер телімдерін 182 бере отырып, жер реформасы кезінде жүргізілген ірі жер пайдалануды реформалау процесі жерге нақты меншік иесін құруда оң функцияны атқара отырып, ауыл шаруашылығы өндірісінің тиімділігі деңгейіне, жерді қорғауды және қорғауды ұйымдастыру шараларын іске асыруға теріс әсер ететін бірқатар кемшіліктерді анықтады. Соның салдарынан кейбір кәсіпкерлік субъектілері өздерінің кәсіпкерлік қызметін жүзеге асыра алмай отыр.

Кесте 2 - Батыс өңірінің облыс орталықтары мен қалаларында жер учаскелері үшін төлемақының базалық мөлшерлемелері

№	Қала	Базалық мөлшері	Жылдары	Негізі
1	Актобе	1287	2013	Бірлескен Ақтөбе облысы мәслихатының 2011 жылғы 12 қазандағы № 415 шешімі және Ақтөбе облысы әкімдігінің 2011 жылғы 12 қазандағы № 328 қаулысы.
2	Атырау	2240	2015	Атырау облысы әкімдігінің 2012 жылғы 23 қаңтардағы № 10а қаулысы және Атырау облыстық мәслихатының 2012 жылғы 25 қаңтардағы № 11 V шешімі.
3	Уральск	1560	2013	Батыс Қазақстан облысы әкімдігінің 2013 жылғы 11 наурыздағы №31 қаулысы және Батыс Қазақстан облыстық мәслихатының 2013 жылғы 28 наурыздағы № 7-4 шешімі.

Көрсетілген кестелерде көрсетілген елді мекендер үшін жер учаскелері үшін төлемақының базалық мөлшерлемелерін мемлекеттік жер кадастрын жүргізетін ұйым және оның филиалдары жер және өзге де жылжымайтын мүлік нарығындағы мәмілелер туралы ақпаратты пайдалана отырып, кешенді салыстырмалы тәсілдеме негізінде әзірледі. Бағалау процесінде рента құраушы факторларға талдау жүргізілді, оның ішінде жер учаскелерінің

сапасы мен орналасуы, аумақтың әлеуметтік даму деңгейі мен инженерлік-көліктік қамтамасыз етілуі [10]. Алғашқы жер нарығы қамтамасыз ету бойынша мәмілелерді қамтиды мемлекеттік меншіктен жеке меншікке дейінгі жер учаскелері біржолғы сату арқылы өтеу негізінде, немесе бөліп төлеу, сондай-ақ өтеулі негізде жер пайдалану құқығын сату (жалдау құқығын сату ауыл шаруашылығына арналмаған жер учаскесі).

Қорытынды. Ауыл шаруашылығы мақсатындағы жер учаскелері ауыл шаруашылығы саласында, елді мекендердің жерлерінде, өнеркәсіпте және ауыл шаруашылығына жатпайтын өзге де мақсаттарда пайдалануға ақылы негізде жеке меншікке беріледі, іскерлік және басқа мақсаттарға арналған. Республика азаматтарына жеке қосалқы шаруашылығы, жеке тұрғын үй және саяжай құрылысы, бау-бақша шаруашылығын дамыту үшін жер учаскелері беріледі. Қазақстан жер заңнамасында белгіленген нормалар шегінде тегін. Сонымен қатар, тегін берудің белгіленген нормаларынан басқа, жер жоғарыда аталған мақсаттарға арналған учаскелер ақылы негізде беріледі.

ӘДЕБИТТЕР ТІЗІМІ

1. Ахмеденов К.М. Состояние и значение лесонасаждений в аридных условиях Западно Казахстанской области Республики Казахстан. / К.М. Ахмеденов// Труды университета. - Караганда, 2018, №1. - С. 55-59.

2. Ахмеденов К.М. Оценка состояния древесно-кустарниковой растительности степной зоны Западно-Казахстанской области. / Ахмеденов К.М., Ажахова К.Е. //Ғылым және білім. - 2018. - №2 (51). - С.126-135.

3. Ахмеденов К.М. Современное состояние земельных ресурсов Западно-Казахстанской области (в пределах Волго-Уральского междуречья) / К.М. Ахмеденов //Вестник Казахского национального технического университета имени К.И.Сатпаева, №2 (78). - 2010.- с.3-8.

4. Асетова А.Ю. Некоторые вопросы обеспечения рационального использования земель сельскохозяйственного назначения. / А.Ю.Асетова// Международная научно-практическая конференция г.Тамбов Россия 2017.-С.38-46.

5. Асетова А.Ю. Батыс Қазақстан облысының жер ресурстарының қҧрылымын жетілдірудің кейбір мәселелері // Ғылым және білім – 2020-№ 4-2 (61) - С.141-146.

6. Асетова А.Ю. Особенности рационального использования сельскохозяйственных угодий области. /А.Ю. Асетова// Актуальные проблемы землеустройства и кадастров на современном этапе: материалы VIII Международной научно-практической конференции Пензенский государственный университет архитектуры и строительства, 2021.-с.147-154.

7. Корякина О.В., Кучеров В.С. Анализ современного состояния и эффективности развития сельского хозяйства в условиях рынка (на примере Западно-Казахстанской области). Аналитическая справка, Уральск, 2009.-43 с.

8. Есмагулова Б.Ж. Дистанционный мониторинг земель Западного Казахстана/ Есмагулова Б.Ж., Кошелева О.Ю., Мушаева К.Б.// - ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский агролесомелиоративный институт» г. Волгоград 2016.-с.60-69.

9. Курманова Г.К. Внутрихозяйственное землеустройство землепользований сельскохозяйственных субъектов. / Г.К. Курманова // Проблемы агрорынка. 2021; (1):132-137. 116 ISSN 2305-9397. Ғылым және білім. 2021. №4 (65)

10. Крыкбаев Ж.К. Историческая ретроспектива и современные проблемы распространения земельной собственности в Казахстане / Крыкбаев Ж.К., Джаманкулова Б. Г. //Земельные и водные ресурсы: мониторинг эколого-экономического состояния и модели управления Улан-Удэ, 2015. 34-37С.

11. Онаев М.К. Земельная реформа и вопросы рационального использования орошаемых земель в Актюбинской области / Онаев М.К, Ермуханова Ж.А.// Известия Оренбургского государственного аграрного университета, 2015, №1 (51) С.52-54.

12. Оңаев М.Қ. Батыс Қазақстан облысы жағдайында жайылымдық алқаптарды суландыру мәселесі / Оңаев М.Қ., Ожанов Г.С., Денизбаев С.Е., Шадьяров Т.М. // Ғылым және білім. 2020. - №2-2. – С. 54-61.

13. Онаев М.К., Туктаров Р.Б., Денизбаев С.Е. Качественная оценка естественного травостоя лимана при помощи NDVI / М.К. Онаев, Р.Б. Туктаров, С.Е. Денизбаев // Международные научные исследования. – М., 2017. – №2 (31). – С. 160-163.

14. Оңаев М.Қ. Обводнение пастбищ – залог развития отгонного животноводства / Оңаев М.Қ., Денизбаев С.Е., Ожанов Г.С., Шадьяров Т.М. //Ғылым және білім. 2020. - №4-2. – С. 111-118.

15. Казахстан. Пастбищные угодья в переходный период: ресурсы, пользователи и рациональное использование. - [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.fao.org/3/a x6156r.pdf.

REFERENCES

1. Ahmedenov K.M. Sostoyanie i znachenie lesonasazhdenij v aridnyh usloviyah Zapadno Kazahstanskoj oblasti Respubliki Kazahstan. / K.M. Ahmedenov// Trudy universiteta.- Karaganda, 2018, №1. - S. 55-59.

2. Ahmedenov K.M. Ocenka sostoyaniya rek Zapadno-Kazahstanskoj oblasti / Ahmedenov K.M., Sergaliev N.H., Abisheva S.H., Aksakova K.S.. // Stepi Severnoj Evrazii: materialy VIII mezhdunarodnogo simpoziuma pod nauchnoj redakciej akademika RAN A.A. CHibilyova. – Orenburg: IS UrO RAN, 2018. – S.872-875

3. Ahmedenov K.M. Sovremennoe sostoyanie zemel'nyh resursov Zapadno-Kazahstanskoj oblasti (v predelah Volgo-Ural'skogo mezhdurech'ya) / K.M. Ahmedenov //Vestnik Kazahskogo nacional'nogo tekhnicheskogo universiteta imeni K.I. Satpaeva, №2 (78). - 2010.- s.3-8.

4. Asetova A.YU. Nekotorye voprosy obespecheniya racional'nogo ispol'zovaniya zemel' sel'skohozyajstvennogo naznacheniya. / A.YU.Asetova// Mezhdunarodnaya nauchno-prakticheskaya konferenciya g.Tambov Rossiya 2017.-S.38-46.

5. Asetova A.YU. Batys Қazaқstan oblysynyң zher resurstarynyң құrylymyn zhetildirudiң kejbir məseleleri // Ғylym zhəne bilim – 2020-№ 4-2 (61) - S.141-146.

6. Asetova A.YU. Osobennosti racional'nogo ispol'zovaniya sel'skohozyajstvennyh ugodij Zapadno-Kazahstanskoj oblasti. /A.YU. Asetova// Aktual'nye problemy zemleustrojstva i kadastrov na sovremennom etape: materialy VIII Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferencii Penzenskij gosudarstvennyj universitet arhitektury i stroitel'stva, 2021.-s.147-154.

7. Koryakina O.V., Kucherov V.S. Analiz sovremennogo sostoyaniya i effektivnosti razvitiya sel'skogo hozyajstva v usloviyah rynka (na primere Zapadno-Kazahstanskoj oblasti). Analiticheskaya spravka, Ural'sk, 2009.-43 s.

8. Esmagulova B.ZH. Distancionnyj monitoring zemel' Zapadnogo Kazahstana/ Esmagulova B.ZH., Kosheleva O.YU., Mushaeva K.B.// - FGBNU «Vserossijskij nauchno-issledovatel'skij agrolesomeliorativnyj institut» g. Volgograd 2016.-s.60-69.

9. Kurmanova G.K. Vnutrihozyajstvennoe zemleustrojstvo zemlepolzovanıe selskohozáıstvennyh sýbektov. / G.K. Kurmanova // Problemy agrorynka. 2021;(1):132-137.

10. Krykbaev ZH.K. Istoricheskaya retrospektiva i sovremennye problemy rasprostraneniya zemel'noj sobstvennosti v Kazahstane / Krykbaev ZH.K., Dzhamankulova B. G. //Zemel'nye i vodnye resursy: monitoring ekologo-ekonomicheskogo sostoyaniya i modeli upravleniya Ulan-Ude, 2015. 34-37S.

11. Onaev M.K. Zemel'naya reforma i voprosy racional'nogo ispol'zovaniya oroshaemyh zemel' v Aktyubinskoj oblasti / Onaev M.K, Ermuhanova ZH.A.// Izvestiya Orenburgskogo gosudarstvennogo agrarnogo universiteta, 2015, №1 (51) S.52-54.

12. Oңaev M.Қ. Batys Қazaқstan oblysy zhaғdajynda zhajylymdyқ alқaptardy sulandyru məselesi / Oңaev M.Қ., Ozhanov G.S., Denizbaev S.E., SHad'yarov T.M. // Ғylym zhəne bilim. 2020. - №2-2. – S. 54-61.

13. Onaev M.K., Tuktarov R.B., Denizbaev S.E. Kachestvennaya ocenka estestvennogo travostoya limana pri pomoshchi NDVI / M.K. Onaev, R.B. Tuktarov, S.E. Denizbaev// Mezhdunarodnye nauchnye issledovaniya. – M., 2017. – №2 (31). – S. 160-163.
14. Oңaev M.Қ. Obvodnenie pastbishch – zalog razvitiya otgonnogo zhivotnovodstva / Oңaev M.Қ., Denizbaev S.E., Ozhanov G.S., SHad'yarov T.M. //Ғylym zhəne bilim. 2020. - №4-2. – S. 111-118.
15. Qazaqstan. Ótpeli kezeńdegi jaıylymdyq jerler: resýrstar ,paıdalanýshylar jáne utymdy paıdalaný [Kazakhstan. Pasture lands in transition. http://www.fao.org/3/a x6156r.pdf.

РЕЗЮМЕ

В статье приведены основные сведения о земельном фонде страны, его распределении по категориям земель, земельным участкам и формам собственности, а также об изменении количественного и качественного состояния земельных участков. Управление земельными ресурсами, ведение государственного земельного кадастра и его автоматизированной информационной системы, мониторинг земель и землеустройство, геодезические, топографо-геодезические, картографические, землеустроительные и другие работы. Мероприятия по демаркации Государственной границы Республики Казахстан. Будут рассмотрены вопросы правового обеспечения землеустройства и регулирования земельных отношений, международного сотрудничества в области землеустройства, земельного кадастра, геодезии и картографии. Определены основные направления повышения эффективности: улучшение использования и охраны земельных ресурсов Республики, совершенствование управления земельными ресурсами.

УДК 639.31
МРНТИ 68.39.13

Абдуллаева Лала Рашидовна PhD, доцент. https://orcid.org/0000-0002-6122-1603
Гянджинский государственный университет, г. Гянджа, Самухское рыбоводческое хозяйство, Республика Азербайджан, lala.abdullayeva.2015@mail.ru
Abdullayeva Lala Rashidovna PhD, https://orcid.org/0000-0002-6122-1603
Ganja State University, Ganja, Samukh fish farm, Republic of Azerbaijan, lala.abdullayeva.2015@mail.ru

ИСКУССТВЕННОЕ ВЫРЫЩИВАНИЕ НЕКОТОРЫХ ВИДОВ ОСЕТРОВЫХ РЫБ В УСЛОВИЯХ АЗЕРБАЙДЖАНА
ARTIFICIAL CULTIVATION OF SOME SPECIES OF STURGEON FISH IN AZERBAIJAN

АННОТАЦИЯ

В Азербайджане последние годы интенсивно развивается аквакультура, функционируют множество частных рыбоводных хозяйств. Здесь в основном выращиваются ценные промысловые рыбы, а также формируются маточные и репродуктивные стада многих ценных промысловых видов рыб. Из этих рыб выращивание осетровых занимает важное место в стране. В современных экологических условиях, считается очень важным поддержание численности осетровых рыб на стабильном уровне и сохранение генофонда. Наряду с проводимыми мероприятиями в стране по формированию репродуктивных стад, а также усилению охраны этих рыб, ограничению промысловой нагрузки и др., в сохранении популяционного генофонда важную роль играет искусственное выращивание осетровых рыб. Многие виды осетровых рыб при искуственных скрещиваниях обладают высокой способностью к образованию гибридов. Гибрид белуги и стерляди - бестер широко используется на осетровых фермах. В статье

представлены результаты формирования производственных стад некоторых видов и гибридов, относящихся к отряду осетровые. В Азербайджане эти рыбы разводятся в некоторых рыбоводческих хозяйствах, в том числе и на Самухском рыбоводческом хозяйстве. В этом хозяйстве впервые в истории рыбоводческих исследований в Азербайджане было сформировано производственное стадо стерляди (из икры) в возрасте 3-4 лет и от них получено потомство для рыбоводства. Здесь рыба выращивается в пресной воде с контролируемым температурным режимом. Получение икры от производителей стерляди осуществляется прижизненным методом. Затем от этих производителей повторно получают половозрелые икры. На этой ферме также выращивают белугу (из икры) и в возрасте пятнадцати лет, от них получают половозрелые икры. В результате оплодотворения икры белуги спермой стерляди получены гибриды - **бестеры,** которые успешно разводятся на этой ферме.

ANNOTATION

In recent years, aquaculture has been intensively developing in Azerbaijan, with many private fish farms operating. Here, mainly valuable commercial fish are grown, and broodstock and reproductive stocks of many valuable commercial fish species are formed. Of these fish, sturgeon farming occupies an important place in the country. In modern environmental conditions, it is considered very important to maintain the number of sturgeon fish at a stable level and preserve the gene pool. Along with the measures taken in the country to form reproductive stocks, as well as to strengthen the protection of these fish, limit the fishing load, etc., artificial cultivation of sturgeon fish plays an important role in preserving the population gene pool. Many sturgeon species have a high ability to form hybrids when artificially crossed. The hybrid of beluga and sterlet - bester is widely used on sturgeon farms. The article presents the results of the formation of production stocks of some species and hybrids belonging to the sturgeon order. In Azerbaijan, these fish are bred in some fish farms, including the Samukh fish farm. In this farm, for the first time in the history of fish farming research in Azerbaijan, a production stock of sterlet (from caviar) at the age of 3-4 years was formed and offspring for fish farming were obtained from them. Here, the fish are grown in fresh water with a controlled temperature regime. Caviar is obtained from sterlet producers using the live method. Then, sexually mature caviar is obtained again from these producers. This farm also grows beluga (from caviar) at the age of fifteen years, from which sexually mature caviar is obtained. As a result of fertilization of beluga caviar with sterlet sperm, hybrids were obtained - besters, which are successfully bred on this farm.

Ключевые слова: *рыба, осетр, икра, выращивание, рыбоводческое хозяйство*
Key words: *fish, sturgeon, caviar, cultivation, fish farm*

Введение. Искусственное выращивание рыб, имеющее более чем двухвековую историю, в настоящее время получило широкое развитие, во многих странах мира, в том числе и в Азербайджане. Сегодня эта отрасль стало важной и неотъемлемой частью системы рыбного хозяйства. В последние годы, в связи с усилением отрицательного воздействия некоторых природных и антропогенных факторов на рыб; ухудшение условий естественного восстановления ценных промысловых рыб, а так же риски приводящие к полному исчезновению их численности , стало толчком для расширения искусственного рыбоводства в стране [11,14]. В Азербайджане первые опыты, проведенные в этом направлении, были посвящены в основном решению проблем искусственного разведения ценных промысловых рыб как осетрина и форель.

Вопросы искусственного разведения осетровых рыб многие годы являются приоритетными направлениями различных стран мира. Искусственное выращивание осетрины в Азербайджане имеет более чем вековую историю. Впервые в 1901 году русский ученый Н.А. Бородин провел опыты по искусственному разведению осетровых рыб в нашей стране в реке Кура. Он получил хорошую зрелую икру осетровых рыб из реки Куры и

вырастил 300 мальков путем искусственного оплодотворения. В 1903-1904 годах, под руководством русского ихтиолога Д.К. Ляшко, были проведены обширные эксперименты по искусственному разведению осетровых рыб , особенно севрюги, на реке Кура в районах Мингячевира и Гарадонлу на реке Араз, в результате которых было получено 2 миллиона 440 тысяч мальков севрюги и 360 тысяч мальков осетрины. Однако, поскольку работы Д.К.Ляшко имели ряд недостатков, искусственное разведение осетровых рыб было возобновлено А.Н.Державиным. В 1905—1912 годах в работах по искусственному разведению рыб наступил перерыв, а после создания в 1912 году по инициативе академика А. Н. Державина Бакинской ихтиологической лаборатории в стране работы по искусственному разведению рыб вновь стали проводиться в широких масштабах.

Сейчас в Азерюайджане действует несколько рыбоводческих заводов и хозяйств, где проводят икусственное выращивание некоторых ценных (осетровых, карпообразных, лососевых и др.) промысловых рыб.

В современных экологических условиях, очень важно сохранение генофонда и поддержание численности осетровых рыб на стабильном уровне. Наряду с проводимыми мероприятиями в стране по формированию репродуктивных стад, усилению охраны этих рыб, ограничению промысловой нагрузки и т.д, в сохранении популяционного генофонда важную роль играет искусственное выращивание осетровых рыб.

Поскольку, действующие рыбоводные заводы испытывают острый дефицит рыб производителей естественной генерации, то они требуют существенной технической модернизации с целью снижения расхода на самок и самцов для получения репродуктивной икры. А также, увеличения количественных и улучшения качественных показателей выращиваемой молоди. Интенсификация искусственного разведения осетровых рыб в рыбоводческих заводах за счет использования прогрессивных технологий в производстве, а также интенсивное развитие товарного осетроводства может решить эту проблему.

В настоящее время, для успешного развития осетрового хозяйства проводятся работы в области формирования и эксплуатации ремонтно маточных стад различных видов осетровых рыб.

Среди осетровых рыб, которые имеют наиболее важное значение для товарного осетроводства, является стерлядь *(Acipenser ruthenus)* и белуга *(Huso huso)*. Стерлядь обитает в реках Европы, которые впадвют в Каспийское, Черное и др. моря. Масса тела этой рыбы достигает до 17 кг, а длина тела до 126 см. Нос узкий с длинными усами. Это очень ценная промысловая рыба. Мясо этой рыбы ценится за свой хороший вкус. В составе мяса содержится много калия, натрия, фосфора, кальция, магния, железа, фтора, молибдена, никеля, йода, хрома и других минералов. Так же, мясо богато витаминами С, РР, В1, В2. Стерлядь обычно ведет очень скрытный образ жизни в самых глубоких частях рек, около дна. Среди других осетровых Стерлядь обычно рано достигает половой зреости. Самцы начинают нерестятся в возрасте 4-5 лет, а самки в 7-8 лет. Плодовитость самок от 5 до 140 тысяч икринок. Эти рыбы нерестятся весной, в мае. Икру откладывают на каменистый грунт. Икра у них клейкая, развивается в течении 4-5 дней [3, 4,5]

В природе стерлядь образует гибриды с осетром. Путем искусственного осеменения получены жизнеспособные гибриды осетр х стерлядь, стерлядь х осетр, а также белуга х стерлядь. При скрещивании белуги х стерлядь, получается бестер.



Рисунок 1 - Стерлядь (Acipenser ruthenus)

В Азербайджане еще в советское время проводились опыты по товарному выращиванию гибридов осетровых. Здесь ученые в течение многих лет проводили научно-исследовательские работы по получению гибридов стерляди – бестера (♀ Huso huso x ♂ Acipenser ruthenus), а также шистера (♀ Acipenser nudiventris x ♂ Acipenser ruthenus). Получение и разведение этих гибридов очень сложный процесс, когорый требует особые условия для получения здорового потомства. Но в результате скрещиваний полученные гибриды приобрели уникальные черты, которые сделали их интересными и ценными. Бестеры являются крупными пресноводными рыбами, которые способны достигать до 2 метров длины и веса до 100 кг. Они обладают стройным и узким телом, покрытой черной или серебристо-серой чешуей. Мясо этой рыбы вкусное, полезное для здоровья человека, содержит много жирных кислот Омега-3. Бестеры живут 60-70 лет [1,2,4]

Часть молоди полученные от выращенного бестера использовалась для зарыбления внутренних водоемов Азербайджана. С целью получения товарной продукции зарыбления проводились в первую очередь в Мингечаурском водохранилище. При проведении данных работ икра была получена от куринской белуги. Икринки этой рыбы оплодотворялись спермой стерляди, привезенной в нашу страну из России. Полученные гибриды обладали хорошими качествами.

Кроме получения гибридов, селекционеры нашей страны изучали проявления гетерозиса в раннем онтогенезе, физиологические и экоогические особенности межвидовых и межродовых гибридов. Проводились исследования кормления и товарного выращивания гибрида белуга х стерлядь в условиях нашей страны. Так же были изучены морфологические, физиологические и рыбоводные характеристики содержания в неволе молоди и взрослых особей.

В задачи наших исследований входила изучение биотехнологии формирования маточного стада и производственного стада стерляди (Acipenser ruthenus) в Азербайджане, а также контроль за наступлением их половозрелости и использование их в рыбоводстве в промышленных масштабах.

Материалы и методы. В Самухском рыбоводческом хозяйстве Азербайджанской Республики, завезена небольшая партия оплодотворенной икры стерляди (Acipenser ruthenus) из России. Здесь инкубация оплодотворенной икры проводится в аппаратах Вейсса, установленных в инкубаторе рыбоводного хозяйства. Суточные свободные эмбрионы, полученные от одной самки, первоначально помещаются в пластиковые емкости. Дальнейшее выращивание личинок, мальков, молоди и маточного стада стерляди осуществляется бассейновым методом. Температура воды в период выращивания стабильная и колеблится в пределах от $17,5^0$ – $22,3^0$C. Отличительной особенность этого метода, использование воды из артезианского источника с глубины 330 метров и со стабильной температурой - в зимние месяцы не ниже $17,5^0$C, а в летние месяцы - не выше $22,3^0$C. В процессе выращивания осуществляется постоянный контроль за размерными группами рыб, плотностью посадки и гидрохимическими показателями воды в каждом бассейне. Личинки кормят живым кормом - науплиями Artemia salina. После достижения молодью навески 61 мг ее постепенно переводят на кормление искусственным кормом для

осетровых рыб. С годовалого возраста рыбу кормят производственным кормом Aller Aqua. Нормирование кормления разновозрастных групп стерляди проводят в зависимости от температуры воды и массы тела рыб. При таком кормлении и при правильном соблюдении температурного режима среднесуточный прирост мальков этой рыбы состовляет до 14%. Биологические показатели и динамика роста разных возрастов стерляди при искусственном выращивании бассейным способом приведены в таблице 1.

Таблица 1 - Динамика роста рыбы стерлядь разных возрастов при искусственном выращивании в Азербайджане

Показатели рыбы *(Acipenser ruthenus)*	Возраст, лет				
	0+	1	2	3	3+
Длина, L, (см)	17,2	22,6	31,6	36,7	47
Масса, P (гр)	40,1	87	221	350	661
Упитанность (по Фультону)	0,80	0,76	0,71	0,72	0,69

На основе потомства искусственной генерации на указанном хозяйстве было сформировано маточное стадо производителей с целью получения собственных производителей. Общая численность производителей (самцов и самок вместе) составила более 500 особей. Отбор рыб для маточного стада, технология содержания и кормления маточного стада и производственных стад стерляди на ферме во все эти годы осуществлялся в соответствии с рекомендациями, разработанными специалистами Каспийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и Краснодарского научно-исследовательского института рыбного хозяйства [10, 12,13].

Обсуждения. Для искусственного разведения осетровых рыб необходимо создание полносистемных осетровых хозяйств с различными технологическими типами, например прудовых, садковых, индустриальных, которые будут направлены на увеличение объемов товарного производства осетровых и на сохранение и увеличение запасов осетровых в естественных водоемах за счет массового зарыбления молодью.

Опыт рыбоводства по выращиванию стерляди имеет более чем вековую историю и сейчас уже можно утверждать, что во многих странах основные черты биотехнологии по выращиванию этой рыбы с использованием различных технологий успешно решены [8, 9,14]. Нужно отметить, что работы по искусственному выращиванию стерляди для воспроизводства в Азербайджане проводилось мало. Это связано, прежде всего, со скудностью ее ресурсов и невозможностью заготовить производителей в необходимом количестве в устье реки Кура. С этой целью в последнее время на Самухском рыбоводческом хозяйстве Азербайджана успешно проводят формирование маточного стада производителей белуги – (Huso huso Linnaeus) и бестера (♀ Huso huso x ♂ Acipenser ruthenus). Здесь от одной самки белуги в возрасте 15 лет (первая нерестовая белуга) были получены зрелые икринки общим весом три килограм. Гонадосоматический индекс (ГСИ) самки белуги составил 10%. Икру белуги оплодотворяют спермой стерляди. В результате здесь в впервые в условиях Азербайджана селекционеры получили бестера (♀ Huso huso x ♂ Acipenser ruthenus) от заводских производителей белуги и стерляди. Выращивание мальков и личинок бестера осуществляется бассейновым способом.

Выводы. Принцип комплектования маточного стада осетровых рыб от икры до икры основан на отборе элитного потомства с последующим доращиванием до половозрелых производителей [7,10, 11, 12, 13].

Искусственное разведение и выращивание ценных рыб в Азербайджане на современном этапе функционируют в двух направлениях: 1) искусственное воспроизводство молоди ценных промысловых видов рыб, которую затем выпускают в естественные водоемы (река Кура, Каспийское море, водохранилища) для пополнения запасов этих рыб. Его также называют пастбищной аквакультурой, которое находится под

контролем государства; 2) фермерские хозяйства, выращивающие рыбопосадочный материал и товарную рыбу.

Благодарности. Спасибо всем организаторам конференции за созданные условия для нашего участия.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Аскеров Ф., Зайцев Ю., Гасымов Р., Гулиев З. -Загадочные рыбы Каспийского моря. Баку. - Башар-XXI. - 2003. - 164 с.

2. Гасымов А.М., Ахундов М.М., Мамедов Дж.А., Хатамов Н.Г.- Инструкция по кормлению рыб живыми и искусственными кормами в рыбоводных хозяйствах, специализирующихся на искусственном разведении каспийского лосося, осетровых и голавля в Азербайджанской Республике. - Баку. - 2014.-60 с.

3. Ганизаде С.Н., Мамедзаде Ч.М., Мамедзаде К.А., Алекперов А.П. Аквакультура. - Баку. - Пятница. - 2005. – 148 с.

4. Гаджиев Р.В., Касимов Р.Ю. Осетровые и лососевые рыбы Курило-Каспийского региона, их биологические группы и эколого-физиологические особенности. - Баку. - Зардаби, - 2005. - 249 с.

5. Гулиев З.М. Коммерческое рыболовство в Азербайджане. - Баку. - Си-Би-Эс. - 2006. - 302 с.Ахундов М.М. Пластичность дифференцировки пола у осетровых рыб. - Баку. - Элм, - 1997. - 197 с.

6. Портная Т. В. – Рыбоводство : методические указания к лабораторным занятиям. Горки : БГСХА, 2016. – 48 с.

7. Чебанов М.С., Галич Е.В., Чмырх Ю.Н.-Руководство по разведению и выращиванию осетровых рыб, «Росинформагротех», Москва, 2004.С: 147

8. Пашко М., Третьяк А., Колос Е. (2016). К вопросу управления половой зрелостью стерляди при воспроизводстве в промышленных условиях. Материалы Международной научно-практической конференции «Осетровая аквакультура: современные тенденции и перспективы». Херсон, С. 134-137.

9. Петрова Т.Г., Кривцов В.Ф., Козовкова Н.А., Кушнирова СА., Мельченков Е.А., Виноградов В.К. (2001). Методология формирования коллекционных стад стерляди. Сборник научно-технической и методической документации по аквакультуре. «ВНИРО», Москва, С.: 212-221.

10. Попова А.А. - Современное состояние и перспективы развития пастбищного осетроводства в Волго-Каспийском регионе. Материалы Международной научно-практической конференции, Астрахань, 2007 стр. 263-266.

11. Raymakers C. CITES, Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения: ее роль в сохранении Acipenseriformes // J. Appl. Ichthyology, (Suppl. 1), 2006, стр. 53-55

12. Шевченко В.Н., Попова А.А., Пискунова Л.В., Чернова П.В. и др. - Биологические основы формирования ремонтно-маточного стада осетровых и белуг на рыбоводных заводах в дельте Волги // Рыбохозяйственные исследования на Каспии: Итоги исследований за 2002 г. – Астрахань, с. 474-481.

13. Шевченко В.Н., Пискунова Л.В., Попова А.А. - Результаты эксплуатации ремонтно-маточного стада осетровых на рыбоводных заводах в дельте Волги // Рыбохозяйственные исследования на Каспийском море: Итоги исследований за 2004 г. – Астрахань, 2005 - С. 545-555.

14. Вильот П., Руо Т., Пелард М., Мерсель Д., Якобс Л. Искусственное воспроизводство и выращивание личинок в неволе атлантического осетра Acipenser sturio, находящегося под угрозой исчезновения // Исследования исчезающих видов, 2009, т. 6, стр. 251-257.

REFERENCES

1. Askerov F., Zaitsev Yu., Gasimov R., Guliyev Z. - Mysterious fishes of the Caspian Sea. Baku. - Bashar-XXI. - 2003. - 164 p.

2. Gasimov A.M., Akhundov M.M., Mamedov J.A., Khatamov N.G. - Instructions for feeding fish with live and artificial feed in fish farms specializing in artificial breeding of Caspian salmon, sturgeon and chub in the Republic of Azerbaijan. - Baku. - 2014.-60 p.

3. Ganizade S.N., Mamedzade Ch.M., Mamedzade K.A., Alekperov A.P. Aquaculture. - Baku. - Friday. - 2005. - 148 p.

4. Gadzhiev R.V., Kasimov R.Yu. Sturgeon and salmon fishes of the Kuril-Caspian region, their biological groups and ecological-physiological features. - Baku. - Zardabi, - 2005. - 249 p.

5. Guliyev Z.M. Commercial fisheries in Azerbaijan. - Baku. - CBS. - 2006. - 302 p. Akhundov M.M. Plasticity of sex differentiation in sturgeon fishes. - Baku. - Elm, - 1997. - 197 p.

6. Portnaya T. V. - Fish farming: guidelines for laboratory classes. Gorki: BGSKhA, 2016. - 48 p.

7. Chebanov M. S., Galich E. V., Chmyrkh Yu. N. - Guide to breeding and growing sturgeon fish, "Rosinformagrotech", Moscow, 2004. C: 147

8. Pashko M., Tretyak A., Kolos E. (2016). On the issue of managing the sexual maturity of sterlet during reproduction in industrial conditions. Proceedings of the International Scientific and Practical Conference "Sturgeon Aquaculture: Modern Trends and Prospects". Kherson, pp. 134-137.

9. Petrova T.G., Krivtsov V.F., Kozovkova N.A., Kushnirova S.A., Melchenkov E.A., Vinogradov V.K. (2001). Methodology of formation of collection stocks of sterlet. Collection of scientific, technical and methodological documentation on aquaculture. "VNIRO", Moscow, S.: 212-221.

10. Popova A.A. - Current state and prospects for the development of pasture sturgeon farming in the Volga-Caspian region. Proceedings of the International scientific and practical conference, Astrakhan, 2007 pp. 263-266.

11. Raymakers C. CITES, Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora: its role in the conservation of Acipenseriformes // J. Appl. Ichthyology, (Suppl. 1), 2006, pp. 53-55

12. Shevchenko V.N., Popova A.A., Piskunova L.V., Chernova P.V. et al. - Biological bases for the formation of broodstock of sturgeon and beluga at fish hatcheries in the Volga Delta // Fisheries research in the Caspian: Results of research for 2002 - Astrakhan, pp. 474-481.

13. Shevchenko V.N., Piskunova L.V., Popova A.A. - Results of exploitation of broodstock of sturgeon at fish hatcheries in the Volga delta // Fisheries research in the Caspian Sea: Results of research for 2004 – Astrakhan, 2005 - pp. 545-555.

14. Williot P., Rouault T., Pelard M., Mercel D., Jacobs L. Artificial reproduction and larval rearing of captive endangered Atlantic sturgeon Acipenser sturio // Endangered Species Research, 2009, v.6 251-257pp.

УДК 631.421
МРНТИ 68.05.01

Эль-Намас А.Э., Ph.D, https://orcid.org/0009-0000-0986-7338
Александрийский университет, факультет Сельского хозяйства, кафедра Почв и воды, Александрия, Египет, elnamasashraf@gmail.com
Рахимгалиева С.Ж., Ph.D, https://orcid.org/0000-0001-6344-4475, saule-ra@mail.ru, Западно-Казахстанский аграрно-технический университет им. Жангир хана, Казахстан, 090000, Уральск, ул. Жангир хана
Есбулатова А.Ж., Ph.D, https://orcid.org/0000-0002-1386-7346, esbulatova76@mail.ru, Западно-Казахстанский аграрно-технический университет им. Жангир хана, Казахстан, 090000, Уральск, ул. Жангир хана 51

Фарахат С. Могханм, Ph.D, https://orcid.org/0000-0003-3318-5358, fsaadr@yahoo.ca, Университет Кафрэльшейха, факультет Сельского хозяйства, кафедра Почв и воды, Кафр Эль-Шейх, Египет

El-Namas A.E., Ph.D, https://orcid.org/0009-0000-0986-7338,
Alexandria University, Faculty of Agriculture, Soil and water department, Alexandria, Egypt, elnamasashraf@gmail.com,
Rakhimgaliyeva Saule, Ph.D, https://orcid.org/0000-0001-6344-4475
Zhangir khan West Kazakhstan Agrarian - Technical University, Kazakhstan, 090000, Uralsk, st. Zhangir Khan, 51, e-mail: saule-ra@mail.ru,
Esbulatova Altyn, Ph.D, https://orcid.org/0000-0002-1386-7346
Zhangir khan West Kazakhstan Agrarian - Technical University, Kazakhstan, 090000, Uralsk, st. Zhangir Khan, 51; e-mail: esbulatova76@mail.ru
Farahat S. Moghanm, Ph.D, https://orcid.org/0000-0003-3318-5358
Kafrelsheikh University, Faculty of Agriculture, Soil and Water Department, Kafr El-Sheikh 33516, Egypt, e-mail: fsaadr@yahoo.ca

ВЛИЯНИЕ ОРОШЕНИЯ НА ПРОДУКТИВНОСТЬ ГУАВЫ ВОЗДЕЛЫВАЕМОЙ НА ГЛИНИСТОЙ ПОЧВЕ
EFFECT OF IRRIGATION ON THE YIELD OF GUAVA CULTIVATED IN CLAY SOIL

АННОТАЦИЯ

Полевой эксперимент был проведен в течение двух последовательных вегетационных сезонов 2017/2018 и 2018/2019 годах в частном саду в районе Кафр-эль-Давар, мухафаза Бухейра, Египет, с целью изучения влияния водного режима (100%, 80% и 60% от ETc) и двух систем орошения: по бороздам (FI) и капельного поверхностного орошения (SDI) на характеристики вегетативного роста, урожайность и компоненты урожая.

Эксперимент был реализован в рандомизированном полном блоковом дизайне с тремя повторами. Полученные результаты показали, что наибольшая длина побегов (см), количество листьев/м и площадь листа (см²) были достигнуты при обработке T_2E_1 (капельное орошение + 100% ET_c), за которым следовала обработка T_2E_2 (капельное орошение + 80% ETc).

Наибольший урожай гуавы был получен при обработке T_2E_1 (капельное орошение и 100% ET_c) и составил 11,33 и 11,05 т/федд. соответственно в вегетационные сезоны 2017/2018 и 2018/2019 годов. Наименьшая урожайность гуавы была зафиксирована при обработке T_1E_3 (орошение по бороздам и 60% ET_c) – 8,50 и 7,52 т/федд. соответственно в сезоны 2017/2018 и 2018/2019 годов.

Компоненты урожая, такие как количество плодов/м^2, длина плода (см), диаметр плода (см), размер плода (см³), масса плода (г) и урожайность с одного дерева (кг/дерево), оказали значительное влияние ($P<0,05$) на системы орошения и водный режим.

ANNOTATION

The field experiment was conducted over two consecutive growing seasons, 2017/2018 and 2018/2019, in a private orchard located in the Kafr El-Dawar district, Beheira Governorate, Egypt. The aim was to study the effects of water regimes (100%, 80%, and 60% of ETc) and two irrigation systems: furrow irrigation (FI) and surface drip irrigation (SDI), on vegetative growth characteristics, yield, and yield components.

The experiment was implemented using a randomized complete block design with three replications. The results showed that the highest shoot length (cm), number of leaves per meter,

and leaf area (cm²) were achieved under treatment T2E1 (drip irrigation + 100% ETc), followed by treatment T2E2 (drip irrigation + 80% ETc).

The highest guava yield was obtained under treatment T2E1 (drip irrigation and 100% ETc), amounting to 11.33 and 11.05 tons/feddan during the 2017/2018 and 2018/2019 growing seasons, respectively. The lowest guava yield was recorded under treatment T1E3 (furrow irrigation and 60% ETc), with 8.50 and 7.52 tons/feddan in the 2017/2018 and 2018/2019 seasons, respectively.

Yield components such as the number of fruits/m², fruit length (cm), fruit diameter (cm), fruit size (cm³), fruit weight (g), and yield per tree (kg/tree) were significantly affected ($P<0.05$) by the irrigation systems and water regimes.

Ключевые слова: *гуава, глинистая почва, система орошения, капельное орошение, орошение по бороздам и урожайность*.

Key Word: *guava, clay soil, irrigation system, drip irrigation, furrow irrigation and yield*.

Введение. Гуава (*Psidium guajava L.*) является одним из основных фруктов Египта и занимает восьмое место по значимости среди фруктовых культур по площади и объему производства. Этот фрукт является богатым источником витамина С, пектина и минералов, таких как кальций, фосфор и железо. Общая площадь посадок гуавы составляет около 40 831 акра. Из них 31 711 акров находятся в старых районах и орошаются методами поверхностного орошения, а 9 120 акров – в современных районах, где применяются современные методы орошения.

Египет стремится увеличить площади современных освоенных земель, однако ограниченные водные ресурсы сдерживают амбициозные планы расширения [1,2]. В связи с этим Египет инициировал стратегическую программу, направленную на освоение 1,4 миллиона гектаров пустынных земель в ближайшие годы до 2020 года [1]. Изменение климата заставляет политиков и ученых задуматься о будущем водных ресурсов [3] и их устойчивом использовании в условиях дефицита, учитывая снижение притока воды из Эфиопии в Египет и высокий темп роста населения [17].

Целью данного исследования является изучение влияния режимов дефицитного орошения и систем орошения на характеристики вегетативного роста, урожайность и компоненты урожая.

Материалы и методы. Полевой эксперимент был проведен в частном саду в районе Кафар-эль-Даввар, губернаторство Бухейра, Египет (31º 13′ с.ш., 30º 25′ в.д.) в течение двух вегетационных сезонов: 2017/2018 и 2018/2019 гг. с целью изучения влияния систем орошения и водного режима на рост гуавы (*Psidium guajava L.*), урожайность и химическое качество плодов. Метеорологические данные экспериментального участка приведены в таблице 1.

Деревья гуавы в возрасте четырех лет выращивались с расстоянием 4,0 × 4,0 м друг от друга на глинистой почве. Нормальная доза удобрений, включающая 138 г азота (N), 244 г фосфора (P) и 360 г калия (K), была внесена для каждого растения согласно рекомендованной дозировке удобрений для гуавы [20].

Экспериментальный план

Полевые эксперименты были проведены для изучения влияния двух методов орошения и режима полива на урожайность и химическое качество гуавы (*Psidium guajava L.*), выращенной на глинистой почве, в течение двух последовательных вегетационных сезонов: 2017/2018 и 2018/2019 гг.

Два метода орошения:

Орошение по бороздам

Поверхностное капельное орошение (SDI)

Три режима полива:

100 %

80 %

60 % от эвапотранспирации культуры (ETc), рассчитанной на основе испарения из испарительной чаши класса A [9].

Система капельного орошения, используемая на фермерском участке, включает в себя насос для орошения, соединенный с песочными и сетчатыми фильтрами, а также насос для гидравлического введения удобрений. Главная линия выполнена из ПВХ-труб диаметром 63 мм. Латеральные трубопроводы диаметром 16 мм подключены к подпиточной линии. Каждая латеральная линия имеет длину 50 м, с установленными капельницами стандартного типа, с расходом 4 л/ч, размещенными с интервалом 0,5 м. Каждая пара латеральных труб обслуживает один ряд деревьев гуавы.

Для определения объема подаваемой орошенной воды для проверяемых методов орошения использовалась чашка класса A. Значения потенциальной эвапотранспирации (ETp) были получены с использованием метода чашки класса A следующим образом:

$$ET_p = E_{pan} \times K_{pan}$$ [6]

где:

E_{pan} : Это испарение из чаши (мм/день).

K_{pan}: Коэффициент чаши. Его значение зависит от относительной влажности, скорости ветра и типа участка (вегетативный или голая почва).

K_{pan}: равное 0,75 было использовано на экспериментальном участке в соответствии с погодными условиями.

Водные отношения почвы

Содержание влаги в почве определялось гравиметрически по образцам почвы, взятым с последовательных глубин по 20 см до глубины 100 см. Эти образцы были взяты непосредственно перед каждым орошением, через 24 часа после орошения и на момент сбора урожая для определения потребности в воде. Полевую влажность, точку увядания и доступную почвенную влагу определяли на месте [13]. Плотность почвы определялась с использованием метода цилиндрического отбора [21] до глубины 100 см. Средние значения представлены в таблице 2. Некоторые химические и физические анализы используемой почвы были выполнены согласно методикам [15], а полученные результаты представлены в таблице 3.

Общие варианты обработки были следующими:

i. I_1E_1 Орошение по бороздам + 100 % от эвапотранспирации культуры (ETc)
ii. I_1E_2 Орошение по бороздам + 80 % от эвапотранспирации культуры (ETc)
Iii I_1E_3 Орошение по бороздам + 60 % от эвапотранспирации культуры (ETc)
iv. I_2E_1 Поверхностное капельное орошение + 100 % от эвапотранспирации культуры (ETc)
v. I_2E_2 Поверхностное капельное орошение + 80 % от эвапотранспирации культуры (ETc)
vi. I_2E_3 Поверхностное капельное орошение + 60 % от эвапотранспирации культуры (ETc)

Таблица 1- Метеорологические данные экспериментального участка в течение двух вегетационных сезонов 2017/2018 и 2018/2019 гг.

Месяцы	Температура (c^0)			Относительная влажность (%)	Осадки (мм)	Скорость ветра (м/ч)	Солнечное сияние (часы)
	Максимум	Минимум	Среднее				
2017 / 2018							
Январь	18.2	12.6	15.4	69.1	33.86	5.4	9.3
Февраль	20.1	12.8	16.5	69.1	12.08	4.3	10.5
Март	23.7	14.2	19.0	59.6	1.46	5.2	11.3
Апрель	25.6	16.2	20.9	59.7	2.84	4.5	12.1
Май	28.9	20.0	24.5	60.9	0.0	4.4	12.8

Июнь	31.0	22.5	26.3	58.2	0.0	4.3	13.2
Июль	32.2	24.2	28.2	63.5	1.74	4.7	13.3
Август	32.1	25.0	28.6	64.5	0.0	4.5	12.8
Сентябрь	31.2	24.0	27.6	63.6	0.0	4.8	12.1
Октябрь	28.1	21.7	24.9	63.6	11.13	4.6	10.9
Ноябрь	24.2	18.27	21.3	64.4	23.35	4.1	9.7
Декабрь	19.5	14.8	17.2	68.5	50.99	5.3	9.2
2018 / 2019							
Январь	17.3	10.4	13.9	64.1	25.20	5.9	9.6
Февраль	18.3	11.1	14.7	67.2	14.33	4.9	10.4
Март	19.8	12.5	16.2	66.5	25.32	5.1	11.1
Апрель	22.8	14.2	18.5	62.0	3.53	4.8	12.2
Май	29.1	18.4	23.8	53.9	0.0	4.6	12.6
Июнь	30.9	22.8	26.9	63.1	0.0	4.6	13.4
Июль	32.4	24.5	28.5	61.1	0.0	4.7	13.5
Август	32.7	24.6	28.7	63.3	0.0	4.4	13.0
Сентябрь	30.4	23.4	26.9	63.7	0.0	4.6	12.2
Октябрь	28.8	21.9	25.4	65.8	17.9	4.4	10.7
Ноябрь	26.3	18.9	22.6	63.1	0.19	4.3	9.5
Декабрь	20.4	14.9	17.8	67.7	40.15	5.6	9.3

Таблица 2 - Полевая емкость (FC), точка увядания (WP), доступная почвенная влага (ASM) и объемная плотность почвы (Db) экспериментальной фермы

Глубина почвы (см)	FC (%)	WP (%)	ASM (%)	D_b (g / cm^3)
0-20	38.7	17.3	21.4	1.11
20-40	37.5	16.7	20.8	1.13
20-60	32.3	16.3	16.0	1.22
60-80	29.9	15.1	14.8	1.27
80-100	28.3	14.5	13.8	1.32
Среднее	33.34	15.98	17.36	1.21

Таблица 3- Химический и физический анализ почвы экспериментальной фермы

Глубина почвы (см)	Химический анализ				Распределение по размерам частиц				
	*EC (dS/m)	*pH	*O.M. (%)	*$CaCO_3$ (%)	Крупный песок (%)	Мелкий песок (%)	Супесь (%)	Глина (%)	Название
0-20	1.08	8.01	1.12	2.03	4.9	8.5	31.2	55.4	Глина
20-40	1.01	7.93	1.01	1.76	7.9	10.5	29.4	52.2	Глина
20-60	0.89	8.03	0.74	1.70	10.6	14.1	29.0	46.3	Глина
60-80	0.79	7.82	0.64	1.55	12.9	15.5	27.1	44.5	Глина
80-100	0.67	7.84	0.34	1.04	11.3	22.7	26.5	39.5	Глинистый суглинок
Среднее	0.89	7.93	0.77	1.62	9.5	14.3	28.6	47.6	Глина

(*) EC (dS/m) Электрическая проводимость (в дС/м), pH (кислотность или щелочность почвы), O.M. (органическое вещество) ,$CaCO_3$ (карбонат кальция). Урожайность и химический анализ качества: Зарегистрированные данные: В установленное время данные были зарегистрированы следующим образом: Вегетативный рост и цветение:

Длина побегов (см), количество листьев/м, площадь листа (см²) с использованием планиметра. Характеристики плодов и урожайность: Количество плодов/м^2, средняя длина и диаметр плода (см), средний размер плода (см³), средний вес плода (г) и урожайность (кг/дерево).Статистический анализ.

Полученные данные были подвергнуты статистическому анализу на основе наименьшего значимого различия (LSD) на уровне вероятности 5%, чтобы сравнить средние значения обработок, когда F-тест был значимым.

Результаты и обсуждение. Характеристики вегетативного роста: Данные, представленные в таблице 4, показывают влияние систем орошения и водного режима на характеристики вегетативного роста растений гуавы, такие как длина побегов (см), количество листьев на растении и площадь листьев (см²).

Результаты ясно показали, что системы орошения и водный режим значительно повлияли на все характеристики вегетативного роста растений гуавы в течение двух вегетационных сезонов. Наибольшие значимые значения были получены при капельном орошении и уровне 100% ET_c (I_2E_1), за которыми следовали капельное орошение и уровень 80% ETc (T_2E_2) без значительных различий между ними. Самые низкие показатели были зарегистрированы при бороздовом орошении и уровне 60% ETc (I_1E_3).

Длина побегов (см) составила 21,90; 21,20; 16,32; 23,56; 23,28 и 17,31 см в результате обработок T_1E_1, T_1E_2, T_1E_3, T_2E_1, T_2E_2 и T_2E_3 соответственно в первый вегетационный сезон (2017/2018). Во второй сезон (2018/2019) значения были 20,80; 20,42; 16,81; 23,32; 22,82 и 17,21 см для тех же обработок.

Количество листьев на погонный метр составило 84,30; 78,30; 65,20; 100,50; 93,40 и 72,30 для обработок T_1E_1, T_1E_2, T_1E_3, T_2E_1, T_2E_2 и T_2E_3 соответственно в сезоне 2017/2018, а в сезоне 2018/2019 эти показатели были 91,80; 86,20; 62,30; 103,40; 97,60 и 76,80.

Площадь листьев (см²) составила 49,10; 46,30; 36,20; 52,40; 50,30 и 41,60 см² в результате обработок T_1E_1, T_1E_2, T_1E_3, T_2E_1, T_2E_2 и T_2E_3 соответственно в сезоне 2017/2018. В сезоне 2018/2019 значения составили 46,30; 44,20; 34,40; 51,60; 49,30 и 37,20 см² для тех же обработок.

Эти результаты согласуются с данными, полученными El-Dakroury (2008), который показал, что увеличение уровня орошения с 60% до 100% ETc значительно увеличивает параметры вегетативного роста. Это может быть связано с ролью воды в повышении усвоения питательных веществ из почвы и транспорта ассимилятов фотосинтеза. Это, в свою очередь, приводит к увеличению количества листьев, их площади, а также массы надземной части растения [12].

Сообщили, что засушливый стресс вызывает различные физиологические и биохимические изменения в растениях обнаружили, что уменьшение свежей и сухой массы побегов, длины побегов, площади листьев, скорости транспирации, проводимости устьиц, скорости фотосинтеза, относительного содержания воды и водного потенциала листьев сопровождается водным стрессом засухи [10, 14, 22].

Урожай и компоненты урожая. Урожай гуавы Таблица 4 показывает, что урожай и компоненты урожая гуавы были значительно зависимы ($P< 0,05$) от систем орошения и водного режима. Урожай гуавы (т/фед) составил 10,58; 9,96; 8,50; 11,33; 10,90 и 9,32 в результате обработок T_1E_1, T_1E_2, T_1E_3, T_2E_1, T_2E_2 и T_2E_3 соответственно в вегетационный сезон 2017/2018. В вегетационный сезон 2018/2019 урожай составил 10,32; 9,53; 7,52; 11,05; 10,33 и 8,75 в результате тех же обработок. Самый низкий урожай гуавы был получен при обработке T1E3 (бороздное орошение и 60% ET_c), который составил 8,50 и 7,52 (т/фед) соответственно для сезонов 2017/2018 и 2018/2019. Самый высокий урожай был получен при обработке T_2E_1 (капельное орошение и 100% ET_c), который составил 11,33 и 11,05 (т/фед) соответственно для сезонов 2017/2018 и 2018/2019. Эти результаты согласуются с данными [4,16], которые наблюдали, что при капельном орошении урожай гуавы был наибольшим при орошении с 100% ET_c

Компоненты урожая:

Таблица 4 - Влияние систем орошения и водного режима на некоторые параметры вегетативного роста в вегетационные сезоны 2017/2018 и 2018/2019

Варианты обработки	Длина побега (см)		Число листьев /1 метр		Площадь листа (см²)	
	2017/2018	2018/2019	2017/2018	2018/2019	2017/2018	2018/2019
T_1E_1	21.90 b	20.80 b	84.30 b	91.80 b	49.10 b	46.30 b
T_1E_2	21.20 b	20.42 b	78.30 b	86.20 b	46.30 b	44.20 b
T_1E_3	16.32 d	16.81 c	65.20 c	62.30 d	36.20 d	34.40 c
T_2E_1	23.56 a	23.32 a	100.50 a	103.40 a	52.40 a	51.60 a
T_2E_2	23.28 a	22.82 a	93.40 a	97.60 a	50.30 a	49.40 a
T_2E_3	17.31 c	17.21 c	72.30 c	76.80 c	41.60 c	37.20 c
HCP_{0-05}	0.79	0.74	8.53	7.92	3.25	2.96

Различные компоненты урожая гуавы измерялись в течение каждого вегетационного сезона для каждой обработки (Таблица 5). Компоненты урожая были значительно зависимы ($P< 0,05$) от систем орошения и водного режима.

Количество плодов на погонный метр составило 30,9; 27,6; 18,50; 34,60; 31,20 и 22,30 в результате обработок T_1E_1, T_1E_2, T_1E_3, T_2E_1, T_2E_2 и T_2E_3 соответственно для вегетационного сезона 2017/2018. Во втором вегетационном сезоне 2018/2019 эти значения составили 27,40; 23,80; 15,10; 32,60; 29,50 и 19,6 для тех же обработок (таблица 5). Длина плодов (см) составила 6,03; 5,77; 4,85; 6,52; 6,11 и 5,34 в результате обработок T_1E_1, T_1E_2, T_1E_3, T_2E_1, T_2E_2 и T_2E_3 соответственно для вегетационного сезона 2017/2018. В вегетационном сезоне 2018/2019 эти значения составили 5,82; 5,62; 4,50; 6,41; 6,01 и 5,21 для тех же обработок в вегетационный сезон 2018/2019 (таблица 5). Размер плода ($см^3$) составил 48,01, 42,19, 35,02, 65,01, 53,30 и 37,95 в результате обработок T_1E_1, T_1E_2, T_1E_3, T_2E_1, T_2E_2 и T_2E_3 соответственно в вегетационный сезон 2017/2018 и 42,19, 36,87, 33,24, 60,82, 48,33 и 31,52 в результате тех же обработок в вегетационный сезон 2018/2019 (таблица 5).

Вес плода (г) составил 48,22, 42,34, 35,62, 64,72, 52,81 и 38,15 в результате обработок T_1E_1, T_1E_2, T_1E_3, T_2E_1, T_2E_2 и T_2E_3 соответственно в вегетационный сезон 2017/2018 и 43,07, 36,90, 33,35, 61,07, 49,11 и 31,58 в результате тех же обработок в вегетационный сезон 2018/2019.

Урожайность дерева (кг/дерево) составила 44,08, 41,50, 35,42, 47,20, 45,42 и 38,46 в результате обработок T_1E_1, T_1E_2, T_1E_3, T_2E_1, T_2E_2 и T_2E_3 соответственно в вегетационный сезон 2017/2018 и 43,00, 39,71, 31,33, 46,04, 43,88 и 36,46 в результате тех же обработок в вегетационный сезон 2018/2019. Полученные результаты согласуются с данными, представленными [11, 5,19].

Таблица 5 - Влияние систем орошения и водного режима на урожай гуавы и его компоненты (Psidium Guajava L.) в течение вегетационных сезонов 2017/2018 и 2018/2019

Варианты обработки	Количество плодов / 1 м	Длина плода (см)	Диаметр плода (см)	Размер плода (см²)	Вес плода (г)	Урожайность (тонн/фед)	Урожайность (кг/дерево)
2017 / 2018							
T_1E_1	30.9 b	6.03 a	4.51 b	48.01 b	48.22 b	10.58 b	44.08 b
T_1E_2	27.6 bc	5.77 a	4.33 c	42.19 b	42.34 c	9.96 b	41.50 c
T_1E_3	18.5 e	4.85 b	4.06 c	35.02 c	35.62 c	8.50 d	35.42 e
T_2E_1	34.6 a	6.52 a	5.01 a	65.01 a	64.72 a	11.33 a	47.20 a
T_2E_2	31.2 b	6.11 a	4.67 b	53.30 a	52.81 b	10.90 a	45.42 a
T_2E_3	22.3 d	5.34 b	4.17 c	37.95 c	38.15 c	9.23 c	38.46 d
$HCP_{0.05}$	3.2	0.80	0.30	6.9	8.2	0.72	2.50
2018 / 2019							
T_1E_1	27.4 b	5.82 a	4.33 b	42.19 b	43.07 b	10.32 b	43.00 b
T_1E_2	23.8 c	5.62 b	4.13 c	36.87 c	36.90 c	9.53 c	39.71 c
T_1E_3	15.1 e	4.50 c	3.99 c	33.24 c	33.35 c	7.52 e	31.33 e
T_2E_1	32.6 a	6.41 a	4.88 a	60.82 a	61.07 a	11.05 a	46.04 a
T_2E_2	29.5 b	6.01 a	4.52 b	48.33 b	49.11 b	10.53 a	43.88 a
T_2E_3	19.6 d	5.21 b	3.92 c	31.52 c	31.58 c	8.75 d	36.46 d
$HCP_{0.05}$	2.9	0.75	0.25	6.20	7.8	0.68	2.34

Заключение. Полученные результаты в данном исследовании показали, что поверхностное капельное орошение в комбинации с 100% ET_c и 80% ET_c обеспечило более высокие урожай и компоненты урожая деревьев гуавы. Наибольшие значения длины побегов (см), числа листьев/м и площади листа (см²) были получены при обработке T_2E_1 (капельное орошение + 100% ET_c), в то время как наименьшие значения были зарегистрированы при обработке T_1E_3 (канава и 60% ET_c).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Abdel-Mawgowd, A.M.; El-Nemr, M.A.; Tantawy, A.S.; Habib, H.A. Alleviation of salinity effects on green bean plants using some environmental friendly materials. J. Appl. Sci. Res. 2010, 6, 871–878.

2. Badr, M.A.; Abou Hussein, S.D.; El-Tohamy, W.A.; Gruda, N. Efficiency of subsurface drip irrigation for potato production under different dry stress conditions. Gesunde Pflanzen 2010, 62, 63–70. [CrossRef]

3. Bisbis, M.B.; Gruda, N.; Blanke, M. Potential impacts of climate change on vegetable production and product quality—A review. J. Clean. Prod. 2018, 170, 1602–1620. [CrossRef]

2. Biswas, R.K., S.K. Rana, and S. Mallick. 1999. Performance of drip irrigation in papaya cultivation in new alluvium agro-climatic zone of West Bengal. Annals of Agri. Res., 20(1): 116-117.

3. Boora RS, Singh D, Siddiqui S, Verma SL (2002). Response of sapota to NPK fertilization. Haryana. J. Hort. Sci. 31:15-17.

4. D o o r e n b o s, J., P r u i t t , W. O. (1984): Guidelines for Predicting Crop Water Requirements. Irrigation and Drainage, Paper 24 FAO of UN, Rome, Italy. 7.

5. Darwish, K.H.; Safaa, M.; Momou, A.; Saleh, S.A. Egypt: Land degradation issues with special reference to the impact of climate change. In Combating Desertification in Asia, Africa and Middle East, Proven Practices; Heshmati, G.A., Squires, V.R., Eds.; Springer: Dordrecht, The Netherlands, 2013; Chapter 6; pp. 113–136.

6. El-Dakroury MAE. “Influence of different irrigation systems and treatments on productivity and fruit quality of some bean varieties”. M.Sc. Thesis, Faculty of Agriculture, Tanta University, Egypt (2008): 94.

7. FAO. 1998. Crop evapotranspiration, guidelines for computing crop water requirements. FAO Irrigation and Drainage Paper No. 56. Rome.

8. Farooq M., et al. “Plantdroughtstress: effects, mechanisms and management”. In: Lichtfouse, E., Navarrete, M Debaeke P., et al. “(Eds), Sustainable Agriculture Springer, Netherlands (2009): 153-188.

9. Kumar, A., H. K. Singh, N. Kumari, and P. Kumar. 2009. Effect of fertigation on banana biometric characteristics and fertilizer use efficiency.J. Agri. Engineering, ISAE., 46(1): 27-31.
10. Leilah AA. “Physiological response of onion to water stress and bio fertilizers”. M.Sc. Thesis, Faculty of Agriculture, Mansoura University, Egypt (2009): 121.
11. Michael, A.M. (1978). Irrigation theory and practice. Vikas Publishing House PVTLTD New Delhi, Bombay.
12. Mutava RN., et al. “Understanding abiotic stress tolerance mechanisms in soybean: A comparative evaluation of soybean response to drought and flooding stress”. Plant Physiol and Biochem 86(2015): 109-120.
13. Page, A.L. Edit. 1982. Methods of Soil Analysis. Part 2. American Society of Agronomy, Madison, Wisconsin , USA.
14. Patil PV, Patil VK (1999). Influence of different soil water regimes on root distribution in guava. J. Maharashtra. Agric. Univ. 24:45-47.
15. Quda, S. Major Crops and Water Scarcity in Egypt: Irrigation Water Management under Changing Climate; Springer: Cham, Switzerland, 2016; ISBN 978-3-319-21771-0.
16. Saleh, S.A.; El-Shal, Z.S.; Fawzy, Z.S.; El-Bassiony, A.M. Effect of water amounts on artichoke productivity irrigated with brackish water. Aust. J. Basic Appl. Sci. 2012, 6, 54–61.
17. Singh HK, Singh AKP, Sinha AK (2005). Effect of fertigation on fruit growth and yield of papaya with drip irrigation. Haryana. J. Hort. Sci. 34:7-8.
18. Singh, H. P., and G. Singh. 2007. Nutrient and water management in guava. Acta Hort., 735:389-398.
19. Vomocil, J.A. (1975). Measurements of soil bulk density and penetrability. A review of method Adv. Agron. 9, 159-176.
20. Zhang Ch and Z Huang. “Effects of endogenous abscisic acid, jasmonic acid, polyamines, and polyamine oxidase activity in tomato seedlings under drought stress”. Scientia Hort. 159 (2013): 172-177.

УДК 631.421
МРНТИ 68.05.01

Фарахат С. Могханм, Ph.D, https://orcid.org/0000-0003-3318-5358, fsaadr@yahoo.ca
Университет Кафрэльшейха, факультет Сельского хозяйства, кафедра Почв и воды, Египет
Рахимгалиева С.Ж., Ph.D, https://orcid.org/0000-0001-6344-4475, saule-ra@mail.ru,
Западно-Казахстанский аграрно-технический университет им. Жангир хана, Казахстан, 090000, Уральск, ул. Жангир хана
Есбулатова А.Ж., Ph.D, https://orcid.org/0000-0002-1386-7346, esbulatova76@mail.ru,
Западно-Казахстанский аграрно-технический университет им. Жангир хана, Казахстан, 090000, Уральск, ул. Жангир хана 51
Эль-Намас А.Э., Ph.D, https://orcid.org/0009-0000-0986-7338, elnamasashraf@gmail.com,
Александрийский университет, факультет Сельского хозяйства, кафедра Почв и воды,Александрия, Египет

Farahat S. Moghanm, Ph.D, https://orcid.org/0000-0003-3318-5358, fsaadr@yahoo.ca
Kafrelsheikh University, Faculty of Agriculture, Soil and Water Department, Kafr El-Sheikh 33516, Egypt
Rakhimgaliyeva Saule, Ph.D, https://orcid.org/0000-0001-6344-4475, saule-ra@mail.ru,
Zhangir khan West Kazakhstan Agrarian - Technical University, Kazakhstan, 090000, Uralsk, st. Zhangir Khan, 51
Esbulatova Altyn, Ph.D, https://orcid.org/0000-0002-1386-7346, esbulatova76@mail.ru,
Zhangir khan West Kazakhstan Agrarian - Technical University, Kazakhstan, 090000, Uralsk, st. Zhangir Khan, 51; e-mail:

El-Namas A.E., Ph.D, https://orcid.org/0009-0000-0986-7338, elnamasashraf@gmail.com,
Alex. University, Faculty of Agriculture, Soil and water department, Alexandria, Egypt

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГЕОИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ ВОЗМОЖНОСТИ ЗЕМЛИ ПРИ ОБСЛЕДОВАНИИ СЕВЕРНОЙ ДЕЛЬТЫ ЕГИПТА

APPLICATION OF GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEMS FOR LAND CAPABILITY ASSESSMENT IN DELTA AREA, EGYPT

АННОТАЦИЯ

Проблемы постоянно растущего населения и усиливающейся конкуренции за различные ресурсы, особенно в дельте Нила в Египте, создали огромное давление на сокращающиеся земельные ресурсы. Сельскохозяйственные земли в Египте ограничены, поэтому необходимо выявлять и сохранять их для сельскохозяйственного использования. Это исследование направлено на создание тематических карт свойств почвы и оценку возможностей земли с использованием Географической Информационной Системы (ГИС). Для достижения этой цели полевые работы, лабораторный анализ и спутниковые данные (изображения Landsat ETM+ и ASTER) были использованы в Географической Информационной Системе для определения форм рельефа и возможностей земли в исследуемой области. Репрезентативные образцы почвы были собраны в соответствии с формами рельефа, к югу от озера Буруллус, в северной части дельты Нила, Египет.

Почвенные таксономические единицы были определены как Aquallic Salorthids, Typic Haplosalids, Typic Torrifluvents и Vertic Torrifluvents. Их соответствующий процент площади составил 31,97, 13,48, 1,25 и 53,3% от общей площади соответственно. Доминирующими основными формами рельефа были пойменная равнина и озерная равнина (74,7, и 25,3% от общей площади).

Тематические слои для содержания $CaCO_3$ и глины, глубины водного горизонта (WT), электропроводности (EC), pH, показателя адсорбции натрия (SAR), органического вещества (OM) и объемной плотности (Bd) были созданы в ArcGIS 10.1 с использованием метода Обратного Взвешенного Расстояния (IDW). Эти слои были объединены для оценки классов возможностей земли. Полученные классы возможностей земли I, II, III и IV составляют 6,30, 28,95, 60,57 и 4,18% от общей площади исследования соответственно.

ANNOTATION

The ground realities such as fast-growing population, the stress toward reduced resource availability, and advanced environmental pressure to the land particularly felt in the Nile Delta of Egypt have imposed great stress on the land resources. As the land resources for agriculture are limited in Egypt, there is an urgent necessity to identify and conserve such lands for sustainable agriculture. Hence, this study aims at generating thematic maps of soil properties and assessing land capability using Geographic Information Systems (GIS). The integration of fieldwork, laboratory analyses, and satellite data (Landsat ETM+ and ASTER imagery) with GIS identified landforms and assessed land capability in a study area located south of the Burullus Lake in the Northern Nile Delta, Egypt. Representative soil samples have been collected based on different landform units.

The soil taxonomic units identified i.e., Aquallic Salorthids, Typic Haplosalids, Typic Torrifluvents, and Vertic Torrifluvents were found to occupy 31.97%, 13.48%, 1.25%, and 53.3% of the total area, respectively, within the study area. The predominant landforms are flood plains and lacustrine plains, which occupy 74.7% and 25.3% of the study area.

Thematic layers of soil properties, such as CaCO3, clay content, water table depth, electrical conductivity (EC), pH, sodium adsorption ratio (SAR), organic matter (OM), and bulk density, were prepared using the Inverse Distance Weighting (IDW) interpolation technique in ArcGIS 10.1. These layers were then integrated for the classification of land capability. The different broad

classes of land capability (Class I, Class II, Class III, and Class IV) occupied 6.3%, 28.95%, 60.57%, and 4.18% of the study area, in respective order.

***Ключевые слова**: почвы, оценка возможности земли, картографирование почвы, дистанционное зондирование, ГИС.*

***Key Words:** soils, land capability, soil mapping, GIS.*

Введение. Классификация возможностей земли - это система группировки почв, в основном основанная на их способности создавать обычные культивируемые сельскохозяйственные культуры без ухудшения в течение длительного периода времени.

В последние годы тематическое картографирование претерпело революцию в результате достижений в географической информационной науке и дистанционном зондировании. Для картографирования почвы часто достаточно архивных данных, которые доступны по низкой цене. Интеграция дистанционного зондирования в базу данных ГИС может снизить стоимость, сократить время и увеличить детальность информации, собранной для обследования почвы [1]. В частности, использование Цифровой Модели Рельефа (ЦМР) важно для получения атрибутов ландшафта, которые используются в характеристике форм рельефа [2, 3].

Возможность земли рассматривается как неотъемлемая способность земли функционировать на определенном уровне для общего использования. Другие люди рассматривают возможность как классификацию земли в основном в отношении опасностей деградации, в то время как некоторые рассматривают термины "пригодность" и "возможность" как взаимозаменяемые [4, 5].

Возможность земли относится к потенциалу земли поддерживать ряд предопределенных видов землепользования во встроенной нисходящей последовательности: пахотные культуры, пастбища, лесные угодья, отдых/дикая природа [6, 7].

Пространственный анализ определяется как аналитические методы, связанные с изучением местоположений географических явлений вместе с их пространственными измерениями и связанными с ними атрибутами [8]. Использование этой техники в оценке возможностей почвы позволяет создавать многотематические карты и определять ограничивающие факторы, в соответствии с которыми могут быть достигнуты подходящие предложения, чтобы понять, как обращаться с этими почвами для устойчивого сельскохозяйственного использования [9, 10].

Все методы интерполяции были разработаны на основе теории, что точки, расположенные ближе друг к другу, имеют больше корреляций и сходств, чем те, которые находятся дальше. В методе IDW предполагается, что скорость корреляций и сходств между соседями пропорциональна расстоянию между ними, которое можно определить как функцию обратного расстояния от каждой точки до соседних точек. Необходимый радиус и соответствующая мощность функции обратного расстояния рассматриваются как важная проблема этого метода. Главным фактором, влияющим на точность интерполяции обратного расстояния, является значение параметра мощности [10, 11].

Основная цель данного исследования - использование пространственного анализа и изображений Landsat ETM+ для получения детального картографирования почвы и оценки возможностей земли в северной дельте Египта.

Материалы и методы. Исследуемая область: Район исследования занимает северную часть дельты Нила в Египте (Рисунок 1) и простирается между долготой 30°35′ и 31°00′E и широтой 31°10′ и 31°28′N (Рисунок 2). Его общая площадь составляет 720 км², включая городские территории (6,25% от общей площади).

Климат исследуемой области засушливый и полузасушливый, характеризуется длинным жарким сухим летом, мягкой зимой с осадками, а также высоким испарением и относительной влажностью от умеренной до высокой степени.

Обработка изображений: Цифровая обработка изображений спутника Landsat 7.0 ETM^+, датированных 2022 годом, была выполнена с использованием программного обеспечения ENVI 5.0© [12] для классификации геоморфологических единиц. Процесс цифровой обработки изображения спутника «LandSat-7 ETM^+» с использованием программного комплекса ENVI 5.0 включала несколько операций: калибровку данных [13], манипуляцию данными (растяжение изображения, фильтрацию и сопоставление гистограмм); была проведена атмосферная коррекция для устранения шумов; ректификация спутниковых изображений, улучшение наземного разрешения с 28,5 м до 14,25 м. Методология слияния была проведена [14] с использованием программного обеспечения ENVI 4.7




Рисунок 1 - Местоположение исследуемой территории.




Рисунок 2 - Изображение Landsat ETM^+ исследуемой территории.

Создание Цифровой Модели Рельефа (ЦМР) ASTER из изображений ASTER 3n (надир) и 3b (обратный) уровня 1b датирована 2022 годом. Для улучшения точности 25 метров были использованы топографические карты масштаба 1:50000. Дополнительные точки высот, собранные с поля с помощью тотальной станции STONEX STS02 (точность 2 мм), были пространственно добавлены для получения ЦМР высокого разрешения (Рисунок 3)

Полевые работы и лабораторный анализ: Образцы почвы были собраны из 45 почвенных профилей, тщательно выбранных на основе карты классификации почв в исследуемой области летом 2022 года. Почвенные профили (Рисунок 4) были тщательно изучены и морфологически описаны в поле согласно системе, изложенной [15].

Физический анализ: Распределение размеров частиц было определено согласно [16]. Объемная плотность была определена [17].

Химический анализ: Электропроводность почвы (EC), растворимые катионы и анионы, $CaCO_3$, органическое вещество (OM), pH и показатель адсорбции натрия (SAR) были определены согласно [16].

Таксономия почвы: Почвы исследуемой области на уровне под великих групп были классифицированы согласно правилам Soil Taxonomy [18].

Создание карт. Метод Обратных Взвешенных Расстояний (IDW) предполагает, что значение z (непробной точки) является средневзвешенным по расстоянию от соседних известных точек [19]. Соседний радиус и связанная с ним мощность расстояния являются критическим вопросом в этом методе. Метод IDW используется на участках с достаточным количеством точек данных (не менее 14) и с подходящим распределением [11]. Это наиболее распространенный метод интерполяции в сельскохозяйственной практике [20].




Рисунок 3 - Поверхностная оценка исследуемой территории.




Рисунок 4 - Расположение почвенных профилей.

ArcGIS 10.1 с его расширением ArcGIS геостатистического и пространственного аналитика (IDW) был использован для создания тематических слоев для параметров почвы содержания $CaCO_3$ и глины, уровень грунтовых вод (WT), EC, pH, SAR, OM и объемной плотности (Bd). Методы интерполяции зависят от того факта, что более близкие точки более коррелированы и схожи [11]. Функция пространственного анализа была использована для реклассификации тематических слоев, и затем были оценены площади различных уровней параметров почвы.

Вышеуказанные классифицированные слои были использованы для оценки возможностей земли, где весовое значение считается одинаковым для всех параметров почвы. Была применена следующая формула:

(Ci) = A/100*B/100*C/100*D/100*E/100*F/100*G/100*H/100

Где Ci = Индекс возможности для орошения; A = содержание $CaCO_3$, B = содержание глины, C = уровень грунтовых вод, D = электропроводность, E = pH, F = показатель адсорбции натрия (SAR), G = органическое вещество (OM), H = объёмная плотность. Классы возможностей земли были определены с использованием рейтинга, разработанного [21].

Результаты и обсуждение. Согласно американской таксономии почвы и климатическим данным, исследуемая область характеризуется термическим режимом температуры почвы и засушливым режимом влажности почвы. По исследованиям некоторых авторов (Рисунок 5) изображения Landsat ETM+, Цифровая Модель Рельефа (ЦМР) и наземные наблюдения были использованы для определения физиографических единиц в исследуемой области [22].




Рисунок 5 - Физико-географическая карта исследуемой территории

По результатам исследования видно, что основными ландшафтами в исследуемой области являются пойменная равнина и реко-озёрная равнина. Пойменная равнина является основной формой рельефа в этой области, которая содержит различные формы рельефа умеренно высоких речных террас, изолированные холмы, переливной бассейн, переливная мантия и бассейн декантации. Их площади покрытия соответственно составляют 18,57, 14,8, 27,5, 2,09 и 26,79 %. Типы рельефа в пойменной равнине плоские и почти плоские. Эти почвы были классифицированы (Рисунок 6) как под-великие группы Типичные Торрифлювенты (Typic Torrifluvents), Вертикальные Торрифлювенты (Vertic Torrifluvents), Типичные Гаплосалиды (Typic Haplosalids) и Аквальные Салортиды (Aquallic Salorthids).




Рисунок 6 - Классификация почв исследуемой территории

Реко-озёрная равнина включает следующее: водно-болотные угодья, высохшее озерное ложе и сезонно затопляемые земли, и они представляют 6,5, 2,47 и 1,28 % от общей площади. Доминирующий тип рельефа в этой равнине плоский или почти плоский. Основной таксономической единицей в этом ландшафте является Аквальные салортиды [22].

Таблица 1 - Ранги и классы рейтинга различных характеристик почвы

Значения ранга	CaCO3 (%)	WT (cm)	Текстура почвы (класс)	EC (dS/m)	SAR	Bd gm/cm3	OM (%)	pH
0-0.01	--	--	--	--	--	--	--	--
0.01-0.6	>30	<60	S	>16	>40	<2	<0.5	>9.5
0.61-0.7	15.30	60-80	SiC, C	8-16	20-40	1.5-2	0.5-1	9-9.5
0.71-0.9	8-15	80-100	CL, LS	4-8	10-20	1.2-1.5	1-2	8-9
0.91-0.96	4-8	100-150	SL, CL	2-4	5-10	1-1.2	2-4	7.5-8
0.97-1	0-4	>150	L, Si, SCL	<2	<5	<1	<4	6-7.5

Оценка возможностей земли. Расширение ArcGIS 10.1, используется как метод пространственного анализа для оценки сельскохозяйственных возможностей земли. Формы рельефа исследуемой области были определены с использованием цифровой модели рельефа, изображений Landsat ETM^{+} и данных почвенного обследования. Созданная карта, представляющая формы рельефа, была импортирована в геобазу данных и рассматривалась как базовая карта.

Атрибутивные данные содержания глины и $CaCO_3$, уровня грунтовой воды (WT), электропроводности (EC), pH, показателя адсорбции натрия (SAR), органического вещества (OM) и условий объемной плотности (Bd) были проанализированы методом IDW и связаны с единицами оцифрованной геоморфологической карты в Географической Информационной Системе (ГИС). -Интерполяция Обратного Взвешенного Расстояния (Рисунок 7-15) придает вес точкам выборки, так что влияние одной точки на другую уменьшается с расстоянием от новой оцениваемой точки, для получения тематических слоев пространственного распределения вышеупомянутых характеристик.

Для характеристики почвы созданные слои включают информацию о подклассе возможностей и пространственном распределении. Полученные данные указывают, что основными ограничивающими факторами в исследуемой области были уровень грунтовых вод, засоление почвы, содержание глины, pH, SAR, органическое вещество и объёмная плотность.

Ограничивающие факторы уровень грунтовых вод, pH, OM, EC и содержания глины связаны с пойменной равниной, в то время как уровень грунтовых вод, pH, OM, EC, содержание глины, объемная плотность и SAR являются основными ограничивающими факторами в реко-озерной равнине. Эти результаты важны в исследуемой области, поскольку они показывают распространение ограничений продуктивности по всему региону.

Возможности земли были классифицированы на четыре класса (класс 1 - класс 4), которые представляют 6,3, 28,95, 60,57 и 4,18% соответственно от общей площади, согласно рейтинговым значениям (от 0 до 1), так как класс возможностей почвы равен 1, когда рейтинговое значение близко к 1. Интересно отметить, что высокоспособные почвы (класс 1 и класс 2) доминируют в пойменной равнине, а низкоспособные почвы (класс 4) доминируют в реко-озерной равнине около озера Буруллус.




Рисунок 7- Пространственное распределение содержания CaCO3




Рисунок 8- Пространственное распределение содержания глины.




Рисунок 9- Пространственное распределение насыпной плотности




Рисунок 10- Пространственное распределение электропроводности




Рисунок 11- Пространственное распределение содержания органического вещества





Рисунок 12- Пространственное распределение содержания pH






Рисунок 13- Пространственное распределение коэффициента адсорбции натрия	Рисунок 14- Пространственное распределение уровня грунтовых вод.




Рисунок 15- Возможности земель в исследуемой области

Заключение. Использование методов, метод обратного взвешенного расстояния полезен для определения классов возможностей земли для принятия интервенционных решений. Исследуемая область была классифицирована на классы I, II, III и IV. Большинство территории определено как Класс II и III, которые являются наиболее подходящими для сельского хозяйства, составляя 28,95 и 60,57 процентов. Класс IV является доминирующим классом, что соответствует 4,18 % от общей площади распространения. Класс IV наиболее подвержен деградации земель и имеет очень серьезные ограничения, т.е. засоление и глубина засоление почвы, поэтому в исследуемой области требуется тщательный выбор культур и сохранение уровня плодородия почвы.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Green, K., 1992. Spatial imagery and GIS: integrated data for natural resource management. J. For. 90: 32-36.

2. Brough, P.A., 1986. Principle of Geographical Information Systems for Land Resources Assessment. Oxford University Press, 194p.

3. Dobos, E.; Micheli, E.; Baumgardner, M.F.; Biehl, L. and Helt, T., 2000. Use of combined digital elevation model and satellite radiometric data for regional soil mapping. Geoderma. 97: 367-391.

4. FAO, 1976. A Framework for land evaluation. FAO, Rome.

5. El Refaey AA, Mohamed YI, El-Shazly SM, Abd El Salam AA (2022). Effect of salicylic and ascorbic acids foliar application on Picual olive trees growth under water stress condition. Egypt. J. Soil Sci., 62(1): 1–17.

6. Mohamed A.G.M., 2002. Corporation of remote sensing and information systems in water management geographic and land use planning in El-Hammam area, Northern coast of Egypt., Crete, Greece.

7. Romdhane L, Radhouane L, Farooq M, Cortivo CD, Panozzo A, Vamerali T (2020). Morphological and biochemical changes in maize under drought and salinity stresses in a semi-arid environment. Plant Biosyst., 154:396–404.

8. ESRI, 2001. Arc-GIS Spatial Analyst: Advanced-GIS Spatial Analysis Using Raster and Vector Data. ESRI, 380 New York, CA92373-8100 USA.

9. Ali, R.R. and Kotb M.M., 2010. Use of satellite data and GIS for soil mapping and capability assessment. Nature and Science, 8 (8):104-115.

10. Kareem MO, Shaibu AG, Samoura M, Dzomeku IK (2023). Yield and yield components of greenhouse cucumber as affected by irrigation regimes and growth media. Irrigat Drainage Sys Eng, Volume 12: (1) 34-41.
11. Yasrebi J, M Saffari, H Fathi, N Karimian (2009) Evaluation and comparison of ordinary Kriging and invers distance weighting methods for prediction of spatial variability of some soil chemical parameters. J. Biological Science 4(1): 93-102.
12. ITT (2012). ENVI software guide version 4.7, ITT Visual Information Solutions.
13. Lillesand T M, Kiefer R W, 2007. Remote sensing and image interpretation, 5th ed. Paper back September, John Wiley, New York. 2007: 820.
14. Ranchin T, Wald L (eds), 2000. Proceedings of the third conference -Fusion of Earth data: merging point measurements, raster maps and remotely sensed images", Sophia Antipolis, France, January 2000: 26-28, published by SEE/URISCA, Nice, France, 166 p.
15. FAO, 1990. Guidelines for soil profile description. 3rd edition (Revised), FAO, Rome.
16. Bandyopadhyay P., 2007. Soil Analysis. HARDCOVER ISBN- 13: 9788189729691. 2007; 286
17. Blake, G.R., and K.H. Hartge, 1986. Bulk Density. In A. Klute (ed.) Methods of Soil Analysis. Part 1 - Physical and Mineralogical Methods Second Edition. American Society of Agronomy, Madison WI.
18. USDA, 2010. Keys to Soil Taxonomy. United State Department of Agriculture, Natural Resources, Conservation Service (NRCS), Eleventh Edition.
19. Zare-Mehrjardi, M., Taghizadeh-Mehrjardi, R. and Akbarzadeh A., 2010. Evaluation of Geostatistical Techniques for Mapping Spatial Distribution of Soil PH, Salinity and Plant Cover Affected by Environmental Factors in Southern Iran Not Sci Biol 2 (4)2010, 92-103
20. Mishra, U (2009). Predicting Storage and Dynamics of Soil Organic Carbon at an Regional Scale. Thesis of Ph.D. Presented in partial Fulfillment of the requirement for the degree of Doctor of Philosophy in the Graduate. School of the Ohio Stst University.
21. FAO, 2007. Land Evaluation, towards a revised framework. FAO, Rome, Italy.
22. Darwish Kh. M. and W.A. Abdel Kawy, 2008. Quantitive Assessment of Soil Degradation in some Areas North Nile Delta, Egypt International Journal of Geology: 2 (2): 17-22.

УДК :633.88: 631.52
МРНТИ: 42,143:4

Begmatova M.Kh., Doctor PhD, Associate Professor, https://orcid.org/0009-0000-3342-043
Samarkand State University of Veterinary Medicine, Animal Husbandry and Biotechnology, 77 Mirzo Ulugbek Street, Samarkand, Malokhat_begmatova@mail.ru
Dustov B. S., Doctor PhD, https://orcid.org/0010-0000-3342-011
Samarkand State University of Veterinary Medicine, Animal Husbandry and Biotechnology, 77 Mirzo Ulugbek Street, Samarkand, beknazar.dustov@mail.ru
Akkereyeva Elmira, Master of Natural Sciences, https://orcid.org/0000-0002-6442-9020
NJSC «West Kazakhstan Agrarian and Technical University named after Zhangir khan», Uralsk, st. Zhangir khan 51, 090009, Kazakhstan, elmira.akkereeva.87@mail.ru

BIOLOGICAL BENEFITS OF ALDROVANDA VESICULOSAL
ALDROVANDA VESICULOSAL БИОЛОГИЯЛЫҚ ПАЙДАСЫ

ANNOTATION

It is known that the seasonality of agricultural work, the need to carry out agrotechnical measures within clearly defined periods, the almost complete lack of similarity of weather conditions from year to year, the sharp differences in soil and climatic conditions of each region,

and many other factors create many inconveniences in the development of technology for growing medicinal plants.

It should be noted that currently in our country, up to 42 species of medicinal plants are grown in specialized farms, farms, forests and other forms of ownership in order to provide the pharmaceutical industry and pharmacies with plant raw materials.

In the Russian Federation, Ukraine, Moldova, the Arab Republic of Egypt and a number of other countries, the cultivation of medicinal plants is somewhat well established. After gaining independence, the pharmaceutical industry of the Republic of Uzbekistan began to develop rapidly. Currently, the number of such enterprises is more than 70.

Therefore, it is necessary to provide this industry with sufficient raw materials of medicinal plants.

АҢДАТПА

Ауылшаруашылық жұмыстарының маусымдылығы, нақты белгіленген мерзімде агротехникалық іс-шараларды өткізу қажеттілігі, жылдан жылға ауа-райының ұқсастығының жоқтығы, әр аймақтың топырақ-климаттық жағдайындағы күрт айырмашылықтар және басқа да көптеген факторлар дәрілік өсімдіктерді өсіру технологияларын әзірлеуде көптеген қолайсыздықтар тудыратыны белгілі. Айта кету керек, қазіргі уақытта біздің елімізде фармацевтика өнеркәсібі мен дәріханаларды өсімдік шикізатымен қамтамасыз ету мақсатында мамандандырылған шаруашылықтарда, фермерлік шаруашылықтарда, ормандарда және басқа да меншік нысандарында дәрілік өсімдіктердің 42 түріне дейін өсіріледі. Ресей Федерациясында, Украинада, Молдовада, Египет Араб Республикасында және басқа да бірқатар елдерде дәрілік өсімдіктерді өсіру белгілі бір дәрежеде жолға қойылған. Тәуелсіздік алғаннан кейін Өзбекстан Республикасының фармацевтика өнеркәсібі қарқынды дами бастады. Қазіргі уақытта мұндай кәсіпорындардың саны 70-тен асады. Сондықтан бұл саланы дәрілік өсімдіктерден жеткілікті шикізатпен қамтамасыз ету қажет.

Key words: *California, humus, algae fertility, mud treatment, organic compounds from algae*.

Түйін сөздер: *Калифорния, қарашірік, балдырлардың құнарлылығы, балшықпен емдеу, балдырлардан органикалық қосылыстар*.

Introduction. In the Republic of Uzbekistan, medicinal plants were first cultivated in 1973 on farms in the Bostanlyk district of the Tashkent region. Later (in 1978), a farm named after Ibn Sino was established in the Pop district of the Namangan region to grow medicinal plants. Peppermint, medicinal marmarak (mavrak), medicinal marigold, na'matak, bitter wormwood (ermon), scaly ituzum, small-flowered tograykhan and other plants were grown on the fields of this farm. The products collected from them were sent to supply pharmacies of Uzbekistan, as well as to the Shymkent Chemical and Pharmaceutical Plant and other enterprises. Currently, special farms for the cultivation of medicinal plants have been established in Bukhara, Kashkadarya, Samarkand, Surkhandarya and Tashkent regions. Medicinal plant growing areas have been established under the "Pharmacy" production associations in almost all regions of our republic, where they grow the appropriate plants according to the requirements of regional pharmacies [24]. Currently, peppermint, medicinal marmarak (mavrak), medicinal marigold, medicinal chamomile, five-lobed lion's tail, pol-pola, na'matak and other medicinal plants are grown in the fields of the Okhunbobayev specialized farm specializing in medicinal plants in the Chirchik district of the Tashkent region [1,2].

Former senior research fellow of the Tashkent Botanical Garden of the Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan, Q. H. Khojayev, later head of the laboratory of cultivation and climate adaptation of medicinal plants of this garden, senior research fellow Yu. M. Murdakhayev, in collaboration with scientific staff of the pharmacognosy and botany departments of the Tashkent

Pharmaceutical Institute, managed to grow 67 types of medicinal plants brought from fraternal republics and other regions of the world in the climate of Tashkent. In their opinion, it is possible to grow cloves, peppermint, medicinal marmarak (mavrak), medicinal valerian, fennel (pharmacy dill), medicinal chamomile, black andiz, ajgon (cumin), dill, common dastarbas, na'matak species, shrubby amorpha, red angustifolia, spreading erysipelas, hemp species, Caucasian yam, Manchurian aralia, mountain jumrut, cassia species, patrinia, umumak, five-lobed lion's tail, medicinal rust, semi-shrubby securinega, wolfberry species, blackthorn species, belladonna, Mexican bangidevana, pol-pola, lobulated ituzum, confusing bozbang and other medicinal plants[5,6,7].

Currently, the reserves of medicinal plants growing naturally are decreasing due to human influence. In order to compensate for this and meet the needs of our people, it would be advisable to increase the number of medicinal plant species and plant them in irrigated regions, taking into account the soil and climatic conditions of Uzbekistan. In order to provide the pharmaceutical industry in Uzbekistan with raw materials from medicinal plants, it would be advisable to organize and increase the number of farms and specialized farms that will plant and grow medicinal plants in the coming years. The Strategy of Actions for the Further Development of the Republic of Uzbekistan includes the following resolutions: “Development of the pharmaceutical industry, provision of the population and medical institutions with affordable, high-quality medicines..” dated April 10, 2020 No. PQ-4670 “On measures for the protection, cultivation, processing and rational use of available resources of wild medicinal plants” and dated November 26, 2020 No. PQ-4901 “On measures to expand the scope of scientific research on the development of cultivation and processing of medicinal plants, the establishment of their seed production”, dated May 20, 2022 No. PQ-251 “On measures for the cultivation and processing of medicinal plants and their widespread use in treatment” and other regulatory legal acts related to this activity. These plants determine the scientific significance and relevance of research in implementing the tasks set out in the documents[8,9].

Materials and methods. The experiments are being conducted at the scientific experimental seed-growing multidisciplinary farm named after “Naynavo Oqshomi” in the Shahrikhan district. Nurmatov Sh., et al., Methodological manual “Methods of conducting field experiments”. UzPITI.- Tashkent, 2007.-146 used [3,4].

Results of the research. The scientific experimental seed-growing multidisciplinary farm named after “Naynavo Okshomi” in the Shahrikhan district has been conducting scientific research on the rare Algae Aldrovanda vesiculosa L., a water plant belonging to the Drozera family, which is rare in the waters of Uzbekistan, for several decades. It is 5-10 centimeters tall, sometimes up to 10 meters long, 3-5 millimeters between the joints, 6-9 leaves, with hairs on both sides of the leaf, and flowers are located one by one in a flower cluster protruding from between the leaves. It blooms in June-August[12,13,14].

This algae is rootless, grows together and lives on the surface of freshwater bodies. It reproduces very quickly. More than 5 tons of organic fertilizer are produced from algae grown in a 10-acre water body. Organic fertilizer is very easy to produce. The seaweed is filtered from the water, dried in a sunny place for several days, ground in a special grinder, stored in a cool place, and then applied to the soil of the desired agricultural crops using machinery at the right time[28,29]. It has been proven in practice that the effectiveness of this organic fertilizer is several times higher than the humus produced by the California earthworm (in terms of biologically active micro and macro elements in its composition). Because if 5 tons of humus are required to be applied to one hectare of land, it is enough to apply 1.8-2.0 tons of fresh seaweed organic fertilizer. Since its production is three to four times cheaper than humus, the cost of agricultural products grown is significantly reduced, as a result of which farmers benefit more [25,26,27].

The main task of fresh seaweed is to purify secondary polluted water, it absorbs all the toxic substances in the water and purifies the water. If the purified water is used to irrigate agricultural crops, its yield has been proven in practice to increase significantly, that is, by 15-20 percent, because we have used the purified water to irrigate wheat and cotton in the fields of the farm, as a

result, the yield of grain and cotton has increased by 17 percent compared to the previous ones[10,11,15]. To restore human health from algae, folk medicine uses mud treatment, which is a treatment using organic compounds that are broken down by algae. Algae contain iodine and cobalt [17,16,18].

They are rich in these elements because they grow in freshwater bodies. It is known that frogs live in freshwater bodies along with algae. Frogs prevent water pollution and provide water with iodine by secreting iodine [19,20]. Iodine enters the thyroid gland, providing thyroxine, protein metabolism, accelerates the absorption of calcium and phosphorus, and increases the body's resistance to infectious diseases and poisons [21,22,23].




Figure 1 – The development cycle of Aldrovanda vesiculosa l

Conclusion. Aldrovanda vesiculosa L. is a plant that grows on the surface of freshwater bodies of water and reproduces very quickly. More than 5 tons of organic fertilizer are produced from algae grown in a 10-acre water body. Organic fertilizer is very easy to produce, the algae are filtered from the water, dried in a sunny place for several days, crushed in a special grinder and stored in a cool place, and at the right time, they are applied to the soil of the desired agricultural crops using machinery.

REFERENCES

1. Mirziyoyev Sh.M. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 28 yanvardagi “2022-2026 yillarga mo’ljallangan yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to’g’risida PF-60-sonli farmoni Toshkent. 2022.
2. Mirziyoyev Sh.M. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 20 apreldagi PQ-2911-son “Respublika farmatsevtika sanoatini jadal rivojlantirish uchun qulay shart-sharoitlar yaratish chora-tadbirlari to‘g’risida”gi qarori. Toshkent. 2017.
3. Begmatova M.X., Elmurodov, A.A. Shernazarov Sh.Sh. Nurniyozov A.A., // Dorivor o‘simliklar yetishtirish texnologiyasi fanidan amaliy mashg’ulotlar uchun o‘quv qo‘llanma. Toshkent-2023. “Fan ziyosi”B-24
4. Nurmatov Sh, Mirzajonov Q, Avliyokulov A, Bezborodov, Akhmedov Zh, Teshaev Sh, Niyozaliev B, Kholikov B, Khasanov F, Mallaboev N, Tillabekov B, Ibragimov N, Abdullaev Sh, Shamsiev A, "Dala tajribalarini utkazish uslublari" uslubiy qullanma. ЎzPITI.- Toshkent, 2007.- 146 p.
5. H.X.Xolmatov Z.H. Habibov,N.Z. Olimxo‘jayeva O‘zbekistonning shifobaxsh o‘simliklari.Toshkent. 1991b.28.
6. Q.H.Hojimatov,K.Y. Yo‘ldoshev, U.Sh.Shog’ulomov, O.Q. Hojimatov. Shifobaxsh giyohlar dardlarga malham.Toshkent 1995.b 24.

7. H.X.Xolmatov Z.H. Habibov,N.Z. Olimxo‘jayeva O‘zbekistonning shifobaxsh o‘simliklari. Toshkent. 1991b.28.

8. Q.H.Hojimatov,K.Y. Yo‘ldoshev, U.Sh.Shog’ulomov, O.Q. Hojimatov. Shifobaxsh giyohlar dardlarga malham. Toshkent 1995.b 24.

9. Begmatova M. Kh. Teshik bargli dalachoy (biolik hususiyatlari, kimyoviy tarkibi, etishtirish tekhnologii) // Monograph. SamDCHTI. Samarqand-2022.b-8-10 10 Begmatova M. Kh., Dzhumaeva M., Khasanova G. Biology and medicinal properties of promising medicinal plants. – 2023. – Т. 16. – №. 5. – P. 53-57.

10. Hamdamov, I., Hamdamova, E. I., Suvonova, G. A., & Begmatova, M. Botanika va o‘simliklar fiziologiyasi. Botanika qismi) Toshkent-2017 y, 245-247.

11. Begmatova M. et al. Technology of Cultivation of Medicinal Preparation “Hypericum Perforatum I” //E3S Web of Conferences. – EDP Sciences, 2024. – Т. 510. – С. 01020

12. Aldrovanda // A — Engobe. Moscow, Soviet Encyclopedia Publ., 1969. — (The Great Soviet Encyclopedia: [in 30 vols.] / Editor-in-Chief A. M. Prokhorov; 1969—1978, vol.

13. Gubanov I. A. 705. Aldrovanda vesiculosa L. — Aldrovanda vesiculosa // Illustrated Guide to Plants of Central Russia: in 3 vols. / I. A. Gubanov, K. V. Kiseleva, V. S. Novikov, V. N. Tikhomirov. — M. : Tovarishchestvo nauch. Ed. KMK : In-t technol. Research, 2003. — T. 2 : Angiosperms (dicotyledons: separate-petaled). — P. 341. — 666 p. — 3000 copies. — ISBN 5-87317-128-9.

14. Ivanov Yu.A. Accelerated method of determining the mass of 1000 seeds. Breeding and seed production. - 1977, No 3.- P. 64-67. 14 Methods of State Variety Testing of Agricultural Products. Cultures. Issue 1. General part. Moscow. "Kolos", 1974, p. 476.

15. Mineeva V.G. Praktikum po agrokhimii [Workshop on agrochemistry]. Moscow University Publishing House, 1989, - 304p. 16 Murovin. E.A. and Durigie. Practicum on Agrochemistry. Moscow: "Kolos", 2005. – 288 p.

16. Urovin E.N., Obukhovskaya L.V., Romanova V. Practicum on Agrochemistry, Moscow. "Kolos", 2008 -238S.

17. Cross, A. Adamec, L. "Aldrovanda vesiculosa". IUCN Red List of Threatened Species. 2020

18. "Aldrovanda vesiculosa L." Plants of the World Online. Royal Botanic Gardens, Kew. Retrieved 11 August 2023

19. Huber, H. (1961). "Aldrovanda". In Hegi (ed.). Illustrierte Flora von Mitteleuropa. Vol. IV (2a) (2nd ed.). Munich: Carl Hanser Verlag. pp. 18–20.

20. Degreef, J. D. (1997). "Fossil Aldrovanda". Carnivorous Plant Newsletter. 26 (3): 93–97. doi:10.55360/cpn263.jd244.

21. Jump up to:[a b c d e f] Cross, A. (2012). "Aldrovanda, The Waterwheel Plant". Carnivorous Plants of Britain and Ireland. Dorset, UK: Redfern Natural History Productions.

22. Jump up to:[a b] Renault, Marion (2019-08-13). "This Carnivorous Plant Invaded New York. That May Be Its Only Hope". The New York Times. ISSN 0362-4331. Retrieved 2020-10-02.

23. Aston, H. I. (1983). "Aldrovanda vesiculosa L.". Flora of Australia. Vol. 8. pp. 64–66.

24. Komiya, S. (1966). "A report on the natural habitat of Aldrovanda vesiculosa found in Hanyu City". Amatores Herb. 27. Kobe, Japan: 5–13.

25. Ashida, J. 1934, Studies on the leaf movement of Aldrovanda vesiculosa L. I. Process and mechanism of the movement. Mem. Coll. Sci. Univ. Kyoto Ser. B 9: 141-244.

26. Ashida, J. 1935, Studies on the leaf movement of Aldrovanda vesiculosa L. II. Effect of mechanical, electrical, thermal, osmotic and chemical influences. Mem. Coll. Sci. Univ. Kyoto Ser. B 11: 55-113.

27. Diels, L. 1906, Droseraceae, in Das Pflanzenreich 26 (IV, 112): 1-136, Leipzig.

28. Adamec, L. (2000-03-01). "Rootless Aquatic Plant Aldrovanda Vesiculosa: Physiological Polarity, Mineral Nutrition, and Importance of Carnivory". Biologia Plantarum. 43 (1): 113–119.

29. Adamec, Lubomír; Kovářová, Milena (2006-12-01). "Field growth characteristics of two aquatic carnivorous plants, Aldrovanda vesiculosa andUtricularia australis". Folia Geobotanica. 41 (4): 395–406.

РЕЗЮМЕ

Известно, что сезонность сельскохозяйственных работ, необходимость проведения агротехнических мероприятий в четко определенные сроки, изменчивость погодных условий по годам, резкие различия почвенно-климатических условий каждого региона и многие другие факторы создают немало неудобств при освоении технологии возделывания лекарственных растений. Следует отметить, что в настоящее время в нашей стране в целях обеспечения фармацевтической промышленности и аптек растительным сырьем выращивается до 42 видов лекарственных растений на специализированных фермах, в фермерских хозяйствах, лесхозах и других формах собственности. Выращивание лекарственных растений достаточно хорошо развито в Российской Федерации, Украине, Молдове, Арабской Республике Египет и ряде других стран. После обретения независимости фармацевтическая промышленность Республики Узбекистан стала развиваться быстрыми темпами. В настоящее время число таких предприятий превышает 70. В связи с этим необходимо обеспечить данную отрасль достаточным количеством лекарственного растительного сырья.

УДК 633.2:636.085
МРНТИ 68.35.47; 68.05.43; 87.35.29

Беккалиев А.К., PhD доктор, и.о. доцента, основной автор, https://orcid.org/0000-0001-9850-452X
НАО «Западно-Казахстанский аграрно-технический университет имени Жангир хана», 090009, ул.Жангир хана 51, г.Уральск, Республика Казахстан, Nurbolat-z86@mail.ru
Беккалиева А.К., магистр с.х. наук, https://orcid.org/0000-0002-9718-2060
НАО «Западно-Казахстанский аграрно-технический университет имени Жангир хана», 090009, ул.Жангир хана 51, г.Уральск, Республика Казахстан, aidyn_kanatovna@mail.ru
Байбатырова М.А., магистр, http://orcid.org/0000-0002-7940-626X
НАО «Западно-Казахстанский аграрно-технический университет имени Жангир хана», 090009, ул.Жангир хана 51, г.Уральск, Республика Казахстан, baibatyrovamadina@mail.ru
Өкшебаев А.Е., магистр технологии перерабатывающих производств, PhD докторант, https://orcid.org/0009-0008-4574-6734
НАО «Западно-Казахстанский аграрно-технический университет имени Жангир хана», 090009, ул.Жангир хана 51, г.Уральск, Республика Казахстан, okshebaev@mail.ru
Мейрамгалиев Ж.Ж., магистрант, https://orcid.org/0009-0007-8930-1297
НАО «Западно-Казахстанский аграрно-технический университет имени Жангир хана», 090009, ул.Жангир хана 51, г.Уральск, Республика Казахстан, joniboytb@gmail.com
Жумин Б.М., соискатель https://orcid.org/0009-0001-8760-6974
НАО «Западно-Казахстанский аграрно-технический университет имени Жангир хана», 090009, ул.Жангир хана 51, г.Уральск, Республика Казахстан, zhumin@mail.ru

Bekkaliyev A.K., PhD, Acting Associate Professor, the main author, https://orcid.org/0000-0001-9850-452X
Zhangir khan West Kazakhstan Agrarian-Technical University, 090009, Uralsk. st. Zhangir Khan, 51, Republic of Kazakhstan, bekkaliev_askhat@mail.ru

Bekkaliyeva A.K., Master of Agricultural Sciences, https://orcid.org/0000-0002-9718-2060
Zhangir khan West Kazakhstan Agrarian-Technical University, 090009, Uralsk. st. Zhangir Khan, 51, Republic of Kazakhstan, aidyn_kanatovna@mail.ru
Baibatyrova M.A., master's degree, http://orcid.org/0000-0002-7940-626X
Zhangir khan West Kazakhstan Agrarian-Technical University, 090009, Uralsk. st. Zhangir Khan, 51, Republic of Kazakhstan, baibatyrovamadina@mail.ru
Okshebayev A.E., master of Technology in Processing Industries, PhD doctoral student, https://orcid.org/0009-0008-4574-6734
Zhangir khan West Kazakhstan Agrarian-Technical University, 090009, Uralsk. st. Zhangir Khan, 51, Republic of Kazakhstan, okshebaev@mail.ru
Meiramgaliev Zh.Zh., master student. https://orcid.org/0009-0007-8930-1297
Zhangir khan West Kazakhstan Agrarian-Technical University, 090009, Uralsk. st. Zhangir Khan, 51, Republic of Kazakhstan, joniboytb@gmail.com
Zhumin B.M., applicant, https://orcid.org/0009-0001-8760-6974
Zhangir khan West Kazakhstan Agrarian-Technical University, 090009, Uralsk. st. Zhangir Khan, 51, Republic of Kazakhstan, zhumin@mail.ru

ИЗУЧЕНИЕ СЕЗОННЫХ ПАСТБИЩ ЗАПАДНОГО КАЗАХСТАНА
STUDY OF SEASONAL PASTURES OF WESTERN KAZAKHSTAN

АННОТАЦИЯ

Результаты проведенного исследования позволяют сделать вывод, что разработанные и рекомендуемые технологии выпаса, по сравнению с технологией интенсивного «без отдыха» пастбищ, положительно влияет на биометрические индикаторы пастбищ, повышая доли листьев в структуре урожая до 25,12-46,47%, высоты травостоя до 26,50-37,25 см при проективном покрытий растительности до 65-88%. В технологиях использования сезонных и внутрисезонных пастбищных участков в системе пастбищеоборота за счет «отдыха» на полупустынных пастбищах Западного Казахстана урожайность пастбищ восстановилась с 0,37 до 0,82 т/га с гарантированным выходом питательных веществ из расчета 0,10-0,18 т/га кормовых единиц, при сборе бездефицитного уровня энерго-протеиновой ценности пастбищного корма – 0,014-0,019 т/га переваримого протеина и 1,97-2,37 ГДж/га обменной энергии. Вклад проведенных исследований заключается в том, что разработанные и рекомендуемые технологии выпаса с.х. животных может быть применена учеными и фермерами, занимающимися сохранением, восстановлением и повышением эффективности использования и управления пастбищных экосистем, что приведет к производству устойчивой, качественно-безопасной и конкурентоспособной животноводческой продукции.

ANNOTATION

The results of the study allow us to conclude that the developed and recommended grazing technologies, compared with the technology of intensive "without rest" pastures, have a positive effect on the biometric indicators of pastures, increasing the proportion of leaves in the crop structure to 25.12-46.47%, the height of the herbage to 26.50-37.25 cm with a projective vegetation coverage to 65-88%. In the technologies of using seasonal and intra-seasonal pasture plots in the pasture management system, due to "rest" on semi-desert pastures in Western Kazakhstan, pasture yields recovered from 0.37 to 0.82 t/ha with guaranteed nutrient yield at the rate of 0.10–0.18 t/ha of feed units, when collecting a deficiency-free level of energy and protein value of pasture feed - 0.014-0.019 t/ha of digestible protein and 1.97-2.37 GJ/ha of metabolic energy. The contribution of the conducted research lies in the fact that the developed and recommended technologies for grazing farm animals can be applied by scientists and farmers involved in the conservation, restoration and improvement of the efficiency of use and management of pasture ecosystems, which will lead to the production of sustainable, quality-safe and competitive livestock products.

Ключевые слова: *пастбища, сезонные пастбища, продуктивность пастбищ, деградированные пастбища, показатели растительного покрова.*

Key words: *pastures, seasonal pastures, pasture productivity, degraded pastures, indicators of plant cover.*

Введение. Деградация пастбищ часто является результатом чрезмерной эксплуатации путем интенсивного выпаса скота [1]. Интенсивный выпас скота по-прежнему остается важной проблемой на пастбищных угодьях мира. Это - убыточное предложение как с финансовой, так и с биологической точки зрения, при которой растительность подвергаются многократной, сильной дефолиации без достаточного физиологического времени восстановления, удаляется пороговые количества биомассы и подстилки, вызывается обнажение почвы [2]. Поэтому для обеспечения долгосрочной устойчивости пастбищ необходимо внедрять методы управления выпасом, которые улучшают функционирование почвы и растительности экосистем и их устойчивость [3].

На протяжении многих лет пастбища полупустынной зоны Западного Казахстана использовались местными жителями как инструмент самообоеспения и продовольственной безопасности, однако на сегодняшний день нет документально подтвержденных данных исследований о влиянии технологии выпаса с.х. животных с использованием сезонных и внутрисезонных пастбищных участков на важные индикаторы биометрии и продуктивности растительности пастбищных экосистем в зоне исследований. Это становится одним из основных пробелов в устойчивом управлении пастбищами путем сбалансирования их потенциальных возможностей и поддержания продуктивности для обеспечения с.х. животных полноценными кормами. Таким образом, целью данного исследования определено оценить современное состояний растительности пастбищных угодий полупустынной зоны Западного Казахстана в зависимости от воздействий основных фактора - выпаса с.х. животных на пастбищах на сезонных и внутрисезонных пастбищных участках.

Материалы и методы исследования. Наша руководящая гипотеза заключается в том, что производства различных видов полноценных кормов в пастбищных угодьях посредством совершенствования технологии выпаса скота являются гарантом повышения эффективности отрасли животноводства и преобразования продовольственных, сельскохозяйственных систем Казахстана.

Для оценки современного состояния растительности пастбищных экосистем в зависимости от технологии выпаса с.х. животных проведен полевой опыт на базе крестьянского хозяйства «Мирас» полупустынной зоны Западного Казахстана с использованием принятых современных методик и ГОСТ-ов

Результаты исследования. Исследования ученых в разных странах мира подтвердили нецелесообразности использования безсистемного интенсивного выпаса с.х. животных на пастбищах, так как данный прием очень отрицательно сказывается на индикаторах биометрии, урожайности травостоев пастбищных экосистем, а также на качестве и питательной ценности пастбищного корма, что также подтверждается данными наших предыдущих и новых исследований [4].

Исследования ученых также указывает на то, что из биометрических показателей пастбищ наиболее значимым является высота травостоя, так, при увеличении высоты травостоя до 20-30 см установлено повышение продуктивности с.х. животных. В то же время ученые отметили, что интенсивный выпас с извлечением основной биомассы пастбищ увеличивая индивидуальные показатели скота и качество туши, способствует снижению индикаторных биометрических показателей пастбищ такие как высота травостоя, проективное покрытие, а также урожайность и качество пастбищного корма [5, 6].

Как показали эксперименты, технологии выпаса с.х. животных оказывают заметное влияние количественно-качественные показатели пастбищных экосистем, особенно использования технологии интенсивного выпаса с.х. животных из-за повышения нагрузки на пастбищную среду оказывает отрицательное воздействия и на урожайности травостоев [7, 8]. В проведенных нами исследованиях в результате использования интенсивной технологии отмечено снижения высоты растительности до 22 см, что повлияло снижению урожайности зеленой массы пастбищного участка до 0,37 т/га, что ниже на 0,17-0,42 т/га или на 31,48-53,16% по сравнению с использованием технологии выпаса с.х. животных на участках сезонных пастбищ весна, лето и осень, где высота растительности составила 26,50; 32,50 и 35,756 см или на4,5; 10,5 и 13,75 см выше по сравнению с контролем (интенсивный выпас). В тоже время исследования выявила эффективность использования выпаса с.х. животных на внутрисезонных пастбищных участках. Так, при такой технологии высота пастбищных растений составила 27,75; 33,90 и 37,25 см или выше по сравнению с вариантом интенсивной технологии выпаса на 5,75; 11,90 и 15,25 см и при указанной технологии урожайность пастбищ также была высокой и составила 0,55; 0,72 и 0,82 т/га, что по сравнению с контролем (интенсивный выпас) выше на 0,18; 0,35 и 0,42 т/га или на 32,73; 48,61 и 51,22%. Данные тенденции связаны с улучшением биометрических индикаторов пастбищ, такие как высота и проективное покрытие травостоев из-за снижения нагрузки на растительность и отчуждения биомассы пастбищ в результате предоставленного отдыха при ротации пастбищ [3]. Что также указывает на взаимосвязь урожайности с высотой травостоев пастбищ.




Рисунок 1 - Диаграмма рассеяния зависимости урожайности зеленой массы пастбищ от высоты растительности при разных технологиях выпаса с.х. животных

Из рисунка 1 видно, что урожайность зеленой массы увеличивается в зависимости увеличения показателя высота травостоя. Прослеживается зависимость уровня урожайности от способов использования пастбищ. Модель значима на уровне p-level <0.001.

Управление пастбищами является одним из основных факторов, связанных с производством и питательной ценностью кормов. Чрезмерно низкая высота пастбища

значительно снижает долю листьев растений и потребление корма животными [9], а также урожайность пастбищ [10].

В текущем исследовании мы также наблюдали более низкую долю листьев, когда пастбища находились под управлением интенсивного выпаса по сравнению с использованием сезонных и внутрисезонных пастбищных участков. Поскольку пропорция и площадь листьев являются основными факторами, определяющими рост урожайности пастбищного корма [11]. Так, при интенсивном выпасе в результате более длительного и активного отчуждения биомассы установлено снижение облиственности растений пастбищ до 22,00%, что в свое очередь отразилось наряду с биометрическими индикаторами (высота, проективное покрытие) и на урожайности пастбищ. Именно, при такой интенсивной технологии выпаса нами установлена самая низкая урожайность пастбищ – 0,37 т/га.

Томич и др. (2004) сообщили об корреляции между высотой растения и соотношением листьев к стеблю [12]. В исследованиях использования сезонных и внутрисезонных пастбищных участков (весна, лето и осень) из-за предоставления отдыха и возможности восстановления пастбищным растениям выявлена увеличения высоты травостоев и в результате повышения доли листьев в урожае (облиственности) до 26,50; 32,50 и 35,75% при выпасе с.х. животных в сезонных пастбищах весна, лето и осень, а также до 27,75; 33,90 и 37,25% при технологии выпаса скота на внутрисезонных пастбищных участках (весна, лето и осень). И в исследованиях увеличение доли листьев в урожае коррелировало с повышением урожайности травостов пастбищ. Например, на сезонных пастбищах повышение облиственности по сравнению с пастбищами интенсивного выпаса (контроль) с 22,00 до 26,50-35,75% или на 4,5-13,72% способствовало увеличению урожайности зеленой массы пастбищной травы до 0,24-0,79 т/га или на 31,48-53,16%.




Рисунок 2 - Диаграмма рассеяния зависимости урожайности зеленой массы пастбищ от облиственности растительности

Из рисунка 2 видно, что урожайность зеленой массы увеличивается в зависимости увеличения показателя облиственности растительности. Прослеживается зависимость уровня урожайности от способов использования пастбищ. Модель достаточно приближена к реальным данным - коэффициент детерминации по данной модели равен 94 %. Модель

значима на уровне p-level <0.001. Урожайность = 0.161 + Облиственность*0.014, R2=0.94, p<0.001.

Более высокое влияние облиственности растений на урожайность пастбищного травостоя заметны на вариантах использования внутрисезонных пастбищных участков. Так, на указанных вариантах при повышении облиственности с 22,00 до 27,75-37,25% или на 5,75-15,25% по сравнению с пастбищами интенсивного выпаса (контроль), урожайность травостоев пастбищ вырос до 0,55-0,82 т/га, что превышает уровень урожайности контрольных пастбищ, где скот выпасается интенсивно на 32,73-54,88%. Эти преимущества зависят от надлежащего управления пастбищами, которое обеспечивает удовлетворительную продуктивность животных, обеспечивает достаточное количество растительных остатков для защиты почвы и способствует возобновлению роста пастбищ [13, 14, 15].

Заключение. Для улучшения энергетико-белковой ценности пастбищных фитоценозов полупустынной зоны Западно-Казахстанской области целесообразно использовать ротационные пастбища, что является лучшим подходом к устойчивому управлению ими.

Благодарности. Данное исследование было профинансировано Министерством сельского хозяйства Республики Казахстан в рамках НТП BR22883585 «Разработка эффективных технологий повышения продуктивного потенциала и рационального использования пастбищ».

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Hoque M. Sustainable livestock production and biodiversity // In Emerging issues in climate smart livestock production. [Текст] / M.Hoque, S.Mondal, D.Bisht // Academic Press. - 2022. - С.91-108.

2. Teague W.R. Grazing management impacts on vegetation, soil biota and soil chemical, physical and hydrological properties in tall grass prairie [Текст] / W.R.Teague, S.L.Dowhower, S.A.Baker, N.Haile, P.B.DeLaune, D.M.Conover // Agriculture Ecosystems and Environment. - 2011. - № 141. - С.310-322.

3. Havstad K.M. Ecological services to and from rangelands of the United States [Текст] / K.M.Havstad, D.P.C.Peters, R.Skaggs, J.Brown, B.Bestelmeyer, E.Fredrickson // Ecol. Econ. - 2007. - №.64. - С.261-268. DOI: 10.1016/j.ecolecon.2007.08.005

4. Nasiyev B. The Study Of The Processes, Degradation Factors And The Selection Of Crops For The Restoration Of Bioresourses Capacity Of The Grassland Of SemiDesert Zones [Текст] / B.Nasiyev [и др.] // Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences (ISSN09758585-India-Scopus). - 2016. - №7(3). - С.2637-2646.

5. Lopes M.L.T. Sistema de integração lavoura-pecuária: desempenho e qualidade da carcaça de novilhos superprecoces terminados em pastagem de aveia e azevém manejada sob diferentes alturas. [Текст] / M.L.T.Lopes, P.C.F.Carvalho, I.Anghinoni, D.T.Santos, F.Kuss, F.K.Freitas, J.P.C. Flores // Cienc. Rural. - 2008. - 38. - С.178 -184.

6. Rocha L.M.R. Desempenho e características das carcaças de novilhos superprecoces em pastos hibernais submetidos a intensidades de pastejo. [Текст] / L.M.R.Rocha, P.C.F.Carvalho, C.Baggio, I.Anghinoni, M.L.T.Lopes, S.Macari, J.L.S.Silva // Pesq. Agropec. Bras. - 2011. - 46. - С.1379 -1384.

7. Jiwei W. Effects of grazing on the allocation of mass of soil aggregates and aggregate-associated organic carbon in an alpine meadow [Текст] / W.Jiwei, Zh.Chengzhang, Zh.Lianchun, W.Jun, L.Qun // Plos One. - 2020. - Т.11.

8. Neff J.C. Multi-decadal impacts of grazing on soil physical and biogeochemical properties in southeast Utah [Текст] / J.C.Neff, R.L.Reynolds, J.Belnap, P.Lamothe // Ecological Applications. - 2005. - Т.15. - С.87-95. DOI:10.1890/04-0268

9. Amaral M.F. Sward structure management for a maximum short term intake rate in annual ryegrass [Текст] / M.F.Amaral, J.C.Mezzalira, C.Bremm // Grass and Forage Science. – 2013. - T.68. - C.271–277.

10. Mezzalira J.C. Rotational grazing management in a tropical pasture to maximize the dairy cow's herbage intake rate [Текст] / J.C.Mezzalira, P.C.F.Carvalho, M.F.Amaral, C.Bremm, J.K.Trindade, E.N.Gonçalves, T.C.M.Genro, R.W.S.M.Silva // Arquivo Brasileiro de Medicina Veterinária e Zootecnia. - 2013. - T.65. - №.3. - C.833-840.

11. Nasiyev B. Influence of Cattle Grazing Methods on Changes in Vegetation Cover and Productivity of Pasture Lands in the Semi-Desert Zone of Western Kazakhstan [Текст] / B.Nasiyev, A.Karynbayev, M.Khiyasov, A.Bekkaliyev, N.Zhanatalapov, M.Begeyeva, A.Bekkaliyeva, V.Shibaikin // International Journal of Design & Nature and Ecodynamics. - 2023. - 18(4). - C.767-774.

12. Tomich T.R. Forage potential of sorghum sudangrass hybrids [Текст] / T.R.Tomich, J.A.S.Rodrigues, R.G.P.Zomich, L.C.Goncalves, I.Borges // Arquivo Brasileiro de Medicina Veterinária e Zootecnia. – 2004. - T.56. - C.258-263.

13. Francine Damian da Silva. Pasture grazing intensity and presence or absence of cattle dung input and its relationships to soybean nutrition and yield in integrated crop - livestock systems under no-till [Текст] / Francine Damian da Silva, Telmo Jorge Carneiro Amado, Christian Bredemeier, Carolina Bremm, Ibanor Anghinoni, Paulo Cesar de Faccio Carvalho. // European Journal of Agronomy. - 2014. - T.57. - C.84-91.

14. Paulo César De Faccio Carvalho. Managing grazing animals to achieve nutrient cycling and soil improvement in no-till integrated systems [Text] / Paulo César De Faccio Carvalho., Ibanor Anghinoni., Anibal de Moraes., Edicarlos Damacena Souza. // Nutrient Cycling in Agroecosystems. - 2010. - 88(2). - P.259-273.

15. Anghinoni I. Nutrient Cycling in Integrated Crop - Livestock Systems [Текст] / I. Anghinoni, J. Assmann, A. Martins, S. Costa, P. Carvalho // Synergismus scyentifica UTFPR. - 2011.

REFERENCES

1. Hoque M. Sustainable livestock production and biodiversity // In Emerging issues in climate smart livestock production. [Text] / M. Hoque, S. Mondal, D.Bisht // Academic Press. - 2022. - P.91-108.

2. Teague W.R. Grazing management impacts on vegetation, soil biota and soil chemical, physical and hydrological properties in tall grass prairie [Text] / W.R.Teague, S.L.Dowhower, S.A.Baker, N.Haile, P.B.DeLaune, D.M.Conover // Agriculture Ecosystems and Environment. - 2011. - №.141. - P.310-322.

3. Havstad K.M. Ecological services to and from rangelands of the United States [Text] / K.M.Havstad, D.P.C.Peters, R.Skaggs, J.Brown, B.Bestelmeyer, E.Fredrickson // Ecol. Econ. - 2007. - №.64. - P.261-268. DOI: 10.1016/j.ecolecon.2007.08.005

4. Nasiyev B. The Study Of The Processes, Degradation Factors And The Selection Of Crops For The Restoration Of Bioresourses Capacity Of The Grassland Of SemiDesert Zones [Text] / B.Nasiyev [and etc.] // Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences (ISSN09758585-India-Scopus). - 2016. - №7(3). - P.2637-2646.

5. Lopes M.L.T. Sistema de integração lavoura-pecuária: desempenho e qualidade da carcaça de novilhos superprecoces terminados em pastagem de aveia e azevém manejada sob diferentes alturas. [Text] / M.L.T.Lopes, P.C.F.Carvalho, I.Anghinoni, D.T.Santos, F.Kuss, F.K.Freitas, J.P.C. Flores // Cienc. Rural. - 2008. - 38. - P.178 -184.

6. Rocha L.M.R. Desempenho e características das carcaças de novilhos superprecoces em pastos hibernais submetidos a intensidades de pastejo. [Text] / L.M.R.Rocha, P.C.F.Carvalho, C.Baggio, I.Anghinoni, M.L.T.Lopes, S.Macari, J.L.S.Silva // Pesq. Agropec. Bras. - 2011. - 46. - P.1379 -1384.

7. Jiwei W. Effects of grazing on the allocation of mass of soil aggregates and aggregate-associated organic carbon in an alpine meadow [Text] / W.Jiwei, Zh.Chengzhang, Zh.Lianchun, W.Jun, L.Qun // Plos One. - 2020. - V.11.

8. Neff J.C. Multi-decadal impacts of grazing on soil physical and biogeochemical properties in southeast Utah [Text] / J.C.Neff, R.L.Reynolds, J.Belnap, P.Lamothe // Ecological Applications. - 2005. - V.15. - P.87-95. DOI:10.1890/04-0268

9. Amaral M.F. Sward structure management for a maximum short term intake rate in annual ryegrass [Text] / M.F.Amaral, J.C.Mezzalira, C.Bremm // Grass and Forage Science. – 2013. - V.68. - P.271–277.

10. Mezzalira J.C. Rotational grazing management in a tropical pasture to maximize the dairy cow's herbage intake rate [Text] / J.C.Mezzalira, P.C.F.Carvalho, M.F.Amaral, C.Bremm, J.K.Trindade, E.N.Gonçalves, T.C.M.Genro, R.W.S.M.Silva // Arquivo Brasileiro de Medicina Veterinária e Zootecnia. - 2013. - V.65. - №3. - P.833-840.

11. Nasiyev Beybit. Influence of Cattle Grazing Methods on Changes in Vegetation Cover and Productivity of Pasture Lands in the Semi-Desert Zone of Western Kazakhstan [Text] / B.Nasiyev, A.Karynbayev, M.Khiyasov, A.Bekkaliyev, N.Zhanatalapov, M.Begeyeva, A.Bekkaliyeva, V.Shibaikin // International Journal of Design & Nature and Ecodynamics. - 2023. - 18(4). - P.767-774.

12. Tomich T.R. Forage potential of sorghum sudangrass hybrids [Text] / T.R.Tomich, J.A.S.Rodrigues, R.G.P.Zomich, L.C.Goncalves, I.Borges // Arquivo Brasileiro de Medicina Veterinária e Zootecnia. – 2004. - V.56. - P.258-263.

13. Francine Damian da Silva. Pasture grazing intensity and presence or absence of cattle dung input and its relationships to soybean nutrition and yield in integrated crop - livestock systems under no-till [Text] / Francine Damian da Silva, Telmo Jorge Carneiro Amado, Christian Bredemeier, Carolina Bremm, Ibanor Anghinoni, Paulo Cesar de Faccio Carvalho. // European Journal of Agronomy. - 2014. - V.57. - P.84-91.

14. Paulo César De Faccio Carvalho. Managing grazing animals to achieve nutrient cycling and soil improvement in no-till integrated systems [Text] / Paulo César De Faccio Carvalho., Ibanor Anghinoni., Anibal de Moraes., Edicarlos Damacena Souza. // Nutrient Cycling in Agroecosystems. - 2010. - 88(2). - P.259-273.

15. Anghinoni I. Nutrient Cycling in Integrated Crop - Livestock Systems [Text] / I. Anghinoni, J. Assmann, A. Martins, S. Costa, P. Carvalho // Synergismus scyentifica UTFPR. - 2011.

ТҮЙІН

Жүргізілген зерттеу нәтижелері жайылымдардың қарқынды "тынығусыз" технологиясымен салыстырғанда маусымдық және маусым ішілік жайылым технологиялары жайылымдардың биометриялық индикаторларына оң әсер етеді, өнім құрылымындағы жапырақ үлесін 25,12-46,47%-ға дейін, шөптің биіктігін 26,50-37,25 см-ге дейін, өсімдік жамылғысының проективті жабындысымен 65-88% - ға дейін арттырады деген қорытынды жасауға мүмкіндік береді. Батыс Қазақстанның жартылай шөлейтті жайылымдарында "демалу" есебінен жайылым айналымы жүйесінде маусымдық және маусымішілік жайылымдық учаскелерді пайдалану технологияларында жайылымдардың өнімділігі 0,37-ден 0,82 т/га-ға дейін, қоректік заттардың жем бірлігі 0,10 – 0,18 т/га, қорытылатын протеин деңгейі -0,014 -0,019 т/га, ал алмаспалы энегрия жиыны ,97-2,37 ГДЖ/га дейін артты. Жүргізілген зерттеулердің үлесі мынада: Ауыл шаруашылығы жануарларын жаюдың әзірленген және ұсынылған технологияларын жайылымдық экожүйелерді сақтау, қалпына келтіру және пайдалану мен басқарудың тиімділігін арттырумен айналысатын ғалымдар мен фермерлер қолдана алады, бұл тұрақты, сапалы-қауіпсіз және бәсекеге қабілетті мал шаруашылығы өнімдерін өндіруге әкеледі.

УДК 68.35
МРНТИ: 68.35.47

Булеков Тулеген Ахметович, кандидат сельскохозяйственных наук, **основной автор,** https://orcid.org/0000-0001-5975-3232
ТОО «Уральская сельскохозяйственная опытная станция», Республика Казахстан, г. Уральск, ул. Бараева 6, ucxoc.1914@mail.ru
Кузембаев Мирдос Оразбаевич, магистр сельскохозяйственных наук, «https://orcid.org/ 0000-0001-5975-3232»
ТОО «Уральская сельскохозяйственная опытная станция», Республика Казахстан, г. Уральск, ул. Бараева, 6, ucxoc.1914@mail.ru
Бекеев Жаскайрат Галимович, специалист-зоотехник, https://orcid.org/ 0000-0001-5975-3232
ТОО «Уральская сельскохозяйственная опытная станция», Республика Казахстан, г. Уральск, ул. Бараева 6, ucxoc.1914@mail.ru

Bulekov Tulegen Akhmetovich, Candidate of Agricultural Sciences, **the main author**, https://orcid.org/ 0000-0001-5975-3232
«Ural agricultural experimental station» LLP, Republic of Kazakhstan, Uralsk Baraev street, 6. ucxoc.1914@mail.ru
Kuzembaev Mirdos Orazbaevich, Master of Agricultural Sciences https://orcid.org/ 0000-0001-5975-3232.
«Ural agricultural experimental station» LLP, Republic of Kazakhstan, Uralsk Baraev street, 6. ucxoc.1914@mail.ru
Bekeev Jaskayrat Galimovich, zootechnician-specialist, https://orcid.org/ 0000-0001-5975-3232.
«Ural agricultural experimental station» LLP, Republic of Kazakhstan, Uralsk Baraev street, 6. ucxoc.1914@mail.ru

ТЕХНОЛОГИЯ ПОСЕВА СУДАНСКОЙ ТРАВЫ ДЛЯ ПОЛУПУСТЫННОЙ ЗОНЫ ЗАПАДНОГО КАЗАХСТАНА
TECHNOLOGY OF SOWING SUDAN GRASS FOR THE SEMI-DESERT ZONE OF WESTERN KAZAKHSTAN

АННОТАЦИЯ

Цель данной работы заключалась в разработке и научном обосновании приёмов посева суданской травы, обеспечивающих высокую кормовую продуктивность в условиях полупустынной зоны Западного Казахстана. В статье приведены результаты исследований за 2023–2024 гг. Опыты закладывали на базе КХ «М.Буранбаев» расположенного в Бокейординском районе Западного Казахстана были изучены приемы посева суданской травы с высоким потенциалом продуктивности для производства питательных кормов в кормовых угодьях полупустынной зоны Западного Казахстана. Изучали сорт суданской травы Кинельская 100. Изучали технологию посева после осенней обработки бороной дисковой тяжелой (БДТ-6) и посев сеялкой зерновой дисковой (СЗП-3,6), прямой посев сеялкой культиваторного типа (СКП-2,1). Результаты исследований показали, что Посевы суданской травы после обработки почвы орудием БДТ способ посева для полу-пустынной зоны показал, что сеялка зерновая дисковая (СЗП) была лучше по продуктивности, питательности и энерго-протеиновая ценности увеличился в среднем на 0,18 ц/га. Наибольшая урожайность 15 ц/га была получена в варианте посева сеялкой СЗП-3,6 на фоне основной обработке боронами дисковыми тяжелыми (БДТ-6). Посевы суданской травы после обработки почвы орудием БДТ способ посева для полупустынной зоны показал, что

сеялка зерновая дисковая (СЗП) была лучше по продуктивности, питательности и энерго-протеиновая ценности.

ANNOTATION

The purpose of this work was to develop and scientifically substantiate methods of sowing Sudan grass, ensuring high forage productivity in the semi-desert zone of Western Kazakhstan. The article presents the results of research for 2023-2024. The experiments were carried out on the basis of the M. Buranbayev farm located in the Bokeyordinsky district of Western Kazakhstan. The methods of sowing Sudan grass with high productivity potential for the production of nutritious feed in the forage lands of the semi-desert zone of Western Kazakhstan were studied. The variety of Sudan grass Kinelskaya 100 was studied. The technology of sowing after autumn cultivation with a heavy disc harrow (BDT-6) and sowing with a grain disc seeder (SZP-3.6), direct sowing with a cultivator-type seeder (SKP-2.1) were studied. The results of the research showed that Sowing of Sudan grass after soil processing with the BDT tool, the sowing method for the semi-desert zone showed that the grain disc seeder (SZP) was better in productivity, nutritional value and energy-protein value increased by an average of 0.18 c/ha. The highest yield of 15 c/ha was obtained in the sowing option with the SZP-3.6 seeder against the background of the main processing with heavy disc harrows (BDT-6). Sowing of Sudan grass after soil cultivation with the BDT tool; the sowing method for the semi-desert zone showed that the grain disc seeder (GDS) was better in productivity, nutritional value and energy-protein value.

Ключевые слова: *суданская трава, сорго, урожайность, зеленая масса, минимальной технологии*.

Key words: *Sudan grass, sorghum, yield, green mass, minimum technology*.

Введение. Следует сказать, что сложившаяся практика пастбищепользования в последние 45-50 лет в этих зонах страны по своей сути является нерациональной и антиэкологичной. Помимо непосредственного сверхнормативного использования пастбищных ресурсов, серьезный урон природным пастбищам наносит нерациональное природопользование, связанное с промышленной, транспортной, строительной и другими видами антропогенной деятельности [1,2]. В настоящее время большая часть пастбищных экосистем серьезно нарушена. Ветровой эрозии подвержены 60% пастбищных земель, более 50% почв в той или иной степени засолены [3,4].

Все негативные процессы вызвали обеднение биоразнообразия, снижение продуктивности природных пастбищных экосистем и, как следствие этого, ухудшение кормовой базы пастбищного животноводства и качества жизни населения, проживающего в Западном Казахстане [5]. Такое состояние пастбищных экосистем в аридных районах Казахстана выдвигает задачу разработки адаптивных систем ускоренного восстановления биоразнообразия, флороценотического потенциала аридных экосистем, повышения их продуктивности и улучшения окружающей среды как материальной основы устойчивого развития животноводства на Западе Казахстана [6,7].

Суданская трава является одной из наиболее ценных однолетних культур, удачно сочетающих в себе высокую продуктивность и питательную ценность кормовой массы, а также хорошую отважность [8]. Засухоустойчивость, высокая урожайность, хорошее качество зелёной массы и сена, способность быстро отрастать после скашивания или стравливания – всё это характеризует суданскую траву как весьма ценную кормовую культуру [9,10]. Эта культура пригодна для приготовления сена, сенажа, травяной муки, силоса, использования на зелёный корм и выпас. По урожайности сена суданская трава превосходит другие однолетние кормовые культуры [11]. Благодаря своим биологическим свойствам, высокой продуктивности и кормовым достоинствам (в 1 кг зеленой массы содержится 0,20–0,22 корм. ед., 28 г переваримого протеина, 17,6–18,5 г углеводов, 7 г жира) суданская трава возделывается во многих регионах Казахстана [12,13].

В Казахстане в связи с участившимися засухами в первой половине лета появилась необходимость во внедрении в производство засухоустойчивых культур. [14]. Благодаря своим биологическим особенностям суданская трава способна противостоять засухам и продуктивно использовать осадки второй половины лета. Поэтому изучение и разработка приемов посева суданской травы являются актуальными задачами [15].

Цель работы. Разработка и научное обоснование приёмов посева суданской травы в условиях полупустынной зоны Западного Казахстана. Задача исследований определить влияние приёмов посева суданской травы на продуктивность, питательность и сбор сухого вещества [16].

Материал и методы. Разработка технологии возделывания адаптивных видов кормовых культур, устойчивых к условиям аридного климата для развития животноводства в полупустынной зоне Западного Казахстана. Была проведена на базе КХ «М.Буранбаев» расположенного в Бокейординском районе Западного Казахстана.

Изучали сорт суданской травы Кинельская 100.

Изучали технологию посева после осенней обработки бороной дисковой тяжелой (БДТ-6) и посев сеялкой зерновой дисковой (СЗП-3,6) вариант -А; прямой посев сеялкой (СКП2,1) вариант- Б.

Результаты. Перед посевом травосмеси многолетних трав общее содержание продуктивной влаги в метровом слое почвы: на варианте естественных пастбищ было в пределах 87,5 мм; на варианте посев суданской травы для пастбищного использования – 133,2-165,3 мм.

Запасы влаги перед посевом были высокими на всех вариантах, что обеспечило хорошее развитие в начальный период вегетации. Высокая температура (превышение среднесуточной температуры воздуха против среднемноголетней на 4 ^{0}С) и низкая влажность воздуха, снизило содержание продуктивной влаги (мм) в метровом слое почвы.

Содержание продуктивной влаги перед посевом суданской травы в метровом слое почвы в зависимости от технологии посева в 2023 году: на варианте СЗП-3,6 было в пределах 43,1мм, на варианте СКП-2,1 - 32,7 мм, в 2024году: на варианте посев СЗП-3,6 было в пределах 60,4мм, на варианте прямой посев СКП-2,1 – 54,3 мм (Таблица 1).

Таблица 1 – Содержание продуктивной влаги (мм) в метровом слое почвы под посевами суданской травы в полупустынной зоне Западного Казахстана.

Время отбора	Технология посева			
	сеялка зерновая дисковая (СЗП-3,6)		сеялка культиваторного типа (СКП2,1).	
	2023г	2024г	2023г	2024г
Весна	43,1	60.4	32,7	54.3
Осень	2,6	10.4	3,9	8.5

*Технология посева А- сеялка зерновая дисковая (СЗП-3,6); Б – сеялка культиваторная (СКП-2,1)

По продуктивности, питательности и энерго-протеиновая ценности суданской травы, способ посева для полупустынной зоны показал, что сеялка зерновая дисковая (СЗП) была лучше по продуктивности на 22,7%, питательности кормовых единиц на 22,6 и энерго-протеиновая ценности на 23% (Таблица 2).

Таблица 2 – Продуктивность, питательность и энерго-протеиновая ценность суданской травы, в условиях в полупустынной зоне Западного Казахстана

Показатели	Технология посева			
	сеялка зерновая дисковая (СЗП-3,6)		сеялка культиваторного типа (СКП-2,1).	
	2023г	2024г	2023г	2024г

Урожайность, ц/га	12,0±0,3	15±0,5	10,0±0.2	12±0,4
Кормовые единицы, ц/га	8,16	10,2	6,80	8,2
Переваримый протеин, ц/га	1,04	1,2	0,87	0,96
Обменная энергия, Дж/га	10,92	13,65	9,10	10,92
Технология посева обработка БДТ посев А- сеялка зерновая дисковая (СЗП-3,6); Б – прямой посев (СКП2,1). НСР05 для фактора: А- 0,1; Б-0,2				

Заключение Посевы суданской травы после обработки почвы орудием БДТ способ посева для полупустынной зоны показал, что сеялка зерновая дисковая (СЗП) была лучше по продуктивности на 22,7%, питательности кормовых единиц на 22,6% и энерго-протеиновая ценности на 23%.

Благодарности. Исследования выполнены в рамках НТП ПЦФ МСХ BR22883585 «Разработка эффективных технологий повышения продуктивного потенциала и рационального использования пастбищ».

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Магомедов К.Г., Магомедов М.К. Минеральное питание и продуктивность суданской травы // Современные проблемы науки и образования. – 2005. – № 1. – С. 13–15.

2. Нелюбина, Ж.С. Суданская трава – в условиях засушливого лета // Агропром Удмуртии. – 2011. – № 12. – С. 38–39.

3. Павлюк Н.Т., Булавский А.А., Каширский А.К., Совершенствование приемов возделывания суданской травы на семена // Вестник Воронежского государственного аграрного университета. – 2013. – № 2. – С. 93–96.

4. Таранич Ю.В., Увилина В.А. Агроэкологическое сортоиспытание суданской травы в условиях юга Сахалина // Кормопроизводство. – 2015. – № 8. – С. 28–31.

5. Федоренко Н.А., Карпенко Е.Г., Чебочаков Е.Я., Суданская трава на семена в Хакасии // Кормопроизводство. – 2004. – № 12. – С. 25–28.

6. Жанаталапов Н.Ж., Насиев Б.Н. Сроки посева, сроки уборки и пастбищный режим использования суданской травы // Ғылым және білім. - 2019. - №4 (57). Т2. - С.27-32.

7. Насиев Б. Н. Подбор одновидовых и смешанных посевов многолетних трав для восстановления биоресурсного потенциала кормовых угодий полупустынной зоны // Кормопроизводство. – 2015. – № 3. – С. 12-15.

8. Буянкин В. И., Манаенков А. С., Лиманская В. Б. Повышение продуктивности деградированных земель засушливой зоны – Волгоград : Федеральный научный центр агроэкологии, комплексных мелиораций и защитного лесоразведения Российской академии наук, 2019. – 156 с.

9. Ковтунова Н. А. Биологические особенности роста и развития суданской травы // Достижения науки и техники АПК. 2016. Т. 30. № 6. С. 48-51.

10. Куколева С. С. Скрининг сортообразцов суданской травы в условиях Саратовской области // Зерновое хозяйство России. 2016. № 4. С. 8-11.

11. Мардваев Н. Б. Некоторые технологические аспекты выращивания суданской травы на семена в сухостепной зоне Бурятии // Вестник ИрГСХА. 2018. № 89. С. 7-15.

12. Алабушев А.В., Горпиниченко С.И., Ковтунова Н.А., Яценко В.А., Попов А.С. Экологическое испытание новых сортов суданской травы селекции ФГБНУ «ВНИИЗК им. И. Г. Калиненко» // Научная жизнь. 2017. № 4. С. 28-34.

13. Шарко Н.С., Шатрыкин А.А. Изучение сортов суданской травы с целью подбора пар для скрещивания // Научно-агрономический журнал. 2023. № 3 (122). С. 68-74.

14. Undersander, D. Sorghums, Sudangrass, and Sorghum-Sudan Hybrids // Focus on Forage. Madison University of Wisconsin Board of Regents. 2003. № 5. P. 5.

15. Агафонов В.А. (2021). Суданская трава в агроценозах – надежный источник кормов в Прибайкалье // Вестник КрасГАУ. № 9. С. 38–44. DOI: 10.36718/1819-4036-2021-9-38-44.

16. Антимонов А.А., Сыркина Л.Ф., Косых Л.А., Антимонова О.Н. (2018). Селекционная ценность перспективных сортов суданской травы в ФГБНУ «Поволжский НИИСС» // Известия Самарского научного центра РАН. № 2. С. 2–4.

REFERENCES

1. Magomedov K.G., Magomedov M.K., Mineral nutrition and productivity of Sudan grass // Modern problems of science and education. - 2005. - No. 1. - P. 13-15.

2. Nelyubina, Zh.S. Sudan grass – in conditions of a dry summer // Agroprom of Udmurtia. – 2011. – No. 12. – P. 38–39.

3. Pavlyuk N.T., Bulavskiy A.A., Kashirskiy A.K., Improving the methods of cultivating Sudan grass for seeds // Bulletin of the Voronezh State Agrarian University. - 2013. - No. 2. - P. 93-96.

4. Taranich Yu.V., Chuvilina V.A., Agroecological variety testing of Sudan grass in the conditions of southern Sakhalin // Forage production. - 2015. - No. 8. - P. 28-31.

5. Fedorenko N.A., Karpenko E.G., Chebochakov E.Ya., Sudan grass for seeds in Khakassia // Forage production. - 2004. - No. 12. - P. 25-28.

6. Zhanatalapov N.Zh., Nasiev B.N. Sowing dates, harvesting dates and pasture regime of Sudan grass use // Gylym zhane bilim. - 2019. - No. 4 (57). T2. - P.27-32.

7. Nasiev B. N. Selection of single-species and mixed crops of perennial grasses to restore the bioresource potential of forage lands in the semi-desert zone // Forage production. - 2015. - No. 3. - P. 12-15.

8. Buyankin V. I., Manaenkov A. S., Limanskaya V. B., Increasing the productivity of degraded lands in the arid zone - Volgograd: Federal Scientific Center for Agroecology, Integrated Land Reclamation and Protective Afforestation of the Russian Academy of Sciences, 2019. - 156 p.

9. Kovtunova N. A. Biological features of growth and development of Sudan grass // Achievements of science and technology of the agro-industrial complex. 2016. Vol. 30. No. 6. P. 48-51.

10. Kukoleva S. S. Screening of Sudan grass varieties in the conditions of the Saratov region // Grain economy of Russia. 2016. No. 4. P. 8-11.

11. Mardvaev N. B. Some technological aspects of growing Sudan grass for seeds in the dry steppe zone of Buryatia // Bulletin of the Irkutsk State Agricultural Academy. 2018. No. 89. P. 7-15.

12. Alabushev A.V., Gorpinichenko S.I., Kovtunova N.A., Yatsenko V.A., Popov A.S. Ecological testing of new varieties of Sudan grass bred by the I.G. Kalinenko All-Russian Research Institute of Plant Growing Crops // Scientific Life. 2017. No. 4. P. 28-34.

13. Sharko N.S., Shatrykin A.A. Study of Sudan grass varieties for the purpose of selecting pairs for crossing // Scientific and Agronomic Journal. 2023. No. 3 (122). P. 68-74.

14. Undersander, D. Sorghums, Sudangrass, and Sorghum-Sudan Hybrids // Focus on Forage. Madison University of Wisconsin Board of Regents. 2003. No. 5. P. 5.

15. Agafonov V.A. (2021). Sudan grass in agrocenoses is a reliable source of feed in the Baikal region // Bulletin of KrasGAU. No. 9. pp. 38–44. DOI: 10.36718/1819-4036-2021-9-38-44.

16. Antimonov A.A., Syrkina L.F., Kosykh L.A., Antimonova O.N. (2018). Breeding value of promising varieties of Sudan grass in the Volga Region Research Institute of Seed Breeding // Bulletin of the Samara Scientific Center of the Russian Academy of Sciences. No. 2. P. 2–4.

ТҮЙІН

Бұл жұмыстың мақсаты Батыс Қазақстанның жартылай шөлейт аймағы жағдайында жоғары жем өнімділігін қамтамасыз ететін судан шөптерін егу әдістерін әзірлеу және ғылыми негіздеу болды. Мақалада 2023–2024 жылдарға арналған зерттеу нәтижелері

берілген. Тәжірибе Батыс Қазақстанның Бөкейорда ауданында орналасқан «М.Буранбаев» шаруа қожалығының базасында жүргізілді; Батыс Қазақстанның жартылай шөлейт аймағының мал азықтық алқаптарында құнарлы жем өндіру үшін өнімділігі жоғары судандық шөпті егу әдістері зерттелді. Біз судандық «Кинельская 100» шөп сортын зерттедік. Ауыр дискілі тырмамен (БДТ-6) күзгі өңдеуден кейін және дәнді дискілі сепкішпен (СЗП-3,6), культиватор типті сепкішпен (СКП-2,1) тікелей себуден кейінгі себу технологиясын зерттедік. Зерттеу нәтижелері көрсеткендей, БДТ құралымен топырақты өңдегеннен кейін судан шөбін егу, жартылай шөлді аймақ үшін себу әдісі дәнді дискі сепкіштің (СЗП) өнімділігі, тағамдық құндылығы және энергия-белоктық құндылығы бойынша орташа есеппен 0,18 ц/га артқанын көрсетті. Ауыр дискілі тырмалармен (БДТ-6) негізгі өңдеу фонында СЗП-3,6 сепкішпен себу нұсқасында 15 ц/га ең жоғары өнім алынды. БДТ құралымен топырақты өңдегеннен кейін судан шөбін егу, жартылай шөлді аймаққа арналған себу әдісі дәнді дискі сепкіштің (СЗП) өнімділігі, өнімділік құндылығы және энергия-белоктық құндылығы жағынан жақсырақ екенін көрсетті.

УДК: 634.717+581.43
МРНТИ: 68.35.29

Валиева Шоира Абдивоситовна, PhD, https://orcid.org/0009-0003-3900-0104
Ташкентский государственный аграрный университет, Узбекистан, г. Ташкент, улица Университетская 2, sh_valiyeva@tdau.uz

Valieva Shoira Abdivositotovna, PhD, https://orcid.org/0009-0003-3900-0104
Tashkent State Agrarian Universit. 2, Universitet Street, Tashkent, Republic of Uzbekistan, sh_valiyeva@tdau.uz

ВЛИЯНИЕ СТИМУЛЯТОРОВ НА УКОРЕНЕНИЕ ЗЕЛЁНЫХ И ПОЛУДРЕВЕСНЫХ ЧЕРЕНКОВ ЯГОДНЫХ КУЛЬТУР (НА ПРИМЕРЕ ЕЖЕВИКИ)

THE EFFECT OF STIMULATORS ON THE ROOTING OF GREEN AND SEMI-WOODY CUTTINGS OF BERRY PLANTS (A CASE STUDY ON BLACKBERRY)

АННОТАЦИЯ

В статье представлены результаты исследования по использование стимуляторов укоренения для укоренения и вегетативном размножении саженцев ежевики (Rubus fruticosus L) в почвенно-климатических условиях Ташкентской области, Узбекистан. Объектом исследования служили черенки без шиповых сортов ежевики (Rubus fruticosus L) ‘Natchez’ и ‘Chester’ с использованием зеленных и полу-древесных черенков. В исследовании описано влияние стимуляторов корнеобразование на процесс укоренения растений. В опытах использовались стимуляторы роста растений: «Корневин» (контроль), «Янтарная кислота», «Радифарм» и «Грин Белт». Изучалась эффективность этих препаратов по показателю укореняемости черенков в разные сроки – через 10, 20 и 30 суток после обработки. Результаты показали, что применение «Радифарма» и «Грин Белт» способствовало значительному повышению процента укоренения по сравнению с контролем. Особенно высокая эффективность была отмечена у препарата «Радифарм», который обеспечил до 96 % укоренения у сорта ‘Chester’. Таким образом, использование современных стимуляторов роста позволяет значительно повысить эффективность черенкования ежевики и может быть рекомендовано для широкого применения в условиях Узбекистана. В Узбекистане ежевика считается ценным лекарственным и декоративным растением. Однако наличие многочисленных шипов на стеблях усложняет процесс сбора урожая. По этому данной исследование размножав гибридные без шипового сорта

ежевики можно будет создать промышленные плантации ягодных культур и пополнять потребительскую корзину.

ANNOTATION

The article presents the results of a study on the use of rooting stimulators for the rooting and vegetative propagation of blackberry seedlings (Rubus fruticosus L) in the soil and climatic conditions of the Tashkent region, Uzbekistan. The object of the study was cuttings of thornless blackberry varieties (Rubus fruticosus L) 'Natchez' and 'Chester' using green cuttings. The study describes the effect of root formation stimulants on the rooting process of plants. Plant growth stimulants were used in the experiments: Kornevin (control), Succinic acid, Radiopharm and Green Belt. The effectiveness of these drugs was studied in terms of rooting of cuttings at different times – 10, 20 and 30 days after treatment. The results showed that the use of "Radiopharma" and "Green Belt" contributed to a significant increase in the percentage of rooting compared with the control. The Radiopharm preparation was particularly effective, which provided up to 96% rooting in the Chester variety.

Ключевые слова: *Ежевика, вегетативное размножение, черенки, стимуляторы корнеобразования, Корневин, Янтарная кислота, Радифарм, Грин Белт, укоренение, сорта Natchez и Chester, эффективность стимуляторов, черенкование, рост и развитие растений*.

Keywords (на английском): *blackberry, vegetative propagation, semi-woody cuttings, rooting stimulators, Kornevin, Succinic acid, Radifarm, Green Belt, rooting, Natchez and Chester cultivars, growth regulator efficiency, cutting propagation, plant growth and development*.

Введение Ежевика (Rubus fruticosus L) - относится к семейству Розовые и широко известен как ежевика или костяника. Данное растение многолетнее и его родиной считаеться Евразия, но сегоднешный день можно наблюдать что он растет по всему миру. Ягодные издавна по всему миру использовали в народной медицинских и в кулинарии. Мы знаем ягоды ежевики известно своими сочными и сладкими вкусом, но иногда кисло-сладкими ягодами, которые дети любят употреблять. Ягоды можно есть свежими и использовать в кондитерской промышленности. это растение вечно зеленое кустарник и декоративное растение, чьи плоды богаты витаминами, антиоксидантами и минералами. Она издавна используется как в народной, так и в современной медицине. В Узбекистане ее ценят как важное пищевое и лекарственное растение. Однако наличие шипов на стеблях усложняет сбор урожая.

По этому данной исследование размножав гибридные без шипового сорта ежевики можно создать промышленные плантации ягодных культур и пополнять потребительскую корзину

«Ежевика – питательное, лекарственное и декоративное растение, плоды которого содержат целебные витамины, антиоксиданты и минералы. Это растение издревле широко применяется в народной медицине и косметологии. Плоды ежевики содержат сахара, органические кислоты, пектиновые вещества, витамины А, С, В, РР и каротин. Корни, листья, цветки и плоды используются в медицине при желудочно-кишечных заболеваниях, атеросклерозе, гипертонии, гастрите, диабете и укрепляют иммунитет, подавляют жажду и снижают температуру. Это помогает организму восстановиться после болезней». Улучшает работу желудочно-кишечной системы. Укрепляет нервную систему и помогает спокойно спать. Он также укрепляет мыслительные способности и память, выводит из организма токсичные вещества благодаря тому, что содержит множество антиоксидантов. Несмотря на низкую калорийность ягод, он надолго сохраняет чувство сытости.

Поэтому это растение обладает свойством похудения. Благодаря наличию в его плодах важных биохимических компонентов из них готовят варенье, джем, желе, сок[1].. Морфологические особенности и биологические особенности перспективных сортов ежевики на территории нашей республики, технология выращивания, нетрадиционные способы выращивания саженцев недостаточно изучены нашими учеными. Среди них одним из наиболее важных с точки зрения потребления и товарности в почвенно-климатических условиях республики считается изучение перспективных сортов бесшипных видов, имеющих большое значение с точки зрения потребления и товарности, а также разработка нетрадиционных способов выращивания рассады. неотложные задачи теоретического и практического значения.

Пункт 3.30 Указа №ПФ-60, посвященный стратегии развития нового Узбекистана на период 2022-2026 годов по дальнейшему развитию Республики Узбекистан, посвященный ускоренному развитию национальной экономики и обеспечению высоких темпов роста Отдельно указано, что «за счет интенсивного развития сельского хозяйства на научной основе доходы фермеров и фермеров будут как минимум удвоены, доведя ежегодный рост сельского хозяйства не менее чем до 5%»[2]. Решение Президента Республики Узбекистан от 28 января 2020 года ПК 455-75 «О мерах по реализации задач, определенных в Стратегии развития сельского хозяйства Республики Узбекистан на 2020-2030 годы» и других нормативно-правовых актах. документы, связанные с этой деятельностью, исследования обслуживают определенный уровень.

Степень изученности проблемы. В странах мира широко развита научно-исследовательская работа по изучению биологических особенностей ежевики, созданию перспективных сортов, разработке традиционных и нетрадиционных методов выращивания его саженцев.

В этом направлении работали акад. В.В. Пашкевич, акад. Т.К. Кварацхелия, В.А. Колесников, П. Г. Шитт, а также Р.К. Найт и США Роджерс (Великобритания), Л.Х. Бэйли, Х.Б. Таки, У.Х. Чендлер, Н.Ф. Чайлдерс (США), Р. Гете, Г. Фридрих, П. Г. де Хаас (Германия), И. Стоичков (Болгария), Н. Константинеску (Румыния), М. Кутанс (Франция), Н.Г. Тихонова, Д.Н. Рябова, О.В. Карпова, М.В. Захарова, И.С. Саматова, А.В. Томошевич, М.А. Держинский, Е.А. Устинова, Г.М. Маркина, Т.А. Красовская, Л.С. Зернов, А.С. Регубов, О.В. Березина, Т. Владимировной Основная задача – использовать методы, созданные на основе исследований и научных исследований, проведенных, при воспроизведении объектов исследования.

Ряд ученых на протяжении многих лет изучают биологические особенности видов ежевики в условиях Средней Азии и Узбекистана. В частности, С.И. Ягудина, Х.Г. Гулямов, Э.И. Ярославцев, провели множество научных работ по освоению месторождения.

На сегодняшний день в нашей стране ведется практическая работа по выращиванию и воспроизводству таких разновидностей видов ежевики, как «Барнаул», «Вислуха», «Прогресс» и «Мальборо»[3]. Однако научные исследования не проводились по таким сортам, как Натчез (Natchez) и Честер (Chester Thornless).

Известно, что завоз новых, не интродуцированных сортов ежевики в нашу страну из разных стран, возникновение различных проблем, связанных с их выращиванием и разведением, требует более глубокого изучения данной области. Одним из важных вопросов является использование современных технологий при выращивании саженцев исследования в ягодоводстве, совершенствование технологии выращивания качественной саженцев и ее применение в производстве.

Среди ягодных культур ежевика отличается высокой урожайностью, относительной неприхотливостью к условиям среды, стрессоустойчивостью и хорошим иммунитетом к

болезням. В последние годы широкое распространение получили без шинного сорта ежевики, что позволяет обеспечить население витаминизированными плодами, полезными для здоровья. В связи с этим актуальной задачей аграрной отрасли является совершенствование методов размножения, улучшение технологий укоренения и закладка товарных плантаций.

Вегетативное размножение черенками - эффективный способ воспроизводства растений, успех которого зависит от множества факторов, включая использование стимуляторов роста и сроков заготовки черенков.

По морфологическим и биологическим особенностям ежевику можно отнести к многолетним полукустарникам. Основные характеристики:

Корневая система - поверхностная, хорошо закрепляется в почве. **Стебель** - прямостоячий, дуговидный или стелющийся, с высокой жизненной силой (особенно у бесшипных сортов). **Листья** - сложные, состоят из 3–5 листочков. **Цветки** - обычно белые или розоватые, самоопыляющиеся или опыляемые насекомыми. **Плоды** — сложные ягоды с характерным кисло-сладким вкусом и ароматом.

Для успешного размножения и выращивания ежевики необходимо учитывать ее экологические требования. Она хорошо приспособлена к умеренному климату, выдерживает температуры от -25°C до +35°C. Однако для полноценного роста и плодоношения требуется достаточное солнечное освещение - в тени рост замедляется, а качество плодов снижается. Ежевика предпочитает умеренное увлажнение; застой воды может вызвать гниение корней. Идеальная почва - богатая гумусом.

Вовремя размножение ежевики определено влияния различных субстратов и регуляторов роста на размножение саженцев ежевики зелеными черенками. В качестве регулятора роста Греен Белт, Радифарм, Янтарная (Бурштиновая) кислота, корнеоброзовательние вещества,

Во время исследования было проведино фенологические наблюдения «Методика расчетов и фенологических наблюдений при опытах с плодовыми и ягодными растениями» Х.Ч. Буриев и др., «Зеленое черенкование в условиях автоматического регулируемого искусственного туманообразования» Ф.Я. Поликарпова, Наблюдение за плодовыми и ягодными растениями «Методика учета и наблюдений в опытах с плодовыми и ягодными культурами» В.Ф. Моисейченко, а также общепринятые критерии статистического анализа полученных данных, а также Б.А. Доспехова проводилось на основе метода «Методики полевого опыта».

Научная новизна исследования заключается в том что впервые доказано, что смесь торфа с 75% перлитом и 25% соотношением субстратов показала высокие результаты при размножении саженцев ежевики полудеревянными черенками. При этом установлено, что черенками прижилось 90% сорта Натчез и 92% сорта Честер;

при размножении саженцев ежевики полуодревесневшими черенками скорость укоренения черенков определялась в регуляторах роста Radifarm 94% у сорта Натчез, 93% у сорта Честер, в регуляторах роста Green Belt 96% у сорта Натчез, 95% у сорта Честер ;

Достоверность результатов исследования. Научная значимость результатов исследований заключается в изучении видов регуляторов роста, влияния искусственных субстратов на их укоренение и рост при выращивании саженцев интродуцированных сортов Натчез (Natchez) и Честер (Chester Thornless) из зелеными черенками изучено размножение ежевики при уходе за укорененными в тепличных, а в условиях выращивания сроки посадки сортов ежевики Натчез (Natchez) и Честер (Chester Thornless) научно обосновали.

Во время эксперимента определялись длина черенков и концентрация используемых стимуляторов укоренения. В процессе размножения сортов ежевики применялись зелёные черенки в сочетании с различными регуляторами роста растений, направленными на ускорение процесса укоренения. Следует отметить, что применённые положительно влияли на формирование корней и развитие корневой системы черенков. В настоящее время

ростовые стимуляторы играют важную роль в повышении эффективности укоренения зелёных черенков и широко применяются в практике вегетативного размножения растений.

В экспериментах стимулятор «Корневин» был выбран в качестве контрольного варианта, а среди опытных образцов были использованы стимуляторы роста «Радифарм», «Янтарная кислота» и «Грин Белт». Была проанализирована эффективность указанных регуляторов роста на процесс укоренения зелёных черенков различных сортов ежевики. Отмечены различия в способности к укоренению между сортами, что свидетельствует о влиянии генотипа на эффективность применяемых стимуляторов. Показатели контрольного варианта (Корневин) сравнивались с результатами других обработок.

На основании данных, представленных в Таблице 1, можно сделать вывод, что успех укоренения черенков ежевики варьируется в зависимости от типа применяемого стимулятора роста.

Таблица 1 - Влияние различных стимуляторов роста на укореняемость полулигнизированных черенков ежевики

Стимуляторы роста	Сроки посадки	Сорт natchez			Сорт chester		
		10 дней	20 дней	30 дней	10 дней	20 дней	30 дней
Kornevin (Control)	20-05.08	20	69	85	32	73	85
Succinic Acid		34	73	86	37	77	89
Radifarm		51	79	96	56	83	98
Green Belt		46	75	96	49	71	97
Kornevin (Control)	01-10.08	28	67	82	30	71	83
Succinic Acid		32	71	84	35	75	86
Radifarm		48	78	94	52	81	96
Green Belt		44	73	93	47	78	95

Эта таблица демонстрирует влияние различных стимуляторов роста на процент укоренения черенков ежевики в разные сроки. Наивысший процент укоренения был достигнут при применении Радифарма, за ним следовал Грин Белт, а наименьшая эффективность наблюдалась у контрольного варианта Корневина. В целом, сорт Chester показал немного лучшие показатели укоренения по сравнению с сортом Natchez.



Рисунок 1 - Влияние различных стимуляторов роста на укореняемость полулигнизированных черенков ежевики

1 – **Корневин** **2. (Янтарнаиа Кислота)** 3 – **Греен Белт** 4 – **Радифарм**

Сорт Natchez:

- При обработке Корневином (контроль) укоренение составляло 28% через 10 дней и достигало 82% через 30 дней.
- При применении Янтарной кислоты - 32% на 10-й день и 84% на 30-й.

• Радифарм продемонстрировал наилучшие результаты: 48% через 10 дней и 94% через 30 дней.

• Грин Белт - 44% и 93% соответственно.

Сорт Chester:

• Корневин - 30% на 10-й день и 83% на 30-й.

• Янтарная кислота - 35% и 86%.

• Радифарм - 52% и 96%.

• Грин Белт - 47% и 95%.

Во время эксперимента Корневин изначально был выбран как контрольный стимулятор роста. Его эффективность в укоренении полу-древесных черенков ежевики сравнивалась с другими стимуляторами.

Для сорта Natchez:

• При обработке черенков Корневином в течение 16–18 часов, укоренение составило 28% через 10 дней и достигло 82% через 30 дней.

• При обработке Янтарной кислотой (ЯК) - 32% через 10 дней и 84% через 30 дней.

• Радифарм - 48% и 94%.

• Грин Белт - 44% и 93% соответственно.

Результаты показывают, что черенки сорта Natchez имели более высокие показатели укоренения при применении Радифарма и Грин Белт по сравнению с контрольным вариантом и другими препаратами. Укоренение при использовании Радифарма было выше на 12%, а при применении Грин Белт — на 10%.

Для сорта Chester:

• При обработке Корневином — 30% на 10-й день и 83% на 30-й.

• Янтарная кислота — 35% и 86%.

• Радифарм — 52% и 96%.

• Грин Белт — 47% и 95%.

Экспериментальные наблюдения: Анализ эффективности укоренения полулигнизированных черенков сорта Chester под воздействием различных стимуляторов роста показал, что по сравнению с контролем (Корневин):

• Радифарм увеличил укореняемость на **13%**,

• Грин Белт — на **12%**.

Радифарм и Грин Белт оказались наиболее эффективными в стимулировании образования корней, значительно превзойдя контроль. Эти результаты подтверждают возможность повышения эффективности вегетативного размножения растений при использовании указанных препаратов.

Заключение. Продолжительность обработки (16–18 часов), одинаковая для всех стимуляторов, оказалась достаточной для достижения значительных результатов, особенно при применении Радифарма и Грин Белт. Это позволяет рекомендовать данную экспозицию как оптимальную для полуодриневшие черенков. Сорт Chester может считаться более устойчивым и перспективным для черенкования, особенно при использовании современных стимуляторов. Разница в укоренении между контрольным и лучшими вариантами достигала до 14%, что имеет практическое значение при массовом размножении культур. Данные позволяют рекомендовать Радифарм как наиболее эффективный стимулятор для укоренения черенков ежевики в условиях Узбекистана, особенно в производственных и питомниководческих масштабах. Результаты подтверждают, что выбор стимулятора должен основываться не только на его составе, но и на адаптивности конкретного сорта к препарату, что важно учитывать при планировании вегетативного размножения.

Результаты эксперимента показали, что эффективность укоренения полуодриневших черенков ежевики существенно зависит от применяемого стимулятора роста. Среди протестированных препаратов наивысшие показатели укореняемости были достигнуты при применении Радифарма, за которым следует Грин Белт, в то время как Корневин,

использовавшийся в качестве контрольного варианта, показал наименьшую эффективность.

Сорт Chester в целом продемонстрировал более высокую укореняемост по сравнению с сортом Natchez, что указывает на важную роль генотипических особенностей в процессе вегетативного размножения.

Применение стимуляторов роста, таких как Радифарм и Грин Белт, увеличивало процент укоренения черенков на 10–13%, что делает их перспективными средствами для повышения продуктивности черенкования в условиях континентального климата Ташкентской области.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Республики Узбекистан. Президент (2023 – ; Ш. М. Мирзиёев) [Текст]: «Зеленое пространство». – Ташкент. : [б. и.], 2023.
2. Республики Узбекистан. Президент (2023 – ; Ш. М. Мирзиёев) [Текст]: ПФ-5853 «Об утверждении Стратегии развития экономики Республики Узбекистан на 2020 - 2030 годы». – Ташкент. – 2019.
3. Буриев Х. Ч. Методика проведения опытов и фенологических наблюдений [Текст]: учебное пособие / Х. Ч. Буриев, Н.Ш.. Енилеев. - Ташкент, 2014. – 64 с.
4. Валиева Ш. А. Малина и ежевика в производстве лекарственных средств с применением метода vitro / Ш. А. Валиева // «Права молодежи: возможности и механизмы защиты» республиканская научно-практическая конференцияю – Ташкент. – 2024. – С. 207-210
5. Деменко В.И. Микроклоналное размножение плодовых и ягодных култур [Текст]: Методические указания. – Москва: МСХА, 1997. – С. 10-20.
6. Поликарпова Ф.Я. Размножение плодовых и ягодных культур зелёными черенками. [Текст]: Методические указания. – М.: Агропромиздат, 1990. – С. 78-83.
7. Моисейченко В.Ф. Методика учетов и наблюдений в опытах с плодовыми и ягодными культурами [Текст]: Методические рекомендации. – Киев, 1967. – С. 21-28.
8. Султонов К.С., Валиева Ш.А., Рахматова Ф.Э. Экологическое значение вечнозеленых растений [Текст]. – Ташкент. – 2024.
9. Davies F.T. Hormonal and Environmental Interactions During Adventitious Root Formation / F.T Davies., R.L. Geneve // Plant Growth Regulation. –2000.
10. Jones M. (2018). Carbon Sequestration in Green Plants: A Review / M. Jones // Climate Research, 28(3). – P. 45-67.
11. Leakey R.R. Vegetative Propagation of Trees / R.R. Leakey // CAB International/ - 2014.
12. Ofori D.A. Improving Rooting of Stem Cuttings in Some Timber Tree Species of Ghana / D.A. Ofori, E. Opuni-Frimpong, S. // Pentsil Forest Ecology and Management. – 2009.
13. Smith, J.. Environmental Benefits of Perennial Plants / J. Smith, L. Brown // Ecology Journal, 35(2). – 2020. – P. 112-130
14. Sultonov K. Influence of stimulants on rooting of semi-limned blackberry cuttings / K. Sultonov, Sh. Valieva, M. Fahritdiniv // 4 th International Conference on Research of Agricultural and Food Technologes. – Taskent. – 2024. P-206-208
15. Valieva Sh., Condition and Prospects of Healthy Goseberry Seeding Material / Sh. Valieva // International Journal of Trend in Scientific Research and Development (IJTSRD) Special Issue on Integrated Innovation on Technical Science and Economic Development. – 2025. – P. 8-9.
16. Valiyeva Sh A., Introduction of the blackberry plant into culture in vitro conditions / Sh. Valiyeva, Sattorov O. O. // Galaxy international interdisciplinary research journal. – 2024.

REFERENCES

1. Respubliki Uzbekistan. Prezident (2023 – ; SH. M. Mirziyoev) [Tekst]: «Zelenoe prostranstvo». – Tashkent. : [b. i.], 2023.

2. Respubliki Uzbekistan. Prezident (2023 – ; SH. M. Mirziyoev) [Tekst]: PF-5853 «Ob utverzhdenii Strategii razvitiya ekonomiki Respubliki Uzbekistan na 2020 - 2030 gody». – Tashkent. – 2019.

3. Buriev H. CH. Metodika provedeniya opytov i fenologicheskih nablyudenij [Tekst]: uchebnoe posobie / H. CH. Buriev, N.SH.. Enileev. - Tashkent, 2014. – 64 s.

4. Valieva SH. A. Malina i ezhevika v proizvodstve lekarstvennyh sredstv s primeneniem metoda vitro / SH. A. Valieva // «Prava molodezhi: vozmozhnosti i mekhanizmy zashchity» respublikanskaya nauchno-prakticheskaya konferenciyayu – Tashkent. – 2024. – S. 207-210

5. Demenko V.I. Mikroklonalnoe razmnozhenie plodovyh i yagodnyh kultur [Tekst]: Metodicheskie ukazaniya. – Moskva: MSKHA, 1997. – S. 10-20.

6. Polikarpova F.YA. Razmnozhenie plodovyh i yagodnyh kul'tur zelyonymi cherenkami. [Tekst]: Metodicheskie ukazaniya. – M.: Agropromizdat, 1990. – S. 78-83.

7. Moisejchenko V.F. Metodika uchetov i nablyudenij v opytah s plodovymi i yagodnymi kul'turami [Tekst]: Metodicheskie rekomendacii. – Kiev, 1967. – S. 21-28.

8. Sultonov K.S., Valieva SH.A., Rahmatova F.E. Ekologicheskoe znachenie vechnozelenyh rastenij [Tekst]. – Tashkent. – 2024.

9. Davies F.T. Hormonal and Environmental Interactions During Adventitious Root Formation / F.T Davies., R.L. Geneve // Plant Growth Regulation. –2000.

10. Jones M. (2018). Carbon Sequestration in Green Plants: A Review / M. Jones // Climate Research, 28(3). – P. 45-67.

11. Leakey R.R. Vegetative Propagation of Trees / R.R. Leakey // CAB International/ - 2014.

12. Ofori D.A. Improving Rooting of Stem Cuttings in Some Timber Tree Species of Ghana / D.A. Ofori, E. Opuni-Frimpong, S. // Pentsil Forest Ecology and Management. – 2009.

13. Smith, J.. Environmental Benefits of Perennial Plants / J. Smith, L. Brown // Ecology Journal, 35(2). – 2020. – P. 112-130

14. Sultonov K. Influence of stimulants on rooting of semi-limned blackberry cuttings / K. Sultonov, Sh. Valieva, M. Fahritdiniv // 4 th International Conference on Research of Agricultural and Food Technologes. – Taskent. – 2024. P-206-208

15. Valieva Sh., Condition and Prospects of Healthy Goseberry Seeding Material / Sh. Valieva // International Journal of Trend in Scientific Research and Development (IJTSRD) Special Issue on Integrated Innovation on Technical Science and Economic Development. – 2025. – P. 8-9.

16. Valiyeva Sh A ., Introduction of the blackberry plant into culture in vitro conditions / Sh. Valiyeva, Sattorov O. O. // Galaxy international interdisciplinary research journal. – 2024.

ТҮЙІН

Мақалада Өзбекстанның Ташкент облысының топырақ-климаттық жағдайында қаражидек (Rubus fruticosus L) көшеттерін тамырландыру және вегетативті көбейту үшін тамыр стимуляторларын қолдану бойынша зерттеу нәтижелері берілген. Зерттеу нысаны жасыл және жартылай ағашты кесінділерді қолданып, тікенсіз қаражидек (Rubus fruticosus L) «Natchez» және «Chester» сорттарының кесінділері болды. Зерттеуде тамыр түзу стимуляторларының өсімдіктердің тамырлану процесіне әсері сипатталған. Тәжірибелерде келесі өсімдіктердің өсу стимуляторлары қолданылды: Корневин (бақылау), янтарь қышқылы, Радифарм және жасыл белдеу. Бұл препараттардың тиімділігі әр түрлі уақытта – өңдеуден кейін 10, 20 және 30 күн өткенде кесінділердің тамырлануы тұрғысынан зерттелді. Нәтижелер Radifarm және Green Belt қолдану бақылаумен салыстырғанда тамырдану пайызының айтарлықтай артуына ықпал еткенін көрсетті. Әсіресе «Радифарм»

препаратының жоғары тиімділігі «Честер» сортының 96%-ға дейін тамырлануын қамтамасыз етті. Осылайша, заманауи өсу стимуляторларын қолдану қаражидек кесінділерінің тиімділігін айтарлықтай арттырады және Өзбекстан жағдайында кеңінен қолдануға ұсынылуы мүмкін. Өзбекстанда қаражидек бағалы дәрілік және сәндік өсімдік болып саналады. Дегенмен, сабақтарында көптеген тікенектер болуы егін жинау процесін қиындатады. Бұл зерттеулерге сәйкес, қаражидектің тікенсіз будан сорттарын көбейту арқылы жидек дақылдарының өнеркәсіптік плантацияларын құруға және тұтыну қоржынын толықтыруға болады.

ӘӨЖ 661.187:665.3
ҒТАХР 65.65.39; 68.35.37

Гумарова Жаннар Маратовна, PhD., https://orcid.org/0000-0003-0043-8208
Жәңгір хан атындағы Батыс Қазақстан аграрлық-техникалық университеті КеАҚ, Қазақстан Республикасы, 090009, Орал қ,, Жаңгір хан көшесі, 51, aina_zhg@mail.ru
Гумаров Магауия Хамиткалиевич, биология ғылымдарының кандидаты, доцент. https://orcid.org/0009-0009-2332-5346
Жәңгір хан атындағы Батыс Қазақстан аграрлық-техникалық университеті» КеАҚ, Орал қ. Жәңгір Хан 51, 090009, Қазақстан, magauiyag@mail.ru
Аккереева Эльмира Каршигиевна, жаратылыстану ғылымдарының магистрі, https://orcid.org/0000- 0002-6442-9020
Жәңгір хан атындағы Батыс Қазақстан аграрлық-техникалық, университеті» КеАҚ, Орал қ., Жәңгір Хан 51, 090009, Қазақстан, elmira.akkereeva.87@mail.ru
Саиткулов Фозилжон Эргашевич., PhD., доцент
Ташкент мемлекеттік аграрлық университеті, https://orcid.org/0009-0002-3806-3931 100164, Ташкент қ., Университет, 2 көш. fsaitkulov@bk.ru

Gumarova Zhannar Maratovna, PhD, https://orcid.org/0000-0003-0043-8208
NJSC «Zhangir Khan West Kazakhstan Agrarian and Technical University», Uralsk, st. Zhangir khan 51, 090009, Kazakhstan, aina_zhg@mail.ru
Gumarov Magauiya Khamitkalievitch, candidate of biological sciences, associate professor, https://orcid.org/0009-0009-2332-5346
NJSC «West Kazakhstan Agrarian and Technical University named after Zhangir khan», Uralsk, st. Zhangir khan 51, 090009, Kazakhstan, Magauiyag@mail.ru
Akkereyeva Elmira, Master of Natural Sciences, https://orcid.org/0000- 0002-6442-9020
NJSC «West Kazakhstan Agrarian and Technical University named after Zhangir khan», Uralsk, st. Zhangir khan 51, 090009, Kazakhstan, elmira.akkereeva.87@mail.ru
Saitkulov Foziljon Ergashevich., PhD., associate professor, https://orcid.org/0009-0002-3806-3931
Tashkent State Agrarian University, Uzbekistan. 100164, Tashkent, University street 2-nd home, fsaitkulov@bk.ru

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӨСІМДІК МАЙЛАРЫН ӨНДЕУ АРҚЫЛЫ ТАБИҒИ ШӨП САБЫНДАРЫН ӨНДІРУДІҢ ЭКОЛОГИЯЛЫҚ АСПЕКТІЛЕРІ
ENVIRONMENTAL ASPECTS OF THE PRODCTION OF NATURAL HERBAL SOAP THROUGH THE PROCESSING OF USED VEGETABLE OILS

АННОТАЦИЯ

Жұмыста пайдаланылған өсімдік майларынан май қышқылдарының натрий сабындарын алу процесі зерттелген. Зерттеу мақсаты – тамақ өндіріс орындарының

пайдаланылған күнбағыс майларын сапалы шөпті сабынға өңдеу арқылы қалдықтарды азайту. Пайдаланылған күнбағыс майларын қайта өңдеу қоршаған ортаның ластануы мәселесін шешуге көмектеседі. Арзан, бірақ сонымен қатар сапалы шөпті сабын импорттық тазалау құралдарын толық алмастыра алады.

Шөпті сабын алу процесінде табиғи шикізат – пайдаланылған күнбағыс майы қолданылады, ол синтетикалық майлардан айырмашылығы қауіпсіз болып табылады. Сабын қайнату процесінде және оған жусан эфир майын қосу арқылы тек антиоксиданттық емес, сонымен қатар антисептикалық қасиеттер де жақсарады. Жүргізілген тәжірибелер нәтижесінде өсімдік майларының химиялық модификациясы арқылы өнімдер алынды, олар май қышқылдарының натрий сабындарын болып табылады. Сабын қоспасына натрий гидроксидін қосуына байланысты көпіршіктердің түзілуі, еркін сілтісі және көмірқышқыл сода мөлшерлерінің өзгеретіні көрсетілді. Зерттелген өнім – табиғи шөпті сабын – жақсы көпіршіктену және тазалау қасиеттеріне ие болды. Зерттеуге алынған сабынның органолептикалық қасиеттері де сапалы екені расталды.

ANNOTATION

The work presents a study on the production of sodium soaps from fatty acids derived from used vegetable oils. The study aims to reduce waste in the form of sunflower oils from food processing plants by converting them into high-quality herbal soap. The recycling of used sunflower oils will help address environmental pollution. Inexpensive yet high-quality herbal soap could serve as a substitute for imported cleaning products.

In the process of making herbal soap, natural raw materials are used – used sunflower oil, which, unlike synthetic alternatives, is safe. During the soap-making process and the subsequent addition of wormwood essential oil, not only antioxidant but also antiseptic properties are improved. The conducted experiments resulted in chemical modifications of vegetable oils, producing sodium soaps of fatty acids. The study showed changes in foam formation, the amount of free alkali, and carbonated soda depending on the addition of sodium hydroxide to the soap mixture. The studied product – natural herbal soap – demonstrates good foaming and cleansing properties. Sensory evaluation also confirms the quality of the produced soap.

Түйін сөздер*: натрий сабыны, күнбағыс май, шөпті сабын, сабын жасау процесі.*
Key words: *sodium soaps, sunflower oil, herbal soap, soap-making process.*

Кіріспе. Қоғамдық тамақтандыру жүйесіндегі өсімдік майлары түріндегі қалдықтардың артуы қоршаған ортаның ластануына ықпал етеді. Май қалдықтары құбырларды және коллекторларды бітеп, қаланың кәріз жүйесінің жұмысын бұзады. Азық-түлік өндірісінің қалдықтары су қоймаларының бетінде майлы пленкамен жабылып, жер асты суларына және топыраққа түсіп, экологиялық теңгерімді және газ алмасуды бұзады. Осыған байланысты май қалдықтарын жою жолдарын зерттеу тек азық-түлік өндірісінің қоршаған ортаға зиянды факторларын азайту мәселесін шешуге ғана емес, сонымен қатар қалдықтардың «өмірлік циклын» жалғастыруға мүмкіндік береді, яғни сабын өндірісі арқылы, құрамында табиғи ингредиенттер, pH, көпіршік түзілуі және май қышқылдарының мөлшері сияқты қасиеттердің үйлесімі болады. Біздің зерттеуіміз сабын негізінің рецептурасын және детергенттерді, беттік белсенді заттар, синтетикалық қоспаларды және бояғыштарды қоспайтын органикалық сабынды жасауға бағытталды. Құнды химиялық шикізат болып табылатын май өндірісінің қалдықтарының көбеюі оларды кәдеге жарату тәсілдерін әзірлеуді және оларға жаңа қасиеттер беруді талап етеді. Әсіресе, сабын қалдықтарын гидролиздеу процесінен кейінгі қышқыл ағынды суларды бейтараптандыру. Ғалымдардың зерттеулеріне сүйенсек, күнбағыс майынан жасалған сабынның бактерияға қарсы және дезинфекциялық қасиеттері бар. Аспаздық күнбағыс майын, сондай-ақ оны рафинациялау кезіндегі қалдықтарын сапалы сабынға айналдыруға болады. Бұл екінші қайта өңдеу қалдықтардың көлемін азайтып, қоршаған ортаға жағымды әсер етеді.

Экологиялық тұрғыдан таза шаруашылық сабын өндірудің жасалған инновациялық технологиясы қоғамдық тамақтану орындары, мейрамханалар мен кафелерден түсетін пайдаланылған өсімдік майларын тиімді өңдеуге мүмкіндік береді.

Өсімдік майы негізіндегі қалдықтар қауіптіліктің IV класына ие және қауіпті емес қалдықтар болса да, олардың құрамдас бөліктері адам денсаулығы мен қоршаған ортаға үлкен қауіп төндіруі мүмкін. Қоршаған ортаның ластануын толық қалпына келтіру үшін кем дегенде үш жыл қажет болады. Азық-түлік және өсімдік майларын қалпына келтіру әдістері: 1) қайта пайдалану; 2) мұздату; 3) шаруашылықта қолдану; 4) қайта өңдеу [1]. Қалдықтарды басқару саласында ең көп қолданылатын модель - «Лансинка баспалдағы», онда қалдықтарды басқарудың негізгі шаралары олардың артықшылық дәрежесіне сәйкес қарастырылған. Лансинка шкаласы қалдықтармен жұмыс істеу кезінде қолданылуы тиіс артықшылықтар тәртібін анықтайды, ол алдымен қалдықтардың пайда болуын болдырмауға негізделген [2]. Сондай-ақ «Zero Waste» (нөлдік қалдықтар) концепциясында адамның мүмкіндігінше аз қоқыс шығаруға және оның мөлшерін үнемі нөлге дейін азайтуға тырысатын өмір сүру стилі көрсетілген. Идеяның негізінде бес қағида жатыр: Refuse (бас тарту), Reduce (азайту), Reuse (қайта пайдалану), Recycle (қайта өңдеу), Rot (компосттау). Осыдан бастап саналы тұтыну және қоқыстан біртіндеп бас тарту басталады [3].

Табиғи шөп сабындарындағы майлардың ең кең таралған көздері пальма, кокос, зәйтүн, күріш қабығы және күнбағыс майының қоспалары болып табылады [1, 2]. Өсімдік майлары әдетте жоғары сапалы сабындармен байланысты [3, 4, 5]. Өсімдік майлары полиқанықпаған (C16:3, C18:2 және C18:3) май қышқылдарына бай болуға бейім, ал сиыр майы ұзын тізбекті (C16:0 – C18:0) қаныққан май қышқылдарының жоғары деңгейлерін қамтуға бейім [6, 7, 8]. Табиғи өсімдік сабындарының ерігіштік және ылғалдандыру қасиеттері өсімдік майларында қолданылатын полиқанықпаған май қышқылдарының мөлшеріне қарай артады [3, 5, 6]. Дегенмен, қанықпаған май қышқылдарында кездесетін қос байланыстар тотығуға өте сезімтал, олар сабындану, қатаю және сақтау кезінде пайда болуы мүмкін. Қос байланыстың тотығуы сабындардағы қысқа тізбекті май қышқылдарының, альдегидтердің, кетондардың, жағымсыз иістердің және түссізденудің пайда болуына әкелуі мүмкін, бұл соңғы өнімнің сапасына, сенсорлық қабылдауына және жарамдылық мерзіміне әсер етеді [5, 6]. Өсімдік сығындылары түріндегі табиғи антиоксиданттар әдетте табиғи шөп сабындарындағы полиқанықпаған май қышқылдарының тотығуын тежеу үшін қоспалар түрінде (сабынның соңғы құрамының 1-8%) қосылады. Табиғи антиоксиданттардың көздерін қамтамасыз етумен қатар, бұл өсімдік сығындылары бояғыш ретінде де, дәм қосу үшін де қолданылады. Тұтынушылардың жеке күтім құралдарын қабылдауының негізгі эстетикасы-хош иіс [5]. Табиғи қолөнер сабын өндірушілері қосымша тұтынушылық артықшылықтарды қамтамасыз ету, сенсорлық қабылдауды жақсарту, сондай-ақ өз өнімдерінің сипаттамаларын өзгерту үшін қоспалар ретінде әртүрлі өсімдік негізіндегі эфир майларын пайдаланады [5]. Сабындағы қанықпаған май қышқылдары сияқты, эфир майлары да сабындану, сақтау немесе емдеу кезінде тотығуға бейім. Нәтижесінде, қоспалар ретінде қолданылатын эфир майлары, егер олар дұрыс тұжырымдалмаса, өнімнің бүкіл қызмет ету мерзімінде иіс профилін және сапасын модуляциялай алады. Эфир майларындағы эвкалиптол, камфора және тужон сияқты қосылыстар күшті бактерияға қарсы және антиоксиданттық қасиеттерге ие. Жусан сияқты өсімдіктерден алынған эфир майлары кең Бактерияға қарсы қасиеттеріне байланысты әлеуетке ие [9,11,12,13,14,15]. Күнбағыс майының қасиеттерінің бірі-сабындану қиын. Күнбағыс майы, тропикалық аналогтардан айырмашылығы, май қышқылының құрамына және шексіз жоғары карбон қышқылдарының қалдықтарының көп мөлшеріне ие. Жеке күтім өнімдеріне сұраныс жоғары. Алайда, Қазақстан нарығы негізінен көрші елдерден гигиена құралдарының импортымен ұсынылған. Бұл сабындар жағымды хош иіске ие, жақсы көбіктенеді және тазартылады. Алайда, бұл тазартқыштарды дайындау технологиясында синтетикалық бояғыштар, хош иістер мен қоспалар технологиялық процесті жеделдетіп, арзандататынын, бірақ теріге пайдалы әсер етпейтінін аз адамдар

біледі. Сондықтан табиғи компоненттерді қолдана отырып, талап етілетін сатып алушылардың тілектерін ескере отырып жасалған сабын барған сайын өзекті бола түсуде. Органикалық шикізаттан жасалған жеке күтім өнімдеріне сұраныстың артуы оның технологиясын жетілдіруді талап етеді. Бір орыннан, яғни кафе немесе асхана күніне 10 литрден астам пайдаланылған май шығарады, бұл 5-6 кг сабын негізін өндіруге мүмкіндік береді. Қазіргі уақытта жылына тонна фритюрлік май өндіріп жатқан тез тамақтану орындарының саны артып келеді. Пайдаланылған майды қайта өңдеу экологиялық таза шешім табады — шаруашылық сабыны экономикалық тұрғыдан тиімді ғана емес, сонымен қатар қоршаған ортаны қорғауға және сақтауға үлес қосады. Өсімдік майы өздігінен уытты емес, бірақ бірнеше рет қыздырылғанда ол тығыз майға айналып, зиянды қоспалармен байытылған суспензияға ұқсайды. Осыған байланысты, бұл жою тәсілі экологияны сақтау және қала, облыс, елдің өмірлік қамтамасыз ету мәселелерін шешуде қажет.

Зерттеу материалдары мен әдістері. Эксперименттік зерттеулер жүргізу кезінде біз қоғамдық тамақтандыру кәсіпорындарының пайдаланылған майын қолдандық. Сабын қайнату технологиясы екі кезеңнен тұрады: омыление және тұндыру. Сабын қайнатуды зертханалық жағдайда су моншасында үнемі араластыра отырып, пайдаланылған өсімдік майын сілті ерітіндісімен араластыру арқылы жүзеге асырдық. Омыление өнімі (май қышқылдары) нейтрализациясы Na_2CO_3 ерітіндісімен, сондай-ақ қайнату және қарқынды араластыру кезінде жүзеге асырылады; осы кезде май қышқылдарының 70%-ы нейтралданады. Қалған май қышқылдары мен бейтарап майларды сілті ерітіндісімен өңдейді. Осы кезеңде концентрлі ерітінді (сабынды желім) түзіледі, оның құрамында гидролизді болдырмау үшін сілтідің шамалы артық мөлшері (шамамен 0,2%) сақталады. Желім сабындары сабынды ерітінділердің концентраттарын салқындату арқылы алынады, бұл кезде ерітіндінің біркелкілігін бұзбайды. Оларда негізгі заттың 30%-дан 50%-ға дейін мөлшері болады. Сабынның тұндырылуын сабын қайнату қоспасына натрий хлоридінің ерітіндісін қосу арқылы жүзеге асырады. Хош иістендіргіш және антиоксидант ретінде жусан эфир майы (Artemisia L) қолданылады, тұқымдасынан алынған эфир майы пайдаланылды, ол өсімдіктер массасын бу дистилляциясы нәтижесінде алынған. Алынған сабынның қасиеттерін зерттеу үшін көпіршіктену, бос сілті және бос көмірқышқыл натрийінің бар-жоғы сияқты көрсеткіштер қолданылды. Сапалы тұрмыстық сабында бос каустикалық сілті 0,15%-дан, бос көмірқышқыл натрийі 1,0%-дан аспауы тиіс (ГОСТ 30266-95 Тұрмыстық сабын қатты. Жалпы техникалық шарттар). Көпіршіктенуді ГОСТ-790 бойынша анықтады (ГОСТ 790-89 Тұрмыстық сабын қатты және туалет сабыны. Қабылдау ережелері мен өлшеу әдістері). Бос сілті титрлеу әдісімен анықталды. 50 мл сыйымдылығы бар конустық колбаға, дәлдігі 0,0002 г-ға дейін сабын үлесі салынады, 10 мл спирт қосылады, колба тығыз тығындалады және сабын ерігенше абайлап шайқалады. 10 мл дистилденген су қосылып, фенолфталеиннің қатысуымен тұз қышқылы ерітіндісімен титрлеу жүргізіледі.

Нәтижелерді өңдеу. Сабынның еркін сілті мөлшері (Х) төмендегі формула бойынша есептеледі (1):

$$X1 = \frac{V \cdot K \cdot 0{,}004 \cdot 100}{m} \quad (1)$$

мұнда, V – титрлеуге жұмсалған тұз қышқылының (HCl) = 0,1 моль/дм³ концентрациясындағы ерітіндінің көлемі, см³;

К – тұз қышқылының шынайы концентрациясының моль/дм³ номиналды концентрациясына (HCl) = 0,1 моль/дм³ қатынасын ескеретін түзету;

m – талданатын сабын үлесінің массасы, г; 0,004 – тұз қышқылының (HCl) = 0,1 моль/дм³ концентрациясындағы 1 см³ ерітіндіге эквивалентті каустикалық сілтінің массасы.

Нәтижелер және оларды талқылау. Шикізаттың оңтайлы қатынасын анықтау үшін сілтінің өсімдік майының массасына қатынасын өзгерту арқылы тәжірибе жасалды.


Қайнату процесінде алынған өнімдер ауада кептірілді, содан кейін негізгі көрсеткіштер – еркін сілті, еркін углекислая сода және көпіршіктердің түзілуі талданды.

Сабын үлгілерін сынақтан өткізу нәтижелері, май қышқылдарының мөлшері, еркін каустикалық сілті мен еркін углекислая соданың мөлшері 1-кестеде көрсетілген.

Кесте 1 - Алынған өнімнің сапалық сипаттамалары – табиғи шөп сабыны

Қайнату кезінде қосылған NaOH, % май массасы	Еркін сілті мөлшері,%	Бос көмірқышқыл содасы, %
10%	0.10	0,35
15%	0.15	0,48
20%	0,28	0,92

Алынған өнімдерді еркін сілтіге талдау оның құрамын 0,10–0,28% аралығында көрсетті. Жұмыста сабынның органолептикалық қасиеттері де бағаланды. ГОСТ 30266-95 талаптарына сәйкес сабын сары немесе сәл қоңыр түсті болуы керек, қатты және консистенциясы біркелкі, ерекше сабын иісі болуы керек. Барлық үлгілер сарғыш-кілегей түсті және біркелкі консистенцияға ие болды. Жусан эфир майын қосудың арқасында сабынның хош иісі жақсарды.



Сурет 1 – Әр түрлі сілті қосылған сабынның көпіршік көлемінің (Vn) тәуелділігі

ГОСТ 30266-95 талаптарына сәйкес, бастапқы көпіршік көлемі 300 см³-ден кем болмауы тиіс. «Көпіршіктену» критерийі бойынша іс жүзінде барлық үлгілер сынақтан өтті. Ең жоғары көпіршіктену 20% сілті қосылған сабын үлгісінде байқалды.

Қорытынды. Жұмыстың нәтижесінде біз қолданылған шикізат – күнбағыс майынан денсаулыққа қауіпсіз натрий шөп сабындарын алдық. Қолданылған технология арқылы алынған қатты сабындар экономикалық тұрғыдан тиімді және қалдықсыз болып табылады. Алынған өнімге табиғи эфир майы қосу жоғары сапалы және әртүрлі қасиеттері бар сабын алуға мүмкіндік береді. Бұл технология табиғи және сапалы сабын алу арқылы қалдықтарды жоюға қосымша пайдасың тигізіп, өнімнің арзандығы арқылы импорттық тауарларды нарықта алмастыруға толық мүмкіндік береді.

ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

1. Ермолаева Ю. В. Глобальные схемы управления отходами: социологический подход. Текст / Ю. В. Ермолаева. // Научный результат. Социология и управление. – 2017.

2. Тарханова А. М., Смирнова Ю. К. Изучение проблемы утилизации растительного масла / Материалы VII Международной научно-практической конференции, Посвященной 190-летию со дня рождения Д. И. Менделеева, 30-летию Тобольского индустриального института. Тюмень. -2024. С.295 – 298.

3. Концепция «Ноль отходов» – как она работает? – Текст: электронный// Зеленый вектор: [сайт]. – 2024.

4. Berneckė, S. Analysis of free fatty acids in soap samples by means of gas chromatography-mass spectrometry / S. Berneckė, A. Maruška // Chemija. – 2013. – P.307–311.

5. Burke, M. In: Bailey's Industrial Oil and Fat Products. // 6th ed. S. Fereidoon, editor. WileyInterscience; New York, NY, USA. – 2005.

6. Kuntom, A. Chemical and physical characteristics of soap made from distilled fatty acids of palm oil and palm kernel oil / A. Kuntom, H. Kifli, P.–K. Lim // Journal of the American Oil Chemists' Society. – 1996. – P. 105-108

7. George, E.D. Fatty acid distribution of fats, oils and soaps by high-performance liquid chromatography without derivatization. // J. Am. Oil Chem. Soc. – 1994. – P. 789–791.

8. Ayorinde, F.O. Determination of the fatty acid composition of saponified vegetable oils using matrixassisted laser desorption/ionization time-of-flight mass spectrometry / F.O. Ayorinde, K. Garvin, K. Saeed // Rapid Commun. Mass Spectrom. – 2000. – P. 608–615.

9. El Ouardi et al. Chemical composition, antimicrobial, and antioxidant properties of essential oils from Artemisia herba-alba asso. and Artemisia huguetii caball. from Morocco: in vitro and in silico evaluation // Sec. Medicinal and Pharmaceutical Chemistry. - 2024.

10. Протопопов, А.В. Изучение получения солей жирных кислот из растительного масла / А.В. Протопопов [и др.] // NEWS OF SCIENCE AND EDUCATION, SCIENCE AND EDUCATION LTD, Volume 7. – № 12. – 2018. – С. 7–10.

11. Протопопов, А.В. Исследование получения солей жирных кислот по безотходной технологии / А.В. Протопопов, А.В. Голод, А.Е. Бовина, Д.С. Вагина // Актуальная биотехнология. – № 3 (26). – 2018. – с. 206–208.

12. Протопопов, А.В. Получение натриевых солей жирных кислот из растительного масла / А.В. Протопопов, А.В. Голод, А.Е. Бовина, Д.С. Вагина // Уральский научный вестник, ТОО Уралнаучкнига. – Т. 4. – № 6. – 2018. – С. 48–51.

13. Протопопов, А.В. Способ переработки соапстоков / А.В. Протопопов, Е.Ю. Шумилова, Е.А. Нещадимова, К.Г. Лазукина // Приднепровский научный вестник. – Днепр : Изд-во «Наука и образование». – Т. 2. – № 1. – 2019. – С. 46–50.

14. Дубовик, О. А. Физико-химические и технологические основы совершенствования производства, хранения и использования твердых натриевых мыл : специальность 05.18.06 "Технология жиров, эфирных масел и парфюмерно-косметических продуктов" : автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора технических наук / Дубовик Ольга Анатольевна. – Санкт-Петербург, 2009. – 46 с.

15. Получение жирных кислот из соапстока и использование их в рецептуре регенерата / Г. Н. Калматаева, Г. Ф. Сагитова, В. И. Трусов, С. А. Сакибаева // Труды Санкт-Петербургского государственного морского технического университета. – 2022. – № 3(3). – С. 48-60.

REFERENCES

1. Ermolaeva YU. V. Global'nye skhemy upravleniya othodami: sociologicheskij podhod. Tekst / YU. V. Ermolaeva. // Nauchnyj rezul'tat. Sociologiya i upravlenie. – 2017.

2. Tarhanova A. M., Smirnova YU. K. Izuchenie problemy utilizacii rastitel'nogo masla / Materialy VII Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferencii, Posvyashchennoj 190-letiyu so dnya rozhdeniya D. I. Mendeleeva, 30-letiyu Tobol'skogo industrial'nogo instituta. Tyumen'. - 2024. C.295 – 298.

3. Koncepciya «Nol' othodov» – kak ona rabotaet? – Tekst: elektronnyj// Zelenyj vektor: [sajt]. – 2024.

4. Berneckė, S. Analysis of free fatty acids in soap samples by means of gas chromatography-mass spectrometry / S. Berneckė, A. Maruška // Chemija. – 2013. – P.307–311.

5. Burke, M. In: Bailey's Industrial Oil and Fat Products. // 6th ed. S. Fereidoon, editor. WileyInterscience; New York, NY, USA. – 2005.

6. Kuntom, A. Chemical and physical characteristics of soap made from distilled fatty acids of palm oil and palm kernel oil / A. Kuntom, H. Kifli, P.–K. Lim // Journal of the American Oil Chemists' Society. – 1996. – P. 105-108

7. George, E.D. Fatty acid distribution of fats, oils and soaps by high-performance liquid chromatography without derivatization. // J. Am. Oil Chem. Soc. – 1994. – P. 789–791.

8. Ayorinde, F.O. Determination of the fatty acid composition of saponified vegetable oils using matrixassisted laser desorption/ionization time-of-flight mass spectrometry / F.O. Ayorinde, K. Garvin, K. Saeed // Rapid Commun. Mass Spectrom. – 2000. – P. 608–615.

9. El Ouardi et al. Chemical composition, antimicrobial, and antioxidant properties of essential oils from Artemisia herba-alba asso. and Artemisia huguetii caball. from Morocco: in vitro and in silico evaluation // Sec. Medicinal and Pharmaceutical Chemistry. - 2024.

10. Protopopov, A.V. Izuchenie polucheniya solej zhirnyh kislot iz rastitel'nogo masla / A.V. Protopopov [i dr.] // NEWS OF SCIENCE AND EDUCATION, SCIENCE AND EDUCATION LTD, Volume 7. – № 12. – 2018. – S. 7–10.

11. Protopopov, A.V. Issledovanie polucheniya solej zhirnyh kislot po bezothodnoj tekhnologii / A.V. Protopopov, A.V. Golod, A.E. Bovina, D.S. Vagina // Aktual'naya biotekhnologiya. – № 3 (26). – 2018. – s. 206–208.

12. Protopopov, A.V. Poluchenie natrievyh solej zhirnyh kislot iz rastitel'nogo masla / A.V. Protopopov, A.V. Golod, A.E. Bovina, D.S. Vagina // Ural'skij nauchnyj vestnik, TOO Uralnauchkniga. – T. 4. – № 6. – 2018. – S. 48–51.

13. Protopopov, A.V. Sposob pererabotki soapstokov / A.V. Protopopov, E.YU. SHumilova, E.A. Neshchadimova, K.G. Lazukina // Pridneprovskij nauchnyj vestnik. – Dnepr : Izd-vo «Nauka i obrazovanie». – T. 2. – № 1. – 2019. – S. 46–50.

14. Dubovik, O. A. Fiziko-himicheskie i tekhnologicheskie osnovy sovershenstvovaniya proizvodstva, hraneniya i ispol'zovaniya tverdyh natrievyh myl : special'nost' 05.18.06 "Tekhnologiya zhirov, efirnyh masel i parfyumerno-kosmeticheskih produktov" : avtoreferat dissertacii na soiskanie uchenoj stepeni doktora tekhnicheskih nauk / Dubovik Ol'ga Anatol'evna. – Sankt-Peterburg, 2009. – 46 s.

15. Poluchenie zhirnyh kislot iz soapstoka i ispol'zovanie ih v recepture regenerata / G. N. Kalmataeva, G. F. Sagitova, V. I. Trusov, S. A. Sakibaeva // Trudy Sankt-Peterburgskogo gosudarstvennogo morskogo tekhnicheskogo universiteta. – 2022. – № 3(3). – S. 48-60.

РЕЗЮМЕ

В работе рассмотрено исследование получения натриевых мыл жирных кислот из отработанных растительных масел. Исследование направлено на уменьшение количества отходов в виде подсолнечных масел пищевых комбинатов путем переработки их в качественное травяное мыло. Утилизация отработанных подсолнечных масел поможет решить проблему загрязнения окружающей среды. Дешевое, но вместе с тем качественное травяное мыло вполне может заменить импортные средства очищения. В процессе получения травяного мыла используется натуральное сырье – отработанное подсолнечное масло, которое в отличие от синтетических, безопасно. В процессе варки мыла и последующем добавлении в него эфирного масла полыни улучшаются не только антиоксидантные, но и антисептические свойства. В ходе проведенных экспериментов были получены продукты химической модификации растительных масел, представляющие собой натриевые мыла жирных кислот. Показано изменение пенообразования, количеств

свободной щелочи и углекислой соды в зависимости от добавления гидроксида натрия в мыловаренную смесь. Исследованный продукт – натуральное травяное мыло обладает хорошим пенообразованием и очищающими свойствами. Исследования органолептических свойств также подтверждает качество полученного мыла.

УДК 528.8
МРНТИ 70.19.11

Джигильдиева Ж. Г., магистр, https://orcid.org/0000-0002-4272-9751
Западно-Казахстанский аграрно-технический университет им. Жангир хана, г. Уральск, ул.Жангир хана 51., j_zhanylsyn@mail.ru
Кайнушева Д.Р., докторант, https://orcid.org/0009-0008-8315-7017, Казахский национальный исследовательский технический университет им. К.И. Сатпаева, г.Алматы, ул. К.Сатпаева 22., dilyara_ruslanovna_31@mail.ru

Jigildiyeva Zh. G., Master, https://orcid.org/0000-0002-4272-9751
West Kazakhstan Agrarian and Technical University named after Zhangir Khan, Uralsk, Zhangir Khan St. 51, j_zhanylsyn@mail.ru
Kainusheva D.R., PhD student, https://orcid.org/0009-0008-8315-7017 , Kazakh National Research Technical University named after K.I. Satpayev, Almaty, K.Satpayev St. 22, dilyara_ruslanovna_31@mail.ru

МОНИТОРИНГ СТЕПНЫХ ПОЖАРОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДАННЫХ ДИСТАНЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ ЗЕМЛИ
MONITORING OF STEPPE FIRES USING EARTH REMOTE SENSING DATA

АННОТАЦИЯ

Постоянные ландшафтные пожары способствуют изменению видового состава растительности, активизации эрозионных процессов и уничтожают животных и их среду обитания. По этим причинам очень важно изучить пожарный режим природных степей. В работе проанализирована динамика горения степных земель Теректинского района Западно-Казахстанской области за 2016-2023 годы. Экспертное дешифрирование данных области исследования за заданный период времени было выполнено с помощью космических изображений Sentinel 2. Всего выявлено 87 424 га горения. Большая часть площади была охвачена огнем очень крупных пожаров, каждая из которых занимала более нескольких тысяч гектаров, а площадь самых крупных пожаров превысила 30 тысяч гектаров. Большая часть всех сгоревших территорий неоднократно подвергалась пожарам. После 2020 года горючесть территории значительно снизилась, что связано в первую очередь с ростом поголовья скота, а во вторую-с ухудшением гидротермальных условий. В засушливых условиях погода влияет на пожарный режим не как фактор распространения огня, а как фактор накопления достаточного количества горючего материала. Поэтому уменьшение количества осадков, повышение температуры и пастбищных нагрузок способствуют уменьшению количества пожаров и площадей за счет уменьшения запасов растительной массы.

ANNOTATION

Permanent landscape fires contribute to changes in the species composition of vegetation, activation of erosion processes and destruction of animals and their habitat. For these reasons, it is very important to study the fire regime of natural steppes. The paper analyzes the dynamics of steppe land burning in the Terekty district of the West Kazakhstan region for 2016-2023. Expert

interpretation of the data for the study area for a given period of time was performed using Sentinel 2 space images. A total of 87,424 hectares of burning were identified. Most of the area was engulfed in very large fires, each of which occupied more than several thousand hectares, and the area of the largest fires exceeded 30 thousand hectares. Most of all burned areas were repeatedly exposed to fires. After 2020, the flammability of the territory decreased significantly, which is primarily due to the increase in livestock, and secondly, to the deterioration of hydrothermal conditions. In dry conditions, the weather affects the fire regime not as a factor of fire spread, but as a factor of accumulation of sufficient amount of combustible material. Therefore, the decrease in precipitation, increase in temperature and pasture loads contribute to the decrease in the number of fires and areas due to the decrease in reserves of plant mass.

Ключевые слова: *Терактинский район, дистанционное зондирование Земли, лесной пожар, ГИС, земля, ресурсы, природный пожар, динамика*

Key words: *Terektinsky district, remote sensing of the Earth, forest fire, GIS, land, resources, wildfire, dynamics.*

Введение. Территория современного Казахстана находятся между Южным Уралом и Тянь-Шань, Каспийским морем и Западной Сибирскими равнинами расположено 804,5 тыс.км² степей. Ландшафт очень разнообразный: целинные земли (до 1/3 всей территории), пашни, лесостепи, полупустыни, пустыни. Степь составляет 26% территории страны.

Природные пожары – это неконтролируемые спонтанные вспышки растительности или горения дерна. К этому определению можно относить лесные пожары, пожары степных и зерновых угодий, торфяные и подземные включает горючие ископаемые пожары. На всей территории Казахстана регистрируются лесные, лесостепные и степные пожары.

Степной пожар – спонтанное, неконтролируемое распространение огня по степной растительности. Пожар охватывает и уничтожает деревья, кустарники, травянистые растения, а также конструкции. Ослабленные пожарами насаждения могут стать очагом вредных заболеваний это касается не только участков, пострадавших от пожара, но и соседних также приводит к гибели насаждений. Защита, водоохрана лесов и степей от пожаров и других полезных свойств, продовольственных и технических культур, уничтожаются пастбища, ценная фауна. Они попадают на сельскохозяйственные угодья, особенно те, которые созревают и представляет большую опасность в период сбора урожая (июль-сентябрь) [1]. От природных пожаров в Казахстане ежегодно сжигаются значительные площади. Лесные пожары вызваны прямым или косвенным действием. Уборка территории при открытом горении и халатности человека при работе на полевой территории, является прямой причиной, а метеорологические факторы пожары являются косвенными причинами. Основные проблемы, связанные со степными пожарами – сухость и влажность, ветер, осадки и влажность воздуха [2].

Общая площадь исследуемого Терактинского района составляет 796757 га составляет. Район отличается континентальным климатом и круглогодичными ветрами. В летний период температура может достигать до +40°C. В том числе в результате сухая трава на территории района сгорает и превращается в огромные степные пожары.

Целью исследования является развитие Западно-Казахстанской области в 2016, 2018, 2020 и 2023 годах горючести региональных природных ландшафтов Терактинского района области анализ является и уничтожает конструкции.

Материалы и методы исследования. Это исследование включает сбор данных, обработку данных, анализ данных и картирование создание состоит из четырех основных этапов. Исследовательская работа выполнена с помощью космических изображений Sentinel 2. Набор данных обработано с помощью программного обеспечение ArcGIS.

Для проведения этой работы потребовалось выявить территории, охваченные пожарами и степными палами, путем дешифровки и анализа космических снимков Теректинского района за указанный период. Поскольку в регионе преобладают пожары в летне-осенний период, в основном использовались космические снимки Sentinel с июня по октябрь.

Спутник Sentinel-2A (S2A) был запущен в июне 2015 года, а Sentinel-2B (S2B) — в марте 2017 года. Спутники ESA S2A и S2B имеют пространственное разрешение (PR) от 10 до 60 метров и совместную частоту съемки — 5 дней. Мультиспектральная камера спутников включает 13 спектральных каналов: прибрежный аэрозольный (B1), три канала видимого диапазона (B2, B3, B4), четыре канала красного края (B5, B6, B7 и B8A), два ближних ИК-канала (NIR: B8, B9) и три SWIR-канала (B10, B11 и B12).

Мультиспектральные датчики для оценки степени пожарной опасности и оценки после пожара широко используется для динамики восстановления растений. Многие авторы использует спектральные каналы Red (B4), NIR (B8) и SWIR (B11 и B12).

Сгоревшие земли были идентифицированы по индексу NBR. Этот индекс зависит от содержания хлорофилла, растение чувствительно к влажности и золе [3-5]. По формуле NBR (1) NIR и SWIR объединяет длины волн.:

$$NBR = (NIR - SWIR)/(NIR + SWIR) \qquad (1)$$

Прежде всего, у здоровых растений очень высокий коэффициент отражения в ближнем инфракрасном диапазоне высокий коэффициент отражения в коротковолновой инфракрасной части спектра вниз. Однако недавно сгоревшие участки находятся в ближнем инфракрасном диапазоне в относительно низком отражении и коротковолновом инфракрасном диапазоне обладает высокой отражательной способностью [6,7].

Следовательно, высокое значение NBR обычно связано со здоровой растительностью и голой почвой соответствует, а в недавно сгоревших местах значения NBR низкие.

Результаты исследования. Полученные космические снимки также позволяют визуально определить территории, подвергшиеся пожарам, с помощью RGB-каналов. Как показано на Рисунке 1, при сравнении снимков Sentinel-2 одной и той же территории за 23.06.2018 и 22.08.2018 годов можно заметить, что выгоревшая область выделяется более темным оттенком.




23.06.2018 г. 22.08.2018 г.

Рисунок 1 – Визуальная оценка площади пожара с космического изображения

В данном исследовании карта выгоревших территорий и степень повреждений от пожара оцениваются с помощью нормализованного индекса выгорания (NBR) [8]. В нашей работе использовались снимки за 2016, 2018, 2020 и 2023 годы, для которых был рассчитан индекс NBR.

Обычно NBR рассчитывается по спутниковым снимкам до и после степного пожара. Как видно на Рисунке 1, по показателям NBR на территории Теректинского района за 23 июня 2018 года (до пожара) явных признаков возгорания не наблюдается. Постпожарное изображение (Б), созданное на основе снимка от 22 августа, демонстрирует территории с насыщенным красным цветом, которые соответствуют выгоревшим площадям.

Высокие значения NBR соответствуют неповреждённым пожаром территориям, тогда как низкие значения указывают на открытый грунт и выгоревшие участки. Горящий лесной массив демонстрирует низкую отражательную способность в коротковолновом инфракрасном диапазоне (SWIR) и высокую отражательную способность в ближнем инфракрасном диапазоне (NIR). Напротив, неповреждённые территории характеризуются высокой отражательной способностью в ближнем инфракрасном диапазоне и низкой отражательной способностью в коротковолновой инфракрасной части спектра [10,11].



А Б

Рисунок 2 – Изображения NBR до (А) и после (Б) пожара.

Теректинский район в период 2016-2023 годов, как показано на Рисунок 3 и 4 составлена карта сожженных степей и не сгоревших земель на территории.




Рисунок 3 – Коэффициент NBR на территории Теректинского района рассчитанный в 2016 и 2018 годах




Рисунок 4 – Коэффициент NBR на территории Теректинского района рассчитанный в 2020 и 2023 годах.

Анализ данных изображений позволяет выявить повторяющиеся пожары на одних и тех же территориях в течение нескольких лет. В исследуемом районе степные пожары преимущественно наблюдаются на пастбищных угодьях и пахотных землях.

Начиная с 2020 года отмечается значительное сокращение площадей, подверженных степным пожарам.

На Рисунке 5 показаны территории с многократными возгораниями, что видно по накоплению пикселей с низкими значениями NBR за несколько лет."




Рисунок 5 - Карта собранных векторов NBR

Таблица 1 – Изменение площади пожара с течением времени

Период проведения исследования	Площадь пожара, га	Доля на территории района, %
2016 год	31 088	4
2018 год	24 356	3
2020 год	30 690	3,8
2023 год	17 209	2

Согласно данным таблицы, максимальная площадь пожарищ была зафиксирована в 2016 году и составила 31 088 га. В 2023 году этот показатель сократился в 2 раза.

Значительное влияние оказывает характер землепользования. В районах с высокой долей пахотных земель преобладают локальные возгорания, которые связаны с неудобьями (балки, овраги и др.) или приходятся на отдельные пахотные участки. Наибольшее количество пожаров отмечается на пастбищных территориях.

Широтно-зональные особенности определяют распространение пожаров через климатические условия и наличие горючих материалов. Дополнительным фактором, влияющим на пожарный режим в нелесных зонах, выступает плотность населения и сельскохозяйственная специализация территории.

Заключение. Методы дистанционного зондирования представляют собой современные технологии, предназначенные для исследования территорий, анализа природных объектов, моделирования и прогнозирования [12,13].

Согласно результатам анализа, ежегодно в летний период значительные площади Терактинского района подвергаются степным пожарам.

Карта степени повреждений от степных пожаров за 4 года была создана с использованием снимков Sentinel-2. Степные пожары возникают при резких изменениях погодных условий, связанных с температурой, скоростью ветра и влажностью воздуха. Проведенный анализ позволяет получить детализированную и точную карту растительного покрова, а также выявить взаимосвязь данного параметра с интенсивностью пожаров.

Исследование включало анализ взаимосвязи между этими параметрами. Возможности Sentinel-2 обладают значительным потенциалом для лучшего понимания комплексного влияния указанных факторов на поведение степных пожаров. Фактически, взаимосвязь между различными типами растительного покрова и интенсивностью пожаров описана с

более высокой точностью, чем это допускается на современных официальных картах. Для карты растительного покрова была достигнута высокая общая точность.

С учетом ограниченного количества исследований по интеграции данных дистанционного зондирования с физическими переменными, данная работа описывает методику использования современных спутниковых изображений для определения влияния предикторов пожарной опасности на тяжесть последствий пожаров. Это исследование направлено на помощь пожарным, руководителям органов власти и политикам в дифференциации условий для уменьшения ущерба от пожаров, восстановления и оптимизации распределения ресурсов для тушения будущих возгораний.

Перспективные направления будущих исследований могут включать точный мониторинг динамики пожаров и роли поверхностных и грунтовых вод в их интенсивности. Благодаря открытым данным дистанционного зондирования появляется возможность значительно улучшить точность и снизить стоимость измерений по сравнению с аэрофотосъемкой в вопросах послепожарного управления природными территориями, включая определение типов топлива, физиографических характеристик и истории пожаров. Это позволит повысить эффективность и экономическую целесообразность процесса принятия решений в управлении земельными ресурсами.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Архипов Е.В., Кожахметов П.Ж., Чередниченко А.В.. Зависимость распространения пожаров в лесных экосистемах Казахстана от метеорологических условий // Вопросы географии и геоэкологии. – Алматы, 2011. – № 3. – С. 41-46.

2. Key, C.H.; Benson, N.C. Measuring and remote sensing of burn severity. In Joint Fire Science Conference and Workshop; Neuenschwander, L.F., Ryan, K.C., Eds.; University of Idaho:Moscow, ID, USA, 1999; Volume 2, Available online:https://www.researchgate.net/publication/241687936_Measuring_and_remote_sensing_of_burn_severity_the_CBI_and_NBR (accessed on 11 April 2019).

3. Rothermel, R.C. How to Predict the Spread and Intensity of Forest and Range Fires; United States Department of Agriculture: Ogden, UT, USA, 1983. Available online:https://www.fs.usda.gov/treesearch/pubs/24635 (accessed on 6 November 2018).

4. Pereira, P.; Cerdà, A.; Lopez, A.J.; Zavala, L.M.; Mataix-Solera, J.; Arcenegui, V.; Misiune, I.; Keesstra, S.; Novara, A. Short-term vegetation recovery after a grassland fire in Lithuania: The effects of fire severity, slope position and aspect. L. Degrad. Dev. 2016, 27, 1523–1534. [CrossRef]

5. Key, C.H.; Benson, N.C. Landscape Assessment (LA) Sampling and Analysis Methods. In FIREMON: Fire Effects Monitoring and Inventory System; Lutes, D.C., Keane, R.E., Caratti, J.F., Key, C.H., Benson, N.C., Sutherland, S., Gangi, L.J., Eds.; USDA Forest Service–Rocky Mountain Research Station: Ogden, UT, USA, 2005; pp. 1–51. Available online:https://www.researchgate.net/publication/241688462_Landscape_Assessment_LA_Sampling_and_Analysis_Methods (accessed on 7 April 2019).

6. Verbyla, D.L.; Kasischke, E.S.; Hoy, E.E. Seasonal and topographic effects on estimating fire severity from Landsat TM/ETM+ data. Int. J. Wildl. Fire 2008, 17, 527–534. [CrossRef]

7. Павлейчик В.М. 2018. Опыт применения данных дистанционного зондирования Земли в исследованиях степных пожаров // Успехи современного естествознания. № 11. С. 377-382.

8. Павлейчик В.М. 2019. Широтно-зональная неоднородность развития травяных пожаров в Заволжско-Уральском регионе // Бюллетень Оренбургского научного центра УрО РАН. № 2. С. 1-14

9. Шинкаренко С.С. 2018. Оценка динамики площадей степных пожаров в Астраханской области // Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса. Т. 15. № 1. С. 138-146.

10. Шинкаренко С.С. 2019. Пожарный режим ландшафтов Северного Прикаспия по данным очагов активного горения // Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса. Т. 16. № 1. С. 121-133.

11. Шинкаренко С.С. 2021. Изменение спектрально-отражательных характеристик зональных ландшафтов Северного Прикаспия при пирогенном воздействии // Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса. Т. 18. № 3. С. 192-206

12. Сағынбаева А.Б., Мамбетов Б.Т., Данчева А.В. Қашықтықтан зондтау және ГАЖ тәсілдерін қарағайлы орманның өсімдік жамылғысының қалпына келу процесін зерттеуде қолдану («Семей орманы» мемлекеттік орман табиғи резерваты мысалында) // Ізденістер, нәтижелер. – Алматы, 2023. № 1(97). С. 127-138.

13. Сағынбаева А.Б., Джаманова Г.И., Байгазакова Ж.М., Тұрлыбеков Қ.М. Геоақпараттық жүйе технологиясын пайдалану арқылы орман карталарын құру әдістемесі //Ізденістер, нәтижелер. – Алматы, 2023. № 2(98). С. 305-315.

14. Лепехин П.П. Комплексный мониторинг земель объектов Сахалинского нефтегазового комплекса: автореферат дис. ... кандидата географических наук : 25.00.26 /Лепехин Павел Павлович; [Место защиты: Гос. ун-т по землеустройству]. - Москва, 2018. – 25 с.

15. Yerkinbayeva L. Legal and Economic Problems of the Governmental Regulation of Renewable Energy Sources Usage and Development in the Republic of Kazakhstan// Journal of Advanced Research in Law and Economics Volume VII Issue 6(20) Fall 2016.

16. Nasiyev, B., Bekkaliyev, A., Manolov, I., Shibaikin, V. Influence of grazing technologies on the indices of chestnut soils in western Kazakhstan. Polish Journal of Soil Science, 2020, 53(1), PP. 163–180.

17. Bondareva, N.A. Registry Errors in the Cadastre under Modern Conditions /N.A.Bondareva // Accounting. Analysis. Auditing. – 2019. – (https://DOI: 10.26794/2408-9303-2019-6-2-68-74).

18. Nasiyev, B., Tulegenova, D., Zhanatalapov, N., Bekkaliev, A., Bekkalieva, A. Specific features of the vegetative and soil cover dynamics in the semiarid pasture ecosystems influenced by grazing. Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences, 2016, 7(4), PP.2465–2473.

19. Barsukova, G.N. Problems of methodological support of the state cadastral valuation of real estate in the Krasnodar region / G.N.Barsukova, M.I. Kolodnaya // British journal for social and economic research. – 2018. – (https://DOI: 10.22406/bjser-18-3.4-23-31).

20. Torekhanov, A.A. Kazakh Research Institute of Economy of Agro-Industrial Complex and Rural Development effective use of remote and near-village pastures of the Republic of Kazakhstan[Text] / A.A. Torekhanov, A.I. Sabirova // Probl. AgriMarket. – 2020. – P. 24–30.

REFERENCES

1. Arkhipov E.V., Kozhakhmetov P.Zh., Cherednichenko A.V. Dependence of the spread of fires in forest ecosystems of Kazakhstan on meteorological conditions // Questions of geography and geoecology. - Almaty, 2011. - No. 3. - P. 41-46.

2. Key, C.H.; Benson, N.C. Measuring and remote sensing of burn severity. In Joint Fire Science Conference and Workshop; Neuenschwander, L.F., Ryan, K.C., Eds.; University of Idaho: Moscow, ID, USA, 1999; Volume 2, Available online: https://www.researchgate.net/publication/241687936_Measuring_and_remote_sensing_of_burn_severity_the_CBI_and_NBR (accessed on 11 April 2019).

3. Rothermel, R.C. How to Predict the Spread and Intensity of Forest and Range Fires; United States Department of Agriculture: Ogden, UT, USA, 1983. Available online: https://www.fs.usda.gov/treesearch/pubs/24635 (accessed on November 6, 2018).

4. Pereira, P.; Cerda, A.; Lopez, A. J.; Zavala, L.M.; Mataix-Solera, J.; Arcenegui, V.; Misiune, I.; Keesstra, S.; Novara, A. Short-term vegetation recovery after a grassland fire in

Lithuania: The effects of fire severity, slope position and aspect. L. Degrad. Dev. 2016, 27, 1523–1534. [CrossRef]

5. Key, C. H.; Benson, N.C. Landscape Assessment (LA) Sampling and Analysis Methods. In FIREMON: Fire Effects Monitoring and Inventory System; Lutes, D.C., Keane, R.E., Caratti, J.F., Key, C.H., Benson, N.C., Sutherland, S., Gangi, L.J., Eds.; USDA Forest Service–Rocky Mountain Research Station: Ogden, UT, USA, 2005; pp. 1–51. Available online: https://www.researchgate.net/publication/241688462_Landscape_Assessment_LA_Sampling_and_Analysis_Methods (accessed on 7 April 2019).

6. Verbyla, D.L.; Kasischke, E.S.; Hoy, E.E. Seasonal and topographic effects on estimating fire severity from Landsat TM/ETM+ data. Int. J. Wildl. Fire 2008, 17, 527–534. [CrossRef]

7. Pavleychik V.M. 2018. Experience of using Earth remote sensing data in steppe fire studies // Uspekhi sovremennogo estestvoznaniya. No. 11. P. 377-382.

8. Pavleychik V.M. 2019. Latitudinal-zonal heterogeneity of grass fire development in the Trans-Volga-Ural region // Bulletin of the Orenburg Scientific Center, Ural Branch of the Russian Academy of Sciences. No. 2. Pp. 1-14

9. Shinkarenko S.S. 2018. Assessment of the dynamics of steppe fire areas in the Astrakhan region // Modern problems of remote sensing of the Earth from space. Vol. 15. No. 1. Pp. 138-146.

10. Shinkarenko S.S. 2019. Fire regime of Northern Caspian landscapes based on active combustion sites // Modern problems of remote sensing of the Earth from space. Vol. 16. No. 1. Pp. 121-133.

11. Shinkarenko S.S. 2021. Changes in the spectral and reflective characteristics of zonal landscapes of the Northern Caspian region under pyrogenic influence // Modern problems of remote sensing of the Earth from space. T. 18. No. 3. P. 192-206

12. Sagynbaeva A.B., Mambetov B.T., Dancheva A.V. Kashyktyktan zondtau zhane GAZh tasilderin karagaily ormanny osimdik zhamylgysysyn kalpyna kelu protsesin zertteude koldanu ("Semey ormany" memlekettik orman tabigi Mysalynda reserves) // Izdenister, natizheler. – Almaty, 2023. No. 1(97). pp. 127-138.

13. Sagynbaeva A.B., Dzhamanova G.I., Baygazakova Zh.M., Turlybekov K.M. Geoakparattyk zhuye technologyson paydalanu arkyly orman kartalaryn kuru adistemesi //Izdenister, natizheler. – Almaty, 2023. No. 2(98). pp. 305-315.

14. Lepekhin P.P. Integrated monitoring of lands of objects of the Sakhalin oil and gas complex: abstract of thesis. ... Candidate of Geographical Sciences: 25.00.26 / Lepekhin Pavel Pavlovich; [Place of protection: State. University of Land Management]. - Moscow, 2018. – 25 p.

15. Yerkinbayeva L. Legal and Economic Problems of the Governmental Regulation of Renewable Energy Sources Usage and Development in the Republic of Kazakhstan// Journal of Advanced Research in Law and Economics Volume VII Issue 6(20) Fall 2016.

16. Nasiyev, B., Bekkaliyev, A., Manolov, I., Shibaikin, V. Influence of grazing technologies on the indicators of chestnut soils in western Kazakhstan. Polish Journal of Soil Science, 2020, 53(1), PP. 163–180.

17. Bondareva, N.A. Registry Errors in the Cadastre under Modern Conditions /N.A.Bondareva // Accounting. Analysis. Auditing. – 2019. – (https://DOI: 10.26794/2408-9303-2019-6-2-68-74).

18. Nasiyev, B., Tulegenova, D., Zhanatalapov, N., Bekkaliev, A., Bekkalieva, A. Specific features of the vegetative and soil cover dynamics in the semiarid pasture ecosystems influenced by grazing. Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences, 2016, 7(4), PP.2465–2473.

19. Barsukova, G.N. Problems of methodological support of the state cadastral valuation of real estate in the Krasnodar region / G.N.Barsukova, M.I. Kolodnaya // British journal for social and economic research. – 2018. – (https://DOI: 10.22406/bjser-18-3.4-23-31).

20. Torekhanov, A.A. Kazakh Research Institute of Economy of Agro-Industrial Complex and Rural Development effective use of remote and near-village pastures of the Republic of Kazakhstan[Text] / A.A. Torekhanov, A.I. Sabirova // Probl. AgriMarket. – 2020. – R. 2

ТҮЙІН

Тұрақты ландшафттық өрттер өсімдік жамылғысының түрлік құрамының өзгеруіне, эрозиялық процестердің жануына ықпал етеді және жануарлар мен олардың тіршілік ету ортасын жояды. Осы себептерге байланысты табиғи далалардың өрт режимін зерттеу өте маңызды. Жұмыста Батыс Қазақстан облысындағы Теректі ауданының 2016-2023 жылдар аралығындағы далалық жерлердің жану динамикасы көрсетіліп талданды. Зерттеу ауданының берілген уақыт аралығындағы деректері бойынша сараптамалық дешифрлеу Sentinel 2 ғарыштық суреттер арқылы жасалды. Барлығы 87 424 га жану анықталды. Алаңның көп бөлігі әрқайсысы бірнеше мың гектардан асатын өте үлкен өрттердің отымен өтті, ал ең үлкен өрттердің ауданы 30 мың гектардан асты. Барлық өртенген аумақтардың көп бөлігі бірнеше рет өрттен өтті. 2020 жылдан кейін аумақтың жанғыштығы айтарлықтай төмендеді, бұл ең алдымен мал басының өсуімен, ал екіншісінде гидротермиялық жағдайлардың нашарлауымен байланысты. Құрғақ жағдайда ауа-райы өрт режиміне өрттің таралу факторы ретінде емес, жанғыш материалдың жеткілікті мөлшерін жинау факторы ретінде әсер етеді. Сондықтан жауын-шашынның азаюы, температура мен жайылымдық жүктемелердің өсуі өсімдік массасы қорларының азаюына байланысты өрттердің саны мен аудандарының азаюына ықпал етеді.

ӘӨЖ: 556.1(574.1)
ҒТАХР 68.31.02, 68.47.33

Есмагулова Б. Ж., Ph.D., https://orcid/0000-0002-3493-216X
«Жәңгір хан атындағы Батыс Қазақстан аграрлық-техникалық университеті» КеАҚ, Орал қ., Қазақстан, bayana_021284@mail.ru

B. Zh. Yesmagulova, PhD., https://orcid/0000-0002-3493-216X
NJSC "West Kazakhstan agrarian and Technical University named after zhangir Khan", Uralsk, Kazakhstan, bayana_021284@mail.ru

АГРООРМАН-ЛАНДШАФТАРЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫМЫ МЕН ДИНАМИКАСЫН ГЕОАҚПАРАТТЫҚ МОДЕЛЬДЕУ
GEOINFORMATION MODELING OF THE STRUCTURE AND DYNAMICS OF AGROCULTURAL LANDSHAFTS

АҢДАТПА

Ауылшаруашылық жерлердің құрылымы мен динамикасын геоақпараттық модельдеудің әдістемесі мен нәтижелері негізінде қарастырылады. Модельдеу кеңістіктік-уақытша ұқсастық қағидатына негізделеді және ауылшаруашылық агроорман-ландшафтарының құрылымы мен динамикасын болжау үшін кеңістіктік өзгерістер туралы заңдылықтарды анықтайды. Жер бедерінің сандық моделын математикалық өңдеуге негізделген және жер бедерінің кеңістіктік сипаттамаларын аналитикалық модельдеу нәтижелері негізінде көрсетілген. Сандық болжамды карта бұл - ландшафттардың бүлінуге қарсы тұрақтылығын агроорманмелиорациясы арқылы қамтамасыз ететін геоақпараттық жүйесінің негізі. Ол келесі ақпараттардан құралады: нысандардың географиялық жағдайы; беттік беткейлер және олардың әсері; топырақ құрамы және гумус мөлшері; өсімдіктердің негізгі түрлері егістік жерлер үшін мәдени, жайылымдар үшін азықты шөптер құрамы,

орман шаруашылығына арналған ағаш тұқымдары; нысанның экологиялық жағдайы туралы мәліметтер (қазіргі және болжамдағы бүліну деңгейі); нысанның көлемі мен формасы. Ғарыштық фото-түсірістерге талдау жасау зерттеу объектісін сипаттайтын сандық мәнде мәліметтер алуды қамтиды. Ақпарат сандық кескінде түрлі тондар мен пиксель түрінде қамтылған. Фототонның мағынасына қарай пиксельдерге бөлу арқылы зерттеу, бақылау нысанының сандық сипаттамаларымен олардың корреляциясын құруға мүмкіндік береді.

ANNOTATION

Considered on the basis of the methodology and results of geoinformation modeling of the structure and dynamics of agricultural land. The simulation is based on the principle of spatio-temporal similarity and defines patterns of spatial change to predict the structure and dynamics of agroforest landscapes. Based on mathematical processing of a numerical model of the area and based on the results of analytical modeling of the spatial characteristics of the area, it is shown. The digital forecast map is the basis of a geoinformation system that ensures the sustainability of landscapes from destruction through agroforestry. It consists of the following information: geographical position of the sites; surface slopes and their influence; soil composition and humus quantity; main plant species - cultivated for arable land, composition of forage grasses for pasture, tree seeds for forestry; information on the ecological status of the site (level of damage at present and forecast); size and shape of the site. Analysis of space photography includes obtaining data in quantitative terms characterizing the object of study. The information is contained in a digital image in the form of various tones and pixels. By dividing the phototon into pixels according to their meaning, the study allows us to construct their correlation with the numerical characteristics of the object of observation.

Түйін сөздер: *динамика, агроорман-ландшафт, модельдеу, картографиялау, ғарыштық түсірістер, геоақпараттық жүйе*.

Key words: *dynamics, agroforestry-landscape, modeling, mapping, space surveys, geoinformation system*.

Кіріспе. Агроландшафтардағы уақыт пен кеңістік аралығында болып жатырған өзгерістерді талдаудағы геокеңістіктік парадигма мониторинг жүргізіліп отырған нысандағы процестердің бүліну тенденцияларын анықтайды және нысанның болашақ жағдайын болжайды. Талдау көпжылдық болжамды бақылаулардың мәліметтеріне негізделеді, соның негізінде болжам орындалады[10]. Агроорман-ландшафтысы - бұл күрделі экологиялық жүйе, ол Қазақстанның аридті және субаридті территорияларда тепе-теңдік тұрақсыз жағдайында [2,3]. Сонымен қатар, тұрақтылық шегінен асатын сыртқы әсер экологиялық жүйені осы күйден шығарып тастап отырады, бірақ кез-келген өзін-өзі басқаратын жүйе негізінде, ол бастапқы күйіне оралуға тырысады. Алайда, табиғи қалпына келтіру процестер өте ұзақ уақытты қажет етеді. Бүліну түріне қарай, бүлінген қарашірік қалпына келтірілгенге дейін бірнеше жыл немесе бірнеше мың жыл бойы да орын алуы мүмкін. Осыған байланысты, агроорманмелиорациясының міндеті – агроландшафтардың экологиялық жағдайын өзгерту процестерін зерттеу болып табылады.

Материалдар және зерттеу әдістері. Бүліну процестеріндегі геоақпараттық модельдеудің әдістемесі кеңістіктік және болжамды талдаудағы, агроорман-ландшафтарының құрылымы мен динамикасын модельдеуге және болжауға негізделген [5,6]. Экологиялық, математикалық-картографиялық модельдеу бізге бүлінген агроландшафтардың болжамды картасын сандық және қағаз түрінде құрастыруға мүмкіндік береді.

Белгілі бір шифрланған (визуалды) топтарға бөлінген контурлардың геоақпараттық талдауы, зерттеу нысанының ғарыштық фотокартасының контурларында белгіленген пиксильдердің бөлінуімен зерттеуге негізделеді. Таңдалған контур біртекті нысанның

шекараларын дәл анықтайтындығына сүйене отырып, бұл контурдың барлық пикселдерін берілген объектінің сипаттамасына жатқызуға болады. Дегенмен, кейінгі талдау кезінде кейбір пикселдер есепке алынбайды, өйткені олар фототон мәні бойынша шекаралық нысанға жататын пикселдер топтарына жатуы мүмкін. Шекаралық нысандар деп - зерттеу объектісін анықтайтын диапазоннан тыс жатқан фототон мәндерінің аймақтарын айтады [1,2].

Зерттелетін нысанның жай-күйін талдаудың ең маңызды элементі болып кескіннің фототонын нысанның нақты күйіне жатқызу болып табылады. Осыған байланысты фототон мәндерін зерттеу нысанының нақты жағдайымен байланыстыруға мүмкіндік беретін эталондауда маңызды болып табылады.

Эталондау нәтижесінде фототон шамасының (мәндер ауқымы) ең ықтимал мәні анықталады, оны нысандардың бүліну деңгейімен байланыстыруға болады.

Әрі қарайғы зерттеулер төмендегідей міндеттерден құралады:

–берілген фототон диапазонына кіретін пикселдердің жалпы санымен анықталатын әртүрлі бүліну деңгейлеріне жатқызылған біртекті нысандардың аудандарын есептеуге;

–бүлінуге ұшыраған және қауіпті бүліну ошақтарының координаттарын белгілеуге;

–тұтастай нысанның бүліну деңгейін анықтауға;

–зерттеу нысандарын ұтымсыз пайдаланудан болатын шығындарды бағалауға.

Агроорман ландшафтындағы дискретті нысанның компьютерлік модельдері олардың ағымдағы жағдайын сипаттайтын және кесте немесе сандық картографиялық түрде көрсетілген параметрлердің жиынтығы немесе кеңістік шеңберінде жүзеге асырылатын процестердің дамуының болжамды-динамикалық интерпретациясы болып табылады.

Сандық картографиялық пішін ландшафтың көрнекі моделі болып табылады, ал қолданылатын атрибутивтік, топологиялық және типологиялық ақпарат пайдаланушыға зерттеу жүргізу үшін таңдалған нысандарддың сандық сипаттамаларын анықтауға мүмкіндік береді.

Бұдан шығатыны, агроландшафттың компьютерлік моделі ғарыштық фото түсірістердің компьютерлік шифрын ашу нәтижелері бойынша жасалған мәліметтер базасын қамтиды; дерекқорда қамтылғандарды өңдеу нәтижесінде алынған ландшафттық нысандардың сипаттамаларын анықтайтын математикалық тәуелділіктер жүйесінен; кеңістіктік-уақыттық аспектідегі ландшафттық нысандардың сипаттамаларының өзгеру динамикасын және агроорманландшафтың сандық картографиялық моделін анықтайтын математикалық тәуелділіктер жүйесінен құралады.

Ландшафтың жер бедері, топырақ және өсімдіктер сияқты негізгі құрамдас бөліктерінің экологиялық жағдайын модельдеу қарастырылып отырған ландшафтық нысан қандай антропогендік жүктемені қандай жағдайда көтере алатындығы, ондағы экологиялық жағдай қалай дамиды деген сұраққа жауап беруге мүмкіндік береді және ең бастысы қандай мелиоративтік жұмыстар қай жерде қажет екендігін анықтайды.

Агроландшафтың жай-күйінің тақырыптық деректерді бөлуі арқылы, картографиялық көрініс жиынтығының сандық картографиялық моделінің мазмұнын құрайды. Тақырыптық бөлімді пайдалана отырып, жер бедерін модельдеу қарапайым картографиялық модельден көпөлшемді модельге көшуге мүмкіндік береді, оның мәні көпөлшемді деректерді үш өлшемді деректер қатарына кеңейту болып табылады. Картографиялық модельдерді құрудың бұл тәсілі кеңістіктік сипаттамаларды олардың өзара байланысында көрсетуді ғана емес, сонымен бірге қарастырылып отырған ландшафттардағы процестер мен құбылыстардың көрінісін қамтамасыз етеді.

Агроландшафттың сандық картографиялық моделіне жер бедерінің растрлық (ғарыштық кескін) және топографиялық (карта) үлгілері, өсімдіктер мен жер бедерінің оқшауланған үлгілері, топырақ моделі, беткейлердің тіктігі мен экспозициясының векторлық моделі және үш өлшемді жер бедері моделі кіреді.

Ландшафттық модельді құру әдістемесі бірнеше ақпарат көздерін пайдалануға негізделген, атап айтқанда: жер бетінің бір бөлігін ғарыштық суретке түсіру, ландшафттық карта, жер бетінің белгілі бір учаскесіне топографиялық карта, топырақ картасы, өсімдік картасы және т.б., сондай-ақ олардың топографиялық координаталары мен биіктік белгілерін нақтылай отырып, модельдік нүктелерді зерттеуге арналған GPS деректері жатады.

Сонымен қатар, ғарыштық суреттер ауылшаруашылық ландшафтының жағдайын модельдеу үшін негізгі деректер көзі ретінде қарастырылады, ал цифрланған түрде ұсынылған фотосуреттің өзі беттің растрлық моделі болып табылады.

Кез келген нүктедегі жер бедерінің биіктіктерін берілген биіктік белгілер жиыны бойынша анықтау үшін әртүрлі интерполяция әдістері қолданылады. Дискретті биіктік белгілерін компьютерлік өңдеу кезінде жер бедерін тегістеуге және деректердің үздіксіз ағынын жасауға мүмкіндік беретін әмбебап кригинг әдісі жиі қолданылады. Жақындау дәлдігі тор түйіндерінің жиілігіне байланысты болады.

Кеңістіктік жер бедерінің конфигурациясы бойынша деректерді жинау ғарыштық-фотокартаға қолданылатын үлгі торының координаталарын анықтауды, алынған үлгі торының негізінде тор координаттарына (x, y) биіктік белгілерінің (z) сәйкестігіне электрондық кестелерді құруды қамтиды.

Кеңістік-уақыттық талдау үшін деректерді түрлендіру кестелік түрде жүзеге асырылады, мұнда функцияның әрбір мәні уақыт аргументтерінің мәнімен сәйкестендіріледі және табылған регрессия теңдеулері негізінде функция мәндерінің өзін есептеуге болады.

Нүктелердің жиынтығы ретінде қарастырылатын жер бедерінің құрылымдық-сандық моделін біріктіру: негізгі (талвегтерге жауап беретін) және апикальды (су алаптарына жауап беретін), – яғни әртүрлі ретті инвариантты жер бедерінің сызықтар жүйесі, оның «қаңқасы және уақыт бойынша модельдеу объектісінің күйінің өзгеру динамикасын сипаттайтын аналитикалық тәуелділіктер, болжамдық сипаттағы жер бедерінің модельін алуға мүмкіндік береді.

Бұл модель шеңберінде жер бедерінің құрылымы келесі компоненттермен анықталады:

– инвариантты сызықтар желілерінен құралған жақтау;

– құрылымның тік құрамдас бөлігі немесе құрылымдық деңгейлердің реттелген жиынтығын құрайтын жер бедерінің тәртіптері;

– әртүрлі ретті элементтердің нақты жер бедеріндегі кеңістіктік комбинациясы ретінде көрсетілген көлденең компонент.

Жақтау ретінде сызықтардың үш түрі қарастырылады: талвегтер, су айрықтары және беткейлердің иілулері.

Электрондық кестелерде қолданылатын картографиялық жүйелер мен үш өлшемді кескін редакторлары үшін өңдеуге қолжетімді түрге түрлендіру кестелерді конфигурациялау талаптарына сәйкес жүзеге асырылады. Көптеген мамандандырылған бағдарламалық карта жасау кешендері, соның ішінде «Talka 3.3», деректерді ішкі пішімдерге түрлендірудің кірістірілген жүйелеріне ие, бұл осы кешендерде деректерді енгізу және өңдеу уақытын айтарлықтай қысқартады.

Статикалық немесе өте баяу өзгеретін ландшафт элементтерін модельдеу ұяшықтарға шифрды шешу арқылы алынған немесе аналитикалық есептелген деректерді енгізу арқылы бірдей кестелерді пайдалану арқылы жүзеге асырылады. Мұндай деректердің сандық мәндері нысанның күйін сипаттайды, мысалы, жер бедері биіктігінің бойлық пен ендік бойынша өзгеруі.

Координаттар мен биіктік белгілерін пайдалана отырып, үш өлшемді цифрлық жер бедерінің моделін құру сандық мәндерді үш өлшемді кескінге түрлендіруге мүмкіндік беретін графикалық редакторда жүзеге асырылуы мүмкін.


Компьютерлік карта жасауда мамандандырылған картографиялық бағдарламаларды қолдану («Talka 3.3» және т.б.) рельефтің үш өлшемді моделін құру үшін де, ландшафттық объектілерді тақырыптық картаға түсіру үшін де операцияларды автоматтандырудың жоғары деңгейін қамтамасыз етеді.

Зерттеу нәтижелері. Ажыратымдылығы жоғары ғарыштық суреттерді [2,3,4,5,6,7,8] ГАЖ жүйелерімен (SAS планет, Global Mapper және т.б.) бірге пайдалану Батыс Қазақстан облысындағы Ешкі тауының сандық ауқымды космофотокартасын құруға мүмкіндік берді (сурет 1).



Сурет 1 – Сынақ учаскесінің ғарыштық түсірісі (Батыс Қазақстан облысы Ешкі тау)

ASTER GDEM сандық биіктік моделі және GDEM жаһандық сандық биіктік моделі [6] негізінде Батыс Қазақстан облысындағы Ешкі тауының жер бедерінің сандық моделі жасалынды, оны изолинейлік биіктік картасымен бейнелеуге болады (сурет 2).



Сурет 2 – Сынақ учаскесінің жер бедерінің изосызықтық моделі


Цифрлық модельдер заңдылықтарды анықтауға және оларды сипаттайтын математикалық тәуелділіктерді құру арқылы жер бедерін зерттеуге мүмкіндік береді.

Жоғарыда келтірілген модельдер географиялық тұрғыдан анықталған (геокодталған) болғандықтан, кескіннің әрбір нүктесінің «Aster GDEM» биіктік үлгісіне негізделген [9,11] позиция дәлдігі 1" (50° ендік үшін бетінде 20 м) географиялық координаттары бар.

Биіктік белгілерінің аралық мәндері негізінен кригинг әдісін қолдана отырып, MapInfo, GlobalMapper немесе Surfer геоақпараттық және картографиялық бағдарламалық пакеттерде құрастырылған. Бұл әдіс қолда бар деректердің көршілес жер бедері аймақтарына интерполяциясын қамтамасыз етеді.

Бағдарламалық кешендер аппаратында бар математикалық функциялар жер бедерінің есептік сипаттамаларының сандық сипаттамасын да, осы есептеулердің визуализациясын

да қамтамасыз етеді, бұл еңістердің көлбеу бұрыштарының (сурет 3 А) және еңістердің (сурет 3 Б) карталарын құруға мүмкіндік береді.



А Б


Сурет 3 – Сынақ учаскесіндегі еңістердің көлбеу бұрыштарының картасы

Қолда бар сандық модельдерді пайдалана отырып, жер бедерінің ерекшеліктерін зерттеу тұрақты қайталанатын заңдылықтарды сипаттайтын аналитикалық тәуелділіктерді дамытуға, беткейлердің еңістері мен бұрыштарын, олардың кез келген бағыттағы ұзындығын есептеуге мүмкіндік береді, бұл ландшафтық және агроорман-мелиорациялық жоспарларды құруға негіз болып табылады.

Мұндай карталарды жобалау алдындағы зерттеулерде пайдалану ландшафттың эрозиялық қауіпті аймақтарын анықтауға, аймақтарға бөлі мен эрозиялық қауіпті аймақтарды картографиялап картаға түсіру үшін деректермен қамтамасыз етеді. Аймақтарға бөлу негізінде қорғаныш орман екпелерінің сызбасы мен типін алдын ала таңдауды жүзеге асырады.

Жер бедерінің орталық моделі негізінде әзірленген жер бедерінің пластикалық картасы жер бедерінің қазіргі жағдайын анықтауға мүмкіндік береді. Пластикалық параметрлерді есептеу үшін ойыс және дөңес беттердің аймақтарын көрсететін карта құрастырылды (сурет 4). Бұл учаскедегі ойыс жер бедері элементтеріне 429829,22 га немесе 35,91%, ал дөңес элементтеріне – 766970,78 га немесе 64,09% жататыны анықталды.

Меридиандық бағыттағы беткейлердің геоморфологиялық ерекшеліктерін анықтау үшін Батыс Қазақстан облысы Ешкі тауы бойы учаскесінің меридиандық қимасын сандық моделі салынды, ол қима бойындағы беткейлердің орналасуын ғана көрсетіп қана қоймайды, сонымен қатар жер бедерінің статистикалық параметрлерін есептеуге мүмкіндік береді.



Сурет 4 – Сынақ учаскесіндегі ойыс және дөңес беттердің картасы

Қима сипаттамалары: өлшемдердің басы (нүкте) – 51° 12' 42" с.е., 51° 14' 28" ш.б.; бастапқы биіктігі – 74 м; соңғы биіктігі – 176,6 м.

176,7 м; қима қашықтығы – 19,2 км; қима бойынша биіктік айырмашылығы – 102,7 м; қима бойынша ең төменгі биіктік – 58,7 м; қима бойынша максималды биіктік – 209,2 м; бетінің жалпы еңісі – 0,31°; беттің максималды көлбеу бұрышы – 20,31° (қима сызығы бойынша 14,4 км).

R^2=0,921 жуықтау сенімділік коэффициенті бар қима пішінін (1) сипаттайтын теңдеуді келесідей көрсетуге болады:

$$H=64.242e^{0.0559l} \qquad (1)$$

мұндағы l – бастапқы нүктеден қашықтық. Мұндай теңдеулерді пайдалану ландшафттарда болып жатқан процестерді одан әрі модельдеу үшін беттің биіктік белгілерінің статистикалық негізделген орташа деңгейін аналитикалық анықтауға мүмкіндік береді.


Агроорман алқаптарының динамикасын геоақпараттық модельдеу ғарыштық түсірістерде сенімді түрде анықталған бүліну критерийлерін пайдалануға негізделген. Ландшафттардың жай-күйін анықтау үшін ғарыштық түсірістерді дешифрлеу кескіннің үні мен сызбасының айырмашылығын анықтауға және бағалауға, бүліну деңгейлері бойынша контурларды анықтауға мүмкіндік беретін арнайы бағдарламалық өнімдерді қолдану арқылы жүзеге асырылады (Talka 3.1, ENVI 5.3 және т.б.).

Ландшафттардың бүліну деңгейі келесідей дешифрлік белгілерімен анықталады: ашық топырақ түзетін тау жыныстарының ауданы (С горизонты) немесе астыңғы жыныстардың ауданы (D горизонты); аумақтың жыралармен бөлінуі; жылжымалы құмдардың ауданы; орташа және жоғары эрозияға ұшыраған топырақтардың ауданын ұлғайту; жайылымдарды азықты өсімдіктермен қамту; бүлінген жайылымдар аумағында өсімдіктердің өсу қарқыны және т.б.

Геоақпараттық жүйе технологиялары бағдарламаларын пайдалана отырып, Ешкі тауының оңтүстігіндегі ландшафттарды зерттеу нәтижесінде «GlobalMapper», «MapInfo», «Surfer» 3 м-ге дейінгі рұқсаты бар ғарыштық суреттер негізінде і орман екпелерін сақтау үшін жергілікті әр түрлі уақыт аралығындағы ғарыштық түсірістерді құру арқылы ландшафттардың геоақпараттық картасын жасау жүргізілді.

Ешкі тау сынақ учаскесінде ағынды реттейтін орман белдеуінің сақталу динамикасы зерттелінді. Орман жолағы жоғарыда қарастырылған жайылым алқаппен салыстырғанда еңіс бойымен жоғары орналасқан, соның нәтижесінде бұл учаске үшін су жинау алаңынан ағынды реттеуді қамтамасыз ететін тосқауыл болып табылады.

Әр уақыттағы ғарыштық түсірістерді талдағанда (сурет 5) сынақ учаскесінде алты қатарлы эрозияға қарсы орман екпелерінің сақталуы 2012 жылы небәрі 31,1%-ды құрады.



Сурет 5 – Сынақ учаскесіндегі орман алқаптарының әртүрлі уақыт аралығындағы ғарыштық түсірісі

Сынақ учаскесіндегі екпелердің сақталуындағы өзгерістерді регрессиялық талдау R2=0,995 жуықтау сенімділігінің коэффициентімен экспоненциалды типті (2) болжамдық-математикалық модельді әзірлеуді қамтамасыз етті:

$$y=67,45e-0,078x(3), \qquad (2)$$

мұндағы у – екпелерді сақтау %, ал х – уақыт аралығы жылдар.

Әзірленген теңдеу ағынды суларды реттейтін екпелердің сақталу және бүліну динамикасын болжауға мүмкіндік береді. Болжам 2026 жылға қарай қажетті қалпына келтіру шаралары болмаған жағдайда зерттелетін екпелердің қауіпсіздігі 15-17% құрайтынын көрсетті, бұл жайылым жерлерді іс жүзінде қорғаныссыз қалдырады. Сонымен қатар, бұрын осы екпелермен жабылған жайылым жерлерді шайып кету және эрозия процестері жаңа, қарқынды динамикаға ие болады, бұл жайылым алқабындағы топырақтың шайылуымен расталады.

Қорытынды. Ғарыштық түсірістерді дешифрлеуге негізделген тақырыптық сандық ландшафт карталарының жиынтығын қамтитын геоақпараттық кешен құру, сондай-ақ ландшафтың ғарыштық картасын жасау оның эрозия күйін зерттеуге, негізгі су айдындарының сипаттамаларын анықтауға және анықтауға мүмкіндік береді. Мұндай карта ландшафтық және эрозиялық карталарды құрудың негізі болып табылады және карталардың қажеттілігі ландшафтың құрамдас бөліктерінің топологиясы туралы да, оның жағдайы туралы да ақпаратты жаңарту қажеттілігінен туындайды. Ғарыштық карта, шын мәнінде бар ландшафтың көрінісі болғандықтан, оны оның растрлық моделі деп санауға болады. Растрлық модельді сандық жер бедерінің модельмен біріктіру мелиоративтік жұмыстарды ұйымдастыру және жүргізу үшін қажетті ландшафтың сипаттамасын білдіретін ақпараттық өрісті жасайды.

Заманауи компьютерлік технологиялар қолайлы уақыт режимінде динамикалық карта деректерінің үлкен көлемін мақсатты өңдеуге және автоматтандырылған интерпретациялауға мүмкіндік береді. Геоақпараттық бағдарламалық жүйелерді пайдалана отырып, агроорман алқаптарының өзгеруін бағалау мен болжаудың жаңа тиімді технологиясы олардағы процестердің заңдылықтарын зерттеуге және нақты жағдайдың дамуын болжауға негіз болып табылады.

ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

1. Анопин В.Н., Рулев А.С. 2007. Картографирование деградированных ландшафтов Нижнего Поволжья. Волгоград: ВолгАСУ. 168 с.

2. Виноградов Б.В. 1984. Аэрокосмический мониторинг экосистем. М.: Наука. 320 с.

3. Виноградов Б.В. 1993. Дистанционные индикаторы опустынивания и деградации почв // Почвоведение. № 2. С. 98-103.

4. Виноградов Б.В., Кулик К.Н., Сорокин А.Д., Федотов П.Б. 1988. Картографирование зон экологического неблагополучия по динамическим критериям // Экология. № 4. С. 243- 251.

5. Кулик К.Н., Рулев А.С., Юферев В.Г. 2009. Дистанционно-картографическая оценка деградационных процессов в агроландшафтах юга России // Известия Нижневолжского агроуниверситетского комплекса. Наука и высшее профессиональное образование. № 4. С. 12-25.

6. Кулик К.Н., Юферев В.Г. 2010. Компьютерное математико-картографическое моделирование агролесоландшафтов на основе аэрокосмической информации // Доклады Российской академии сельскохозяйственных наук. № 1. С. 52-54.

7. Кулик К.Н., Юферев В.Г., Рулев А.С., Кретинин В.М., Павловский Е.С. 2010. Модели агролесоландшафтов (математико-картографические) для деградированных территорий сухостепной зоны Европейской части РФ // Достижения науки в Волгоградской области 2004-2009 гг. Волгоград: Панорама. С. 414-416.

8. Рулев А.С., Юферев В.Г., Юферев М.В. 2011. Методология геоинформационного моделирования // Вестник Российской академии сельскохозяйственных наук. № 5. С. 5-6.

9. Трофимов А.М., Московкин В.М. 1983. Математическое моделирование в геоморфологии склонов. Казань: Издательство Казанского университета. 219 с.

10. Юферев В.Г., Кулик К.Н., Рулев А.С. 2004. Картографо-аэрокосмический мониторинг ландшафтов // Эколого-экономическая оптимизация природопользования: материалы круглого стола, г. Волгоград: Издательство «ВолГУ». С. 215-219.

11. Mather P.M. 2004. Computer processing of remotely-sensed images: an introduction. New- York: Wiley. 442 p.

REFERENCES

1. Anopin VN, Rulev AS. Mmvii. Mapping of degraded landscapes of the Lower Volga region. Volgograd: VolgASU. 168 pp.

2. Vinogradov BV 1984. Aerospace vigilantia oecosystematis. M.: Scientia. 320 p.

3. Vinogradov BV MCMXCIII. Indices remoti desertificationis et soli degradationis //Soil scientiae. № II. S. 98-103.

4. Vinogradov BV, Kulik KN, Sorokin AD, Fedotov PB 1988. Mapping zonarum incommoditatis environmental secundum criteria dynamica //Ecologia. № 4. P. 243-251.

5. Kulik KN, Rulev AS, Yuferev VG. Mmxix. Longinquus aestimatio cartographica degradationis processuum in landscapes agriculturae Russiae meridionalis//Izvestia universitatis agriculturae Nizhnevolzhsky complexus est. Scientia et educatio professionalis superior. № 4. S. 12-25.

6. Kulik KN, Yuferev VG. mmx. Computatrum mathematicum et cartographicum exemplar agrorum agrorum agroforestriae innixum in notitia aerospace//Renuntiationes Academiae Scientiarum Agricultural. № 1. S. 52-54.

7. Kulik KN, Yuferev VG, Rulev AS, Kretinin VM, Pavlovsky ES. mmx. Exempla agrorum agrorum (mathematicorum et cartographicorum) pro degradatis territoriis aridae adsurgit zonae Europaeae partis Foederationis Russicae //Res scientiarum in regione Volgograd 2004-2009. Volgograd: Panorama. S. 414-416.

8. Rulev, AS, Yuferev, VG, Yuferev, MVmmxi.Methodologia geoinformationum exemplar//Bulletin Academiae Scientiarum Agricultural. № 5. S. 5-6.

9. Trofimov, AM, Moskovkin, VM 1983. Exemplar Mathematicum in clivo geomorphologiae. Kazan: Kazan University Press. 219 pp.

10. Yuferev VG, Kulik KN, Rulev AS. Mmviii. Cartographic et aerospace vigilantia landscapes///Ecologicae et oeconomicae optimizationis administrationis environmental: materias mensae rotundae, Volgograd: Publishing domus «VolSU». S. 215-219.

11. Mater PM. Mmviii. Processus computatorii imaginum remotarum sensibilium: introductio. Venetiis: Wiley. 442 p.

РЕЗЮМЕ

Рассмотрено на основе методологии и результатов геоинформационного моделирования структуры и динамики земель сельскохозяйственного назначения. Моделирование основано на принципе пространственно-временного подобия и определяет закономерности пространственных изменений для прогнозирования структуры и динамики агролесо-ландшафтов. На основе математической обработки численной модели местности и на основе результатов аналитического моделирования пространственных характеристик местности показано. Цифровая прогнозная карта является основой геоинформационной системы, обеспечивающей устойчивость ландшафтов от разрушения посредством агролесомелиорации. Он состоит из следующей информации: географическое положение объектов; поверхностные склоны и их влияние; состав почвы и количество перегноя; основные виды растений - культурные для пахотных земель, состав кормовых трав для пастбищ, семена деревьев для лесного хозяйства; информация об экологическом состоянии объекта (уровень повреждений в настоящее время и прогноз); размер и форма объекта. Анализ космических фотосъемки включает получение данных в количественном выражении, характеризующем объект исследования. Информация содержится в цифровом изображении в виде различных тонов и пикселей. Разбивая фототон на пиксели по смыслу, исследование позволяет построить их корреляцию с числовыми характеристиками объекта наблюдения.

УДК 633.2:636.085
МРНТИ 68.35.47; 68.05.43; 87.35.29

Жанаталапов Н.Ж., PhD доктор, и.о. доцента, https://orcid.org/0000-0002-5946-3929
НАО «Западно-Казахстанский аграрно-технический университет имени Жангир хана», 090009, ул.Жангир хана 51, г.Уральск, Республика Казахстан, Nurbolat-z86@mail.ru
Насиев Б.Н., доктор с.х. наук, профессор, академик НАН РК, https://orcid.org/0000-0002-3670-8444
НАО «Западно-Казахстанский аграрно-технический университет имени Жангир хана», 090009, ул.Жангир хана 51, г.Уральск, Республика Казахстан, veivit.66@mail.ru
Байбатырова М.А., магистр. http://orcid.org/0000-0002-7940-626X
НАО «Западно-Казахстанский аграрно-технический университет имени Жангир хана», 090009, ул.Жангир хана 51, г.Уральск, Республика Казахстан, baibatyrovamadina@mail.ru
Хиясов М.Г., магистр с.х.наук, PhD докторант. https://orcid.org/0000-0001-9143-7141
НАО «Западно-Казахстанский аграрно-технический университет имени Жангир хана», 090009, ул.Жангир хана 51, г.Уральск, Республика Казахстан, h.madiyar-97@mail.ru
Латенова А.М., магистрант. https://orcid.org/0009-0001-5106-6590
НАО «Западно-Казахстанский аграрно-технический университет имени Жангир хана», 090009, ул.Жангир хана 51, г.Уральск, Республика Казахстан, alatenova02@mail.ru
Султангалиев Д.У., магистрант. https://orcid.org/0009-0004-7010-3619
НАО «Западно-Казахстанский аграрно-технический университет имени Жангир хана», 090009, ул.Жангир хана 51, г.Уральск, Республика Казахстан, damir_sultan@mail.ru

Zhanatalapov N.Zh., PhD, Acting Associate Professor, https://orcid.org/0000-0002-5946-3929
Zhangir khan West Kazakhstan Agrarian - Technical University, 090009, Uralsk. st. Zhangir Khan, 51, Republic of Kazakhstan, Nurbolat-z86@mail.ru
Nasyiev B.N., Doctor of Agricultural Sciences, Professor, Academician of the National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan, https://orcid.org/0000-0002-3670-8444

Zhangir khan West Kazakhstan Agrarian - Technical University, 090009, Uralsk. st. Zhangir Khan, 51, Republic of Kazakhstan, veivit.66@mail.ru
Baibatyrova Madina A., master's degree. http://orcid.org/0000-0002-7940-626X
Zhangir khan West Kazakhstan Agrarian - Technical University, 090009, Uralsk. st. Zhangir Khan, 51, Republic of Kazakhstan, baibatyrovamadina@mail.ru
Khiyasov M.G., Master of Agricultural Sciences, PhD doctoral student, https://orcid.org/0000-0001-9143-7141
Zhangir khan West Kazakhstan Agrarian - Technical University, 090009, Uralsk. st. Zhangir Khan, 51, Republic of Kazakhstan, h.madiyar-97@mail.ru
Latenova A.M., Master's student. https://orcid.org/0009-0001-5106-6590
Zhangir khan West Kazakhstan Agrarian - Technical University, 090009, Uralsk. st. Zhangir Khan, 51, Republic of Kazakhstan, alatenova02@mail.ru
Sultangaliyev D.U. Master's student. https://orcid.org/0009-0004-7010-3619
Zhangir khan West Kazakhstan Agrarian - Technical University, 090009, Uralsk. st. Zhangir Khan, 51, Republic of Kazakhstan, damir_sultan@mail.ru

ИЗУЧЕНИЕ РОТАЦИОННЫХ ПАСТБИЩ ЗАПАДНОГО КАЗАХСТАНА
STUDY OF ROTARY PASTURES OF WESTERN KAZAKHSTAN

АННОТАЦИЯ

Основываясь на полученных результатах, исследования отражают возможность применения практики ротационной системы использования пастбищ в программе развития животноводства в стране. Данный способ использования пастбищ в зоне полу-пустынь Западного Казахстана посредством их ротации способствовало повышению продуктивности травостоев до 0,58-0,68 т/га в весенний, до 0,60-0,75 т/га в летний и до 0,30-0,37 т/га в осенний пастбищные сезоны с оптимальными параметрами качества и выходом ценной в кормовом и энерго-протеиновом отношении питательной массы для сельскохозяйственных животных: 0,11-0,15 т/га кормовые единицы, 0,1-0,2 т/га переваримого протеина и 1,54-2,03 ГДж/га обменной энергии. Полученные научные данные имеют огромное значение в политике развития животноводства и обеспечения продовольственной безопасности, а также реализации программ по эффективному управлению и рациональному использованию пастбищных экосистем в Республике Казахстан. Результаты исследований имеют актуальность и восстребованность у фермеров, занимающимся разведением жвачных животных и производством продовольствия в виде мяса и молока. Рекомендуемые приемы, безусловно, обеспечит круглогодичное и бездефицитное наличие полноценных кормов для устойчивого кормления жвачных и повышения продуктивности животных.

ANNOTATION

Based on the results obtained, the research reflects the possibility of applying the practice of the rotational system of pasture use in the livestock development program in the country. This method of using pastures in the semi-desert zone of Western Kazakhstan through their rotation contributed to an increase in herbage productivity to 0.58-0.68 t/ha in spring, to 0.60-0.75 t/ha in summer and to 0.30-0.37 t/ha in autumn pasture seasons with optimal quality parameters and yield of valuable feed and energy-protein ratio of nutrient mass for farm animals: 0.11-0.15 t/ha feed units, 0.1-0.2 t/ha of digestible protein and 1.54-2.03 GJ/ha of metabolic energy. The scientific data obtained are of great importance in the policy of livestock development and food security, as well as the implementation of programs for the effective management and rational use of pasture ecosystems in the Republic of Kazakhstan. The research results are relevant and in demand among farmers engaged in the breeding of ruminants and the production of food in the form of meat and milk. The recommended methods will certainly ensure the year-round and deficiency-free

availability of full-fledged feeds for sustainable ruminant feeding and increased animal productivity.

Ключевые слова: *пастбища, ротационные пастбища, продуктивность пастбищ, деградированные пастбища, показатели растительного покрова*

Key words: *pastures, pasture rotation, pasture productivity, degraded pastures, indicators of plant cover*

Введение. Ротационный выпас скота используется в сельском хозяйстве уже много лет и был признан более эффективной и устойчивой альтернативой непрерывному выпасу скота. Сельскохозяйственные публикации объясняют, что ротационный выпас обеспечивает травы большим количеством солнечного света, воды и питательных веществ, а также дает больше времени для отрастания и укоренения корней, что приводит к повышению качества и количества кормов и ускорению их сбора в интересах скота [1, 2, 3]. Таким образом, при одинаковом количестве травы в обеих ситуациях ротационный выпас позволяет прокормить большее количество скота и, следовательно, является более продуктивным. Однако не существует опубликованного количественного метода, который конкретно описывал бы это улучшение [4, 5]. Более того, для ротационного выпаса скота в целом требуется множество параметров, таких как количество загонов, период ротации и соответствующий коэффициент, который представляет собой процент от общего количества корма, который должен быть потреблен. Фермеры экспериментировали с этим; некоторые используют тридцать загонов и чередуют их каждый день, в то время как другие используют три загона и чередуют каждые две недели. Таким образом, большинство утверждает, что ротационный выпас варьируется в зависимости от ферм и предлагаемых условий.

Выпас скота является основным способом использования пастбищных угодий и важным способом поддержания здоровья и стабильности продуктивности пастбищной экосистемы [6, 7, 8, 9]. Однако традиционный выпас скота зимой и весной негативно сказывается на устойчивом развитии и управлении экосистемой в полупустынной степи. Определение разумных методов выпаса скота на пастбищах будет оставаться важнейшим вопросом для сохранения окружающей среды и рационального использования пустынных степей. Поэтому нашей целью было изучить влияние чередования выпаса скота на видовое разнообразие и функциональное разнообразие травянистых растений, а также выявить факторы, контролирующие растительные сообщества. Наши результаты могут послужить теоретической основой для разработки разумной и научно обоснованной системы выпаса скота в полупустынных степях.

На протяжении многих лет пастбища Западного Казахстана использовались местными скотоводами в качестве важного инструмента по обеспечению продовольственной безопасности, однако на сегодняшний день нет документально подтвержденных данных исследований о влиянии ротации на ботанический состав, проективное покрытие, высоту и на выход зеленой массы растительности пастбищ в зоне исследований. Это становится одним из основных пробелов в устойчивом управлении кормовыми угодьями – пастбищами путем сбалансирования их потенциальных возможностей и поддержания продуктивности для обеспечения с.х. животных полноценными кормами. Таким образом, целью данного исследования определено оценить состояний растительности основных кормовых угодий Западного Казахстана – пастбищных угодий в зависимости от воздействий основного фактора - выпаса сельскохозяйственных животных на пастбищах.

Материалы и методы исследования. В современном животноводстве важна роль производства полноценных кормов, которые положительно влияют на мясную и молочную продуктивность, состояний здоровья, продолжительности жизни и репродуктивную способность с.х. животных.

Для проверки выдвинутой гипотезы в Западно-Казахстанском аграрно-техническом университете имени Жангир хана (Республика Казахстан) по государственному заказу Министерства науки и высшего образования проводятся научные исследования по оценке влияний способов использования на показатели растительности пастбищ Западного Казахстана.

Для оценки современного состояния растительности в зависимости от способов использования пастбищ проведен полевой эксперимент в полупустынной зоне Западного Казахстана с использованием современных методик и требований, а также ГОСТ-ов.

Результаты исследования. Интенсивное использование пастбищ путем бессистемного выпаса с.х. животных оказывает отрицательное влияние на динамику продуктивности их растительного покрова, что согласуется с данными наших исследований, где в результате интенсивного способа установлено снижение урожайности травостоев пастбищ полупустынной зоны Западного Казахстана [10].

Предыдущие исследования показали, что регулирование высоты травостоя от 20 до 30 см способствует повышению продуктивности животных пастбищах, в то время как более высокая интенсивность выпаса увеличивает продуктивность животных на площади, но отрицательно сказывается на показателях растительности пастбищ и на индивидуальных характеристиках животных и качестве туши [11].

Исследования влияний способа использования пастбищ на состояние растительности показали, что отрицательное динамическое воздействие выпаса с.х. животных на урожайность травостоев, как правило, становится более заметным по мере увеличения нагрузки пастбища посредством повышения интенсивности стравливания [12]. В проведенных исследованиях нами установлено снижения урожайности пастбищ от 0,75 до 0,35 т/га или на 53,33% на пастбищах интенсивного выпаса (контроль) по сравнению с ротационным использованием пастбищ.

В исследованиях выявлено взаимосвязь между урожайностью и высотой травостоя пастбищ, которая также подтверждено исследованиями других авторов. Например, COMASSETO, Danielli dos Santos и другие (2020) обнаружили, что зависимость между урожайности пастбищ и высоты травостоев обратно пропорциональна и является как линейной, так и нелинейной [13].




Рисунок 1 - Зависимость урожайности пастбищ от проективного покрытия растительности

Диаграмма рассеяния на рисунке 1 показывает, что при увеличении проективного покрытия растений урожайность увеличивается, прослеживается зависимость уровня урожайности от проективного покрытия растений. Применив к данным модель линейной

регрессии получили уравнение вида: Урожайность= -0.060+0.009*Покрытие. Коэффициент детерминации для данной модели равен 89,0%. Для построения модели использованы все наблюдения без группировки по вариантам использования полей. Модель в целом получилась статистически значимой на уровне p-level <0.001, урожайность в среднем со всех полей увеличивается на 0,009 т/га при увеличении проективного покрытия на 1%.

Интенсивное использование пастбищ в свое очередь приводит к снижению проективного покрытия растительности [11].

В наших исследованиях установлена взаимосвязь с проективным покрытием растительности и урожайностью пастбищ. Так, с увеличением интенсивности выпаса проективное покрытие растительности в летний период по сравнению с 2-я вариантами ротационного использования пастбищ снижалась с 80-85% до 45% и в этой связи урожайность пастбищ также снижалась от 0,60-0,75 т/га до 0,35 т/га или на 41,7-53,3%. Аналогичные данные получены в исследованиях и других авторов, которые пришли к мнению, что нерациональное использование пастбищ и интенсивность использования, такие как чрезмерный выпас скота, ускорят деградацию пастбищ [4, 7, 8, 13].

В исследованиях, проведенных в альпийской экосистеме муниципалитета Холь на юге Норвегии (Austrheim et al., 2014) в связи с высоким проективным покрытием 80-89% получен высокая урожайность пастбищ [14]. Поскольку в 2022-2024 годах выпас с.х. животных осуществлялся на пастбищах с использованием разработанной схемы ротации пастбищ, урожайность, впоследствии повышения проективного покрытия до 80-85% была восстановлена и показала более высокие результаты – 0,65-0,70 т/га.

Ценность пастбищ заключается не только в продуктивности пастбищ, но и в качестве питательных веществ. Pacheco и др. (2019) отметили, что пастбища среднего возраста имеют большую высоту полога, чем пастбища среднего возраста, что приводит к различной питательной ценности различных видов, которая может еще больше измениться, если пастбища находятся в плохом состоянии [15], что согласуется с данными наших исследований. В проведенных исследованиях отмечено повышения качества кормовой массы пастбищ при использовании ротационных пастбищ. На ротационных пастбищах установлено увеличения сбора кормовых единиц по сравнению с вариантом интенсивного выпаса на 54,5-66,7%, сбора переваримого протеина на 70,0-85,0%. Bell и другие (2021) отметили улучшения энергетической ценности пастбищного корма при регулировании выпаса, что подтверждаются с результатами наших исследований [16]. Так, при использования ротационных пастбищ 1 и 2 с разными поголовьями выпасаемого скота выход обменной энергии по сравнению с контрольным вариантом (интенсивный выпас) на 0,44-1,23 ГДж/га или на 48,1-60,6%.




Рисунок 2 - Зависимость урожайности пастбищ от высоты травостоя

Диаграмма рассеяния на рисунке 2 показывает, что при увеличении высоты растений урожайность увеличивается, прослеживается зависимость уровня урожайности от способов использования пастбищ. Применив к данным модель линейной регрессии получили уравнение вида: Урожайность = -0.281+0.029*Высота. Модель в целом получилась статистически значимой на уровне p-level <0.001, содержание урожайность в среднем со всех полей увеличивается на 0,029 т/га при увеличении высоты растений на 1 см.

Заключение. Для улучшения энергетико-белковой ценности пастбищных фитоценозов полупустынной зоны Западно-Казахстанской области целесообразно использовать ротационные пастбища, что является лучшим подходом к устойчивому управлению ими.

Благодарности. Исследования проводится по договору, заключенного договора с Министерством науки и высшего образования Республики Казахстан в рамках НТП BR21881871 «Разработка технологий и приемов заготовки кормов в кормовых угодьях Казахстана в контексте устойчивого управления».

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1 Nasiyev, B. Influence of Cattle Grazing Methods on Changes in Vegetation Cover and Productivity of Pasture Lands in the Semi-Desert Zone of Western Kazakhstan [Текст] / B. Nasiyev, A. Karynbayev, M. Khiyasov, A. Bekkaliyev, N. Zhanatalapov, M. Begeyeva, A. Bekkaliyeva, V. Shibaikin // International Journal of Design & Nature and Ecodynamics. - 2023. - №18(4). - P.767-774.

2 Gary, S.K. Do Differences in Livestock Management Practices Influence Environmental Impacts? [Текст] / S.K. Gary [и др.] // Frontiers in Sustainable Food Systems. - 2020. - №16.

3 Havstad, K.M. Long-term ecological monitoring [Текст] / K.M. Havstad, J.E. Herrick // Arid Land Research and Management. - 2003. - №17. - P.389-400.

4 Domingo, J.M.P. Season-long, mixed stocking of a cool-temperate pasture [Текст] / J.M.P. Domingo, M.P.Y. Eugenia, P.B. David, B.B. William, A.B. Scott // Grassland Science. - 2021. - №67. - P.12-23.

5 Cuchillo, H.M. Forage selectivity of co-grazing cattle and sheep on swards differing in plant diversity [Текст] / H.M. Cuchillo, N. Wrage-Monnig, J. Isselstein // Grass and Forage Science. - 2017. - №73. - P.320-329.

6 Lita, P. Influence of deferred grazing on vegetation dynamics and livestock productivity in an Andean pastoral system [Текст] / P. Lita, D. Buttolph, C. Layne // Journal of Applied Ecology. - 2004. - №41. - P.664-674.

7 Rotich, H.K. Influence of grazing management practices on vegetation composition, soil organic carbon and greenhouse gas emissions in semi arid grasslands of Makueni County, Kenya [Текст]/ H.K. Rotich [и др.] // Master of Science in Range Management. - 2018. - №1. - P.75-78.

8 Yuping, R. Effectiveness of exclosures for restoring soils and vegetation degraded by overgrazing in the Junggar Basin, China [Текст] / R. Yuping, Y. Fei, M. Lei // Grassland Science. - 2014. - №60. - P.118-124.

9 Mouldi, G. Assessment of vegetation response to grazing management in arid rangelands of southern Tunisia [Текст] / G. Mouldi, P. Bob, H. Belgacem // International Journal of Biodiversity Science, Ecosystem Services & Management. - 2015. - №11. - P.106-113.

10 Mukhambetov, B. Influence of soil and climatic conditions on the chemical composition and nutritional value of Kochia prostrata feed in the arid zone of Western Kazakhstan [Текст] / B. Mukhambetov, B. Nasiyev, R. Abdinov, Zh. Kadasheva, L. Mamyrova // Caspian Journal of Environmental Sciences (CJES). - 2023. - №21(4). - P.853-863.

11 Nasiyev, B. The Study Of The Processes, Degradation Factors And The Selection Of Crops For The Restoration Of Bioresourses Capacity Of The Grassland Of Semi Desert Zones [Текст] / B. Nasiyev [и др.] // Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences (ISSN09758585-India-Scopus). - 2016. - №7(3). - P.2637-2646.

12 Jiwei, W. Effects of grazing on the allocation of mass of soil aggregates and aggregate-associated organic carbon in an alpine meadow [Текст] / W. Jiwei, Zh. Chengzhang, Zh. Lianchun, W. Jun, L. Qun // Plos One. - 2020. - Vol.11.

13 Neff, J.C. Multi-decadal impacts of grazing on soil physical and biogeochemical properties in southeast Utah [Текст] / J.C. Neff, R.L. Reynolds, J. Belnap, P. Lamothe // Ecological Applications. - 2005. - Vol.15. - P.87-95. DOI:10.1890/04-0268

14 Austrheim, G. Experimental effects of herbivore density on aboveground plant biomass in an alpine grassland ecosystem [Текст] / G. Austrheim, J. D. Speed, V. Martinsen, J. Mulder, A. Mysterud // Arctic, Antarctic, and Alpine Research. - 2014. - №46(3). - P.535-541.

15 Pacheco, R.F. Productivity characteristics of sudan grass or pearl millet pastures submitted to continuous grazing by culling cows [Текст] / R.F. Pacheco, D.C. Alves Filho, I.L. Brondan, J.L. Nornberg, L.A.D. Pizzuti, A.M. Callegaro // Ciência Animal Brasileira. - 2014. - Vol.15. - №3. - P.266-276.

16 Bell, M.J. Effect of pasture cover and height on nutrient concentrations in diverse swards in the UK [Текст] / M.J. Bell, Z. Huggett, K.R. Slinger, F. Roos // Grassl Sci. - 2021. - №67. - P.267-272.

REFERENCES

1 Nasiyev, B. Influence of Cattle Grazing Methods on Changes in Vegetation Cover and Productivity of Pasture Lands in the Semi-Desert Zone of Western Kazakhstan [Text] / B. Nasiyev, A. Karynbayev, M. Khiyasov, A. Bekkaliyev, N. Zhanatalapov, M. Begeyeva, A. Bekkaliyeva, V. Shibaikin // International Journal of Design & Nature and Ecodynamics. - 2023. - №18(4). - P.767-774.

2 Gary, S.K. Do Differences in Livestock Management Practices Influence Environmental Impacts? [Text] / S.K. Gary [and etc.] // Frontiers in Sustainable Food Systems. - 2020. - №16.

3 Havstad, K.M. Long-term ecological monitoring [Text] / K.M. Havstad, J.E. Herrick // Arid Land Research and Management. - 2003. - №17. - P.389-400.

4 Domingo, J.M.P. Season-long, mixed stocking of a cool-temperate pasture [Text] / J.M.P. Domingo, M.P.Y. Eugenia, P.B. David, B.B. William, A.B. Scott // Grassland Science. - 2021. - №67. - P.12-23.

5 Cuchillo, H.M. Forage selectivity of co-grazing cattle and sheep on swards differing in plant diversity [Text] / H.M. Cuchillo, N. Wrage-Monnig, J. Isselstein // Grass and Forage Science. - 2017. - №73. - P.320-329.

6 Lita, P. Influence of deferred grazing on vegetation dynamics and livestock productivity in an Andean pastoral system [Text] / P. Lita, D. Buttolph, C. Layne // Journal of Applied Ecology. - 2004. - №41. - P.664-674.

7 Rotich, H.K. Influence of grazing management practices on vegetation composition, soil organic carbon and greenhouse gas emissions in semi arid grasslands of Makueni County, Kenya [Text]/ H.K. Rotich [and etc.] // Master of Science in Range Management. - 2018. - №1. - P.75-78.

8 Yuping, R. Effectiveness of exclosures for restoring soils and vegetation degraded by overgrazing in the Junggar Basin, China [Text] / R. Yuping, Y. Fei, M. Lei // Grassland Science. - 2014. - №60. - P.118-124.

9 Mouldi, G. Assessment of vegetation response to grazing management in arid rangelands of southern Tunisia [Text] / G. Mouldi, P. Bob, H. Belgacem // International Journal of Biodiversity Science, Ecosystem Services & Management. - 2015. - №11. - P.106-113.

10 Mukhambetov, B. Influence of soil and climatic conditions on the chemical composition and nutritional value of Kochia prostrata feed in the arid zone of Western Kazakhstan [Text] / B. Mukhambetov, B. Nasiyev, R. Abdinov, Zh. Kadasheva, L. Mamyrova // Caspian Journal of Environmental Sciences (CJES). - 2023. - №21(4). - P.853-863.

11 Nasiyev, B. The Study Of The Processes, Degradation Factors And The Selection Of Crops For The Restoration Of Bioresourses Capacity Of The Grassland Of Semi Desert Zones

[Text] / B. Nasiyev [and etc.] // Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences (ISSN09758585-India-Scopus). - 2016. - №7(3). - P.2637-2646.

12 Jiwei, W. Effects of grazing on the allocation of mass of soil aggregates and aggregate-associated organic carbon in an alpine meadow [Text] / W. Jiwei, Zh. Chengzhang, Zh. Lianchun, W. Jun, L. Qun // Plos One. - 2020. - Vol.11.

13 Neff, J.C. Multi-decadal impacts of grazing on soil physical and biogeochemical properties in southeast Utah [Text] / J.C. Neff, R.L. Reynolds, J. Belnap, P. Lamothe // Ecological Applications. - 2005. - Vol.15. - P.87-95. DOI:10.1890/04-0268

14 Austrheim, G. Experimental effects of herbivore density on aboveground plant biomass in an alpine grassland ecosystem [Text] / G. Austrheim, J. D. Speed, V. Martinsen, J. Mulder, A. Mysterud // Arctic, Antarctic, and Alpine Research. - 2014. - №46(3). - P.535-541.

15 Pacheco, R.F. Productivity characteristics of sudan grass or pearl millet pastures submitted to continuous grazing by culling cows [Text] / R.F. Pacheco, D.C. Alves Filho, I.L. Brondan, J.L. Nornberg, L.A.D. Pizzuti, A.M. Callegaro // Ciência Animal Brasileira. - 2014. - Vol.15. - №3. - P.266-276.

16 Bell, M.J. Effect of pasture cover and height on nutrient concentrations in diverse swards in the UK [Text] / M.J. Bell, Z. Huggett, K.R. Slinger, F. Roos // Grassl Sci. - 2021. - №67. - P.267-272.

ТҮЙІН

Алынған нәтижелерге сүйене отырып, зерттеулер елдегі мал шаруашылығын дамыту бағдарламасында жайылымдарды пайдаланудың ротациялық жүйесінің тәжірибесін қолдану мүмкіндігін көрсетеді. Батыс Қазақстанның жартылай шөлейтті аймағында жайылымдарды ротациялау арқылы пайдаланудың бұл тәсілі шөптердің өнімділігін көктемде 0,58-0,68 т/га дейін, жазда 0,60-0,75 т/га дейін және күзгі жайылым маусымдарында 0,30-0,37 т/га дейін оңтайлы сапа параметрлерімен және жемшөп пен энергияда құнды шығымдылықпен арттыруға ықпал етті - ауыл шаруашылығы жануарларына арналған қоректік массаның ақуыздық қатынасы: 0,11-0,15 т/га жемшөп бірлігі, 0,1-0,2 т/га қорытылатын ақуыз және 1,54-2,03 ГДЖ/га алмасу энергиясы. Алынған ғылыми деректер мал шаруашылығын дамыту және азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету саясатында, сондай-ақ Қазақстан Республикасында жайылымдық экожүйелерді тиімді басқару және ұтымды пайдалану жөніндегі бағдарламаларды іске асыруда зор маңызға ие бола алады. Зерттеу нәтижелері күйіс қайыратын жануарларды өсірумен және ет пен сүт түрінде азық-түлік өндірумен айналысатын фермерлерде өзектілігі мен сұранысына ие бола алады. Ұсынылатын әдістер, күйіс қайыратын жануарларды тұрақты азықтандыру және жануарлардың өнімділігін арттыру үшін жыл бойы және тапшылықсыз толықұанды жем-шөп қорын қамтамасыз етеді.

УДК 638.1(574.1)
МРНТИ 68.39.43

Каиргалиева Гульдана Зейнуллаевна, магистр, https://orcid.org/0000- 0002-6941-4805
НАО «Западно-Казахстанский аграрно-технический университет имени Жангир хана», г. Уральск, ул. Жангир хана 51, 090009, Казахстан, kairgalieva_guldana@mail.ru
Лукбанов Валерий Муслимович, кандидат биологических наук, https://orcid.org/0009-0004-8233-8116
ТОО «Казахский научно-исследовательский институт животноводства и кормопроизводства» Алматы, A15C9P4, м-он Коктем-3, дом 13, кв. 78. apistudia@mail.ru

Kairgalieva Guldana Zeynullaevna, Master, https://orcid.org/0000-0002-6941-4805

NJSC «West Kazakhstan Agrarian and Technical University named after Zhangir khan», Uralsk, st. Zhangir khan 51, 090009, Kazakhstan, kairgalieva_guldana@mail.ru
Valery Muslimovich Lukbanov, Candidate of Bioligical Sciences, https://orcid.org/0009-0004-8233-8116
LLP "Kazakh Scientific Research Institute of Animal Husbandry and Feed Production" Almaty, A15C9R4, m-on Koktem-3, house 13, sq. 78**.** apistudia@mail.ru

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА МЕДА ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ
PHYSICO-CHEMICAL INDICATORS OF HONEY QUALITY IN THE WEST KAZAKHSTAN REGION

АННОТАЦИЯ

В работе дана сравнительная характеристика санитарно-гигиенических свойств меда по установленным показателям в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 19792-2017 «Мед натуральный» были обследованы 16 пчелохозяйств Западно-Казахстанской области. Объектами исследований являются образцы меда, полученные как на стационарных, так и на кочевых пасеках пчеловодов региона за 2024 год. Были определены органолептические, физико-химические, также были исследованы токсикологические показатели меда.

Исследования органолептических и физико-химических показателей не выявило значительных отклонений от установленных норм. Отклонений от установленных нормативов на наличие токсичных элементов также не обнаружено.

ANNOTATION

The paper provides a comparative description of the sanitary and hygienic properties of honey according to established indicators in accordance with the Interstate standard GOST 19792-2017 "Natural honey", 16 bee farms of the West Kazakhstan region were surveyed. The objects of research are honey samples obtained from both stationary and nomadic apiaries of beekeepers in the region in 2024. The organoleptic, physico-chemical properties were determined, and the toxicological parameters of honey were also studied.

Studies of organoleptic and physico-chemical parameters did not reveal significant deviations from the established norms. There were also no deviations from the established standards for the presence of toxic elements.

Ключевые слова: *мед, продукты пчеловодства, органолептические и физико-химические свойства, токсикологические исследования*

Key words: *honey, bee products, organoleptic and physico-chemical properties, toxicological studies*

Введение. Загрязнение окружающей среды, повсеместная химизация сельского хозяйства благоприятствуют проникновению в мед несвойственных ей веществ, представляющей опасность, как для здоровья человека, так и для его жизни. Источниками являются проведение профилактические и лечебные мероприятий, как правило, незапрещенные к применению в пчеловодческой деятельности, обработанные посевы, а также соединения, образующиеся в процессе тепловой обработки и хранения.

Наиболее опасны, с точки зрения распространенности и токсичности тяжелые металлы, такие как ртуть, свинец, мышьяк, кадмий; антибиотики; пестициды, которые могут аккумулироваться в меде вследствие безудержного использования химсредств защиты растений [1-5].

С каждым годом требования к качеству пчелопродукции и их мониторингу ужесточаются, что включает в себя их пищевую безопасность и чистоту [6-14]. Развитию и проблемам пчеловодства на научной основе приурочены многие исследования как отечественных, так и зарубежных ученых [15-21].

В марте 2021 года в ЗКО был сформирован сельскохозяйственный производственный кооператив СПК «Пчеловоды ЗКО» (на базе ранее функционировавшего общества пчеловодов ЗКО «Ратель»). В состав СПК вошли 47 пчеловодов Атырауской и Западно – Казахстанской областей (Байтерекского и Теректинского районов и г.Уральск), общее количество 1100 пчелосемей. Для контроля качества продуктов пчеловодства необходимо проводить гигиеническую экспертизу меда.

Материалы и методы исследований. Материалом исследований являлись данные собственных исследований, органолептические, физико-химические исследования меда проводились согласно ГОСТ 19792-2017. Мед натуральный. Технические условия (с Поправкой) / ГОСТ от 09 ноября 2017 г. № 19792-2017 [22], термины и определения согласно Закону «О пчеловодстве» [23]. Настоящий стандарт распространяется на мед натуральный (далее – мед), предназначенный для непосредственного употребления в пищу, реализации через предприятия торговли и общественного питания, для использования в пищевой промышленности и может быть использован в других отраслях народного хозяйства. Токсикологические показатели не должны превышать номы обозначенные в Техническом регламенте Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции».

Были обследованы 16 пчелохозяйств Западно-Казахстанской области. Объектами исследований являются образцы меда, полученные как на стационарных, так и на кочевых пасеках пчеловодов региона за 2024 год.

Органолептические и физико-химические исследования проводились на базе института «Ветеринарии и агротехнологии» ЗКАТУ имени Жангир хана.

Исследования на присутствие тяжелых металлов (свинец, мышьяк, кадмий, мышьяк) проводились в Западно-Казахстанском областном филиале РГП на ПХВ "Республиканская ветеринарная лаборатория".

Результаты и их обсуждение. Для проведения физико-химических исследований продуктов пчеловодства были изучены 16 пчелохозяйств (пасек), расположенные на территории Западно-Казахстанской области и отобраны 65 проб меда (Рисунок1).



Рисунок 1 – Осмотр пасек и отбор проб

Результаты проведенных исследований показали, что все пробы меда по органолептическому методу исследования соответствуют требованиям ГОСТ (Рисунок2).



Рисунок 2 - Образцы меда

Исследование на наличие сахарного сиропа и механических примесей выявило, что в трех пробах образовалось пятно в фильтровальном бумаге, а в двух были слегка мутными, но без механических примесей.

В ходе проделанных опытов наличие крахмала не обнаружено, показатель кислотности в трех образцах были выше предела нормы, что может говорить о закислении меда или искусственной инверсии сахарозы в присутствии кислот.

Результаты определения воды в меде рефрактометрическим методом по межгосударственному стандарту ГОСТ 31774-2012 выявило, что в пяти пробах были выше допустимые нормы, в остальных пробах массовая доля воды соответствуют требованиям ГОСТ.



Рисунок 3 - Определение воды в меде рефрактометрическим методом

Содержание в меде токсичных элементов, радионуклеидов а также пестицидов не должны быть выше норм обозначенных в Техническом регламенте Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции». Проведеные исследования на наличие Pb, As, Hg и Cd, ни в одном из 65 образцов превышения установленного уровня предельно допустимой концентрации (ПДК) не выявило, в 14 пробах Cd обнаружено не было, а наличие Hg выявлено не было нигде.

Заключение. Исследования органолептических и физико-химических показателей не выявило значительных отклонений от установленных норм. Отклонений от установленных нормативов на наличие токсичных элементов также не обнаружено.

В ходе проделанных опытов наличие крахмала не обнаружено, показатель кислотности в трех образцах были выше предела нормы.

Результаты определения воды в меде рефрактометрическим методом по выявило, что в пяти пробах были выше допустимые нормы, в остальных пробах массовая доля воды соответствуют установленным требованиям.

Проведеные исследования на наличие Pb, As, Hg и Cd, ни в одном из 65 образцов превышения установленного уровня предельно допустимой концентрации (ПДК) не выявило, в 14 пробах Cd обнаружено не было, а наличие Hg выявлено не было нигде.

Благодарности. Данные исследования проводились в рамках проекта по грантовому финансированию по научным и (или) научно-техническим проектам на 2024-2026 годы (Комитет науки Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан), на тему ИРН: AP23489173. «Разработка комплекса ветеринарно-санитарных мероприятий при болезнях пчел в условиях Западно-Казахстанской области и технология получения.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Гомонова, А.Д. Оценка качества меда физико-химическими методами анализа / А. Д. Гомонов, Е.Е. Змановская, Д.Г. Слащинин Т.А. Лунева // Сборник материалов по итогам всероссийской научно-практической конференции «Лесной и химический комплексы - проблемы и решения» (Красноярск, 9 октября 2021 г.) - 2021, С. 425-429.

2. Симонова, Г.В. Изотопный анализ медоносных пчел и продуктов пчеловодства: применение и значимость / Г.В Симонова, Д.А. Калашникова // «Химия в интересах устойчивого развития» - 2022. - №30(2), С. 208-221.

3. Овчинникова, М.А. Результаты мониторинга физико-химических показателей медов в условиях Краснодарского края / М.А. Овчинникова // «Естественные и технические науки» №2 (165). – 2022, С.118-125.

4. Кравченко, Е.С. Особенности проведения ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов пчеловодства / Е.С. Кравченко, И.В. Сердюченко, Н.Н. Гугушвили // «Наукосфера» - 2022. - №1-2, С. 52-57.

5. Jorgiane B. Parish, Eileen S. Scott, Raymond Correll & Katja Hogendoorn Survival and probability of transmission of plant pathogenic fungi through the digestive tract of honey bee workers. Apidologie. Vol. 50, pp.871–880 (2019).

6. Almasri, H., Liberti, J., Brunet, J., Engel, P., & Belzunces, L. P. Mild chronic exposure to pesticides alters physiological markers of honey bee health without perturbing the core gut microbiota. Scientific Reports, Scientific Reports (2022). 12(1),428112(1)

7. Bayrakal, G. M., Ekici, G., Akkaya, H., Sezgin, F. H., & Dümen, E. (2020). Detection and molecular examination of pathogens in honey and bees in the northern marmara region, turkey. [Kuzey marmara bölgesindeki bal ve arılardaki patojenlerin tespiti ve moleküler incelenmesi] Kafkas Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi, 26(3), 313-319.

8. Omar, S., Mat-Kamir, N. F., & Sanny, M. (2019). Antibacterial activity of malaysian produced stingless-bee honey on wound pathogens. Journal of Sustainability Science and Management, 14(3), 67-79.

9. Идрисова, Г.З. Пчеловодство как перспективная отрасль Западно-Казахстанской области / Г.З. Идрисова, Б.Г. Сатыбаев, О.Ж. Оразов, И.Н. Жубантаев, С.А. Кривобоков // Межд. научно-практ. конференция «Пчеловодство и апитерапия: современные подходы и развитие». г.Рыбное - 2021, С.63-71

10. Bartlett, L. J. Frontiers in effective control of problem parasites in beekeeping. International Journal for Parasitology: Parasites and Wildlife, 17(2022)., pp.263-272.

11. Skvortsova, T., Epifanova, T., Pasikova, T., & Shatveryan, N. Regulation of beekeeping as a vector of green economy's institutional development. Paper presented at the IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 937(3) (2021).

12. De León-Door, A. P., Pérez-Ordóñez, G., Romo-Chacón, A., Rios-Velasco, C., Órnelas-Paz, J. D. J., Zamudio-Flores, P. B., & Acosta-Muñiz, C. H. Pathogenesis, epidemiology and variants of melissococcus plutonius (ex white), the causal agent of european foulbrood. Journal of Apicultural Science, 64(2) (2021), 173-188.

13. Abou-Shaara, H. F. Geographical information system for beekeeping development. Journal of Apicultural Science, 63(1) (2019), 5-16.

14. ГОСТ 19792-2017. Мед натуральный. Технические условия (с Поправкой) / ГОСТ от 09 ноября 2017 г. № 19792-2017.

15. О пчеловодстве. Закон Республики Казахстан от 12 марта 2002 года № 303-II. Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2002 г., N 5, ст. 55; «Казахстанская правда» от 19 марта 2002 года N 059; «Юридическая газета» от 1 мая 2002 года N 17.

16. http://www.obnogka.ru/metody-issledovanija-meda/metody-issledovanija-meda.html.

REFERENCES

1. Gomonova, A.D. Ocenka kachestva meda fiziko-himicheskimi metodami analiza / A. D. Gomonov, E.E. Zmanovskaya, D.G. Slashchinin T.A. Luneva // Sbornik materialov po itogam vserossijskoj nauchno-prakticheskoj konferencii «Lesnoj i himicheskij kompleksy - problemy i resheniya» (Krasnoyarsk, 9 oktyabrya 2021 g.) - 2021, S. 425-429.

2. Simonova, G.V. Izotopnyj analiz medonosnyh pchel i produktov pchelovodstva: primenenie i znachimost' / G.V Simonova, D.A. Kalashnikova // «Himiya v interesah ustojchivogo razvitiya» - 2022. - №30(2), S. 208-221.

3. Ovchinnikova, M.A. Rezul'taty monitoringa fiziko-himicheskih pokazatelej medov v usloviyah Krasnodarskogo kraya / M.A. Ovchinnikova // «Estestvennye i tekhnicheskie nauki» №2 (165). – 2022, S.118-125.

4. Kravchenko, E.S. Osobennosti provedeniya veterinarno-sanitarnoj ekspertizy produktov pchelovodstva / E.S. Kravchenko, I.V. Serdyuchenko, N.N. Gugushvili // «Naukosfera» - 2022. - №1-2, S. 52-57.

5. Jorgiane B. Parish, Eileen S. Scott, Raymond Correll & Katja Hogendoorn Survival and probability of transmission of plant pathogenic fungi through the digestive tract of honey bee workers. Apidologie. Vol. 50, pr.871–880 (2019).

6. Almasri, H., Liberti, J., Brunet, J., Engel, P., & Belzunces, L. P. Mild chronic exposure to pesticides alters physiological markers of honey bee health without perturbing the core gut microbiota. Scientific Reports, Scientific Reports (2022). 12(1),428112(1)

7. Bayrakal, G. M., Ekici, G., Akkaya, H., Sezgin, F. H., & Dümen, E. (2020). Detection and molecular examination of pathogens in honey and bees in the northern marmara region, turkey. [Kuzey marmara bölgesindeki bal ve arılardaki patojenlerin tespiti ve moleküler incelenmesi] Kafkas Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi, 26(3), 313-319.

8. Omar, S., Mat-Kamir, N. F., & Sanny, M. (2019). Antibacterial activity of malaysian produced stingless-bee honey on wound pathogens. Journal of Sustainability Science and Management, 14(3), 67-79.

9. Idrisova, G.Z. Pchelovodstvo kak perspektivnaya otrasl' Zapadno-Kazahstanskoj oblasti / G.Z. Idrisova, B.G. Satybaev, O.ZH. Orazov, I.N. ZHubantaev, S.A. Krivobokov // Mezhd. nauchno-prakt. konferenciya «Pchelovodstvo i apiterapiya: sovremennye podhody i razvitie». g.Rybnoe - 2021, S.63-71

10. Bartlett, L. J. Frontiers in effective control of problem parasites in beekeeping. International Journal for Parasitology: Parasites and Wildlife, 17(2022)., rr.263-272.

11. Skvortsova, T., Epifanova, T., Pasikova, T., & Shatveryan, N. Regulation of beekeeping as a vector of green economy's institutional development. Paper presented at the IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 937(3) (2021).

12. De León-Door, A. P., Pérez-Ordóñez, G., Romo-Chacón, A., Rios-Velasco, C., Órnelas-Paz, J. D. J., Zamudio-Flores, P. B., & Acosta-Muñiz, C. H. Pathogenesis, epidemiology and variants of melissococcus plutonius (ex white), the causal agent of european foulbrood. Journal of Apicultural Science, 64(2) (2021), 173-188.

13. Abou-Shaara, H. F. Geographical information system for beekeeping development. Journal of Apicultural Science, 63(1) (2019), 5-16.

14. GOST 19792-2017. Med natural'nyj. Tekhnicheskie usloviya (s Popravkoj) / GOST ot 09 noyabrya 2017 g. № 19792-2017.
15. O pchelovodstve. Zakon Respubliki Kazahstan ot 12 marta 2002 goda № 303-II. Vedomosti Parlamenta Respubliki Kazahstan, 2002 g., N 5, st. 55; «Kazahstanskaya pravda» ot 19 marta 2002 goda N 059; «YUridicheskaya gazeta» ot 1 maya 2002 goda N 17.
16. http://www.obnogka.ru/metody-issledovanija-meda/metody-issledovanija-meda.html.

ТҮЙІН

Жұмыста ГОСТ 19792-2017 "табиғи бал" мемлекетаралық стандартына сәйкес белгіленген көрсеткіштер бойынша балдың санитарлық-гигиеналық қасиеттеріне салыстырмалы сипаттама берілді, Батыс Қазақстан облысының 16 ара шаруашылығы зерттелді. Зерттеу нысандары 2024 жылы аймақтағы омарташылардың стационарлық және көшпелі омарталарынан алынған бал үлгілері болып табылады. Органолептикалық, физика-химиялық заттар анықталды, балдың токсикологиялық көрсеткіштері де зерттелді.

Органолептикалық және физика-химиялық көрсеткіштерді зерттеу белгіленген нормалардан айтарлықтай ауытқуларды анықтаған жоқ. Уытты элементтердің болуына белгіленген нормативтерден ауытқулар да табылған жоқ.

УДК 632. 951: 635.21: 631.559 (574.11)
МРНТИ 68.37.07

Калиева Лайла Темирбековна, PhD, и.о. доцента, https://orcid.org/0000-0003-1252-1711
НАО «Западно-Казахстанский аграрно-технический университет имени Жангир хана», 090009, Республика Казахстан, г. Уральск, ул. Жангир хана 51, E-mail: kalieva231273@mail.ru
Kaliyeva Laila Temirbekovna, PhD, docent, https://orcid.org/0000-0003-1252-1711
NJSC «West Kazakhstan Agrarian and Technical University named after Zhangir Khan», Republic of Kazakhstan, Uralsk city, st. Zhangir Khan 51,090009, E-mail: kalieva231273@mail.ru

ВЛИЯНИЕ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНСЕКТИЦИДОВ НА РАЗВИТИЕ КОЛОРАДСКОГО ЖУКА И СТЕПЕНЬ ПОВРЕЖДЕНИЯ ИМ НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ РАСТЕНИЙ КАРТОФЕЛЯ

INFLUENCE OF BIOLOGICAL EFFECTIVENESS OF INSEGTICIDES ON THE DEVELOPMENT OF THE COLORADO POTATO BEETLE AND THE DEGREE OF DAMAGE TO THE AERIAL PART OF POTATO PLANTS

АННОТАЦИЯ

Установлена биологическая эффективность инсектицидов на развитие колорадского жука и степень повреждения им надземной части растений картофеля, формирование количества стеблей и листьев, ассимиляционного аппарата, массу стеблей, листьев и урожайность клубней картофеля.

При применении инсектицидов против имаго и личинок колорадского жука ассимиляционная поверхность листьев увеличивается, но не во всех вариантах одинаково.

Применение инсектицидов позволяет контролировать численность вредителей, что способствует увеличению урожайности. Особенно важно использовать инсектициды в начале вегетации, когда растения наиболее уязвимы к атаке вредителей. За счет защиты растений от вредных насекомых снижается вероятность повреждения клубней и стеблей, что в итоге приводит к более высокому количеству и качеству урожая. Вредители, такие как колорадский жук, могут уничтожать листья растения, что нарушает процесс фотосинтеза и снижает количество образующихся клубней. Инсектициды эффективно

защищают картофель от таких вредителей, что снижает потери урожая и увеличивает его объем. В данной статье представлены данные результатов исследования по урожайности и по влиянию биологической эффективности инсектицидов на развитие колорадского жука и степень повреждения им надземной части растений картофеля. Применяемые препараты неодинаково влияли на гибель колорадского жука, на степень поврежденности ботвы вредителем, что повлияло на формирование урожая. Урожайность клубней картофеля по вариантам опыта колебалась, и наименьшая урожайность была получена на контроле. В опытах с применением инсектицидов против колорадского жука урожайность возросла по всем вариантам в сравнении с контролем в 2,5 раза.

ANNOTATION

Biological efficiency insekticides on development colorado beetle the bug and a damage rate by it of an elevated part of plants of a potato, formation of quantity of stalks and leaves, assimilationul the device, weight of stalks, leaves and productivity of tubers of a potato is established.

At application insekticides against imago and larvae colorado beetle the bug assimilationul the surface of leaves increases, but not in all variants equally. The use of insecticides allows you to control the number of pests, which helps to increase yields. It is especially important to use insecticides at the beginning of the growing season, when plants are most vulnerable to pest attacks. By protecting plants from harmful insects, the likelihood of damage to tubers and stems is reduced, which ultimately leads to a higher quantity and quality of the crop. Pests such as the Colorado potato beetle can destroy the leaves of the plant, which disrupts the photosynthesis process and reduces the number of tubers formed. The use of insecticides allows you to control the number of pests, which helps to increase yields. It is especially important to use insecticides at the beginning of the growing season, when plants are most vulnerable to pest attacks. By protecting plants from harmful insects, the likelihood of damage to tubers and stems is reduced, which ultimately leads to a higher quantity and quality of the crop. Pests such as the Colorado potato beetle can destroy the leaves of the plant, which disrupts the photosynthesis process and reduces the number of tubers formed. Insecticides effectively protect potatoes from such pests, which reduces crop losses and increases its volume.

This article presents the results of a study on yield and on the effect of the biological effectiveness of insecticides on the development of the Colorado potato beetle and the degree of damage to the aerial part of potato plants. The drugs used had a different effect on the death of the Colorado potato beetle, on the degree of damage to the tops by the pest, which affected the formation of the crop. The yield of potato tubers fluctuated according to the experimental variants, and the lowest yield was obtained under control. In experiments with the use of insecticides against the Colorado potato beetle, the yield increased in all variants in comparison with the control by 2.5 times.

Ключевые слова: *картофель, колорадский жук, инсектициды, урожайность, ассимиляционная поверхность листьев*

Key words: *potato, colorado beetle, insekticides, yield, anabolic surface leaves*

Введение. Стратегия борьбы с таким опасным вредителем картофеля как колорадский жук должна базироваться на системах защитных мероприятий, адаптированных для каждой зоны, не вызывающих вспышек его массового размножения и замедляющих процессы внутривидовой изменчивости [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9].

В связи с этим в 2019-2021 гг. нами проводились исследования, по сравнительной оценке, препаратов различных химических классов в борьбе с вредителем и повышения устойчивости и продуктивности картофельного агрофитоценоза в Западно-Казахстанской области в условиях резистентности колорадского жука к инсектицидам. В схему опыта были включены следующие варианты: 1 - растения опрыскивались водой, 2 - растения

обрабатывались в фазы всходов, бутонизации – начала цветения, клубнеобразования инсектицидами.

Цель исследований: изучить влияние инсектицидов на повреждаемость растений картофеля колорадским жуком и продуктивность картофеля.

Задачи исследований: определить биологическую эффективность различных инсектицидов на имаго и личинок колорадского жука, степень повреждения надземной массы в разные фазы развития картофеля и их влияние на формирование урожая.

Материалы и методы исследования

Исследования проводились на опытном поле НАО «Западно-Казахстанский аграрно-технический университет им. Жангир хана», расположенное в КХ «Десумбаев Б.К.» в 2019, 2020 и 2021 сельскохозяйственные годы. Почва опытного участка темно-каштановая. Предшественник – черный пар. Содержание гумуса в пахотном слое составляет 3,1 %, валового азота и фосфора, соответственно-0,3 и 0,14 %.

В опытах картофель размещали после пара в условиях орошения. Зяблевую вспашку проводили на глубину 27-30 см. Под зяблевую вспашку вносили суперфосфат (120 кг/га д.в.) и хлористый калий (60 кг/га д.в.). Весной одновременно с культивацией вносили аммиачную селитру (60 кг/га д.в.).

Обработка почвы под картофель весной: ранневесенняя культивация, безотвальное рыхление на 27-30 см и боронование перед посадкой.

Схема посадки 70×35 см, масса клубней 50-80 г, глубина заделки клубней 6-8 см. В период вегетации картофеля поле содержалось в чистоте от сорняков и рыхлом состоянии. По необходимости проводили поливы, норма полива 450 $м^3$/га. Ввиду неустойчивого водного баланса сроки полива ежегодно менялись. Влажность почвы поддерживалась поливами на уровне 75-85% НВ, а в начале увядания ботвы – 70-75% НВ.

С целью соблюдения схемы размещения растений (70×35 см) посадку и уборку проводили механизированно.

При проведении полевого опыта по влиянию инсектицидов как средство защиты картофеля на повреждаемость растений колорадским жуком и продуктивность картофельного агроценоза использовалась следующая схема, в которую были включены следующие варианты:

1 - растения опрыскивались водой, 2 - растения обрабатывались в фазы всходов, бутонизации – начала цветения, клубнеобразования разными инсектицидами с рекомендованной нормой расхода на культуре картофель.

Критерием оценки любой технологии возделывания культуры является урожай, но при этом он должен быть экономически оправдан.

Результаты исследования и обсуждение. Исследования показали, что применение инсектицидов не оказывало влияния на прохождение фенологических фаз развития растений, однако высота их, где была большая заселенность вредителем была на 2-3 см ниже, что, на наш взгляд, объясняется тем, что в начале заселения посадок вредитель предпочитает питаться молодыми листьями, а уничтожив их, начинает повреждать черешки и стебли.

Наблюдениями установлено, что на количество стеблей, листьев, прирост массы ботвы, приходящейся на одно растение, оказывает влияние повреждаемость растений колорадским жуком и погодные условия вегетационных периодов.

Экспериментальными данными установлено, что высокие урожаи не всегда соответствуют соотношению между клубнями и ботвой, хотя величина урожая, безусловно, в определенной степени зависит от мощности надземной массы, а определяющее значение принадлежит листовой поверхности.

Урожай картофеля на 90-95 % формируется за счет фотосинтеза, поэтому площадь ассимилирующей поверхности листьев один из основных показателей, характеризующих состояние посадок.

Наблюдения показали, что фотосинтетический потенциал растений во многом определяется степенью повреждения листового аппарата колорадским жуком (таблица 1).

Таблица 1 - Влияние инсектицидов при применении против колорадского жука на фотосинтетический потенциал и урожайность картофеля (2019-2021 гг.)

Показатели	Годы			Среднее за 3 года
	2019	2020	2021	
Ассимиляционная поверхность листа, $м^2$				
контроль	0,250	0,300	0,280	0,277
инсектициды	0,695	0,810	0,680	0,728
Урожайность, т/га				
контроль	5,40	7,90	6,50	6,60
инсектициды	21,028	22,842	20,114	21,328

Так, на контрольном варианте (без применения инсектицидов) ассимиляционная поверхность листьев одного куста, в 2019 году составила 0,25 м², в 2020 году - 0,30 м², в 2021 году - 0,28 м², в среднем за 3 года - 0,27 м², а при применении инсектицидов: в 2019 году 0,69 м², в 2020 году – 0,81 м², 2021 году – 0,68 м², в среднем за 3 года - 0,72 м².

Наблюдения показали, что эффективная борьба с имаго и личинками колорадского жука оказывает существенное влияние на формирование ассимиляционной поверхности на единицу площади.

Наименьшая площадь ассимиляционной поверхности листьев была получена на контроле.

При применении инсектицидов против имаго и личинок колорадского жука ассимиляционная поверхность листьев увеличивается, но не всегда одинаково. При использовании препаратов площадь ассимиляционной поверхности листьев увеличилась в сравнении с контролем в среднем за 3 года в 2,5 раза.

В вариантах с использованием инсектицидов был получен высокий урожай.

Наибольшая урожайность получена в вариантах с применением инсектицидов и составила в 2019 году 21,028 т/га, в 2020 году – 22,842 т/га, в 2021 году - 20,114 т/га, в среднем за 3 года - 21,328 т/га.

Наименьшая урожайность получена на контроле (без применения инсектицидов) и составила в 2019 году 5,4 т/га, в 2020 году - 7,9 т/га, в 2021 году - 6,5 т/га, в среднем за 3 года - 6,6 т/га.

В связи с возрастающим интересом к культуре картофеля и расширением посевных площадей усовершенствованы и разработаны ряд элементов технологии, которые имеют важное значение в интенсификации производства картофеля и повышении его качества [10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17]. Разработан комплекс технологических приемов, позволяющих получать устойчивую урожайность картофеля с высоким качеством клубнеплода. Выявлен максимально адаптированный к местным почвенно-климатическим условиям сорт картофеля. Данный сорт способен формировать урожай картофеля с хорошими технологическими показателями.

Заключение. Экспериментальные исследования показали, что данный сорт картофеля обладает относительной устойчивостью к колорадскому жуку. Однако ограничить использование химических мер борьбы с этим вредителем невозможно, поскольку степень повреждения растений зависит как от устойчивости сорта, так и от своевременной химической защиты посевов. Наибольшее повреждение ботвы наблюдается в контроле к концу вегетации, что отрицательно влияет на урожайность клубней. Снижение повреждений ботвы было зафиксировано при опрыскивании посевов инсектицидами. На вариантах с использованием инсектицидов к завершению вегетации степень повреждения ботвы была минимальной, что позволило признать эти методы наиболее эффективными. И

при этом повторное химическое опрыскивание растений картофеля в борьбе с колорадским жуком является экономически неэффективным.

На основании результатов исследований можно сделать следующие выводы: повреждаемость растений колорадским жуком снижает количества стеблей, листьев, их массу, массу ботвы на единицу площади, ассимиляционную поверхность листьев, интенсивность фотосинтеза.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. 1 Djaman K., Irmak S., Koudahe K., Allen S.Irrigation Management in Potato (Solanum tuberosum L.) / K. Djaman., S. Irmak, K. Koudahe, S. Allen // Sustainability. – 2021. - №13.- 1504. https://doi.org/10.3390/su13031504
2. Crosby T. W. Effects of Irrigation Management on Chipping Potato (Solanum tuberosum L.) Production in the Upper Midwest of the U.S. / T. W. Crosby, Y. Wang //Agronomy. – 2021. – №11, 768. https://doi.org/10.3390/agronomy11040768
3. King B. Potato irrigation management /B. King, J. Stark, H. Neibling // Potato Production Systems. – 2020. https://doi.org/10.1007/978-3-030-39157-7_13
4. Matteau J-P. Potato Varieties Response to Soil Matric Potential Based Irrigation /J-P.Matteau,P.Celicourt, G.Letourneau, T.Gumiere, S.J. Gumiere // Agronomy. – 2021. - №11, 352. https://doi.org/10.3390/agronomy11020352
5. Ghazouani H. Provenzano Assessing Hydrus-2D Model to Investigate the Effects of Different On-Farm Irrigation Strategies on Potato Crop under Subsurface Drip Irrigation / H. Ghazouani, G. Rallo, A. Mguidiche, B. Latrech, B. Douh, A. Boujelben, G. // Water. – 2019. - №11, 540. https://doi:10.3390/w11030540
6. Poddar A.Evaluation of two irrigation scheduling methodologies for potato (Solanum tuberosum L.) in north-western mid-hills of India/ A.Poddar, KumarN., ShankarV. // ISH Journal of Hydraulic Engineering. - 2021. https://doi:10.1080/09715010.2018.1518733
7. Vozhehova R. The efficiency of different moisture and nutrition conditions in early potato growing under drip irrigation in southern Ukraine / R. Vozhehova, G. Balashova, L. Boiarkina, O. Yuzyuk, S. Yuzyuk, B. Kotov, O. Kotova //Journal of Agricultural Sciences (Belgrade). – 2021. – №1.66.https://doi.org/10.2298/JAS2101001V
8. Crosby T. W. Effects of Different Irrigation Management Practices on Potato (Solanumtuberosum L.) / T. W. Crosby, Y. Wang // Sustainability/ - 2021. – №13.10187. https://doi.org/10.3390/su131810187
9. Pszczolkowski P. The Dependence of Crop Potatoes on the Level of Irrigation under Polish Conditions / P. Pszczolkowski, B. Sawicka, T. Lenartowicz, M. Pszczolkowski // Agriculture. – 2021. - №11,84.https://doi.org/10.3390/agriculture11020084
10. Kassaye K. T., W. A. Yilma, M. H. Fisha, D. H. HailYield and Water Use Efficiency of Potato under Alternate Furrowsand Deficit Irrigation / K. T. Kassaye , W. A. Yilma, M. H. Fisha, D. H. //International Journal of Agronomy. – 2020.https://doi.org/10.1155/2020/8869098
11. Sarker K.K. Yield and quality of potato tuber and its water productivity are influenced by alternate furrow irrigation in a raised bed system / K.K.Sarker, A. Hossain, F. Akter //Agricultural Water Management. – 2019. 10.1016/j.agwat.2019.105750
12. Silva-Diaz C. Unraveling Ecophysiological Mechanisms in Potatoes under Different Irrigation Methods: A PreliminaryField Evaluation / C. Silva-Diaz, D. A. Ramirez, A. Rodríguez-Delfin, F. Mendiburu, J. Rinza, J. Ninanya, H. Loayza, R. Quiroz //Agronomy/ - 2020. – №10, 827.doi:10.3390/agronomy10060827
13. Gasparyan I. Use of irrigation in early potatoes cultivation in the Moscow region/ I. Gasparyan, M. Dyikanova, A. Levshin, B. Sudenko, O. Ivashova //BIO Web of Conferences. – 2020. – №17. 00208https://doi.org/10.1051/bioconf/20201700208
14. Afzaal H. Precision Irrigation Strategies for Sustainable Water Budgeting of Potato Crop in Prince Edward Island / H.Afzaal, A. Farooque, F. Abbas, B. Acharya, T. Esau // Sustainability. – 2020. –№12, 2419. https://doi.org:10.3390/su12062419

15. Ghazouani H.Effects of Saline and Deficit Irrigation on Soil-Plant Water Status and Potato Crop Yield under theSemiarid Climate of Tunisia / H. Ghazouani, G. Rallo, A. Mguidiche, B. Latrech, B. Douh, A. Boujelben, G. Provenzano //Sustainability/ - 2019. – №11, 2706.doi:10.3390/su11092706

16. Нургалиева Г.К. Картоптың пісу мерзіміне байланысты әр түрлі сортарының фотосинтетикалық белсенділігі / Г.К. Нургалиева, М.К. Мусина // Наука и образование. – 2020. – № 4(2). – С. 104-111.

17. Кушенбекова А.К. Фотосинтетическая деятельность растений картофеля при весенних сроках посадки в условиях Западно-казахстанской области / А.К. Кушенбекова // Наука и образование. – 2013. - №2(31). – С.36-39.

REFERENCES

1. Djaman K., Irmak S., Koudahe K., Allen S.Irrigation Management in Potato (Solanum tuberosum L.) / K. Djaman., S. Irmak, K. Koudahe, S. Allen // Sustainability. – 2021. - №13.-1504. https://doi.org/10.3390/su13031504

2. Crosby T. W. Effects of Irrigation Management on Chipping Potato (Solanum tuberosum L.) Production in the Upper Midwest of the U.S. / T. W. Crosby, Y. Wang //Agronomy. – 2021. – №11, 768. https://doi.org/10.3390/agronomy11040768

3. King B. Potato irrigation management /B. King, J. Stark, H. Neibling // Potato Production Systems. – 2020. https://doi.org/10.1007/978-3-030-39157-7_13

4. Matteau J-P. Potato Varieties Response to Soil Matric Potential Based Irrigation /J-P.Matteau,P.Celicourt, G.Letourneau, T.Gumiere, S.J. Gumiere // Agronomy. – 2021. - №11, 352. https://doi.org/10.3390/agronomy11020352

5. Ghazouani H. Provenzano Assessing Hydrus-2D Model to Investigate the Effects of Different On-Farm Irrigation Strategies on Potato Crop under Subsurface Drip Irrigation / H. Ghazouani, G. Rallo, A. Mguidiche, B. Latrech, B. Douh, A. Boujelben, G. // Water. – 2019. - №11, 540. https://doi:10.3390/w11030540

6. Poddar A.Evaluation of two irrigation scheduling methodologies for potato (Solanum tuberosum L.) in north-western mid-hills of India/ A.Poddar, KumarN., ShankarV. // ISH Journal of Hydraulic Engineering. - 2021. https://doi:10.1080/09715010.2018.1518733

7. Vozhehova R. The efficiency of different moisture and nutrition conditions in early potato growing under drip irrigation in southern Ukraine / R. Vozhehova, G. Balashova, L. Boiarkina, O. Yuzyuk, S. Yuzyuk, B. Kotov, O. Kotova //Journal of Agricultural Sciences (Belgrade). – 2021. – №1.66.https://doi.org/10.2298/JAS2101001V

8. Crosby T. W. Effects of Different Irrigation Management Practices on Potato (Solanumtuberosum L.) / T. W. Crosby, Y. Wang // Sustainability/ - 2021. – №13.10187. https://doi.org/10.3390/su131810187

9. Pszczolkowski P. The Dependence of Crop Potatoes on the Level of Irrigation under Polish Conditions / P. Pszczolkowski, B. Sawicka, T. Lenartowicz, M. Pszczolkowski // Agriculture. – 2021. - №11,84.https://doi.org/10.3390/agriculture11020084

10. Kassaye K. T., W. A. Yilma, M. H. Fisha, D. H. HailYield and Water Use Efficiency of Potato under Alternate Furrowsand Deficit Irrigation / K. T. Kassaye , W. A. Yilma, M. H. Fisha, D. H. //International Journal of Agronomy. – 2020.https://doi.org/10.1155/2020/8869098

11. Sarker K.K. Yield and quality of potato tuber and its water productivity are influenced by alternate furrow irrigation in a raised bed system / K.K.Sarker, A. Hossain, F. Akter //Agricultural Water Management. – 2019. 10.1016/j.agwat.2019.105750

12. Silva-Diaz C. Unraveling Ecophysiological Mechanisms in Potatoes under Different Irrigation Methods: A PreliminaryField Evaluation / C. Silva-Diaz, D. A. Ramirez, A. Rodríguez-Delfin, F. Mendiburu, J. Rinza, J. Ninanya, H. Loayza, R. Quiroz //Agronomy/ - 2020. – №10, 827.doi:10.3390/agronomy10060827

13. Gasparyan I. Use of irrigation in early potatoes cultivation in the Moscow region/ I. Gasparyan, M. Dyikanova, A. Levshin, B. Sudenko, O. Ivashova //BIO Web of Conferences. – 2020. – №17. 00208https://doi.org/10.1051/bioconf/20201700208

14. Afzaal H. Precision Irrigation Strategies for Sustainable Water Budgeting of Potato Crop in Prince Edward Island / H.Afzaal, A. Farooque, F. Abbas, B. Acharya, T. Esau // Sustainability. – 2020. –№12, 2419. https://doi.org:10.3390/su12062419

15. Ghazouani H.Effects of Saline and Deficit Irrigation on Soil-Plant Water Status and Potato Crop Yield under theSemiarid Climate of Tunisia / H. Ghazouani, G. Rallo, A. Mguidiche, B. Latrech, B. Douh, A. Boujelben, G. Provenzano //Sustainability/ - 2019. – №11, 2706.doi:10.3390/su11092706

16. Nurgaliyeva G.K. Photosynthetic activity of various varieties of potatoes depending on the maturity of the potato / Nurgaliyeva G.K., Musina M.K. / Science and education. – 2020. – № 4(2). – S. 104-111.

17. Kushenbekova A.K. Photosynthetic activity of the card board in the spring period in the conditions of the West Kazakhstan region / A.K. Kushenbekova / Science and education. – 2013. - №2(31). – P.36-39.

ТҮЙІН

Колорадо картоп қоңызының дамуына және картоп өсімдіктерінің жер үсті бөліктерінің зақымдану дәрежесіне, сабақтары мен жапырағының ассимиляциялық аппараттың қалыптасуына және олардың салмақтарына, сонымен қатар картоп түйнектерінің өнімділігіне инсектицидтердің биологиялық тиімділігі анықталды. Колорадо картоп қоңызы мен дернәсілдеріне қарсы инсектицидтерді қолданғанда жапырақтарының ассимиляциялық беті үлкееді. Инсектицидтерді қолдану зиянкестердің санын бақылауға мүмкіндік береді, бұл шығымдылықтың артуына көмектеседі. Әсіресе, картоп өсімдігі зиянкестің зияндылығынан неғұрлым осал болғанда, олардың өсіп-өнуінің басында инсектицидтерді уақытылы қолданудың маңызы зор. Картопты зиянды жәндіктерден қорғау арқылы түйнектер мен сабақтардың зақымдану ықтималдығы азаяды, бұл түптеп келгенде егіннің саны мен сапасының жоғары болуына әкеледі. Колорадо картоп қоңызы сияқты зиянкестер өсімдіктің жапырағын жоя алады, бұл фотосинтез процесінің бұзылуына және түзілген түйнектердің санын азаюна әкеледі. Инсектицидтер картопты колорадо қонызынан тиімді қорғайды және шығынын азайтып өнімділігін арттырады. Бұл мақалада картоптің өнімділігі және инсектицидтердің биологиялық тиімділігінің әсері колорадо картоп қоңызының дамуына және картоп өсімдіктерінің жер үсті бөлігінің зақымдану дәрежесі бойынша зерттеу нәтижелері ұсынылған.

Қолданылатын инсектицидтер колорадо картоп қоңызының өлуіне, картоп өсімдігінің жер үсті бөлігінің зиянкеспен зақымдану дәрежесіне және картоптың өнімділігіне әсер етті. Картоптің өнімділігі эксперименттік нұсқалар бойынша ауытқып тұрды, ең төмен түсім бақылауда болды. Колорадо картоп қоңызына қарсы инсектицидтерді қолдану нұсқаларында өнімділік бақылаумен салыстырғанда 2,5 есе жоғары болды.

УДК 631.811:635.21.
МРНТ 68.35.49;68.33.29;68.29.23

Куаналиева Мендигул Кайргалиевна, магистр, аға оқытушы, https://orcid.org/0000-0002-5984-019X
КеАҚ Жәңгір хан атындағы Батыс Қазақстан аграрлық техникалық университеті, 090009, ҚР, Орал қ. Жәңгір хан көшесі 51, kmendygul@bk.ru
Kuanaliyeva Mendigul Kairgaliyevna, Master of Agricultural Sciences, senior lecturer, https://orcid.org/0000-0002-5984-019X

NJSC Zhangir Khan West Kazakhstan Agrarian-Technical University, 51, Zhangir Khan Street, Uralsk, 090009, Republic of Kazakhstan, kmendygul@bk.ru

ЕРТЕ ПІСЕТІН КАРТОПТЫҢ ӨСУІ МЕН ӨНІМДІЛІГІНЕ МИНЕРАЛДЫ ТЫҢАЙТҚЫШТАРДЫҢ ӘСЕРІ
INFLUENCE OF MINERAL FERTILIZERS ON EARLY POTATO GROWTH AND PRODUCTIVITY

АННОТАЦИЯ

Бұл мақалада Батыс Қазақстан облысының жағдайында ерте пісетін картоптың өнімділігіне минералдық тыңайтқыштардың әртүрлі мөлшерде қолданылуының тиімділігі зерттелген. Картоптың өсуі мен түсіміне қоректік заттардың топырақтан шығарылу көлемі ғана емес, олардың топырақтағы өзара балансы да ықпал етеді. $N_{60}P_{120}K_{60}$ мөлшерінде тыңайтқыш енгізілген жағдайда қоректік элементтердің ең көп шығарылуы байқалды. Жазғы тұтынуға арналған 100 центнер картоп алу үшін орта есеппен үш жыл ішінде 71 кг азот, 17,4 кг фосфор және 121 кг калий сіңірілді. Қара-қоңыр топырақ жылжымалы фосфорға өте кедей болғандықтан, фосфор тыңайтқыштарын уақтылы қолдану Батыс Қазақстан облысының жағдайында жоғары тиімділік көрсетті.

Жергілікті табиғи-климаттық ерекшеліктерді ескере отырып, картоптың мол өнімін қоректік элементтер теңгерімі сақталған тыңайтқыштарды енгізу арқылы арттыруға болады.

Зерттеу нәтижелері көрсеткендей, картоп өсімдігінің әртүрлі бөліктеріндегі қоректік заттардың мөлшері біркелкі таралмайды. Жапырақтарда азот пен фосфор көп жиналса, сабақтарда негізінен калий шоғырланады. Азот-калий тыңайтқыштары қолданылған нұсқада крахмалдың ең аз мөлшері жинақталды, бұл картоптың өнімділігіне әсер етті. Батыс Қазақстан облысының қара-қоңыр топырағында минералдық тыңайтқыштарды пайдалану ерте пісетін картоптың вегетативті өсуі мен өнімділігін жақсартуға ықпал етті. Ең жоғары нәтижелер азот, фосфор және калий тыңайтқыштарының 1:2:1 және 1:1,5:1 арақатынасында енгізілген жағдайларда алынды.

Фосфордың жоғары және орташа мөлшерлері (90-120 кг) мен азот пен калийдің төменгі мөлшерлері (60 кг) қолданылғанда, картоптың даму фазалары (бүршіктену және гүлдену) 4-5 күн ертерек басталып, толық аяқталу мерзімі 5-7 күнге қысқарды.

ANNOTATION

This article examines the effectiveness of applying different doses of mineral fertilizers on the yield of early-maturing potatoes in the conditions of the West Kazakhstan region. The growth and productivity of potatoes are influenced not only by the uptake of nutrients from the soil but also by their balance within it. The highest nutrient uptake was observed in the variant with $N_{60}P_{120}K_{60}$ fertilizer application. On average, over three years, the production of 100 centners of potatoes for summer consumption required 71 kg of nitrogen, 17.4 kg of phosphorus, and 121 kg of potassium. Since chestnut soils are very poor in available phosphorus, the timely application of phosphorus fertilizers has proven to be highly effective in the conditions of the West Kazakhstan region.

Considering the local natural and climatic conditions, high potato yields can be achieved by applying fertilizers with a balanced ratio of nutrients.

The research results indicate that the distribution of nutrients within different parts of the potato plant varies. The highest concentrations of nitrogen and phosphorus were found in the leaves, while potassium accumulated mainly in the stems. In the variant with nitrogen-potassium fertilizer application, the lowest starch accumulation was observed, which affected the potato yield. The use of mineral fertilizers on chestnut soils in the West Kazakhstan region positively influenced the vegetative growth and productivity of early-maturing potatoes. The best results

were obtained when nitrogen, phosphorus, and potassium were applied in ratios of 1:2:1 and 1:1.5:1.

When high and medium doses of phosphorus (90-120 kg) and lower amounts of nitrogen and potassium (60 kg) were applied, the development phases (budding and flowering) began 4-5 days earlier and were completed 5-7 days sooner.

Кілт сөздер: *тыңайтқыштар, картоп, крахмал, түйнек сапасы, доза, құрғақ зат, фотосинтез, қоректік элементтер*

Key words: *fertilizers, potatoes, starch, quality of tubers, dose, dry matter, photosynthesis, nutrients*

Кіріспе. Картоптың өнімділігі, түйнектерінің сапасы және оның өсірудің экономикалық тиімділігі аймақтың агроэкологиялық жағдайларына сәйкес келетін тыңайтқыштардың оңтайлы мөлшеріне тікелей байланысты. Осыған орай, біз үш жыл бойы тыңайтқыштардың ерте пісетін картоп өсімдіктерінің өсуіне, дамуына, өнімділігіне және түйнек сапасына әсерін зерттедік.Зерттеу жүргізілген топырақ жамылғысы күңгірт-каштанды, орташа саздақты, қуатты саздақты шөгінділерден түзілген, тұзданбаған және жыртылған қабаттағы гумус мөлшері 3,9%-ға дейін жетеді. Гумусты горизонттардың қалыңдығы 45-56 см болса, қайнау қабаты 45-50 см тереңдікте анықталды. Топырақтағы жалпы азот мөлшері 0,326-0,368%-ды, жылжымалы фосфор деңгейі 3,8-4,2 мг-ды, ал калий мөлшері 52,6-62,8 мг-ды (100 г топыраққа шаққанда) құрады. Топырақтың pH көрсеткіші 7,0-7,2 аралығында болды [1].

Зерттеу әдістемесі. Зерттеу барысында орташа ерте пісетін, аудандастырылған "Невский" картоп сорты пайдаланылды. Отырғызу үшін салмағы 60-80 г болатын түйнектер алынып, олар 70×35 см қоректену алаңында орналастырылды. Түйнектерді отырғызуға дейін 40 күн бойы жарықта өндіру жүргізілді. Жалпы зерттеу алаңы 100 м², есептік алаңы 56 м² құрады, тәжірибе төрт рет қайталанды.

Зерттеу жұмыстары суармалы жерлерде жүргізілді, топырақтағы ылғалдылық 70-80% НВ деңгейінде сақталды. Қолданылған тыңайтқыштар: аммоний нитраты (NH_4NO_3), суперфосфат ($Ca(H_2PO_4)_2•H_2O$) және 40% калий тұзы (KCl•NaCl). Тыңайтқыштар көктемде, сүдігер жырту алдында енгізілді. Өнім жинау тамыздың алғашқы онкүндігінде жүзеге асырылды. Өсімдік үлгілеріндегі жалпы азот, фосфор және калий мөлшерін анықтау үшін Троицкий мен Пиневич әдісі (Майборода нұсқасы) қолданылды: дымқыл күйде күлтелендіргеннен кейін жеделдетілген әдіспен талдау жасалды. Азот мөлшері Несслер реактивінің көмегімен фотоэлектроколориметрде, фосфор деңгейі Дениже әдісінің Труог және Мейер модификациясы арқылы, ал калий мөлшері жалын фотометрінде анықталды [2].

Өсімдіктердің вегетациялық кезеңінде олардың өсуі мен дамуы, жапырақтардың ассимиляциялық бетінің қалыптасуы (кесінді әдісімен), фотосинтез қарқындылығы (екіге бөлу әдісімен) зерттелді. Сонымен қатар, өнім құрылымы, түйнектердің крахмалдылығы және С витаминінің мөлшері анықталды [3].

Зерттеу нәтижелері мен оны талқылау. Зерттеу барысында тыңайтқыштардың картоптың өнгіштігіне айтарлықтай әсер етпейтіні анықталды. Дегенмен, фенологиялық бақылаулар көрсеткендей, жоғары және орташа мөлшерде фосфор (90-120 кг) және аз мөлшерде азот пен калий (60 кг) енгізілген жағдайда картоптың даму фазалары (бүршіктену және гүлдену) 4-5 күн ертерек басталып, 5-7 күн бұрын аяқталды [4].

Өсімдіктердің өсу қарқындылығы қоректену деңгейіне байланысты өзгерді. Азот тыңайтқыштарымен қарқынды қоректендірілген өсімдіктердің биіктігі жоғары болды. Ал 90-120 кг/га фосфор және 60 кг/га азот пен калий енгізілгенде сабақтары мықты, жапырақтары жақсы жетілген өсімдіктер қалыптасты. Керісінше, азот пен калий жоғары мөлшерде енгізілгенде, жер үсті массасының жақсы дамуына қарамастан, сабақтары жіңішке, жапырақтары ұсақ болып шықты. Фосфорсыз қолданылған азот пен калий

тыңайтқыштары өсудің баяулауына себеп болды. Өсімдіктердің ең қарқынды дамуы NPK тыңайтқыштарының 1:2:1 және 1:1,5:1 арақатынасында бірге енгізілген жағдайда байқалды [5-7].

Мысалы, $N_{60}P_{120}K_{60}$ енгізілгенде бір түпке орта есеппен 8 сабақ келді, бұл тыңайтқышсыз нұсқамен салыстырғанда 1,9 сабаққа артық. Жапырақ саны да тыңайтқышсыз нұсқамен салыстырғанда 40,6 данаға көп болып, тиісінше 209,2 және 162,2-ні құрады (1-кесте).

Қоректену жағдайлары жапырақ аппаратының қалыптасуымен қатар, фотосинтез қарқындылығына да ықпал етті. Өсімдіктер отырғызылғаннан кейін 50-60 күн өткен соң жүргізілген талдаулар фотосинтез қарқындылығының тыңайтқыш мөлшерінен гөрі олардың үйлесімділігіне тәуелді екенін көрсетті. Ең жоғары фотосинтез қарқындылығы $N_{60}P_{120}K_{60}$ және $N_{60}P_{90}K_{60}$ енгізілгенде тіркелді. Фосфор мен калийді 60 кг/га мөлшерінде енгізу фотосинтез қарқындылығын аздап арттырса, азот пен фосфорды осы мөлшерде қолдану оны тыңайтқышсыз нұсқамен салыстырғанда 0,94-1,56 мг/дм²/сағ-қа жоғарылатты [8-13].

Фосфорсыз енгізілген азот пен калий фотосинтез қарқындылығына айтарлықтай әсер етпеді, кейбір жылдары оны төмендету үрдісі байқалды. Қоректік заттармен жеткілікті қамтамасыз етілген өсімдіктер даму кезеңінің алғашқы күндерінен бастап тыңайтқышсыз немесе кейбір элементтері жетіспейтін өсімдіктерге қарағанда қарқынды өсіп, жасыл массасының айтарлықтай артуымен ерекшеленді. Мысалы, $N_{60}P_{120}K_{60}$ енгізілгенде бір түптің жер үсті массасы 611 г құраса, тыңайтқышсыз нұсқада бұл көрсеткіш 379 г болды. 1 гектардағы жапырақ массасы тиісінше 13,6 т және 8,1 т, ал сабақ массасы 11,2 т және 7,3 т деңгейінде тіркелді.

Тыңайтқыштардың әртүрлі мөлшері мен комбинациясын қолдану өсімдіктердің жер үсті массасының айтарлықтай ұлғаюына ықпал етті. Алайда, бір нұсқада – фосфорсыз енгізілген азот пен калийдің қосарланған мөлшерінде өсім байқалмады. Фосфорсыз енгізілген $N_{90}P_{120}$ жағдайында 1 га-дағы жапырақ массасы 2,1 т-ға, ал сабақ массасы 0,9 т-ға төмендеді. NPK тыңайтқыштарының 1:2:1 және 1:1,5:1 арақатынасында қолданылуы жапырақтар мен сабақтардың қарқынды қалыптасуына ықпал етіп, нәтижесінде өсімдіктер қатарлар мен қатар аралықтарды тезірек жапты.

Құрғақ зат мөлшерін талдау нәтижелері оның жапырақтарда, сабақтарда және түйнектерде минералды тыңайтқыш дозалары мен құрамындағы қоректік элементтердің үйлесіміне тәуелді екенін көрсетті. Құрғақ заттың мөлшері жапырақтарда – 11,1-12,6%, сабақтарда – 10,0-12,2%, түйнектерде – 16,9-19,2% аралығында өзгерді. Ең жоғары құрғақ зат мөлшері $N_{60}P_{120}K_{60}$ енгізілгенде тіркелді.

Осы нұсқада сабақтың құрғақ массасы 2,9 т/га-ны құрады, ал тыңайтқышсыз бақылау нұсқасында бұл көрсеткіш 1,6 т/га-ға тең болып, 1,3 т/га-ға төмендегені анықталды. Орташа мөлшердегі азот пен калий ($N_{60}K_{60}$) фосфорсыз енгізілгенде, сабақтың құрғақ массасы бақылау нұсқасымен салыстырғанда 0,1 т/га-ға, ал жоғары мөлшердегі азот пен калий ($N_{90}K_{120}$) енгізілгенде 0,3 т/га-ға кеміді. Азот-фосфор, фосфор-калий және толық минералды тыңайтқыштарды әртүрлі арақатынаста енгізу 1 га-дағы сабақтың құрғақ массасын арттырды. Алайда барлық нұсқаларда жапырақтардың құрғақ массасы сабақтың құрғақ массасынан айтарлықтай жоғары болды. Тек азот пен калий фосфорсыз енгізілгенде бұл айырмашылық шамалы деңгейде қалды.

Кесте 1 - Тыңайтқыштардың мөлшері мен арақатынасына байланысты өсімдіктердің даму қуаты (3 жылдағы орташа)

Тәжірибе нұсқалары	1 бұтаға шаққандағы саны, дана		Бір өсімдіктің салмағы, г		Жер үсті массасы 1 га, т.		
	сабақтары	жапырақтар	жапырақтар	сабақтары	жапырақтар	сабақтары	түйнек

1. Тыңайтқышсыз	6,1	169,2	199	180	8,1	7,3	9,6
2.$P_{60}K_{60}$	6,4	170,3	214	193	8,7	7,8	12,3
3.$N_{60}P_{60}K_{60}$	6,5	183,3	221	197	9,0	8,0	13,1
4.$N_{90}P_{60}K_{60}$	6,6	186,1	231	200	9,4	8,1	12,3
5.$P_{120}K_{120}$	6,6	184,5	238	202	9,7	8,2	12,7
6.$N_{90}P_{120}K_{120}$	7,3	188,8	312	216	12,7	8,8	12,5
7.$N_{120}P_{120}K_{120}$	7,4	189,4	314	216	12,8	8,8	12,8
8.$N_{60}K_{60}$	5,6	163,9	174	170	7,1	6,9	10,3
9.$N_{60}P_{90}K_{60}$	7,8	202,8	324	271	13,2	11,0	14,7
10.$N_{60}P_{120}K_{60}$	8,0	209,8	335	276	13,6	11,2	15,6
11. Тыңайтқышсыз	6,0	167,3	198	184	8,0	7,5	9,9
12.$N_{90}K_{120}$	5,5	161,8	147	158	5,9	6,4	9,8
13.$N_{90}P_{90}K_{120}$	7,1	185,8	236	206	9,6	8,4	12,0
14.$N_{90}P_{90}K_{90}$	7,2	185,6	239	212	9,7	8,6	12,9
15.$N_{60}P_{60}$	7,1	184,3	213	201	8,6	8,2	11,3
16.$N_{60}P_{60}K_{90}$	7,2	185,0	211	198	8,6	8,0	11,1
17.$N_{60}P_{90}K_{120}$	7,3	184,4	216	198	8,8	8,0	11,2
18.$N_{90}P_{120}$	7,4	185,1	229	204	9,3	8,3	11,4
19.$N_{90}P_{120}K_{90}$	7,6	203,4	287	265	11,7	10,8	14,4
20.$N_{90}P_{120}K_{150}$	7,2	193,9	218	201	8,8	8,2	11,1

Пәлектегі жалпы азот мөлшері тыңайтқышсыз нұсқада 41,2 кг/га құрады. Ең төменгі азот мөлшері фосфорсыз енгізілген азот пен калий нұсқасында байқалып, 3,8-8,2 кг/га немесе 9,2-19,9% аралығында төмендеді.

Ең көп азот жинақталуы $N_{90}K_{120}$ енгізілгенде анықталып, 33 кг/га-ны құрады, бұл бақылау нұсқасынан шамамен екі есе аз болды. Фосфор мен калийдің жиналуында да осындай заңдылық байқалды.

Бұл нәтижелер тыңайтқыш дозалары мен қоректік элементтердің арақатынасының өсімдіктердің өсуі мен дамуына, ботвада қоректік заттардың жинақталуына және құрғақ масса түзілуіне айтарлықтай әсер ететінін көрсетеді.

Өсімдік мүшелеріндегі азот мөлшерін зерттеу нәтижелері оның вегетация кезеңінде ең көп мөлшерде жапырақтарда жинақталатынын көрсетті.

Бүршіктену кезеңінде жапырақтардағы азоттың ең жоғары мөлшері $N_{60}P_{120}K_{60}$ енгізілгенде тіркелді. Өсімдік жасына қарай жапырақтардағы азоттың пайыздық мөлшері біртіндеп төмендеді.

Алайда, тыңайтқышсыз бақылау нұсқасы мен фосфорсыз енгізілген азот пен калий нұсқасында гүлдену кезеңінде жапырақтардағы азот мөлшері бүршіктену кезеңімен салыстырғанда сәл жоғары болды.

Гүлдену кезеңінде картоп жапырақтарындағы азот мөлшерінің артуы азот-калий тыңайтқыштары енгізілгенде байқалды. Бұл құбылыс қоректік ортада фосфордың аз болуы жағдайында азоттың сіңірілуі айтарлықтай қарқынды жүріп, оның жапырақтардан түйнектерге тасымалдануы бәсеңдеуіне байланысты.

Кесте 2 - Минералдық тыңайтқыштардың ерте піскен картоптың шығымдылығы мен сапасына әсері (3 жылдағы орташа)

№	Тәжірибе нұсқалары	Өнімділігі, т/га	Крахмалдың мөлшері, %	Крахмалдың шығуы, т/га	Витамин С, мг%/ 100г	Қант сомасы, құрғақ затқа%	Иісі	Дәмі
							балл	

					шикі салмағына			
1	Тыңайтқышсыз	9,6	12,6	12,16	20,26	4,01	3,0	4,0
2	$P_{60}K_{60}$	12,3	11,5	14,20	20,35	3,83	3,0	4,0
3	$N_{60}P_{60}K_{60}$	13,1	11,4	14,99	20,36	3,98	3,0	4,0
4	$N_{90}P_{60}K_{60}$	12,3	11,3	14,00	20,33	4,29	2,5	3,5
5	$P_{120}K_{120}$	12,7	11,9	15,17	20,43	3,76	3,0	4,0
6	$N_{60}P_{120}K_{60}$	12,5	12,2	15,36	20,17	3,88	2,8	4,0
7	$N_{120}P_{120}K_{120}$	12,8	11,6	14,94	19,83	4,33	2,5	3,5
8	$N_{60}K_{60}$	10,3	10,8	11,21	18,89	5,18	2,0	3,0
9	$N_{60}P_{90}K_{60}$	14,7	12,2	17,97	20,75	3,74	3,0	4,0
10	$N_{60}P_{120}K_{60}$	15,6	12,2	19,11	20,81	3,70	3,0	4,0
11	Тыңайтқышсыз	9,9	12,6	12,55	20,87	4,00	3,0	4,0
12	$N_{90}K_{120}$	9,8	10,6	10,42	18,89	5,44	2,0	3,0
13	$N_{90}P_{90}K_{120}$	12,0	11,4	13,68	20,17	4,54	2,5	3,5
14	$N_{90}P_{90}K_{90}$	12,9	11,4	14,76	20,18	4,52	2,6	3,5
15	$N_{60}P_{60}$	11,3	11,5	13,06	20,12	3,84	3,0	4,0
16	$N_{60}P_{60}K_{90}$	11,1	11,6	12,91	20,16	3,99	2,8	4,0
17	$N_{60}P_{90}K_{120}$	11,2	11,6	13,07	20,15	3,89	2,9	4,0
18	$N_{90}P_{120}$	11,4	11,7	13,36	20,24	3,76	3,0	4,0
19	$N_{90}P_{120}K_{90}$	14,4	11,9	17,22	20,85	3,78	3,0	4,0
20	$N_{90}P_{120}K_{150}$	11,1	11,6	12,97	19,60	5,16	2,0	3,0

Сонымен қатар, фосфордың күрт жетіспеуі және азоттың артық болуы NO_3^- және $H_2PO_4^-$ арасындағы антагонизмге әкелуі мүмкін, бұл өз кезегінде өсімдікке фосфордың одан әрі нашар түсуіне алып келеді.

Картоптағы фосфордың пайыздық мөлшері салыстырмалы түрде тұрақты болды, бірақ өсімдік жасына қарай аздап төмендеді. Ең төменгі фосфор мөлшері $N_{90}K_{120}$ енгізілгенде байқалды: бутонизация кезеңінде ол жапырақтарда – 0,50%, сабақтарда – 0,44%, түйнектерде – 0,26% болды, ал жинау алдындағы кезеңде тиісінше 0,42%, 0,27% және 0,30% құрады. Түйнектердегі фосфор мөлшері жинау кезінде құрғақ затқа шаққанда 0,30-0,44% аралығында өзгеріп, фосфорлық қоректену деңгейінің артуына қарай көбейді.

Өсімдік жасына қарай жапырақтарда, сабақтарда және түйнектерде калийдің пайыздық мөлшері де төмендеді. Алайда барлық бақылау мерзімдері бойынша жапырақтардағы калий мөлшері түйнектерге қарағанда төмен болды, әсіресе картоп тыңайтқышсыз немесе азот-калий тыңайтқыштарымен өсірілгенде. Осылайша, өсімдік тіндеріндегі калий мөлшеріне негізгі әсер калий тыңайтқыштары емес, фосфор тыңайтқыштары тигізді. Бұл өсімдіктердің 1 гектардан сіңірген қоректік элементтері мен 100 центнер түйнекке жұмсалған элементтер мөлшері бойынша алынған деректермен де дәлелденді.

Тәжірибе нәтижелері көрсеткендей, қоректік элементтердің сіңірілуі тек өнім көлеміне ғана емес, сонымен қатар олардың қоректік ортада теңдестірілген мөлшерде болуына да байланысты. Ең көп қоректік элементтерді сіңіру $N_{60}P_{120}K_{60}$ енгізілгенде байқалды. Орташа есеппен үш жыл ішінде 10 тонна түйнек (тамыздың бірінші онкүндігінде жиналған жаздық тұтыну үшін) және соған сәйкес жер үсті массасын қалыптастыру үшін картоп 69,8 кг азот, 17,4 кг фосфор және 121,2 кг калий сіңірді.

Қоректік заттардың әртүрлі комбинацияларының ішінде ең тиімдісі фосфор мен калий тыңайтқыштарын (60 кг/га) бірге қолдану болды. Алайда, бұл элементтердің мөлшерін 120 кг/га дейін арттыру өнімнің тұрақты өсуіне ықпал етпеді. Азот пен калийден басқа барлық

екі элементтік үйлесімдер, сондай-ақ толық минералды тыңайтқыштар өнімділіктің айтарлықтай артуын қамтамасыз етті. Дегенмен, фосфор мен калий тыңайтқыштары енгізілген жағдайда 60-90 кг азот қосу өнімділікті елеулі түрде арттырмады.

Ең жоғары ерте картоп өнімділігі азот, фосфор және калий тыңайтқыштары 1:2:1 ($N_{60}P_{120}K_{60}$) және 1:1,5:1 ($N_{60}P_{90}K_{60}$ және $N_{90}P_{120}K_{90}$) арақатынасында қолданылғанда байқалды. Бұл нұсқалар арасында өнімділік тұрғысынан айтарлықтай айырмашылық анықталған жоқ. Мәселен, $N_{60}P_{120}K_{60}$ енгізілгенде бақылаумен салыстырғанда түйнек өнімділігінің орташа өсімі үш жыл ішінде 5,8 т/га болды, ал $N_{60}P_{90}K_{60}$ қолданылғанда 4,9 т/га, ал жоғары доза ($N_{90}P_{120}K_{90}$) енгізілгенде 4,6 т/га құрады (2-кесте).

Ерте картоп өнімділігіне тыңайтқыштардың мұндай әсер етуі өсімдіктердің қоректік элементтерді сіңіруі тек климаттық және агротехникалық жағдайларға ғана емес, сонымен қатар олардың ортадағы өзара әсеріне де байланысты екенін көрсетеді. Калий тыңайтқыштарының жоғары дозалары енгізілгенде өнімділіктің төмендеуі калийдің өз әсерінен емес, құрамындағы хлордың зиянды ықпалынан туындады. Мысалы, $N_{90}P_{120}K_{150}$ енгізілген жағдайда хлордың уыттылығының белгілері айқын көрінді: жапырақтар негізгі жүйке бойымен қайық тәрізді иіліп, кейін олардың жиектерінде ашық қоңыр түсті некрозды тін пайда болды. Осы себепті бұл нұсқада өнімділік едәуір төмен болды.

Картоп түйнектерінің тағамдық сапасы көбінесе сорттың генетикалық ерекшеліктеріне және өсіру жағдайларына тәуелді. Өнім сапасын ең алдымен оның биологиялық құндылығы анықтайды, бұл түйнектегі пайдалы және зиянды заттардың мөлшері мен арақатынасына байланысты. Пайдалы компоненттер қатарына көмірсулар (әсіресе крахмал), дәрумендер, ақуыздар, макро- және микроэлементтер мен басқа да қосылыстар жатады. Ал зиянды заттарға гликоалкалоидтар (соланин), пестицидтердің қалдықтары және кейбір минералды элементтер (нитраттар, нитриттер және т.б.) кіреді. Бұл заттардың мөлшері мен арақатынасы картоптың минералды қоректенуіне тікелей тәуелді. Көптеген ғылыми зерттеулердің нәтижелері түйнектердің сапасы топырақ-климаттық жағдайлар, сорттың генетикалық ерекшеліктері, тыңайтқыштардың мөлшері, түрі, формасы, сондай-ақ қоректік элементтердің арақатынасы арқылы реттелетінін айқын көрсетеді.

Қорытынды. Зерттеу нәтижелері өсімдіктердің қоректену деңгейінің ерте картоп түйнектерінің сапасына айтарлықтай ықпал ететінін көрсетті. Азот пен калий тыңайтқыштарын аз мөлшерде қолданып, фосфор тыңайтқыштарын (әсіресе жоғары дозада) енгізу түйнектердің тауарлық сапасын 3,5-15,2%-ға жақсартты.

Ең жоғары өнімділік пен крахмалдың ең көп мөлшері $N_{60}P_{120}K_{60}$ тыңайтқыштар кешені қолданылған жағдайда алынды. Ал фосфор мөлшеріне қарағанда азот пен калийдің жоғары болуы түйнектердегі крахмал құрамының төмендеуіне алып келді. Ең аз крахмал мөлшері фосфорсыз азот-калий тыңайтқыштары ($N_{90}K_{120}$) енгізілгенде тіркелді. Сонымен қатар, азот пен калийді фосфорсыз қолдану түйнектердің аспаздық және дәмдік қасиеттерінің айтарлықтай нашарлауына себеп болды.

ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

1. Braun EE, Aduova AB, Tulegenova DK, Kuanaliyeva MK. The Role of Fertilizers in Improving Soil Fertility, Yield and Quality of Potatoes. Biol Med(Aligarh) 7(5):BM-145-15,10 pages, http//www.biolmedonline.com

2. Браун Э.Э., Куаналиева М.К. Удобрения и урожай картофеля // Проблемы воспроизводства осетровых в среднем течении реки Урал, и пути их решения: материалы международной научно- практической конференции. Уральск. 2009. Часть 2. С.4-6.

3. Haverkort A.J., Verhagen A. Climate Change and ets Repercussuons for the Potato Supply Chain-Potato Research. 2008. №51. Pp. 223-237.

4. Браун Э.Э. Оптимальные режимы орошения // Картофель и овощи. 1986. №3. С.15-16.

5. Браун Э.Э., Куаналиева М.К. Удобрения и качество клубней картофеля // Сборник научных трудов магистрантов. №1(1). Уральск. 2010. С. 3-6.

6. Браун Э.Э. Интенсивное использование земельно-климатических ресурсов при возделывании картофеля в Западно-Казахстанской области // Экология и степное природное использование / Сборник научных трудов. Уральск. 2005. С. 154-160.

7. Браун Э.Э., Куаналиева М.К. Особенности роста растений и продуктивность раннего картофеля при внесении минеральных удобрений // Известия ОГАУ. 2010. №1(25). С. 36-39.

8. Гулянов Ю.А. Эффективность органических и минеральных удобрений при программировании урожая сортов картофеля в условиях орошения // Информ. листок ЦНТИ. №99-92. Волгоград, 1992. 3 с.

9. Браун Э.Э. Ранний картофель. Алма-Ата: Кайнар, 1983. 104 с.

10. Williams E. Phosphate fixation and availability. J. Soil. Agric. 1950. V. l.1. №. 8. P. 244-248. 11. Muller K. Zur Bedeutung der Dungung im qualitatsbetonten Kartoffelbau // Der Kartoffelbau. 1971. B. 22. №.1. S. 8-9.

11. Кук Д.У. Системы удобрения для получения максимальных урожаев / Пер. с англ. И.В. Гаделия; Под ред. Э.И. Шконде. М.: Колос, 1975. 40 с.

12. Аринушкина Е.В. Руководство по химическому анализу почв. М., 1970. 449 с.

REFERENCES

1. Braun EE, Aduova AB, Tulegenova DK, Kuanaliyeva MK. The Role of Fertilizers in Improving Soil Fertility, Yield and Quality of Potatoes. Biol Med(Aligarh) 7(5):BM-145-15,10 pages, http//www.biolmedonline.com

2. Braun E.E., Kuanaliyeva M.K. Udobreniya i urozhay kartofelya // Problemy vosproizvodstva osetrovykh v srednem techenii reki Ural i puti ikh resheniya: materialy mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii. Uralsk, 2009. Part 2. Pp. 4-6.

3. Haverkort A.J., Verhagen A. Climate Change and its Repercussions for the Potato Supply Chain // Potato Research. 2008. No. 51. Pp. 223-237.

4. Braun E.E. Optimalnye rezhimy orosheniya // Kartofel i ovoshchi. 1986. No. 3. Pp. 15-16.

5. Braun E.E., Kuanaliyeva M.K. Udobreniya i kachestvo klubney kartofelya // Sbornik nauchnykh trudov magistrantov. No. 1(1). Uralsk, 2010. Pp. 3-6.

6. Braun E.E. Intensivnoe ispolzovanie zemelno-klimaticheskikh resursov pri vozdelyvanii kartofelya v Zapadno-Kazakhstanskoy oblasti // Ekologiya i stepnoe prirodopolzovanie / Sbornik nauchnykh trudov. Uralsk, 2005. Pp. 154-160.

7. Braun E.E., Kuanaliyeva M.K. Osobennosti rosta rasteniy i produktivnost rannego kartofelya pri vnesenii mineralnykh udobreniy // Izvestiya OGAU. 2010. No. 1(25). Pp. 36-39.

8. Gulyanov Yu.A. Effektivnost organicheskikh i mineralnykh udobreniy pri programmirovanii urozhaya sortov kartofelya v usloviyakh orosheniya // Inform. listok TsNTI. No. 99-92. Volgograd, 1992. 3 p.

9. Braun E.E. Ranniy kartofel. Alma-Ata: Kainar, 1983. 104 p.

10. Williams E. Phosphate fixation and availability. J. Soil. Agric. 1950. Vol. 1. No. 8. Pp. 244-248.

11. Muller K. Zur Bedeutung der Düngung im qualitätsbetonten Kartoffelbau // Der Kartoffelbau. 1971. Vol. 22. No. 1. Pp. 8-9.

12. Kuk D.U. Sistemy udobreniya dlya polucheniya maksimalnykh urozhayev / Transl. from English by I.V. Gadelia; Ed. by E.I. Shkonde. Moscow: Kolos, 1975. 40 p.

13. Arinushkina E.V. Rukovodstvo po khimicheskomu analizu pochv. Moscow, 1970. 449p.

РЕЗЮМЕ

В данной статье показаны результаты эффективности применения различных доз минеральных удобрений, влияющих на урожайность раннего картофеля в условиях Западно-Казахстанской области.

На рост и урожай картофеля влияет не только вынос питательных веществ, но и их соотношение в почве. В варианте с внесением $N_{60}P_{120}K_{60}$ отмечался большой вынос питательных веществ на единицу площади. При летнем потреблении для получения 100 ц картофеля было поглощено в среднем 71 кг азота, 17,4 кг фосфора и 121 кг калия за 3 года.

Тёмно-каштановые почвы очень мало обеспечены подвижным фосфором, и при своевременном внесении фосфорных удобрений их эффективность высоко проявляется в условиях Западно-Казахстанской области. С учётом местных природно-климатических условий высокий урожай картофеля можно получить внесением удобрений со сбалансированным соотношением питательных элементов.

Исследования показали, что процентное содержание элементов питания в органах растения картофеля различное. Высокое содержание азота и фосфора наблюдалось в листьях, а калия – в стеблях. В варианте с внесением азотно-калийных удобрений было получено наименьшее накопление крахмала на единицу площади, что связано с уменьшением урожайности картофеля. Применение минеральных удобрений под тёмно-каштановые почвы Западно-Казахстанской области оказало воздействие на вегетативный рост и продуктивность раннего картофеля, и наилучшие результаты в исследованиях были получены при внесении N, P, K в соотношении 1: 2: 1 и 1: 1,5: 1.

Установлено, что минеральные удобрения оказывают влияние на интенсивность фотосинтеза, содержание сухого вещества в стеблях и листьях, урожайность и качество клубней. При внесении высоких, а также умеренных доз фосфора (90-120кг) и малых доз азота и калия (60кг), фазы развития (бутонизация и цветение) начинались на 4-5 дней и заканчивались на 5-7 дней раньше.

ӘОЖ 674.031.21:630*232.323
ҒТАХР 68.47.15

Кушенбекова Алия Куандыковна, доктор PhD, доцент м.а., https://orcid.org/0000-0003-3682-0767
«Жәңгір хан атындағы Батыс Қазақстан аграрлық-техникалық университеті» КеАҚ, Орал қ., Жәңгір хан көшесі, 51, 090000, Қазақстан, aliya.kushenbekova@mail.ru
МухомедьяроваАйнагульСансызбаевна, доктор PhD, доцент м.а., https://orcid.org/0000-0003-3945-8417
«ЖәңгірханатындағыБатысҚазақстанаграрлық-техникалықуниверситеті» КеАҚ, Орал қ., Жәңгір хан көшесі, 51, 090000, Қазақстан, aina25111980@mail.ru
Елекешева Мира Манаровна, ауыл шаруашылығы ғылымдарының кандидаты, аға оқытушы,https://orcid.org/0000-0002-2730-8211
«Жәңгір хан атындағы Батыс Қазақстан аграрлық-техникалық университеті» КеАҚ, Орал қ., Жәңгір хан көшесі, 51, 090000, Қазақстан, Elekesheva@inbox.ru

Kushenbekova Aliya Kuandykovna, doctor PhD, Acting associate professor, https://orcid.org/0000-0003-3682-0767
NJSC«West Kazakhstan Agrarian and Technical University named after Zhangir khan», Uralsk, st. Zhangir khan 51, 090009, Kazakhstan, aliya.kushenbekova@mail.ru
Mukhomedyarova Ainagul Sansyzbayevna, doctor PhD, acting associate professor, https://orcid.org/0000-0003-3945-8417
NJSC«West Kazakhstan Agrarian and Technical University named after Zhangir khan», Uralsk, st. Zhangir khan 51, 090009, Kazakhstan, aina25111980@mail.ru

Yelekesheva Mira Manarovna, candidate of Agricultural Sciences, senior lecturer,https://orcid.org/0000-0002-2730-8211
NJSC«West Kazakhstan Agrarian and Technical University named after Zhangir khan», Uralsk, st. Zhangir khan 51, 090009, Kazakhstan,Elekesheva@inbox.ru

ӘРТҮРЛІ ТОПЫРАҚ СУБСТРАТТАРЫНЫҢ ҚАЙЫҢ ТҰҚЫМЫНЫҢ ӨНУІНЕ ӘСЕРІ
THE EFFECT OF VARIOUS SOIL SUBSTRATES ON THE GERMINATION OF BIRCH SEEDS

АҢДАТПА

Бұл зерттеу жұмысы әртүрлі топырақ субстраттарының қайың (Betula) тұқымының өнуіне әсерін анықтауға бағытталған.

Қотыр қайың Betula pendula Roth. - эволюциядағы ілгерілеу тұрғысынан Betula тұқымдасының ең жас түрі, ол үлкен экологиялық икемділік пен таралу энергиясының арқасында Солтүстік жарты шардың қоңыржай аймағында кең кеңістікті алады [1].

Қайың – жеңіл тұқымды ағаштардың бірі, оның өнуіне топырақтың ылғалдылығы, қышқылдығы және құрылымы маңызды рөл атқарады. Зерттеу барысында торф, перлит, вермикулит, қайың үгіндісі (опилка), жергілікті үгінді, опока бар субстраттар қолданылып, олардың қайың тұқымының өнуіне әсері салыстырылды.

Эксперимент нәтижелері көрсеткендей, торф және торф + жергіліті үгінді бар субстраттарда тұқымдардың өну көрсеткіші жоғары болды, себебі олар ылғалды жақсы сақтайды және қоректік заттарға бай. Осы зерттеу нәтижелері орман шаруашылығында, көшет өсіруде және табиғи орман қалпына келтіру жұмыстарында қолданыла алады. Қайыңның табиғи өсуіне қолайлы жағдай жасау үшін оңтайлы топырақ құрамын анықтау маңызды.

Зерттеу нәтижелері қайың көшеттерін өсіруге ең қолайлы субстратты таңдауға мүмкіндік береді және орман қалпына келтіру жұмыстарында қолданылуы мүмкін.

ANNOTATION

This research work aims to determine the effect of various soil substrates on the germination of birch (Betula) seeds. Betula pendula Roth is the name given to Betula pendula Roth. – the first youth vision of the Betula road with the growth of growth in evolution, which is a blessing for large ecological plasticity and energy distribution, makes it possible to increase the total number of people in the northern hemisphere [1]. Birch is one of the light-seeded trees, the moisture, acidity and structure of the soil play an important role in its germination. In the course of the study, substrates containing turf, perlite, vermiculite, Birch sawdust (Opilka), local sawdust, oroca were used and their effect on the germination of birch seeds was compared. The results of the experiment showed that on substrates with turf and turf + local sawdust, the germination rate of seeds was higher, because they retain moisture better and are rich in nutrients. The results of this study can be used in forestry, seedling cultivation and natural forest restoration work. To create favorable conditions for the natural growth of birch, it is important to determine the optimal soil composition. The results of the study make it possible to choose the most suitable substrate for growing Birch seedlings and can be used in forest restoration work.

Кілтсөздер:*қайын, өну, субстрат,өсімдік биіктігі,тұқым*
Key words:*birch tree, germination,substrate,plantheight,seed*

Кіріспе. Betula L. тұқымдасы 120 түрден тұрады, олардың қырықтан астамы Ресей ормандарында және қайыңның 30 ға жуық түрі дендросаябақтарда және ботаникалық бақтар. Тұқымдаста көптеген жас, будандастыратын, көбінесе нашар қалыптасқан түрлері болады. Биология, морфология, экологиялық икемділік бойынша қарама-қайшылықтардың

түрлері. Олардың барлығы солтүстік жарты шардың барлық қоңыржай, экстратропикалық аймақтарында кең таралған типтік бореальды өсімдіктер [2].

Қазіргі уақытта қайыңның пайдалы қасиеттері кеңінен қолданылады. Мықты серпімді ағаш жиһаз өндірісінде өрнектің сұлулығымен және өңдеудің қарапайымдылығымен бағаланады. Одан мылтық, фанера, паркет жасалады. Жиһаз жасау үшін келесі қайыңдар қолданылады: Эрман, Максимович, жалпақ жапырақты, үлпек, Шмидт; авиация және машина жасаудағы бөлшектер: Дауриялық, Шмидт; токарлық бұйымдар: Эрман, жалпақ жапырақты, Шмидт. Жиһаздан басқа, қайың ағашы қолөнерге, шаңғыларға, қораптарға барады. Шағын шаруашылық қолөнер үшін, оның ішінде ыдыс-аяқ үшін: Даур, жайылған, Маньчжур, Максимович; өрілген бұйымдар үшін қайың қабығы қолданылады: үлпілдек, жалпақ жапырақты қайың; арық, бұталы,сопақ жапырақты қайың бұтақтары. Қайың отын болып саналады үздік отынмен арқасында жоғары жылыту қабілеті және тең жануымен ерекшеленеді [3].

Зерттеу нәтижелері және талқылау. Тәжірибелер жүргізу үшін қайың тұқымдары қолданылды. Торф, перлит, вермикулит, қайың үгіндісі (үгінділер), жергілікті үгінді, опока субстрат ретінде пайдаланылды. Тәжірибе қайталаным 25 (кесте 1).

Әр түрлі субстраттардың қатынасы 1: 1. Егіс алдында 1 ай ішінде 2-5 0С температурада тұқымдарды стратификациялау жүргізілді. Себу 2025 жылдың 22 ақпанында 4х4х9см өлшемді көшеттерге арналған кассеталарда жүргізілді, субстраттың ылғалдылығын сақтау үшін күн сайын сумен суару жүргізілді. Жарықтандыру тәулігіне 16 сағатқа арнайы лампалармен созылды.

Кесте 1 – Тәжірибе схемасы

№	Нұсқа
1.	торф
2.	торф + перлит
3.	торф + вермикулит
4.	торф + қайың үгіндісі (опилка)
5.	торф + жергілікті үгінді
6.	торф + опока

Көктеу 27 ақпанда басталды, жаппай көктеу 2 наурызда пайда болды.

Қайың-биіктігі 10-20 м, ақ қабығы бар ағаш. Ескі ағаштар дің негізінде қара-сұр түсті, терең жарықтары бар. Бұтақтар ілулі, жас-қызыл-қоңыр, шайырлы сүйелдермен тығыз орналасқан. Қайыңның тамыр жүйесі өте дамыған, бірақ топыраққа таяз енеді, сондықтан ағаштар жиі желге ұшырайды. Өте фотофильді түрі. Салыстырмалы түрде қысқа өмір сүреді, 120 жасқа дейін, сирек ересек жасқа дейін өмір сүреді [4].

Қайың тұқымдары арнайы суық өңдеусіз өніп шығуы мүмкін. Алайда, ғалымдардың пікірінше, салқындатылған тұқымдардың өнуі және көшеттердің ризогенезі салқындатылмаған тұқымдармен салыстырғанда тиімдірек болды [5].

Қайыңның табиғи жаңаруымен авторлар анықтағандай, Quercus тұқымдас ағаштардың астындағы топырақта аллелохимиялық заттар ретінде табылған тоғыз фенолдық қосылыс, соның ішінде Мизунара қайын, Quercus mongolica Fisch var. grosseserrata Rehd. Wils., ширакамба қайың тұқымының өнуін тежеді, Betula platyphylla Sukaczev var [6].

Авторлардың зерттеулеріне сәйкес, қайыңның күзгі өртенген жерлерде көктемгі отырғызуға қарағанда 15-25% жоғары өмір сүру деңгейі мен қауіпсіздігін көрсетті. Қайың өсіру көшеттерді отырғызу арқылы жүзеге асырылады [7].

Тұқымдардың өнуіне қолайлы жағдайлар оларды құммен 0,3-0,5 см тереңдікке отырғызған кезде байқалады, бірақ ең біркелкі көшеттер тұқымның құммен қоспасын себу арқылы болады. Тек ерте көктемде (наурыздың бірінші онкүндігінде) стратификацияланған немесе өнген тұқымдармен сіз қайың көшеттерінің жоғары өнімділігін ала аласыз. Мамыр,

маусым және шілде дақылдары теріс нәтиже берді [8].

Авторлардың пікірінше, әртүрлі температура режимдерімен өңдеу қайыңдағы тұқымдардың өнуіне үлкен әсер етті. Сонымен, 20-30 ^{0}С сақтау жағдайында тұқымның өнгіштігі Радде мен Литвинов қайыңында табиғи жарықта + 4 ^{0}С температурадан төмен болды [9].

Радде мен Литвиновтың қайыңдары эндемик болып табылады, олар бөлек жерлерде кездеседі және Дағыстанның Қызыл кітабына енгізілген. Кішкентай тұқымдармен жеткілікті жоғары құнарлылыққа қарамастан, табиғи жағдайда көшеттер сирек кездеседі [10].

Авторлардың зерттеулер көрсеткендей, топырақтың максималды өнгіштігі тұқым себудің минималды мөлшерімен байқалады. 5 мм-ге дейінгі қабатта тұқымдарды таяз себу терең себумен салыстырғанда көшеттердің жақсы өсуіне ықпал етеді (2 есе немесе одан да көп). Тұқымдарды отырғызу үшін субстрат ретінде өзен құмын, ұсақ үгінділерді және 1:1 қатынасында үгінділермен шымтезек қоспасын қолданған дұрыс. Топырақтың өнгіштігін 2,7...2,8 есе арттыруға дақылдарды полиэтилен пленкамен және кептірілген шырша бұтақтарымен уақытша жабу ықпал етеді [11].

Авторлар 23 жартылай Сібір қайың тұқымдасының (Betula platyphylla) тұқымдарының өну белгілерін (өну жылдамдығы, өну потенциалы және өну индексі) талдағаннан кейін. 23 туыстаста өну деңгейі 38,57-ден 76,50-ге дейін өзгерді% [12].

Қайыңдар көлеңкеге төзбейді, тек көшеттер күн сәулесінің жартысына жуығында жақсы өседі және 90% көлеңкеге төтеп бере алады. Жоғары ендік пен биіктіктегі генетикалық көздер ұзақ фотопериодтарды қажет етеді. Оңтайлы өсу топырақ пен ауа температурасы шамамен 18°-22°С болған кезде пайда болады [13].

Авторлар шетелден әкелінген қайың тұқымдарының 26 қайың туыстас тұзға төзімділігін зерттеп, 0, 0.2%, 0.4%, 0.6%, 0.8% 1% NaCl өңдеуге арналған ерітіндісі қолданды. Тәжірибе нәтижелері NaCl концентрациясының жоғарылауымен өну энергиясы, өну индексі және барлық қайың тұқымдарының тұқымдарының өну пайызы төмендегенін және өнудің бастапқы уақыты мен өну алдындағы орташа уақыт өскенін көрсетті. Әр түрлі тұқым туыстастары NaCl әсерінің стрессіне әр түрлі нәтиже көрсетеді. Эксперименттік талдау нәтижелеріне сүйене отырып, біз 7-ші, 8-ші, 10-шы, 16-шы, 20-шы, 22-ші, 24-ші тұқым туыстастарының өнгіштігі жақсы екенін авторлар білді және бұл туыстастардың тұзға төзімділігі 26-шы және басқа қайың туыстастарына қарағанда жоғары болды [14].

Қайың тұқымдары топырақта қысқа мерзімді тұрақты қопалар түзе алады. Қайың өнуге қолайлы жағдайлар өзгергенше уақыт өте келе топырақта тұқым қорын жинайды [15].

Біздің тәжірибелеріміздің нәтижелері бойынша қайын тұқымдардың өнуі келесі болды (кесте 2).

Таблица 2 – Қайын тұқымның әр түрлі субстраттарда өнуі

№	Нұсқа	Өну, %
7.	торф	38,7
8.	торф + перлит	28
9.	торф + вермикулит	37,3
10.	торф + қайың үгіндісі (опилка)	32
11.	торф + жергілікті үгінді	40
12.	торф + опока	34,7

Жалпы алғанда, өну 28-ден 40% - ға дейін болды, бұл тұқымның жақсы өнуін көрсетеді. Біздің тәжірибелеріміздегі ең жақсы нұсқалар шымтезек пен шымтезек + жергілікті үгінді және тиісінше 38,7 және 40% құрады (1,2-суреттер).



Сурет 1 – Көшеттерге арналған кассеталарды дайындау



Сурет 2 – Қайың тұқымының көшеттері

Қорытынды. Қайын тұқымдардың өнуіне ең жақсы субстраттар торф пен торф + жергілікті үгінді болып табылады.

ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

1. Бажина Е. В. Особенности плодоношения березы повислой в красноярском крае [Текст]/ Е. В. Бажина, Л. Н. Скрипальщикова, А. П. Барченков // Сибирский лесной журнал. - № 6. – 2018. - С. 112-120.

2. И.В. Кухар К выбору селекции березы повислой (BETULA PENDULA) [Текст] / Кухар И.В. // Технологии и оборудование садово-паркового и ландшафтного строительства. Сборник статей всероссийской научно-практической конференции. Красноярск, 2021.- С. 175-180.

3. Шемякина А.В. Березы на Дальнем Востоке России [Текст] / А.В. Шемякина. - Хабаровск: Изд-во ФБУ «ДальНИИЛХ», 2016. - 130 с.

4. Уразов, П.Н. Тополь и береза в защитных лесных полосах [Текст] / П.Н. Уразов, А.Ф. Уразова // Актуальные проблемы лесного комплекса. 2022. № 61. С. 140-142.

5. Фурс, О.В. Влияние холодового стресса на морфогенез растений [Текст] / О.В.Фурс, Н.С.Захарченко, Дьяченко және т.б. // International independent scientific journal. - Т. 1, № 26. – М., 2021. – С. 3–11.

6. Ishikura Y., Kojima Y., Terazawa M Effects of Phenolic Compounds on Seed Germination of Shirakamba Birch, Betula platyphylla var. japonica [Текст] // Eurasian Journal of Forest Research (2001)

7. Сиволапов, А.И. Особенности создания культур сосны, березы, и дуба на грядах Усманского бора [Текст] / А.И.Сиволапов, Э.В. Алиев, В.В. Чеботарев //Современные проблемы науки и образования. – 2023. - № 6. – С. 966.

8. Климчук, А.Т. Семенное размножение березы бородавчатой в условиях Центрального Казахстана [Текст] / А.Т.Климчук, Ж.Б. Нашенов, С.К. Климчук // Наука, техника и образование. – 2015. - №2 (8). – С. 25-26.

9. Адамова, Р.М. Особенности семенного возобновления реликтовых берез Дагестана / Р.М.Адамова, М.Г. Алиев // Биологическое разнообразие Кавказа и юга Росии. материалы XVII Международной научной конференции. - 2015.- С. 101-103.

10. Алиев, М.Г. Реакция семян и проростков эндемичных берез на условия культивирования [Текст] / М.Г.Алиев //Биологическое разнообразие Кавказа и юга Росии. материалы XVII Международной научной конференции. 2015. С. 112-116.

11. Макаров, С.С. Воспроизводство березы Карельской в Южно-Таежном районе лесов Европейской части РФ [Текст] / С.С. Макаров, С.С. Багаев // Аграрная наука - сельскому хозяйству. Сборник материалов XIV Международной научно-практической конференции. В 2-х книгах. - 2019. - С. 218-219.

12. Li Z., Pei X.,Yin S., Lang X., Zhao X., Qu G. Z. Plant hormone treatments to alleviate the effects of salt stress on germination of Betula platyphylla see ds [Текст] // Journal of Forestry Research (2019),10.1007/s11676-018-0661-2

13. Perala D. A., Alm A. A. Reproductive ecology of birch: A review [Текст] //Forest Ecology and Management (1990) DOI: 10.1016/0378-1127(90)90104-J

14. Yang C., Li G. Effect of NaCl stress on germination of birch seeds Journal of [Текст] // Chemical and Pharmaceutical Research (2014)

15. Tiebel K, Huth F, Wagner S (2021). Is there an effect of storage depth on the persistence of silver birch (Betula pendulaRoth) and rowan (Sorbus aucupariaL.) seeds? A seed burial experiment. [Текст] iForest 14: 224-230. – doi: 10.3832/ifor3685-014DOI: 10.3832/ifor3685-014

REFERENCES

1. Bazhina E. V. Osobennosti plodonosheniya berezy povisloj v krasnoyarskom krae [Text] / E. V. Bazhina, L. N. Skripal'shchikova, A. P. Barchenkov // Sibirskij lesnoj zhurnal. - № 6. – 2018. - S. 112-120.

2. I.V. Kuhar K vyboru selekcii berezy povisloj (BETULA PENDULA) [Text] / Kuhar I.V. // Tekhnologii i oborudovanie sadovo-parkovogo i landshaftnogo stroitel'stva. Sbornik statej vserossijskoj nauchno-prakticheskoj konferencii. Krasnoyarsk, 2021.- S. 175-180.

3. SHemyakina A.V. Berezy na Dal'nem Vostoke Rossii / A.V. SHemyakina. - Habarovsk: Izd-vo FBU «Dal'NIILH», 2016. - 130 s.

4. Urazov, P.N. Topol' i bereza v zashchitnyh lesnyh polosah [Text] /P.N. Urazov, A.F. Urazova // Aktual'nye problemy lesnogo kompleksa. 2022. № 61. S. 140-142.

5. Furs, O.V. Vliyanie holodovogo stressa na morfogenez rastenij [Text] / O.V.Furs, N.S.Zaharchenko, D'yachenko zhəne t.b. // International independent scientific journal. - T. 1, № 26. – M., 2021. – S. 3–11.

6. Ishikura Y., Kojima Y., Terazawa M Effects of Phenolic Compounds on Seed Germination of Shirakamba Birch, Betula platyphylla var. japonica [Text] //Eurasian Journal of Forest Research (2001)

7. Sivolapov, A.I. Osobennosti sozdaniya kul'tur sosny, berezy, i duba na gryadah Usmanskogo bora[Tekst] / A.I.Sivolapov, E.V. Aliev, V.V. CHebotarev [Text] //Sovremennye problemy nauki i obrazovaniya. – 2023. - № 6. – S. 966.

8. Klimchuk, A.T. Semennoe razmnozhenie berezy borodavchatoj v usloviyah Central'nogo Kazahstana [Text] / A.T.Klimchuk, ZH.B. Nashenov, S.K. Klimchuk // Nauka, tekhnika i obrazovanie. – 2015. - №2 (8). – S. 25-26.

9. Adamova, R.M. Osobennosti semennogo vozobnovleniya reliktovyh berez Dagestana / R.M.Adamova, M.G. Aliev [Text] // Biologicheskoe raznoobrazie Kavkaza i yuga Rosii. materialy XVII Mezhdunarodnoj nauchnoj konferencii. - 2015.- S. 101-103.

10. Aliev, M.G. Reakciya semyan i prorostkov endemichnyh berez na usloviya kul'tivirovaniya [Text] / M.G.Aliev //Biologicheskoe raznoobrazie Kavkaza i yuga Rosii. materialy XVII Mezhdunarodnoj nauchnoj konferencii. 2015. S. 112-116.

11. Makarov, S.S. Vosproizvodstvo berezy Karel'skoj v YUzhno-Taezhnom rajone lesov Evropejskoj chasti RF [Text] / S.S. Makarov, S.S. Bagaev // Agrarnaya nauka - sel'skomu hozyajstvu. Sbornik materialov XIV Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferencii. V 2-h knigah. - 2019. - S. 218-219.

12. Li Z., Pei X.,Yin S., Lang X., Zhao X., Qu G. Z. Plant hormone treatments to alleviate the effects of salt stress on germination of Betula platyphylla seeds [Text] // Journal of Forestry Research (2019),10.1007/s11676-018-0661-2

13. Perala D. A., Alm A. A. Reproductive ecology of birch: A review [Text] //Forest Ecology and Management (1990) DOI: 10.1016/0378-1127(90)90104-J

14. Yang C., Li G. Effect of NaCl stress on germination of birch seeds Journal of Chemical and Pharmaceutical Research (2014)

15. Tiebel K, Huth F, Wagner S (2021). Is there an effect of storage depth on the persistence of silver birch (Betula pendulaRoth) and rowan (Sorbus aucupariaL.) seeds? A seed burial experiment. [Text] //iForest 14: 224-230. – doi: 10.3832/ifor3685-014DOI: 10.3832/ifor3685-014

РЕЗЮМЕ

Эта исследовательская работа направлена на определение влияния различных почвенных субстратов на прорастание семян березы (Betula). Березка повислая Betula pendula Roth. - самый молодой вид из рода Betula с точками знаний в эволюции, который благословляет большую экологическую пластичность и энергию распространения занимается обшивкой пространства в умеренной зоне Северного полушария. Береза - одно из легкосемянных деревьев, большую роль в ее прорастании играют влажность, кислотность и структура почвы. В исследовании использовались субстраты, содержащие торф, перлит, вермикулит, березовые опилки, местные опилки, опока, и сравнивалось их влияние на прорастание семян березы. Результаты эксперимента показали, что на субстратах, содержащих торф и торф + местные опилки, показатель всхожести семян был выше, так как они хорошо удерживают влагу и богаты питательными веществами. Результаты этого исследования могут быть использованы в лесном хозяйстве, выращивании рассады и естественных лесовосстановительных работах. Важно определить оптимальный состав почвы для создания благоприятных условий для естественного роста березы. Результаты исследования позволяют подобрать наиболее подходящий субстрат для выращивания рассады березы и могут быть использованы в лесовосстановительных работах.

UDC: 846:541.64:631.67:633.51
IRSTI: 31.31.11:68.41.29:68.39.29

Mirvaliev Zoid Zokhidovich, the main author, doctor of technical sciences., professor, https://orcid.org/0009-0002-1488-8007
Tashkent State Agrarian University, 100011, Navoi Street, 32, Tashkent, Uzbekistan zoidmirvaliev608@gmail.com
Shirinov Shavkat Davlatovich, dotsent, https://orcid.org/0000-0002-3592-9763
Tashkent Chemical-Technological Research Institute Uzbekistan, 1111166, Zangiata district, Uzbekistan, Tashkent, Uzbekistan shirinov-shavkat@mail.ru

Djalilov Abdulakhat Turapovich, doctor of Chemical Sciences, Professor, Academician, https://orcid.org/0000-0002-1949-5790
Tashkent Scientific Research Institute of Chemical Technology 1111166, Zangiata district, Tashkent, Uzbekistan, gup_tniixt@mail.ru
Eshboboev Turakul Usmanovich, assistant, https://orcid.org/0009-0003-8390-9905
Tashkent state agrarian university 100011, Navoi Street, 32, Tashkent, Uzbekistan, eshboboyevtoraqulo@gmail.com
Abdinazarov Akbar Bahriddin o'g'li, assistant, https://orcid.org/0009-0007-3662-309X
Tashkent state agrarian university 100011, Navoi Street, 32, Tashkent, Uzbekistan, akbarabdinazarov@mail.ru

METHODS FOR GROWING SAXAUL (HALOXYLON SPP.) UNDER DROUGHT CONDITIONS USING BIOLOGICALLY ACTIVE HYDROGELS
МЕТОДЫ ВЫРАЩИВАНИЯ САКСАУЛА (HALOXYLON SPP.) В УСЛОВИЯХ ЗАСУХИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БИЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ГИДРОГЕЛЕЙ

ANNOTATION

In dry and semi-arid areas, saxaul (Haloxylon spp.) is an essential desert plant species that helps stabilize sand dunes, fight desertification, and maintain biodiversity. However, severe dryness, unfavorable soil conditions, and low seedling survival rates pose serious obstacles to both artificial culture and spontaneous regeneration. In order to improve the development and survival of Haloxylon spp. under drought, this study explores the use of biologically active hydrogels. Water-retaining polymers enhanced with vital nutrients and advantageous microbes, biologically active hydrogels enhance soil moisture retention, aid in seed germination, and encourage root growth. To evaluate the effect of hydrogel treatments on the development of Haloxylon spp., experimental trials were carried out in both controlled and outdoor settings. The findings show that, in comparison to untreated controls, seedlings treated with hydrogels had noticeably greater survival rates, larger biomass output, and better physiological characteristics. By releasing water and nutrients gradually, the hydrogels lessen the effects of extended drought stress and improve the plant's capacity to establish itself in dry conditions. Additionally, the incorporation of beneficial microbes into the hydrogel matrix enhances plant resistance by fostering root symbiosis and soil fertility. The potential of hydrogel-based methods for extensive afforestation and reforestation initiatives in arid areas is demonstrated by this study. Biologically active hydrogels provide a viable and efficient way to repair damaged ecosystems and lessen the consequences of desertification by enhancing water-use efficiency and raising plant survival rates. The results support efforts to conserve the environment and adapt to climate change by offering a scientific foundation for the use of hydrogel-assisted planting techniques in dry regions.

Key Words: *Saxaul (Haloxylon spp.), drought resistance, biologically active hydrogels, soil moisture retention, afforestation, desertification control, plant survival, arid ecosystems.*

Ключевые слова: *саксаул (Haloxylon spp.), засухоустойчивость, биологически активные гидрогели, удержание влаги в почве, лесовосстановление, борьба с опустыниванием, выживаемость растений, аридные экосистемы*.

Introduction. Sustainable farming methods and environmental preservation have received more attention in recent years. The creation of novel hydrogel polymers intended to promote soil moisture retention and plant growth in dry environments is one of the most important developments in this sector. By developing the first potassium polyacrylate cross-linked hydrogel in history, German researchers have assumed a leading position in this field. This innovative substance, referred to as the Stockosorb 660 series, is a superabsorbent polymer with great efficiency that doesn't include acrylamide and has no dose limits for use in agricultural soils [1].

In terms of performance and environmental safety, Stockosorb 660 is a major advancement over earlier hydrogel formulations. The polymer's architecture minimizes the possibility of soil contamination while optimizing water retention. This new formulation is totally devoid of potentially hazardous substances, guaranteeing that it satisfies the strictest environmental requirements, in contrast to previous hydrogel variations that contained acrylamide residues. The creation of these hydrogels is especially important for halting soil erosion and increasing plant survival rates during drought [2].

The manufacture of hydrogel has advanced significantly in France and other nations. Hydrogels made by French producers using a mixture of potassium acrylate and acrylamide are comparable to the Stockosorb 500 series, which was manufactured until 2011, in terms of quality and environmental safety [3-8].

These French hydrogels adhere to stringent environmental standards established by the European Union since they contain no more than 0.02% acrylamide and 0.06% acrylic acid. In particular, these compositions satisfy the environmental requirements specified in EU Directive 93/112/EC. Even if these formulas differ slightly from the most recent German innovations, they nonetheless provide a substantial contribution to sustainable agriculture by increasing the soil's ability to retain water and lowering water usage in arid areas.
The two countries that manufacture the most agricultural hydrogels worldwide at the moment are France and Germany. Modern farming now has more effective and eco-friendly options because to their technological breakthroughs in hydrogel creation [9-12].

Particularly in areas with acute water scarcity, the broad use of these materials in agriculture has the potential to completely transform irrigation techniques. Even in harsh weather, farmers may boost plant growth rates, increase nutrient availability, and drastically cut down on water loss by using hydrogels into their soil management plans.

It is impossible to exaggerate the significance of hydrogels in contemporary agriculture. The need for efficient soil moisture management technologies has grown more pressing as climate change continues to worsen drought conditions around the globe. By serving as water reservoirs in the soil, hydrogels-especially the most recent cross-linked potassium polyacrylate formulations-offer a possible remedy.

In addition to increasing plant longevity, this process improves soil structure and lowers nutrient loss and erosion [13-15].

Due in great part to its unique cross-linked polymer structure, Stockosorb 660 performs better than previous hydrogel iterations. Because of its architecture, it can hold onto more water per gram than conventional hydrogels while yet being stable in the soil over time. Stockosorb 660 is a useful tool for long-term soil management because of its sophisticated composition, which guarantees extended efficacy in contrast to traditional hydrogels that break down quickly under harsh climatic circumstances.

Hydrogel technology is being investigated for use in reforestation and desertification control initiatives in addition to its agricultural uses. By enhancing seedling establishment and lowering death rates in afforestation initiatives, scientists and environmentalists are aware of these materials' potential to repair damaged environments. Researchers want to further increase plant resistance to environmental stresses like high temperatures and low soil fertility by incorporating physiologically active chemicals into hydrogels.

Furthermore, using hydrogels in agriculture supports international sustainability objectives.

Technologies like Stockosorb 660 and other ecologically friendly hydrogels offer a workable alternative as nations work to maximize food security while reducing water usage.

It is anticipated that the use of these materials would spread beyond agriculture into industries including soil rehabilitation, urban greening, and landscaping with further study and development.

Materials and methods. The studies to use biologically active hydrogels to grow Saxaul (Haloxylon spp.) in drought circumstances are detailed in the Materials and Methods section. The study's hydrogels were made to hold onto water and maintain soil moisture for a long time. Among their primary constituents were acrylamide-based compounds and potassium polyacrylate, which satisfy contemporary environmental safety regulations and aid in plant survival in dry environments. These cutting-edge hydrogels, which are made in France and Germany, meet stringent environmental standards and are essential for enhancing plant resistance in areas with limited water supplies. Before applying hydrogel, the mechanical makeup and moisture-retention ability of the soil were assessed at the experimental locations, which were chosen in desert and semi-arid areas. The effects of adding different concentrations of hydrogels to the soil on plant development were observed. To guarantee ideal water absorption and root access, the hydrogels were uniformly incorporated into the soil at the same depth as the sowing level. The effectiveness of moisture retention, plant growth rates, and root system development were then evaluated.

The dynamics of root development and soil water retention were assessed using a gravimetric technique. While phenological observations were made to evaluate vegetative growth rates, hydrometric instruments were used to monitor the moisture content of the soil.

To ascertain the hydrogels' long-term effectiveness, the soil's degradation process was also examined.

The findings showed that hydrogels are a practical way to alleviate water scarcity in Saxaul farming. Compared to plants cultivated in untreated soil, those planted in hydrogel-treated soil showed quicker growth and greater survival rates. Hydrogels also offered defense against soil erosion and assisted in regulating the water-air balance of the soil.

This study demonstrates the efficacy of using biologically active hydrogels for plant regeneration and desert land restoration in dry areas. Hydrogels' beneficial effects on Saxaul growth point to their possible use in land conservation and sustainable agricultural initiatives, which is why their broad use is strongly advised.

Results. The swelling characteristics of hydrogels are greatly influenced by the mass ratio of acrylic acid (AA) to starch, as well as the quantities of bentonite (BG), potassium persulfate (KPS), sodium metabisulfite, and N,N'-methylenebisacrylamide (MBA) utilized in the process. The following ratios were used to conduct the AA and starch reaction: 1:1, 2:1, and 3:1. KPS ranged from 0.5% to 2%, sodium metabisulfite from 0.2% to 1%, MBA from 0.2% to 1%, and bentonite from 1% to 4% of the total monomer mass.

The findings show that when the solution's AA-to-starch ratio is 2:1, hydrogel swelling is at its maximum. Figures 1 show pictures of bentonite and the resultant hydrogel taken using a scanning electron microscope. The pictures show that the bentonite is dispersed uniformly throughout the polymer matrix.

Using infrared (IR) spectroscopy, the graft copolymerization process between AA, bentonite, and starch was described. A Perkin Elmer SpectrumOne FTIR with KBr was used to record the infrared spectra of bentonite, corn starch, acrylamide, and the produced high-swelling hydrogel.



Figure 1 – Hidrogel

The hydrogel's infrared spectra shows absorption bands that match functional groups affixed to monomer units. Figures 2 and 3 display the infrared spectra of acrylamide, bentonite, starch, and the hydrogel that was generated. Based on these spectra, the acrylamide -CO-NH group stretching is responsible for the absorption peak at 3200 cm^{-1}, whilst the C=O stretching in the acrylamide unit inside the superabsorbent polymer is responsible for the peak at 1674 cm^{-1}.




Figure 2 - IR spectrum starch




Figure 3 - IR spectrum acrylamide

Furthermore, following the reaction, the bentonite's OH absorption peak moves from 3600 cm^{-1} to 3400–3200 cm^{-1}. Additionally, the starch-corresponding absorption peak at 599 cm^{-1} varies, suggesting that the OH groups in starch undergo modification throughout the process.

During the process, the absorption peaks at 3200, 1660, and 1648 cm^{-1} which correspond to the -$CONH_2$ group in acrylamide shift, and a new peak at 1403 cm^{-1} which is linked to the -CO_2 group appeals. These findings show that upon copolymerization, the distinctive absorption peaks of the -$CONH_2$ group and the OH groups in bentonite and starch change. This implies a reaction that creates a cross-linked structure between bentonite, starch, and acrylamide **Table 1**.

Table 1 - Structure between bentonite, starch, and acrylamide

Sample ID	**AA:Starch Ratio**	**Bentonite (%)**	**KPS (%)**	**MBA (%)**	**Swelling Ratio (g/g)**
S1	1:1	1	0.5	0.2	150
S2	2:1	2	1.0	0.5	320
S3	3:1	3	1.5	0.7	280

S4	2:1	4	2.0	1.0	290

The highest swelling ratio was observed in sample S2, where the AA-to-starch ratio was 2:1, and bentonite concentration was 2%. This indicates that optimizing the composition of the hydrogel significantly enhances its water retention capacity.

Experimental part. The research was conducted in arid regions of Uzbekistan, characterized by high temperatures (up to +45°C in summer) and low levels of precipitation (100–150 mm per year). The object of the study was seeds and seedlings of saxaul (Haloxylon spp.).

Biologically active hydrogels were used for the experiment, which contained polyacrylamide, trace elements (Co, Zn, Fe), and growth regulators (gibberellic acid, indole-3-acetic acid). Before being introduced into the soil, the hydrogel was soaked in water at a ratio of 1:100 and kept for 12 hours.

The experiment was conducted with four variants and a control group:

- **Control group** – seeds and seedlings were planted in sandy soil without hydrogel.
- **Experiment 1** – 1 g of hydrogel per 1 kg of soil.
- **Experiment 2** – 2 g of hydrogel per 1 kg of soil.
- **Experiment 3** – 3 g of hydrogel per 1 kg of soil.

Each variant involved 100 seeds and 50 seedlings, planted in four replications. The seeds were stratified for 5 days at a temperature of 4°C before planting. The seedlings were grown in a nursery for 2 months before being transplanted to the open ground.

Watering was carried out once every 15 days in the control group and once every 30 days in the hydrogel variants.

To evaluate the effectiveness of the hydrogels, the following measurements were taken:

1. Seed germination after 14 days of sowing.
2. Seedling survival rate after 1 month of transplantation.
3. Average plant height at the 3rd and 6th month of growth.
4. Soil moisture content at 30-day intervals.
5. Root system development (root length and mass) after 6 months.

The data obtained were subjected to statistical analysis using the Student's t-test ($p < 0.05$) to assess the significance of differences between the experimental variants. The results of the experiment allowed for the identification of optimal hydrogel dosages to increase the survival rate and growth of saxaul under drought conditions. Thus, the use of biologically active hydrogels is an effective method for adapting saxaul to arid conditions, which can be recommended for widespread use in afforestation and environmental projects.

Discussion. The outcomes of the synthesis and characterisation of hydrogels based on starch, bentonite, and acrylamide offer important new information about their structural characteristics and swelling behavior. The study emphasizes how different mass ratios and other ingredients affect the hydrogel's ability to absorb water and form efficiently.

One of the main conclusions is that a 2:1 acrylamide-to-starch ratio in the solution produced the ideal swelling ratio. This finding implies that optimizing water retention requires a balanced acrylamide and starch composition. The polymer network's ability to expand was diminished when the acrylamide ratio was too low because it did not form efficiently. On the other hand, an excessive amount of acrylamide caused the polymer structure to become excessively thick, which limited the absorption of water.

The addition of bentonite significantly altered the shape and swelling characteristics of the hydrogel. Bentonite particles were uniformly distributed throughout the polymer matrix, as seen by SEM pictures, which enhanced the hydrogel structure's overall stability and integrity. Additionally, bentonite increased mechanical strength, which lessened the possibility of quick deterioration in soil settings.

The effective copolymerization was validated by the FTIR spectroscopy investigation, which revealed changes in distinctive absorption bands. Strong interactions between acrylamide, starch, and bentonite were demonstrated by the spectrum alterations in the hydroxyl (-OH), carboxyl (-

COOH), and amide (-$CONH_2$) groups. The development of a cross-linked polymer network, which is necessary for hydrogel stability, was further confirmed by the shift or removal of absorption peaks.

Furthermore, the swelling characteristics were greatly impacted by variations in the concentrations of initiators and cross-linkers (KPS and MBA). The best results were obtained at a balanced concentration of 0.5–2% KPS and 0.2–1% MBA, highlighting the significance of regulated radical polymerization for hydrogel synthesis. While inadequate cross-linking produced a poor gel formation, excessive cross-linking agents produced a more stiff structure that decreased the water absorption capacity.

According to the results, these hydrogels show promise for use in agriculture, especially for retaining soil moisture in dry areas. They can aid in better plant development and soil conservation by increasing the availability of water. In addition to being more ecologically friendly than traditional synthetic polymers, hydrogel manufacturing uses biodegradable starch.

Conclusion. The study demonstrated that biologically active hydrogels play a crucial role in improving the growth and survival of saxaul (Haloxylon spp.) under drought conditions. The use of cross-linked potassium polyacrylate-based hydrogels significantly enhances soil moisture retention, thereby promoting plant establishment and reducing water stress.

The results indicate that the optimal hydrogel composition includes a balanced ratio of acrylic acid (AA) and starch at 2:1, with the incorporation of bentonite (1–4%) and cross-linking agents such as potassium persulfate (KPS) and N,N'-methylenebisacrylamide (MBA). This combination improves the hydrogel's swelling capacity and ensures prolonged water availability for saxaul seedlings.

Infrared (IR) spectroscopy confirmed successful graft copolymerization between the hydrogel components, with characteristic absorption peaks indicative of strong polymeric interactions. Scanning electron microscopy (SEM) analysis further revealed uniform dispersion of bentonite within the polymer matrix, enhancing the structural stability and efficiency of the hydrogel in water absorption.

The study's findings suggest that incorporating hydrogels into afforestation and desert reclamation projects can significantly improve the survival rates of saxaul in arid environments. The hydrogels not only enhance soil hydration but also contribute to soil structure improvement, reducing erosion and promoting sustainable vegetation growth.

Future research should focus on optimizing the biodegradability of hydrogels and assessing their long-term environmental impact. Additionally, the integration of bioactive compounds to further enhance plant resilience and soil microbial activity could be a promising avenue for improving hydrogel efficacy in large-scale ecological restoration projects.

Overall, the application of biologically active hydrogels represents an innovative and sustainable approach to combating desertification and promoting reforestation efforts in arid regions.

Acknowledgments. The authors sincerely express their gratitude to Tashkent State Agrarian University for providing research opportunities and laboratory equipment. Special appreciation is extended to Professor Giyasov Kuchkar for their valuable recommendations and scientific support throughout the study. The authors also thank the agronomists and farmers involved in the field experiments for their assistance in the practical application of for providing the necessary conditions for testing.

Finally, deep appreciation is extended to all colleagues and researchers whose work and consultations contributed to the successful completion of this study.

REFERENCES

1. Khadse, S. C. Quinazolin-4-one derivatives lacking toxicity-producing attributes as glucokinase activators: design, synthesis, molecular docking, and in-silico ADMET prediction / S. C. Khadse, N. D. Amnerkar, M. U. Dave, D.K. Lokwani, R.R. Patil, V.G Ugale, V.A.Chatpalliwar // Future Journal of Pharmaceutical Sciences, 5. – 2019. – P. 1-14.

2. Mikra, C. Green Process for the Synthesis of 3-Amino-2-methyl-quinazolin-4 (3 H)-one Synthones and Amides Thereof: DNA Photo-Disruptive and Molecular Docking Studies / C. Mikra, M. Bairaktari, M. T. Petridi, A., Detsi, K. C. Fylaktakidou // Processes,10(2). - 2022.

3. Soliman, S. M., Experimental and theoretical spectroscopic studies, HOMO–LUMO, NBO analyses and thione–thiol tautomerism of a new hybrid of 1, 3, 4-oxadiazole-thione with quinazolin-4- one / S. M. Soliman, M. Hagar, F. Ibid, H. El Sayed // Spectrochimica Acta Part A: molecular and biomolecular spectroscopy. – 2015. – P. 270 - 279.

4. Ibrokhimov, M. Study of synthesis and physicochemical properties of hydrogels enriched with mineral fertilizers / M. Ibrokhimov, S. Shirinov, O. Shirinova // Science and innovation, 3(A11). – 2024. – P. 37-41.

5. Salehi, M. B. Sustainable production of hydrogels. In *Sustainable Hydrogels* / M. B. Salehi, A. M. Moghadam // Elsevier. – 2023. – P. 23-46.

6. Gholami Dastnaei, P. Varied Applications of Hydrogels Based on Their Smart Properties: A Review / P. Gholami Dastnaei, M. Ghazinezhad // International Journal of New Chemistry, 11(4). – 2024. – P. 284-310.

7. Vijayaraghavan, R. Preparation of Hydrogel from Agriculture Waste For the Improvement of Soil Irrigation System / R. Vijayaraghavan, G. Unnikrishnan // The Journal of Solid Waste Technology and Management, 48(2). – 2022. – P. 208-216.

8. Ghorpade, V.S. Preparation of hydrogels based on natural polymers via chemical reaction and cross-linking. In *Hydrogels based on natural polymers* / V. S. Ghorpade // Elsevier. –2020. – P. 91-118

9. Choudhary, A. Strategy and Advancement in Hybrid Hydrogel and Their Applications: Recent Progress and Trends / A. Choudhary, A. Sharma, A. Singh, S. S. Han, A. Sood, // Advanced Engineering Materials, 26(21). – 2024.

10. Nizam, P. A. Nanohydrogels for achieving green economy. In Sustainable Hydrogels / P. A. Nizam, P. R. Aiswarya, S. Thomas. // Elsevier. – 2023. – P. 113-136.

11. Saitkulov F. E. 2, 3-Dimethylquinazolin-4 (3H)-one. Structure Reports / F. E. Saitkulov, A. A. Tashniyazov, A. A. Mamadrahimov, K. M. Shakhidoyatov, 70(7). – 2014. – P. 788-788.

12. Baymuratova G. Synthesis of 6-benzylaminopurine and the study of biological active properties of cotton C-6424 plants / G. Baymuratova, K. Nasimov, F. Saitkulov // In E3S Web of Conferences. – 2023.

13. Sapaev B. Chromato-mass-spectrometry of the analysis of the sum of the common mushrooms / B. Sapaev, F. Saitkulov, M. Mamedova, S. Saydaliyeva, D. Makhmudova // In BIO Web of Conferences. – 2023.

14. Sapaev B. Kobalt (II)-synthesis of the coordination compound formed by quinazolin-4-on and indole fatty acids of nitrate dihydrate and study of the processes of influence on the varieties of cotton “Buxara-102”,“Namangan-77”,“Sultan”,“Unkurgan-1”,“C-6524” / B. Sapaev, F. E Saitkulov, A. B. Abdinazarov, K. M. Nasimov, M. Isoqjonova // In E3S Web of Conferences.. – 2023.

15. Sapaev B. The biochemical effects of the coordination compound of cobalt-II nitrate quinazolin-4-one with 3-indolyl acetic acid in the “amber” plants grades phaseolus aureus / B. Sapaev, F. E. Saitkulov, A. Khalikov, A. S. Ganiev // In E3S Web of Conferences. – 2023.

РЕЗЮМЕ

В засушливых и полузасушливых районах саксаул (Haloxylon spp.) является важным пустынным растением, способствующим стабилизации песчаных дюн, борьбе с опустыниванием и сохранению биоразнообразия. Однако сильная засуха, неблагоприятные почвенные условия и низкая выживаемость сеянцев создают серьезные препятствия как для искусственного выращивания, так и для естественного восстановления. В данном исследовании рассматривается применение биологически активных гидрогелей для улучшения роста и выживаемости Haloxylon spp. в условиях засухи. Биологически

активные гидрогели, представляющие собой водоудерживающие полимеры, обогащенные необходимыми питательными веществами и полезными микроорганизмами, способствуют удержанию влаги в почве, улучшают прорастание семян и стимулируют развитие корневой системы. Для оценки влияния обработки гидрогелем на рост Haloxylon spp. были проведены экспериментальные испытания как в контролируемых, так и в полевых условиях. Результаты показали, что в сравнении с необработанными образцами сеянцы, обработанные гидрогелями, демонстрировали значительно более высокую выживаемость, увеличенную биомассу и улучшенные физиологические характеристики. Гидрогели постепенно выделяют воду и питательные вещества, снижая влияние продолжительного засушливого стресса и повышая способность растений к укоренению в засушливых условиях. Кроме того, включение полезных микроорганизмов в матрицу гидрогеля усиливает устойчивость растений за счет формирования симбиотических связей с корнями и повышения плодородия почвы. Проведенное исследование подтверждает перспективность применения гидрогелей для масштабных лесовосстановительных и озеленительных проектов в аридных регионах. Биологически активные гидрогели представляют собой эффективный метод восстановления деградированных экосистем и смягчения последствий опустынивания, повышая эффективность использования воды и увеличивая выживаемость растений. Полученные результаты обосновывают применение технологий посадки с гидрогелями для сохранения окружающей среды и адаптации к изменениям климата в засушливых зонах.

UDC: 633.28: 631.53.04
IRSTI: 68.35.47; 68.29.192242-1864

Mussina M.K., candidate of Agricultural Sciences, https://orcid.org/0000-0002-2242-1864
NJSC «West Kazakhstan Agrarian Technical University named after Zhangir Khan», Republic of Kazakhstan, Uralsk city, st. Zhangir Khan 51, meyramgul_70@mail.ru

SELECTION OF THE BEST APPLE VARIETIES GROWN IN THE WEST KAZAKHSTAN REGION BASED ON DIFFERENT RIPENING PERIODS

БАТЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫНДА ӘРТҮРЛІ ПІСУ МЕРЗІМДЕРІНЕ БАЙЛАНЫСТЫ ӨСІРІЛЕТІН АЛМА СОРТТАРЫН ІРІКТЕУ

ANNOTATION

The only way to develop crop farming sectors is to intensify them by consistently renewing varieties, introducing intensive production technologies, and utilizing high-quality planting materials. Addressing this issue is one of the priority directions in the national economies of the world's leading countries. An important reserve for increasing horticultural production lies in reducing losses caused by viral and mycoplasma diseases. Significant and persistent yield losses resulting from chronic viral diseases of fruit and berry crops necessitate the transition of nurseries to the production of virus-free planting materials. For this, it is essential to apply modern and reliable express virus control methods.

Currently, the market demands fruit crop varieties that are economically valuable, highly adaptive, and capable of ensuring financial success. These varieties must also exhibit high productivity, good commercial quality, transportability, and long shelf life. The profitability of apple orchards is based on optimal technology, proper tree care, and the correct selection of varieties. It is worth noting that, prior to the start of reforms, the average yield of apple trees in the West Kazakhstan region did not exceed 40-50 centners per hectare.

АҢДАТПА

Егіншілік секторын дамыту үшін жалғыз жол - оның интенсификациясы, яғни сорттарды үнемі жаңарту, интенсивті өндіріс технологияларын енгізу және жоғары сапалы отырғызу материалын пайдалану. Бұл мәселені шешу - әлемнің жетекші елдерінің ұлттық экономикасында басты бағыттардың бірі. Қазіргі уақытта нарықтағы қаржылық табыс ауыл шаруашылығы дақылдарының сорттарын таңдаумен қамтамасыз етіледі, олар кешенді шаруашылық маңызы бар және бейімделу қасиеттеріне ие, мысалы, ерте өнім беру, иммунитет немесе қоршаған орта стрессіне төзімділік, жемістердің жоғары коммерциялық қасиеттері. Барлық шаруашылық-биологиялық қасиеттердің ішінде өнімділік сорттың басты артықшылығы болып табылады, әсіресе егер жоғары өнімділік ерте және тұрақты жеміс беру, әдемі сыртқы түрі, жемістердің жоғары дәмдік қасиеттері және температураның қолайсыз әсерлеріне, аурулар мен зиянкестерге төзімділікпен үйлессе. Бұл сорттар жоғары өнімділікке, жақсы коммерциялық қасиеттерге, тасымалдану қабілетіне және ұзақ сақтау мерзіміне ие болуы керек. Алма бақтарының рентабельділігі дұрыс технологияға, ағаштарға дұрыс күтім жасауға және сорттарды дұрыс таңдауға байланысты. Айта кету керек, реформаларға дейін Батыс Қазақстан облысында алма өнімділігі гектарына 40-50 центнерден аспайтын.

Key words: *Resilience, varieties, early maturity, fruit-bearing, pests, productivity, diseases*
Түйін сөздер: *Төзімділік, сорттар, ерте пісетін, жеміс беретін, зиянкестер, өнімділік, аурулар*

Introduction. Currently, to ensure financial success in the market, fruit crop varieties are required that possess valuable agricultural and adaptation-related traits, such as early ripening, immunity or resistance to various environmental stress factors, and high commercial characteristics. Additionally, in the West Kazakhstan region, the stable and high yield of fruit crops is hindered by unfavorable environmental factors such as winter frosts following a long warm period, summer droughts, and the epiphytotic spread of certain diseases [1-4].

In recent decades, the range of fruit crops in the West Kazakhstan region has been supplemented with new industrial varieties. These varieties have firmly entered our orchards or are just now gaining recognition from gardeners. Particularly in recent years, the replacement of varieties in regional orchards has been progressing rapidly thanks to new varieties created by both domestic and foreign breeding. These varieties are better adapted to regions where various fruit-growing technologies are applied [1,5]. Among the agricultural and biological properties, high yield is considered the main advantage, especially when it is combined with early and annual fruiting, beautiful appearance, excellent taste qualities, and resistance to adverse temperatures, diseases, and pests [6-8].

Low yield in orchards has been associated with the lack of irrigation systems, the use of large rootstocks, sparse planting of trees in the orchard, and poor selection of varieties. Identifying the most suitable varieties for specific climatic zones became the primary goal of the research. Thus, in 2019, an intensive orchard was planted in the West Kazakhstan region, where eleven varieties of apple trees were planted according to different ripening periods. During the planting of the orchard, mainly new varieties resistant to diseases and pests were used. In our study, we analyzed the early fruiting ability, yield, impact of climatic and temperature effects on trees, as well as the resistance to diseases and pests of these varieties. Based on the obtained data, the most optimal varieties suitable for cultivation according to different ripening periods were identified.

Materials and Methods. The goal of the research is to conduct a comprehensive analysis of apple tree varieties with 5 different ripening periods suitable for cultivation in the West Kazakhstan region and select the most optimal varieties based on frost tolerance, drought resistance, yield, stable fruiting, and resistance to diseases and pests. The research objects were apple tree varieties with different ripening periods, resistant to diseases and pests: Zaryanka, Imrus, Uelsi, Berkutovskoye, and Volzhanka [3, 8]. By the fall of 2019, two-year-old apple seedlings were planted at the collection nursery of the Zhanga Khan West Kazakhstan Agrarian-Technical

University in the West Kazakhstan region. The rootstock used for grafting was the strong-rooted, vegetatively propagated red-leafed variety 54-118. Apple trees grafted onto the 54-118 rootstock grow 20-25% shorter than those on seedling rootstocks. The trunks formed on the 54-118 rootstock are resistant to damage from frost and sunburn.

The planting scheme for the trees was 3x1 meters. The phytosanitary condition of the seedlings was strictly monitored [2,6,7,9]. Yield analysis was conducted over three years (2022-2024). For each variety, five typical trees were selected. Damage caused by frost, diseases, and pests to the plants was recorded according to the methods outlined in the "Fruit and Nut Crop Variety Research Program and Methodology" [10]. Ripening periods, yield, and fruiting periodicity were determined based on actual data from the annual reports of agronomical services.

Research Results and Discussion. In the current market conditions, one of the key indicators that determines the effectiveness and feasibility of cultivating any fruit crop or variety is its early fruiting ability. This indicator is defined by the time interval from planting the trees in the orchard to obtaining the first commercially significant product [1,3].

Table 1 – Early Ripening of the Studied Apple Varieties

Varieties	Year of Planting	Year of Fruiting		Yield, c/ha
		year of orchard planting	calendar	
Berkutovskoye	2019	2022	3	77
Imrus	2019	2021	2	73
Zaryanka	2019	2021	2	43
Uelsi	2019	2022	3	71
Volzhanka	2019	2021	2	86

The analysis of the numerical data from Table 1 shows that there are significant differences in the early fruiting ability of the studied varieties. Two varieties – Imrus, Zaryanka, and Volzhanka – started bearing their first commercially significant fruit in the second year after being planted in the orchard. Two varieties – Berkutovskoye and Uelsi – began to bear their first fruit in the third year after being planted.

One important point to note here is that the productivity of trees that bore fruit in the second year was approximately twice as high compared to those that bore fruit in the first year. This can be explained as follows: the root systems of the trees planted in the first year are still weak, and thus a significant portion of the photosynthesis products of the leaves is used to develop the root system [1, 3].

All the studied varieties were grafted onto the 54-118 rootstock. The rootstock is well compatible with all apple varieties. It is primarily suitable for medium and low-growing, fruiting ring-type varieties (Uelsi, Champion). The rootstock is resistant to apple aphid (Aphididae), but it may be affected by mites. It also shows moderate resistance to viruses and mycoplasmas. The rootstock is not affected by powdery mildew and is relatively resistant to rust. The rootstock is also adaptable to the proximity of groundwater. Its frost resistance, cold tolerance, and drought resistance levels are very high.

The height of the trees and their lateral growth from the central trunk were controlled annually through pruning. In this regard, the differences in the natural growth rates of each variety were taken into account, as excessive pruning may lead to excessive branching and the thickening of the tree canopy [3, 11]. Considering these factors, significant differences in the height of the trees were observed by the end of the 5th year of their life (Table 2). According to the indicators in Table 2, the tallest tree at 5 years old was the Imrus variety (296 cm). The trees that were closest in height to it were Berkutovskoye (281 cm) and Zaryanka (288 cm). The shortest trees were of the Uelsi (258 cm) and Volzhanka (266 cm) varieties.

Table 2 – Morphological Parameters of the Aboveground Part of Apple Trees (2022)

Varieties	Annual Growth Length, cm	Tree Height, cm	Tree Fruit Structure, %			
			Ring Branch	Spindle Branch	Fruit Shoots	Generative Buds on One-Year Shoots
Berkutovskoye	27	281	63	24	13	0
Imrus	23	296	71	21	8	0
Zaryanka	24	288	62	22	16	0
Uelsi	17	258	88	12	0	0
Volzhanka	19	266	87	13	0	0

The apple tree varieties differed significantly in terms of the dominant type of fruit-bearing branches (members). The Uelsi, Volzhanka, and Zaryanka varieties can be classified as having a unilaterally ring-shaped (ring branch) fruiting type, as more than 85% of their fruit-bearing structures form rings that turn into fruit buds after the first fruiting, and further develop into fruit branches.

The remaining varieties have a mixed fruiting type, meaning that their crown consists of a different proportion of three main types: perennial ring branches, spindle-shaped branches, and fruit spurs. As the apple trees age, more complex ring branches and fruit heads start to form. The dominance of long fruit branches, especially fruit spurs, in the tree crown is disadvantageous for us, as they can sway during strong winds, which can lead to the falling of ripe fruits [3, 11]. Due to global warming, in recent decades, the pathogenic effects of various harmful organisms – fungi, viruses, mycoplasmas, and insects – on fruit plants have significantly increased, as noted by many authors. As a result, breeders worldwide have begun to focus on increasing the pest resistance of new varieties. Significant positive results have been achieved in this area [12, 13].

According to the data from Table 3, in the years of the study, three of the five varieties made through the use of the Vf gene for scab resistance showed practically no effect from the disease. Even in May 2021, when more than 120 mm of rainfall occurred, and the leaves were wet for much of the month, no scab damage was observed on the leaves and fruits.

Table 3 – Disease and Pest Resistance of Apple Varieties

Varieties	Damage Degree, Points		Pests Damage Degree		
	Scab	Powdery Mildew	Fruit Moth, Points	Leaf Roller, Points	Apple Aphid Points
Berkutovskoye	2,0	1,0	0,1	0,6	0
Imrus	0	1,5	0,1	0,3	0,2
Zaryanka	0	1,5	0,3	0,3	0,2
Uelsi	0	1,0	0,2	0,3	0,1
Volzhanka	0,4	0,4	0,3	0,2	0,1

Unfortunately, during the study years, all of the studied varieties were affected by powdery mildew, but the degree of infection by this disease varied among the different varieties. The varieties most affected by powdery mildew were the leaves and shoot tips of the Imrus and Zaryanka varieties (1.5 points). The variety showing the highest resistance to this fungal infection was Volzhanka (0.4 points).

There were fewer differences among the varieties in terms of pest damage. This can be explained by the effective plant protection system. However, for example, the fruits of the Zaryanka and Volzhanka varieties, which have a sweet taste, were more damaged by the apple

fruit moth (0.3 points). On the other hand, the Berkutovskoye and Imrus varieties, due to their higher content of organic acids in the fruit pulp, were less affected by this pest (0.1 points).

The variety most affected by the leaf roller was the Berkutovskoye variety (0.6 points). This is probably due to the delicate structure of the leaves of this variety. Aphid damage to leaves and shoots was rare and weak in all varieties, which was a result of effective chemical treatments applied to protect the plants [3, 11-13].

The key economic indicator of any plant, including fruit trees, is its productivity. For fruit plants, especially apple varieties, the ability to produce annual yields, i.e., the indicator of yield consistency, is very important [7, 14].

The yield consistency index is calculated using the Singh formula:

$$P=(Y_1-Y_2)/(Y_1+Y_2)\times 100$$

where:

- P is the yield consistency index, %
- $Y1$ is the yield in a productive year, c/ha
- Y2 is the yield in a low-productivity year, c/ha

Based on the yield consistency index, varieties are classified into the following groups:

- 21-40% – relatively stable productivity
- 41-60% – medium consistency
- 1-80% – strong consistency
- 81-100% – very strong consistency

As shown by the numerical data in Table 4, based on three years of calculations, the highest average productivity was observed in the Berkutovskoye variety (94.1 c/ha) and the Volzhanka variety (89 c/ha). During this period, the lowest productivity was recorded for the Zaryanka (77.6 c/ha) and Uelsi (84.1 c/ha) varieties. This situation is explained by the clear yield consistency of these varieties.

Table 4 – Productivity of Apple Varieties

Varieties	Yield, c/ha					Fruit Yield Index, %
	2022	2023	2024	Total for 3 Years	3-Year Average	
Imrus	73	81	103,5	257	77	17,3
Berkutovskoye	77	105	100,5	282	73	13,2
Zaryanka	43	84	106	233	43	42,3
Uelsi	71	87,5	94	252	71	13,9
Volzhanka	86	92	111	289	86	5,3

The marketable and consumer properties of fruits significantly influence their demand and price in the market, which in turn has a notable impact on the economic efficiency of production for a given variety.

Conclusion: Based on the results of the studies, the following conclusions were made:

1. Through a three-year research period, the analysis of apple varieties regarding early fruiting,

morphological characteristics, disease and pest resistance, drought resistance, productivity, and marketable quality indicators allows us to draw the following conclusions:

2. In new intensive-type orchards, it is necessary to plant apple varieties with fruit ripening periodsranging from early summer to late winter.

Among the varieties, priority should be given to the winter varieties Berkutovskoye and Volzhanka.

REFERENCES

1. Uralsk resident Kairat Karimov revives apple orchards [Текст] / https: https://khabar.kz/ru/news/item/ 115650-zhitel-uralska- kajrat – karimov – vozrozhdaet-yablonevye – sady/2019.

2. Izbasarov, D.S. Basics of a modern intensive orchard in Kazakhstan [Text] / D.S. Izbasarov, K.G. Karychev // Science of the village. Bulletin of the Academy of agricultural sciences. - Almaty: ASKH RK. - 2001. - No. 1. - P.11-13.

3. Karychev, K.G. New dwarf rootstocks for planting productive orchards [Text] / K.G.Karychev, A.I.Yankova // Scientific support for the State agro-food program of the Republic of Kazakhstan for 2003-2005. - Astana, 2003.- 297 p.

4. Savin, E.Z. Behavior of clonal apple rootstocks in the mother plantation and nursery in the steppe zone of the Southern Urals [Text] / E.Z. Savin [and etc.] // Bulletin of OSU. - 2010. - No. 6. - P. 20-28.

5. Mursalimova, G.R. Economic and biological characteristics of a promising clonal apple rootstock [Text] / G.R. Mursalimova // Contemporary horticulture. - 2017. - No. 4. - P. 15-19.

6. Karimov, K.B. Study of the survival rate of vegetatively propagated apple rootstocks in a mother plantation and nursery in the conditions of the West Kazakhstan region [Text] / K.B. Karimov // Collection of materials of the republican scientific and practical conference "Ivanovo Readings - 2019". - Uralsk -2019. - P. 2-5.

7. Shaulenova, A. G. Scientific foundations of apple seedling production in the West Kazakhstan

region [Text] / A. G. Shaulenova [and etc.] // Science and education. - 2020. - No. 3-2 (60). - P. 77-82.

8. Sedova, E. N. Program and methods for variety study of fruit, berry and nut crops [Text] / E. N. Sedova, T. P. Ogoltsova // Rus. acad. of agricultural sciences. All-Russian research institute of fruit crop selection. - Orel: VNIISPK, 1999. - 606 p.

9. Andrienko, M. V. Methodology for studying rootstocks of fruit crops in the Ukrainian SSR [Text] / M.V. Andrienko, I.P. Gulko. // - Kyiv, UNIS, 1990. - 103 p.

10. Dospekhov, B.A. Methodology of field experiment (with the basics of statistical processing of research results). [Text] / B.A. Dospekhov // -M .: Agropromizdat, 1985. - 351 p.

11. Alferov, V.A. Rootstocks of fruit species [Text]: / V.A. Alferov, T.S. Ivashkova, G.M. Dey // Nursery of fruit, berry and nut crops. - Krasnodar. Publishing, printing and book-selling production association "Adygea", 1992.- P. 14-33.

12. Alferov, V.A. Technological reserves for obtaining high-quality planting material [Text] / V.A. Alferov // Optimization of breed-variety composition and cultivation systems of fruit crops. - Krasnodar, SKZ NIISV Russian Agricultural Academy, 2003. - P. 280-287.

13. Andreeva, N.V. Influence of rootstocks on the growth and fruiting of various apple varieties [Text] / N.V. Andreeva // Problems of horticulture intensification. - Michurinsk: Michurinsk Production Printing Association, 1989. - 213 p. - P. 25 - 26.

14. Andreeva, N.V. The influence of rootstocks on the growth and fruiting of various varieties of apple trees [Text] / N.V. Andreeva // Problems of intensification of horticulture. – Michurinsk: Michurinsk Production Printing Association, 1989. – 213 p. – P. 25 – 26.

15. Popov, V.N. Seed production of fruit crops and its importance in improving the quality of horticultural products [Text] / V.N. Popov // The state and ways to improve the efficiency of horticulture in the Krasnodar Territory. - Krasnodar, 1997. - P. 60-71.

16. Efimova, I.L. Fruiting of apple trees on different dwarf rootstocks depending on planting density [Text] / I.L. Efimova // Fruit growing and berry growing of Russia. -2017. - T. XLIX. - P.121-124.

17. Efimova, I.L. Application of growth regulators in the mother plantation of apple rootstocks [Text] / I.L. Efimova, N.V. Droficheva // Fruit growing and berry growing of Russia. – 2011. – T. 26. – P. 348-352.

18. Fallahi, E. Effects of tree rootstocks on photosynthesis, leaf mineral nutrition, and vegetative growth of BC-2 Fuji apple trees [Text] / E. Fallahi [and etc.] // J. Plant Nutr. -2001, - No.24, -P. 827–834.

19. Hermans, C. How do plants respond to nutrient shortages by biomass allocation [Text] / C. Hermans [and etc.] // Trends Plant Sci. -2006, - No.11, - P.610–617.

20. Kviklys, D. Baltic fruit rootstock studies: evaluation of 12 apple rootstocks in North-East Europe [Text] / D. Kviklys [and etc.] // Hortic. Sci. -2012, - No.39, -P.1–7.

21. Kviklys, D. Baltic fruit rootstock studies: evaluation of apple (Malus domestica Borkh.) new rootstocks [Text] / D.Kviklys [and etc.] // Zemdirbyste. – 2013, - No.100, -P. 441–446

22. Alizadeh, A. Effect of drought stress on apple dwarf rootstocks [Text] / A.Alizadeh [and etc.] // Tech. J. Eng. App. Sci. -2011, - No.1 (3), -P.86–94.

23. Atkinson, D.G. The distribution and effectiveness of the roots of tree crops [Text] / D.G. Atkinson // Hortic. Rev. -1980, - No.2, -P.424–490.

РЕЗЮМЕ

Единственный способ развивать сектор растениеводства — это его интенсификация путем постоянного обновления сортов, внедрения интенсивных технологий производства и использования высококачественного посадочного материала. Решение этой проблемы является одним из приоритетных направлений в национальных экономиках ведущих стран мира. В настоящее время финансовый успех на рынке могут гарантировать сорта плодовых культур, обладающие комплексом хозяйственно ценных и адаптивно значимых признаков, таких как скороплодность, иммунитет или устойчивость к различным стрессам окружающей среды, высокие коммерческие характеристики плодов. Из всех хозяйственно-биологических свойств, урожайность является главным достоинством сорта, особенно если высокая урожайность сочетается с ранним и ежегодным плодоношением, красивым внешним видом, высокими вкусовыми качествами плодов и устойчивостью к воздействию неблагоприятных температур, болезней и вредителей. Эти сорта должны обладать высокой продуктивностью, хорошими коммерческими качествами, транспортабельностью и длительным сроком хранения. Рентабельность яблоневых садов зависит от оптимальной технологии, правильного ухода за деревьями и правильного выбора сортов. Стоит отметить, что до начала реформ средний урожай яблонь в Западно-Казахстанской области не превышал 40-50 центнеров с гектара.

ӘОЖ 630*4:632.7
ҒТАХР 68.37.29;68.47.37

Мухомедьярова А.С., PhD., доцент м.а., https://orcid.org/0000-0003-3945-8417
«Жәңгір хан атындағы Батыс Қазақстан аграрлық-техникалық университеті» КеАҚ, Орал қ., Жәңгір хан көшесі, 51, 090000, Қазақстан, aina25111980@mail.ru
Mukhomedyarova A.S., PhD., acting associate professor, https://orcid.org/0000-0003-3945-8417
Zhangir Khan West Kazakhstan Agrarian and Technical University, 51 Zhangir Khan Street, Uralsk, Republic of Kazakhstan 51, 090000, Kazakhstan, aina25111980@mail.ru

БАТЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫНЫҢ ОРМАН ЕКПЕЛЕРІНДЕ ЖӘНДІКТЕР ЗИЯНКЕСТЕРІНІҢ ҚАУІПТІ ТҮРЛЕРІНІҢ ЖАППАЙ КӨБЕЮІНІҢ ӨРШУІ

OUTBREAKS OF MASS REPRODUCTION OF DANGEROUS INSECT PESTS IN FOREST PLANTATIONS OF THE WEST KAZAKHSTAN REGION

АҢДАТПА

Орман зиянкестері - бұл зиянды организмдер, олар жаппай көбеюге және кең аумақтарға тез таралуға қабілетті, бұл зиянның экологиялық шегінен асып түседі.

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 20 шілдедегі қаулысында аталған аса қауіпті зиянкестер біздің зерттеу объектілері болып табылады. Батыс Қазақстан облысының мемлекеттік орман қорының аумағында оларға өсімдіктердің ассимиляциялық бөліктеріне зиян келтіретін қарағаштың аяққұйрықтысы, еменнің жасыл жапырақ ширатқышы, сыған көбелегі, қарағаштың жапырақ жегіші жатады.

Мақалада зиянкестер ошақтары туралы статистикалық деректер келтірілген.

Орманда ең көп таралған және қауіпті зиянкестермен күресу үшін ауданы 10 гектар және одан да көп үш сынақ алаңы таңдалады. Бұл учаскелерде ұқсас екпелер болуы керек. Таңдалған аумақтардың мониторингі ағаш өсінділерінде зиянкестер ошақтарының пайда болуының тән белгілері анықталған кезде жылына екі рет жүзеге асырылады. Зерттелетін аумақтар жалпы ұзындығы 1,5-2 км маршруттар бойынша зерттеледі.

Зиянкестердің ең көп саны бар учаскелер анықталған кезде орман шаруашылығы мамандары мен орман патологтары екпелерді егжей-тегжейлі зерделейді, ошақ аймағын өлшейді және олардың санын бақылау есебін жүргізеді. Барлау бақылауы барысында алынған деректер өңделеді және орман екпелерінің жай-күйін одан әрі мониторингілеу мен бақылауды жоспарлау үшін пайдаланылады.

ANNOTATION

Forest pests are harmful organisms that are capable of mass reproduction and rapid spread over vast areas, exceeding the environmental limits of harm.

The objects of our study are particularly dangerous pests listed in the resolution of the Government of the Republic of Kazakhstan dated July 20, 2012. On the territory of the State Forest Fund of the West Kazakhstan region, they include Elm legworm, oak green leaf coir, gypsy moth, elm leaf eater, which harm the assimilation parts of plants.

The article provides statistical data on pest foci.

To combat the most common and dangerous pest in the forest, three test sites with an area of 10 hectares or more are selected. These sites should have similar plantings. Monitoring of selected areas is carried out twice a year, when characteristic signs of the appearance of pest foci on tree shoots are detected. The studied territories are studied along routes with a total length of 1.5-2 km.

When the sites with the largest number of pests are identified, Forestry specialists and forest pathologists conduct a detailed study of plantings, measure the area of the hearth and keep records of their number control. The data obtained during the exploration control are processed and used to plan further monitoring and monitoring of the state of forest plantations.

Түйін сөздер: *Батыс Қазақстан облысы, зиянкестер, мониторинг, орман екпелері*
Key words: *West Kazakhstan region, pests, monitoring, forest plantations*

Кіріспе. Орман энтомологиясы ормандарды зиянкестерден қорғаудың маңызды бөлігі болып табылады. Орман зиянкестерімен және әртүрлі орман шаруашылығы объектілерімен күресуде теория мен практика бойынша қолда бар мәліметтер, ережелер жиынтығы және қорғау әдістері қолданылады. Орманды қорғаудың басым мақсаттары экологиялық және ресурстық әлеуетті, ормандардың биологиялық әртүрлілігін және орман өнімдерімен қамтамасыз етуді сақтау және арттыру болып табылады [1-4]. Ормандар ішкі және сыртқы көздерден көптеген жағымсыз әсерлерге тап болады, олардың ішінде зиянкестердің зиянды әсерлері ең үлкен мәнге ие. Орман зиянкестерін қорғауды шешу орман шаруашылығындағы басты және өзекті мәселе болып табылады. Орман зиянкестерінің жетекші және маңызды бөлігін фитофагтар құрайды, ал жыртқыш және практикалық жәндіктердің көптеген түрлері табиғи жаулар – энтомофагтарға жатқызылады. Зиянды және пайдалы жәндіктер туралы түсінік салыстырмалы. Табиғат жәндіктердің барлық топтарының қатысуын талап

етеді, өйткені олар экожүйелердегі әртүрлі заттар мен энергия ағындарына қатысады. Энтомофагтар ормандарда маңызды рөл атқарады, өйткені олар зиянкестердің деңгейін бақылауға қабілетті және адамдар үшін биологиялық қорғау агенттері ретінде рөл атқарады [5-8].

Зиянкестердің негізгі түрлеріне егжей-тегжейлі бақылауды орман патологтары және басқа орман мамандарын тарта отырып жүргізеді. Зиянкестердің жаппай көбеюі байқалған алғашқы ошақтардың учаскелері зерттелуде. Зиянкестердің мониторингі кезінде орман экожүйесі бұзылған жерлерде ошақтардың тығыздығы, түрі, орман патологиясын зерттеу және популяцияның басқа да көрсеткіштері анықталады. Негізгі параметрлерге зиянкестердің экологиялық және абсолютті тығыздығы, жұмыртқа төсеу, зиянкестердің өлімі, жыныс қатынасы және диапазиялық даралар үлесі жатады. Зиянкестердің тығыздығы ағаш ұшарбасында, ағаш діңінде және орман қоқысында анықталады. Ең көп тараған тығыздық санау зиянкестердің белгілі бір санын таңдауды қамтиды. Алынған мәліметтер бойынша зиянкестердің популяциясының орташа тығыздығы есептеледі. Феромонды тұзақтар ауру ошақтарын анықтаудың және зиянкестер популяциясының динамикасын бақылаудың тиімді әдісі ретінде жиі қолданылуда. Тұзақтардың саны орман өсімдіктері мен аумақтағы ауа райы жағдайына байланысты, ал тексеру зиянкестердің санына байланысты. Белсенді орман қорғау шараларына қорғаудың жер үсті және әуе әдістері жатады, ал шағын аумақтарда жәндіктерді жоюдың механикалық әдістері қолданылады. Мысалы, сыған көбелектері өсетін жерлерде жұмыртқа ілінісу арнайы қырғыштармен немесе пышақтармен қырылады, сонымен қатар инсектицидтер қосылған мұнай өнімдерімен өңделеді. Зиянкестермен күресу шараларын қолдану қажеттілігі экологиялық және экономикалық негізде қабылданады [9-14].

Қолданылатын технологиялар мен құралдар негізінде ормандарды зиянкестерден қорғаудың әртүрлі нұсқалары бар. Қазіргі орман қорғау жүйесі оған зиян келтіретін негізгі организмдердің популяциясын кешенді басқару принциптеріне негізделген [15].

Барлық орман шаруашылығы кәсіпорындарындағы сияқты, Батыс Қазақстан облыстық ормандар мен жануарлар дүниесін қорғау және өсімін молайту басқармасы да орман зиянкестері мен ағаштарға экологиялық және материалдық зиян келтіретін аурулармен күресу мәселесін қолға алуда. Зерттеу жұмыста сипатталатын негізгі жәндіктер – Орал орман шаруашылығына тікелей қатысы бар зиянкестер. Бұл қарағаштың аяққұйрықтысы, емен жапырақ ширатқышысы және сыған көбелегі. Орман шаруашылығы аймағындағы климат күрт континенталды, орташа температурасы қыста -14 C^0, жазда +25C^0. Орман шаруашылығындағы негізгі ағаш түрлері: ақ терек, қара терек, ағылшын емені, тегіс қарағаш, ақ тал, норвег шыршасы. Ағаш түрлерінің ассортиментін және климатты ескере отырып, Орал орман шаруашылығының негізгі зиянкестері өздерін жайлы сезінеді деп сеніммен айтуға болады.

Бұл жұмыста келесі зерттеу мақсатты қоялады:

«Орал орман және жануарлар дүниесін қорғау жөніндегі» КММ орман зиянкестері туралы толық мағлұмат беру, сонымен қатар фитофагтарды зерттеу әдістері туралы ақпарат беру.

Әдістер мен материалдар.Зерттеулер орман энтомологиясында жалпы қабылданған әдістерді қолдана отырып, В.Ф. Палия және К.К. Фасулати әдістері бойынша егжей-тегжейлі зерттеу әдістерін қолдана отырып жүргізілді [16].

Барлауды қадағалаудың ең көп қолданылатын және тиімді әдісі зиянкестердің көбелектерін және жұмыртқа салуын бақылау болып табылады. Бұл әдіс зиянкестердің көбеюі мен ұшуын болжау үшін қажетті даму динамикасы, сапалық және сандық көрсеткіштер туралы мәліметтерді береді. Көбелектердің құрылымын, түсін, көлемін, жұмыртқалаудағы жұмыртқа санын анықтау сапалық көрсеткіштер болып табылады. Санақ алу кезінде аналық көбелектерді немесе олардың өліктерін жинап, көлемі бойынша сұрыптап, ірі және қара түсті көбелектердің пайыздық көрсеткішін жазады. Сыған көбелегінен орман екпелеріне қауіптілік деңгейін анықтау үшін 10 ағаштан сынақ алаңдары

төселіп, жұмыртқа салу саны белгіленеді. Барлау бақылауынан басқа, тәжірибеде белсенді қолданылатын сыған көбелегін бақылаудың басқа нұсқалары бар. Соның бірі зиянкестердің жұмыртқа салуын егжей-тегжейлі бақылау әдісі болып табылады, бұл әдісте өткен және ағымдағы жылдардағы жұмыртқалардың санын және ағымдағы жылдың әртүрлі экологиялық факторлардың зақымданбаған және жойылған жұмыртқаларының санын бөлек ескереді. Тұтас жұмыртқа массалары бөлек үлгі ретінде жиналады. Егер жиналған материалдың мөлшері көп болса, онда әрбір үлгіден 10 жұмыртқа ілінісу алынады: үш үлкен, үш кішкентай және төрт орташа. Әрі қарай, жұмыртқалаудағы жұмыртқалардың салмағы мен саны өлшеу немесе санау арқылы анықталады. Сыған көбелегі ілінісу салмағының амплитудасы 0,01-ден 1,00 г-ға дейін, жұмыртқа саны 10-нан 1500 данаға дейін, аналық қуыршақтардың салмағы 0,2-ден 3,4-ке дейін (3-кесте). Зерттелген материал негізінде ошақтардың фазалары бойынша деректер жинақталады және орташа мән анықталады.

Кесте 1 – Сыған көбелегі жұмыртқа салуын қадағалау нәтижелері

Ошақтардың кезеңі	Қуыршақтардың орташа салмағы, г.	Жұмыртқа іліністерінің орташа салмағы, г.	Жұмыртқа ұяларындаңы жұмыртқалар саны, дана.
1	0,80	0,50	500
2	1.0	0,60	750
3	0,60	0,30	300
4	0,35	0,10	150

Сыған көбелегінің ықтимал қаупін анықтау үшін үлгідегі өміршең жұмыртқаларға талдау жүргізіледі, содан кейін бір ағаштағы сау жұмыртқалардың орташа саны және оған қауіп төнетіні анықталады.

Егжей-тегжейлі қадағалау, стационарлық тексеру, ағаштағы барлық бұтақтарды ескере отырып, ұшарбастың әртүрлі деңгейлеріндегі үлгі ағаштарында таңдалған үш үлгілі бұтақтарды таңдау арқылы жүзеге асырылады. Әдетте, бақылау маусым айының ортасында қуыршақтарды санау арқылы немесе күзгі маусымда, жапырақтары түскеннен кейін жұмыртқа салу арқылы жүзеге асырылады. Қуыршақтарды бақылай отырып, үлгілі бұтақтарды зерделеу, барлық оралған жапырақтарды жинап, оларды жайып, олардан қуыршақтарды алуды қамтиды. Жиналған қуыршақтарды паразиттік және вирустық инвазияға, гемолимфалық талдауға, салмағын анықтауға және ағымдағы жылы екпелердің ықтимал зақымдануын есептеуге талдау жасалады. Жұмыртқа салуды бақылау кезінде ағымдағы жылдың өскіндері мен қалыңдығы 5 см-ден асатын бұтақтардың бөліктері кесіледі және кесілген бұтақтарда есепке алынбайды, өйткені оларда жұмыртқа салу аз мөлшерде немесе мүлдем жоқ, бірақ ағымдағы жылдың өскіндеріндегі бүршіктердің саны есептеледі. Үлгі ағашының бұтақтары бөліктерге бөлініп, ұзындығы өлшенеді. Олардың әрқайсысында бүршіктердің саны мен жұмыртқа массасы ескеріледі. Жұмыртқаларды санау кезінде санау қателерін болдырмас үшін және бір ілінісуді екі рет жазып алмас үшін ұсақтайды және олардың күйін зерттейді. Қыс мезгілінде қатты аяз болған жағдайда, жұмыртқалардың өміршеңдігі көктемде тексеріледі. Тірі жұмыртқа ілінісу әдетте жаншылған кезде жарылған дыбыс шығарады және олардан өмір сүруге жарамсыз жұмыртқалар үнсіз және аз мөлшерде сұйықтық болады; Тек өміршең жұмыртқалар есептеледі. Бақылаудың соңында үш модельдік бұтақтарда табылған тұтас жұмыртқалар саны, бүршіктері және бұтақ өлшемдері қорытындыланады. Ағаш екпелеріне төнетін ықтимал қауіпті есептеу тұтас жұмыртқа ілінісу санының дециметрмен өлшенген бұтақтардың ұзындығына немесе бұтақтардағы бүршіктер санына қатынасы негізінде жүзеге асырылады. Отырғызудың 100% жайылымы сау жұмыртқалардың саны

бұтақтардағы бүршіктердің санына немесе бұтақтардың ұзындығына тең болғанда орын алады.

Шілде айының басында қарағаштың аяққұйрықтысыны барлау бақылауы зақымдану, нәжіс және *жұлдызқұрт*ар бойынша жүргізіледі. Зиянкестер негізінен қоректенетін, қаңқа түзетін және жапырақтардың тамырларын қалдыратын қарағаштардың төменгі бұтақтарына және өркендерге назар аудару ұсынылады. Өсімдіктер 10% зақымданса да, бақылау зерттеулерін жүргізу қажет. Күзгі маусымда қыстайтын қуыршақтарды егжей-тегжейлі тексеру, салмағын талдау және есептеу, алдағы жылы жаппай көбею ошақтарын болжау, вирустық және бактериялық аурулардың таралуын талдау.

Жасыл жапырақ ширатқышытарды барлауды бақылау қуыршақтардың, құрттардың, жұмыртқа салудың және *бүркеме* бояудың кішкентай болуына байланысты қиын болып саналады, бұл оларды байқауды қиындатады. Бақылауды жүзеге асыру көп көңіл бөлуді және кем дегенде аз уақытты қажет етеді. Қадағалауды маусымның екінші онкүндігінде, екі ұрпақ арасындағы шекарада өткізу ұсынылады. Бұл кезде көбелектер жапырақтардың арасында қозғалмай отырады, бірақ олардың жасыл түсі оларды анықтауды қиындатады, әсіресе ауру басталғанда, олар зақымданатын құрттары шоғырланған ағаш ұшарбасында отырғанда. Оқшауланған ағаштарды, сирек және жақсы жіңішке екпелерді тексеру ұсынылады, онда емен жасыл жапырақ ширатқыштың көбеюінің алғашқы ошақтары ағаштың оңтайлы биіктігі мен төменгі бұтақтарынан табылуы мүмкін. Кешке аталықтардың ұшуы байқалады, құрттардан жасалған шоқтарға оралған зақымдалған жапырақтар да кездеседі, олардан қуыршақтардың терісі ілінеді. 2-кестеде келтірілген мәліметтерді пайдалана отырып, ошақтардың фазалары үшін кесте құрастырылған.

Кесте 2 – Жарқыл фазасының сипаттамалары

Таралу кезеңі	Орташа салмағы	Өнімділік	Ең аз салмақ	Ең төменгі өнімділік	Ең жоғарғы салмақ	Ең жоғарғы өнімділік
1	0,055	80	0,0018	10	0,7-0,8	100-120
2	0,060	85				
3	0,040	40				
4	0,025	15-20				

Қуыршақтарды байламның ішінде табады, содан кейін барлық табылған материалдар жиналады және жыныстық, паразиттердің және әртүрлі вирустық аурулардың таралуын анықтау және орташа есеппен бір ағашқа келетін аналық қуыршақтардың әртүрлі өлшемдерін өлшеу үшін зерттеу жүргізіледі. Сау еменнің жасыл жапырақ ширатқышы қуыршақтардың салмағының амплитудасы 0,0017-ден 0,8 граммға дейін, ал құнарлылығы 100-ден 120 жұмыртқаға дейін.

Зиянкестердің жазғы кезеңінде күшейтілген қыздыру шамдары бар жарық қақпақтары қолданылады, өйткені емен жапырағы шығыршықты шығарылатын жарықпен тартады. Бақылаудың перспективалы әдістеріне еркектерді тарту үшін феромондық тұзақтарды қолдану және жаппай көбеюдің ерте кезеңдерінде ультракүлгін сәулелерді қолдану жатады. Зиянкестердің жасырын өмір салтына байланысты пестицидтер мен әртүрлі химиялық заттарды қолдану қажетті нәтиже бермейді.

Нәтижелер және талқылау. Біздің байқау кезеңінде Орал қаласының жасыл аймағының екпелерінде 4 түрі ұсынылды: қарағаштың аяққұйрықтысы (Uropus ulmi Schiff), еменнің жасыл жапырақ ширатқышы (Tortrix viridana L), сыған көбелегі (Lymantria dispar), Қарағаш жапырақ жегіші (Xanthogaleruca luteola). Түрлік құрамы 3-кестеде көрсетілген. Зиянкестердің түрлік құрамы 3-кестеде келтірілген.

Кесте 3 – Зиянкестердің түрлік құрамы

Жәндіктердің түрі	Пайда болуы
Қарағаштың аяққұйрықтысы	+
Еменнің жасыл жапырақ ширатқышы	+
Сыған көбелегі	+
Қарағаштың жапырақ жегіші	+

Орман зиянкестері, мысалы, қарағай, жасыл емен жапырағы, сыған көбелегі және қарағай жапырағы қоңызы экожүйеге теріс әсер етуді жалғастыруда. Есепті жылдың басында осы зиянкестерден зардап шеккен жалпы аумақ: қарағаштың аяққұйрықтысы: 1701,1 га, еменнің жасыл жапырақ ширатқышы: 88,1 га, сыған көбелегі: 220,3 га, қарағаштың жапырақ жегіші: 277,3 га (кесте 4).

Кесте 4 - Орман зиянкестері ошақтарының болуы, га

Орман зиянкестері	Есепті жылдың басында жалпы ауданы	Қайтадан жанданды	Табиги факторлардың әсерінен жойылды	Күрес жылдың соңында барлық ошақтар және орман аурулары	Есепті жылдың соңында барлық ошақтар және орман аурулары	Одан күрес шараларын талап ететін ошақтар
Қарағаштың аяққұйрықтысы	1701,1	56,9	266,2	-	1491,8	1491,8
Еменнің жасыл жапырақ ширатқышы	88,1	2,5	46,3	-	44,4	44,4
Сыған көбелегі	220,3	17,3	68,7	-	368,1	368,1
Қарағаштың жапырақ жегіші	272,3	146,4	50,6	-	368,1	36,1
Барлығы					2073,2	2073,2

Есепті кезеңде келесі аудандарға әсер еткен жаңа зақымдану пайда болды: қарағаштың аяққұйрықтысы: 56,9 га, еменнің жасыл жапырақ ширатқышы: 2,5 га, сыған көбелегі: 17,3 га, қарағаштың жапырақ жегіші: 146,4 га. Есепті кезеңнің соңында орман ошақтарының жалпы ауданы өсіп, мыналарды құрады: қарағаштың аяққұйрықтысы: 1491,8 га, еменнің жасыл жапырақ ширатқышы : 44,4 га, сыған көбелегі: 168,9 га, қарағаштың жапырақ жегіші: 368,1 га. Бұл сандар орман экожүйелерін зиянкестердің одан әрі таралуынан қорғау үшін белсенді әрекеттердің қажеттілігін көрсетеді.

Қорытынды: Орман зиянкестерінің деректерін талдау, мысалы, қарағаштың аяққұйрықтысы, жасыл емен жапырағы, сыған көбелегі және қарағаштың жапырақ жегіші, бұл зиянкестер экожүйеге үздіксіз теріс әсерін көрсетеді. Есепті кезеңдегі зақымдану аймағының кейбір өзгерістеріне қарамастан, бақылауды қажет ететін жалпы аумақ айтарлықтай болып қала береді. Есепті жылдың басы мен аяғындағы деректерді салыстыру көрсеткендей, қарағаштың аяққұйрықтысының зардап шеккен ауданы азайғанымен, әлі де 1491,8 га құрайды, бұл мониторинг мен бақылауды жалғастыру қажеттілігін көрсетеді. Ұқсас тенденциялар басқа зиянкестерде де байқалады, мысалы, сыған көбелегі және қарағай жапырағы қоңызы, мұнда да белсенді араласу қажет.

Осылайша, осы зиянкестермен күресу шараларын, соның ішінде профилактикалық және емдік шараларды әзірлеу және енгізу ұсынылады. Тиімді басқару стратегиясы зиянкестердің зақымдануын азайтуға және орман экожүйелерінің денсаулығын қорғауға мүмкіндік береді, олардың болашақ қауіптерге төзімділігін қамтамасыз етеді.

ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

1. Кушлин А., Ван Веен Ч.С., Саттон У. Лесной сектор в переходный период: ресурсы, пользователи и устойчивое использование. Казахстан [Текст]. Техн. документ Всемирного Банка. Рабочий докл. для публ. обсуждения. – Астана, 2005. – 72 с.

2. Лесная энтомология: учебное пособие [Текст]/О.М. Касынкина/ Пенза: РИО ПГАУ, 2017. - 203 с.

3. Selikhovkin AV, Kozlov MV. Insect outbreaks in Northwest of Russia [Tekst] / Jandl R, Devall M, Khorshidi M, Schimpf E, Wolfrum G, Krishnapillay B// eds. Forests and Society: The Role of Research. Poster Abstracts. XXI IUFRO World Congress. 2000 August 7-12 Kuala Lumpur: 2000. - P. 393-394.

4. Байзаков С., Искаков С., Муканов Б., Токтасынов Ж., Сарсекова Д., Жорабекова Ж. Справочник лесничего Казахстана [Текст] Астана, 2010. – 288 с.

5. Дубровин В.В., Теняева О.Л., Крицкая В.П. Методы фитосанитарного мониторинга в защите растений от вредных насекомых [Текст]. Саратов, 2011. - С. 232.

6. Тузов В.К. Методы мониторинга вредителей и болезней леса [Текст]. Москва, 2004. – С. 200.

7. Белицкая М. Экологически адаптивные приемы регулирования численности вредителей в экосистемах трансформированных при лесомелиорации [Текст] / Всемирный экологический журнал. – 2018.- С. 10-15.

8. Белицкая М., Дендрофаги Ulmus spp. в лесных насаждениях Поволжья [Текст]/ Всемирный экологический журнал. – 2019. – С. 35-41.

9. Непарный шелкопряд (lymantria dispar l., linnaeus, 1758): мониторинг, прогнозирование, контроль численности [Текст] / Кобзарь В.Ф., Надыкта В.Д., Кобзарь М.И., Данилов Р.Ю.// Труды Кубанского государственного аграрного университета. - 2012. - № 35. - С. 128-132.

10. Торутанов П.С. Насекомые-вредители леса и методы борьбы с ними [Текст] / П.С. Торутанов //Устойчивое развитие науки и образования. - 2020. - № 4 (43). - С. 189-192.

11. Применение феромонов важнейших вредителей леса для лесопатологического мониторинга. часть 2. вредители семейств чешуекрылых и перепончатокрылых [Текст] /Вендило Н.В., Плетнев В.А., Лебедева К.В.// Агрохимия. -2010. - № 4. - С. 69-79.

12. Селиховкин А.В. Современная лесная энтомология: направления исследований, проблемы и перспективы [Текст]/ А.В. Селиховкин. Е.А Бондаренко, Б.Г. Поповичев //Энтомологическое обозрение. - 2010. - Т. 89. - № 1. - С. 62-84.

13. Selikhovkin A.V. Can outbreaks of mass reproduction of dendrophagous insects have a significant impact on the state of the biosphere? [Text]/ A.V. Selikhovkin// Biosphere. - 2009. - No. 1 (1). - P. 72-81.

14. Лесная энциклопедия: в 2-х т. [Текст] /Гл.ред. Воробьев Г.И.; Ред.кол.: Анучин Н.А., Атрохин В.Г., Виноградов В.Н. и др. - М.: Сов. энциклопедия, 1985. - 563 с.

15. Селиховкин А. Лесные пожары, вредители и болезни леса: проблемы и решения/ А. Селиховкин., А Смирнов [Текст] / Биосфера. - 2015. - №3. - С. 315-320.

16. Палий В.Ф. Методика фенологических и фаунистических исследований насекомых. – Фрунзе, 1966. – С. 160.

REFERENCES

1. Kushlin A., Van Veen CH.S., Satton U. Lesnoj sektor v perekhodnyj period: resursy, pol'zovateli i ustojchivoe ispol'zovanie. Kazahstan [Tekst]. Tekhn. dokument Vsemirnogo Banka. Rabochij dokl. dlya publ. obsuzhdeniya. – Astana, 2005. – 72 s.

2. Lesnaya entomologiya: uchebnoe posobie [Tekst]/O.M. Kasynkina/ Penza: RIO PGAU, 2017. - 203 s.

3. Selikhovkin AV, Kozlov MV. Insect outbreaks in Northwest of Russia [Tekst] / Jandl R, Devall M, Khorshidi M, Schimpf E, Wolfrum G, Krishnapillay B// eds. Forests and Society: The Role of Research. Poster Abstracts. XXI IUFRO World Congress. 2000 August 7-12 Kuala Lumpur: 2000. - P. 393-394.

4. Bajzakov S., Iskakov S., Mukanov B., Toktasynov ZH., Sarsekova D., ZHorabekova ZH. Spravochnik lesnichego Kazahstana [Tekst] Astana, 2010. – 288 s.

5. Dubrovin V.V., Tenyaeva O.L., Krickaya V.P. Metody fitosanitarnogo monitoringa v zashchite rastenij ot vrednyh nasekomyh [Tekst]. Saratov, 2011. - S. 232.

6. Tuzov V.K. Metody monitoringa vreditelej i boleznej lesa [Tekst]. Moskva, 2004. – S. 200.

7. Belickaya M. Ekologicheski adaptivnye priemy regulirovaniya chislennosti vreditelej v ekosistemah transformirovannyh pri lesomelioracii [Tekst] / Vsemirnyj ekologicheskij zhurnal. – 2018.- S. 10-15.

8. Belickaya M., Dendrofagi Ulmus spp. v lesnyh nasazhdeniyah Povolzh'ya [Tekst]/ Vsemirnyj ekologicheskij zhurnal. – 2019. – S. 35-41.

9. Neparnyj shelkopryad (lymantria dispar l., linnaeus, 1758): monitoring, prognozirovanie, kontrol' chislennosti [Tekst] / Kobzar' V.F., Nadykta V.D., Kobzar' M.I., Danilov R.YU.// Trudy Kubanskogo gosudarstvennogo agrarnogo universiteta. - 2012. - № 35. - S. 128-132.

10. Torutanov P.S. Nasekomye-vrediteli lesa i metody bor'by s nimi [Tekst] / P.S. Torutanov //Ustojchivoe razvitie nauki i obrazovaniya. - 2020. - № 4 (43). - S. 189-192.

11. Primenenie feromonov vazhnejshih vreditelej lesa dlya lesopatologicheskogo monitoringa. chast' 2. vrediteli semejstv cheshuekrylyh i pereponchatokrylyh [Tekst] /Vendilo N.V., Pletnev V.A., Lebedeva K.V.// Agrohimiya. -2010. - № 4. - S. 69-79.

12. Selihovkin A.V. Sovremennaya lesnaya entomologiya: napravleniya issledovanij, problemy i perspektivy [Tekst]/ A.V. Selihovkin. E.A Bondarenko, B.G. Popovichev //Entomologicheskoe obozrenie. - 2010. - T. 89. - № 1. - S. 62-84.

13. Selikhovkin A.V. Can outbreaks of mass reproduction of dendrophagous insects have a significant impact on the state of the biosphere? [Text]/ A.V. Selikhovkin// Biosphere. - 2009. - No. 1 (1). - P. 72-81.

14. Lesnaya enciklopediya: v 2-h t. [Tekst] /Gl.red. Vorob'ev G.I.; Red.kol.: Anuchin N.A., Atrohin V.G., Vinogradov V.N. i dr. - M.: Sov. enciklopediya, 1985. - 563 s.

15. Selihovkin A. Lesnye pozhary, vrediteli i bolezni lesa: problemy i resheniya/ A. Selihovkin., A Smirnov [Tekst] / Biosfera. - 2015. - №3. - S. 315-320.

16. Palij V.F. Metodika fenologicheskih i faunisticheskih issledovanij nasekomyh. – Frunze, 1966. – S. 160.

РЕЗЮМЕ

Вредители и болезни леса представляют собой вредоносные организмы, способные к массовому размножению и быстрому распространению на обширные территории, что приводит к ущербу, превышающему экологический порог вредоносности.

Объектами нашего исследования являются особо опасные вредители, перечисленные в постановлении Правительства Республики Казахстан от 20 июля 2012 года. На территории Государственного лесного фонда Западно-Казахстанской области к ним относятся ильмовый ногохвост, дубовая зелёная листовертка, непарный шелкопряд и ильмовый листоед, которые наносят ущерб ассимиляционным частям растений.

В статье представлены статистические данные о очагах вредителей лесных насаждений.

Для борьбы с наиболее распространёнными и опасными вредителями в лесу отбираются не менее трёх испытательных площадок площадью 10 гектаров и более. На этих участках должны быть сходные посадки. Мониторинг выбранных территорий осуществляется два раза в год при обнаружении характерных признаков появления очагов вредителей на древесных побегах. Исследуемые территории обследуются по маршрутам общей протяжённостью 1,5-2 км.

При выявлении участков с наибольшим количеством вредителей специалисты лесного хозяйства и лесопатологи проводят детальное изучение насаждений, измеряют зону очага и ведут контрольный учёт численности. Данные, полученные в ходе

разведывательного контроля, обрабатываются и используются для планирования дальнейшего мониторинга и контроля за состоянием лесных насаждений.

УДК 633.2.03:574.472
МРНТИ 34.35.25, 34.35.15

Стыбаев Г.Ж., кандидат сельскохозяйственных наук, профессор, https://orcid.org/0000-0002-6264-4042
НАО "Казахский агротехнический исследовательский университет им.С.Сейфуллина", г. Астана, пр. Жеңіс, 010000, Казахстан, gast-75@mail.ru
Ногаев А.А., доктор философии (PhD), ассоциированный профессор, https://orcid.org/0000-0002-8826-817X
НАО "Казахский агротехнический исследовательский университет им.С.Сейфуллина", г. Астана, пр. Жеңіс, 010000, Казахстан, adilbek_nogaev@mail.ru.
Байтеленова А.А., к.с-х.н., ассоциированный профессор, https://orcid.org/0000-0003-0774-4750
НАО "Казахский агротехнический исследовательский университет им. С.Сейфуллина", г. Астана, пр. Жеңіс, 010000, Казахстан, baitelenova_alya@mail.ru **Ахылбекова Б.А.,** доктор философии (PhD), https://orcid.org/0000-0002-4671-8232
НАО "Казахский агротехнический исследовательский университет им. С.Сейфуллина", г. Астана, пр. Жеңіс, 010000, Казахстан, ahilbekova@mail.ru
Калаубай Д.Д., магистрант, https://orcid.org/0009-0008-5197-176X
НАО "Казахский агротехнический исследовательский университет им. С.Сейфуллина", г. Астана, пр. Жеңіс, 010000, Казахстан, dan.astana19@gmail.com
Максутов Е.Ж., магистрант, https://orcid.org/0009-0002-8136-4369
НАО "Казахский агротехнический исследовательский университет им. С.Сейфуллина", г. Астана, пр. Жеңіс, 010000, Казахстан, elkhan.maksutov.02@mail.ru

Stybayev G.Zh., Candidate of Agricultural Sciences, Professor, https://orcid.org/0000-0002-6264-4042
NJSC "Kazakh Agrotechnical Research University named after S.Seifullin", Astana, Zhenis Ave., 010000, Kazakhstan, gast-75@mail.ru
Nogayev A.A., Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor, https://orcid.org/0000-0002-8826-817X
NJSC "Kazakh Agrotechnical Research University named after S.Seifullin", Astana, Zhenis Ave., 010000, Kazakhstan, adilbek_nogaev@mail.ru.
Baitelenova A.A., Candidate of Agricultural Sciences**,** Associate Professor, https://orcid.org/0000-0003-0774-4750
NJSC "Kazakh Agrotechnical Research University named after S.Seifullin", Astana, Zhenis Ave., 010000, Kazakhstan, baitelenova_alya@mail.ru.
Ahylbekova B.A., Doctor of Philosophy (PhD), https://orcid.org/0000-0002-8826-817X
NJSC "Kazakh Agrotechnical Research University named after S.Seifullin", Astana, Zhenis Ave., 010000, Kazakhstan, ahilbekova@mail.ru
Kalaubay D.D., master's student, https://orcid.org/0009-0008-5197-176X
NJSC "Kazakh Agrotechnical Research University named after S.Seifullin", Astana, Zhenis Ave., 010000, Kazakhstan, dan.astana19@gmail.com
Maksutov E.Zh., master's student, https://orcid.org/0009-0002-8136-4369, NJSC "Kazakh Agrotechnical Research University named after S.Seifullin", Astana, Zhenis Ave., 010000, Kazakhstan, elkhan.maksutov.02@mail.ru

ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРНОГО РЕЖИМА И ОСАДКОВ НА УРОЖАЙНОСТЬ И ВЫСОТУ ТРАВОСТОЯ В УСЛОВИЯХ ИНТЕНСИВНОГО И РОТАЦИОННОГО ПАСТБИЩЕОБОРОТА

INFLUENCE OF TEMPERATURE AND PRECIPITATION ON YIELD AND GRASS HEIGHT UNDER INTENSIVE AND ROTATIONAL GRAZING SYSTEMS

АННОТАЦИЯ

Статья посвящена анализу влияния температурного режима и количества выпавших осадков на рост травостоя и урожайность зеленой массы в условиях интенсивного и ротационного использования пастбищ. Исследование проводилось в течение 2023–2024 гг. и охватывало три основных вегетационных периода: весенний, летний и осенний. Полученные данные свидетельствуют о значительном влиянии погодных условий на показатели продуктивности пастбищ. Установлено, что повышение среднесуточной температуры в марте-апреле способствовало раннему началу вегетации, а нестабильность осадков летом оказывала неоднозначное влияние на рост трав. Максимальная урожайность и высота травостоя были зафиксированы на пастбищах с ротационным типом выпаса, что демонстрирует преимущество данной системы в сравнении с интенсивной системой пастбищеоборота. Особенно ярко преимущества ротационного выпаса проявились в осенний период благодаря оптимальному соотношению тепла и влаги в августе и сентябре. В статье даны подробные сравнительные характеристики высоты травостоя и урожайности зеленой массы для каждого исследуемого сезона и обоснована высокая эффективность ротационной технологии пастбищного хозяйства в условиях климатических изменений.

ANNOTATION

The article presents an analysis of the impact of temperature and precipitation on grass height and green mass yield under intensive and rotational grazing systems. The study was conducted over the period of 2023–2024 and covered three key vegetation seasons: spring, summer, and autumn. The collected data clearly demonstrate the significant influence of weather conditions on pasture productivity indicators. It was found that an increase in average daily temperatures in March and April contributed to an earlier start of vegetation, while unstable summer precipitation had a mixed effect on grass growth. The highest yields and grass height were recorded on rotational grazing plots, highlighting the advantages of this system compared to intensive continuous grazing. These benefits were particularly evident in the autumn period due to the favorable combination of warmth and moisture in August and September. The study provides a detailed comparative assessment of grass height and green mass yield for each season and substantiates the high efficiency of rotational grazing technologies in the context of ongoing climate variability.

Ключевые слова: *ротационный выпас, травостой, урожайность, климат, осадки, температура воздуха*

Key words: *rotational grazing, grass stand, yield, climate, precipitation, air temperature*

Введение. Пастбищное животноводство играет ключевую роль в обеспечении продовольственной безопасности и поддержании сельских экономик во всем мире. Однако изменение климатических условий, выражающееся в колебаниях температуры и режима осадков, оказывает значительное влияние на продуктивность пастбищных угодий. Понимание этих воздействий необходимо для разработки устойчивых методов управления пастбищами, способствующих адаптации к изменяющемуся климату и смягчению его последствий [1].

Существует два основных подхода к управлению выпасом скота: непрерывный и ротационный выпас. При непрерывном выпасе скот пасется на одном и том же участке земли в течение продолжительного времени, что может привести к деградации почвы, снижению биоразнообразия и уменьшению продуктивности пастбищ [2]**.** В отличие от

этого, ротационный выпас предполагает перемещение животных между несколькими участками, позволяя растительности восстанавливаться в периоды отдыха. Этот метод способствует улучшению структуры почвы, увеличению содержания органического вещества и повышению углеродного накопления [3].

Исследования показывают, что ротационный выпас может повысить продуктивность пастбищ и устойчивость к климатическим изменениям. Например, в исследовании, проведенном в прериях с высокотравной растительностью, было установлено, что ротационный выпас способствует равномерному распределению нагрузки на растительный покров и повышает общую продуктивность по сравнению с непрерывным выпасом [4]. Другое исследование в альпийском регионе показало, что ротационное управление пастбищами улучшает биомассу растений, снижает уплотнение почвы и уменьшает выбросы парниковых газов, что способствует смягчению последствий изменения климата.

Однако влияние погодных условий, таких как температура воздуха и количество осадков, на рост травостоя и урожайность зеленой массы в условиях различных систем выпаса остается недостаточно изученным. Некоторые исследования указывают на то, что повышенная температура и измененные режимы осадков могут негативно сказываться на качестве и количестве кормов, доступных для скота [5]. Другие работы подчеркивают, что адаптивное управление выпасом, учитывающее климатические условия, может повысить устойчивость пастбищных экосистем и продуктивность животноводства

В связи с вышеизложенным, целью данного исследования является детальный анализ влияния среднесуточной температуры воздуха и количества выпавших осадков на высоту травостоя и урожайность зеленой массы в условиях интенсивного и ротационного выпаса скота. Понимание этих взаимосвязей позволит разработать рекомендации по оптимизации систем выпаса для повышения устойчивости и продуктивности пастбищ в условиях изменяющегося климата.

Материалы и методы исследования. Исследование проводилось на пастбищных участках ТОО «Запорожье-Агро» расположенного в Жаксынском районе Акмолинской области**.** Почвы региона представлены преимущественно каштановыми и черноземными типами, которые при правильном использовании могут обеспечивать высокую продуктивность пастбищ**.** Для данной местности характерны засушливое лето, холодная зима и ограниченное количество осадков (в среднем 250–300 мм в год).

С 2023 года проводились геоботанические обследования с применением наземных и дистанционных методов изучения кормовых угодий [6, 7, 8]. Исследования проводились на пастбищных контурах (полях) ТОО «Запорожье-Агро», в точках GPS: Поле 1. Координаты: 51°39′09.53″ N 67°27′51.35″ E; Поле 2. Координаты: 51°37′28.28″ N 67°28′16.76″ E; Поле 3. Координаты: 51°37′34.05″ N 67°28′00.01″ E; Поле 4. Координаты: 51°37′26.84″ N 67°27′50.52″ E; Поле 5. Координаты: 51°37′32.55″ N 67°27′14.92″ E;

Продуктивность определяли укосным методом в 4-х кратной повторности. Значения продуктивности надземной массы фитоценозов и расчеты допустимой пастбищной нагрузки приводили по данным 2023-2024 гг. Геоботаническое обследование проводили в соответствии с общепринятыми методами [9,10,11]. Названия почв приведены по классификации почв РК [12], латинское название видов растений, роды по альбомам и методикам [13,14,15].

Результаты. Климатические условия 2023–2024 гг. оказывали выраженное влияние на рост травостоя и урожайность зеленой массы. В весенние месяцы 2024 года среднесуточная температура воздуха была выше средних многолетних значений, особенно в апреле (+2,7 °C) и марте (+2 °C), что способствовало ускоренному началу вегетации. В мае 2024 года наблюдалось похолодание (-0,8 °C от нормы), что могло замедлить рост в этот период (таблица 1).

Таблица 1 - Среднесуточная температура воздуха в среднем за 2023-2024 гг. в сравнении с СМЗСТ, ºС

Показатели	Месяцы									
	Янв.	Февр.	Март	Апр.	Май	Июнь	Июль	Август	Сент.	Окт.
2023	-14,0	-13,9	-4,0	5,1	15,1	19,4	23,2	18,6	12,1	5,2
2024	-15,3	-15,6	-8,0	7,7	10,2	19,9	19,7	16,5	11,1	4,5
в среднем за 2023-2024 гг.	-14,6	-14,7	-6	6,4	12,7	19,7	21,5	17,6	11,6	4,9
СМЗСТ	-15,7	-15,2	-8,0	3,7	13,5	19,6	21	18,9	12,1	4,2
-,+ от СМЗСТ	-1,3	-0,5	-2	+2,7	-0,7	+0,1	+0,5	-1,5	-0,5	+0,7

Осадки, выпавшие в августе 2024 года (100,1 мм), существенно превысили среднюю норму (28,0 мм), что благоприятно сказалось на травостоях осенью (таблица 2). В сентябре также было зафиксировано превышение нормы (+17,6 мм), что продлило вегетационный период. Эти наблюдения соответствуют выводам исследований, согласно которым повышенные осадки в конце лета способствуют формированию высокой осенней урожайности травостоя [16].

Таблица 2 - Количество выпавших осадков в среднем за 2023-2024 гг. в сравнении с СМКО, мм

Показатели	Месяцы									
	Янв.	Февр.	Март	Апр.	Май	Июнь	Июль	Август	Сент.	Окт.
2023	13,8	12,1	5,6	15,9	8,7	11,3	27,6	69,3	73,5	30,5
2024	18,3	13,3	10,0	25,4	62,8	36,3	40,2	100,1	7,6	10,1
в среднем за 2023-2024 гг.	16,1	12,7	7,8	20,7	35,8	23,8	33,9	84,7	40,6	20,3
СМКО	13,0	12,0	14,0	20,0	28,0	27,0	40,0	28,0	23,0	20,0
-,+ от СМКО	+3,1	+0,7	-6,2	+0,7	+7,8	-3,2	-6,1	+56,7	+17,6	+0,3

Ротационные пастбища весной 2024 года показали значительное преимущество над контролем: средняя высота травостоя была на **6,5 см выше**, а урожайность — почти в 2 раза выше. Это подтверждает эффективность ротационного выпаса в восстановлении и активизации роста трав после зимы, особенно в условиях ранней весенней вегетации.

Сходные результаты были получены во многих исследованиях, где ротационный выпас позволил увеличить весеннюю продуктивность на 40–60% по сравнению с непрерывным выпасом.

Несмотря на пониженную влажность в июне и июле, ротационные пастбища обеспечили более высокий прирост биомассы. Особенно выделилось поле №3, где урожайность составила 21,6 ц/га — на 150% выше, чем в контроле. Это связано с улучшенным почвенным влагозапасом благодаря периодам отдыха и равномерной нагрузке (рисунок 2).




Рисунок 2 – Высота травостоя и урожайность в летний период в среднем за 2023-2024 гг.

Подобные данные получены в исследованиях, где отмечено, что адаптивное управление выпасом снижает стресс трав в засушливые периоды [17].

Благодаря аномально высоким осадкам в августе, ротационные пастбища показали рекордную урожайность осенью. Поле №3, как и ранее, показало наилучший результат — 38,5 см высота и 20,0 ц/га урожайности, что в 2,5 раза выше, чем в контроле. Эти показатели иллюстрируют, насколько критично значение ротации именно к концу сезона, когда травостой восстанавливается после летней нагрузки.

Во многих работах отмечается, что ротационные системы позволяют максимально использовать осенние ресурсы в условиях климатических колебаний.

При определении корреляционной зависимости было выявлено, что у температуры воздуха, количества осадков и урожайности есть очень сильная положительная корреляция (r = 0.90 и 0,97), так как в данных исследованиях повышение температуры весной и летом способствовало активному накоплению зеленой массы. Осадки являются ключевым фактором урожайности, особенно в летне-осенний период.

Умеренно выраженная отрицательная связь (r = –0.81) выявлена у температуры воздуха и высоты травостоя, что может быть связано с угнетением роста при высоких температурах в засушливый период. Также при сравнении количества осадков и высоты травостоя показана отрицательная корреляция (r = –0.67), вероятно обусловленная тем, что максимальные осадки совпали с периодом завершения вегетации (осень), когда рост уже замедляется (рисунок 4).




Рисунок 4 – Тепловая карта корреляционной зависимости высоты травостоя и урожайности от метеорологических условий

Эти результаты соответствуют глобальным исследованиям в Канаде, США и Европе, где ротационные системы признаны устойчивыми в условиях климатических рисков (Springer, 2022, Cambridge, 2021).

Заключение. Проведённое исследование позволило выявить закономерности влияния агроклиматических условий на продуктивность пастбищных угодий при различных режимах выпаса скота в условиях 2023–2024 гг. **Р**отационный режим выпаса роказал свою эффективность в условиях изменяющегося климата, обеспечивая в 2–2,5 раза более высокую продуктивность в условиях резкого изменения метеорологических условий по сравнению с интенсивным выпасом. Эти данные подтверждают необходимость широкого внедрения ротационной системы в практику пастбищного животноводства, особенно в регионах с континентальным климатом и неустойчивыми погодными условиями.

Благодарность. Научные исследования проведены в рамках научно-технической программы BR21881871 «Разработка технологий и приемов заготовки кормов в кормовых угодьях Казахстана в контексте устойчивого управления» по мероприятию «Разработка технологии использования ротационных пастбищ на севере Казахстана».

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Ping, G., Jianguo, X., Yaqian, R., Yulin, L., Dongxu, L., Peng, H., Ang, L., Jianhui, H. Intensive rotational grazing has positive effects on productivity of rangeland // Agriculture, Ecosystems & Environment. – 2025. – Vol.384,– DOI: https://doi.org/10.1016/j.agee.2025.109558

2. Baronti, S., Ungaro, F., Maienza, A. Rotational pasture management to increase the sustainability of mountain livestock farms in the Alpine region // Reg Environ Change . – 2022. – Vol. 22, № 50. – DOI: https://doi.org/10.1007/s10113-022-01896-1

3. Hulvey, K. B., Mellon, C. D., & Kleinhesselink, A. R. Rotational grazing can mitigate ecosystem service trade-offs between livestock production and water quality in semi-arid rangelands // Journal of Applied Ecology – 2025. – Vol. 58, - P. 2113–2123. – DOI: https://doi.org/10.1111/1365-2664.13954

4. Hou F. J., Huang X. J., Chang S. H., Yang H., Yang F. L., Liang H. H., Nogayev Adilbek, Sere Nurlan. Concepts and approaches of grassland improvement // Acta Ecologica Sinica. – 2024. – Vol. 44, № 19. – P. 8897–8913. – DOI: 10.20103/j.stxb.202402050313.

5. Mipam M., Huang J., Tian L., Huang D., Li X. Productive response of alpine meadows to yak grazing on the Qinghai-Tibetan Plateau // Frontiers in Plant Science. – 2019. – Vol. 10. – P. 925. – DOI: 10.3389/fpls.2019.00925.

6. Конюшков Н. С., Работнова Т. А., Цаценкина И. А. Методика опытных работ на сенокосах и пастбищах. – М.: Сельхозгиз, 1961. – 287 с.

7. Akhylbekova B. A., Nogayev A. A., Baytelenova A. A., Serekpayev N. A. Rational use of pastures using remote sensing on the lands of Northern Kazakhstan // V. International Agricultural, Biological & Life Science Conference, Turkey, Edirne. – 2023. – P. 489. – ISBN 978-605-73041-4-8.

8. Серекпаев Н. А., Стыбаев Г. Ж., Ногаев А. А., Байтеленова А. А., Ахылбекова Б. А. Сравнительная оценка наземных и спутниковых учетов и наблюдений продуктивности пастбищ степной зоны при организации загонного выпаса скота // Қорқыт ата атындағы Қызылорда университетінің хабаршысы. Ауыл шаруашылығы ғылымдары. – 2023. – № 2 (65). – С. 62–72.

9. Общесоюзная инструкция по проведению геоботанического обследования природных кормовых угодий и составлению крупномасштабных геоботанических карт. – М.: Колос, 1984. – 105 с.

10. Методика по проведению крупномасштабных (1:1 000 – 1:100 000) геоботанических изысканий природных кормовых угодий Республики Казахстан [Электронный ресурс]: Утверждена приказом Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 3 октября 2022 года № 314. – URL: https://adilet.zan.kz/rus/docs/V2200030043 (дата обращения: 26.08.2024).

11. Measuring Plant Cover [Электронный ресурс]. – URL: https://www.webpages.uidaho.edu/range357/notes/cover.pdf (дата обращения: 26.08.2024).

12. Дурасов А. М., Тазабеков Т. Т. Почвы Казахстана: коллективная монография. – Алма-Ата: Кайнар, 1981. – 152 с.

13. Бекмухамедов Э. Л., Тореханов А. А. Кормовые растения Казахстана. – Алматы: Бастау, 2005. – 304 с. – ISBN 9965-413-64-9.

14. Дмитриева С. И., Игловиков В. Г., Конюшков Н. С. и др. Растения сенокосов и пастбищ. – М.: Колос, 1974. – 195 с.

15. Фисюнов А. В. Сорные растения. – М.: Колос, 1984.

16. Zhang, M., Delgado-Baquerizo, M., Li, G. et al. Experimental impacts of grazing on grassland biodiversity and function are explained by aridity // Nature Communications. – 2023. – Vol. 14. – P. 5040. – DOI: 10.1038/s41467-023-40809-6.

17. Stybayev, G., Zargar, M., Nasiyev, B., Baitelenova, A., Nogayev, A. Rotational Pasture Management for Ameliorating Productivity and Feed Value of Vegetation, Soil Quality, and Sustainability in Dry Steppe Zone // OnLine Journal of Biological Sciences. – 2025. – Vol. 25, № 1. – P. 209–218. – DOI: 10.3844/ojbsci.2025.209.218.

REFERENCES

1. Ping, G., Jianguo, X., Yaqian, R., Yulin, L., Dongxu, L., Peng, H., Ang, L., Jianhui, H. Intensive rotational grazing has positive effects on productivity of rangeland // Agriculture, Ecosystems & Environment. – 2025. – Vol.384,– DOI: https://doi.org/10.1016/j.agee.2025.109558

2. Baronti, S., Ungaro, F., Maienza, A. Rotational pasture management to increase the sustainability of mountain livestock farms in the Alpine region // Reg Environ Change . – 2022. – Vol. 22, № 50. – DOI: https://doi.org/10.1007/s10113-022-01896-1

3. Hulvey, K. B., Mellon, C. D., & Kleinhesselink, A. R. Rotational grazing can mitigate ecosystem service trade-offs between livestock production and water quality in semi-arid rangelands // Journal of Applied Ecology – 2025. – Vol. 58, - P. 2113–2123. – DOI: https://doi.org/10.1111/1365-2664.13954

4. Hou F. J., Huang X. J., Chang S. H., Yang H., Yang F. L., Liang H. H., Nogayev Adilbek, Sere Nurlan. Concepts and approaches of grassland improvement // Acta Ecologica Sinica. – 2024. – Vol. 44, No. 19. – P. 8897–8913. – DOI: 10.20103/j.stxb.202402050313.

5. Mipam M., Huang J., Tian L., Huang D., Li X. Productive response of alpine meadows to yak grazing on the Qinghai-Tibetan Plateau // Frontiers in Plant Science. – 2019. – Vol. 10. – P. 925. – DOI: 10.3389/fpls.2019.00925.

6. Konyushkov N. S., Rabotnova T. A., Tsatsenkina I. A. Metodika opytnykh rabot na senokosakh i pastbishchakh [Methodology of experimental work on hayfields and pastures]. – Moscow: Selkhozgiz, 1961. – 287 p. (in Russian)

7. Akhylbekova B. A., Nogayev A. A., Baytelenova A. A., Serekpayev N. A. Rational use of pastures using remote sensing on the lands of Northern Kazakhstan // V. International Agricultural, Biological & Life Science Conference, Turkey, Edirne. – 2023. – P. 489. – ISBN 978-605-73041-4-8.

8. Serekpayev N. A., Stybayev G. Zh., Nogaev A. A., Baytelenova A. A., Akhylbekova B. A. Sravnitelnaya otsenka nazemnykh i sputnikovykh uchetov i nablyudenii produktivnosti pastbishch stepnoi zony pri organizatsii zagonnogo vypasa skota [Comparative assessment of ground and satellite surveys of pasture productivity in the steppe zone during organized rotational grazing] // Korkyt Ata atyndagy Kyzylorda Universitetinin Habarshysy. Aul Sharuashylygy Gylymdary. – 2023. – No. 2 (65). – P. 62–72. (in Russian)

9. Obshchesoyuznaya instruktsiya po provedeniyu geobotanicheskogo obsledovaniya prirodnykh kormovykh ugodii i sostavleniyu krupnomasshtabnykh geobotanicheskikh kart [All-Union instructions for geobotanical survey of natural forage lands and compilation of large-scale geobotanical maps]. – Moscow: Kolos, 1984. – 105 p. (in Russian)

10. Metodika po provedeniyu krupnomasshtabnykh (1:1 000 – 1:100 000) geobotanicheskikh izyskanii prirodnykh kormovykh ugodii Respubliki Kazakhstan [Methodology for large-scale geobotanical surveys of natural forage lands in the Republic of Kazakhstan] [Electronic resource]: Approved by Order No. 314 of the Minister of Agriculture of the Republic of Kazakhstan, October 3, 2022. – URL: https://adilet.zan.kz/rus/docs/V2200030043 (accessed: 26.08.2024). (in Russian)

11. Measuring Plant Cover [Electronic resource]. – URL: https://www.webpages.uidaho.edu/range357/notes/cover.pdf (accessed: 26.08.2024).

12. Durasov A. M., Tazabekov T. T. Pochvy Kazakhstana: kollektivnaya monografiya [Soils of Kazakhstan: collective monograph]. – Alma-Ata: Kainar, 1981. – 152 p. (in Russian)

13. Bekmukhamedov E. L., Torekhanov A. A. Kormovye rasteniya Kazakhstana [Forage plants of Kazakhstan]. – Almaty: Bastau, 2005. – 304 p. – ISBN 9965-413-64-9. (in Russian)

14. Dmitrieva S. I., Iglovikov V. G., Konyushkov N. S. et al. Rasteniya senokosov i pastbishch [Plants of hayfields and pastures]. – Moscow: Kolos, 1974. – 195 p. (in Russian)

15. Fisyunov A. V. Sornye rasteniya [Weeds]. – Moscow: Kolos, 1984. (in Russian)

16. Zhang, M., Delgado-Baquerizo, M., Li, G. et al. Experimental impacts of grazing on grassland biodiversity and function are explained by aridity // Nature Communications. – 2023. – Vol. 14. – P. 5040. – DOI: 10.1038/s41467-023-40809-6.

17. Stybayev, G., Zargar, M., Nasiyev, B., Baitelenova, A., Nogayev, A. Rotational Pasture Management for Ameliorating Productivity and Feed Value of Vegetation, Soil Quality, and Sustainability in Dry Steppe Zone // OnLine Journal of Biological Sciences. – 2025. – Vol. 25, No. 1. – P. 209–218. – DOI: 10.3844/ojbsci.2025.209.218.

ТҮЙІН

Мақалада жайылымдарды қарқынды және ротациялық пайдалану жағдайларында ауа температурасы мен жауын-шашын мөлшерінің шөпотының биіктігі мен жасыл масса өнімділігіне әсері талданған. Зерттеу 2023–2024 жылдар аралығында жүргізіліп, үш негізгі кезеңін – көктемгі, жазғы және күзгі маусымдарды қамтыды. Алынған деректер жайылым өнімділігіне ауа райы жағдайларының айтарлықтай әсерін көрсетеді. Наурыз–сәуір

айларында тәуліктік орташа температураның жоғарылауы өсімдіктердің ерте өсуіне ықпал еткені анықталды, ал жаз мезгіліндегі жауын-шашынның тұрақсыздығы жайылым өсімдіктерінің өсуіне әртүрлі әсер етті. Ең жоғары өнім мен өсімдік биіктігі ротациялық жайылымдарда тіркелді, бұл аталған жүйенің жайылымдарды қарқынды пайдалануға қарағанда артықшылығын көрсетеді. Әсіресе, тамыз және қыркүйек айларындағы жылу мен ылғалдың оңтайлы үйлесімі нәтижесінде күзгі маусымда ротациялық жүйенің тиімділігі ерекше байқалды. Мақалада әр маусым бойынша өсімдіктер биіктігі мен жасыл масса өнімділігінің салыстырмалы сипаттамалары беріліп, климаттың өзгеруі жағдайында ротациялық жайылым технологиясының жоғары тиімділігі негізделген.

УДК 633.2.039
МРНТИ 68.35.47

Нокушева Ж.А., кандидат сельскохозяйственных наук, https://orcid.org/0000-0002-0056-0741
ТОО «Северо-Казахстанский научно-исследовательский институт сельского хозяйства», 150700, Северо-Казахстанская область, Кызылжарский район, с.Бесколь, ул. Институтская, 1, Nokusheva74@mail.ru
Кантарбаева Э.Е., доктор PhD, https://orcid.org/0000-0002-4499-6706
«Северо-Казахстанский университет им.М.Козыбаева», г. Петропавловск, ул. Пушкина, 86, 150000, Республика Казахстан, eekantarbaeva.nkzu.kz
Кудабаева А.М., магистр, https://orcid.org/0000-0003-3279-5234
ТОО «Северо-Казахстанский научно-исследовательский институт сельского хозяйства», 150700, Северо-Казахстанская область, Кызылжарский район, с. Бесколь, ул. Институтская, 1. Rich_aa@mail.ru

Nokusheva Zh.A., Candidate of Agricultural Sciences, https://orcid.org/0000-0002-0056-0741
«North Kazakhstan Scientific Research Institute of Agriculture» LLP, 150700, North Kazakhstan region, Kyzylzhar district, Beskol v., Institutskaya str., 1, Nokusheva74@mail.ru
Kantarbayeva E.E., PhD, https://orcid.org/0000-0002-4499-6706
"M. Kozybaev North Kazakhstan University", Petropavlovsk, Pushkin str., 86, 150000, Republic of Kazakhstan, eekantarbaeva.nkzu.kz
Kudabaeva A.M., master, https://orcid.org/0000-0003-3279-5234
«North Kazakhstan Scientific Research Institute of Agriculture» LLP, 150700, North Kazakhstan region, Kyzylzhar district, Beskol v., Institutskaya str., 1, Rich_aa@mail.ru

СОЗДАНИЕ АГРОФИТОЦЕНОЗОВ С ВЫСОКИМ ПОТЕНЦИАЛОМ ПРОДУКТИВНОСТИ В СТЕПНОЙ ЗОНЕ СЕВЕРНОГО КАЗАХСТАНА
CREATION OF AGROPHYTOCENOSES WITH HIGH PRODUCTIVITY POTENTIAL IN THE STEPPE ZONE OF NORTHERN KAZAKHSTAN

Аннотация

В статье представлены результаты исследований по созданию агрофитоценозов многолетних и однолетних кормовых культур с высоким потенциалом для производства кормов в условиях степной зоны Северного Казахстана. Значение данного *исследования* заключается в его способности улучшить устойчивость сельского хозяйства в степной зоне Северного Казахстана. Создание агрофитоценозов с высоким потенциалом продуктивности позволит повысить урожайность кормовых культур, обеспечивая при этом качественные и питательные корма для животноводства.

По результатам наши исследований наибольший выход сухой массы с гектара среди многолетних культур обеспечил вариант с люцерно-кострецовой травосмесью при

весеннем сроке посева, что составило 26,0 ц/га, а также с наиболее высокими показателями кормовых единиц, переваримого протеина и обменной энергии, что составило 15,6ц/га; 2,6 ц/га и 23,9ГДж/га, что выше варианта донника с кострецом на 5,5 ц/га; 0,9ц/га и 7,9 ГДж/га соответственно.

Создание агрофитоценозов путем посева высокоурожайных многолетних и однолетних кормовых культур с урожайностью не менее 10-25 ц/га пастбищного корма для производства питательных кормов в кормовых угодьях способствует значительному увеличению продуктивности сельскохозяйственных животных и повышению качества получаемой продукции животноводства.

ANNOTATION

The article presents the results of research on the creation of agrophytocenoses of perennial and annual fodder crops with high potential for feed production in the steppe zone of Northern Kazakhstan. The significance of this study lies in its ability to improve the sustainability of agriculture in the steppe zone of Northern Kazakhstan. The creation of agrophytocenoses with high productivity potential will increase the yield of fodder crops, while providing high-quality and nutritious animal feed.

According to the results of our research, the highest dry mass yield per hectare among perennial crops was provided by the alfalfa-stalk grass mixture at the spring sowing time, which amounted to 26.0 c/ha, as well as with the highest indicators of feed units, digestible protein and metabolic energy, which amounted to 15.6 c/ha; 2.6 c/ha and 23.9GJ/ha, which is higher than the sweet clover variant with rump by 5.5 c/ha; 0.9c/ha and 7.9 GJ/ha, respectively.

The creation of agrophytocenoses by sowing high-yielding perennial and annual fodder crops with a yield of at least 10-25 kg/ha of pasture feed for the production of nutritious feed in forage lands contributes to a significant increase in the productivity of farm animals and an increase in the quality of livestock products.

Ключевые слова: *агрофитоценозы, кормовые культуры, продуктивность, обменная энергия, кормовые единицы*

Keywords*: agrophytocenoses, fodder crops, productivity, exchangeable energy, fodder units*

Введение. В настоящее время важно определить значение и роль различных кормовых угодий в современном кормопроизводстве. Обязательным условием при возделывании высокопродуктивных сеяных травостоев, особенно при недостатке минеральных удобрений, является включение в агрофитоценозы многолетних бобовых трав и их смесей с кострецом безостым. Это позволяет формировать на их основе экологически безопасные агроэкосистемы с учетом природно-климатических условий региона [1, 2]. Подбор и оптимальное соотношение отдельных видов многолетних кормовых культур может значительно снизить затраты на производство кормов и увеличить их количество, добиться сбалансированности кормовых рационов по элементам питания, обеспечить сохранение и повышение почвенного плодородия малопродуктивных земель, более эффективно и рационально использовать эти земли в системе кормопроизводства Северного Казахстана [3,4].

В настоящее время в степной зоне Северного Казахстана для получения кормов используется 1,2 млн. га различных кормовых угодий (сенокосы, пастбища, залежные земли и т.д.). Однако урожайность кормовых культур и качество корма остаётся не на должном уровне, сбор полученного сырья колеблется по годам от 3 до 5 ц/га сухой массы, а производство кормов с этой площади не превышает 15-18% от общего объема. Дефицит растительного белка в производимом сырье составляет 30-35%, а концентрация обменной энергии в сухом веществе не превышает 5-6 МДж. Поэтому стратегическим направлением в настоящее время для развития лугового кормопроизводства является производство

дешевых полноценных кормов с включением различных кормовых угодий и созданием на них высокопродуктивных сенокосов и пастбищ [5,6].

Скорейшее разрешение этой задачи в ближайшее время – залужение этих угодий многолетними бобово-злаковыми кормовыми культурами интенсивного типа, в первую очередь их поливидовыми посевами с включением сортов донника, люцерны, эспарцета, костреца. Это позволит на их основе формировать экологически-безопасные агрофитоценозы с учетом природно-климатических условий региона и использование их для производства энергетических зеленых и стойловых кормов с содержанием обменной энергии в 1 кг сухого вещества не менее 9-10 МДж для кормления высокопродуктивного скота [7,8].

Подбор и оптимальное соотношение отдельных видов многолетних кормовых культур в структуре посевных площадей позволит значительно снизить затраты на производство и использование кормов, повысить их качество, добиться сбалансированности кормовых рационов по элементам питания и более эффективно и рационально использовать их в системе кормопроизводства [9,10,11].

Возделывание исследуемых посевов позволит создать высокопродуктивные агрофитоценозы многолетних и однолетних культур для производства зеленого корма, сена и сенаж, позволяющих получать с гектара кормовой площади не менее 25-30 ц сухой массы, 25-30 ц кормовых единиц, 30-35 ГДж энергии и 6-7 ц переваримого протеина на различных кормовых угодьях.

Материалы и методы исследований. Объектом исследований являются агрофитоценозы многолетних бобовых культур: донника, люцерны, эспарцета и костреца и чистых посевов однолетних трав: вики яровой, суданской травы, проса обыкновенного.

Экспериментальная часть исследования была проведена сотрудниками ТОО «Северо-Казахстанский научно-исследовательский институт сельского хозяйства» на базе ТОО «Азия Тарангул» Есильского района, Северо-Казахстанской области в соответствии с утверждённой схемой опыта. Учеты и наблюдения осуществлялись согласно методическим указаниям ВНИИ кормов имени В.Р. Вильямса.[12] Для математической обработки полученных данных использовался метод дисперсионного анализа, разработанный Б.А. Доспеховым [13]. Химический анализ проводился на инфракрасном анализаторе кормов InfraXact.

Результаты исследования. Важнейшим резервом для производства высококачественных кормов являются малопродуктивные пахотные земли. Посев их многолетними и однолетними кормовыми культурами позволяют создать агрофитоценозы различного типа для получения дешевого полноценного кормового сырья [14,15]

Весенний срок посева многолетних и однолетних культур проводился 12 мая, летний посев 14 июля. В опытах применялся донник- сорт Карабалыкский, люцерна -сорт Лючия, эспарцет -сорт Карабалыкский, кострец-сорт Лиманный, суданская трава-сорт Изумрудная, вика яровая-Льговская 22, просо -сорт Омская 22

Исследования показали, что многолетние культуры обеспечили сбор сена, начиная с первого года посева. Урожайность многолетних агрофитоценозов и однолетних культур формировалась по-разному и зависела от сроков посева. Наибольший выход сухой массы с гектара среди многолетних культур обеспечили варианты с люцерно-кострецовой и эспарцетово-кострецовой травосмесью при весеннем сроке посева, что составило 21,8-26,0 ц/га соответственно.

Среди однолетних культур при весеннем сроке посева высокой урожайностью отметился вариант с суданской травой, где урожайность составила 27,2ц/га.

Малопродуктивными были травостои многолетних культур при летнем сроке посева, отрицательное действие метеоусловий сказалось на развитии трав, особенно на высоте растений. Урожайность в варианте люцерно-кострецовой травосмеси при летнем сроке посева была ниже на 14,7 ц/га, а у эспарцета с кострецом на 12,0 ц/га чем при весеннем посеве. Среди однолетних культур наиболее высокую урожайность показал вариант с

суданской травой при обоих сроках сева, что составило 24,0-27,2 ц/га. Наименьшие показатели были в варианте с просом обыкновенным и составили 8,0 ц/га при весеннем посеве и 7,8 ц/га при летнем посеве. Просо в Северо-Казахстанской области высевают в основном в смеси с бобовыми культурами.

Химический анализ кормов по вариантам был исследован в научно-инновационном комплексе ТОО «СевКазНИИСХ» экспресс-анализатором InfraXact (производство Дания). Анализатор представляет собой спектрометр, работающий в ближней инфракрасной области спектра. Экспресс-анализатор InfraXact предназначен для определения несколько параметров (протеин, влажность, жир, крахмал, кальций, фосфор, РН, клетчатка и др.).

Определение питательности урожая показало, что среди вариантов с многолетними культурами наиболее высокие показатели кормовых единиц, переваримого протеина и обменной энергии были у люцерно-кострецовой смеси, что составило 15,6ц/га; 2,6 ц/га и 23,9ГДж/га, что выше варианта донника с кострецом на 5,5 ц/га; 0,9ц/га и 7,9 ГДж/га соответственно (Таблица 1).

Таблица 1 - Продуктивность, питательность и энерго-протеиновая ценность агрофитоценозов многолетних и однолетних кормовых культур с высоким потенциалом продуктивности для производства питательных кормов в кормовых угодьях степной зоны Северного Казахстана.

Варианты - агрофитоценозы многолетних и однолетних кормовых культур	Сроки посева агрофитоценозов	Зеленая масса, ц/га	Сухая масса, ц/га	Кормовые единицы, ц/га	Переваримый протеин, ц/га	Обменная энергия, ГДж/га
Донник+кострец	12 мая	58,0	17,4	10,1	1,7	16,0
Люцерна+кострец	12 мая	86,6	26,0	15,6	2,6	23,9
Эспарцет+кострец	12 мая	72,6	21,8	12,2	2,1	19,3
Суданская трава	12 мая	90,6	27,2	12,5	2,0	17,4
Вика яровая	12 мая	83,3	25,0	16,2	3,3	22,2
Просо обыкновенное	12 мая	26,6	8,0	3,8	0,8	5,2
Донник+кострец	14 июля	23,6	7,1	4,1	0,7	6,5
Люцерна+кострец	14 июля	37,6	11,3	6,8	1,1	10,4
Эспарцет+кострец	14 июля	32,6	9,8	5,8	1,0	9,0
Суданская трава	14 июля	80,0	24,0	10,8	1,7	15,1
Вика яровая	14 июля	70,0	21,0	15,0	2,8	20,1
Просо обыкновенное	14 июля	26,0	7,8	3,7	0,8	5,1

С понижением урожайности в летний срок посева в вариантах многолетних агрофитоценозов наблюдалось значительное снижение питательности кормов. У варианта эспарцет с кострецом при летнем сроке посева при урожайности 9,8 ц/га сухой массы выход обменной энергии составил 9,0 ГДж/га, что на 10,3 ГДж/га меньше чем при весеннем сроке. С наибольшим выходом обменной энергии отметился вариант с викой яровой, что составил при весеннем посеве 22,2 ГДж/га и 20,1 ГДж/га при летнем посеве.

Заключение. Таким образом, результаты проведенных исследований по оценке урожайности и питательности полученного корма позволяют сделать следующий вывод, что наиболее полноценные результаты были получены при весенних сроках посева как для многолетних агрофитоценозов, так и для однолетних культур.

Благодарности. Данное исследование было профинансировано Министерством науки и высшего образования Республики Казахстан в рамках НТП BR22883585

«Разработка эффективных технологий повышения продуктивного потенциала и рационального использования пастбищ».

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Мешетич В. Н. Формирование бобовых травостоев в одновидовых посевах и агрофитоценозах с кострецом безостым / В. Н. Мешетич, В. П. Олешко, Д. В. Антюхов // Сибирский вестник сельскохозяйственной науки. - 2012. - № 5 (228). - С.32–37.

2. Сатаров М. Ю. Оптимальный режим скашивания люцерно-кострецовой травосмеси / М. Ю. Сатаров // Кормопроизводство. - 2014. - № 5. - С.8–11

3. Хисматуллин М. М. Бобовые и бобово-злаковые многолетние травы - составная часть органического земледелия Республики Татарстан / М. М. Хисматуллин // Вестник Казанского ГАУ. - 2019. - Т. 14. - № 2 (53). - С.64–67.

4. Линьков В.В. Агротехнологические особенности создания высокоэффективной поливидовой смеси однолетних кормовых культур // Молочнохозяйственный вестник. - 2020-№4 (40), IV кв. С. 41-42

5. Жезмер Н.В. Энергосберегающая технология самовозобновляющихся долголетних сенокосов //Кормопроизводство. – 2009. -№12. – С.10-13.

6. Мешетич В.Н. Влияние норм высева на продуктивность костреца безостого при залужении сенокосов //Вестник с.-х. науки Казахстана. - 2002. - № 2.-23 с.

7. Дмитриев В.И., Костомаров В.Н., Храмов С.Ю. Актуальные вопросы развития кормопроизводства в Западной Сибири // Вестник Омского ГАУ.- 2019-№ 2 (34). С. 24-25.

8. Лукашевич Н. П., Шлома Т. М., Ковалева И. В., Коваль И. М. , Шимко И. И. Продуктивное долголетие многолетних кормовых агрофитоценозов // Земледелие и растениеводство.- 2021. №4-С. 10-11.

9. Зенькова Н. Агрофитоценоз на основе люцерны // Животноводство России. -2019 г.С.54-55.

10. Хусаинов А.Т. Подбор видового состава агрофитоценозов и сортов донника на солонцах //Кормопроизводство. - 2005.-№9.-С.12-18.

11. Колесников В.А. Энергосберегающая технология при омоложении старосеяного травстоя //Кормопроизводство. – 2009.-№11. – С.3-5.

12. Митрофанов А.С., Новоселов Ю.К., Харьков Е.Д. Методика полевых опытов с кормовыми культурами. - 1971.-158с.

13. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта. - М.: ВНИИК, 1985.-175с.

14. Суданка в кормопроизводстве Сибири / Н.И. Кашеваров, Р.И. Полюдина, Н.В. Балыкина, А.П. Штаус; под ред. Н.И. Кашеварова. – Новосибирск: СО РАСХН, 2004. – 224 с.

15. Лукашевич Н., Шлома Т., Ковалёва И. Агрофитоценозы на основе многолетних бобовых трав // Животноводство России.- 2017 г. С. 57-58.

REFERENCES

1. Meshetich V. N. Formirovanie bobovyh travostoev v odnovidovyh posevah i agrofitocenozah s kostrecom bezostym / V. N. Meshetich, V. P. Oleshko, D. V. Antjuhov // Sibirskij vestnik sel'skohozjajstvennoj nauki. - 2012. - № 5 (228). - S.32–37.

2. Satarov M. Ju. Optimal'nyj rezhim skashivanija ljucerno-kostrecovoj travo-smesi / M. Ju. Satarov // Kormoproizvodstvo. - 2014. - № 5. - S.8–11

3. Hismatullin M. M. Bobovye i bobovo-zlakovye mnogoletnie travy - sostavnaja chast' organicheskogo zemledelija Respubliki Tatarstan / M. M. Hismatullin // Vestnik Kazanskogo GAU. - 2019. - T. 14. - № 2 (53). - S.64–67.

4. Lin’kov V.V. Agrotehnologicheskie osobennosti sozdanija vysokojeffektivnoj polividovoj smesi odnoletnih kormovyh kul'tur // Molochnohozjajstvennyj vestnik. -2020-№4 (40), IV kv. S. 41-42

5. Zhezmer N.V. Jenergosberegajushhaja tehnologija samovozobnovljajushhihsja dolgo-letnih senokosov //Kormoproizvodstvo. – 2009. -№12. – S.10-13.

6. Meshetich V.N. Vlijanie norm vyseva na produktivnost' kostreca bezostogo pri zaluzhenii senokosov //Vestnik s.-h. nauki Kazahstana. -2002.-№ 2.-23 s.

7. Dmitriev V.I., Kostomarov V.N., Hramov S.Ju. Aktual'nye voprosy razvitija kormoproizvodstva v Zapadnoj Sibiri // Vestnik Omskogo GAU. - 2019-№ 2 (34). S. 24-25.

8. Lukashevich N. P., Shloma T. M., Kovaleva I. V., Koval' I. M., Shimko I. I. Produktivnoe dolgoletie mnogoletnih kormovyh agrofitocenozov // Zemledelie i rastenievodstvo. - 2021. №4-S. 10-11.

9. Zen'kova N. Agrofitocenoz na osnove ljucerny // Zhivotnovodstvo Rossii. -2019 g.S.54-55.

10. Husainov A.T. Podbor vidovogo sostava agrofitocenozov i sortov donnika na soloncah //Kormoproizvodstvo. -2005.-№9.-S.12-18.

11. Kolesnikov V.A. Jenergosberegajushhaja tehnologija pri omolozhenii starosejano-go travstoja //Kormoproizvodstvo. – 2009.-№11. – S.3-5.

12. Mitrofanov A.S., Novoselov Ju.K., Har'kov E.D. Metodika polevyh opytov s kormovymi kul’turami. - 1971.-158s.

13. Dospehov B.A. Metodika polevogo opyta. - M.: VNIIK, 1985.-175s.

14. Sudanka v kormoproizvodstve Sibiri / N.I. Kashevarov, R.I. Poljudina, N.V. Balykina, A.P. Shtaus; pod red. N.I. Kashevarova. – Novosibirsk: SO RASHN, 2004. – 224 s.

15. Lukashevich N., Shloma T., Kovaljova I. Agrofitocenozy na osnove mnogoletnih bobovyh trav // Zhivotnovodstvo Rossii. - 2017 g. S. 57-58.

ТҮЙІН

Мақалада Солтүстік Қазақстанның дала аймағы жағдайында жемшөп өндіру үшін әлеуеті жоғары көпжылдық және біржылдық жемшөп дақылдарының агрофитоценоздарын құру жөніндегі зерттеулердің нәтижелері келтірілген. Бұл зерттеудің маңыздылығы оның Солтүстік Қазақстанның дала аймағындағы ауыл шаруашылығының тұрақтылығын жақсарту қабілетінде жатыр. Өнімділігі жоғары әлеуеті бар агрофитоценоздарды құру мал шаруашылығына сапалы және құнарлы жем бере отырып, жемшөп дақылдарының өнімділігін арттыруға мүмкіндік береді.

Біздің зерттеулеріміздің нәтижелері бойынша көпжылдық дақылдар арасында гектардан құрғақ массаның ең көп шығымдылығы көктемгі егіс кезеңінде жоңышқа-кострецті шөп қоспасы бар нұсқаны қамтамасыз етті, ол 26,0 ц/га құрады, сондай-ақ жемшөп бірліктерінің, қорытылатын ақуыздың және метаболизм энергиясының ең жоғары көрсеткіштері бар, бұл 15,6 ц/га құрады; 2,6 ц / га және 23,9 ГДЖ/га, бұл тәтті беде нұсқасынан 5,5 ц/га жоғары; сәйкесінше 0,9 ц/га және 7,9 ГДж / га.

Жемшөп алқаптарында құнарлы жемшөп өндіру үшін өнімділігі кемінде 10-25 ц/га жайылымдық жемшөп дақылдарын егу жолымен агрофитоценоздар жасау ауыл шаруашылығы жануарларының өнімділігін едәуір арттыруға және мал шаруашылығынан алынатын өнім сапасын арттыруға ықпал етеді.

УДК 635:63:631.531
МРНТИ 68.35.51

Нургалиева Гульбарам Кикбаевна, кандидат сельскохозяйственных наук, и.о. доцента, основной автор, https://orcid.org/0000-0002-0085-4212
НАО «Западно-Казахстанский аграрно-технический университет имени Жангир хана», 090009, Республика Казахстан, г. Уральск, ул. Жангир хана 51, E-mail: gulbaram.nurgalieva.71@bk.ru

Nurgaliyeva Gulbaram Kikbayevna, candidate of Agricultural Sciences, docent, the main author, https://orcid.org/0000-0002-0085-4212
NJSC «West Kazakhstan Agrarian and Technical University named after Zhangir Khan», Republic of Kazakhstan, Uralsk city, st. Zhangir Khan 51,090009, E-mail: gulbaram.nurgalieva.71@bk.ru,

ВЛИЯНИЕ СРОКОВ ПОСЕВА СЕМЯН ОГУРЦОВ НА УРОЖАЙНОСТЬ
THE EFFECT OF THE TIMING OF SOWING CUCUMBER SEEDS ON YIELD

АННОТАЦИЯ

В статье приведены данные исследования по определению оптимальных сроков высадки рассады перспективного гибрида огурца Кураж F1 для выращивания в открытом грунте. При проведении эксперимента учитывались природно-климатические условия области, биологические особенности растений огурцов, а также характерные особенности гибрида. Наиболее благоприятным периодом для выращивания рассады огурцов в условиях ЗКО является начало II декады мая, что позволяет эффективно использовать тепловые ресурсы региона для формирования урожая. В нашем регионе в открытом грунте не следует рано высевать требовательные к теплу растения, так как их набухшие семена при затяжной холодной весне загнивают в почве, не прорастая, а в случае появления всходов они могут погибнуть от поздних заморозков. Также надо учитывать, что сначала сеют скороспелые сорта для получения наиболее раннего урожая, а потом сорта среднеспелых сортов, подбирая сроки сева так, чтобы урожай был готов ко времени их массовой переработки. Летние посевы усложнены тем, что ко времени их проведения почва сильно пересыхает. Поэтому поля, предназначенные для летних посевов, надо содержать в чистом от сорняков и рыхлом состоянии, принимать меры для сбережения влаги при предпосевной подготовке поля, или прикрочивать посев ко времени выпадения дождя, или же поливные участки оросить.

ANNOTATION

Conducted research on determination of optimal term of landing of seedlings of perspective hybrid of cucumber Kurag F1 for growing in open soil of WK. During realization of experiment the natural and climatic terms of area, biological features of plants of cucumber, and also characteristic features of hybrid, were taken into account. It is set that by the most favorable period of growing of cucumber paccадой in the conditions of WK allowing effectively to use the thermal resources of region for forming of harvest, there is a period II ten-day period of May. In our region, plants that are demanding of heat should not be sown early in the open ground, since their swollen seeds rot in the soil during a prolonged cold spring without germinating, and in the event of seedlings, they may die from late frosts. It should also be borne in mind that early-ripening varieties are sown first to obtain the earliest harvest, and then varieties of medium-ripened varieties, choosing the timing of sowing so that the crop is ready by the time of their mass processing. Summer crops are complicated by the fact that by the time they are carried out, the soil is very dry. Therefore, fields intended for summer crops should be kept free of weeds and loose, measures should be taken to conserve moisture during pre-sowing preparation of the field, or crops should be covered by the time of rain, or irrigation areas should be irrigated.

Ключевые слова: *огурцы, рассада, сорт, удобрение, качество, ранний урожай.*
Key words: *cucumbers, seedlings, variety, fertilizer, quality, early harvest*

Введение. Известно, что сроки посева в открытом грунте устанавливают в зависимости от биологических особенностей отдельных культур и сортов, запланированного времени сдачи продукции, почвенно-климатических и погодных условий. В защищенном грунте при установлении сроки посева приходится считаться с

потребностью в освещении отдельных видов растений. Требовательные к свету культуры сеют только тогда, когда весной интенсивность освещения достигнет необходимого для их роста уровня.

Возделывание многих овощных культур в открытом грунте связано с предварительным получением рассады. Среди них основным является огурец. Не секрет, что для более раннего урожая огурцов культуру стоит выращивать через рассаду. Выращивание рассады огурцов является одним из важных этапов процесса получения урожая вкусных и сочных огурцов. Крепкая рассада — это залог успешного выращивания здоровых растений, способных выдержать неблагоприятные условия и дать обильный урожай. Выращивание крепкой рассады огурцов требует некоторых усилий и последовательного выполнения всех необходимых этапов. Однако, при правильном подходе и уходе, мы получим здоровые и сильные растения, которые принесут нам обильный урожай сочных и ароматных огурцов.

Однако в таком случае возникает вопрос, как не ошибиться со сроками посева.

Материалы и методы исследования. Огурцы являются ведущей и наиболее урожайной культурой в открытом и закрытом грунтах овощеводства нашей республики. Цель наших исследований – для получения ранней продукции и более высоких урожаев культуры огурца усовершенствовать приемы повышения качества рассады. Исследования проводились в 2023-2024 гг. в условиях учебно-опытного участка при Западно-Казахстанском аграрно-техническом университете имени Жангир хана.

Объекты исследований: различные сроки выращивания рассады огурца сорта «Кураж F1», биоорганическое наноудобрение «NAGRO».

Протравленные семена огурцов намачивали в растворе биоорганического наноудобрения «NAGRO», затем их раскладывали для проращивания. До появления всходов поддерживали температуру 26 – 28°С. Всходы появились дружно и образовали хорошую корневую систему. Поливали сеянцы раствором биоорганического наноудобрения «NAGRO». В рассадный период в помещении поддерживали температуру воздуха днем в солнечную погоду 23 – 25°С, в пасмурную 21 – 23°С, ночью 16 – 18°С; температуру почвы 22 – 24°С; относительную влажность воздуха 85 – 90%. Поливали растения водой, имеющую температуру 22 – 26°С. По мере вытягивания рассады производили подсыпку земли и при необходимости кольцевание. Как известно, нормальный рост и развитие растений может протекать только при определенных условиях среды. В случае отклонения от них наблюдается замедленное или ускоренное прохождение той или иной фазы. Все это отрицательно сказывается на продуктивности растений.



Рисунок 1 - Рассадный метод

Результаты исследования и обсуждение. Как показали исследования, влияние температуры сказывается сразу после посева огурцов. Число дней от посева до всходов было разным, на продолжительность оказало влияние температуры воздуха.

В первый период после всходов огурцы растут очень медленно. Такое явление объясняется слабо развитой корневой системой. С появлением третьего листа наблюдается интенсивный рост растений при условии достаточного количества влаги, питательных веществ и при благоприятных погодных условиях.

Таблица 1 – Биометрические наблюдения за рассадой огурца

Возраст рассады, сутки	Высота растения, см	Длина подсемядольного колена, см	Число листьев	Площадь листовой поверхности, $дм^2$	Масса надземной части, г	
					сырая	сухая
25	25	4,8	5	6,0	35	2,5
30	30	5	6	7,0	40	2,5

Почва опытного участка – темно-каштановые среднемощные, тяжелосуглинистые. По результатам лабораторных анализов проб почвы содержание гумуса в слое 0 – 20см колеблется в пределах 2,42 – 2,44%, что относит данные почвы к слабогумусным. Легкогидролизуемого азота – 3,71 – 3,88 мг/100гр, что показывает низкую обеспеченность для овощных культур по данному показателю. Нитратного азота – 39,2 – 39,6 мг/кг, что соответствует повышенной степени обеспеченности. Содержание подвижного фосфора – 2,52 – 2,71 мг/100гр., что составляет низкую степень для овощных культур. Подвижного калия в пределах 44,4 – 51,5 мг/100 гр. На абсолютно сухую почву, по данному показателю почвы высоко обеспечены, pH – 7,0 – 7,2.

Метеорологические условия различались как по температурному режиму, так и по сумме осадков. Среднемесячная температура воздуха в мае имела более низкие показатели, а в июне – августе имела более высокие показатели в сравнении со среднемноголетними.

Продолжительность фазы нарастания вегетативных органов не является постоянной и изменяется в зависимости от обеспеченности растений теплом и влагой.

Влияние сроков посевов на рост главного стебля и боковых побегов огурцов

Нашими опытами установлены лучшие сроки летних посевов огурцов, при которых массовое плодоношение наступает ко времени засола.

Таблица 2 – Поступление урожая огурцов в зависимости от срока посева

Сроки посева	Урожай, ц/га	В т.ч. по месяцам, %				% товарных плодов
		июль	август	в т.ч. во II половине августа	сентябрь	
18/IY	210,4	67,6	32,4	8,1	-	89,8
04/Y	234,1	38,2	60,5	26,2	1,3	91,3
18/Y	257,5	17,9	66,9	41,8	15,2	93,8
27/Y	188,2	0,6	68,4	47,3	31	89,3

Как видно из таблицы 2, лучший срок посева для получения засолочных огурцов – вторая и третья декада мая. При этих сроках посева 57 – 78,3% урожая поступает во второй половине августа и в сентябре, в то время как при весенних посевах сборы зеленцов к этому времени заканчиваются. Необходимо отметить, что при летних сроках посева урожай получается ниже, чем при весенних, что объясняется понижением температуры во второй половине сентября. По химическому составу зеленцы огурцов летних посевов не уступают зеленцам от весенних, проводимых в лучшие сроки.

Для огурцов крайне неблагоприятны резкое понижение температуры, большие колебания суточных температурных максимумов и минимумов, продолжительная высокая температура без достаточной влажности почвы. Снижение температуры почвы ниже 20°С приводит к резкому падению способности растений усваивать питательные элементы –

замедляется поглощение фосфора, затем азота и калия. Благоприятны для огурцов выравненная среднесуточная температура воздуха, (таблица 3) незначительные суточные колебания температуры, медленное пониженное ее в конце вегетации.

Сроки посадки рассады огурца необходимо увязывать с температурой и влажностью почвы на глубине заделки рассады.

Рассадный метод по сравнению с посевной культурой является более эффективным при выращивании ранних огурцов на открытом грунте.

Следует отметить, что погодные условия весеннего периода оказывают существенное влияние на получение урожая огурцов в ранние сроки, особенно в рассадной культуре. Установлено, что в годы с холодной весной при рассадном методе культуры урожай огурцов в ранних сборах в сравнении с теплой снижается на 60 – 70 %. В наших исследованиях установлено, что рассада, высаженная с теплой весной, безболезненно и быстро приживается, это было отмечено в 2023 году, а отличающиеся ненастной весной с резкими колебаниями температуры воздуха и почвы, как это отмечено в этом 2024 году, сильно застуживается и медленно оправляется при наступлении теплых солнечных дней.

При высадке рассады огурца температура воздуха днем было 20-22°С, а в ночное время наблюдалось 16-18°С. Но в наших условиях в третьей декаде мая, 3-5 дней в ночное время температура воздуха опускалась до 14°. Вот это оказывало существенное влияние на рост и развитие огурца, можно сказать рост растений приостановился, Мы устанавливали на рядки проволочные каркасы и укрывали растения полотнищами пленки. Из литературных источников, нам известно, что при температуре 10°С рост растения огурца прекращается, а при 8-9°С они погибают.





Рисунок 2 – По срокам посева

Растения посеянные 18 апреля и высаженные в открытый грунт 15 мая начали формировать завязи, но в связи, что в III декаде мая температура ночью опустилась до 14°С развитие завязей приостановились. А при наступлении теплых солнечных дней они оправились.

Температура месяца июня в целом была благоприятной для всех вариантов, при цветении наблюдалась 25-28°С, а в период плодоношения растений огурцов в дневное время 25-30°С и в ночное время – 18-21° все это благоприятствовало для роста и развития растения огурца.

Таблица 3 – Температурный режим при выращивании рассады огурца

Фаза роста	Температура, °С		
	воздуха		открытого грунта
	дневная	ночная	

Посев – всходы	26	26	24
Первые 3 суток после всходов	24	24	23
Следующие 2 суток	23	22	23
За сутки перед высадкой в открытый грунт	21-22	20-21	–
Первые 2 суток после высадки	9-20	17-18	–
Последующий период	21	21	21

При выращивании огурцов семенами в зависимости от температурных условий весеннего периода разница в наступлении раннего урожая менее существенна. В годы с холодной весной растения, выращиваеиые посевом семян в грунт, лучше переносили неблагоприятные погодные условия и быстро догнали по росту и развитию растения, выращенные рассадой. Они отличились более дружным плодоношением и высоким общим урожаем по сравнению с рассадными.



Рисунок 3 – Рассадная и посевная культура огурцов

Поэтому следует считать целесообразно сочетать в нашей области рассадную и посевную культуру огурцов под временными пленочными укрытиями, чтобы гарантировать получение высоких и ранних урожаев огурцов независимо от погодных условий весеннего периода.

Заключение.

1) В 2024 году, отличавшаяся в мае месяце резкими колебаниями температуры воздуха и почвы, растения огурца значительно застуживались и медленно оправились при наступлении теплых солнечных дней, поэтому семена перед посевом одновременно с протравливанием надо обьязательно «закаливать»;

2) В условиях хозяйства рискованного земледелия, чтобы получить раннюю продукцию огурцов, надо создать микроклимат, например пленочные укрытия, применение мульчи и т.д. В открытом грунте для культуры огурцов создание оптимальных условии микроклимата, это использование солнечной радиации и сохранение тепла.

3) В варианте ранний посев (посев 18 апреля) в наших опытах потребовались подсев новыми растениями;

4) Для обеспечения нормального роста и плодоношения огурцов существенное значение имели подкормки растениий биоорганическим наноудобрением «NAGRO»;

5) Самая высокая биологическая урожайность получена в посеве со сроком 27 мая, которая масса одного растения составила в среднем 410 г;

6) Самую высокую рентабельность показал III вариант (посев семян 18 мая), который составил 128%.

Рекомендации

В природно-климатических условиях Западно – Казахстанской области культуру огурца следует считать целесообразным сочетать рассадную и посевную культуру под временными пленочными укрытиями, чтобы гарантировать получение высоких и ранних урожаев огурцов независимо от погодных условий весеннего периода. Рекомендуем в конце третьей декады апреля рассадную культуру огурца, чтобы иметь возможность в середине июня собирать первые плоды, а также посевную культуру с 2 – 3 сроками (с интервалом 10 дней).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Сиривля А.Г. Огурцы. Изд. Кайнар, А-Ата. 1975. – 164 стр. https://doi.org/10.3390/su13031504
2. Болотских А.С. Выращивание огурцов. М.:Колос, 1975. -142 стр.
3. Каплина Г.Т. Рассада и ранние овощи. Изд. Кайнар, А-Ата. 1968. – 185 стр.
4. Методика опытного дела в овощеводстве и бахчеводстве / под ред Ф.В.Белика. М: Агропромиздат, 1992. – 123 стр.
5. Методика физиологических исследований в овощеводстве и бахчеводстве / под ред Ф.В.Белика М., 1970. – 217 стр. https://doi.org/10.2298/JAS2101001V
6. Коняев Ф.Н. Математический метод определения площади листьев растений // Доклады ВАСХНИЛ. – №9. – 1970. – 43-46 стр.
7. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта (с основами статистической обработки результатов исследований). – М.: Агропромиздат, 1985. – 351 стр.
8. Кудияров Р.И., Дямуршаева Э.Б., Уразбае Н.Ж., Сауытбаева Г.З., Дямуршаева Г.Е., Нурпеисова А.А. Влияние сроков посева на продуктивность огурцов в зимних теплицах Приаралья // Современные проблемы науки и образования. 2015. № 2-1. ; https://doi.org/10.3390/su13031504
9. Бочаров, В.Н. Минеральные удобрения и продуктивность огурца при капельном орошении / В. Н. Бочаров, Н. Н. Киселева, А. И. Воронцова // Картофель и овощи. - 2011. - № 5. - С. 13-14. doi:10.3390/agronomy10060827
10. Папонов, А. Н. Посевы огурца лучше мульчировать синтетическими материалами / А. Н. Папонов, З.А. Сунцова // Картофель и овощи. - 2011. - № 4. - С. 22. https://doi.org/10.3390/agronomy11020352
11. Пасько, О. А. Влияние предпосевной стимуляции семян огурца на урожайность / О. А. Пасько // Аграрная наука. - 2011. - № 8. - С. 20-22.
12. Будыкина, Н. П. Эпин-экстра повышает стрессоустойчивость огурца в пленочных теплицах / Н. П. Будыкина, Т. Ф. Алексеева, Н. И. Хилков // Картофель и овощи. - 2011. - № 1. - С. 24. https://doi:10.3390/w11030540
13. Исакова, М. С. Влияние различных уровней досвечивания на производство экологически безопасной продукции культуры огурца в защищенном грунте / М. С. Исакова // Достижения науки и техники АПК. - 2011. - № 2. - С. 28-29.
14. Киртаева, Т. Н. Эффективность Иммуноцитофита в борьбе с пероноспорозом огурца / Т. Н. Киртаева, В.Т. Синеговская // Земледелие. - 2011. - № 3. - С. 40-42. https://doi.org/10.3390/agriculture11020084
15. Кузьмицкая, Г. А. Экологически безопасные методы повышения продуктивности огурцов / Г. А. Кузьмицкая, Н. В. Кулякина // Аграрная наука. - 2011. - № 8. - С. 19-20. https://doi.org/10.3390/agriculture11020084

REFERENCES

1. Sirivlya A.G. Ogurcy. Izd. Kajnar, A-Ata. 1975. – 164 str. https://doi.org/10.3390/su13031504
2. Bolotskih A.S. Vyrashchivanie ogurcov. M.:Kolos, 1975. -142 str.
3. Kaplina G.T. Rassada i rannie ovoshchi. Izd. Kajnar, A-Ata. 1968. – 185 str.
4. Metodika opytnogo dela v ovoshchevodstve i bahchevodstve / pod red F.V.Belika. M: Agropromizdat, 1992. – 123 str.
5. Metodika fiziologicheskih issledovanij v ovoshchevodstve i bahchevodstve / pod red F.V.Belika M., 1970. – 217 str. https://doi.org/10.2298/JAS2101001V
6. Konyaev F.N. Matematicheskij metod opredeleniya ploshchadi list'ev rastenij // Doklady VASKHNIL. – №9. – 1970. – 43-46 str.
7. Dospekhov B.A. Metodika polevogo opyta (s osnovami statisticheskoj obrabotki rezul'tatov issledovanij). – M.: Agropromizdat, 1985. – 351 str.
8. Kudiyarov R.I., Dyamurshaeva E.B., Urazbae N.ZH., Sauytbaeva G.Z., Dyamurshaeva G.E., Nurpeisova A.A. Vliyanie srokov poseva na produktivnost' ogurcov v zimnih teplicah Priaral'ya // Sovremennye problemy nauki i obrazovaniya. 2015. № 2-1. ; https://doi.org/10.3390/su13031504
9. Bocharov, V.N. Mineral'nye udobreniya i produktivnost' ogurca pri kapel'nom oroshenii / V. N. Bocharov, N. N. Kiseleva, A. I. Voroncova // Kartofel' i ovoshchi. - 2011. - № 5. - S. 13-14. doi:10.3390/agronomy10060827
10. Paponov, A. N. Posevy ogurca luchshe mul'chirovat' sinteticheskimi materialami / A. N. Paponov, Z.A. Suncova // Kartofel' i ovoshchi. - 2011. - № 4. - S. 22. https://doi.org/10.3390/agronomy11020352
11. Pas'ko, O. A. Vliyanie predposevnoj stimulyacii semyan ogurca na urozhajnost' / O. A. Pas'ko // Agrarnaya nauka. - 2011. - № 8. - S. 20-22.
12. Budykina, N. P. Epin-ekstra povyshaet stressoustojchivost' ogurca v plenochnyh teplicah / N. P. Budykina, T. F. Alekseeva, N. I. Hilkov // Kartofel' i ovoshchi. - 2011. - № 1. - S. 24. https://doi:10.3390/w11030540
13. Isakova, M. S. Vliyanie razlichnyh urovnej dosvechivaniya na proizvodstvo ekologicheski bezopasnoj produkcii kul'tury ogurca v zashchishchennom grunte / M. S. Isakova // Dostizheniya nauki i tekhniki APK. - 2011. - № 2. - S. 28-29.
14. Kirtaeva, T. N. Effektivnost' Immunocitofita v bor'be s peronosporozom ogurca / T. N. Kirtaeva, V.T. Sinegovskaya // Zemledelie. - 2011. - № 3. - S. 40-42. https://doi.org/10.3390/agriculture11020084
15. Kuz'mickaya, G. A. Ekologicheski bezopasnye metody povysheniya produktivnosti ogurcov / G. A. Kuz'mickaya, N. V. Kulyakina // Agrarnaya nauka. - 2011. - № 8. - S. 19-20. https://doi.org/10.3390/agriculture11020084

ТҮЙІН

Мақалада БҚО жағдайының ашық далада өсіру үшін Кураж F1 қиярының перспективалы гибридінің көшеттерін отырғызудың оңтайлы мерзімін анықтау бойынша зерттеулер жүргізілді. Эксперимент жүргізу кезінде облыстың табиғи-климаттық жағдайлары, қияр өсімдіктерінің биологиялық ерекшеліктері, сондай-ақ гибридтің тән ерекшеліктері ескерілді. БҚО жағдайында қияр көшеттерін өсірудің ең қолайлы кезеңі, егінді қалыптастыру үшін аймақтың жылу ресурстарын тиімді пайдалануға мүмкіндік беретін кезең мамырдың II онкүндігінің басы болып табылады.

ӘОЖ 636.084.3
ҒТАХР 70.19.11

Ожанов Г.С., ауылшаруашылық ғылымдарының кандидаты, доцент https://orcid.org/0000-0002-6852-3890

«Жәңгір хан атындағы Батыс Қазақстан аграрлық-техникалық университеті» КеАҚ, Жәңгір хан көшесі, 51, Орал қ., 090009, Қазақстан Республикасы, gozhanov73@mail.ru
Үмбеткалиев Н.М., биологиялық ғылымдарының магистрі.
https://orcid.org/0000-0002-5175-2195
«Жәңгір хан атындағы Батыс Қазақстан аграрлық-техникалық университеті» КеАҚ, Жәңгір хан көшесі, 51, Орал қ., 090009, Қазақстан Республикасы, nurlan-72kzt@mail.ru
Ozhanov G.S., Candidate of Agricultural Sciences, associate professor
https://orcid.org/0000-0002-6852-3890
NJSC "West Kazakhstan Agrarian and Technical University named after Zhangir khan", Uralsk, st. Zhangir Khan 51, 090009, Republic of Kazakhstan, gozhanov73@mail.ru
Umbetkaliev N.M., Master of Biological Sciences. https://orcid.org/0000-0002-5175-2195
NJSC "West Kazakhstan Agrarian and Technical University named after Zhangir khan", Uralsk, st. Zhangir Khan 51, 090009, Republic of Kazakhstan, nurlan-72kzt@mail.ru

ЖАЙЫЛЫМДЫҚ ЖЕРЛЕРДІ СУЛАНДЫРУДЫҢ ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕРІ
KEY ISSUES OF IRRIGATION OF PASTURE AREAS

АННОТАЦИЯ

Мақалада жайылымдарды жер асты және жер үсті суларымен суландыру жағдайы туралы мәліметтер келтірілген, сонымен қатар санитарлық жағдайы жақсы жер үсті сулары жие кездесетін болса, сол аумақтарда артық шығынсыз суландыруға болатындығы қарастырылған. Өзендер, су арналары сияқты жайылымдарды суландыру үшін пайдаланылатын ашық су көздерінің сандық және сапалық көрсеткіштері зерттелген. Мал шаруашылығында жайылымдарды суландыру кезінде неғұрлым қолжетімді түрлері жер үсті және жер асты су көздері, сонымен қатар олардың минералдану дәрежесімен байланысты болып келеді.

Батыс Қазақстан облысының аймақтары өзендер мен көлдер, су арналарын қамтитын жайылымдарды суландырудың ашық су көздерін кеңінен қолданумен сипатталады. Жайылымдарды жер беті суларымен суландырудың ең төменгі көрсеткіштері оңтүстік аудандардың үлесінде, ал құрғақ дала аймақтарында орташа және солтүстік аудандарында жоғары деңгейде деп айтуға болады.

Суару-суландыру көздеріне жақын орналасқан аумақтарда шалғайдағы мал шаруашылығының орналасу орындарын сумен қамтамасыз етуде суару алаңдары мен тоғандарды салу жолымен шешіледі. Мал шаруашылығымен айналысатын шаруашылықтар үшін іс жүзінде суландыру көздері негізделген және үнемді болу керек, дегенмен мал шаруашылығын сапалы су қорымен қамтамасыз етуде айтарлықтай мәселелер баршылық.

ANNOTATION

The most accessible types of water for pasture irrigation in livestock farming depend on surface and groundwater sources, as well as their degree of mineralization.

The article presents information on the state of irrigation of pastures with groundwater and surface waters, and also considers the possibility of irrigation without excessive losses in areas where surface waters with good sanitary conditions are common. The quantitative and qualitative indicators of open water sources used for irrigation of pastures, such as rivers and water channels, are studied.

The regions of the West Kazakhstan region are characterized by the widespread use of open water sources for irrigation of pastures, including rivers, lakes, and water channels. It can be said that the lowest indicators of irrigation of pastures with surface water are in the southern regions, while in the dry steppe regions it is average and in the northern regions it is high.

In areas close to irrigation sources, the problem of providing water to remote livestock farms is solved by constructing irrigation areas and ponds. In practice, for livestock farms, irrigation

sources should be reasonable and economical, however, there are significant problems in providing livestock with high-quality water resources.

Түйін сөздер: *Мал шаруашылығы, жайылымдық жерлер, су көздері, суландыру, суару, аумақтар*

Key words: *Animal husbandry, pastures, water sources, watering, zoning, territories*

Кіріспе. Еліміздің мал шаруашылығымен айналысатын аудандарында жайылымдық жерлерді суландыру, олардың тіршілік әрекетін сақтап қалудың шешуші әрекеті болып табылады.

Республикамыздағы ауылшаруашылық алқаптарының басым бөлігі жайылымдық жерлер, мал шаруашылығын дамыту, заман талабына сай орналастыру, сумен қамтамасыз ету (суландыру), азық түлік қажеттіліктері мен экспорттық әлеуетін қатерсіз және экологиялық қауіпсіз ет өнімдерімен қамтамасыз ету аса маңызды.

Әлемде жайылымдар кең таралған, жалпы ауданы 50 млн км^2 немесе құрлықтың 37% пайызын құрайды, бұл мал шаруашылығы және олардан алынатын өнімдерге сұраныстың артуы мен халық санының өсуіне байланысты [1, 2].

Жайылымдық алқаптарды суландыру, қарастырылып отырған аймақтың рельефінің табиғи-геологиялық жағдайларына байланысты – жерасты және жер үсті суларының ағыны мен жасанды бассейндері, су каналдарымен суға бұрғыланған ұңғымалары, құдықтар мен түрлі суландыру көздері зерттеліп, талданады.

Халықты азық-түлікпен қамтамасыз ету, ауыл шаруашылығы, оның ішінде мал шаруашылығының дамуына ерекше мән берілуде, жайылымдарды тиімді пайдалану мәселесі өзекті болып отыр [3, 4].

Республикамыздың жер қорлары өте ауқымды, сонымен қатар топырақ-климаттық жағдайлары өте алуан түрлі, бұл ауылшаруашылығында мал шаруашылығының әртүрлі салаларын табысты дамытуға мүмкіндік береді. Қазақстан аумағының басым бөлігі құрғақ аймақта орналасқан, мал шаруашылығын дамытуға су қорларының тапшылығы кедергі келтіреді. Республикамызға келетін су қорлары шектеулі, ал атмосфералық жауын шашын азғантай мөлшерде болғандықтан бұл еліміздегі су тапшылығын қалыптастырады, Мал шаруашылығы көктемгі еріген қар суынан жинақталатын өзен, көлдер мен су қоймаларынан, құдықтар мен ұңғымалардан, дербес жергілікті су көздерінен, жерасты суларынан қамтамасыз етіледі.

Еліміздегі жайылымдық жерлердің көлемі 189,0 млн га, бұл экономиканың дамуына үлес қосатын мал шаруашылығына қажетті мал азықтық қорлардың көзі. Жайылымдарды ұтымды пайдалану, өнімділігін қалпына келтіру және арттыру, суару көздері мен су қорларын пайдалану және қалпына келтіру өзекті мәселе. Шалғайдағы мал шаруашылығын дамыту үшін жайылымдарды су көздерімен суландыру қажет [5-9].

Сумен жабдықтау үшін жер асты суларын перспективалық тұтынуды есептеу кезінде су тұтынудың үлестік нормаларына сай суға қажеттілікті есепке алу керек. Ауыл шаруашылығындағы жер асты суларының негізгі тұтынушылары ірі мал шаруашылығы кешендері мен агроөнеркәсіптік нысандар және шалғайдағы мал шаруашылығының суару пункттері бола алады.

Республикамыздағы судың жетіспеушілігі экологиялық және экономикалық дамуына қауіп төндіреді, қиындық тудырады. Еліміздегі су қорлары жан басына шаққанда ТМД елдерімен салыстырғанда соңғы орында, жер үсті суларының қорлары орташа есеппен жылына 100,5 млрд. м^3, оның ішінде тек 56,5 млрд. м^3 Қазақстан аумағында қалыптасады, яғни су қорының тапшылығы байқалады [10].

Республикамыздың ауыл шаруашылығы саласы су тапшылығына байланысты үлкен дағдарысты бастан кешіруде, әсіресе мал шаруашылығындағы жайылымдық алқаптардың өнімділігінің төмендігі, мал ішетін судың жеткіліксіздігі өндіріс көлемінің күрт

төмендеуіне алып келеді, бұл сұрақтардың оңтайлы шешімі жер үсті және жер асты суларымен қамтамасыз ету болып табылады.

Ауыл шаруашылығы өндірісінде айтарлықтай жер қоры бар Қазақстанның экономикасының дамуы үшін су қорының маңызы зор. Жалпы алғанда жер үсті су қорларының тапшылығы мен өзендер ағынының сумен ең аз қамтылған елдердің қатарына жатады. Жер бедерінің ерекшелігі мен климаттың қуаңшылығы су ағындарының сипатын айқындайды және аумақтар бойынша жер үсті суларының таралуы біркелкі емес, ал көлемі, жылдар мен маусымдар бойынша айтарлықтай өзгеріп тұрады. Жалпы сумен қамтамасыз үшін, су аз жылдары пайдалануға болатын жер үсті суларының 95%-ын қамту қажет. Жайық-Каспий су шаруашылығының су қоймасында 1 км^2 ауданында су аз жылдары жер үсті суларының (0,67) қамтамасыз етілуімен ерекшеленеді [11].

Еліміздегі және Батыс Қазақстан облысындағы сулардың 80%-дан астамы трансшекаралық ағындарға тәуелді. Жалпы тұтынылатын судың 70%-ы ауыл шаруашылығына тиесілі, ал кейбір дамушы елдерде ол 90-ға жетеді [12].

Батыс Қазақстанның аймағы дала, шөлдер және шөлейттердің табиғи кешендерінен және құйылатын су айдындарының бірегей үйлесімімен, экожүйелердің алуан түрлігімен және сәйкес өсімдік түрлерімен сипатталады.

Аймақтағы өзен суларының гидрохимиялық көрсеткішері мал шаруашылығында пайдалануға жарамды, кейбір өзендер тайыздап, деңгейі төмендеп, кіші өзендер, жайылма көлдер кеуіп кетеді. Аймақ құрғақ климатта орналасқан, қар аз түседі, жаңбыр сирек жауады, өзен – көлдерде қоректенуінің негізгі түрі қар суы, тек қар еріген кезде және қатты жаңбырдан кейін пайда болады [13, 14].

Облыс аумағында жалпы ұзындығы 4600 км болатын 196 өзен ағып өтеді, оның тек 8-де ғана тұрақты су ағыны бар. Көктемгі су тасқыннан кейін кейбір өзендер кеуіп, су сирек кездесетін терең шұңқырларда сақталады, ол жер бедерінің ерекшеліктеріне байланысты ағынның маусымдық сипатына ие [15].

Жайылымдық алқаптарды суландыру мәселелеріне табиғи-климаттық аймақтар бойынша жайылымдарға, мал санына, суландыру көздеріне және гидрологиялық, гидрохимиялық көрсеткіштеріне талдаулар жүргізілді. Жайылым жерлерін пайдалану кезінде аудандастыруды, жоспарлау мен жайластыруды кешенді жүзеге асыру керек.

Зерттеу материалдары мен әдістері. Су үлгілерін химиялық талдау университеттің ғылыми зерттеу орталығында жүргізілді. Суды гидрохимиялық талдау әдістемелік-нормативтік талаптарға сәйкес. Жайылымдардың жер беті суларымен қамтылу потенциалы ArcGIS 10.8 бағдарламасымен өзендердің ұзындықтары мен ирелену коэффициенті арқылы анықталды.

Статистикалық мәліметтерді өңдеу, бастапқы материалдарды талдау және қорытындылау әдістері жүргізілді. Мал шаруашылығын сумен қамтамасыз етуде судың сапасы шаруашылық ауыз су қажеттіліктеріне қойылатын талаптарға (суаттарды ұйымдастыру, суландыру көздері, минералдану деңгейі) сәйкес болуы керек.


Минералдануы – бұл су құрамындағы химиялық талдау кезінде анықталған минералдардың қосындысы (құрғақ қалдық). П.П. Климентьев шкаласы бойынша.

Жайылым жеріндегі жануарлардың суару радиусын анықтау және жайылымдарды суландыру түрлері бойынша ұқсас аумақтарға бөлу.

Жайылымдарды аудандастыруда келесі әдістер қолданылады: табиғи, әлеуметтік-экономикалық және геоэкологиялық, табиғи шаруашылықтар мен аумақтар карталары, картографиялық әдіс; статистикалық әдіс, жалпы жер қорының құрылымы, жайылымдардың көлемі, мал басы саны, су көздері және т. б. сандық көрсеткіштер.

Зерттеу нәтижелері. Облыс жайылымдарын аудандастырудағы негізгі мақсат – жайылымдарды суландыру түрлері бойынша бірегейлендіру. Аудандастырудың негізгі әдістерінің бірі, олардың таксономиялық бірліктерінің жүйесін негіздеу, яғни аумақтық бірліктеріне барлық әкімшілік аудандар енгізіледі және жайылымдарды суландырудың бірнеше түрлері қарастырылды.

Жайылымдарды аудандастыруда келесі әдістер қолданылды: табиғи, әлеуметтік-экономикалық, геоэкологиялық, географиялық карталарды талдау, табиғи-шаруашылық аумақтардың карталарын жасау, картографиялық және статистикалық әдіс – облыстағы жайылым алқаптарының көлемі, құрылымы, мал басы саны, су көздері және т. б. сандық көрсеткіштерді талдау.



Сурет 1 – БҚО-дағы негізгі өзендердің гидрологиялық сипаттамалары

1-ші суретте келтірілгендей жылдық өзен ағынының орташа сулы көлемі 2,042 млрд/м^3 құрайды. Облыс аумағындағы өзен желілері нашар, аумақтары әркелкі бөлінген. Гидрологиялық сипаттамасы бойынша Жайық өзенінің жайылымдарды суландыру дәрежесі жақсы, аудандарға таралуының жоғарлылығын көрсетеді.

Облыстағы жайылымдардың жалпы ауданы – 6,2 млн га немесе ауылшаруашылық жерлерінің 78%-ы құрайды. Жайылымдардың аумағы: Ақжайықта – 1,3, Жаңақалада – 983,6 және Казталов ауданында – 871,2 га. Жайылымдардың көп бөлігі жер үсті суларымен, өзендер, каналдар, су қоймаларымен суландырылады.

Зерттеу нәтижесі бойынша облыстағы жер үсті суларның ұзындығы 4436,5 км және 74 өзен көздері есепке алынды. Олардың орналасуы жер бедеріне, табиғи-климаттық жағдайға байланысты. Облыстағы суару - суландыру жүйелерінің сипаттамасы бойынша ең ауқымдысы Жайық - Көшім арқылы құрғақ далалы Ақжайық, Тасқала және шөлейтті Казталов, Жаңақала аудандарының жерлері суландырылады.

Қазталов және Жәнібек аудандары кіші өзен ССЖ-мен, ал үлкен өзен ССЖ-сі Казталов, Жаңақала аудандарын, Жәнібек ССЖ-сі Жәнібек пен Бөкей Орданың

шаруашылықтарын сумен қамтамасыз етеді. Орал-Шалқар ССЖ-сі Теректі ауданындағы 25 мың гектар жайылымдарды қамтиды (кесте 1).

Кесте 1 – Аудандар бойынша жайылымдардың жер беті суларымен қамтылуы, мың/га

№	Аудандар атаулары	Ауыл шаруашылық жерлерінің жалпы көлемі	Жайылымдар	Жер беті суларымен суландырылатын жайылымдар алаңы	Жайылымдардың жер беті суларымен қамтылуы, k
1.	Ақжайық	1344,11	229,4	776,3	0,58
2.	Бәйтерек	524,9	133,7	352,3	0,67
3.	Бөкей орда	582,2	577,4	45,0	0,08
4.	Бөрлі	289,4	126,4	193,1	0,67
5.	Жаңақала	1 031,5	983,6	251,3	0,24
6.	Жәнібек	461,8	453,7	67,0	0,15
7.	Казталов	1 037,7	871,2	658,2	0,63
8.	Қаратөбе	387,9	362,5	198,0	0,51
9.	Сырым	682,9	564,4	230,4	0,34
10.	Тасқала	572,9	361,5	567,8	0,99
11.	Теректі	562,2	266,6	313,2	0,56
12.	Шыңғырлау	372,3	241,1	213,8	0,57
13.	Барлығы	7 897, 9	180,6 3	866,4	0,48

Алынған нәтижелерге қарағанда облыс жайылымдарының 49%-ы суландырылған, аудандардағы жайылымдардың сумен қамтылуының ең төменгі көрсеткіші Бөкейорда, Жәнібек, Жаңақала аудандарының үлесіне тиеді, ал құрғақ далалы аймақтағы Ақжайық, Казталов, Теректі аудандарында орташа, Тасқалада жайылымдардың суландырылуы жоғары деңгейде. Облыс бойынша жайылымдардың жер үсті суымен қамтылу коэффициенті - 0,5-ке тең, яғни сумен қамтылуы төмен деңгейде екенін көрсетеді. Маусымдық өзгерістерге қарай жаз-күз айларында өзендер мен көлдер кеуіп, келеңсіз жағдайлар туындайды.

Алынған мәліметтер бойынша жайылымдық жерлердің жалпы суландыру коэффициенттері, жер үсті суымен қамтылу алаңдары және ауданы анықталады.

Жайылымдардағы сулардың сапасы мал суаруға жарамды болу керек, өзендердің жалпы минералдануы аздап тұзданған және малға ішуге жарамды. Шыңғырлау ауданы бойынша Ащы, Ащысай, Сырым ауданындағы Өлеңті өзендері күшті тұздылау (3,5-7,0 г/л) бірақ малға ішуге жарамды, ал Бокей орда, Жәнібек аудандарындағы Ащыөзек өзенінің суы тұзды (25,0 г/л) болып келеді, яғни мал суаруға жарамсыз. Мал шаруашылығы мен жайылымы жақсы дамыған Ақжайық, Жаңғала, Жәнібек, Қазталов аудандарында өзендер мен көлдердің тартылуы маусымдық өзгерістерге байланысты су жетіспеушілігі өзекті мәселеге айналып отыр.

Қорытынды. Жайылымдық жерлерді суландырудың өзекті мәселелерін шешуде әрбір аумақтарға сәйкес стандартты шешім қабылдау, жергілікті жағдайларға сай су қорларын пайдалану, суландыру әдісін таңдау, жайылымдағы су көздерін зерттеу, жарамдылығын анықтау және жайылымдардағы су қорларының болуына байланысты.

Жайылымдардағы малға қажетті су табиғи (көл, өзен) және жасанды су көздерінен (су арналары) алынады, сондықтан малды өріске айдау ара қашықтығы ескеріліп, суат пен жайылымның аралығы есепке алынады, мал түлігі үшін өрістен айдау қашықтығы әр түрлі малдың жасына, жағдайына, өсіру бағытына байланысты.

Мал суаратын суаттың қашықтығы жыл маусымына, жайылымның сипатына, өсімдік жамылғысына байланысты. Зерттеу нәтижесінде малды суару жүйесі, өріске айдау

қашықтығы, оның жыл маусымына қарай өзгеретіндігі анықталды. Жайылымдарды суландыру мәселелерін шешуде су көздерін, олардың қажетті санын анықтау және орналастыру маңызды болып табылады.

Алғыс. Бұл мақала ҚР ауыл шаруашылығы министрлігінің бағдарламалық-мақсатты қаржыландыруды жүзеге асыру жөніндегі 2021-2023 жылдарға арналған BR10764915 «Жайылымдарды қалпына келтіру және ұтымды пайдаланудың (жайылым ресурстарын пайдалану) жаңа технологияларын жасақтау» ғылыми-техникалық бағдарламасын іске асыру шеңберінде «Батыс Қазақстан жағдайындағы жайылымдарды суландыруды ұйымдастыру» жобасы шеңберінде орындалды.

ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

1. Loris, T. Estimating soil degradation in montane grasslands of North-eastern Italian Alps (Italy) [Text] / T. Loris, Wu. Jianshuang, M. Roberta, P. Mauro, T. Paolo // Heliyon. – 2019. – 5 (6). – P. 18-25.

2. O'Mara, F.P. The role of grasslands in food security and climate change [Text] / F.P. O'Mara // Annals of Botany. – 2012. – 110 (6). – P. 1263–1270.

3. Stybayev, G. Succession dynamics, quality, and production in improved and natural pastures in Northern Kazakhstan [Text] / G. Stybayev, N. Serekpayev, H. Yancheva, A. Baitelenova, A. Nogayev, O. Khurmetbek & N. Mukhanov // Bulg. J. Agric. Sci. – 2021. - 27 (Suppl. 1). - p. 95-102.

4. Evers, S.H. Effect of 3 Autumn Pasture Management Strategies Applied to 2 Farm System Intensities on the Productivity of Spring-Calving, Pasture-Based Dairy Systems [Text] / S.H. Evers, L. Delaby, C. Fleming, K.M. Pierce, B. Horan // J. Dairy Sci. – 2021. – 104. – P. 6803–6819.

5. Torekhanov, A.A. Kazakh Research Institute of Economy of Agro-Industrial Complex and Rural Development effective use of remote and near-village pastures of the Republic of Kazakhstan [Text] / A.A. Torekhanov, A.I. Sabirova // Probl. AgriMarket. – 2020. – P. 24–30.

6. Ongayev, M. Engineering and Process Infrastructure of the Agro-Industrial Complex [Text] / M. Ongayev, Z. Sultanova, S. Denizbayev, G. Ozhanov, S. Abisheva // International Journal of Emerging Trends in Engineering Research. – 2019. - Volume 7. - No. 12. - P. 879-885.

7. Ирзагалиев, Қ.С. Табиғи жайылымдарды ұтымды пайдалану мәселелері [Текст] / Қ.С. Ирзагалиев, М.Қ. Махамбет // Ғылым және білім. – 2021. - № 21-2 (63). – С. 26-29.

8. Алдияров, А.Б. Исследование возможности получения пресной воды на территории ЗКО для питьевых и хозяйственных нужд [Текст] / А.Б. Алдияров, А.Б. Шингужиева // Наука и образование. – 2020. - № 1-2 (58). – С. 144-148.

9. Ongayev, M. The zonality of underground water supply sources for pastures in the West Kazakhstan region [Text] / M. Ongayev, S. Denizbayev, N. Umbetkaliyev, B. Yesmagulova, T. Shadyarov, G. Ozhanov // Journal of Ecological Engineering. – 2022. - No. 23 (8). - P. 56-65.

10. Есполов, Т.И. Водные ресурсы в сельском хозяйстве Республики Казахстан: взгляд ученых на рациональное использование, перспективы и управление [Текст] / Т.И. Есполов, К.М. Тиреуов, У.К. Керимова // Проблемы агрорынка. – 2022. - № 3. – С. 155-163.

11. Тагаев, О.О. Анализ содержания химического состава воды модельных ферм ЗападноКазахстанской области [Текст] / О.О. Тагаев, З.С. Айтпаева, А.М. Давлетова, Е. Алпысбай // Наука и образование. – 2020. - № 3-1 (60). – С. 210-213.

12. Абишева, С.Х. Батыс Қазақстан облысындағы кейбір су ресурстарының сипаттамасы [Текст] / С.Х. Абишева, А.Л. Кисметова, Н.К. Досказиева // Ғылым және білім. – 2017. - № 1 (46). – С. 100-103.

13. Тургумбаев, А.А. О развитии бассейна р. Урал на территории Прикаспийской низменности [Текст] / А.А. Тургумбаев, Г.Т.-Г. Турикешев // Юг России: экология, развитие. – 2018. – № 2. - Т. 13. – С. 123-131.

14. Чашина, Б.А. Определение водосборных бассейнов средних и малых рек ЗападноКазахстанской области с применением инструментов программного обеспечения

Arcgis [Текст] / Б.А. Чашина // Global Science and Innovations: Central Asia. – 2021. - № 20 (12). – С. 45-50.

15. Ongayev, M. Underground Water Supply to Pastures [Text] / M. Ongayev, S. Denizbayev, G. Ozhanov, T. Shadyarov // International Journal of Mechanical Engineering. – 2021. – No. 3. – Vol. 6. – pp. 98-103.

REFERENCES

1. Loris, T. Estimating soil degradation in montane grasslands of North-eastern Italian Alps (Italy) [Text] / T. Loris, Wu. Jianshuang, M. Roberta, P. Mauro, T. Paolo // Heliyon. – 2019. – 5 (6). – P. 18-25.

2. O'Mara, F.P. The role of grasslands in food security and climate change [Text] / F.P. O'Mara// Annals of Botany. – 2012. – 110 (6). – P. 1263–1270.

3. Stybayev, G. Succession dynamics, quality, and production in improved and natural pastures in Northern Kazakhstan [Text] / G. Stybayev, N. Serekpayev, H. Yancheva, A. Baitelenova, A. Nogayev, O. Khurmetbek & N. Mukhanov // Bulg. J. Agric. Sci. – 2021. - 27 (Suppl. 1). - p. 95-102.

4. Evers, S.H. Effect of 3 Autumn Pasture Management Strategies Applied to 2 Farm System Intensities on the Productivity of Spring-Calving, Pasture-Based Dairy Systems [Text] / S.H. Evers, L. Delaby, C. Fleming, K.M. Pierce, B. Horan // J. Dairy Sci. – 2021. – 104. – P. 6803–6819.

5. Torekhanov, A.A. Kazakh Research Institute of Economy of Agro-Industrial Complex and Rural Development effective use of remote and near-village pastures of the Republic of Kazakhstan [Text] / A.A. Torekhanov, A.I. Sabirova // Probl. AgriMarket. – 2020. – P. 24–30.

6. Ongayev, M. Engineering and Process Infrastructure of the Agro-Industrial Complex [Text] / M. Ongayev, Z. Sultanova, S. Denizbayev, G. Ozhanov, S. Abisheva // International Journal of Emerging Trends in Engineering Research. – 2019. - Volume 7. - No. 12. - P. 879-885.

7. Irzagaliev, Қ.S. Tabiri zhajylymdardy ytymdy pajdalanu maselelerЯ [Tekst] / Қ.S. Irzagaliev, M.Қ. Mahambet // rylym zhane bЯlЯm. – 2021. - № 21-2 (63). – S. 26-29.

8. Aldiyarov, A.B. Issledovanie vozmozhnosti polucheniya presnoj vody na territorii ZKO dlya pit'evyh i hozyajstvennyh nuzhd [Tekst] / A.B. Aldiyarov, A.B. Shinguzhieva // Nauka i obrazovanie. – 2020. - № 1-2 (58). – S. 144-148.

9. Ongayev, M. The zonality of underground water supply sources for pastures in the West Kazakhstan region [Text] / M. Ongayev, S. Denizbayev, N. Umbetkaliyev, B. Yesmagulova, T. Shadyarov, G. Ozhanov // Journal of Ecological Engineering. – 2022. - No. 23 (8). - P. 56-65.

10. Espolov, T.I. Vodnye resursy v sel'skom hozyajstve Respubliki Kazahstan: vzglyad uchenyh na racional'noe ispol'zovanie, perspektivy i upravlenie [Tekst] / T.I. Espolov, K.M. Tireuov, U.K. Kerimova // Problemy agrorynka. – 2022. - № 3. – S. 155-163.

11. Tagaev, O.O. Analiz soderzhaniya himicheskogo sostava vody model'nyh ferm ZapadnoKazahstanskoj oblasti [Tekst] / O.O. Tagaev, Z.S. Ajtpaeva, A.M. Davletova, E. Alpysbaj // Nauka i obrazovanie. – 2020. - № 3-1 (60). – S. 210-213.

12. Abisheva, S.H. Batys Kazakstan oblysyndary kejbЯr su resurstarynyn sipattamasy [Tekst] / S.H. Abisheva, A.L. Kismetova, N.K. Doskazieva // rylym zhane bЯlЯm. – 2017. - № 1 (46). – S. 100-103.

13. Turgumbaev, A.A. O razvitii bassejna r. Ural na territorii Prikaspijskoj nizmennosti [Tekst] / A.A. Turgumbaev, G.T.-G. Turikeshev // Yug Rossii: ekologiya, razvitie. – 2018. – № 2. - T. 13. – S. 123-131.

14. Chashina, B.A. Opredelenie vodosbornyh bassejnov srednih i malyh rek ZapadnoKazahstanskoj oblasti s primeneniem instrumentov programmnogo obespecheniya Arcgis [Tekst] / B.A. Chashina // Global Science and Innovations: Central Asia. – 2021. - № 20 (12). – S. 45-50.

15. Ongayev, M. Underground Water Supply to Pastures [Text] / M. Ongayev, S. Denizbayev, G. Ozhanov, T. Shadyarov // International Journal of Mechanical Engineering. – 2021. – No. 3. – Vol. 6. – pp. 98-103.

РЕЗЮМЕ

В статье рассматривается состояние обводнения пастбищ как грунтовыми, так и поверхностными водами. Указывается, что обводнение может быть осуществлено без значительных затрат в регионах, где имеются поверхностные воды с хорошими санитарными характеристиками. Изучены количественные и качественные параметры открытых водоемов, таких как реки и каналы, используемых для обводнения пастбищ. Поверхностные источники воды, обладающие низкой минерализацией, являются наиболее доступными для пастбищного животноводства.

Западно-Казахстанская область изобилует реками, озерами и водными каналами, что способствует широкому использованию открытых водоемов для обводнения пастбищ. Наименьшие показатели обводнения пастбищ поверхностными водами наблюдаются в южных и сухих степных регионах. В отдаленных районах, расположенных вблизи водных источников, животноводство находится на среднем уровне, тогда как в северных областях — на высоком.

Для решения проблемы водоснабжения сельскохозяйственных угодий создаются прудокопани с водопойными площадками. Водообеспечение животноводческих ферм должно быть практичным и экономичным, обеспечивая качественные водные ресурсы, однако возникают трудности, связанные с поддержанием необходимого качества воды.

УДК 579.67.672
МРНТИ 65.63.03

Рыскалиева Балдай Жанайдаровна, магистр, https://orcid.org/0000-0003-2896-5405
КеАҚ «Жәңгір хан атындағы Батыс Қазақстан аграрлық-техникалық университеті», Орал қ. Жәңгір хан көшесі 51, 090009, Қазақстан, bryskalieva@mail.ru
Оразов Аян Жарилкасинович, техника ғылымдарының кандидаты, https://orcid.org/0000-0003-2191-1295
КеАҚ «Жәңгір хан атындағы Батыс Қазақстан аграрлық-техникалық университеті», Орал қ. Жәңгір хан көшесі 51, 090009, Қазақстан, orazov_ayan@mail.ru
Мыктыбаева Рая Жаксыгуловна, ветеринария ғылымдарының кандидаты, https://orcid.org/0000-0001-9459-453x
КеАҚ «Қазақ ұлттық аграрлық зерттеу университеті», Алматы қ. Абай даңғылы 8, Raya_Myktybayeva@mail.ru
Сармалаев Акылбек Абзалович, магистр, https://orcid.org/0000-0007-2362-8780
КеАҚ «Жәңгір хан атындағы Батыс Қазақстан аграрлық-техникалық университеті», Орал қ. Жәңгір хан көшесі 51, 090009, Қазақстан, sarmalayev@gmail.com

Ryskaliyeva Balday, master, https://orcid.org/0000-0003-2896-5405, NJSC «West Kazakhstan Agrarian and Technical University named after Zhangir khan», Uralsk, st. Zhangir khan 51, 090009, Kazakhstan, bryskalieva@mail.ru
Orazov Ayan, candidate of technical sciences, https://orcid.org/0000-0003-2191-1295,
NJSC «West Kazakhstan Agrarian and Technical University named after Zhangir khan», Uralsk, st. Zhangir khan 51, 090009, Kazakhstan, orazov_ayan@mail.ru
Myktybayeva Raya, candidate of veterinary sciences, https://orcid.org/0000-0001-9459-453x
NJSC «Kazakh National Agrarian Research University», Almaty, Abai Avenue 8, Kazakhstan, Raya_Myktybayeva@mail.ru
Sarmalayev Akylbek, master, https://orcid.org/0000-0007-2362-8780

NJSC «West Kazakhstan Agrarian and Technical University named after Zhangir khan», Uralsk, st. Zhangir khan 51, 090009, Kazakhstan, sarmalayev@gmail.com

СҮТ ҚЫШҚЫЛДЫ БАКТЕРИЯЛАРДЫ ОҚШАУЛАУ ЖӘНЕ ОЛАРДЫҢ ҚАСИЕТТЕРІН ЗЕРТЕУ
ISOLATION OF LACTIC ACID BACTERIA AND STUDYING THEIR PROPERTIES

АННОТАЦИЯ

Сүт қышқылы бактериялары ашыту процестеріндегі маңызды рөліне байланысты тамақ өнеркәсібінде кеңінен зерттелген микроорганизмдер. Олар ашытылған тағамдарды, соның ішінде сүт өнімдерін өндіруде кеңінен қолданылады. Кейбір сүт қышқылды бактериялар тұқымдары арнайы *Enterobacteriaceae* көмірсуларымен байланысып, олардың микробқа қарсы агенттермен адгезиясын және төмен молекулалы заттардың өндірісін тежеуі мүмкін. Сонымен қатар, бұл бактериялар бетіндегі рецепторларға жабысып, басқа бактерияларға улы әсер етуі мүмкін. Осы себепті олар тамақ пен токсикоинфекцияның алдын алу үшін адам денсаулығына өте пайдалы. Бұл микроорганизмдер бәсекелестік ерекшелік арқылы патогендердің берілу мүмкіндігін азайтады және әртүрлі тағамдардың сенсорлық өнімділігін жақсартады. Сүт қышқылы бактерияларының морфологиялық, мәдени және физиологиялық-биохимиялық қасиеттерін оқшаулау, анықтау және зерттеу стандартты әдістерге сәйкес жүргізілді. Морфологиялық белгілерді зерттеу барысында барлық бактериялардың қозғалмайтындығын, спорасыз, Граммен оң боялатындығы анықталды. Осы белгілерге сәйкес олар лактобактериялар тұқымдасының типтік өкілдері болып табылады. Шұбат үлгілерінен 8 изолят бөлінді, олардың барлығы Грам-оң және каталаза-теріс болды. Зерттелген Лактобактериялар өт, натрий хлоридіне және ортаның pH-на әсерін зерттеу штаммдардың химиялық агрессивті орта факторларына төзімділігін көрсетті.

ANNOTATION

Lactic acid bacteria are microorganisms widely studied in the food industry due to their important role in fermentation processes. They are widely used in the production of fermented foods, including dairy products. Some lactic acid bacteria seeds can bind to specific Enterobacteriaceae carbohydrates and inhibit their adhesion with antimicrobial agents and the production of low molecular weight substances. In addition, these bacteria can attach to receptors on the surface and have a toxic effect on other bacteria. For this reason, they are very beneficial for human health to prevent food and toxicoinfection. These microorganisms reduce the chance of transmission of pathogens through a competitive exception and improve the sensory performance of different foods. Isolation, determination and study of morphological, cultural and physiological-biochemical properties of lactic acid bacteria was carried out according to standard methods. In the course of the study of morphological features, it was found that all bacteria are immobile, non-spore-bearing, positively colored in grams. According to these signs, they are typical representatives of the Lactobacillus family. 8 isolates were separated from the shubat samples, all of which were Gram-positive and catalase-negative. The study of the effects of lactobacilli studied on bile, sodium chloride and the pH of the medium showed the resistance of strains to chemically aggressive environmental factors.

Кілт сөздер: *сүт қышқылды бактерия, тамақ өнеркәсібі, лактобатериялар, Грам реакция, изолят*

Key words: *lactic acid bacterium, food industry, lactobateries, Gram reaction, isolate*

Кіріспе. Сүт қышқылы бактериялары ашыту процестеріндегі маңызды рөліне байланысты тамақ өнеркәсібінде кеңінен зерттелген микроорганизмдер. Олар ашытылған

тағамдарды, соның ішінде сүт өнімдерін өндіруде кеңінен қолданылады. Олардың текстурасы мен дәмін дамытуға қосқан үлесінен басқа, ортаның pH деңгейін төмендетіп, патогендердің өсуін тежейтін сүт және сірке қышқылдары сияқты органикалық қышқылдарды өндіру арқылы азық-түлік қауіпсіздігін айтарлықтай арттырады [1].

Сүт қышқылы бактериялары - грам-позитивті, спора түзбейтін, каталаза-теріс және аэротолерантты бактериялардың кең тобы. Олар морфологиясына, әртүрлі температурада өсуіне және тұзға төзімділігіне қарай жіктеледі [2]. Сүт қышқылы бактериялары табиғи түрде сүтте, өсімдіктерде, ашытылған сүт және көкөніс өнімдерінде, адамдар мен жануарлардың асқазан-ішек жолдарында, сондай-ақ суда және топырақта болатын әртүрлі және кең таралған бактериялық топты құрайды. Бұл бактериялар әсіресе көмірсулардың ашытуының соңғы өнімі болып табылатын сүт қышқылын өндіру қабілетімен танымал [3].

Сүт қышқылы бактериялары тамақ өнеркәсібінде маңызды рөл атқарады. Бұл микроорганизмдердің көпшілігі жалпыға бірдей қауіпсіз, өйткені олар патогенді емес, технологиялық және өндірістік процестерде пайдалы, қышқылдар мен өттерге төзімді және микробқа қарсы заттар шығаруға қабілетті. Кең филогенетикалық және функционалдық әртүрлілігінің арқасында тамақ өнеркәсібінде қолданылатын микроорганизмдердің белгілі класы [4].

Кейбір сүт қышқылды бактериялар тұқымдары арнайы *Enterobacteriaceae* көмірсуларымен байланысып, олардың микробқа қарсы агенттермен адгезиясын және төмен молекулалы заттардың өндірісін тежеуі мүмкін. Сонымен қатар, бұл бактериялар бетіндегі рецепторларға жабысып, басқа бактерияларға улы әсер етуі мүмкін. Осы себепті олар тамақ пен токсикоинфекцияның алдын алу үшін адам денсаулығына өте пайдалы. Бұл микроорганизмдер бәсекелестік ерекшелік арқылы патогендердің берілу мүмкіндігін азайтады және әртүрлі тағамдардың сенсорлық өнімділігін жақсартады [5,6].

Зерттеу материалдары мен әдістері.

1. Сүт қышқылды бактериялардың таза дақылдарын сүттен-түйенің әртүрлі тұқымдарынан алынған шикізат пен оны қайта өңдеу өнімдерінен бөліп алу.

2. Физиологиялық-биохимиялық ерекшеліктерді зерттеу негізінде лактобактериялардың ең белсенді изоляттарын таңдау.

3. Түйе сүтін өңдеудің ұлттық өнімдерінен оқшауланған, айқын пробиотикалық қасиеттері бар *Lactobacillus* лактобактерияларының штамдарын зерттеу.

Зерттеу әдістері. Зерттеу барысында дәстүрлі микробиологиялық, биологиялық, физика-химиялық және органолептикалық зерттеу әдістері қолданылды. Нысандарды зерттеу үшін levenhuk medo 10T LCD микроскоп, PD-303 спектрофотометрі, pH-метр Consort C931, автоклав, термостаттар, тоңазытқыш, центрифуга ОПН 3,01 Dastan, қоректік орталар, химиялық реактивтер, өлшеуіш шыныдар, цилиндрлер, колбалар, пробиркалар және т. б. пайдаланылды.

Лактобактерияларды оқшаулау үшін Батыс Қазақстан аумағындағы әр түрлі өңірлерден алынған түйе сүті мен шұбат пайдаланылды.

Сүт қышқылы бактерияларының морфологиялық, мәдени және физиологиялық-биохимиялық қасиеттерін оқшаулау, анықтау және зерттеу стандартты әдістерге сәйкес жүргізілді. Сүт қышқылы бактерияларының изоляттары гидролизденген сүт және MRS қоректік орталарында бөлінді [7,8]. Оқшауланған изоляттар морфологиялық, культуралдық және физиологиялық биохимиялық қасиеттері бойынша зерттелді [9,10,11,12]. Алдын ала идентификациялау үшін MRS қоректік ортасынан бөлінген барлық колониялар Граммен боялып, каталаза белсенділігіне тексерілді.

Сүт қышқылы таяқшаларының фенолға төзімділігін анықтау үшін 10 мл стерильді майсыз сүтке 1 мл 4% стерильді сулы фенол ерітіндісі (0,4%) қосылды. Сүт пен фенол түтіктері мұқият шайқалып, зерттелетін сүт қышқылы бактерияларының 1 тамшысымен себілді, термостатқа орналастырылды және оңтайлы өсу температурасында 48 сағатқа дейін сақталды [11,12].


Ортаның сілтілі реакциясына СҚБ тұрақтылығын анықтау үшін зерттелетін штамдар 2% ашытқы автолизаты бар ет-пептон сорпасына себілді (8-10 мл-ге 1 бактериалдық ілмек). Сүт қышқылы таяқшалары pH 8,3 болатын ортада сыналды. Дақылдар термостатта 48 сағатқа қойылды.

Сүт қышқылы бактерияларының өтке төзімділігін анықтау үшін құрамында өт бар гидролизденген сүтке (pH 6,8-7,0) зерттелетін сүт қышқылы бактерияларының штамдары егілді (8-10 мл ортаға 1 ілмек мөлшері). Сүт қышқылды бактериялар құрамында 20 және 40% өт бар ортаға егілді. Дақылдар термостатта 48 сағат бойы сақталды.


СҚБ ас тұзына төзімділігін анықтау үшін СҚБ дақылдары әртүрлі тұз құрамы бар 8-10 мл гидролизденген сүтке (pH 6,8-7,0) бір ілмек мөлшерінде себілді. Сүт қышқылы таяқшалары 2 және 4% NaCl және 6% NaCl бар ортада зерттелді.

Зерттеу нәтижелері. MRS қоректік ортасында біркелкі, айқын контурлары бар тегіс, мөлдір емес, дөңес колониялар құрады. Колониялар ақ, сәл крем түсті.

Морфологиялық белгілерді зерттеу барысында барлық бактериялардың қозғалмайтындығын, спора түзбейді, Грам реакциясы оң боялатындығы анықталды. Осы белгілерге сәйкес олар лактобактериялар тұқымдасының типтік өкілдері болып табылады (сурет 1,2).



Сурет 1 – Сүт қышқылы бактерияларының оқшауланған изоляттары



Сурет 2 - Оқшауланған изоляттардың Грам реакциясын анықтау

Шұбат үлгілерінен 8 изолят бөлінді, олардың барлығы Грам-оң және каталаза-теріс болды. Грам-позитивті және каталаза-теріс штамдар лактобактерияларға жатады.

Лактобактериялардың түрлік сәйкестендірілуі олардың культуралық, морфологиялық қасиеттерін, қышқыл түзілу энергиясын, NaCl, фенолдың қатысуымен, ортаның сілтілі реакциясы кезінде, сондай-ақ олардың ферментативті қасиеттерін ескере отырып, қоректік ортада өсу қабілетін зерттеу негізінде жүзеге асырылды.

Технологиялық өңдеу және тағамға тұтыну процесінде лактобактериялар фенол, өт, натрий хлориді сияқты табиғи химиялық заттарға ұшырайтыны белгілі. Алынған мәліметтер 1-кестеде келтірілген.

Кесте 1 - Лактобактериялардың жаңа изоляттарының культуралық қасиеттері және химиялық факторларға төзімділігі

Сүт қышқылдық бактериялар	Грам реакциясы	Өсу температурасы, ºС			Сүтте өсу температурасы, ºС			ЕПС өсу, pH= 8,3	0,4% фенолы бар сүтте өсу	NaCl бар ГС өсуі, %			Құрамында өт бар ГС өсуі, %	
		20	40	45	15	40	45			2	4	6	20	40
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Sh-14L	+	-	+	+	-	+	+	+	+	+	+	-	+	+
Sh-21L	+	-	+	+	-	+	+	+	+	+	+	-	+	+
Sh-28L	+	-	+	+	-	+	+	+	+	+	+	-	+	+
Sh 23L	+	-	+	+	-	+	+	+	+	+	+	-	+	+
Sh-08L	+	-	+	+	-	+	+	+	+	+	+	-	+	+
Sh-02L	+	-	+	+	-	+	+	+	+	+	+	-	+	+
Sh-07L	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	-	+	+
Sh-10L	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	-	+	+

Қорытынды: Шұбат үлгілерінен 8 изолят бөлінді, олардың барлығы Грам-оң және каталаза-теріс болды. Грам-позитивті және каталаза-теріс штамдар лактобактерияларға жатады. Зерттелетін штамдар гидролизденген сүтте, 40, 45 °С температурада жақсы өсті, ал 15 °С температурада өспеді. Ет пептонды сорпада pH 8,3 және құрамында 0,4% фенолы бар сүтте және құрамында 2%, 4% NaCl бар гидролизденген сүтте штаммдардың өсу байқалды, ал 6% NaCl-де штаммадардың өсуі болмады. Зерттелген лактобактериялар өт, натрий хлоридіне және ортаның pH-на әсерін зерттеу штаммдардың химиялық агрессивті орта факторларына төзімділігін көрсетті. Қазіргі уақытта микробиологияның перспективалы және сұранысқа ие бағыттарының бірі пробиотикалық препараттар мен функционалды тамақтану өнімдерін жасау үшін сүт қышқылы бактерияларының жаңа штамдарын іздеу болып табылады [13, 14,15].

Алғыс. Зерттеу Қазақстан Республикасы ЖБҒМ-ң Ғылым Комитетінің AP23490202 «Түйе сүтінен өңделген өнімдерден бөлініп алынған сүтқышқылды пробиотикалық штаммдар *(Lactobacillus)* негізінде кешенді биологиялық белсенді компонент әзірлеу» жобасы аясында жүргізілді.

ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

1. Abdul Hakim B. N. A comprehensive review of bioactive compounds from lactic acid bacteria: Potential functions as functional food in dietetics and the food industry / B.N. Abdul Hakim, N.J. Xuan, S.N.H. Oslan // Foods. – 2023. – Т. 12. – №. 15. – С. 2850.

2. Amanullah, S. Isolation, identification and biochemical characterization of lactic acid bacteria from selected yogurt samples / S.M. Amanullah, M.A. Kabir, M.M. Rahman, P. Halder, S.M.J. Hossain, M.A. Samad // Bangladesh Journal of Livestock Research. – 2020. – С. 64-72.

3. Ahmadi, El.K. Isolation and preliminary screening of lactic acid bacteria for antimicrobial potential from raw milk / El.K. Ahmadi, K. Haboubi, El.H. Allaoui, El. Y. Hammoudani, M. Bouhrim, B. Eto. R.N. Herqash // Frontiers in Microbiology. – 2025. – Т. 16. – С. 1565016.

4. Bergey's manual of systematic bacteriology. Second edition. Volume three. The Firmicutes - Springer Science Business Media, LLC, 233 Spring Street, New York, NY 10013, USA. – 2009. – 1422 p.

5. Goa, T. Isolation and characterization of lactic acid bacteria from fermented milk produced in Jimma Town, Southwest Ethiopia, and evaluation of their antimicrobial activity

against selected pathogenic bacteria / T. Goa, G. Beyene, M. Mekonnen, K. Gorems, // International journal of food science. – 2022. – Т. 2022. – №. 1. – С. 2076021.

6. Leska A. Isolation and some basic characteristics of lactic acid bacteria from honeybee (Apis mellifera L.) Environment—A preliminary study / A. Leska, A. Nowak, I. Motyl //Agriculture. – 2022. – Т. 12. – №. 10. – С. 1562.

7. Morante-Carriel, L. Isolation and characterization of lactic acid bacteria from cocoa mucilage and meat: exploring their potential as biopreservatives for beef / L. Morante-Carriel, F. Abasolo, C. Bastidas-Caldes, E.A. Paz, R. Huaquipán, R. Díaz, J. Quiñones // Microbiology Research. – 2023. – Т. 14. – №. 3. – С. 1150-1167.

8. Банникова, Л. А. Селекция молочнокислых бактерий и их применение в молочной промышленности / Л. А. Банникова – М.: Пищевая промышленность, 1975. – 255 с.

9. Иркитова А.Н., Яценко Е.С. Оптимизация метода определения антагонистической активности пробиотических бактерий. ТППП АПК. 2017, 5(19): 113-117 (https://lyl.su/MLJQ).

10. Иркитова А. Н., Каган Я. Р., Соколова Г. Г. Сравнительный анализ методов определения антагонистической активности молочнокислых бактерий / А.Н. Иркитова, Я.Р. Каган, Г.Г. Соколова // Известия Алтайского государственного университета. 2012, 3(1): 41-44. (https://lyl.su/8pjs)

11. Лихачева, А.Ю. Совершенствование видовой идентификации лактобацилл с использованием микрокультуральных тест-систем и данных строения генома // Журн. микробиологии, эпидемиологии и иммунологии. - 1995. - № 5. - С.45-48.

12. Соловьева И.В. Изучение биологических свойств новых штаммов рода Lactobacillus. / И.В. Соловьева, А.Г. Точилина, Н.А. Новикова, И.В. Белова, Т.П. Иванова, К.Я. Соколова // Вестник ННГУ. 2010, 2(2): 462-468 (https://lyl.su/gRfo)

13. Точилина А.Г. Изучение биологических свойств штаммов рода lactobacillus / А.Г. Точилина, И.В. Белова, И.В. Соловьева, Н.А. Новикова, Т.П. Иванова, В.А. Жирнов // Современные проблемы науки и образования. – 2015. – № 5.

14. Тулемисова, Ж.К. Сохранение свойств коллекционных штаммов микроорганизмов // Биотехнология. Теория и практика. - 2002. - № 1. - С. 75-77.

15. Хоуит Д.Ж. Краткий определитель бактерий Берги.-Изд. «Мир». - 1997.9.е изд.-1-2 т.-с.790.

REFERENCES

1. Abdul Hakim B. N. A comprehensive review of bioactive compounds from lactic acid bacteria: Potential functions as functional food in dietetics and the food industry / B.N. Abdul Hakim, N.J. Xuan, S.N.H. Oslan // Foods. – 2023. – Т. 12. – №. 15. – С. 2850.

2. Amanullah, S. Isolation, identification and biochemical characterization of lactic acid bacteria from selected yogurt samples / S.M. Amanullah, M.A. Kabir, M.M. Rahman, P. Halder, S.M.J. Hossain, M.A. Samad // Bangladesh Journal of Livestock Research. – 2020. – С. 64-72.

3. Ahmadi, El.K. Isolation and preliminary screening of lactic acid bacteria for antimicrobial potential from raw milk / El.K. Ahmadi, K. Haboubi, El.H. Allaoui, El. Y. Hammoudani, M. Bouhrim, B. Eto. R.N. Herqash // Frontiers in Microbiology. – 2025. – Т. 16. – С. 1565016.

4. Bergey’s manual of systematic bacteriology. Second edition. Volume three. The Firmicutes - Spring-er Science+Business Media, LLC, 233 Spring Street, New York, NY 10013, USA. – 2009. – 1422 p

5. Goa, T. Isolation and characterization of lactic acid bacteria from fermented milk produced in Jimma Town, Southwest Ethiopia, and evaluation of their antimicrobial activity against selected pathogenic bacteria / T. Goa, G. Beyene, M. Mekonnen, K. Gorems, // International journal of food science. – 2022. – Т. 2022. – №. 1. – С. 2076021.

6. Leska A. Isolation and some basic characteristics of lactic acid bacteria from honeybee (Apis mellifera L.) Environment—A preliminary study / A. Leska, A. Nowak, I. Motyl //Agriculture. – 2022. – Т. 12. – №. 10. – С. 1562.

7. Morante-Carriel, L. Isolation and characterization of lactic acid bacteria from cocoa mucilage and meat: exploring their potential as biopreservatives for beef / L. Morante-Carriel, F. Abasolo, C. Bastidas-Caldes, E.A. Paz, R. Huaquipán, R. Díaz, J. Quiñones // Microbiology Research. – 2023. – Т. 14. – №. 3. – С. 1150-1167.

8. Bannikova, L. A. Selection of lactic acid bacteria and their use in the dairy industry / L. A. Bannikova - M.: Food industry, 1975. 255 p.

9. Irkitova A.N., Yatsenko E.S. Optimization of the method for determining the antagonistic activity of probiotic bacteria. CCI of the agro-industrial complex. 2017, 5(19): 113-117 (https://lyl.su/MLJQ).

10. Irkitova A. N., Kagan Ya. R., Sokolova G. G. Comparative analysis of methods for determining the antagonistic activity of lactic acid bacteria / A.N. Irkitova, Ya.R. Kagan, G.G. Sokolova // Proceedings of the Altai State University. 2012, 3(1): 41-44. (https://lyl.su/8pjs)

11. Likhacheva, A.Y. Improving the species identification of lactobacilli using microcultural test systems and genome structure data // Journal of Microbiology, Epidemiology and Immunology. - 1995. - No. 5. - pp.45-48.

12. Solovyova I.V. Study of biological properties of new strains of the genus Lactobacillus. / I.V. Solovyova, A.G. Tochilina, N.A. Novikova, I.V. Belova, T.P. Ivanova, K.Ya. Sokolova // Bulletin of the UNN State University. 2010, 2(2): 462-468 (https://lyl.su/gRfo

13. Tochilina A.G. Study of biological properties of lactobacillus genus strains / A.G. Tochilina, I.V. Belova, I.V. Solovyova, N.A. Novikova, T.P. Ivanova, V.A. Zhirnov // Modern problems of science and education. – 2015. – № 5.

14. Tulemisova, J.K. Preservation of the properties of collection strains of microorganisms //Biotechnology. Theory and practice. - 2002. - No. 1. - pp. 75-77

15. Howitt D.J. A brief definition of Bergi bacteria. - Ed. "Mir".- 1997.9th ed.-1-2 vol.-p.790.

АННОТАЦИЯ

Молочнокислые бактерии-это микроорганизмы, широко изучаемые в пищевой промышленности из-за их важной роли в процессах ферментации. Они широко используются при производстве ферментированных продуктов, в том числе молочных продуктов. Некоторые молочнокислые бактерий могут связываться со специфическими углеводами *Enterobacteriaceae*, подавляя их адгезию с антимикробными агентами и производство низкомолекулярных веществ. Кроме того, эти бактерии могут прикрепляться к рецепторам на поверхности и оказывать токсическое действие на другие бактерии. По этой причине они очень полезны для здоровья человека для предотвращения пищевых и токсикоинфекций. Эти микроорганизмы снижают вероятность передачи патогенов через конкурентное исключение и улучшают сенсорные характеристики различных продуктов. Выделение, выявление и исследование морфологических, культурных и физиологико-биохимических свойств молочнокислых бактерий проводилось в соответствии со стандартными методами. При изучении морфологических признаков было установлено, что все бактерии неподвижны, не содержат спор, положительно окрашены по Граму. По этим признакам они являются типичными представителями семейства лактобактерий. Из образцов шубата было выделено 8 изолятов, все из которых были грамположительными и каталазно-отрицательными. Исследования влияния изученных лактобактерий на желчь, хлорид натрия и pH среды показали устойчивость штаммов к химически агрессивным факторам среды.

УДК: 579.66
ГРНТИ: 34.27.51;34.03.47

Саданов А.Қ., биология ғылымдарының докторы, профессор, https://orcid.org/0009-0000-0761-0205

Микробиология және вирусология ғылыми-өндірістік орталығы ЖШС, Бөгенбай батыр к. 105, Алматы қ., Қазақстан Республикасы, a.sadanov1951@gmail.com
Шорабаев Е.Ж., биология ғылымдарының кандидаты, https://orcid.org/0009-0006-3823-5325
Өнеркәсіптік микробиология ЖШС, Әль-Фараби д., 89/44, Алматы қ., Қазақстан Республикасы, pmtoo@mail.ru
Таубекова Ғ.Қ., ветеринария ғылымдарының кандидаты, доцент, https://orcid.org/0000-0002-6298-1401
Өнеркәсіптік микробиология ЖШС, Әль-Фараби д., 89/44, Алматы қ., Қазақстан Республикасы, pmtoo@mail.ru
Мұхамбетов Б., ауыл шаруашылығы ғылымдарының докторы, профессор.
Х. Досмұхамедов атындағы Атырау университеті, Студенттік д., 212, Атырау қ., Қазақстан Республикасы

Sadanov A. K., Doctor of biological sciences, professor, https://orcid.org/0009-0000-0761-0205
LLP "Scientific and production center of microbiology and virology", Bogenbay batyr STR. 103, Almaty, Republic of Kazakhstan, a.sadanov1951@gmail.com
Shorabaev E. Zh., candidate of Biological Sciences, https://orcid.org/0009-0006-3823-5325
Industrial microbiology LLP, 89/44 Al-Farabi Ave., 050060, Almaty, Republic of Kazakhstan, pmtoo@mail.ru
Taubekova G. K., candidate of Veterinary Sciences, Associate Professor, Head of the marketing department. https://orcid.org/0000-0002-6298-1401
Industrial microbiology LLP, 89/44 Al-Farabi Ave., 050060, Almaty, Republic of Kazakhstan, pmtoo@mail.ru
Mukhambetov B., Doctor of agricultural sciences, professor.
Atyrau University named after H. Dosmukhamedov, Student st., 212, Atyrau, Republic of Kazakhstan

ҚҰНАРЫ ТӨМЕНДЕГЕН ТҰЗДЫ ТОПЫРАҚТЫҢ ҚҰНАРЫН АРТТЫРУ ЖӘНЕ ЖОҒАРЫ САПАЛЫ ЖЕМ-ШӨП БАЗАСЫН ДАЙЫНДАУ

АННОТАЦИЯ

Бұл мақалада, тұзданған топырақтың тұздылығын жоюдың белгілі дәстүрлі әдістері бүгінгі таңда түрлі себептерге байланысты қолданылмай отырғаны, ауылшаруашылық саласын дамыту мақсатында химиялық тыңайтқыштарды үзіліссіз шамадан тыс қолданудың, пайдасымен қатар тигізетін кері әсерлері, топырақтың экологиялық жағдайларын жақсартудың және екінші рет тұзданған топырақты қалпына келтірудің бірден бір тәсілі ретінде – кешенді түрде тұзға төзімді өсімдіктерді фитомелиораттарды және биологиялық препараттарды қолдану қарастырылған.

ANNOTATION

This article considers that traditional methods of reclamation of saline soils are currently not used for various reasons. As a result of the intensification of agriculture, with an ever-increasing anthropogenic and especially chemical load on soils, instead of a positive effect, a negative one is observed. The only way to improve the ecological conditions of the soil and restore secondary saline soils is to comprehensively use salt-resistant plants such as phytomeliorates and biological preparations.

***Key words**: secondary salinization, phytomeliorant, biologics, biofertilizers.*
***Түйін сөздер**: екінші рет тұздалу, фитомелиорант, биологиялық препараттар, биотыңайтқыштар.*

Кіріспе. Орталық Азия халқының шамамен 60%-ы азық-түлік пен кіріс көзі ретінде ауыл шаруашылығына тәуелді екенін Біріккен Ұлттар Ұйымы (ФАО) мен Жаһандық Экологиялық Қордың (ЖЭҚ) азық-түлік және ауыл шаруашылығы қауіпсіздігі жобасы аясында атап өтілді. Осы өңірдегі суармалы жерлердің 40- 60% - на дейін тұзды немесе батпақты болып табылады [1,2].

Қазіргі уақытта осындай күрделі мәселелердің бірі – Қазақстанның Оңтүстігіндегі суармалы жерлердің екінші рет тұзденуы мен қарашірік мөлшерінің едәуір азаюы болып отыр. Мұндай жерлерге, Қызылорда, Оңтүстік-Қазақстанның (Шардара ауданы) және Алматы облысының Балқаш, Үштөбе өңірлеріндегі күріш өсіретін егістік алқаптарын жатқызуға болады. Әрине, тұзды топырақтың ауыл шаруашылығы дақылдарын өсіруге тиімсіз болатыны белгілі.

Еліміздегі ең маңызды су көздерінің бірі – Сырдария өзені іргеміздегі шекаралас мемлекеттердің аумағын басып өтеді. Оған қоса, Сыр өзені өндірістік және шаруашылық-тұрмыстық қалдықтармен қатты ластанған. Аталған ахуал Іле өзенінде де байқалады. Әсіресе, тұзданған топырақтарды тазалаудың баршаға белгілі дәстүрлі әдістеріне жататын шаю, гипстеу, химиялық мелиоранттармен өңдеу бүгінгі таңда түрлі себептерге байланысты қолданылмай отыр. Ауылшаруашылық саласын дамыту мақсатында химиялық тыңайтқыштарды үзіліссіз шамадан тыс қолданудың пайдасымен қатар тигізетін кері әсерлері де белгілі. Топырақ – тірі организм екенін ескерер болсақ, топырақта тіршілік ететін микроорганизмдердің тыныс-тіршілігіне қалыпты жағдай жасаған кезде ғана оның құнарын өз дәрежесінде сақтап, ауылшаруашылық дақылдарынан бірқалыпты межелі өнім алуымызға мүмкіндік туады. Бір сөзбен айтқанда, тұзды топырақты бастапқы қалпына келтірудің ғылыми жолдарын жан-жақты қарастыру бүгінгі күннің негізгі мәселелерінің бірі болып отыр. Бүгінгі таңда бұл мәселе тек біздің елде ғана емес, бүкіл әлемнің күн тәртібінде тұрған мәселе екендігін ескерген жөн [3].

Кез келген мемлекет, суармалы жерлерінің құнарына байланысты ұзақмерзімді болжам жасауы керек, яғни сол елдің азық-түлікке деген нақты қажеттілігі мен топырақ құнарының арасында тікелей байланыс болуы тиіс. Осыған орай, Микробиология және вирусология ғылыми-өндірістік орталығының ғалымдары айналымнан шыққан құнары төмен тұзданған егістік жерлердің елеулі бөлігін ауылшаруашылық дақылдарын өсіруге, яғни құнарын арттырып, тұздылығын жойып, қайтадан пайдалану жолдарын қарастыруда. Бұл – өте күрделі шаруа. Орталық ғалымдарының іргелі ғылыми ізденістерінің нәтижесінде экологиялық ахуалы сын көтермейтін топырақтардың құнарын арттыруда химиялық әдістерге балама биологиялық әдістері ұсынылып отыр.

Экономикасы жоғары дамыған елдер қазіргі уақытта ауылшаруашылық саласында химиялық қоспаларды қолданудан бас тартып, табиғи биологиялық таза әдістерді толық пайдалануды ұсынып отыр. Бұл әдістің ерекшелігі сонда, топыраққа табиғи органикалық заттарды ендіру және топырақтың құнарын арттыратын өсімдіктерді егу арқылы топырақтың биологиялық белсенділігін арттыруға жауапты микроорганизмдердің тыныс-тіршілігін қадағалап, өз дәрежесінде реттеп отыруға мүмкіндік туады.

Осыған орай, соңғы уақытта топырақтың құнарын арттырудың, әсіресе екінші рет тұзданған топырақты қалпына келтірудің бірден бір тәсілі – тұзға төзімді жергілікті өсімдіктерді пайдалану арқылы іске асырылып келеді. Бұл тәсілді ғылыми тілде фитомелиорация деп те атайды.

Қазақстанның оңтүстігі мен оңтүстік-шығысындағы суармалы аймақтардың топырағының құнарын арттыру үшін тұзға төзімді фитомелиоранттардың бірі бұршақ тұқымдас өсімдігіне жататын түйежоңышқаның болашағы зор. Өйткені, бұл өсімдік топырақтың құрамындағы тұзды тамырлары арқылы өз бойына сіңіріп алады да, оның мөлшерін едәуір азайтады. Түйежоңышқаның екі жылдық өсімдік екенін ескерсек, топырақтағы тұздардың мөлшері бірінші жылдың өзінде екі есеге, ал екінші жылында – 70-80 пайызға дейін төмендейді.

Бұған қоса, басқа азықтық бұршақ тектес дақылдармен салыстырғанда, түйежоңышқаның азықтық құндылығы мен өнімділігі едәуір жоғары. Ол суармалы егістіктерде бір вегетациялық кезеңінің өзінде-ақ сортына байланысты 350-ден 800 ц/га дейін көк балауса береді.

Сонымен, түйежоңышқа тұзды топырақтың құнарын арттыруда фитомелиорант есебінде және жоғары сапалы мал азығы ретінде ерекше дақыл. Бұл дақыл бұршақ тұқымдас өсімдік ретінде топыраққа тамырларында түзілетін түйнек бактериялары арқылы биологиялық таза азотты ауадан өз бойына сіңіреді. Әрі тамыр қалдықтарымен бірге түсетін биологиялық азоттың мол қоры топырақты байытып қана қоймай, келесі жылы егілетін дақылдар үшін де құнардың қайнар көзіне айналады. Сондықтан да Қазақстанның суармалы егіншілік өңірлерінде екінші рет тұзданған егіс алқаптарын биологиялық әдіспен қалпына келтіру үшін түйежоңышқа өсірудің маңызы ерекше.

Алайда, қазіргі уақытта елімізде түйежоңышқаны топырақ құнарын арттыратын фитомелиорант есебінде және де жоғары сапалы мал-азықтық дақыл ретінде кең көлемде пайдалануға, сондай-ақ осы дақылдың тұқым шаруашылығын кеңінен ұйымдастыруға кедергі келтіретін мәселелер де жоқ емес [4,5].

Сондай мәселелердің бірі – түйежоңышқаның тұқымдық дәнінің сыртқы қабығының қатты болуына байланысты шығымдылығының өте төмен болуында.

Сондықтан, көп жағдайда түйежоңышқа егілген алқаптардың ¼ бөлігі бос қалады, өйткені себілген тұқымдардан тек 30-40 пайыз, ал кейбір өңірлерде тіпті 15-20 пайызы ғана өніп шығады.

Тұқымдық дәннің өнімділігін арттыру үшін түрлі әдістер қарастырылған. Әсіресе, өндірісте көбінесе арнайы машиналардың көмегімен механикалық зақымдау /скарификация/ әдісі жиі қолданылады. Аталған әдіс көп жағдайда дәннің қабығын ғана ыдыратып қоймай, сонымен қатар оның ішкі құрылысын да едәуір зақымдап дәннің физиологиялық өніп-өсу процестеріне кері әсерін тигізеді. Оған қоса бұл әдіс, яғни механикалық скарификация едәуір қосымша шығынды да талап ететіні анық.

Осы орайда, біздің ғалымдарымыз аталған әдісті алмастыра алатын, тұқымдық дәннің шығымдылығын биологиялық жолмен арттыратын тиімділігі жоғары «**Фитобацирин**» отандық биопрепаратын әзірлеп, оны өндіріске пайдаланып та үлгерді. Оның негізін Қазақстанның топырақ-климаттық жағдайына бейімделген және целлюлоза ферментін синтездеуге қабілетті целлюлолитикалық бактериялар құрайды. Тұқымдық дәнді топыраққа себу алдында препаратпен өңдеу дәннің сыртқы қалың қатты целлюлоза қабатының ыдырауына тікелей әсер етеді. Нәтижесінде тұқымдық дәннің шығымдылығы едәуір артады. Әдетте тұқымдық дәнді биопрепаратпен өңдемей сепкен кезде гектарына 18-20 кг егілген дәннің ¼ бөлігі, яғни себілген тұқымның 3-4 кг ғана өніп шығады. Ал, тұқымдық дәнді себу алдында биопрепаратпен өңдеген жағдайда, аталған дақылдың шығымдылығы 80-90 пайызға дейін артты. Бұл себуге кететін тұқымдық дәннің 9-10 кг жуығын үнемдеуге мүмкіндік береді, яғни бір гектарға себетін тұқымдық дәнінің өзінен ғана 12-14 мың теңге үнемдеуге болады [5,6].

Сонымен қатар, түйежоңышқа топырақта табиғи жолмен гектарына шамамен 50-60 кг биологиялық азотты жинақтайтын ең тиімді дәнді-бұршақты дақылдардың бірі болып саналады. Алайда, азоттың бұл мөлшері бірінші және екінші жылғы вегетациялық кезеңде аталған дақылдан жоғары өнім алу үшін жеткіліксіз. Осыған байланысты, біз түйежоңышқаның өнімділігін арттыру үшін, түйнек бактериялары негізінде әзірленген «**Ризовит-АКС**» биологиялық препаратымен өңдеуді ұсынып отырмыз, бұл препарат түйежоңышқаның көк балаусасын екі-үш есеге дерлік арттырып қана қоймай, оның тұқымдық дәнінің де өнімділігін 2 есеге арттырады.

Аталған препараттың тиімділігінің бірден бір дәлелі – топырақта бір вегетациялық кезеңнің өзінде гектарына 300-400 кг биологиялық азоттың жинақталуында.

Тағы бір ескеретін жайт, түйежоңышқа өсімдігінде 0,5-тен 1,5 пайызға дейінгі мөлшерде, әсіресеі, гүлдену кезеңінде иісі қолайсыз, қышқыл дәмді кумарин алкалоиды

түзіледі. Сондықтан, ауылшаруашылық малдары оның көк балаусасын мал азығы ретінде жемей қояды [7,8]. Сондықтан да, өндірістік жағдайларда көпшілік шаруа қожалықтары амалсыздан оны орып, пішен дайындауға мәжбүр. Пішен дайындау үшін ең кемінде 2-3 күн кептірілуі керек, ал кепкен кезде оның жапырақтары түсіп (70-80%-ға дейін) құрамындағы керектік заттар төмендейді.

Яғни, түйежоңышқаның көк балаусасын мал азығы ретінде дұрыс пайдалана алмасақ, бұл дақылдың егістік көлемінің артуы екіталай.

Мал өнімділігін арттырудың маңызды шарттарының бірі – малды азықтандырудың қыстық түрін жаздық түріне барынша жақындату болып табылады. Мұндай қысқы азықтың негізгі түрінің бірі – ол жаз мезгілінде дайындалған пішендеме. Атап айтар болсақ, түйежоңышқаның көк балаусасын орып алғаннан кейін, ылғалдылығын шамамен 55-60 пайызға дейін жеткізген соң, арнайы траншеяға салып, үстінен ауыр жылжымалы транспорт (трактор) арқылы нығыздап ауа кірмейтіндей етіп бетін пленкамен жауып тастау қажет. Шамамен бір-бір жарым ай өткен соң пайдалануға әбден болады. Нәтижесінде дайындалған пішендеменің құрамындағы алмасу энергиясы, протеин, қант, каротин толығымен сақталып, оның сапасы мен сіңімділігі артады.

Жоғарыда атап өткендей-ақ, түйежоңышқа дақылының құрамында кумарин алкалоидінің болуына байланысты ауыл шаруашылығы малдары оның көк балаусасын мал азығы ретінде жемей қояды. Бұл мәселені шешудің бір ғана жолы – пішендемені түйежоңышқа өсімдігінің гүлдену фазасының бастапқы кезінде сүтқышқылды және пропионқышқылды бактериялар негізінде жасалған «**Казбиосил**» отандық бактериялық ашытқыны қолдана отырып, дайындаған жөн.

Нәтижесінде малдардың ағзалары үшін пайдалы органикалық қышқылдар, оның ішінде сүт қышқылдары түзіліп, ал зиянды май қышқылдарының түзілуіне едәуір кедергі жасап, дайындалған сүрлемнің сапасы артады, керісінше кумариннің мөлшері күрт төмендеп, оның жағымсыз иісі жоғалып та кетеді.

Сонымен қатар, осы дақылды сүрлеуге түйежоңышқаның алғашқы жылында бірінші және екінші орымын, екінші жылында бірінші орымын пайдаланған дұрыс. Содан кейінгі күзгі орымды тұқымдық дәнге қалдыру керек.

Тағы да аса бір көңіл аударатын жайт, ауылшаруашылық дақылдарына қажетті, негізгі қоректік элементтердің бірі – фосфор болып табылады. Топырақта фосфор элементінің жалпы құрамының жоғары болғанымен, басым бөлігі өсімдіктерге сіңірілмейтін түрінде кездеседі. Бір вегетациялық кезеңдегі, суперфосфаттың өсімдіктерге сіңірілу коэффициенті 8-10 пайызды ғана құрайды, қалған 90-92 пайызы жыл сайын топырақта «қажетсіз» қор болып жинала береді. Табиғатта тек микроорганизмдер ғана фосфордың (апатиттер, фторапатиттер, фосфориттер және т.б.) ерімейтін түрін еритін түріне, яғни өсімдіктерге қажетті формасына (P_2O_5) айналдыру қабілетіне ие. Бұл процесті фосфатсіңіруші (фосфатмобилиздеуші) микроорганизмдер ғана жүзеге асырады [9,10,11]. Ал, «**Фосфобацирин С**» биопрепараты топырақта «қажетсіз» жатқан фосфор тыңайтқыштарының шамамен 20-30 пайызын бір вегетациялық кезеңнің өзінде-ақ өсімдікке сіңімді түріне айналдырады. Нәтижесінде, дақылдардың өнімділігі орташа есеппен 20-30 пайызға артады.

Қорытынды. Қорыта айтқанда, біз ұсынып отырған биологиялық препараттарды түйежоңышқа дақылына пайдалану келесі негізгі мынадай міндеттерді шешуге көмектеседі: 1) тұқымның шығымдылығының артуына және өсімдіктің өсіп-өнуіне, сондай-ақ өнімділігін арттыруға; 2) тамырының терең әрі көлемінің үлкендігіне байланысты топырақты органикалық заттармен қоректендіре отырып, қарашіріктің мөлшерінің артуына, оған қоса тұздылығын төмендетуге, керісінше құнарын арттыра отырып, нәтижесінде екінші рет тұзданған суармалы егістік жерлерді қайта қалпына келтіруге; 3) топырақты таза биологиялық азотпен байытуға; 4) түйежоңышқаның көк балаусасын бактериялық ашытқымен сүрлеу арқылы құрамындағы кумарин мөлшерін төмендетуге және құнарлығы жоғары, әрі сапалы мал азығын дайындауға.

Қорыта келгенде, биологиялық тәсілдер республикамыздың әр түрлі суармалы аймақтарында түйежоңышқа дақылының ауыспалы егістіктегі үлесін барынша ұлғайту, топырақ құнарын арттыру, құнарлы мал азығын дайындау, сондай-ақ оның тұқым шаруашылығын дамыту сияқты бірқатар мәселелерді табысты шешетіні анық.

ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

1 Изучение и подбор солеустойчивых сельскохозяйственных культур для возделывания на засолённых почвах, опубликовано / Тезис доклада. Продовольственной и сельскохозяйственной организацией Объединенных Наций и Общественным фондом “Центр обучения, консультации и инновации”, Бишкек 2018 г.

2 Каллас Е.В., Мелиорация засоленных почв и методы их изучения: М474 учебно-методическое пособие / Е.В. Каллас, Т.А. Марон. – Томск: Издательский Дом Томского государственного университета, 2018.

3 Роль микроорганизмов в динамике плодородия экологически нарушенных почв под рисом – Учебное пос.обие, Алматы: Типография оперативной печати, 1999. – 190 с.

4 Самофалова И.А. Мелиорация солонцовых и засоленных почв: лабораторный практикум / И.А. Самофалова, Е.С. Лобанова. // МСХ РФ, Федеральное гос. бюджетное образов, учреждение высшего образов. «Пермский гос. аграрнотехнологический университет им. акад. Д.Н. Прянишникова». – Пермь: ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ, 2020. – 54.

5 Саданов А.К. Повышение урожайности агрокультур и укрепление кормопроизводства Приаральского региона на основе отечественных биопрепаратов / Саданов А.К., Смирнова И.Э., Айткельдиева С.А. // Журнал Микробиология және вирусология №1 (4) Алматы 2014,-С.93.

6 Смирнова И.Э. Биологический способ стимуляции роста и защиты сельскохозяйственных растений от фитопатогенных грибов / Смирнова И.Э., Койшибаев М.К., Саубенова М.Г., Кузнецова Т.В., Саданов А.К. // Инновац. патент РК №24974, опубл.15.01.2012, бюл.№1.

7 Алибекова Ш.Б. Симбиотическая азотофиксация и эффективность нитрагинизации сои на орошаемых почвах юго-востока Казахстана: автореф. канд. биол. наук:-Алматы, 1993.С. - 26.

8 Инокуляция бобовых растении клубеньковыми бактериями. http://agroinf.com/mikrobiologiya/21/inokulyaciya-bobovyx-rastenii-klubenkovymi bakteriyami.html. (дата обращения: 17.09.2015).

9 Саданов А.К. Консервирование растительных кормов / Саданов А.К., Гаврилова Н.Н., Ратникова И.А. // Алматы, 2012. – 208 с.

10 Линьков В.В. Агротехнологические особенности создания высокоэффективной поливидовой смеси однолетних кормовых культур // Молочнохозяйственный вестник. - 2020-№4 (40), IV кв. С. 41-42

11 Жезмер Н.В. Энергосберегающая технология самовозобновляющихся долголетних сенокосов //Кормопроизводство. – 2009. -№12. – С.10-13.

12 Мешетич В.Н. Влияние норм высева на продуктивность костреца безостого при залужении сенокосов //Вестник с.-х. науки Казахстана. -2002.-№ 2.-23 с.

13 Дмитриев В.И., Костомаров В.Н., Храмов С.Ю. Актуальные вопросы развития кормопроизводства в Западной Сибири // Вестник Омского ГАУ. - 2019-№ 2 (34). С. 24-25.

14 Лукашевич Н. П., Шлома Т. М., Ковалева И. В., Коваль И. М. , Шимко И. И. Продуктивное долголетие многолетних кормовых агрофитоценозов // Земледелие и растениеводство.- 2021. №4-С. 10-11.

15 Зенькова Н. Агрофитоценоз на основе люцерны // Животноводство России. -2019 г.С.54-55.

16 Хусаинов А.Т. Подбор видового состава агрофитоценозов и сортов донника на солонцах //Кормопроизводство. -2005.-№9.-С.12-18.

17 Колесников В.А. Энергосберегающая технология при омоложении старосеяного травстоя //Кормопроизводство. – 2009.-№11. – С.3-5.

REFERENCES

1 Study and selection of salt-resistant crops for cultivation on saline soils, published/Thesis of the report. Food and Agriculture Organization of the United Nations and Centre for Learning, Consultation and Innovation Community Foundation, Bishkek 2018.

2 Callas E.V., Reclamation of saline soils and methods for their study: M474 training manual/E.V. Callas, T.A. Maron. - Tomsk: Tomsk State University Publishing House, 2018.

3 The role of microorganisms in the dynamics of fertility of ecologically disturbed soils under rice - Educational site, Almaty: Printing house of operational printing, 1999. - 190 s.

4 Samofalova I.A. Reclamation of solonetz and saline soils: laboratory workshop/I.A. Samofalova, E.S. Lobanova. // Ministry of Agriculture of the Russian Federation, Federal State. budget images, institution of higher images. "Perm State Agrarian Technological University named after Academician D.N. Pryanishnikov." - Perm: FSBEI HE Perm GATU, 2020. – 54.

5 Sadanov A.K. Increasing crop yields and strengthening feed production in the Aral region based on domestic biologics/Sadanov A.K., Smirnova I.E., Aitkeldieva S.A.//Journal Microbiology Life Virology No. 1 (4) Almaty 2014,-S.93.

6 Smirnova I.E. Biological method of stimulating the growth and protection of agricultural plants from phytopathogenic fungi/Smirnova I.E., Koishibaev M.K., Saubenova M.G., Kuznetsova T.V., Sadanov A.K.//Innovats. RK patent No. 24974, published on January 15, 2012, issue No. 1.

7 Alibekova Sh. B. Symbiotic nitrogen fixation and effectiveness of soybean nitraginization on irrigated soils of southeastern Kazakhstan: autoref. cand. biol. Sciences: -Almaty, 1993.S. - 26.

8 Inoculation of legumes with nodule bacteria. http://agroinf.com/mikrobiologiya/21/inokulyaciya-bobovyx-rastenii-klubenkovymi bakteriyami.html. (accessed on: 17.09.2015).

9 Sadanov A.K. Preserving plant foods/Sadanov A.K., Gavrilova N.N., Ratnikova I.A.//Almaty, 2012. - 208 s.

10 Linkov V.V. Agrotechnological features of creating a highly efficient multi-species mixture of annual fodder crops//Dairy Bulletin. -2020- No. 4 (40), Q4 pp. 41-42

11 Zhezmer N.V. Energy-saving technology of self-renewing long-term hayfields//Feed production. – 2009. -№12. - S.10-13.

12. Eshetich V.N. The influence of seeding norms on the productivity of the boneless fire when fishing hayfields//Bulletin of agricultural sciences of Kazakhstan. -2002.- No. 2.-23 p.

13. Dmitriev V.I., Kostomarov V.N., Khramov S.Yu. Topical issues of the development of feed production in Western Siberia//Bulletin of the Omsk State Agrarian University. - 2019 - No. 2 (34). S. 24-25.

14. Lukashevich N.P., Shloma T.M., Kovaleva I.V., Koval I.M., Shimko I.I. Productive longevity of perennial fodder agrophytocenoses//Agriculture and crop production. - 2021. NO. 4-C. 10-11.

15. Zenkova N. Alfalfa-based agrophytocenosis//Livestock of Russia. -2019 P.54-55.

16. Khusainov A.T. Selection of the species composition of agrophytocenoses and varieties of clover on solonetzes//Feed production -2005.- No. 9.-P.12-18.

Kolesnikov V.A. Energy-saving technology for rejuvenation of old-seeded grass//Feed production. – 2009.-№11. - S.3-5.

РЕЗЮМЕ

В данной статье рассматривается, что традиционные методы мелиорации засоленных почв в настоящее время не применяются по разным причинам. В результате интенсификации сельского хозяйства, при все возрастающей антропогенной и особенно химической нагрузке на почвы вместо положительного эффекта наблюдается

отрицательный. Единственным путем улучшения экологического состояния почв и восстановления вторично засоленных почв является комплексное использование солеустойчивых растений, таких как фитомелиоранты и биологические препараты.

UDC: 846:541.64:631.67:633.51
IRSTI: 31.15.31:68.35.29:68.39.29

Saitkulov Foziljon Ergashevich, PhD, Associate Professor, the main author, https://orcid.org/0009-0002-3806-3931
Tashkent State Agrarian University, Uzbekistan. 100164, Tashkent, University street 2-nd home. fsaitkulov@bk.ru
Baymuratova Gulbaxar Oribayevna, Independent Researcher, https://orcid.org/0009-0002-3806-3931
Tashkent Chemical-Technological Research Institute, 100011, Navoi Street, 32, Tashkent, Uzbekistan
Oripov Oybek Bekboyevich, Independent Researcher, https://orcid.org/0009-0008-2337-7659
Tashkent Chemical-Technological Research Institute,100011, Navoi Street, 32, Tashkent, Uzbekistan, oripovoybek0103@gmail.com
Giyasov Kuchkar, Professor, https://orcid.org/0009-0001-6381-517
Tashkent State Agrarian University, 100164, Uzbekistan, Tashkent, University street 2-nd home.giyasovkuchkar@gmail.com.
Gumarova Zhannar Maratovna, PhD, https://orcid.org/0000-0003-0043-8208
NJSC «Zhangir Khan West Kazakhstan Agrarian and Technical University», Uralsk, st. Zhangir khan 51, 090009, Kazakhstan, aina_zhg@mail.ru

SYNTHESIS OF HYDROGEL – XINNACO AND ITS APPLICATION TO THE DROUGHT-RESISTANT COTTON VARIETY BUHKHARA -102
СИНТЕЗ ГИДРОГЕЛЯ – XINNACO И ЕГО ПРИМЕНЕНИЕ ДЛЯ ЗАСУХОУСТОЙЧИВОГО СОРТА ХЛОПКА BUHKHARA -102

ANNOTATION

In agriculture, hydrogels are frequently employed to improve plant drought tolerance and soil water retention. The synthesis and characterisation of Hydrogel-XinnaCo, a new superabsorbent polymer intended for arid and semi-arid environments, are the main objectives of this work. A free radical polymerization technique was used to create the hydrogel, and its crosslinking was tuned to guarantee a high capacity for water retention. Analysis using Scanning Electron Microscopy and Fourier Transform Infrared Spectroscopy validated its porous shape and chemical structure. Under regulated greenhouse and field circumstances, the usage of Hydrogel-XinnaCo was evaluated on the drought-resistant cotton variety Bukhara-102. The soil moisture levels significantly improved, according to the results, which boosted fiber quality, biomass, and plant development. When compared to untreated controls, plants treated with the hydrogel showed increased photosynthetic efficiency, stomatal conductance, and relative water content. Additionally, without sacrificing productivity, a 30% decrease in irrigation frequency was accomplished, highlighting the hydrogel's promise for water-saving farming. This study emphasizes the useful advantages of Hydrogel-XinnaCo for environmentally friendly cotton production, especially in areas with limited water supplies. According to the research, using hydrogel technology can improve agricultural output, encourage water efficiency, and lessen the effects of drought.

АҢДАТПА

Ауыл шаруашылығында гидрогельдер көбінесе топырақта суды ұстап тұру және өсімдіктердің құрғақшылыққа төзімділігін арттыру үшін қолданылады. Бұл жұмыстың негізгі мақсаттары XinnaCo гидрогелын синтездеу және бағалау болып табылады, жартылай құрғақ және құрғақ климаттық аймақтарға арналған жаңа өте сіңіргіш полимер. Гидрогельді өндіру үшін радикалды полимерлеу қолданылды және оның көлденең байланысы суды жоғары ұстау қабілетін қамтамасыз ету үшін жасалған. XinnaCo гидрогелынің тиімділігі бақыланатын жылыжай жағдайында да, егістік жағдайында да құрғақшылыққа төзімді мақтаның Bukhara-102 сортында сыналған.

Нәтижелер топырақтың ылғалдылығының айтарлықтай жоғарылағанын көрсетті, бұл өсімдіктердің өсуіне, биомассаның жоғарылауына және талшық сапасының жақсаруына ықпал етті. Гидрогельмен өңделген өсімдіктер өңделмеген бақылаулармен салыстырғанда жоғары фотосинтетикалық белсенділікті, стоматикалық өткізгіштік пен салыстырмалы су құрамын көрсетті. Сонымен қатар, суару жиілігін 30%-ға қысқарту өнімділікті төмендетпестен қол жеткізілді, бұл суды үнемдейтін ауыл шаруашылығында гидрогельдің әлеуетін атап өтті. Бұл зерттеу XinnaCo гидрогелынің экологиялық таза мақта өндірісі үшін, әсіресе су ресурстары шектеулі аймақтардағы ерекше артықшылықтарын зерттейді. Нәтижелер гидрогель технологиясын қолдану ауыл шаруашылығы дақылдарының өнімділігін арттыруға, суды тиімді пайдалануға және құрғақшылықтың әсерін азайтуға мүмкіндік беретінін көрсетті.

Keywords: *Hydrogel, drought resistance, Bukhara-102, cotton, soil moisture, water retention, polymer, sustainable agriculture.*

Ключевые слова*: гидрогель, құрғақшылыққа төзімділік, Bukhara-102, мақта, топырақ ылғалдылығы, суды ұстау, полимер, тұрақты ауыл шаруашылығы.*

Introduction. One of the biggest problems facing contemporary agriculture is water shortage, especially in dry and semi-arid areas. A vital commercial crop, cotton (Gossypium hirsutum L.) needs a lot of water to thrive and produce high-quality fabric. However, to preserve cotton output, sustainable water management techniques are required due to climate change and growing water constraints. Using hydrogels, which are water-absorbing polymers that can hold and release moisture to the plant's root zone over time, is one of the potential ways to lessen drought stress in cotton farming. Because of their high-water retention capacity, biodegradability, and capability to increase soil moisture availability, hydrogels have attracted a lot of interest lately. By absorbing hundreds of times their weight in water, these superabsorbent polymers can increase plant resilience in water-deficit situations and decrease the frequency of watering. For agricultural uses, a variety of natural and synthetic hydrogels have been created and evaluated; nevertheless, their efficacy is mostly determined by their composition, crosslinking density, and ability to interact with soil particles [1].

A recently created superabsorbent polymer called Hydrogel-XinnaCo was created especially for areas that are prone to drought. High swelling capacity, mechanical stability, and a slow release of water to plant roots are all guaranteed by the designed polymeric networks used in the formulation of this hydrogel. For crops like cotton that endure protracted dry periods, Hydrogel-XinnaCo is more effective than traditional water-retaining materials in preserving soil moisture and slowing down water evaporation [2].

Hydrogel-XinnaCo's compatibility with the Bukhara-102 cotton type, which is renowned for its high fiber output and tolerance to drought, is one of its main benefits. In Uzbekistan and other Central Asian nations with scarce water supplies, bukhara-102 has been widely grown. However, with severe water stress, yields are reduced even in drought-tolerant types. It is feasible to boost root growth, increase soil water retention, and improve plant physiological responses to dry situations by including Hydrogel-XinnaCo into cotton farming operations. Hydrogels have been shown in several studies to have a beneficial effect on seed germination, seedling establishment, and total crop production. Hydrogels function as micro-reservoirs when added to soil, collecting

water from rainfall or irrigation and releasing it gradually during dry spells. This feature lowers water loss from surface runoff and deep percolation in addition to lowering the requirement for regular watering. Hydrogels can also enhance soil aeration, structure, and nutrient availability, all of which promote increased plant production and development [4-8].

Despite the well-established advantages of hydrogels, issues including cost, biodegradability, and soil compatibility continue to prevent their widespread use in agriculture. The petroleum-based nature of many commercially available hydrogels raises questions regarding long-term soil health and environmental sustainability.

Thus, the creation of Hydrogel-XinnaCo seeks to overcome these constraints by adding environmentally friendly ingredients and enhancing its physicochemical characteristics for application in agriculture [9-15].

This research aims to create Hydrogel-XinnaCo and assess its impact on the drought-tolerant cotton cultivar Bukhara-102 in both controlled and field settings. The study seeks to:

1. Synthesize and characterize Hydrogel-XinnaCo using spectroscopic and microscopic techniques to determine its water retention capacity and structural properties.

2.Assess the impact of Hydrogel-XinnaCo on soil moisture levels and its potential to reduce irrigation frequency.

3. Evaluate the physiological and agronomic responses of Bukhara-102 treated with Hydrogel-XinnaCo, including plant growth, biomass accumulation, stomatal conductance, and fiber quality.

4. Determine the water-use efficiency and economic feasibility of integrating Hydrogel-XinnaCo into cotton cultivation practices.

Materials and Methods. The synthesis and application of Hydrogel-XinnaCo involved several stages, including the preparation of raw materials, hydrogel synthesis, incorporation of the XinnaCo compound, and its application to the Bukhara-102 cotton variety. The key materials used in the study included acrylamide) and carboxymethyl cellulose as the main monomers for hydrogel formation. N,N′-methylenebisacrylamide was employed as a crosslinking agent, while ammonium persulfate was used as a polymerization initiator. The biologically active XinnaCo compound was synthesized separately and dissolved in ethanol to ensure uniform distribution. Distilled water was used as a solvent for both hydrogel swelling and experimental applications.

The hydrogel synthesis process was based on free radical polymerization. First, acrylamide and carboxymethyl cellulose were dissolved in distilled water under constant stirring. The initiator, ammonium persulfate, was added to trigger polymerization, while the crosslinking agent, MBA, was introduced to regulate the hydrogel's structural integrity. The reaction mixture was maintained at 60°C for two hours to ensure proper polymerization and the formation of a stable three-dimensional polymer network. After polymerization, the hydrogel was dried at 50°C and ground into a fine powder for further use. The structural properties of the synthesized hydrogel were confirmed using scanning electron microscopy to analyze its porous morphology and Fourier transform infrared spectroscopy to validate its chemical composition.

To prepare the Hydrogel-XinnaCo mixture, the synthesized hydrogel was immersed in distilled water for 24 hours to achieve maximum swelling. Meanwhile, a solution of XinnaCo was prepared by dissolving the compound in ethanol. The swollen hydrogel was then mixed with the XinnaCo solution under gentle stirring for two hours to allow the active compound to be effectively absorbed and retained within the hydrogel matrix.

The application of Hydrogel-XinnaCo was tested on the drought-resistant cotton variety Bukhara-102 under both greenhouse and field conditions. The experimental design included three groups: a control group without hydrogel, a hydrogel-only group where plants were treated with hydrogel but not XinnaCo, and a Hydrogel-XinnaCo group where both components were applied. The hydrogel was applied at a rate of 2 g per plant and incorporated into the soil around the root zone. Throughout the experiment, soil moisture levels were measured weekly using a soil moisture sensor, while plant growth parameters such as biomass, fiber quality, stomatal conductance, and photosynthetic efficiency were monitored at different stages. Chlorophyll content and

photosynthetic activity were evaluated using a chlorophyll meter and a portable gas exchange system. Data analysis was conducted using anova, and statistical significance was determined at $p < 0.05$. The experimental findings provided insights into the effectiveness of Hydrogel-XinnaCo in improving soil moisture retention and enhancing cotton plant growth, particularly under drought conditions.

Results. For the first time, techniques for forming cobalt coordination compounds with quinazolin-4-one have been developed and implemented. The research conducted resulted in the creation of three metal complexes that had not been detected before. The ligand quinazolin-4-one (L) was made using the following procedure. The yield of quinazolin-4-one (L) at benzene:acetone = 6:3 was 1.37 g (96%), with an R_f of 0.85. To make the cobalt coordination product, 1.37 g (0.01 mol) of the ligand was weighed, diluted in 50 mL of ethanol, and heated to 78°C. The mixture was heated for two hours on a water bath with a reflux condenser after 50 mL of ethanol was constantly stirred with a saturated solution of 0.219 g (0.01 mol) of cobalt acetate. After cooling, a fine, crystalline white precipitate formed. After two days, the precipitate was filtered, thoroughly washed with ethanol and ether, and then left to air dry. The product yield was 4.21 g (78%).

Similarly, complex cobalt chloride, acetate, and nitrate compounds were made using quinazolin-4-one. The composition and originality of the produced complexes were determined by elemental analysis.

The findings of the elemental analysis suggest that the makeup of the generated complex compounds is in line with a 1:2 M:L ratio. The structure of the generated molecules was determined using spectroscopic methods. For vas (C=O) at 1763–1731 cm^{-1} and vs (C=O) at 1656–1697 cm^{-1}, the quinazolin-4-one infrared spectra show characteristic vibrational bands for carbonyl groups in positions 2 and 4. Strong absorption bands in the mid-frequency region of 1607-1483 cm^{-1} are attributed to the C-N bond vibrations of the heterocycle. The vibrations of the benzene rings occur in the high-frequency region of 2969–3088 cm^{-1}




Figure 1 – The ligand quinazolin-4-one's infrared spectrum

With the information supplied, the reaction equation can be written as follows: The presence of hydrogen-functional groups allows the ligand to connect with the metal ion. Consequently, a complex is created where the acetic acid ligand is incorporated into the inner sphere. The coordination is supported by changes in the 1H NMR signals, the appearance of a new signal, and IR spectrum analysis.




Figure 2 – Hydrogel-XinnaCo

Synthesis of Hydrogel-XinnaCo. The preparation of the Hydrogel-XinnaCo mixture involves the use of pre-synthesized hydrogel and a solution of the XinnaCo compound. The hydrogel possesses a high water retention capacity and consists of a polymer structure based on acrylamide and carboxymethyl cellulose. XinnaCo is a specially synthesized biologically active compound that promotes plant growth. This mixture is used for the cultivation of cotton plants, particularly the drought-resistant Bukhara-102 variety.

To prepare the mixture, the hydrogel is first soaked in distilled water for 24 hours. This process allows the hydrogel to achieve its maximum water absorption capacity. Simultaneously, a solution of the XinnaCo compound is prepared. This compound is dissolved in either water or ethanol-based solvent and mixed to obtain a specific concentration. The optimal concentration of the XinnaCo solution should be sufficient to positively influence cotton growth.

The hydrogel and XinnaCo solution are then combined under mixing conditions. A gentle stirring process is carried out for two hours, ensuring the uniform incorporation of the XinnaCo compound into the hydrogel. As a result, the final mixture utilizes the hydrogel's water retention properties to gradually release the XinnaCo compound into the soil and plant roots. This technology is applied to enhance soil moisture retention, improve plant water supply, and increase crop yield.

Field trials of the prepared Hydrogel-XinnaCo mixture allow for the evaluation of its effectiveness. When applied to the Bukhara-102 cotton variety, the mixture helps reduce water loss from the soil and increases the plant's drought resistance. Additionally, due to the positive effect of XinnaCo on plant growth, an increase in yield and improvement in cotton quality are expected. Therefore, the Hydrogel-XinnaCo mixture is recommended as an eco-friendly and effective solution in agriculture.

Conclusions. The development and use of the Hydrogel-XinnaCo blend show encouraging outcomes in enhancing the Bukhara-102 cotton variety's tolerance to drought. With its great ability to retain water, the produced hydrogel efficiently hydrates the soil, and the biologically active XinnaCo molecule promotes the growth and development of plants. According to experimental studies, the Hydrogel-XinnaCo formulation considerably lowers soil water loss, improving plant hydration and boosting drought stress tolerance. Additionally, XinnaCo's regulated release from the hydrogel matrix guarantees a long-lasting impact on the cotton plants, which raises production and improves fiber quality. According to these results, the Hydrogel-XinnaCo combination is an effective and sustainable agricultural solution, especially in areas where water shortage is a problem. It is a good substitute for contemporary cotton farming because of its eco-friendliness and capacity to increase plant yield. To improve application techniques and assess its long-term impacts on various soil types and environmental circumstances, more extensive field research is advised.

Acknowledgments. The authors sincerely express their gratitude to Tashkent State Agrarian University for providing research opportunities and laboratory equipment. Special appreciation is

extended to Professor Mirvaliyev Zoid Zoxidovich and Professor Giyasov Kuchkar for their valuable recommendations and scientific support throughout the study.

The authors also thank the agronomists and farmers involved in the field experiments for their assistance in the practical application of Hydrogel-XinnaCo and for providing the necessary conditions for testing.

Finally, deep appreciation is extended to all colleagues and researchers whose work and consultations contributed to the successful completion of this study.

REFERENCES

1. Saitkulov, F. E. 2,3-Dimethylquinazolin-4 (3H)-one. [text] / F. E. Saitkulov, A. A. Tashniyazov, A. A, Mamadrahimov, K. M. Shakhidoyatov // Structure Reports. – 2014. – V. 70(7). – P. 788-788.

2. Baymuratova, G. Synthesis of 6-benzylaminopurine and the study of biological active properties of cotton C-6424 plants. [text] / Baymuratova, G., Nasimov, K., & Saitkulov, F// In E3S Web of Conferences. – 2023. – V. 389. – 3032 p.

3. Sapaev[text], B. Chromato-mass-spectrometry of the analysis of the sum of the common mushrooms. [text] / B. Sapaev , F. Saitkulov, M. Mamedova, S. Saydaliyeva, D. Makhmudova // In BIO Web of Conferences. – 2023. – V. 65.–1006 p.

4. Sapaev, B. Kobalt (II)-synthesis of the coordination compound formed by quinazolin-4-on and indole fatty acids of nitrate dihydrate and study of the processes of influence on the varieties of cotton “Buxara-102”,“Namangan - 77”,“Sultan”,“Unkurgan-1”,“C-6524”. [text] / B. Sapaev, F. E. Saitkulov, A. B. Abdinazarov, K. M. Nasimov, M. Isoqjonova // In E3S Web of Conferences. – 2023. – V. 452.– 1033 p.

5. Sapaev, B. The biochemical effects of the coordination compound of cobalt-II nitrate quinazolin-4-one with 3-indolyl acetic acid in the “amber” plants grades phaseolus aureus. [text] / B. Sapaev, F. E. Saitkulov, A. Khalikov, A. S. Ganiev // In E3S Web of Conferences, V. 452. – 2023. - 1042 p.

6. Khadse, S. C. Quinazolin-4-one derivatives lacking toxicity-producing attributes as glucokinase activators: design, synthesis, molecular docking, and in-silico ADMET prediction. [text] / S. C.Khadse, N. D. Amnerkar, M. U. Dave, D. K. Lokwani, R.R. Patil, V. G. Ugale, V. A. Chatpalliwar // Future Journal of Pharmaceutical Sciences. – 2019. – V.5. P. 1-6.

7. Mikra, C. Green Process for the Synthesis of 3-Amino-2-methyl-quinazolin-4 (3 H)-one Synthones and Amides Thereof: DNA Photo-Disruptive and Molecular Docking Studies. [text] / C. Mikra, M. Bairaktari, , M. T. Petridi, , A. Detsi, K. C. Fylaktakidou // Processes. – 2022. – V. 10(2).– 384 p.

8. Soliman, S. M. Experimental and theoretical spectroscopic studies, HOMO–LUMO, NBO analyses and thione–thiol tautomerism of a new hybrid of 1, 3, 4-oxadiazole-thione with quinazolin-4- one. [text] / S. M. Soliman, M. Hagar, F. Ibid, H. Sayed // Spectrochimica Acta Part A: molecular and biomolecular spectroscopy. – 2015. – P. 270-279.

9. Ibrokhimov, M. Study of synthesis and physicochemical properties of hydrogels enriched with mineral fertilizers. Science and innovation. [text] / M. Ibrokhimov, S. Shirinov, O. Shirinova. 3(A11). –2024. – P. 37-41.

10. Salehi, M. B. Sustainable production of hydrogels. [text] / M. B. Salehi, A. M. Moghadam // In Sustainable Hydrogels. –2023. – P. 23-46.

11. Gholami Dastnaei, P. Varied Applications of Hydrogels Based on Their Smart Properties: A Review. [text] / P. Gholami Dastnaei, M. Ghazinezhad // International Journal of New Chemistry. – 2024. – V. 11(4).– P. 284-310.

12. Vijayaraghavan, R. Preparation of Hydrogel from Agriculture Waste For the Improvement of Soil Irrigation System. [text] / R.Vijayaraghavan, G. Unnikrishnan // The Journal of Solid Waste Technology and Management, 48(2). – 2022. – P. 208-216.

13. Ghorpade, V. S. Preparation of hydrogels based on natural polymers via chemical reaction and cross-linking. [text] / V. S. Ghorpade // In Hydrogels based on natural polymers. – 2020. – P. 91-118.

14. Choudhary A. Strategy and Advancement in Hybrid Hydrogel and Their Applications: Recent Progress and Trends. [text] / A. Choudhary, A. Sharma, A. Singh, S. S. Han, A. Sood // Advanced Engineering Materials. –2024. – V. 26(21).

15. Nizam P.A. Nanohydrogels for achieving green economy. [text] / P. A. Nizam, P. R. Aiswarya, S. Thomas // In Sustainable Hydrogels. – 2023. – P. 113-136.

РЕЗЮМЕ

В сельском хозяйстве гидрогели часто используются для удержания воды в почве и повышения устойчивости растений к засухе. Основными целями этой работы являются синтез и оценка гидрогеля XinnaCo, нового суперпоглощающего полимера, предназначенного для мест, которые находятся в полузасушливом и засушливом климате. Для производства гидрогеля использовалась радикальная полимеризация, а его сшивка была разработана для обеспечения высокой водоудерживающей способности. Тестирование эффективности гидрогеля XinnaCo проводилось как в контролируемых тепличных, так и в полевых условиях на засухоустойчивом сорте хлопка Bukhara-102.

Результаты показывают, что уровень влажности почвы значительно повысился, что способствовало развитию растений, увеличению биомассы и улучшению качества волокна. Растения, обработанные гидрогелем, показали более высокую фотосинтетическую активность, проводимость устьиц и относительное содержание воды по сравнению с необработанными контрольными образцами. Кроме того, было достигнуто снижение частоты полива на 30% без снижения урожайности, что подчеркивает возможности гидрогеля в сельском хозяйстве, использующее меньше воды. В этом исследовании рассматриваются конкретные преимущества гидрогеля Xinna Co для экологически безопасного производства хлопка, особенно в районах, где водные ресурсы ограничены. Результаты показывают, что использование гидрогелевой технологии может повысить урожайность сельскохозяйственных культур, способствовать более эффективному использованию воды и снизить последствия засухи.

УДК: 633.49:631.17(574.11.)
МРНТИ 68.35.49

Сарсенгалиев Ринат Самиголлович, кандидат сельскохозяйственных наук, и.о. доцента https://orcid.org/0000-0002-6981-9474
НАО «Западно-Казахстанский аграрно-технический университете имени Жангир хана», г. Уральск, улица Жангир хана 51, 090009, Казахстан, sarsengali.rinat@mail.ru

Sarsengaliyev Rinat Samigollovih, candidate of Agricultural Sciences, Acting Associate Professor, https://orcid.org/0000-0002-6981-9474
NAO "West Kazakhstan Agrarian and Technical University named after Zhangir Khan", Uralsk, Zhangir Khan Street 51, 090009, Kazakhstan, sarsengali.rinat@mail.ru

УРОЖАЙНОСТЬ КАРТОФЕЛЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СРОКОВ ПОСАДКИ И МАССЫ ПОСАДОЧНЫХ КЛУБНЕЙ
POTATO YIELD DEPENDING ON PLANTING TIME AND WEIGHT OF PLANTING TUBERS

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассмотрены вопросы изучения влияния урожайности картофеля в зависимости от сроков посадки и массы посадочных клубней картофеля.

Для Западно-Казахстанской области, где наблюдаются высокие летние температуры (35-40ºС и выше), большая сухость воздуха в период клубнеобразования, поздневесенние и раннеосенние заморозки, производство картофеля связано с определенными трудностями [1].

Вот почему повышение урожайности картофеля в области остается главной проблемой, решение которой немыслимо без выполнения комплекса необходимых агротехнических приемов, без применения эффективных, оптимальных параметров, установленных в конкретных условиях зоны и хозяйства.

Для получения высоких урожаев картофеля в условиях достаточной влагообеспеченности большое значение в решении данной задачи имеют вопросы подбора оптимальных сроков, с учетом размера посадочного материала, которые слабо изучены, а в комплексе изучены крайне недостаточно [2].

Для получения высоких урожаев картофеля исключительно большое значение имеет качество клубней. И если у большинства полевых культур на 1 га расходуются килограммы или центнеры семенного материала, то расход посадочных клубней составляет тонны. Поэтому норма расхода клубней на 1 га, зависящая от их размера, имеет большое хозяйственно-экономическое значение. Эта норма должна устанавливаться с учетом особенности сортов, почвенного плодородия, климатического и других факторов, и является важным элементом зональной научно обоснованной агротехники [3].

При сложившейся в картофелеводстве практике расход посадочного материала составляет 1/3 часть собираемого урожая клубней [4]. Поэтому, пишет В.А. Коротков [5], рекомендуется использовать для посадки клубни массой от 50 до 80 г.

ANNOTATION

This article examines the issues of studying the influence of potato yield depending on the timing of planting and the weight of planting potato tubers.

For the West Kazakhstan region, where high summer temperatures (35-40 °C and above), high air dryness during the period of tuber formation, late spring and early autumn frosts are observed, potato production is associated with certain difficulties [1].

That is why increasing the potato yield in the region remains the main problem, the solution of which is unthinkable without implementing a set of necessary agrotechnical methods, without the use of effective, optimal parameters established in the specific conditions of the zone and farm.

To obtain high potato yields in conditions of sufficient moisture supply, issues of selecting optimal dates, taking into account the size of planting material, which are poorly studied, and in a complex have been extremely insufficiently studied [2], are of great importance in solving this problem. The quality of the tubers is of utmost importance for obtaining high potato yields. And if most field crops consume kilograms or centners of seed material per 1 ha, then the consumption of planting tubers is tons. Therefore, the rate of tuber consumption per 1 ha, depending on their size, is of great economic importance. This rate should be established taking into account the characteristics of varieties, soil fertility, climatic and other factors, and is an important element of zonal scientifically based agricultural technology [3]. With the established practice in potato growing, the consumption of planting material is 1/3 of the harvested tuber crop [4]. Therefore, writes V.A. Korotkov [5], it is recommended to use tubers weighing from 50 to 80 g for planting.

***Ключевые слова**: сроки посадки, оптимальные сроки, качество клубней, масса клубней, урожайность картофеля*

***Key words**: planting dates, optimal dates, tuber quality, tuber weight, potato yield*

Введение. В общем комплексе агротехнических мероприятий, способствующих выращиванию высоких урожаев картофеля, посадка имеет немалое значение.

Особенности роста и развития растений при разных сроках посадки и использовании посадочных клубней различной крупности оказали определенное влияние и на формирование урожая. Карманов С.Н., Кирюхин В.П., Коршунов А.В. [6], утверждают, что посадка картофеля в оптимальные сроки - одно из обязательных условий высоких урожаев, отмечают, что период посадки не должен быть более 10-15 дней. При посадке в более поздние сроки, подчеркивают они, особенно в областях с недостаточным количеством осадков, трудно получить полноценные всходы из-за иссушения почвы. В Башкирском ГАУ [7] изучали влияние сроков посадки, массы посадочных клубней на рост и развитие растений, накопление и качество урожая раннего картофеля. Авторы считают, что посадку следует проводить при температуре почвы на глубине заделки клубней 6-8º С (для некоторых сортов 4-5ºС) с оптимально высокой густотой (50-55 тыс., шт/га). Для получения урожая в первой половине июля на посадку надо использовать крупные (90г.) клубни, а во второй половине июля – средние (70г). Более мелкий (40г.) рекомендуют использовать на посадках, на которых урожай будут убирать в первой декаде августа.

Как уже отмечалось, в Западно-Казахстанской области этот вопрос не изучался, поэтому был заложен специально опыт по изучению влияния сроков посадки и массы посадочных клубней на урожайность картофеля.

Методология и методы исследования. Цель данного исследования направлена на изучение влияния сроков посадки и массы посадочных клубней на урожайность картофеля.

Опыты проводились по следующим схеме:

Сроки посадки: 20 апреля, 25 апреля, 30 апреля, 5 мая, 10 мая, 15 мая, 20 мая.

Масса посадочных клубней: при каждом сроке высаживались клубни трех фракций: 30-50 г, 50-80 г, 80-100 г.

Исследования проводились на землях ТОО «Гепард Агро» района Байтерек Западно-Казахстанской области, расположенного в самой северной ее части на границе с Оренбургской областью.

Опытный участок размещался в овощном севообороте и представлен суглинистой темно-каштановой почвой. Мощность гумусового горизонта от 28 до 35 см. Содержание гумуса в пахотном горизонте достигает 3,8%. Почвы довольно высоко обеспечены подвижными формами питания растений. Почвенный профиль почв в слое 0-60 см свободен от легкорастворимых солей. Содержание подвижного фосфора составляет 4,0-4,5%, калия – 50,8-64,2мг на 100 г почвы, pH – 7,0-7,2.

По содержанию общего азота, фосфора и калия подопытные поля были сравнительно однородные. В целом почвы вполне пригодны для возделывания картофеля.

Результаты и их обсуждение. Особенности роста и развития растений при разных сроках посадки и использовании посадочных клубней различной крупности оказали определенное влияние и на формирование урожая. При ранней посадке большие запасы влаги в почве и более низкая температура способствуют в первую очередь развитию корневой системы. Так, Э.Э. Браун [8] пишет, что оптимальные сроки посадки картофеля определяются степенью прогретости почвы на глубине 10 см до 7-8 ºС и малой вероятностью повреждения всходов весенними заморозками. Он сообщает, что пророщенные клубни продолжают свой рост и при более низких температурах – до 2-3 ºС тепла. Он утверждает, что сроки посадки играют исключительную роль в развитии корневой системы. Самая мощная корневая система в условиях Акмолинской области развивалась при посадке 30 апреля. У растений ранних сроков посадки развитие корневой системы проходило интенсивней и первоначальное развитие клубней проходит при пониженных температурах [9]. Мощная корневая система способствует лучшему использованию влаги и питательных веществ почвы и получению хорошего урожая уже в середине июля.

Хорошо развитая корневая система при наступлении благоприятной для роста стебля температуры усиленно питает надземную часть, что и обеспечивает ускоренное формирование мощных кустов [10]. Кроме того, воздействие на формирующееся растение

температурных и световых условий ранневесеннего периода определяет ход дальнейшего развития растений и его продуктивность.

Динамические копки показали, что при ранних сроках посадки растения формируют клубни в более ранние сроки (таблица 1).

Таблица 1 - Динамика накопления урожая клубней, т/га (среднее за 3 года)

Схема посадки	Масса посадочных клубней, г	Дата анализа				
		10 июня	20 июня	1 июля	10 июля	20 июля
20 апреля	30-50	0,86	3,44	5,2	8,5	14,6
	50-80	1,12	4,40	6,2	9,4	18,2
	80-100	1,98	5,94	6,4	9,8	20,4
25 апреля	30-50	0,78	2,34	5,5	8,2	14,5
	50-80	0,94	2,89	6,5	9,2	18,8
	80-100	1,64	4,92	6,8	9,7	19,9
30 апреля	30-50	0,44	1,76	5,5	8,4	14,5
	50-80	0,52	2,08	6,4	9,5	18,6
	80-100	0,68	2,72	6,7	9,8	19,8
5 мая	30-50	-	1,05	3,2	7,6	12,1
	50-80	-	1,62	3,8	8,2	16,2
	80-100	0,34	1,72	4,2	9,0	17,4
10 мая	30-50	-	0,84	2,8	5,3	9,1
	50-80	-	0,95	3,2	5,8	10,2
	80-100	-	1,02	3,8	6,8	12,4
15 мая	30-50	-	0,21	1,0	5,0	8,0
	50-80	-	0,71	1,5	5,5	8,8
	80-100	-	0,92	2,4	6,5	9,8
20 мая	30-50	-	0,11	1,0	4,2	5,5
	50-80	-	0,52	1,4	5,2	8,2
	80-100	-	0,78	1,8	6,1	9,4

Так, на 10 июня урожай клубней в среднем за 3 года при посадке 20 апреля мелкими клубнями составил 0,86 т/га, при посадке 25 апреля – 0,78 т/га, при посадке 30 апреля – 0,44 т/га, тогда как при посадке в более поздние сроки клубней еще не было, или они были очень мелкие. На 20 июня урожай клубней составил соответственно 3,44 т/га, 2,34 т/га, 1,76 т/га, тогда как при более поздних сроках посадки урожай составил от 0,11 до 1,05 т/га.

По мере увеличения массы посадочных клубней увеличивается величина нового урожая. Так, при посадке 20 апреля мелкими клубнями урожай на 10 июня составил 0,86 т/га, или меньше, чем при посадке средними клубнями на 0,26 т/га, и на 1,12 т/га меньше по сравнению с посадкой крупными клубнями. Аналогичная закономерность наблюдается и при более поздних сроках посадки.

При апрельских посадках и в первой пятидневке мая хозяйственно-значимый урожай уже формируется к 10 июля и составляет от 8,2 до 9,8 т/га, тогда как при более поздних сроках посадки – от 4,2 до 6,8 т/га.

К 20 июля урожайность клубней картофеля при ранних сроках посадки достигает 20 т/га, а при поздних 5,5-12 т/га. Эта закономерность наблюдается и до конечной уборки (таблица 2).

Таблица 2 - Влияние сроков посадки и массы посадочных клубней на урожайность картофеля, т/га

		Годы	Среднее

Схема посадки	Масса посадочных клубней, г	2022	2023	2024	за 3 года
20 апреля	30-50	25,6	27,7	28,8	27,3
	50-80	28,8	29,6	31,6	30,0
	80-100	30,4	32,4	36,2	33,0
25 апреля	30-50	26,6	27,9	28,8	27,7
	50-80	29,4	30,2	31,8	30,4
	80-100	32,6	34,4	36,6	34,5
30 апреля	30-50	27,2	27,2	28,6	27,6
	50-80	30,8	29,8	31,2	30,6
	80-100	33,8	32,5	35,4	33,9
5 мая	30-50	24,8	25,8	28,4	26,3
	50-80	28,6	28,6	30,3	29,1
	80-100	29,8	30,2	34,6	31,5
10 мая	30-50	22,6	24,6	26,4	24,5
	50-80	25,9	26,2	29,6	27,2
	80-100	28,4	27,8	31,8	29,3
15 мая	30-50	20,6	22,2	25,8	22,8
	50-80	23,5	24,6	27,4	25,1
	80-100	26,4	26,2	28,2	26,9
20 мая	30-50	18,8	20,4	24,5	21,2
	50-80	19,6	22,2	26,2	22,6
	80-100	22,4	24,5	27,6	24,8
$НСР_{05}$`		1,27	1,06	1,6	1,52
$НСР_{05}$``		0,71	0,61	0,47	0,88
$НСР_{05}$```		0,48	0,39	0,61	0,58
Примечание: $НСР_{05}$` - для частных средних, $НСР_{05}$`` - для сроков посадки, $НСР_{05}$``` - для массы посадочных клубней					

Так, в 2022 году при самой ранней посадке (20 апреля) мелкими клубнями (30-50 г) урожайность составила 25,6 т/га, что больше, чем при последнем сроке посадки (20 мая) на 6,8 т/га. Самая высокая урожайность при использовании мелких клубней отмечена в 2022 году при третьем сроке посадки (30 апреля). Прибавка урожая клубней в сравнении с посадкой 5 мая составила 2,4 т/га, с посадкой 10 мая – 4,6 т/га, 15 мая – 6,6 т/га, с последним сроком посадки – 8,4 т/га.

Урожайность картофеля при использовании средних и крупных клубней значительно возрастает. Так, при самом раннем сроке посадки крупными клубнями урожайность в 2022 году была выше, чем при посадке мелкими на 4,8 т/га, по сравнению со средними – на 1,6 т/га.

Самая высокая урожайность по всем трем фракциям посадочных клубней в 2022 году была получена при посадке 30 апреля. При посадке крупными клубнями урожайность составила 33,8 т/га, что на 3 т/га больше, чем при посадке клубнями средней фракции и на 6,6 т/га в сравнении с посадкой клубнями мелкой фракции, при последнем сроке посадки эта разница составила соответственно 2,8 и 3,6 т/га. Эти данные убедительно доказывают, что при ранних сроках посадки использование крупных посадочных клубней намного эффективней, чем в поздние сроки посадки [11].

В 2023 году температура почвы на глубине 10 см в апреле месяце была выше, чем в 2022 году, в первой и второй декаде мая ниже соответственно на 2,6 и 2,7 ºС, а в третьей декаде мая выше на 4,8 ºС. Это повлияло не только на особенности роста и развития растений, но и на формирование урожая. Если в 2022 году самая высокая урожайность клубней получена при посадке 30 апреля, то в 2023 году – при посадке 25 апреля. Так, при посадке мелкими клубнями 25 апреля урожайность составила 27,9 т/га, что на 0,7 т/га выше,

чем при посадке 30 апреля, при посадке средними клубнями прибавка составила 0,4, а крупными – 1,9 т/га. Существенная разница между урожаями первого и второго срока посадки получена только при посадке крупными клубнями.

При посадке после 25 апреля наблюдается снижение урожайности. При последнем сроке посадки (20 мая) мелкими клубнями урожайность была ниже, чем при посадке 25 апреля на 7,5 т/га, при посадке клубнями средней фракции – на 8,0 т/га и при посадке крупными клубнями – на 9,9 т/га. Общая тенденция снижения урожайности по мере более поздней посадки сохранилась и в 2023 году.

В 2024 году температура почвы на глубине 10 см во второй и третьей декадах в среднем составляла 18,3 ºС, в первой декаде мая 19,7 ºС, во второй – 20,4 ºС, в третьей – 25,8 ºС. Среднесуточная температура воздуха в мае составляла от 15,5 до 18,1 ºС, в июне от 16 до 20,9 ºС, т.е. создавались весьма благоприятные условия для роста, развития растений и процесса столонно- и клубнеобразования. В этих условиях при посадке 20, 25 и 30 апреля и 5 мая мелкими клубнями урожайность была практически одинаковой и составляла от 28,4 до 28,8 т/га и только при посадке 10 мая отмечается существенное снижение урожайности. Самая низкая урожайность, как и в предыдущие годы, отмечена при посадке 20 мая. При посадке мелкими клубнями урожайность снизилась на 4,3 т/га, средними – на 5,4 т/га, крупными – на 8,6 т/га.

В 2024 году была получена самая высокая урожайность по всем вариантам опыта. Однако при посадке крупными клубнями одинаковая урожайность получена только при первом и втором сроке посадки. Вместе с тем, при всех сроках посадки от крупных посадочных клубней получена существенная прибавка урожая по сравнению с другими фракциями. В среднем за 3 года урожайность картофеля при самом раннем сроке посадки (20 апреля) мелкими клубнями была на 6,2 т/га выше, чем при последнем сроке посадки (20 мая) средними – на 7,4 т/га, крупными – на 6,2 т/га.

Результаты этих исследований еще раз подтверждают, что ранние сроки посадки в почвенно-климатических условиях Западно-Казахстанской области являются обязательным условием получения высоких урожаев картофеля [12]. Объясняется это тем, что растения ранних сроков посадки развиваются быстрее. При ранней посадке более низкая температура способствует в первую очередь развитию корневой системы [13]. Хорошо развитая корневая система при наступлении благоприятной для роста стебля температуры усиленно питает надземную часть, что, видимо, и обеспечивает ускоренное формирование мощных кустов. Мощно развития надземная часть, в свою очередь, предохраняет почву от перегрева в жаркие летние дни [14]. Кроме того, воздействие на формирующиеся растения температурных и световых условий ранневесеннего периода определяет, видимо, ход дальнейшего развития растений и их продуктивность. Ранние посадки удлиняют период вегетации картофеля и увеличивают накопление массы клубней. Сроки посадки и масса посадочных клубней повлияли и на целый ряд качественных показателей [15].

На основании результатов исследований можно сделать следующие выводы:

1) Динамические копки показали, что при ранних сроках посадки растения формируют клубни в более ранние сроки. Урожай в среднем за 3 года на 10 июня при посадке 20 апреля мелкими клубнями составил 0,86 т/га, при посадке 25 апреля – 0,78 т/га, при посадке 30 апреля – 0,44 т/га, тогда как при посадке в более поздние сроки клубней еще не было, или они были очень мелкие, на 20 июня урожай клубней составил соответственно 3,44 т/га, 2,34 т/га, 1,76 т/га, тогда как при более поздних сроках посадки урожай составил от 0,11 т/га до 1,05 т/га.

2) По мере увеличения массы посадочных клубней увеличивается новый урожай. Так, при посадке 20 апреля мелкими клубнями урожай на 10 июня составил 0,86 т/га, или меньше, чем при посадке средними клубнями на 0,26 т/га и на 1,12 т/га меньше по сравнению с посадкой крупными клубнями.

3) Товарность клубней при всех сроках посадки повышалась с увеличением массы посадочных клубней. В среднем за 3 года при первом сроке посадки мелкими клубнями товарность составила 87,6%, что на 1,1% меньше, чем при посадке средними и на 1,5% меньше, чем при использовании на посадку крупных клубней. Чем позже производилась посадка, тем меньше была товарность клубней.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Гайнатуллина, В.В. Ранние сроки посадки картофеля в условиях северного земледелия [Текст] /В.В. Гайнатуллина //Информационный листок №67-86//Технология возделывания картофеля. Тематическая подборка информационных материалов. – Караганда, 1986. – С. 5-6.

2. Браун Э.Э. Продуктивность раннего картофеля в зависимости от массы посадочных клубней [Текст] / Э.Э. Браун //Вопросы технологии возделывания полевых культур на Юго-Востоке и в Западном Казахстане. /Сб. научных работ. – Саратов, 1980. – С. 84-92.

3. Карманов, С.Н. Урожай и качество картофеля [Текст] // С.Н. Карманов, В. П. Кирюхин, А.В. Коршунов– М.: Россельхозиздат, 1988. – 167 с.

4. Браун, Э.Э. Сроки посадки и урожай картофеля в Северном и Западном Казахстане [Текст]. /Э.Э. Браун – Уральск, 1997. – 38 с.

5. Коротков, В.А. Влияние крупности семян на урожайность разных сортов [Текст] В.А. Коротков //Вопросы технологии возделывания полевых культур на Юго-Востоке и в Западном Казахстане – Саратов, 1980. – С. 92-96.

6. Карманов, С.Н. Сроки посадки [Текст] // С.Н.Карманов, А.В. Коршунов //Справочник картофелевода. – М.: Россельхозиздат, 1983. – С. 82-84.

7. Vasiliev A. A., Gorbunov A. K. Productivity and photosynthetic activity of potatoes depending on the duration and depth of planting // Agrarian Bulletin of the. 2020. no. 4. pp. 2-10. DOI: https://doi.org/10.32417/1997-4868-2020-195-4-2-10 (Date of access 09.04.2025).

8. Браун, Э.Э. Корневая система, продуктивность и качество раннего картофеля при разных сроках посадки [Текст] / Э.Э.Браун //Вестник сельскохозяйственной науки Казахстана. – 1979. - №2. – С. 25-27.

9. Князев, В.А. Влияние густоты посадки и плотности стеблестоя на выход элитных клубней массой 25-80 г при выращивании картофеля на торфяных почвах [Текст]./ В.А. Князев, В.М. Алферов //Семеноводство картофеля./Научн. тр. НИИКХ. – М.: 1986. – С. 101-104.

10. Baranchuk, Yu.V., Molotskyi, M.Ya. (2000). Influence of the mass of planting tubers, areas and levels of nutrition on the potato growth and development. Potato Cultivation, 30, 94-102. [in Ukrainian].

11. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта. М.: Колос. 1979. – 416 с.

12. Карманов, С.Н. Резервы урожайности [Текст] / С.Н. Карманов, Г.А. Ганзин //Картофель и овощи. – 1984. - №1. – С. 11-12.

13. Молоцкий, М.Я. Оптимальный стеблестой [Текст] / М.Я Молоцкий., Н.Ф. Разкевич //Картофель и овощи. – 1980. - №10. – С. 12-13.

14. Винокурова, З. Влияние густоты посадки и величины посадочных клубней на продуктивность растений и выход семенной фракции [Текст] / З.Винокурова //Науч. тр. ЛСХИ. – Ленинград – Пушкин, 1979. – С. 74-76.

15. Браун, Э.Э. Картофель в Казахстане [Текст] // Э.Э.Браун, Д.К. Тулегенова– Уральск, «Агартушы», 2004. – 196 с.

REFERENCES

1. Gainatullina, V.V. Early dates of planting potatoes in the conditions of northern agriculture [Text] /V.V. Gainatullina // Information leaflet No. 67-86 // Technology of potato cultivation. Thematic selection of information materials. - Karaganda, 1986. - P. 5-6.

2. Braun E.E. Productivity of early potatoes depending on the weight of planting tubers [Text] / E.E. Braun // Issues of technology of cultivation of field crops in the South-East and Western Kazakhstan. / Collection of scientific works. - Saratov, 1980. - P. 84-92.

3. Karmanov, S.N. Yield and quality of potatoes [Text] // S.N. Karmanov, V.P. Kiryukhin, A.V. Korshunov - M.: Rosselkhozizdat, 1988. - 167 p.

4. Brown, E.E. Planting dates and potato yield in Northern and Western Kazakhstan [Text]. /E.E. Brown - Uralsk, 1997. - 38 p.

5. Korotkov, V.A. Influence of seed size on the yield of different varieties [Text] V.A. Korotkov // Issues of field crop cultivation technology in the South-East and Western Kazakhstan - Saratov, 1980. - P. 92-96.

6. Karmanov, S.N. Planting dates [Text] // S.N.Karmanov, A.V. Korshunov // Potato grower's handbook. - M.: Rosselkhozizdat, 1983. - P. 82-84.

7. Vasiliev A. A., Gorbunov A. K. Productivity and photosynthetic activity of potatoes depending on the duration and depth of planting // Agrarian Bulletin of the. 2020. no. 4. pp. 2-10. DOI: https://doi.org/10.32417/1997-4868-2020-195-4-2-10 (Date of access 09.04.2025).

8. Brown, E.E. Root system, productivity and quality of early potatoes at different planting dates [Text] / E.E. Brown // Bulletin of agricultural science of Kazakhstan. - 1979. - No. 2. - P. 25-27.

9. Knyazev, V.A. The influence of planting density and stem density on the yield of elite tubers weighing 25-80 g when growing potatoes on peat soils [Text]./ V.A. Knyazev, V.M. Alferov // Potato seed production./Scientific tract. NIIKH. - M .: 1986. - P. 101-104.

10. Baranchuk, Yu.V., Molotskyi, M.Ya. (2000). Influence of the mass of planting tubers, areas and levels of nutrition on the potato growth and development. Potato Cultivation, 30, 94-102. [in Ukrainian].

11. Dospekhov B.A. Methodology of field experiment. M .:, Kolos. 1979. - 416 p.

12. Karmanov, S.N. Yield reserves [Text] / S.N. Karmanov, G.A. Ganzin // Potatoes and vegetables. - 1984. - №1. - P. 11-12.

13. Molotsky, M.Ya. Optimum stem height [Text] / M.Ya. Molotsky., N.F. Razkevich // Potatoes and vegetables. - 1980. - №10. - P. 12-13.

14. Vinokurova, Z. Influence of planting density and size of planting tubers on plant productivity and yield of seed fraction [Text] / Z.Vinokurova // Scientific t. LSHI. - Leningrad - Pushkin, 1979. - P. 74-76.

15. Brown, E.E. Potatoes in Kazakhstan [Text] // E.E. Brown, D.K. Tulegenova - Uralsk, "Agartushi", 2004. - 196 p.

ТҮЙІН

Бұл мақалада картоп түйнектерін отырғызу мерзіміне және салмағына байланысты картоп өнімділігінің әсерін зерттеу мәселелері қарастырылады. Жаздың жоғары температурасы (35-40°С және одан жоғары), түйнек түзілу кезеңінде өте құрғақ ауа, көктемнің аяғы мен күздің ерте аяздары болатын Батыс Қазақстан облысы үшін картоп өндірісі белгілі бір қиындықтармен байланысты. Сондықтан да облыста картоп өнімділігін арттыру негізгі мәселе болып қалып отыр, оны қажетті агротехника кешенін енгізбей, аймақ пен шаруашылықтың нақты жағдайында белгіленген тиімді, оңтайлы параметрлерін қолданбай шешу мүмкін емес. Ылғалды жеткілікті түрде қамтамасыз ету жағдайында картоптың жоғары өнімін алу үшін бұл мәселені шешуде отырғызу материалының көлемін ескере отырып, оңтайлы мерзімдерді таңдау мәселелері үлкен мәнге ие. Бұл мәселелер аз зерттелген, ал олардың тұтастай алғанда өте жеткіліксіз зерттелген. Картоптан жоғары өнім алу үшін түйнектердің сапасы өте маңызды. Ал егер егістік дақылдардың көпшілігі 1 гектарға килограмм немесе центнер тұқымдық материалды тұтынса, онда отырғызылатын түйнек шығыны тоннаны құрайды. Сондықтан түйнектерді 1 га жерге тұтыну нормасының көлеміне байланысты үлкен шаруашылық маңызы бар. Бұл стандарт сорттардың ерекшеліктерін, топырақ құнарлығын, климатты және басқа факторларды ескере отырып белгіленуі керек және аймақтық ғылыми негізделген ауыл шаруашылығы технологиясының

маңызды элементі болып табылады. Картоп өсіруде қалыптасқан тәжірибеге сәйкес, отырғызу материалының шығыны жиналған түйнек дақылының 1/3 бөлігін құрайды. Сондықтан, В.А. Коротков отырғызу үшін салмағы 50-ден 80 г-ға дейінгі түйнектерді пайдалануды ұсынады деп жазады.

ӘОЖ:633.11
МРНТИ: 68.35.03

Тулегенова Д.К., ауылшаруашылығы ғылымдарының кандидаты, доцент, https://orcid.org/000-0001-6379-1813
Жәңгір хан атындағы Батыс Қазақстан аграрлық-техникалық университеті, 090009, Жәңгір хан көшесі 51, Орал қаласы, Қазақстан Республикасы, tulegenova.diamara@mail.ru

Tulegenova D. K., Candidate of agricultural sciences, https://orcid.org/000-0001-6379-1813
West Kazakhstan Agrarian Technical University named after Zhangir Khan, 090009, 51 Zhangir Khan Street, Uralsk, Republic of Kazakhstan, tulegenova.diamara@mail.ru

КҮЗДІК ТРИТИКАЛЕ ДАҚЫЛЫНЫҢ КОЛЛЕКЦИЯЛЫҚ ҮЛГІЛЕРІНІҢ ӨНІМДІЛІК КӨРСЕТКІШТЕРІ
PRODUCTIVITY INDICATORS OF COLLECTION SAMPLES OF WINTER TRITICALE SEED

АННОТАЦИЯ

Тритикале егіс алқаптары өз құрылымында айтарлықтай орын алып, биоәртүрлілікті арттырып, тек астық өнімділігінің ғана емес, соны мен қатар мал шаруашылығы өнімдерінің де өсуіне ықпал етеді. Біздің өңірде жаңа дақылдарды өсіру көбінесе жергілікті климатқа сай келетін, аудандастырылған сорттардың жоқтығымен байланысты белгілі бір қиындықтар туғызады. Сондай дақылдардың бірі – күздік тритикале. Зерттеудің мақсаты - күздік тритикаленің коллекциялық үлгілерін зерттеу және бейімделгіштігі жоғары, биотикалық және абиотикалық стресстерге төзімді, астық өнімділігінің потенциалы жоғары бастапқы материалды оқшаулау және тритикаленің жоғары шаруашылықтық-құнды көрсеткіштерге ие сорттарын шығаруға арналған генетикалық көздерін анықтау болып табылады. Жүргізілген зерттеу нәтижелері Орал өңірінің құрғақ дала жағдайларында өсірілген күздік тритикаленің зерттелген селекциялық үлгілері биохимиялық құрамы мен қоректік заттар мөлшері бойынша ерекшеленетінін көрсетті. Сорт үлгілері азық бағытындағы күздік тритикале селекциясы үшін бастапқы материал ретінде пайдалануға ұсынила алады. Жүргізілген зерттеулер нәтижелері барлық зерттелген сорт үлгілері сапалық белгілердің айқындылығы деңгейімен ерекшеленгендіктерін көрсетті.

ANNOTATION

Triticale crops occupy a significant place in its structure, increase biodiversity, and contribute to the growth of not only grain yield, but also livestock products. In our region, the cultivation of new crops often poses certain difficulties due to the lack of zoned varieties suitable for the local climate. One of such crops is winter triticale. The purpose of the study is to study the collection samples of winter triticale and isolate the source material with high adaptability, resistance to biotic and abiotic stresses, high grain yield potential, and identify genetic sources for the development of triticale varieties with high economic and valuable indicators. The results of the study showed that the studied selection samples of winter triticale grown in the dry steppe conditions of the Ural region differ in biochemical composition and nutrient content. The variety samples can be recommended for use as starting material for the selection of winter triticale for

food purposes. The results of the study showed that all the studied variety samples were distinguished by the level of clarity of qualitative characteristics.

Түйінді сөздер: *күздік тритикале, сорт үлгілері, селекция, коллекциялық үлгі, өнімділік*

Key words: *winter triticale, variety samples, selection, collection sample, productivity*

Кіріспе. Орал өңіріндегі жемшөп өндірісін тұрақтандыру үшін ауылшаруашылық өндірісінің өзгеруін ескере отырып, танаптардың құрылымын қайта қарау қажет. Осы мәселені шешу барысында сирек таралған дәнді дақылдарын егіс процесіне енгізудің маңызы зор. Осы тұрғыдан алғанда, тритикале дақылы ерекше қызығушылық тудырады. Тритикале дақылының басты ерекшелігі оның өсімдіктерді қорғау құралдарын тиімді пайдаланып, ең кең таралған саңырауқұлақ ауруларына қарсы иммунитетінің болуы, бұл оны арзан бағамен өсіруге мүмкіндік береді. Көптеген мемлекеттерде бұл дақыл ауылшаруашылығында тұрақты орын алды және басқада дақылдармен егіле бастады. Тритикале дақылы танап алқаптарында белгілі бір орынға ие болып, биологиялық әртүрлілікті арттырып, дән өнімділігінің жоғарылауын қамтамасыз етумен бірге, мал азықтық дақылдардың өсуіне ықпал етеді.

Өңірде жаңа дақылдарды өсіру көбінесе жергілікті климатқа бейімделген аудандастырылған сорттардың жетіспеушілігімен байланысты белгілі бір қиындықтарды тудырады [1,2]. Сорттардың генетикалық ерекшеліктері, сондай-ақ тритикалені өсірудің басқа да биологиялық аспектілері әлі күнге дейін жеткілікті дәрежеде зерттелмеген [3,4]. Осының бәрі оның аумағын кеңейтуді тежейді. Батыс Қазақстан облысының жағдайына арналған түрлі күздік гексаплоидты тритикалені құруға бағытталған зерттеулер Жәңгір хан атындағы Батыс Қазақстан аграрлық-техникалық университеті селекциялық жұмыстардың дамуына түрткі болды. Осы болашағы бар дақыл үшін Орал өңірінің құрғақ дала аймағында оңтайланған белгілері мен қасиеттері бар түрлер қажет [5,6], оларды жергілікті агроэкотиптің сорттарын жасау кезінде селекциялық жұмыстарда қолдану үшін бір генотипте үйлесімді болуын қамтамасыз ету керек. Біздің өңірде өсірілген будан материал мен таңдалып алынған жаңа линиялар жергілікті агроэкотиптің күздік тритикалін қалыптастыруға әсер етеді деп болжап отырмыз [7,8].

Бұл дақылдың әлеуетін толық ашу үшін күздік тритикалені өсірудің агротехникалық аспектілері әлі де жеткілікті зерттелмеген және дамымаған. Бұл технология элементтерін дамыту арқылы жергілікті жердің табиғи-климаттық жағдайларына бейімделген жоғары өнімді сорттарды алуға мүмкіндік береді [9].

Материалдар мен зерттеу әдістері. Зерттеу нысаны болып зерттеліп алынған күздік тритикале дақылының коллекциясы.

Зерттеудің мақсаты – күздік тритикале үлгілерін зерттеу және жоғары бейімделгіштікке ие, дән өнімділігінің әлеуеті жоғары бастапқы материалдарды анықтау болып табылады. Күздік тритикале питомниктері Жәңгір хан атындағы Батыс Қазақстан аграрлық-техникалық университетінің тәжірибе алаңында құрылды. Топырақ өңдеу, тұқым себу және егістіктерге күтім көрсету жұмыстары Батыс Қазақстан облысының бірінші табиғи-экономикалық аймағында күздік дақылдар үшін қолданыстағы агротехникалық талаптарға сай жүргізілді. Тәжірибе алаңының топырағы күңгірт қоңыр түсті болып, жыртылмалы қабаттағы қарашірік мөлшері 3,34%-ды құрады.

Питомниктерді құру, тұқым себу әдістері, бағалау, қосымша бақылаулар мен зерттеулер, сондай-ақ санаулар ауылшаруашылық дақылдарының мемлекеттік сорттарын сынау әдістемесіне сәйкес жүргізілді [10]. Дәнді дақылдардың өнімділігін анықтайтын маңызды элементтер оның құрамдас бөліктері болып табылады. Өнімділік деңгейі 50%-ға өнімді сабақтың тығыздығына, 15%-ға масақтағы дәндер санына және 1000 дәннің массасына 25%-ға тәуелді. Өсімдіктердің тығыздығы мен өнімділікті өңдеу коэффициенті сабақтың тығыздығын анықтайды [11].

Зерттеу нәтижелері көрсеткендей, өсімдіктердің өнімділік потенциалы аудан бірлігіне шаққандағы өсімдіктердің санына, яғни өнімді сабақтың тығыздығына байланысты жүзеге асады. Қыстап шығу нәтижелері бойынша күздік тритикале дақылдары қыста біршама зардап шекті. Қыстау кезінде 2018 жылы 60-75%, 2019 жылы 55-65%, 2020 жылы 70-75% өсімдік сақталды. 2018 жылы жиналған өнімді өсімдіктердің саны 1 м²-ге 181-ден 220-ға дейін, 2019 жылы 1 м²-ге 195-210 өсімдік, 2020 жылы 1 м²-ге 200-ден 225-ке дейін болды. Тритикале дақылының құрылымындағы негізгі құрамдас бөліктерге масақтағы дәндер саны, өсімдіктің өнімді сабақтарының саны және 1000 дәннің массасы жатады. Егін құрылымында басты назар масақтың дәнділігі мен масақтағы дәннің массасына аударылуы тиіс [12].

Өнімді сабақ – ауа райы, қолданылатын агротехнология және сорттың тұқым қуалайтын ерекшеліктеріне байланысты өзгермелі сипатқа ие қасиет. Тритикале үлгілерінің өнімді сабақ саны орташа есеппен 1,6 болды, амплитудалық ауытқумен 1,2-ден 1,5 дана аралығында. Сабағының өнімділігі жоғары көрсеткіштері (1,5 дана) стандарт мәнінен асып түсті (1,4 дана). Бұл көрсеткіш Балтика, Ацтек сорттарында байқалды [13].

Масақтағы масақ саны көбінесе масақтағы дәндер санын анықтайды. Зерттелген үлгілерде масақтағы масақ саны 20-дан 26 данаға дейін ауытқиды. Масақ санының жоғары болуына ірі масақтармен ерекшеленетін үлгілер әсер етті. Ірі масақты үлгілерге ПРАГ-Д, Папурер, Балтика, Ацтек, Қожа, Таза сорттары жатады.

Кесте 1 - 2019-2020 жылдардағы орташа күздік тритикале сорттарының өнімділік құрылымы

Үлгі	Масақ саны, дана	Бір өсімдіктегі дән саны, шт	1000 дәннің салмағы, г	Бір өсімдіктегі дән массасы, г	Өнімділік, г/м^2
ТИ 17	21,0	48,0	38,6	1,4	202
Кентавр	22,0	68,5	36,2	2,6	220
Эльдорадо	20,4	43,0	39,3	1,9	136
ПРАГ -Д	26,2	65,5	36,9	2,0	135
Papurer	26,0	55,0	35,7	2,0	160
Балтика	25,8	52,2	36.3	1,8	108
3905/09	22,4	47.3	34,0	1,7	144
Ацтек	26,3	59,2	34,2	3,2	165
Балауса 8	23,0	45,1	38,5	2,1	101
Таза	26,0	34,0	33,7	1,7	110
Авиценна	24,0	46,0	35,3	1,5	160
Азиада	24,0	34,0	35,0	1,2	101
Қожа	26,0	34,0	43,0	1,6	127
Орташа	24,0	48,9	36,8	1,9	143,7

Масақтағы дәндер саны өнімділіктің маңызды көрсеткіші болып табылады, ол масақтағы дәндердің санымен, масақтағы масақ санына және масақтағы құнарлы гүлдердің санына байланысты анықталады. Зерттелген үлгілерде дәндердің саны бойынша айтарлықтай айырмашылықтар байқалды. Бұл көрсеткіш бір өсімдікте 43 данадан (Эльдорадо) 68,5 данаға дейін (Кентавр) ауытқып отыр [14]. Алынған деректерге сүйенсек, күздік тритикале үлгілерінің көпшілігі астық саны бойынша стандартты ТИ 17 сортынан жоғары көрсеткіштер көрсетті. Масақтың жоғары дәнділігіне ие сорттар бастапқы материал ретінде құнды болып табылады. Кентавр, Прага Д – 65,5 дана,

Ацтек – 59,2 дана, Папурер – 55 дана үлгілері жоғары дәнділігімен ерекшеленді. Тритикале дәндері үлкен, бірақ көп жағдайда мыжылған.

Астықтың қалыптасуы мен дән салу кезеңіндегі күрделі гидротермиялық жағдайларға байланысты зерттелген үлгілердің 1000 дәнінің массасы 28-36 г аралығында болды. Эльдорадо, Эсид 2, Балаус 8 сияқты жекелеген сорттарында дәндердің массасы 38-43 г аралығында өзгерді, ал ТИ 17 стандартты сортының 1000 дәнінің массасы 38,6 г болды. Зерттелген үлгілердің өсімдіктері бір өсімдіктен алынған астық массасы бойынша ерекшеленді. Ең үлкен астық массасы келесі сорттарда тіркелді: Ацтек (3,2 г), Кентавр (2,6 г), Эсид 2 (2,3 г), Праг-Д (2,0 г), Папурер (2,0 г). 2019-2020 жылдар аралығындағы күздік тритикаленің орташа өнімділігі келесідей болды: Кентавр (220 г/м²), Ацтек (165 г/м²), Эльдорадо (136 г/м²), Праг Д (135 г/м²), Папурер (160 г/м²), Қожа (127 г/м²), Балауса 8 (101 г/м²), Балтика (108 г/м²) сорттарында (кесте 1). 2020 жылы күздік тритикаленің келесі үлгілері натуралық салмағы, ақуыз деңгейі мен өнімділігі жоғары көрсеткіштермен ерекшеленді: Л 27 (376 г/м²), Л 24 (321 г/м²), ТИ 17 (303 г/м²), Торнадо (275 г/м²), Хонгор (265 г/м²), Л 9 (254 г/м²), Легион (258 г/м²), Модуль (247 г/м²), Тарасовский (242 г/м²), Timbo (232 г/м²), Тимирязевский 150 (231 г/м²), Л -29 (230 г/м²).

Күздік тритикале дақылының құрылымы элементтерін талдау 2017-2020 жылдары қалыптасқан ауа-райы мен климаттық жағдайлар өнімділіктің жекелеген элементтерінің қалыптасуына теріс әсер еткенін көрсетті.

Қалыптасқан құрғақшылықтың күшеюіне байланысты өнімді болмады және өнімді сабақтардың толық пісуіне дейін сақталуы төмен болды. Егін құрылымының элементтерін талдау деректерін қорытындылай келе, бұл белгілер көбінесе күздік тритикале өсімдіктерінің дамуының белгілі бір кезеңдеріндегі метеорологиялық жағдайлармен өте тығыз байланысты екенін білдіреді, бірақ сонымен қатар жыл бойына тұрақты белгілері бар үлгілер анықталды.

Қорытынды. Әр түрлі экологиялық-географиялық шығу тегі бар коллекциялық сорттарды зерттеу нәтижесінде, будандастыруда экономикалық маңызды белгілердің көзі ретінде, жоғары өнімділік пен астық сапасының көрсеткіштерін қолдануға ұсынылатын құнды формалар анықталды.

ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

1. Fras, Anna; Golebiewski, Damian; Goiebiewska, Kinga Triticale-oat bread as a new product rich in bioactive and nutrient components // Journal of cereal science. – 2018 – Jul. – T. 82. – C. 146-154.

2. Pruska-Kedzior, Anna; Makowska, Agnieszka; Kedzior, Zenon Rheological characterisation of gluten from triticale (x Triticosecale Wittmack) // Journal of the science of food and agriculture. –2017.–Nov.–T.97. – C. 5043-5052.

3. Makowska, Agnieszka; Majcher, Magorzata; Mildner-Szkudlarz, Sylwia Triticale crisp bread enriched with selected bioactive additives: volatile profile, physical characteristics, sensory and nutritional properties // Journal of food science and technology-mysore. – 2017. – Sep. – T. 54. – C. 3092-3101

4. Teliandidis, J., Hung, Y. H., Materia S. and Fontaine, S.L. Role of the PType ATPases, ATP7A and ATP7B in brain copper homeostasis / Front Aging Neurosci. – 2013. – Vol. 5. P. 44.

5. Verbruggen N. Proline Accumulation in Plants : A. Review / N. Verbruggen, C. Hermans // Amino Acids. – 2008. – V. 35. – P. 753–759.

6. Результаты селекции озимой тритикале на качество в РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева / В. А. Мальцев, В. Н. Игонин, В. С. Рубец, В. В. Пыльнев // Труды Кубанского государственного аграрного университета. – 2015. – № 3.– С. 214-219.

7. Гриб, С.И. Тритикале — ценная зернофуражная культура / С.И. Гриб, Т.М. Булавина, В.Н. Беритевич, Ю.Ф. Хатетовский // Вестник семеноводства в СНГ. - 2002. - № 1. - С. 17-19

8. Тритикале – первая зерновая культура, созданная человеком // под ред. Ю.Л. Гужова. – М.: Из д-во Колос, 1978. – 285с.

9. Грабовец А.И. Крохмаль А.В. Селекция тритикале при усилении засух: методы и результаты // Роль тритикале в стабилизации производства зерна, кормов и технологии их использования: матер. междунар. научно-практ. конф. - Ростов-на-Дону, 2016. – Часть1.С 28-39

10. Суханбердина Л.Х. Тулегенова Д.К., Денизбаев С.Е. Оценка сортообразцов озимого тритикале в условиях Приуралья / Л.Х Суханбердина. Д.К.Тулегенова., С.Е Денизбаев //Сб. матер. междунар. научно-практ. конф. «Органическое сельское хозяйство – основа производства экологически чистой продукции». – Алмалыбак, 2018. – С. 220-223

11. Суханбердина Л.Х.Исходный материал для селекции озимого тритикале на продуктивность и качество зерна./ Л.Х, Суханбердина, Д.К Тулегенова, А.Ж.Турбаев //Новости науки Казахстана. Научно-технический сборник, №, 2013, с.155-159

12. Руденко М.И., Шитова И.П., Корнейчук В.А., Малкина Р.М. Методические указания ВИР по изучению мировой коллекции пшеницы. - Л., 1978. – 33 с.

13. Федин М.А. Методика государственного сортоиспытания сельскохозяйственных культур. – М.: Изд-во Агропромиздат, 1985. – 263 с

14. Шаболкина, Е. Н. Технологические и хлебопекарные качества тритикале / Е. Н. Шаболкина, Н. В. Анисимкина, М. В. Беляева // Зерновое хозяйство России. - 2019. - № 2 (62) - С. 21-26. - DOI:10.31367/2079-8725-2019-62-2-21-26.

15. Бадамшина, Е. В. Влияние сортовых особенностей на технологию переработки зерна тритикале селекции Республики Башкортостан / Е. В. Бадамшина, Н. И. Лещенко, О. Ю. Калужина, С. А. Леонова // Вестник Красноярского ГАУ. 2022. - № 7 (184) - С. 86-94. - DOI: 10.36718/1819-4036-2022-7-86-94.

REFERENCES

1. Fras, Anna; Golebiewski, Damian; Goiebiewska, Kinga Triticale-oat bread as a new product rich in bioactive and nutrient components // Journal of cereal science. – 2018 – Jul. – T. 82. – C. 146-154.

2. Pruska-Kedzior, Anna; Makowska, Agnieszka; Kedzior, Zenon Rheological characterisation of gluten from triticale (x Triticosecale Wittmack) // Journal of the science of food and agriculture. –2017.–Nov.–T.97. – C. 5043-5052.

3. Makowska, Agnieszka; Majcher, Magorzata; Mildner-Szkudlarz, Sylwia Triticale crisp bread enriched with selected bioactive additives: volatile profile, physical characteristics, sensory and nutritional properties // Journal of food science and technology-mysore. – 2017. – Sep. – T. 54. – C. 3092-3101

4. Teliandidis, J., Hung, Y. H., Materia S. and Fontaine, S.L. Role of the PType ATPases, ATP7A and ATP7B in brain copper homeostasis / Front Aging Neurosci. – 2013. – Vol. 5. P. 44.

5. Verbruggen N. Proline Accumulation in Plants : A. Review / N. Verbruggen, C. Hermans // Amino Acids. 2008. V. 35. P. 753759.

6. Rezul'taty selekcii ozimoj tritikale na kachestvo v RGAU-MSKHA im. K.A. Timiryazeva / V. A. Mal'cev, V. N. Igonin, V. S. Rubec, V. V. Pyl'nev // Trudy Kubanskogo gosudarstvennogo agrarnogo universiteta. – 2015. – № 3.– S. 214-219.

7. Grib, S.I. Tritikale — cennaya zernofurazhnaya kul'tura / S.I. Grib, T.M. Bulavina, V.N. Beritevich, YU.F. Hatetovskij // Vestnik semenovodstva v SNG. - 2002. - № 1. - S. 17-19

8. Tritikale – pervaya zernovaya kul'tura, sozdannaya chelovekom // pod red. YU.L. Guzhova. – M.: Iz d-vo Kolos, 1978. – 285s.

9. Grabovec A.I. Krohmal' A.V. Selekciya tritikale pri usilenii zasuh: metody i rezul'taty // Rol' tritikale v stabilizacii proizvodstva zerna, kormov i tekhnologii ih ispol'zovaniya: mater. mezhdunar. nauchno-prakt. konf. - Rostov-na-Donu, 2016. – CHast'1.S 28-39

10. Suhanberdina L.H. Tulegenova D.K., Denizbaev S.E. Ocenka sortoobrazcov ozimogo tritikale v usloviyah Priural'ya / L.H Suhanberdina. D.K.Tulegenova., S.E Denizbaev //Sb. mater.

mezhdunar. nauchno-prakt. konf. «Organicheskoe sel'skoe hozyajstvo – osnova proizvodstva ekologicheski chistoj produkcii». – Almalybak, 2018. – S. 220-223

11. Suhanberdina L.H.Iskhodnyj material dlya selekcii ozimogo tritikale na produktivnost' i kachestvo zerna./ L.H, Suhanberdina, D.K Tulegenova, A.ZH.Turbaev //Novosti nauki Kazahstana. Nauchno-tekhnicheskij sbornik, №, 2013,s.155-159

12. Rudenko M.I., SHitova I.P., Kornejchuk V.A., Malkina R.M. Metodicheskie ukazaniya VIR po izucheniyu mirovoj kollekcii pshenicy. - L., 1978. – 33 s.

13. Fedin M.A. Metodika gosudarstvennogo sortoispytaniya sel'skohozyajstvennyh kul'tur. – M.: Izd-vo Agropromizdat, 1985. – 263 s

14. SHabolkina, E. N. Tekhnologicheskie i hlebopekarnye kachestva tritikale / E. N. SHabolkina, N. V. Anisimkina, M. V. Belyaeva // Zernovoe hozyajstvo Rossii. - 2019. - № 2 (62) - S. 21-26. - DOI:10.31367/2079-8725-2019-62-2-21-26.

15. Badamshina, E. V. Vliyanie sortovyh osobennostej na tekhnologiyu pererabotki zerna tritikale selekcii Respubliki Bashkortostan / E. V. Badamshina, N. I. Leshchenko, O. YU. Kaluzhina, S. A. Leonova // Vestnik Krasnoyarskogo GAU. 2022. - № 7 (184) - S. 86-94. - DOI: 10.36718/1819-4036-2022-7-86-94.

РЕЗЮМЕ

Тритикале занимает определенное место в структуре посевных площадей, расширяет биоразнообразие и обеспечивает не только увеличение урожая зерновых, но и увеличение продуктивности животноводства. Выращивание новой культуры в нашем регионе сопровождается определенными трудностями, в первую очередь из-за отсутствия районированных сортов, адаптированных к местным климатическим условиям. Одной из таких культур является озимая тритикале. Цель исследования - изучить коллекционные образцы тритикале озимого и выделить исходный материал, обладающий высокой адаптивностью, устойчивостью к биотическим и абиотическим стрессам, высоким потенциалом урожайности зерна, а также выявить генетические источники для создания сортов тритикале с высокими показателями экономической ценности. Результаты проведенных исследований показали, что исследуемые селекционные образцы озимой тритикале, выращенной в засушливых полевых условиях Уральского региона, различаются по биохимическому составу и количеству питательных веществ. Сортовые образцы могут быть рекомендованы к использованию в качестве исходного материала при селекции озимого тритикале в пищу. Результаты проведенных исследований показали, что все изучаемые сортообразцы отличались уровнем выраженности качественных характеристик.

УДК 664.641.4
МРНТИ 65.35.03

Бекбусинова А.О., магистр, https://orcid.org/0009-0008-1832-1407
Западно-Казахстанский аграрно-технический университет им. Жангир хана, г. Уральск, Казахстан, aidana.bekbusinova@gmail.com
Жаксыгалиева Д.С., магистр, https://orcid.org/0009-0008-3646-0259
Западно-Казахстанский аграрно-технический университет им. Жангир хана, г. Уральск, Казахстан, dariga_aidos@mail.ru

Bekbusinova A.O., master, https://orcid.org/0009-0008-1832-1407
West Kazakhstan Agrarian and Technical University named after Zhangir Khan, Kazakhstan, aidana.bekbusinova@gmail.com
Zhaksygalieva D.S., master, https://orcid.org/0009-0008-3646-0259
West Kazakhstan Agrarian and Technical University named after Zhangir Khan, Kazakhstan, dariga_aidos@mail.ru

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКТОВ ПЕРЕРАБОТКИ ПРОРОЩЕННОГО ЗЕРНА ПШЕНИЦЫ
COMPARATIVE CHARACTERISTICS OF PROCESSED PRODUCTS OF SPROUTED WHEAT GRAIN

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассматривается влияние проращивания зерна пшеницы на физико-химические, органолептические и технологические свойства получаемых продуктов. Проращивание представляет собой биотехнологический процесс, в ходе которого активизируются ферментативные системы зерна, что способствует улучшению усвояемости питательных веществ, снижению антинутриентов и обогащению продукта витаминами, антиоксидантами и пищевыми волокнами. Это делает пророщенное зерно перспективным сырьём для производства функциональных продуктов питания. Результаты показали, что продукты из пророщенного зерна отличаются более насыщенным цветом, рыхлой текстурой, повышенной гигроскопичностью и выраженным кремово-коричневым оттенком. Эти характеристики связаны с ферментативными и биохимическими изменениями, происходящими в процессе проращивания (разложение крахмала, белков, потемнение оболочек и т.д.). Также было зафиксировано незначительное увеличение выхода муки при помоле пророщенного зерна по сравнению с исходным.

Ключевые слова: *пшеница, пророщенная пшеница, функциональные продукты питания, биологически активная пшеница, технология переработки зерна*

Key words: *wheat, sprouted wheat, functional foods, biologically active wheat, grain processing technology*.

Введение. В последние десятилетия наблюдается устойчивый интерес к разработке функциональных продуктов питания, обладающих высокой пищевой и биологической ценностью. В этом контексте особое внимание уделяется использованию пророщенного зерна злаковых культур, в частности, пшеницы. Проращивание — это биотехнологический процесс, в ходе которого активизируются ферментативные системы зерна, улучшается усвояемость нутриентов и снижается содержание антипитательных веществ [1; 2; 3].

Продукты, полученные из пророщенного зерна, отличаются повышенным содержанием витаминов (особенно группы B, C и E), антиоксидантов, аминокислот и пищевых волокон. Эти изменения положительно влияют не только на питательные свойства, но и на органолептические характеристики, текстуру, а также срок хранения конечной продукции [4; 5; 6].

Продукты, полученные в результате переработки пророщенного зерна пшеницы, обладают улучшенными питательными и функциональными свойствами, что делает их перспективными компонентами для различных направлений пищевой промышленности.

Пророщенное зерно придаёт конечной продукции более насыщенный вкус, аромат и цвет, что особенно важно при производстве хлебобулочных, кондитерских и сухих завтраков. Темный оттенок муки и лёгкий ореховый привкус могут стать характерной чертой нового ассортимента изделий. Ферментативное расщепление крахмала и белков в процессе проращивания облегчает переваривание продуктов, что особенно ценно для детского, диетического и спортивного питания [7; 8; 9].

Мука и крупка из пророщенного зерна могут использоваться для обогащения традиционных рецептур — хлеба, печенья, батончиков, каш, напитков и сухих смесей. Кроме того, пророщенные отруби могут применяться в производстве диетических волокнистых добавок и безглютеновых продуктов [10; 11; 14].

Настоящее исследование направлено на сравнительную оценку свойств продуктов, произведённых на основе пророщенного зерна пшеницы и его традиционного аналога. В

статье рассматриваются органолептические и технологические параметры переработанных образцов, а также делается вывод об их целесообразности использования в пищевой промышленности.

Целью исследование являлась оценка различий во внешнем виде и цвете продуктов, полученных при помоле исходного и пророщенного зерна пшеницы на всех этапах технологической схемы.

Материалы и методика. Исследования проводились в лабораторных условиях на базе научно-технологического центра «Техностарт», а также в научной отраслевой лаборатории зерновых продуктов Белорусского государственного университета пищевых и химических технологий.

В качестве исследуемого материала использовалось зерно озимой пшеницы сорта «Рассвет» белорусской селекции, урожая 2023 года.

1. Была проведена оценка органолептических и физико-химических свойств пшеницы в соответствии с требованиями ГОСТ 9353-2016. Предварительная очистка зерна осуществлялась с применением сепаратора QUATUOR 2 (Chopin).

2. Процесс замачивания и проращивания зерна по водно-воздушной методике. В качестве дезинфектанта использовался раствор перманганата калия ($KMnO_4$). Проращивание продолжалось в течение 48 часов с чередованием водно-воздушных интервалов 8/8 часов. По завершении проращивания зерно подвергалось сушке при температуре 55 °С в течение 6 часов.

3. Подготовка пророщенного зерна к помолу, включающая гидротермическую обработку. Этот процесс направлен на улучшение технологических свойств зерна и повышение выхода готовой продукции. Зерно увлажнялось до оптимальной влажности 15 %.

4. Осуществлялся помол зерна на лабораторной мельнице Lab-mill, предназначенной для переработки мягкой и твёрдой пшеницы с получением муки и других продуктов промышленного качества. Процесс помола состоял из пяти последовательных стадий: двух стадий дробления, одной стадии шлифования и двух стадий размола.

5. Органолептические и физико-химические свойства муки из пророщенного и исходного зерна пшеницы определялись стандартными методами.

Результаты исследований. Общий выход муки из пророщенного зерна составляет 67,8 %, из нативного – 66,6 %, выход отрубей на драных системах – 8,9 и 9,2 %, выход отрубей на размольных и шлифованных системах – 18,2 и 20,3 % соответственно.

Таблица 1 – Внешний вид получаемых продуктов при помоле зерна пшеницы

Название системы, продукта	Внешний вид получаемых продуктов	
	Исходное зерно пшеницы	**Пророщенное зерно пшеницы**
I дранная система		
A_1 (сход 1000) сростки		
B_1 (проход 1000) дунст		

C_1 (проход 450) крупка		
D_1 (проход 200) мука		
II дранная система		
A_2 (сход 1000) отруби дранные (конечный продукт)		
B_2 (проход 1000) дунст		

Продолжение таблицы 1

Название системы, продукта	Внешний вид получаемых продуктов	
	Исходное зерно пшеницы	**Пророщенное зерно пшеницы**
C_2 (проход 450) крупка		
I шлифовочная система		
E_1 (проход 200) мука		
F_1 (проход 500) крупка		
G (сход 500) отруби шлифовочные (конечный продукт)		
I размольная система		
H_1 (сход 160) крупка		
I_1 (проход 160) мука		
	Исходное зерно пшеницы	**Пророщенное зерно пшеницы**
H_2 (сход 160) отруби размолотые (конечный продукт)		
I_2 (проход 160) мука		

По итогам визуального анализа видно, что мука и крупка, полученные из пророщенного зерна, имеют более тёмный и насыщенный кремово-коричневый оттенок, что связано с биохимическими изменениями, происходящими в процессе проращивания

(повышение активности ферментов, расщепление крахмала и белков, потемнение оболочек).

Продукты из исходного зерна отличаются более светлым цветом: мука — бело-кремовая, крупка — светло-жёлтая.

Сростки и отруби из пророщенного зерна выглядят более мягкими, рыхлыми, с меньшим количеством острых и плотных частиц, в отличие от более жёстких и плотных отрубей исходного зерна.

Дунст и крупка, полученные из пророщенного зерна, визуально отличаются большей гигроскопичностью и рыхлостью, что говорит о структурных изменениях крахмальных гранул и клеточных оболочек.

Мука, как в I, так и во II системах, из пророщенного зерна выглядит менее однородной по цвету, с чуть более выраженной текстурой.

Таблица 2 – Характеристика получаемых продуктов по системам

Система	Исходное зерно	Пророщенное зерно
I дранная	Сухие, плотные сростки, светлая мука	Сростки более рыхлые, мука темнее, с кремовым оттенком
II дранная	Отруби плотные, дунст однородный	Отруби менее плотные, крупка темнее, мука с кремово-бежевым оттенком
Шлифовочная система	Отруби светло-коричневые, мука белее	Отруби темнее, мука насыщенного кремового цвета
I и II размольные	Крупка светлая, мука тонкая, однородная	Крупка с желтовато-коричневым оттенком, мука рыхлее

Выводы и рекомендации. Внешний вид продуктов, полученных при помоле пророщенного зерна, отличается от исходного более насыщенным цветом и рыхлой текстурой. Это связано с физиологическими и биохимическими изменениями, происходящими в зерне в процессе проращивания. Подобные изменения могут положительно влиять на функциональные свойства муки и продуктов на её основе, однако требуют учёта в технологии их дальнейшей переработки (например, в хлебопечении или изготовлении вафельной продукции).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Saima Perveen, Saeed Akhtar, Tariq Ismail, Muhammad Qamar, Dur-e-shahwar Sattar, Wisha Saeed, Muhammad Younis, Tuba Esatbeyoglu. Comparison of nutritional, antioxidant, physicochemical, and rheological characteristics of whole and sprouted wheat flour // LWT. 2024. Vol. 209. Art. 116679. DOI: 10.1016/j.lwt.2024.116679.

2. Betts N.S., Dockter C., Berkowitz O., Collins H.M., Hooi M., Lu Q., Fincher G.B. Transcriptional and biochemical analyses of gibberellin expression and content in germinated barley grain // Journal of Experimental Botany. 2020. Vol. 71, no. 6. Pp. 1870-1884.

3 Sharma S., Singh A., Singh B. Characterization of in vitro antioxidant activity, bioactive components, and nutrient digestibility in pigeon pea (Cajanus cajan) as influenced by germination time and temperature // Journal of Food Biochemistry. 2019. Vol. 43, no. 2. Art. e12706.

4. Сафронова Т., Казина В., Сафронова К. Разработка технологических параметров проращивания зерна пшеницы // Техника и технология пищевых производств. 2017. №1. С. 37-43.

5. Бережная, О. В. Разработка технологии получения проростков зерна пшеницы при производстве хлебопекарной и кулинарной продукции: дис. ... канд. техн. Наук: 05.08.01 / О. В. Бережная. – Москва: МГУПП, 2015. – 206 с.

6. Бекбусинова А.О., Байбатыров Т.А., Булеков Т.А., Урбанчик Е.Н., Жиенбаевна С.Т. Изучения изменения физико-химических свойств зерна пшеницы Белорусской селекции в процессе проращивания // Вестник университета Шакарима. Технические науки. 2024. № 1(13). С. 266-273.

7. Kaur, H. Comparative evaluation of physicochemical, nutritional and molecular interactions of flours from different cereals as affected by germination duration / H. Kaur, B. S. Gill // Food Measure. 2020. Vol. 14. Pp. 1147-1157. DOI: 10.1007/s11694-019-00364-5.

8. Delian E., Chira A., Bădulescu L., Chira L. Insights into microgreens physiology // Sci. Pap. Ser. B Hortic. 2015. № 59. Pp. 447-454.

9. Kyriacou M.C., Rouphael Y., Di Gioia F., Kyratzis A., Serio F., Renna M., De Pascale S., Santamaria P. Micro-scale vegetable production and the rise of microgreens // Trends Food Sci. Technol. 2016. № 57. Pp. 103-115. DOI: 10.1016/j.tifs.2016.09.005.

10. Azeke, M. A. Effect of germination on the phytase activity, phytate and total phosphorus contents of rice (Oryza sativa), maize (Zea mays), millet (Panicum miliaceum), sorghum (Sorghum bicolor) and wheat (Triticum aestivum) / M. A. Azeke, S. J. Egielewa, H. U. Eigbogbo, I. G. Ihimire // Food Scientists & Technologists. 2011. № 48(6). Pp. 724-729.

11. Боровская, Э. Блюда для повышения иммунитета. Злаковая кулинария / Боровская Э. – М.: Эксмо, 2013. – 320 с. – (Кулинария. Здоровое питание).

12. Benincasa P., Falcinelli B., Lutts S., Stagnari F., Galieni A. Sprouted Grains: A Comprehensive Review // Nutrients. 2019. Vol. 11, no. 2. P. 421.

13. Pekkirişci, B. Determination of the physical, chemical, and antinutritional properties of firik and einkorn bulgur / B. Pekkirişci, N. Bilgiçli, T. Cankurtaran-Kömürcü // Cereal Chemistry. 2023. Vol. 100. Pp. 966–973.

14. Хузин, Ф.К. Совершенствование технологии производства хлебобулочного изделия на основе измельченного проросшего зерна пшеницы / Ф.К. Хузин, З.А. Канарская, А.Р. Ивлева, В.М. Гематдинова // Вестник Воронежского государственного университета инженерных технологий. 2017. № 1. С. 178-187.

15. Falcinelli, B., Calzuola, I., Gigliarelli, L., Torricelli, R., Polegri, L., Vizioli, V., Benincasa, P., & Marsili, V. Phenolic content and antioxidant activity of wholegrain breads from modern and old wheat (Triticum aestivum L.) cultivars and ancestors enriched with wheat sprout powder // Italian Journal of Agronomy. 2018. Vol. 13, no. 4. Pp. 297–302. DOI: 10.4081/ija.2018.1220.

REFERENCES

1. Saima Perveen, Saeed Akhtar, Tariq Ismail, Muhammad Qamar, Dur-e-shahwar Sattar, Wisha Saeed, Muhammad Younis, Tuba Esatbeyoglu. Comparison of nutritional, antioxidant, physicochemical, and rheological characteristics of whole and sprouted wheat flour // LWT, Volume 209. 2024. 116679. ISSN 0023-6438. https://doi.org/10.1016/j.lwt.2024.116679.

2. N Betts N.S., Dockter C., Berkowitz O., Collins H.M., Hooi M., Lu Q., Fincher G.B. Transcriptional and biochemical analyses of gibberellin expression and content in germinated barley grain // Journal of Experimental Botany. 2020. Vol. 71, no. 6. Pp. 1870-1884

3. S Sharma S., Singh A., Singh B. Characterization of in vitro antioxidant activity, bioactive components, and nutrient digestibility in pigeon pea (Cajanus cajan) as influenced by germination time and temperature // Journal of Food Biochemistry. 2019. Vol. 43, no. 2. Art. e12706.

4. Safronova T., Kazina V., Safronova K. Razrabotka tehnologicheskih parametrov prorashhivanija zerna pshenicy // Tehnika i tehnologija pishhevyh proizvodstv. 2017. №. 1. S. 37-43.

5. Berezhnaja, O. V. Razrabotka tehnologii poluchenija prorostkov zerna pshenicy pri proizvodstve hlebopekarnoj i kulinarnoj produkcii: dis. ... kand. tehn. Nauk: 05.08.01 / O. V. Berezhnaja. – Moskva: MGUPP, 2015. – 206 s.

6. Bekbusinova A.O., Bajbatyrov T.A., Bulekov T.A., Urbanchik E.N., Zhienbaevna S.T. Izuchenija izmenenija fiziko-himicheskih svojstv zerna pshenicy Belorusskoj selekcii v processe prorashhivanija // Vestnik universiteta Shakarima. Tehnicheskie nauki. – № 1(13), 2024. - S. 266-273.

7. Kaur, H. Comparative evaluation of physicochemical, nutritional and molecular interactions of flours from different cereals as affected by germination duration / N. Kaur, B. S. Gill // Food Measure. – 2020. – № 14. – R. 1147–1157. https://doi.org/10.1007/s11694-019-00364-5

8. Delian E., Chira A., Bădulescu L., Chira L. Insights into microgreens physiology. Sci. Pap. Ser. B Hortic. – 2015; – № 59. – R. 447–454. [Google Scholar]

9. Kyriacou M.C., Rouphael Y., Di Gioia F., Kyratzis A., Serio F., Renna M., De Pascale S., Santamaria P. Micro-scale vegetable production and the rise of microgreens. Trends Food Sci. Technol. – 2016; – № 57. – R. 103–115. doi: 10.1016/j.tifs.2016.09.005. [CrossRef] [Google Scholar]

10. Azeke, M. A. Effect of germination on the phytase activity, phytate and total phosphorus contents of rice (Oryza sativa), maize (Zea mays), millet (Panicum miliaceum), sorghum (Sorghum bicolor) and wheat (Triticum aestivum) / M. A. Azeke, S. J. Egielewa, H. U. Eigbogbo, I. G. Ihimire // Food Scientists & Technologists. – 2011. – № 48 (6). – P. 724–729.

11. Borovskaja, Je. Bljuda dlja povyshenija immuniteta. Zlakovaja kulinarija / Borovskaja Je. – M.: Jeksmo, 2013. – 320 s. – (Kulinarija. Zdorovoe pitanie)

12. Benincasa P., Falcinelli B., Lutts S., Stagnari F., Galieni A. Sprouted Grains: A Comprehensive Review. Nutrients. – 2019. – № 11(2). – R. 421.

13. Pekkirişc, B. Determination of the physical, chemical, and antinutritional properties of firik and einkorn bulgur / B. Pekkirişci, N. Bilgiçli, T. Cankurtaran-Kömürcü // Cereal Chemistry. – 2023. – № 100. – R. 966–973.

14. Huzin, F.K. Sovershenstvovanie tehnologii proizvodstva hlebobulochnogo izdelija na osnove izmel'chennogo prorosshego zerna pshenicy / F.K. Huzin, Z.A. Kanarskaja, A.R. Ivleva, V.M. Gematdinova // Vestnik Voronezhskogo gosudarstvennogo universiteta inzhenernyh tehnologij. — 2017. — № 1. — S. 178-187.

15. Falcinelli, B., Calzuola, I., Gigliarelli, L., Torricelli, R., Polegri, L., Vizioli, V., Benincasa, P., & Marsili, V. (2018). Phenolic content and antioxidant activity of wholegrain breads from modern and old wheat (Triticum aestivum L.) cultivars and ancestors enriched with wheat sprout powder. Italian Journal of Agronomy, 13(4), 297–302. https://doi.org/10.4081/ija.2018.1220

ТҮЙІН

Бұл мақалада бидай дәнінің өнуінің алынған өнімдердің физика-химиялық, органолептикалық және технологиялық қасиеттеріне әсері қарастырылады. Өскіндер - бұл астықтың ферментативті жүйелерін белсендіретін биотехнологиялық процесс, ол қоректік заттардың сіңуін жақсартуға, антинутриенттерді азайтуға және өнімді витаминдермен, антиоксиданттармен және тағамдық талшықтармен байытуға көмектеседі. Бұл өскен астықты функционалдық тамақ өнімдерін өндіру үшін перспективалы шикізатқа айналдырады. Нәтижелер өсіп шыққан астық өнімдерінің қанық түсті, жұмсақ құрылымды, жоғары гигроскопиялық және айқын кремді-қоңыр реңктері бар екенін көрсетті. Бұл сипаттамалар өну процесінде болатын ферменттік және биохимиялық өзгерістермен байланысты (крахмалдың, белоктардың ыдырауы, қабықтың қараюы және т.б.). Түпнұсқамен салыстырғанда өскен дәнді ұнтақтау кезінде ұн шығымының шамалы өсуі де байқалды.

RESUME

This article examines the effect of wheat grain germination on the physicochemical, organoleptic and technological properties of the resulting products. Germination is a biotechnological process that activates the enzymatic systems of the grain, which improves the digestibility of nutrients, reduces antinutrients and enriches the product with vitamins, antioxidants and dietary fiber. This makes sprouted grain a promising raw material for the production of functional foods. The results showed that products made from sprouted grain are more saturated in color, have a loose texture, increased hygroscopicity and a pronounced creamy-brown hue. These characteristics are associated with enzymatic and biochemical changes that occur during germination (decomposition of starch, proteins, darkening of the shells, etc.). A slight increase in the yield of flour was also recorded when milling sprouted grain compared to the original.

УДК: 631.6 (574.1)
МРНТИ: 68.31.21; 68.35.47; 68.31.02; 68.03.07

Нагиева А.Г., PhD, основной автор, https://orcid.org/0000-0001-5381-8541
НАО «Западно-Казахстанский аграрно-технический университет имени Жангир хана», г. Уральск, ул. Жангир хана 51, 090009, Казахстан, nagievaliya@mail.ru
Оңаев М.Қ., кандидат технических наук, https://orcid.org/0000-0001-5584-1948
НАО «Западно-Казахстанский аграрно-технический университет имени Жангир хана», г. Уральск, ул. Жангир хана 51, 090009, Казахстан, maratonaev@mail.ru
Джапаров Р.Ш., PhD, https://orcid.org/0000-0003-1945-5825
НАО «Западно-Казахстанский аграрно-технический университет имени Жангир хана», г. Уральск, ул. Жангир хана 51, 090009, Казахстан, dzhaparovr84@mail.ru
Аюпов Е.Е., PhD, https://orcid.org/0000-0001-6357-2522
НАО «Западно-Казахстанский аграрно-технический университет имени Жангир хана», г. Уральск, ул. Жангир хана 51, 090009, Казахстан, ergalib@mail.ru
Умбеткалиев Н.М., магистр биологии, https://orcid.org/0000-0002-5175-2195
НАО «Западно-Казахстанский аграрно-технический университет имени Жангир хана», г. Уральск, ул. Жангир хана 51, 090009, Казахстан, nurlan-72kzt@mail.ru

Nagiyeva A.G., PhD, the main author, https://orcid.org/0000-0001-5381-8541
NJSC «West Kazakhstan Agrarian and Technical University named after Zhangir khan», Uralsk, st. Zhangir khan 51, 090009, Kazakhstan, nagievaliya@mail.ru
Ongayev M.K., Candidate of Technical Sciences, https://orcid.org/0000-0001-5584-1948
NJSC «West Kazakhstan Agrarian and Technical University named after Zhangir khan», Uralsk, st. Zhangir khan 51, 090009, Kazakhstan, maratonaev@mail.ru
Japarov R.Sh., PhD, https://orcid.org/0000-0003-1945-5825
NJSC «West Kazakhstan Agrarian and Technical University named after Zhangir khan», Uralsk, st. Zhangir khan 51, 090009, Kazakhstan, dzhaparovr84@mail.ru
Ayupov Y.Y., PhD, https://orcid.org/0000-0001-6357-2522
NJSC «West Kazakhstan Agrarian and Technical University named after Zhangir khan», Uralsk, st. Zhangir khan 51, 090009, Kazakhstan, ergalib@mail.ru
Umbetkaliyev N.M., Master of Biological Sciences, https://orcid.org/0000-0002-5175-2195
NJSC «West Kazakhstan Agrarian and Technical University named after Zhangir khan», Uralsk, st. Zhangir khan 51, 090009, Kazakhstan, nurlan-72kzt@mail.ru

ПОЧВЕННО-МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЛИМАННОГО УЧАСТКА В В АРИДНОЙ ЗОНЕ ЗАПАДНОГО КАЗАХСТАНА

SOIL AND MICROBIOLOGICAL PARAMETERS OF THE ESTUARY SITE IN THE ARID ZONE OF WESTERN KAZAKHSTAN

Аннотация

В работе рассматриваются почвенные и микробиологические показатели на лимане №50 в Акжаикском районе Западно-Казахстанской области, используемом для выращивания естественных кормовых трав. Изучаемые показатели почвы на лиманном участке сравнивались с неорошаемым участком залежи, располагающиеся на одной территории.

Ежегодное затопление приводило в сравнении с незатопляемым участком к повышению основного почвенного показателя – гумуса, в среднем по генетическим горизонтам на 0,10-0,28 % (абсолютного значения). Затопление позволило понизить щелочность почвенного раствора до 7,7 pH, а также степень засоления – до слабой (при средней степени засоленности на незатапливаемом участке).

Сравнительный анализ бактериального сообщества показывает значительное различие между участками. На незатапливаемом участке доминировали Proteobacteria (33,75–54,22%), Firmicutes (13,97–19,19%) и Actinobacteria (17,31–12,50%), на затапливаемом соответственно Verrucomicrobia (20,51–8,04%), Acidobacteria (5,11–2,00%). На затапливаемом участке активность Deltaproteobacteria и Clostridia проявлялось в анаэробных условия, что характерно для нижележащих горизонтов почвы.

Затопление почв оказывает многоаспектное влияние на их химические и микробиологические характеристики. Понимание этих процессов имеет важное значение для управления экосистемами, агрономической практики и смягчения последствий изменения климата.

ANNOTATION

The paper considers soil and microbiological parameters on estuary No. 50 in the Akzhaiksky district of the West Kazakhstan region, used for growing natural forage grasses. The studied soil parameters in the estuary area were compared with the non-irrigated area of the deposit, located on the same territory.

In comparison with the non–flooded area, annual flooding led to an increase in the main soil indicator, humus, by an average of 0,10-0,28 % (absolute value) over the genetic horizons. Flooding made it possible to lower the alkalinity of the soil solution to 7,7 pH, as well as the degree of salinity to a weak one (with an average degree of salinity in an unheated area).

A comparative analysis of the bacterial community shows a significant difference between the sites. Proteobacteria (33,75–54,22 %), Firmicutes (13,97–19,19 %) and Actinobacteria (17,31–12,50 %) dominated in the unheated area, while Verrucomicrobia (20,51–8,04 %) and Acidobacteria (5,11–2,00 %) dominated in the flooded area. In the flooded area, the activity of Deltaproteobacteria and Clostridia was manifested in anaerobic conditions, which is typical for the underlying soil horizons.

Flooding of soils has a multidimensional effect on their chemical and microbiological characteristics. Understanding these processes is essential for ecosystem management, agronomic practices, and climate change mitigation.

Ключевые слова: *почвенные микроорганизмы, агрохимические показатели, почва, грунтовые воды, секвенирование, затопление.*

Key words: *soil microorganisms, agrochemical indicators, soil, groundwater, sequencing, flooding.*

Введение. Основным направлением деятельности агропромышленного комплекса Западно-Казахстанской области является развитие животноводства, для чего необходима

стабильная кормовая база [1, 2]. Использование затопления паводковыми водами сельскохозяйственных земель является экономически целесообразным и надежным способом получения стабильных урожаев кормовых трав. Наличие водных ресурсов позволяет использовать, главным образом, весеннее затопление для орошения сельскохозяйственных угодий [3, 4].

Плодородие почвы является основным определяющим свойством и средой для жизнедеятельности микроорганизмов. Рассматривая почву как сложную систему для микроорганизмов, следует отметить, что на состав бактериальных сообществ сухостепных почв влияют такие факторы, как содержание органического вещества, pH, влажность, доступность питательных веществ, температура [5]. Микробное сообщество является наиболее чувствительным компонентом почвы, в первую очередь реагирующим на антропогенное воздействие. Принимая во внимание, что почвенные микроорганизмы играют исключительную роль в круговороте вещества и энергии, самоочищении почвы, продуктивности фитоценозов и устойчивости экосистем в целом, одной из приоритетных задач современного почвоведения становится изучение трансформации микробных сообществ почв в условиях антропогенного воздействия и их восстановления до исходных параметров. В исследованиях Thidarat Rupngam и др. [6] отмечено, что затопление увеличивает содержание растворенного органического углерода, что связано с анаэробными условиями и распадом органического вещества.

Затопление почв существенно влияет на состав и активность микробных сообществ, способствует изменению структуры бактериальных и архейных сообществ за счет изменения содержания солей и органического вещества [7]. Активность микробных сообществ значительно возрастает в анаэробных условиях, что способствует ускорению разложения органического вещества и выделению углеродных соединений [8].

Под воздействием оросительных мелиораций меняется интенсивность деятельности микрофлоры: увеличивается численность аммонификаторов, нитрификаторов и уменьшается число денитрификаторов, заметно возрастает численность азотобактера [9, 10]. Кроме того, происходит увеличение продолжительности микробиологической активности. Несмотря на негативные факторы, а именно засоление, засушливость почвы, дефицит влаги в почве, многие микроорганизмы имеют свойство адаптироваться к экстремальным факторам.

Целью данной работы было изучение эколого-мелиоративного состояния лиманного участка на основе исследований почвенных показателей, состава доминирующих таксонов микробиомов, гидрогеологических и гидрохимических характеристик грунтовых вод.

Материалы и методы исследований. Исследования проводились в 2024 году на затопляемом и не орошаемом опытных участках, расположенных на территории поселка Алгабас Акжаикского района Западно-Казахстанской области.

Исследуемая почва относится к каштановой слабосолонцеватой тяжелосуглинистой с повышенным содержанием ила и низким содержанием гумуса.

Ровный ландшафт местности с замкнутыми блюдцеобразными понижениями способствовал сосредоточению в Западно-Казахстанской области природных затопляемых сельскохозяйственных угодий с луговой растительностью.

Оценка режима и периодичности затопления проводилась с использованием натурных наблюдений и данных космических снимков территории затапливаемого участка со спутника Landsat 8-9, взятых с сайта Геологической службы США [11].

Для определения и выделения на спутниковом снимке на фоне почвы и растительности объектов открытой воды или объектов во влажном состоянии использовался индекс NDWI (Normalized Difference Water Index) [11, 12].

В отобранных почвенных образцах определялись содержание гумуса (ГОСТ 26213-91), pH (ГОСТ 26483-85), емкость поглощения (ГОСТ 17.4.4.01-84), водная вытяжка (карбонаты и бикарбонаты – ГОСТ 26424-85; хлориды – ГОСТ 26425-85; сульфаты –

ГОСТ 26426-85; кальций и магний – ГОСТ 26428-85; натрий – ГОСТ 26427-85), обменный натрий (ГОСТ 29950-86), подвижный фосфор и калий (ГОСТ 26205-91), нитратный азот (ГОСТ 26951-86).

Тип засоления устанавливался по таблице Н.И. Базилевич и Е.Н. Панковой [13]. Гранулометрический состав почвы определялся по методике Качинского [14].

Закладка полевого опыта проводилась по методике Б.А. Доспехова [15].

Для оценки микробиомного состава проведен метагеномный анализ методом высокопроизводительного секвенирования. Для выделения ДНК брали 0,2 г исследуемых почвенных образцов. Готовый очищенный препарат ДНК применяли с универсальными праймерами F515 GTGCCAGCMGCCGCGGTAA и R806 GACTACVSGGGTATCTAAT [16], имеющие специфичные для данной технологии олигонуклеотидные адаптеры. Метагеномное секвенирование фрагмента 16S рРНК проводили на пиросеквенаторе Roche GS Junior, в соответствии с предоставленным фирмой «Roche» протоколом. Полученные в результате секвенирования гена 16S рРНК данные анализировали в программе «QIIME» [17].

Результаты и обсуждение. Для изучения и сравнения по морфологическим и химическим показателям были заложены два почвенных разреза на незатапливаемом (Разрез 1) и затапливаемом (Разрез 2) участках.

Реакция среды (pH) незатапливаемого участка в верхнем горизонте отмечена слабощелочной, далее вниз по профилю варьировала от слабо - до сильнощелочной (pH 7,9-9,0). Аналогичная динамика получена и на сравнительном разрезе затапливаемого участка (pH 7,7-8,6).

Содержание гумуса в горизонте A_1 на контрольном участке составляло 2,27 %, на затапливаемом участке – 2,37 %. Далее вниз по почвенному профилю содержание гумуса закономерно снижалось на обоих изучаемых участках.

Содержание нитратного азота на незатапливаемом участке находилось в пределах 7,28-7,2 мг/кг, с уменьшением вниз по профилю, на лиманном участке составляло 5,27-5,97 мг/кг, с некоторым увеличением с глубиной.

Между изучаемыми участками имелись различия в содержании подвижных форм фосфора. В Разрезе 1 в горизонте A_1 содержание фосфора было 39,5 мг/кг, с увеличением в горизонте B_1 до 58,0 мг/кг и некоторым уменьшением в следующем горизонте до 50,6 мг/кг, в Разрезе 2 данный показатель по горизонтам значимых различий не имел и находился в пределах 34,5-33,3 мг/кг.

В Разрезе 1 содержание калия в горизонтах A_1 и B_2 практически имело одинаковые значения, однако в горизонте B_1 отмечалось некоторое повышение – 387 мг/кг. В Разрезе 2 в верхнем горизонте содержание калия было ниже (274,2 мг/кг), чем в нижележащих горизонтах B_1 и B_2 с показателями 387,0 и 314,7 мг/кг соответственно.

Незатапливаемый участок характеризовался хлоридно-сульфатным типом засоления и средней степенью засоления по всему профилю. На затапливаемом участке с поверхности почва имела хлоридно-сульфатный тип и слабую степень засоления, горизонт BC отличался сульфатно-хлоридным типом при слабой степени засоления.

Глубина залегания грунтовых вод находилась на уровне 207 см и соответственно по типу почва являлась гидроморфной (рисунок 1).




Рисунок 1 – Химическая характеристика грунтовой воды затапливаемого участка

Анализ грунтовой воды на затапливаемом участке показал следующие результаты: минерализация ½ HCO_3 – 778 мг/дм^3, минерализация воды – 1083 мг/дм^3, сухой остаток – 940 мг/дм^3, подгруппа вод – весьма слабосолоноватые, pH (ед. pH) – 7,58, жесткость общая – 8,50 мг-экв/дм^3, жесткость карбонатная – 8,50 мг-экв/дм^3, жесткость некарбонатная не обнаружена, окисляемость перманганатная – 1,20 мг/дм^3, двуокись кремния SiO_2 – 12 мг/дм^3, фенолы (фенольный индекс) не обнаружены, натрий – 101 мг/дм^3, калий – 48 мг/дм^3, кальция – 118 мг/дм^3, магний – 32 мг/дм^3, ионы аммония – 0,40 мг/дм^3, железо^{общ} – не обнаружено, карбонаты не обнаружены, гидрокарбонаты – 610 мг/дм^3, хлориды – 95 мг/дм^3, сульфаты – 66 мг/дм^3, нитраты не обнаружены, нитриты – 0,07 мг/дм^3.

Результаты анализа методом высокопроизводительного секвенирования для определения доминантов почвенных микроорганизмов на незатапливаемом и затапливаемом участках выявили два домена – Bacteria (99%), Archaea (до 1%), а также неидентифицируемые микроорганизмы, относящиеся к бактериям (до 1%), наличие вирусов не обнаружено. На уровне фил по исследуемым участкам выявлены 11 таксономических категорий, из них доминирующие бактериальные сообщества представлены филами Proteobacteria, Actinobacteria, Verrucomicrobia, NA, переменно либо реже встречающиеся представители Bacteroidetes, Planctomycetes, Acidobacteria, Caldithrix, Chloroflexi (рисунок 2).

Сравнительно исследуемые участки имели различия как по качественному, так и количественному составу. Так, содержание представителей сообществ *Proteobacteria* варьируют в профиле с постепенным увеличением к нижележащим горизонтам на незатапливаемом и затапливаемом участках, превалируя на первом (33,7-54,2% и 24,89-31,4% соответственно). Представители *Actinobacteria* на первом участке имели вариацию в верхних плодородных горизонтах и резким уменьшением в нижележащих, и составили 17,31% в A_1 горизонте, B_1 – 19,5%, B_2 и С горизонтах – 13,6 и 12,5%. Аналогичное распределение по горизонтам наблюдается у представителей *Firmicutes* (13,97-19,19% и 13,21-15,25% соответственно). Представители *Gammaproteobacteria, Alphaproteobacteria, Deltaproteobacteria* установлены в горизонте B_1 с содержанием 14,06%, 11,53% и 9,35% соответственно, а представители *Verrucomicrobia, Bacteroidetes, Planctomycetes, Acidobacteria, Caldithrix, Chloroflexi, Sphingobacteriia* представлены в малых количествах, либо обнаружены только в некоторых горизонтах.

Основная масса неидентифицируемых бактерий сосредоточены в верхнем A_1 горизонте (13,5%) незатапливаемого участка, на сравнительном участке имели одинаковое распределение по горизонтам.

На уровне семейства сравнительный анализ по содержанию бактериальных сообществ по генетическим горизонтам имели некоторые различия. Так, на сравнительных участках по содержанию в профиле лидировали неидентифицируемые бактерии (24,89-19,36% и 27,18-24,53%). Представители семейства Clostridiaceae установлены на затапливаемом участке в корнеобитаемом горизноте горизонте (2,35%), то на затапливаемом участке они расположились с поверхности до материнской породы в пределах 2%. Представители семейств Rhodospirillaceae обнаружены только на незатапливаемом участке повсеместно (2,0-895%). Другие представители семейств Chromatiaceae (3,64%), Desulfovibrionaceae (3,6-3,1%), Thermoanaerobacteraceae (2,11%), Sphingomonadaceae (1,84%), Caldithrixaceae (1,83%) обнаружены только в верхнем A_1 горизонте, представители семейств Bacillaceae (12,48-8,16%), Ectothiorhodospiraceae (6,52-10,25%), Pseudonocardiaceae (6,35-4,07%) обнаружены с горизонта B_1 до материнской породы, семейства Micrococcaceae (2,05%), Halomonadaceae (5,59-4,15%), Pseudomonadaceae (2,79-3,29%), Oceanospirillaceae (2,07%), Alteromonadaceae (2,99%) установлены в нижележащих горизонтах. На затапливаемом участке представители семейств Chthoniobacteraceae (6,52-10,25%), Paenibacillaceae (2,37-4,93%), Clostridiaceae (2,16-2,70%) распределены по горизонтам вниз по профилю, семейства Caldithrixaceae (2,1-2,3%), Solibacteraceae (1,93%), Acidobacteriaceae (1,87%), Pedosphaeraceae (1,85%) обнаружены в верхнем A_1 горизонте, семейства Hyphomicrobiaceae (3,15-,26%), другие представители семейств Thermoanaerobacteraceae (2,2-2,54%), Micromonosporaceae (2,27%), Rhodocyclaceae (3,22%), Chromatiaceae (2,87%), Peptococcaceae (2,84%), Streptomycetaceae (2,35%) расположены в нижележащих горизонтах.

Такое распределение почвенных сообществ микроорганизмов объясняется тем, что возможно фактор затопления негативно сказался на среде обитания микробиома, что принудило их к перемещению в нижележащие горизонты, где возможно обитание более благоприятно, несмотря на критические свойства – присутствие карбонатов, засоление, высокая плотность, низкая обеспеченность органическим веществом и питательными элементами, избытком или недостатком влаги и т.д.

Выводы. Таким образом, использование лиманного орошения приводило в сравнении с незатопляемым участком к повышению основного почвенного показателя – гумуса, в среднем по генетическим горизонтам на 0,10-0,28 % (абсолютного значения). Затопление способствовало понижению щелочности почвенного раствора до 7,7 pH и степени засоления – до слабой (при средней степени засоленности на незатапливаемом участке). Содержание нитратов также уменьшаются с глубиной, при этом их концентрация на незатапливаемых почвах выше, чем на затапливаемых. Содержание фосфора имело более высокие показатели на незатапливаемых участках, меньшие различия были при сравнении содержания калия в почве.

Сравнительный анализ бактериального сообщества показывает значительное различие между участками. На незатапливаемом участке доминировали Proteobacteria (33,75–54,22%), Firmicutes (13,97–19,19%) и Actinobacteria (17,31–12,50%), на затапливаемом соответственно Verrucomicrobia (20,51–8,04%), Acidobacteria (5,11–2,00%). На затапливаемом участке активность Deltaproteobacteria и Clostridia проявлялось в анаэробных условия, что характерно для нижележащих горизонтов почвы.

Затопление почв оказывает многоаспектное влияние на их химические и микробиологические характеристики. Понимание этих процессов имеет важное значение для управления экосистемами, агрономической практики и смягчения последствий изменения климата.

Благодарности. Данное исследование было профинансировано Комитетом науки Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан в рамках проекта AP23489274 «Разработка технологии улучшения эколого-мелиоративного состояния лиманов и повышения их продуктивности».

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Онаев, М.К. Мелиоративная оценка водных и земельных ресурсов Приуралья. Монография [Текст] / науч. ред. В.С. Кучеров. – Уральск: Зап.-Казах. аграр. техн. ун.-т им. Жангир хана, 2014. – 166 с.

2. Nasiyev, B. Influence of Cattle Grazing Methods on Changes in Vegetation Cover and Productivity of Pasture Lands in the Semi-Desert Zone of Western Kazakhstan [Text] / B. Nasiyev, A. Karynbayev, M. Khiyasov, A. Bekkaliyev, N. Zhanatalapov, M. Begeyeva, A. Bekkaliyeva, V. Shibaikin // International Journal of Design & Nature and Ecodynamics. – 2023. – V. 18(4). – P. 767-774.

3. Ларин, И.В. Природные лиманы, их улучшение и рациональное использование [Текст] / И.В. Ларин // Вестник с.-х. науки. – 1965. – № 7. – 1965. – С. 14-20.

4. Онаев, М.Х. Продуктивность естественного травостоя на инженерных лиманах при многолетней эксплуатации [Текст] / М.Х. Онаев, Т.А. Турганбаев, Н.А. Сапарова // Мелиорация и водное хозяйство. – 2013. – №1. – С. 5-6.

5. Daniel, R. The metagenomics of soil [Text] / R. Daniel // Nature Reviews Microbiology. – 2005. - Vol. 3. - P. 470-478.

6. Thidarat, Rupngam. Unraveling the Interactions between Flooding Dynamics and Agricultural Productivity in a Changing Climate [Text] / Thidarat Rupngam and Aimé J. Messiga // Sustainability. – 2024. - 16, 6141. https://doi.org/10.3390/su16146141

7. Karolina, Furtak. Experiments Give Insight into the Response of the Soil Environment to Flooding? A Comparison of Microcosm and Natural Event [Text] / Karolina Furtak, Jarosław Grz ˛ adziel and Anna Gałazka Can Model // Biology. – 2022. - 11, 386. https://doi.org/10.3390/biology11030386

8. Breidenbach, B. Seasonal dynamics of bacterial and archaeal methanogenic communities in flooded rice fields and effect of drainage [Text] / B. Breidenbach & R. Conrad // Frontiers in Microbiology. - 5, 752 (2015) https://doi.org/10.3389/fmicb.2014.00752

9. Rietz, D.N. Effects of irrigation-induced salinity and sodicity on soil microbial activity [Text] / D.N. Rietz, R.J. Haynes // 2003. - Volume 35, Issue 6, June, Pages 845-854.

10. Guo, Y. Role of c-di-GMP in anammox aggregation and systematic analysis of its turnover protein in Candidatus Jettenia caeni [Text] / Y. Guo, S. Liu, X. Tang, F. Yang // Water Res. – 2017. - V. 113, P. 181–190.

11. US Geological Survey website/USGS, 2024. - Access mode: https://earthexplorer.usgs.gov/

12. Interpretation of Landsat TM/ETM+ data channel combinations/GIS-Lab, 2005. - Access mode: http://gis-lab.info/qa/landsat-bandcomb.html

13. Воронин, Н.Г. Поверхностное улучшение травостоя лиманов Александрово-Гайской системы [Текст] / Н.Г. Воронин, С.С. Ермилов // Эффективное использование орошаемых земель в Поволжье: Сборник научных работ Саратовского СХИ. Саратов: СХИ. - 1986. - С. 59-67.

14. Кутузова, А.А. Продуктивность долголетних сенокосов при разных системах ведения [Текст] / А.А. Кутузова, Л.С. Трофимова, М.А. Олигер, Е.К. Орленкова // Кормопроизводство. – 2000. – №5. – С. 11 - 15.

15. Доспехов, Б.А. Методика полевого опыта [Текст] / Б.А. Доспехов. – М.: Агропромиздат, 1985. – 351 с.

16. Bates, S. Examining the global distribution of dominant archaeal populations in soil [Text] / S. Bates, D. Berg-Lyons, J.G. Caporaso, W.A. Walters, R. Knight, N. Fierer // The ISME Journal. – 2011. – 5. – pp. 908–917.

17. Caporaso, J.G. QIIME allows analysis of high throughput community sequencing data [Text] / J.G. Caporaso, J. Kuczynski, J. Stombaugh // Nature methods. – 2010. - Vol. 7, №5, P. 335–336.

REFERENCES

1. Onaev, M.K. Meliorativnaya ocenka vodnyh i zemel'nyh resursov Priural'ya. Monografiya [Tekst] / nauch. red. V.S. Kucherov. – Ural'sk: Zap.-Kazah. agrar. tekhn. un.-t im. ZHangir hana, 2014. – 166 s.

2. Nasiyev, B. Influence of Cattle Grazing Methods on Changes in Vegetation Cover and Productivity of Pasture Lands in the Semi-Desert Zone of Western Kazakhstan [Text] / B. Nasiyev, A. Karynbayev, M. Khiyasov, A. Bekkaliyev, N. Zhanatalapov, M. Begeyeva, A. Bekkaliyeva, V. Shibaikin // International Journal of Design & Nature and Ecodynamics. – 2023. – V. 18(4). – P. 767-774.

3. Larin, I.V. Prirodnye limany, ih uluchshenie i racional'noe ispol'zovanie [Tekst] / I.V. Larin // Vestnik s.-h. nauki. – 1965. – № 7. – 1965. – S. 14-20.

4. Onaev, M.H. Produktivnost' estestvennogo travostoya na inzhenernyh limanah pri mnogoletnej ekspluatacii [Tekst] / M.H. Onaev, T.A. Turganbaev, N.A. Saparova // Melioraciya i vodnoe hozyajstvo. – 2013. – №1. – S. 5-6.

5. Daniel, R. The metagenomics of soil [Text] / R. Daniel // Nature Reviews Microbiology. – 2005. - Vol. 3. - P. 470-478.

6. Thidarat, Rupngam. Unraveling the Interactions between Flooding Dynamics and Agricultural Productivity in a Changing Climate [Text] / Thidarat Rupngam and Aimé J. Messiga // Sustainability. – 2024. - 16, 6141. https://doi.org/10.3390/su16146141

7. Karolina, Furtak. Experiments Give Insight into the Response of the Soil Environment to Flooding? A Comparison of Microcosm and Natural Event [Text] / Karolina Furtak, Jarosław Grz ˛ adziel and Anna Gałazka Can Model // Biology. – 2022. - 11, 386. https://doi.org/10.3390/biology11030386

8. Breidenbach, B. Seasonal dynamics of bacterial and archaeal methanogenic communities in flooded rice fields and effect of drainage [Text] / B. Breidenbach & R. Conrad // Frontiers in Microbiology. - 5, 752 (2015) https://doi.org/10.3389/fmicb.2014.00752

9. Rietz, D.N. Effects of irrigation-induced salinity and sodicity on soil microbial activity [Text] / D.N. Rietz, R.J. Haynes // 2003. - Volume 35, Issue 6, June, Pages 845-854.

10. Guo, Y. Role of c-di-GMP in anammox aggregation and systematic analysis of its turnover protein in Candidatus Jettenia caeni [Text] / Y. Guo, S. Liu, X. Tang, F. Yang // Water Res. – 2017. - V. 113, P. 181–190.

11. US Geological Survey website/USGS, 2024. - Access mode: https://earthexplorer.usgs.gov/

12. Interpretation of Landsat TM/ETM+ data channel combinations/GIS-Lab, 2005. - Access mode: http://gis-lab.info/qa/landsat-bandcomb.html

13. Voronin, N.G. Poverhnostnoe uluchshenie travostoya limanov Aleksandrovo-Gajskoj sistemy [Tekst] / N.G. Voronin, S.S. Ermilov // Effektivnoe ispol'zovanie oroshaemyh zemel' v Povolzh'e: Sbornik nauchnyh rabot Saratovskogo SKHI. Saratov: SKHI. - 1986. - S. 59-67.

14. Kutuzova, A.A. Produktivnost' dolgoletnih senokosov pri raznyh sistemah vedeniya [Tekst] / A.A. Kutuzova, L.S. Trofimova, M.A. Oliger, E.K. Orlenkova // Kormoproizvodstvo. – 2000. – №5. – S. 11 - 15.

15. Dospekhov, B.A. Metodika polevogo opyta [Tekst] / B.A. Dospekhov. – M.: Agropromizdat, 1985. – 351 s.

16. Bates, S. Examining the global distribution of dominant archaeal populations in soil [Text] / S. Bates, D. Berg-Lyons, J.G. Caporaso, W.A. Walters, R. Knight, N. Fierer // The ISME Journal. – 2011. – 5. – pp. 908–917.

17. Caporaso, J.G. QIIME allows analysis of high throughput community sequencing data [Text] / J.G. Caporaso, J. Kuczynski, J. Stombaugh // Nature methods. – 2010. - Vol. 7, №5, P. 335–336.

ТҮЙІН

Жұмыста табиғи жемшөп шөптерін өсіру үшін пайдаланылатын Батыс Қазақстан облысы Ақжайық ауданындағы №50 көлтабандағы топырақ және микробиологиялық көрсеткіштер қарастырылды. Көлтабан учаскесіндегі зерттелген топырақ көрсеткіштері бір аумақта орналасқан суарылмайтын кен орындарымен салыстырылды.

Жыл сайынғы су басу су баспайтын учаскемен салыстырғанда топырақтың негізгі көрсеткіші – гумустың, генетикалық горизонттар бойынша орта есеппен 0,10-0,28%-ға (абсолютті мән) өсуіне әкелді. Су басу топырақ ерітіндісінің сілтілігін 7,7 pH дейін, сондай-ақ тұздану дәрежесін – әлсізге дейін төмендетуге мүмкіндік берді (су баспайтын жерде орташа тұздану дәрежесінде).

Бактериялық қауымдастықтың салыстырмалы талдауы учаскелер арасындағы айтарлықтай айырмашылықты көрсетеді. Су баспайтын жерде Proteobacteria (33,75–54,22%), Firmicutes (13,97–19,19%) және Actinobacteria (17,31–12,50%), тиісінше су басқан Verrucomicrobia (20,51–8,04%), Acidobacteria (5,11–2,00%) басым болды. Су басқан жерде Deltaproteobacteria және Clostridia белсенділігі анаэробты жағдайларда байқалды, бұл топырақтың астындағы қабаттарға тән.

Топырақты су басу олардың химиялық және микробиологиялық сипаттамаларына көп қырлы әсер етеді. Бұл процестерді түсіну экожүйелерді басқару, агрономиялық тәжірибе және климаттың өзгеруін азайту үшін өте маңызды.

УДК 63: 636.59
МРНТИ 636.598; 636.598.8

Шамшидин А.С., доктор биологических наук, основной автор, https://orcid.org/0000-0001- 5457-1720
НАО «Западно-Казахстанский аграрно-технический университет имени Жангир хана», г. Уральск, ул. Жангир хана, 51, 090009, Казахстан, mailto:270180@mail.ru
Нугманова А.Е., PhD, https://orcid.org/0000-0002-5007-3262
НАО «Западно-Казахстанский аграрно-технический университет имени Жангир хана», г. Уральск, ул. Жангир хана, 51, 090009, Казахстан, aru_kyz_90@mail.ru
Сабыржанов А.У., PhD, https://orcid.org/0000-0002-9178-4845
НАО «Западно-Казахстанский аграрно-технический университет имени Жангир хана», г. Уральск, ул. Жангир хана, 51, 090009, Казахстан, arman__1983@mail.ru
Махимова Ж.Н., кандидат биолгических наук, https://orcid.org/0000-0003-0379-0274
НАО «Западно-Казахстанский аграрно-технический университет имени Жангир хана», г. Уральск, ул. Жангир хана, 51, 090009, Казахстан, zhanylsyn16@mail.ru

Shamshidin A.S., doctor of biological sciences, the main author, https://orcid.org/0000-0001-5457-1720
NJSC «West Kazakhstan Agrarian and Technical University named after Zhangir khan», Uralsk, st. Zhangir khan 51, 090009, Kazakhstan, 270180@mail.ru
Nugmanova A.E., doctor PhD., https://orcid.org/0000-0002-5007-3262
NJSC «West Kazakhstan Agrarian and Technical University named after Zhangir Khan», Uralsk,
st. Zhangir khan 51,090009, Kazakhstan, aru_kyz_90@mail.ru

Sabyrzhanov A.U., PhD, https://orcid.org/0000-0002-9178-4845
NJSC «West Kazakhstan Agrarian and Technical University named after Zhangir Khan», Uralsk,
st. Zhangir khan 51,090009, Kazakhstan, arman__1983@mail.ru
Makhimova Zh.N., candidate of biological sciences, https://orcid.org/0000-0002-5007-3262
NJSC «West Kazakhstan Agrarian and Technical University named after Zhangir Khan», Uralsk,
st. Zhangir khan 51,090009, Kazakhstan, aslzhan-90@mail.ru

POTENTIAL USE OF VITAMIN COMPLEXES FOR GROWTH AND DEVELOPMENT OF MUSCOVY DUCKS
ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВИТАМИННЫХ КОМПЛЕКСОВ ДЛЯ РОСТА И РАЗВИТИЯ МУСКУНЫХ УТОК

АННОТАЦИЯ

Целью данного исследования было изучение эффективности применения витаминного комплекса «Нитамин» на показателях продуктивности и физиологическом состоянии молодняка мускусных уток. Эксперимент проводился в научно-производственном центре ЗКАТУ им. Жангир хана на 150 утятах (самцы и самки), разделённых на три группы (контрольная, опытная 1 – с «Тетрагидровитом», опытная 2 – с «Нитамином»). Утят выращивали в течение 84 дней на комбикормах «Baby line chick» и «Finish chick» с добавлением витаминов через питьевую воду: опытная 1 – «Тетрагидровит» (1,5 мл/л однократно, затем 2 мл/л каждые 3 недели), опытная 2 – «Нитамин» (1 мл/л + далее 1,5 мл/л по той же схеме). Еженедельные взвешивания 50 птиц каждой группы позволили оценить динамику роста, среднесуточный и абсолютный приросты, а также коэффициент сохранности поголовья.

Результаты показали, что применение «Нитамина» значительно улучшило ростовые параметры по сравнению с контрольной группой: самцы опытной 2 группы к 84-му дню набрали на 925 г больше (среднесуточный прирост +30 %), самки – на 109 г (+4,8 %). Абсолютный прирост составил 3973 г у самцов и 2374 г у самок. Сохранность поголовья превышала 98 % во всех группах.

Таким образом, введение витаминного комплекса «Нитамин» в питьевую воду в дозировке 1–1,5 мл/л является эффективной стратегией улучшения продуктивности и здоровья мускусных утят, способствует ускоренному набору массы, оптимальной конверсии корма и высокой сохранности, и может быть рекомендовано в промышленной практике птицеводства.

ANNOTATION

The aim of this study was to investigate the effectiveness of the vitamin complex "Nitamin" on the productivity indicators and physiological state of young Muscovy ducks. The experiment was conducted at the Research and Production Center of ZKATU named after Zhangir Khan on 150 ducklings (males and females) divided into three groups (control, experimental 1 - with "Tetrahydrovit", experimental 2 - with "Nitamin"). The ducklings were raised for 84 days on the combined feeds "Baby line chick" and "Finish chick" with the addition of vitamins through drinking water: experimental 1 - "Tetrahydrovit" (1.5 ml / l once, then 2 ml / l every 3 weeks), experimental 2 - "Nitamin" (1 ml / l + then 1.5 ml / l according to the same scheme). Weekly weighing of 50 birds in each group allowed us to evaluate the growth dynamics, average daily and absolute gains, as well as the survival rate of the livestock.

The results showed that the use of "Nitamin" significantly improved growth parameters compared to the control group: males of the experimental group 2 gained 925 g more by the 84th day (average daily gain +30%), females - 109 g (+4.8%). The absolute gain was 3973 g

for males and 2374 g for females. The survival rate of the livestock exceeded 98% in all groups. Thus, the introduction of the vitamin complex "Nitamin" into drinking water at a dosage of 1-1.5 ml/l is an effective strategy for improving the productivity and health of Muscovy ducklings, promotes accelerated weight gain, optimal feed conversion and high survivability, and can be recommended in industrial poultry farming practice.

Ключевые слова: *мускусные утки, Нитамин, витаминный комплекс, среднесуточный прирост, абсолютный прирост, продуктивность, комбикорм, живая масса.*

Key words: *Muscovy ducks, Nitamin, vitamin complex, average daily gain, absolute gain, productivity, compound feed, live weight.*

Введение. Чтобы птица была здоровой и продуктивной, важно поддерживать здоровую микрофлору кишечника. Неправильное кормление и злоупотребление лекарствами могут нарушить эту микрофлору, приводя к проблемам со здоровьем и снижению продуктивности [1]. Профилактикой этих проблем является использование витаминных комплексов, особенно в тех случаях, когда рацион птицы не обеспечивает достаточного количества витаминов. Витамины, особенно группы А, Е, С, играют ключевую роль в поддержании обмена веществ, укреплении иммунитета и обеспечении энергией, предотвращая дефицит витаминов[1,2,3,4,5,6,7].

Для оптимизации применения витаминных комплексов в промышленном птицеводстве требуется всестороннее изучение их воздействия на физиологические процессы птицы. Важно досконально исследовать влияние витаминов на метаболизм, эффективность использования корма, продуктивность, качество мяса, иммунную систему и характеристики конечного продукта[8]. В настоящее время витаминные комплексы широко используются для укрепления здоровья птицы, включая повышение резистентности к заболеваниям, улучшение кишечной микробиоты, профилактику диареи и стресса, а также стимуляцию роста мышечной массы[9,10]. Многочисленные исследования подтверждают положительное влияние витаминных добавок на продуктивные и физиологические показатели птицы [11,12,13,14,15]. Данное исследование направлено на оценку воздействия витаминного комплекса «Нитамин» на продуктивность молодняка мускусных уток[1,5,6, 11,12].

Материалы и методы исследований. Исследования проведены в рамках грантового финансирования фундаментальных и прикладных научных исследований по научным и (или) научно-технических проектам на 2024-2026 годы по проекту AP23488151 «Прогрессивные ресурсосберегающие технологии производства мяса и инкубационных яиц мускусных уток».

На базе научно-производственного центра Западно-Казахстанского аграрно-технического университета имени Жангир хана изучалась эффективность витаминного комплекса "Нитамин" для мускусных утят. Для этого были сформированы контрольная и две опытные группы самцов и самок (по 50 голов в каждой), сбалансированные по возрасту, весу и физиологическому состоянию. Контрольная группа получала стандартный рацион (Старт ПК-21(0-4 нд); Финиш ПК-22(5-8 нд); Финиш ПК-22(9-12 нд)), а опытные группы – другой рацион (Baby line chick 1857 (0-25 дн), Финиш chick 1858 (с 26 дней до убоя)) с добавлением витаминных комплексов "Тетрагидровит" и "Нитамин". Дозировка и способ введения витаминов определялись схемой опытов (таблица 1). В течение 84 дней выращивания еженедельно проводилось индивидуальное взвешивание 50 утят из каждой группы для отслеживания динамики роста.

При исследовании использовались методы статистической обработки данных в программе «Exell», для взвешивания использовались электронные весы. Такой подход

позволил многомерно оценить влияние «Нитамина»: не только по массе и приросту, но и по надёжности и предсказуемости конечного результата[16,17,18].

Таблица 1 – Схема опыта

Группа	Доза вводимого препарата
	Самцы
Контрольная	Основной рацион (ОР), состоящий из Мегакорма Старт ПК-21(0-4 нд); Финиш ПК-22(5-8 нд); Финиш ПК-22(9-12 нд)
1 опытная	ОР, состоящий из Baby line chick 1857 (0-25 дн) + Тетрагидровит 1,5 мл/л однократное пропаевание; Финиш chick 1858 (с 26 дней до убоя) - Тетрагидровит 2,0 мл/л каждую третью неделю
2 опытная	ОР, состоящий из Baby line chick 1857 (0-25 дн) + Нитамин 1,0 мл/л однократное пропаевание; Финиш chick 1858 (с 26 дней до убоя) - Нитамин 1,5 мл/л каждую третью неделю
	Самки
Контрольная	Основной рацион (ОР), состоящий из Мегакорма Старт ПК-21(0-4 нд); Финиш ПК-22(5-8 нд); Финиш ПК-22(9-12 нд)
1 опытная	ОР, состоящий из Baby line chick 1857 (0-25 дн) + Тетрагидровит 1,5 мл/л однократное пропаевание; Финиш chick 1858 (с 26 дней до убоя) - Тетрагидровит 2,0 мл/л каждую третью неделю
2 опытная	ОР, состоящий из Baby line chick 1857 (0-25 дн) + Нитамин 1,0 мл/л однократное пропаевание; Финиш chick 1858 (с 26 дней до убоя) - Нитамин 1,5 мл/л каждую третью неделю

В ходе эксперимента мускусным утятам 1-й и 2-й опытных групп, в дополнение к основному рациону, с питьевой водой вводили исследуемые препараты в соответствии с дозировками, представленными в схеме опыта (таблица 1). Продолжительность эксперимента составила 84 дня.

Результаты исследований. Для оценки эффективности биологических препаратов были проанализированы следующие показатели: динамика абсолютной живой массы мускусных уток, среднесуточный прирост массы тела и процент сохранности поголовья.

Взвешивание осуществлялось с использованием электронных весов, в утренние часы, до начала кормления, по 50 особей из каждой группы. Расчет среднесуточного и абсолютного прироста массы тела производился на основе полученных данных. Сохранность поголовья определялась путем ежедневного мониторинга падежа.

Результаты исследований, касающиеся влияния витаминных комплексов и комбикормов, и их обсуждение представлены в таблице 2.

Таблица 2 – Динамика живой массы мускусных уток, г

Возраст, дн	Группа

	Контрольная	1 опытная	2 опытная
	Самцы		
1	51,23±0,3	50,87±0,65	51,06±0,54
7	161,52±1,5	165,24±2,14	166,32±1,98
14	308,25±5,9	321,59±4,95	332,54±4,56
21	548,75±8,23	596,36±7,98	623,54±8,21
28	931,24±12,45	1049,81±11,24	1101,85±10,85
35	1341,35±13,52	1464,21±13,84	1508,84±12,84
42	1689,87±13,86	2053,24±15,87	2111,76±13,89
49	2012,45±15,28	2511,32±17,54	2562,11±15,26
56	2308,37±18,45	2986,99±22,87	3124,25±19,98
63	2648,23±21,50	3536,38±28,64	3652,68±25,64
70	2914,13±23,54	3674,29±35,48	3798,85±26,98
77	3007,98±22,65	3787,37±42,15	3911,85±31,25
84	3098,83±24,56	3861,82±38,95	4024,62±42,25
	Самки		
1	48,21±0,98	49,21±0,85	49,11±0,46
7	159,32±2,14	160,21±1,98	162,51±0,23
14	291,23±5,23	297,59±7,52	302,81±6,52
21	528,95±8,95	542,51±7,86	559,85±6,03
28	892,31±10,95	953,54±12,54	998,87±9,62
35	1259,96±9,89	1303,87±11,25	1379,89±10,6
42	1603,54±10,85	1609,87±12,54	1721,46±13,68
49	1887,96±12,54	1913,54±10,96	2005,48±14,95
56	2009,84±13,95	2041,08±15,74	2151,21±17,85
63	2189,84±12,85	2179±14,25	2238,73±14,93
70	2248,71±13,81	2253,79±15,86	2312,16±16,54
77	2279,38±15,84	2304,88±16,89	2361,50±15,85
84	2314,14±15,98	2355,25±18,52	2423,51±16,76

В начале эксперимента все группы мускусных утят имели одинаковый вес, что подтверждает их однородность (таблица 2). Регулярные взвешивания показали, что утята второй опытной группы, получавшие витаминные добавки «Тетрагидровит» и «Нитамин» к основному рациону, росли быстрее, чем остальные. Заметные различия в весе стали проявляться после 28 дней. К этому моменту самцы второй опытной группы весили на 170,61 г больше, чем в контрольной группе, и на 118,57 г больше, чем в первой опытной группе. У самок разница составила 106,56 г и 61,23 г соответственно. Важно отметить, что самки мускусных уток в принципе набирают вес примерно в полтора раза медленнее, чем самцы.

Уже к трехнедельному возрасту утята, получавшие витаминные добавки, демонстрировали преимущество в весе. Самцы второй опытной группы весили на 74,79 г больше, чем в контрольной группе, и на 47,61 г больше, чем в первой опытной группе. У самок разница составила 11,58 г и 6,36 г соответственно.

К 49-му дню жизни самцы второй опытной группы опережали по весу контрольную группу на 549,66 г, а первую опытную группу – на 498,87 г. Это преимущество сохранялось и в дальнейшем.

К 84-му дню самцы второй опытной группы достигли веса 4024,62 г, что на 925,79 г больше, чем у контрольной группы, и на 762,99 г больше, чем у первой опытной группы.

У самок к 49-му дню разница в весе между второй опытной группой и контрольной составила 117,52 г, а с первой опытной группой – 25,58 г. К 84-му дню самки второй опытной группы весили 2423,51 г, что на 109,37 г больше, чем у контрольной группы, и на 41,11 г больше, чем у первой опытной группы.

Таким образом, использование витаминных комплексов положительно влияет на усвоение корма, что приводит к значительному увеличению веса у опытных групп по сравнению с контрольной. Вторая опытная группа, получавшая «Нитамин», последовательно превосходит первую (с «Тетрагидровитом») и контроль. Преимущество явно нарастает особенно после 28 дня, что свидетельствует о накопительном эффекте витаминов и сбалансированного комбикорма.

Самцы реагируют сильнее: разрыв с контролем достигает +925 г к концу, у самок — около +109 г. Демонстрируется половой диморфизм в отклике на витаминную поддержку. Схема исследования с «Нитамином» эффективна именно при длительном применении — по меньшей мере с 14–28 дня.

Анализ данных о живой массе позволил рассчитать среднесуточные и абсолютные привесы молодняка в течение каждого периода выращивания, а также за весь экспериментальный период. Эти данные подробно представлены в таблицах 3 и 4.

Среднесуточный привес молодняка самцов мускусных уток с первого по седьмой день жизни живая масса птиц 1 опытной группы превышали контрольные значения на 3,68%, цыплята 2 опытной группы — на 4,5%, ау самок 1 и 2 опытных групп -0,13% и 2,07% соответственно. Пик среднесуточного привеса у 1 и 2 опытных групп самцов мускусных уток наблюдается в промежутке с 36 по 42 день и составил 84,14 г. и 86,13 г. соответственно, в контрольной группе пик пришелся на 29-35 день и составил 54,64 г. Максимальный среднесуточный привес у самок мускусных уток 1 и 2 опытной группы пришелся на 22-28 день и составил 58,71 г. и 62,71 г. соответственно, а у контрольной группы на период 29-35 дней и составил 58,58 г. Среднесуточный привес у мускусных уток получавшие витаминные добавки "Тетрагидровит" и "Нитамин" к основному рациону к концу опытов 1-84 день составил в 1 опытной группе самцов 45,36 г., а у самок 27,45г., во 2 опытной группе самцов 47,30 г., у самок 28,26 г. соответственно. В контрольной группе самцов среднесуточный привес за 84 дня составил 36,28 г., у самок 26,98 г.

Таблица 3 – Среднесуточный прирост живой массы мускусных уток, г

Возрастной период	Группа		
	Контрольная	1 опытная	2 опытная
	Самцы		
1-7	15,75±0,12	16,33±0,09	16,46±0,09
8--14	20,96±0,21	22,33±0,14	23,74±0,11
15--21	34,35±0,25	39,25±0,23	41,57±0,21
22--28	54,64±0,68	64,77±0,54	68,33±0,45
29-35	58,58±0,42	59,20±0,43	58,14±0,39
36-42	49,78±0,35	84,14±1,58	86,13±1,63
43-49	46,08±0,87	65,44±0,78	64,33±0,95
50-56	42,27±0,33	67,95±1,21	80,30±1,59
57-63	48,55±0,36	78,48±1,12	75,49±0,62
64-70	37,98±0,28	19,70±0,15	20,88±0,15
71-77	13,40±0,14	16,15±0,09	16,14±0,07
78-84	12,97±0,11	10,63±0,07	16,11±0,09
1--84	36,28±0,24	45,36±0,35	47,30±0,24
	Самки		
1-7	15,87±0,21	15,85±0,19	16,20±0,23
8--14	18,84±0,19	19,62±0,14	20,04±0,25

15--21	33,96±0,34	34,98±0,25	36,72±0,31
22--28	51,90±0,39	58,71±1,12	62,71±1,05
29-35	52,52±0,89	50,04±1,02	54,43±1,13
36-42	49,08±0,41	43,71±0,38	48,79±0,38
43-49	40,63±0,35	43,38±0,37	40,57±0,45
50-56	17,41±0,18	18,22±0,16	20,81±0,28
57-63	25,71±0,24	19,70±0,19	12,50±0,11
64-70	8,41±0,05	10,68±0,13	10,49±0,15
71-77	4,38±0,04	7,29±0,05	7,04±0,08
78-84	4,96±0,02	7,19±0,06	8,85±0,05
1-84	26,97±0,18	27,45±0,23	28,26±0,17

В таблице 3 представлены данные по среднесуточному приросту живой массы мускусных уток (г) в разные возрастные периоды.

В ходе 84-дневного исследования было установлено, что среднесуточный привес самцов в первой опытной группе был на 25,02%, а во второй – на 30,37% выше, чем в контрольной группе. У самок этот показатель был выше на 1,77% и 4,78% соответственно. Таким образом, у самцов наблюдался более значительный прирост массы тела по сравнению с самками. Витамины C, A, D и E в рационе водоплавающих птиц доказали свою эффективность, видимый отрезок от 22-го дня, когда влияние витаминов и сбалансированного корма проявляется наиболее ярко. Самцы лучше реагируют на добавку витаминов — возможно, связано с более высокой потребностью в микроэлементах для мускулатуры и обмена. Комбикорм с «Нитамином» обеспечивает прямую, статистически значимую выгоду в приросте массы, особенно в ключевую фазу роста (22–42 дня).

Самцы мускусных утят второй опытной группы демонстрировали самый высокий абсолютный прирост живой массы на протяжении всего периода выращивания (таблица 4). Преимущество второй группы стало заметно уже в возрасте 15-21 дня. К этому моменту они опережали контрольную группу на 50,5 г, а первую опытную группу – на 16,23 г. Эта тенденция сохранилась до конца эксперимента: к 84-му дню разница в абсолютном приросте между второй опытной группой и контрольной составила 925,96 г, а с первой опытной группой – 162,61 г.

Таблица 4 – Абсолютный прирост живой массы мускусных уток, г

Возрастной период	Группа		
	Контрольная	1 опытная	2 опытная
	Самцы		
1-7	110,29±5,23	114,37±4,45	115,26±4,95
8-14	146,73±8,21	156,35±9,65	166,22±9,15
15-21	240,5±12,52	274,77±13,14	291±12,54
22-28	382,49±9,84	453,45±12,15	478,31±11,48
29-35	410,11±14,62	414,4±15,26	406,99±12,23
36-42	348,52±11,02	589,03±16,24	602,92±17,83
43-49	322,58±10,25	458,08±18,57	450,35±15,33
50-56	295,92±9,65	475,67±19,65	562,14±12,33
57-63	339,86±10,59	549,39±14,73	528,43±16,81
64-70	265,9±10,74	137,91±11,21	146,17±10,87
71-77	93,85±2,6	113,08±8,26	113±6,05

78-84	90,85±5,98	74,45±2,01	112,77±4,58
1--84	3047,6±52,41	3810,95±55,26	3973,56±67,19
	Самки		
1-7	111,11±6,44	111±7,51	113,4±6,09
8-14	131,91±10,21	137,38±13,45	140,3±11,09
15-21	237,72±8,98	244,92±11,24	257,04±12,08
22--8	363,36±14,24	411,03±16,54	439,02±15,84
29-35	367,65±16,87	350,33±12,56	381,02±17,07
36-42	343,58±14,48	306±10,54	341,57±16,58
43-49	284,42±9,87	303,67±10,11	284,02±8,87
50-56	121,88±6,48	127,54±6,59	145,73±7,43
57-63	180±8,54	137,92±6,54	87,52±4,23
64-70	58,87±3,15	74,79±3,84	73,43±3,26
71-77	30,67±2,54	51,09±2,04	49,34±1,98
78-84	34,76±3,01	50,37±4,01	62,01±2,98
1-84	2265,93±62,14	2306,04±59,34	2374,4±60,97

Аналогичная картина наблюдалась и у самок: вторая опытная группа также показывала более высокие результаты по сравнению с контрольной и первой опытной группами. Наибольший прирост массы тела у самок второй опытной группы приходился на период 22-28 дней и составил 439,02 г. У самок первой опытной группы пик прироста в этот же период составил 411,03 г. В контрольной группе максимальный прирост (367,65 г) наблюдался позже – в период с 29 по 35 день. К 84-му дню абсолютный прирост у самок второй опытной группы составил 2374,4 г, в то время как в контрольной и первой опытной группах этот показатель был равен 2265,93 г и 2306,04 г соответственно.

Абсолютный прирост показывает, что витаминный комплекс «Нитамин» довольно сильно усиливает прирост массы — особенно у самцов. Это подкрепляет среднесуточные данные и делает комплекс эффективным инструментом для повышения продуктивности мускусных утят.

Заключение. Экспериментальное исследование, проведённое на базе Западно-Казахстанского аграрно-технического университета, отчетливо продемонстрировало положительное влияние витаминного комплекса «Нитамин» при кормлении мускусных утят. Введение препарата в дозировке 1 мл/л стартовой воды и 1,5 мл/л каждые три недели значительно увеличило темпы роста, особенно у самцов. Включение витаминного комплекса в комбинированную схему с рационом Baby line chick + Finish chick, как и во второй опытной группе — это способствует ускоренному набору массы и улучшению конверсии корма. Согласно практике фермеров, применение «Нитамина» увеличивает привесы в 2–3 раза выше, чем у масляных форм, и положительно влияет на иммунитет[1,19,20,21,22,23]. Сравнение с контрольной группой в исследовании подтверждает это — увеличение среднесуточного прироста у самцов на 30 %, у самок — на 4,8 %.

В исследовании на мускусных утятах комплекс «Нитамин» показал себя как эффективная профилактическая и стимуляционная добавка: увеличивает темпы роста: самцы набрали на 925 г больше, самки — на 109 г к 84 дню по сравнению с контролем; повышает среднесуточный прирост: +30 % у самцов и +4,8 % у самок за весь период; Улучшает сохранность и общее состояние птицы за счёт сбалансированного

поступления витаминов А, D_3, Е и С. Эффективность препарата подтверждается не только внутренними результатами, но и данными о его высокой биодоступности, совместимости с рационом и пользе при стрессах, вакцинациях, инфекциях.

Применение «Нитамина» по указанной схеме — обоснованное и перспективное решение для улучшения роста, здоровья и продуктивности мускусных утят в условиях промышленного производства. Важно соблюдать дозы, мониторить состояние птицы и учитывать экономическую выгоду.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Миронович Я. А. Влияние витаминного препарата «Нитамин» на гематологические показатели телят раннего возраста в условиях ПК «Ольговское» // Студенты — науке и практике АПК: материалы 107-й Международной научно-практической конференции студентов и магистрантов. — Витебск: ВГАВМ, 20 мая 2022. — Ч. 2: Ветеринарная фармация. — С. 84–85.

2. НИТА-ФАРМ ООО. Инструкция по применению ветеринарного препарата «Нитамин OR Актив» [Электронный ресурс] // Нита-Фарм. — Москва: Нита-Фарм, 2024. — Режим доступа: URL. — Дата обращения: 01.07.2025.

3. НИТАМИН OR: инструкция по применению, состав, показания… [Электронный ресурс] // Vidal. — 2025. — Режим доступа: vidal.ru. — Дата обращения: 01.07.2025.

4. Нитамин: инструкция по применению для животных [Электронный ресурс] // vetlekar.by. — 2025. — Режим доступа: vetlekar.by. — Дата обращения: 01.07.2025.

5. Повышение продуктивности и жизнеспособности птицы. Опыты с «Нитамин OR» на бройлерах [Электронный ресурс] // ПтицаИнфо. — 2025. — Режим доступа: pticainfo.ru. — Дата обращения: 01.07.2025.

6. El-Saadony, M.T., Umar, M., Hassan, F.-u., Alagawany, M., Arif, M., Taha, A.E., Elnesr, S. S., El-Tarabily, K.A., Abd El-Hack, M.E., 2022. Applications ofbutyric acidin poultry production: the dynamics of gut health, performance, nutrient utilization, egg quality, and osteoporosis. Anim. Health Res. Rev. 23 (2), 136-146.

7. Островский А. В., Кудрявцева Е. Н., Юшковский Е. А. Влияние витаминной добавки «Нитамин OR» на физиологические и производственные показатели у кур-несушек // Ученые записки УО «ВГАВМ». — Витебск, 2017. — Т. 53, вып. 4. — С. 138–142.

8. Жукова Н. Н., Сидоркин В. А., Торопов А. А. Бутофан OR – новая кормовая добавка для сельскохозяйственной птицы [Электронный ресурс] // Статьи NITA-FARM. — Саратов: Нита-Фарм, 2023.

9. Соколенко Г. Г., Лазарев Б. П., Миньченко С. В. Пробиотики в рациональном кормлении животных // Технологии пищевой и перерабатывающей промышленности АПК — продукты здорового питания. — 2015. — № 1(5). — С. 72–78.

10. Суханова С. Ф., Корниенко И. Г. Показатели естественной резистентности гусят-бройлеров, потреблявших Левисел Sb плюс // Вестник Алтайского государственного аграрного университета. — 2017. — № 5(151). — С. 103–108.

11. Кожевников С. В., Суханова С. Ф. Биологически активные вещества в кормах для цыплят-бройлеров // Зоотехния. — 2010. — № 4. — С. 16–17.

12. Суханова С. Ф. Влияние Лактобифадола на продуктивность молодняка гусей // Современные научные тенденции в животноводстве, охотоведении и экологии: материалы Междунар. науч.-практ. конф., Киров, 12 декабря 2013 г. — Киров: Вятская ГСХА, 2013. — С. 186–188.

13. Зеленкова Г.А., Пахомова А.А. Эффективность применения минеральных добавок в птицеводстве // Ветеринарная патология. 2010. № 4 (35). С. 36-39.

14. Зудяева Т., Воробьева Г., Кудрявцев А., Григораш А., Неминущая Л. Влияние добавки Флоравит на микрофлору ЖКТ бройлеров // Птицеводство. — 2013. — № 1. — С. 37–38.

15. Nugmanova A., Nazerke S., Nametov A., Makhimova Z., Sabyrzhanov A. Prospects for the Development of Duck Breeding in the West Kazakhstan Region // International Journal of Agriculture and Biosciences. 2024. Vol. 13, № 3. P. 519–524. DOI: 10.47278/journal.ijab/2024.153.

16. Nugmanova A., Sabyrzhanov A., Shamshidin A., Makhimova Z., Nazerke S. Effect of Mineral Feed Additives on the Rearing of Young Ducklings: An Experimental Study in Western Kazakhstan // International Journal of Veterinary Science. 2024. Vol. 13, № 6. P. 827–832. DOI: 10.47278/journal.ijvs/2024.181.

17. Муллакаева М. О. Влияние биологически активных веществ на естественную резистентность индеек // Ученые записки КГАВМ им. Н. Э. Баумана. — 2011. — Т. 207. — С. 360–363.

18. Околелова Т. М., Мансуров Р. С., Шевяков А. Н. Эффективность препарата Овокрак при выращивании бройлеров // Птицеводство. — 2014. — № 6. — С. 31–34.

19. Shamshidin, A.S. . Efficiency of using feed additives «sal carb dry»and «toxfin dry»in the diet of musk ducklings [Text]/ A.S. Shamshidin, A.E. Nugmanova, A.U. Sabyrzhanov, Zh.N. Makhimova, G. Kh. Nagimova // Science and education. 2024. No 3 (76)_ -P. 81-88.

20. Timerbekova, G.A. Netradicionnye kormovye dobavki dlja remontnogo molodnjaka utok /G.A. Timerbekova, K.N. Kanyshev, S.A.Mustafin i dr. [Tekst] //Pticevodstvo. -2015. -S. 39-42.

21. Наставления по использованию нетрадиционных кормов в рационах птицы /И.А. Егоров, Т.Н. Ленкова, В.А. Манукян и др.-Сергиев Посад. -2016. -59 с.

22. Fouad, AM, D Ruan, S Wang, W Chen, W Xia, and C Zheng. Nutritional requirements of meat- type and egg-type ducks: What do we know?. J Anim Sci Biotechnol. 2018. 9(1): 1-11.

23. Ye, P, K Ge, M Li, L Yang, S Jin, C Zhang, X Chen and Z Geng. Egg-laying and brooding stage- specific hormonal response and transcriptional regulation in pituitary of Muscovy duck (Cairina moschata). Poult Sci. 2019. 98(11):5287-5296.

REFERENCES

1. Mironovich Ya. A. Vliyanie vitaminnogo preparata «Nitamin» na gematologicheskie pokazateli telyat rannego vozrasta v usloviyakh PK «Olgovskoe» // Studenti — nauke i praktike APK: materiali 107-i Mezhdunarodnoi nauchno-prakticheskoi konferentsii studentov i magistrantov. — Vitebsk: VGAVM, 20 maya 2022. — Ch. 2: Veterinarnaya farmatsiya. — S. 84–85.

2. NITA-FARM OOO. Instruktsiya po primeneniyu veterinarnogo preparata «Nitamin OR Aktiv» [Elektronnii resurs] // Nita-Farm. — Moskva: Nita-Farm, 2024. — Rezhim dostupa: URL. — Data obrashcheniya: 01.07.2025.

3. NITAMIN OR: instruktsiya po primeneniyu, sostav, pokazaniya… [Elektronnii resurs] // Vidal. — 2025. — Rezhim dostupa: vidal.ru. — Data obrashcheniya: 01.07.2025.

4. Nitamin: instruktsiya po primeneniyu dlya zhivotnikh [Elektronnii resurs] // vetlekar.by. — 2025. — Rezhim dostupa: vetlekar.by. — Data obrashcheniya: 01.07.2025.

5. Povishenie produktivnosti i zhiznesposobnosti ptitsi. Opiti s «Nitamin OR» na broilerakh [Elektronnii resurs] // PtitsaInfo. — 2025. — Rezhim dostupa: pticainfo.ru. — Data obrashcheniya: 01.07.2025.

6. El-Saadony, M.T., Umar, M., Hassan, F.-u., Alagawany, M., Arif, M., Taha, A.E., Elnesr, S. S., El-Tarabily, K.A., Abd El-Hack, M.E., 2022. Applications ofbutyric acidin

poultry production: the dynamics of gut health, performance, nutrient utilization, egg quality, and osteoporosis. Anim. Health Res. Rev. 23 (2), 136-146.

7. Ostrovskii A. V., Kudryavtseva Ye. N., Yushkovskii Ye. A. Vliyanie vitaminnoi dobavki «Nitamin OR» na fiziologicheskie i proizvodstvennie pokazateli u kur-nesushek // Uchenie zapiski UO «VGAVM». — Vitebsk, 2017. — T. 53, vip. 4. — S. 138–142.

8. Zhukova N. N., Sidorkin V. A., Toropov A. A. Butofan OR – novaya kormovaya dobavka dlya selskokhozyaistvennoi ptitsi [Elektronnii resurs] // Stati NITA-FARM. — Saratov: Nita-Farm, 2023.

9. Sokolenko G. G., Lazarev B. P., Minchenko S. V. Probiotiki v ratsionalnom kormlenii zhivotnikh // Tekhnologii pishchevoi i pererabativayushchei promishlennosti APK — produkti zdorovogo pitaniya. — 2015. — № 1(5). — S. 72–78.

10. Sukhanova S. F., Kornienko I. G. Pokazateli yestestvennoi rezistentnosti gusyat-broilerov, potreblyavshikh Levisel Sb plyus // Vestnik Altaiskogo gosudarstvennogo agrarnogo universiteta. — 2017. — № 5(151). — S. 103–108.

11. Kozhevnikov S. V., Sukhanova S. F. Biologicheski aktivnie veshchestva v kormakh dlya tsiplyat-broilerov // Zootekhniya. — 2010. — № 4. — S. 16–17.

12. Sukhanova S. F. Vliyanie Laktobifadola na produktivnost molodnyaka gusei // Sovremennie nauchnie tendentsii v zhivotnovodstve, okhotovedenii i ekologii: materiali Mezhdunar. nauch.-prakt. konf., Kirov, 12 dekabrya 2013 g. — Kirov: Vyatskaya GSKhA, 2013. — S. 186–188.

13. Zelenkova G.A., Pakhomova A.A. Effektivnost primeneniya mineralnikh dobavok v ptitsevodstve // Veterinarnaya patologiya. 2010. № 4 (35). S. 36-39.

14. Zudyaeva T., Vorobeva G., Kudryavtsev A., Grigorash A., Neminushchaya L. Vliyanie dobavki Floravit na mikrofloru ZhKT broilerov // Ptitsevodstvo. — 2013. — № 1. — S. 37–38.

15. Nugmanova A., Nazerke S., Nametov A., Makhimova Z., Sabyrzhanov A. Prospects for the Development of Duck Breeding in the West Kazakhstan Region // International Journal of Agriculture and Biosciences. 2024. Vol. 13, № 3. P. 519–524. DOI: 10.47278/journal.ijab/2024.153.

16. Nugmanova A., Sabyrzhanov A., Shamshidin A., Makhimova Z., Nazerke S. Effect of Mineral Feed Additives on the Rearing of Young Ducklings: An Experimental Study in Western Kazakhstan // International Journal of Veterinary Science. 2024. Vol. 13, № 6. P. 827–832. DOI: 10.47278/journal.ijvs/2024.181.

17. Mullakaeva M. O. Vliyanie biologicheski aktivnikh veshchestv na yestestvennuyu rezistentnost indeek // Uchenie zapiski KGAVM im. N. E. Baumana. — 2011. — T. 207. — S. 360–363.

18. Okolelova T. M., Mansurov R. S., Shevyakov A. N. Effektivnost preparata Ovokrak pri virashchivanii broilerov // Ptitsevodstvo. — 2014. — № 6. — S. 31–34.

19. Shamshidin, A.S. . Efficiency of using feed additives «sal carb dry»and «toxfin dry»in the diet of musk ducklings [Text]/ A.S. Shamshidin, A.E. Nugmanova, A.U. Sabyrzhanov, Zh.N. Makhimova, G. Kh. Nagimova // Science and education. 2024. No 3 (76)_ -P. 81-88.

20. Timerbekova, G.A. Netradicionnye kormovye dobavki dlja remontnogo molodnjaka utok /G.A. Timerbekova, K.N. Kanyshev, S.A.Mustafin i dr. [Tekst] //Pticevodstvo. -2015. -S. 39-42.

21. Nastavleniya po ispolzovaniyu netraditsionnikh kormov v ratsionakh ptitsi /I.A. Yegorov, T.N. Lenkova, V.A. Manukyan i dr.-Sergiev Posad. -2016. -59 s.

22. Fouad, AM, D Ruan, S Wang, W Chen, W Xia, and C Zheng. Nutritional requirements of meat- type and egg-type ducks: What do we know?. J Anim Sci Biotechnol. 2018. 9(1): 1-11.

23. Ye, P, K Ge, M Li, L Yang, S Jin, C Zhang, X Chen and Z Geng. Egg-laying and brooding stage- specific hormonal response and transcriptional regulation in pituitary of Muscovy duck (Cairina moschata). Poult Sci. 2019. 98(11):5287-5296.

ТҮЙІН

Бұл зерттеудің мақсаты жас мускус үйректердің өнімділік көрсеткіштері мен физиологиялық жағдайына «Нитамин» витаминдік кешенінің тиімділігін зерттеу болды. Тәжірибе Жәңгір хан атындағы ЗҚАТУ ғылыми-өндірістік орталығында үш топқа (бақылау, 1 тәжірибе – «Тетрагидровитпен», 2 тәжірибелік – «Нитаминмен») бөлінген 150 үйрек (еркек және аналық) балапандарға жүргізілді. Үйректер 84 күн бойы «Baby line chick» және «Finish chick» құрама жемінде ауыз су арқылы дәрумендерді қосып өсірілді: 1 тәжірибелік топқа – «Тетрагидровит» (1,5 мл/л бір рет, содан кейін 2 мл/л 3 аптада бір рет), тәжірибелік 2 топқа – «Нитамин» (содан кейін 1 мл/мл/л/л). Әр топтағы 50 құстың апта сайынғы салмағы өсу динамикасын, орташа тәуліктік және абсолютті өсімін, сондай-ақ мал басының аман қалу көрсеткішін бағалауға мүмкіндік берді.

Нәтижелер «Нитаминді» қолдану бақылау тобымен салыстырғанда өсу параметрлерін айтарлықтай жақсартқанын көрсетті: 2-тәжірибелік топтың еркектері 84-ші күні 925 г-ға артқан (орташа тәуліктік өсім +30%), әйелдер - 109 г (+4,8%). Абсолютті өсім ерлерде 3973 г, әйелдерде 2374 г құрады. Мал басының аман қалу көрсеткіші барлық топтарда 98 пайыздан асты. Осылайша, ауыз суға «Нитамин» дәрумендік кешенін 1-1,5 мл/л дозада енгізу москвалық үйректердің өнімділігі мен денсаулығын жақсартудың тиімді стратегиясы болып табылады, салмақтың тез өсуіне, жемнің оңтайлы өзгеруіне және жоғары тіршілігіне ықпал етеді және өнеркәсіптік құс шаруашылығы тәжірибесінде ұсынылуы мүмкін.

ӘОЖ 53.072:519.622.1
ҒТАХР 29.03.19

Бисенгалиева А.М., техника ғылымдарының магистрі, https://orcid.org/0000-0002-6914-2352
«Жәңгір хан атындағы Батыс Қазақстан аграрлық-техникалық университеті» КеАҚ, Орал қ., Жәңгір хан көш., 51, 090009, Қазақстан Республикасы, B.a.m69@mail.ru
Ермуханова Н.Б., PhD, қауымдастырылған профессор, https://orcid.org/0000-0001-9163-2879
Қорқыт ата атындағы Қызылорда университеті, Айтеке би, 29А, Қызылорда қ., 120014, Қазақстан Республикасы, nurzhamal77@mail.ru
Bissengaliyeva A., master of technical sciences, https://orcid.org/0000-0002-6914-2352
NJSC «West Kazakhstan Agrarian and Technical University named after Zhangir Khan», Uralsk, st. Zhangir khan 51,090009, Kazakhstan, B.a.m69@mail.ru
Ermukhanova N., PhD, associate Professor, https://orcid.org/0000-0001-9163-2879
Korkyt Ata Kyzylorda University, Aiteke, 29A, Kyzylorda, 120014, Kazakhstan, nurzhamal77@mail.ru

WORDWALL ТЕХНОЛОГИЯСЫН ОҚЫТУ ҮРДІСІНДЕ ҚОЛДАНУ
WORDWALL TECHNOLOGY LEARNING APPLICATION

АННОТАЦИЯ

Бұл мақалада оқыту процесіне Wordwall платформасын қолданып зерттеу жүргізілді. Зерттеуге сәйкес, Wordwall бағдарламасын енгізу білім алушылардың физика сабағына қатысуын арттырады.

Бұл мақаланың мақсаты – білім алушылардың шығармашылық ойлау қабілеттерін дамытуын зерттейміз. Wordwall оқыту құралдары оқуға деген қызығушылығын, шығармашылық ынтасын арттырып, оларды ағымдағы оқиғалардан хабардар етіп отыратыны дәлелденген. Бес аспектісі бар: жатық ойлау, икемді ойлау, ерекшелік, пысықтау және бағалау. Әдебиеттік шолу арқылы Wordwall оқыту құралдарын енгізіп білім алушылардың шығармашылық ойлауын дамытуға әсерін қарастырамыз. Оқу-тәрбие процесінде оқу-әдістемелік құралдарды пайдалану оқудың қажетті нәтижелерін арттыратыны сөзсіз.

ANNOTATION

In this paper, a study of the learning process using Wordwall platform was conducted. According to the study, the implementation of Wordwall program increases students' activity in physics lessons.

The purpose of this article is to explore the development of students' creative thinking skills. Wordwall learning tools have been proven to increase interest in learning, creativity and keep up to date with current events. Five aspects are identified: intuitive thinking, flexible thinking, specificity, elaboration and evaluation. Through a literature review, we examine the impact of implementing Wordwall learning tools on the development of students' creative thinking. The use of teaching and learning tools in the educational process will undoubtedly enhance the desired learning outcomes.

Кілт сөздер: *Wordwall, виртуальды орта, Moodle., интернет, компьютерлік графика.*

Key words: *Wordwall, virtual environment, project, internet, computer graphics.*


Кіріспе. Білім өмірде маңызды рөл атқарады, өйткені ол адам ресурстарының сапасын жақсарту және дамыту құралы болып табылады. Білім беру жүйесі сәйкес білім

беру – білім алушылардың белсенді болуы үшін оқу атмосферасы мен оқу процесін құруға бағытталған саналы және жүйелі әрекет.
Wordwall - қызықты онлайн оқу құралы ретінде пайдалануға болатын білім беру құралы. Бұл құрал ойын арқылы оқыта отырып, білім алушының қызығушылығы мен белсенділігін арттырып, жұмысты орындап жылдам кері байланысты қамтамасыз ете алады [1-5].

Woordwall – бұл білім беру мақсаттарына арналған интерактивті платформа [6]. Осы платформада әртүрлі үлгілерді пайдаланып, тапсырмалар жасауға болады. Бұл құралды бастауыш сыныптан бастап, жоғары оқу орындарына дейінгі білім беру деңгейлерінде қолдана алады [7-9]. Негізгінен мынадай мүмкіндіктері бар: ойын үлгілері**:** викториналар, сөзжұмбақтар, сәйкестендіру тапсырмалары, «дөңгелекті айналдыр» секілді қызықты форматтар. Оқыту барысында интерактивті тапсырмалар жасап, оқушылардың қызығушылығын арттыра алады.

Материалдар мен әдістер. Зерттей отырып осындай платформа бағдарламаны физика сабағына қолдандық. Аса көптеген мақалаламен таныса отырып , әдебиеттік шолу жасадық. Зерттеу жұмысын сауалнама арқылы жүргіздік.

Нәтижелер және оларды талқылау. Нәтижесінде ойындарды пайдалану білім алушылардың зейінін жақсартуға көмектесті. 1 - суретте шығармашылық ойлау қабілетін арттыруға арналған Wordwall медиа кескіні көрсетілді [10-13].




Сурет 1 - Wordwall медиа кескіні

Осы зерттеудің кейбір нәтижелері мен тұжырымдары Wordwall медиасын пайдалануға деген көзқарасын өзгертіп, оқуға деген қызығушылығы мен ынтасын арттырады.
Woordwall-дың оқытуда қолданылу артықшылықтары мен кемшіліктері [14-17]:

- Интерактивтілік –қызықты ойындар мен викториналар жасауға мүмкіндік береді.
- Уақытты үнемдеу – дайын шаблондарды пайдалану арқылы тез тапсырма құруға болады.
- Бейімделгіштік – тапсырмаларды жеке немесе топтық түрде орындай алады.
- Бағалау мүмкіндігі – жауаптарын автоматты түрде тексеруге және нәтижелерін талдауға болады.
- Презентациясын жасау – өте ұзақ уақытты алады.

2- суретте Woordwall платформасын оқыту үрдісінде пайдалануы көрсетілген.



Сурет 2 - Wordwall платформасының өткізілген сабақ көрінісі

Нәтижелерді зерттеген уақытта 1 – ші курс топ білім алушыларына сауалнама жүргіздік. Сауалнама құрылымы мынадай сұрақтардан тұрады:

1. Woordwall-ды қандай мақсатта қолданасыз?
2. Woordwall тапсырмаларын орындауға орта есеппен қанша уақыт жұмсайсыз?
3. Woordwall платформасын қолдану сізге қаншалықты оңай?
4. Wordwall технологиясын ұғымы сізге таныс па?
5. Wordwall технологиясын дамуының болашағы қандай?
6. Wordwall технологиясы сізді қызықтырар ма еді?



Сурет 3 - Сауалнама

Сауалнама қорытытындысының диаграммасы 3- суретте көрсетілді. Тоқталып кетсек 58 пайызы - ия, әрине; 34 пайызы - менің ойымша жоқ; 12 пайызы - жауап беруге қиналамын деген жауап алдық [18-20].

Қорытынды. Қорыта келе Wordwall платформасын білім беру бағдарламасына тиімді пайдалана алуға мүмкіндігіміз зор. Woordwall – оқытушылар мен білім алушылар үшін таптырмас құрал. Ол сабақтарды қызықты әрі тиімді өткізуге көмектесетініне көзіміз жеткіздік.

ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

1 Караваев, Н. Л. Анализ программных сервисов и платформ, обладающих потенциалом для геймификации обучения [Электронный ресурс] / Н. Л. Караваев, Е. В. Соболева // Концепт. 2017. № 8. С. 14-25. Электрон. дан. URL: http://e-koncept.ru/2017/170202.htm (дата обращения: 10.05.2021).18. Электрон. дан. DOI: 10.15393/j5.art.2021.6664 (дата обращения: 09.03.2025).

2 Ветлугина, Н. О. Организационно-педагогические условия применения мультимедиа технологий в повышении эффективности подготовки бакалавров профессионального обучения: дис. ... канд. пед. наук. Екатеринбург, 2016. 181 с.

3 Смолин, А.А. Системы виртуальной, дополненной и смешанной реальности : учебное пособие / А.А. Смолин. – Санкт – Петербург : Университет ИТМО, 2018. – 59 с

4 Лукачева, М.А. Сервис Wordwaall в образовательном процессе/ М.А. Лукачева, Д.М. Богачева.м-мТекст : непосредственный // Молодой ученый. – 2022. - 20(415) С.594 – 598.

5 Ширинова, Л. Ф. Использование интернет-технологий в образовательном процессе школы / Л. Ф. Ширинова // Вестник Шадринского государственного педагогического университета. 2018. № 4 (40). С. 27-30.

6 Baeva, L.V., Khrapov, S.A., Azhmukhamedov, I.M. «Smart Technologies» in Education : Development Opportunities and Threats // Lecture Notes in Networks and Systems. – 2021. – 155. – P. 714–723.

7 Данилов, О.Е. Учебное экспериментирование в виртуальной реальности // О.Е. Данилов - Школьная педагогика – 2016. – № 3 (6) . – С. 370 – 372.

8 Данилов, О.Е. Компьютерная визуализация полей физических величин в учебном процессе // О.Е. Данилов. - Дистационное и виртуальное обучение – 2015. – № 6 . – С. 97 – 106.

9 AGEIA Technologies, PhysX documentation. Retrieved from [Text] //www.ageia.com

10 ITenterprise [Электронный ресурс]// https://www.it.ua/ru/knowledge-base/technology-innovation/virtualnaja-realnost-vr.

11 Папагианнис, Х. Дополнительная реальность: книга / Х. Папагианнис. – Москва: Издательство «Эксмо», 2019, – 288 с.

12 Васильева А. В. Формирование понятийного аппарата предметной области интерактивного обучения (в педагогике и методике) [Электронный ресурс] / А. В. Васильева // Непрерывное образование: XXI век. 2021. Вып. 1 (33). С. 1-18.

13 Иванко, А.Ф. Компьютерные игры и онлайн-журналистика / А.Ф. Иванко, М. А. Иванко, Е.В. Куликова, Ю.М. Султанова - Международный журнал инженерных технологий и компьютерных исследований (IJETCR). Том 5; Выпуск 3; май-июнь: 2017; Стр. № 11-15. https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000346563502073

14 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://lomonosov-msu.ru/file/event/4428/

15 Эльтемеров, А. А. Культура поведения в современном цифровом пространстве / А.А. Эльтемеров, О.В. Эльтемерова // Культура и безопасность. 2021. № 2. С. 39–43. DOI: 10.25257/KB.2021.2.39-43.

16 https://www.rbc.ru/trends/industry/5db179279a79472d7aa9e58a

17 https://te-st.ru/2018/10/30/responsible-design-in-vr-ar-project/

18 Винокур, А. И. Информационные системы в издательском деле: Учебное пособие. пособие / А. И. Винокур, А. Ф. Иванко, М. А. Иванко; Москва. государство. Университет Ивана Федорова. — Москва: МГЮА им. Ивана Федорова, 2015. — 196 с.

19 Иванко, А. Ф. Информационные технологии в издательском деле Руководство / А. Ф. Иванко, М. А. Иванко -. Москва-МГУП им. Иван Федоров, 2013, -136с.

20 Винокур, А. И. Информационные системы в издательском деле: Учебное пособие. пособие / А. И. Винокур, А. Ф. Иванко, М. А. Иванко. — Москва: МГЮА им. Ивана Федорова, 2018. — 196 с. https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000870709300028

REFERENCES

1 Karavaev N. L. Analiz programmnyh servisov i platform, obladayushchih potencialom dlya gejmifikacii obucheniya [Elektronnyj resurs] / N. L. Karavaev, E. V. Soboleva // Koncept. 2017. № 8. S. 14-25. Elektron. dan. URL: http://e-koncept.ru/2017/170202.htm (data obrashcheniya: 09.03.2025)

2 VetluginaN. O. Organizacionno-pedagogicheskie usloviya primeneniya mul'timedia tekhnologij v povyshenii effektivnosti podgotovki bakalavrov professional'nogo- obucheniya: dis. ... kand. ped. nauk. Ekaterinburg, 2016. 181 p. .

3 Smolin, A.A. Sistemy virtual'noj, dopolnennoj i smeshannoj real'nosti : uchebnoe posobie / A.A. Smolin. – Sankt – Peterburg : Universitet ITMO, 2018. – 59 s

4 Lukacheva, M.A. Servis Wordwaall v obrazovatel'nom processe / Molodoj uchenyj. – 2022. - 20(415) S.594 – 598.

5 SHirinova L. F. Ispol'zovanie internet-tekhnologij v obrazovatel'nom processe shkoly / L. F. SHirinova // Vestnik SHadrinskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta. 2018. № 4 (40). S. 27-30.

6 Baeva, L.V., Khrapov, S.A., Azhmukhamedov, I.M. «Smart Technologies» in Education : Development Opportunities and Threats // Lecture Notes in Networks and Systems. – 2021. – 155. – P. 714–723.

7 Danilov, O.E. Uchebnoe eksperimentirovanie v virtual'noj real'nosti // O.E. Danilov - SHkol'naya pedagogika – 2016. – № 3 (6) . – S. 370 – 372.

8 Danilov, O.E. Komp'yuternaya vizualizaciya polej fizicheskih velichin v uchebnom processe // O.E. Danilov. - Distacionnoe i virtual'noe obuchenie – 2015. – № 6 . – S. 97 – 106.

9 AGEIA Technologies, PhysX documentation. Retrieved from [Text] //www.ageia.com

10 ITenterprise [Elektronnyj resurs] // https://www.it.ua/ru/knowledge-base/technology-innovation/virtualnaja-realnost-vr.

11 Papagiannis, H. Dopolnitel'naya real'nost': kniga / H. Papagiannis. – Moskva: Izdatel'stvo «Eksmo», 2019, – 288 s.

12 Vasil'eva A. V. Formirovanie ponyatijnogo apparata predmetnoj oblasti interaktivnogo obucheniya (v pedagogike i metodike) [Elektronnyj resurs] / A. V. Vasil'eva // Nepreryvnoe obrazovanie: XXI vek. 2021. Vyp. 1 (33). S. 1-18

13 Ivanko, A.F. Komp'yuternye igry i onlajn-zhurnalistika / A.F. Ivanko,

M. A. Ivanko, E.V. Kulikova, YU.M. Sultanova - Mezhdunarodnyj zhurnal inzhenernyh tekhnologij i komp'yuternyh issledovanij (IJETCR). Tom 5; Vypusk 3; maj-iyun': 2017; Str. № 11-15. https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000346563502073

14 [Elektronnyj resurs]. – Rezhim dostupa: https://lomonosov-msu.ru/file/event/4428/

15 El'temerov A. A., El'temerova O. V. Kul'tura povedeniya v sovremennom cifrovom prostranstve // Kul'tura i bezopasnost'. 2021. № 2. S. 39–43. DOI: 10.25257/KB.2021.2.39-43.

16 https://www.rbc.ru/trends/industry/5db179279a79472d7aa9e58a

17 https://te-st.ru/2018/10/30/responsible-design-in-vr-ar-project/

18 Vinokur A. I. Informacionnye sistemy v izdatel'skom dele: Uchebnoe posobie. posobie /
A. I. Vinokur, A. F. Ivanko, M. A. Ivanko; Moskva. gosudarstvo. Universitet Ivana Fedorova. — Moskva: MGYUA im. Ivana Fedorova, 2015. — 196 s.

19 Ivanko, A. F. Informacionnye tekhnologii v izdatel'skom dele Rukovodstvo / A. F. Ivanko, M. A. Ivanko -. Moskva-MGUP im. Ivan Fedorov, 2013, -136s.

20 Vinokur, A. I. Informacionnye sistemy v izdatel'skom dele: Uchebnoe posobie. posobie /
A. I. Vinokur, A. F. Ivanko, M. A. Ivanko. — Moskva: MGYUA im. Ivana Fedorova, 2018. — 196 s. https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000870709300028

РЕЗЮМЕ

В данной статье было проведено исследование учебного процесса с использованием платформы Wordwall. Согласно исследованию, внедрение программы Wordwall повышает активность учащихся на уроках физики. Целью данной статьи является изучение развития творческих мыслительных способностей учащихся. Доказано, что инструменты обучения Wordwall повышают интерес к обучению, творчеству и позволяют быть в курсе текущих событий. Выделяют пять аспектов: интуитивное мышление, гибкое мышление, специфичность, проработка и оценка. Путем обзора литературы мы рассматриваем влияние внедрения обучающих средств Wordwall на развитие творческого мышления учащихся. Использование учебно-методических средств в образовательном процессе, несомненно, повысит желаемые результаты обучения.

УДК 681.5.015:665.71
МРНТИ 28.27.27

Днекешев А.А., магистр технических наук, https://orcid.org/0000-0002-2352-7898
НАО «Западно-Казахстанский аграрно-технический университет имени Жангир хана», 090009, ул. Жангир хана, 51, г. Уральск, Республика Казахстан, dnekeshev1991@gmail.com
Dnekeshev A., master of technical sciences, https://orcid.org/0000-0002-2352-7898
NJSC«West Kazakhstan Agrarian and Technical University named after Zhangir Khan», Uralsk, st. Zhangir khan 51, 090009, Kazakhstan, dnekeshev1991@gmail.com

ПОДХОД К ФОРМИРОВАНИЮ СЦЕНАРИЕВ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ НА НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕМ ПРЕДПРИЯТИИ
APPROACH TO FORMING EMERGENCY SCENARIOS AT AN OIL REFINERY

АННОТАЦИЯ

Современные нефтеперерабатывающие предприятия являются сложными высокоавтоматизированными производственными системами, где непрерывное взаимодействие разнородных технологических процессов значительно увеличивает вероятность возникновения аварийных ситуаций. Для повышения уровня безопасности таких объектов необходимо создание интеллектуальных средств идентификации аварий, основанных на формализованных представлениях об их свойствах.

В статье предлагается методика формирования метрического пространства аварийных ситуаций, в котором каждая точка соответствует конкретной аварии и описывается набором координат, отражающих ее важнейшие характеристики: причины, последствия, человеческие жертвы, утечка опасных веществ, материальный ущерб, задействованные установки, меры реагирования, документы и данные, необходимые для принятия управленческих решений. Пространство снабжается специальной функцией метрики, позволяющей количественно оценивать степень близости между различными аварийными ситуациями. Представлена геометрическая интерпретация пространства и разработаны алгоритмы построения и идентификации его точек.

Полученные результаты могут быть использованы при создании автоматизированных систем поддержки принятия решений в области предупреждения и ликвидации аварийных ситуаций, что особенно актуально для повышения надежности и безопасности функционирования нефтеперерабатывающих предприятий.

ANNOTATION

Modern oil refineries are complex, highly automated production systems where continuous interaction of heterogeneous technological processes significantly increases the probability of emergency situations. To improve the safety level of such facilities, it is necessary to create intelligent means of identifying accidents based on formalized ideas about their properties.

The article proposes a methodology for forming a metric space of emergency situations, in which each point corresponds to a specific accident and is described by a set of coordinates reflecting its most important characteristics: causes, consequences, human casualties, leakage of hazardous substances, material damage, involved installations, response measures, documents and data necessary for making management decisions. The space is supplied with a special metric function that allows quantitatively assessing the degree of proximity between different emergency situations. A geometric interpretation of the space is presented and algorithms for constructing and identifying its points are developed.

The results obtained can be used to create automated decision support systems in the field of preventing and eliminating emergency situations, which is especially important for improving the reliability and safety of oil refineries.

Ключевые слова: *аварийные ситуации, нефтеперерабатывающее предприятие, идентификация, метрическое пространство, безопасность, система поддержки решений, алгоритм, модель аварии*.

Key words: *emergency situations, oil refinery, identification, metric space, safety, decision support system, algorithm, emergency model.*

Введение. В настоящее время нефтеперерабатывающие предприятия представляет собой комплекс разных по сложности технологических установок. Стабильность и функционирование, которых во многом определяется сложным взаимодействием разнородных производственных процессов. Результатом взаимодействия этих процессов является возникновение неблагоприятных факторов приводящие к аварийной ситуации. Предотвращение и получение минимального ущерба от таких аварийных ситуаций решается путем их оперативной идентификации в системах управления нефтеперерабатывающего предприятия [1-6].

Для этого необходимо сформировать единое семантическое пространство в которой информация об аварийных ситуациях, предварительно рассортированная экспертами нефтеперерабатывающего предприятия, так чтобы при идентификации каждой из них, выдавался список связанных с ними документов и данных регламентирующие мероприятия необходимые для их предотвращения [7-13].

Материалы и методы исследований. Для практической реализации данного подхода к построению систем оперативной идентификации аварийных ситуаций и поиска информации в распределенной базе данных предприятия необходимо выполнить следующие исследования:

1. Предложить и обосновать методику формирования пространства аварийных ситуаций;
2. Выбрать функцию метрики данного пространства;
3. Разработать алгоритмы идентификации аварийных ситуаций.

Для формирования пространства аварийных ситуаций объекта управления необходимо разработать алгоритм определения точек множества аварийных ситуаций $\{Z(\overrightarrow{b(t)}, \overrightarrow{l(t)})\}$ и задать метрику ρ_Z, позволяющую количественно установить расстояние между точками пространства в $\{Z(\overrightarrow{b(t)}, \overrightarrow{l(t)})\}$.

Для обоснования разработанной ниже методики определения расстояния в метрическом пространстве аварийных ситуаций и повышения ее наглядности необходимо предварительно осуществить геометрическую интерпретацию проблемы

идентификации аварийных ситуаций, периодически возникающих при управлении производственными процессами нефтеперерабатывающего предприятия.

Для этого представим процесс достижения целей функционирования этого предприятия как движение внутри пространства аварийных ситуаций $\left\{Z\left(\overrightarrow{b(t)},\overrightarrow{l(t)}\right)\right\}$, каждая точка которого $Z\left(\overrightarrow{b(t)},\overrightarrow{l(t)}\right) \in \left\{Z\left(\overrightarrow{b(t)},\overrightarrow{l(t)}\right)\right\}$ имеет координаты соответствующие основным характеристикам аварийной ситуации:

$\langle Name(t)\rangle,$
$\langle Reason(t)\rangle,$
$\langle Consequence(t)\rangle,$
$\langle Human\ sacrifice(t)\rangle,$
$\langle Time(t)\rangle,$
$\langle Division(t)\rangle,$
$\left\langle \begin{matrix} Major\ material \\ damage(t) \end{matrix} \right\rangle,$
$\left\langle \begin{matrix} Leakage\ of\ poisonous\ and \\ explosive\ substances(t) \end{matrix} \right\rangle,$
$\langle Action(t)\rangle,$
$\left\langle \begin{matrix} Affecting\ recidence \\ of\ nearby\ areas(t) \end{matrix} \right\rangle,$
$\langle B_1(t), B_2(t), B_3(t), \dots, B_n(t)\rangle,$
$\langle Documents(t)\rangle,$
$\langle Data(t)\rangle.$

$$Time(t) ::= \left\langle \begin{matrix} 'Time\ beginning', \\ 'Time\ end' \end{matrix} \right\rangle, \qquad (1)$$

где $Name$ – наименование аварийной ситуации, $Reason$ – причины аварийной ситуации, $Consequence$ – последствия аварийной ситуации, $Human\ sacrifice$ – человеческие жертвы, $Time$ – время начала и окончания аварийной ситуации, $Division$ – установки предприятия, затронутые данной аварийной ситуацией, $Major\ material\ damage$ – крупный материальный ущерб, *Leakage of poisonous and explosive substances* – утечка ядовитых и взрывоопасных веществ, $Action$ – мероприятия, необходимые для разрешения аварийной ситуации, $Affecting\ recidence\ of\ nearby\ areas$ – поражение жителей близлежащих районов, $B_1, B_2, B_3, \dots, B_n$ – параметры объекта и системы управления, окружающей среды, которые ЛПР учитывает при принятии в возникшей разнородной аварийной ситуации, $Documents$ – список необходимых документов, используемых ЛПР при принятии решения устранения аварийной ситуации, $Data$ – перечень данных, используемых ЛПР при принятии решения устранения аварийной ситуации, t - переменная времени.

В формируемом математическом обеспечении характеристика $'Name'_i$ не входит в состав координат аварийной ситуации и используется в качестве идентификатора точки $\left\{Z\left(\overrightarrow{b(t)},\overrightarrow{l(t)}\right)\right\}$.

Таким образом, при разработке метода решения, поставленной задачи пространство аварийных ситуаций рассматривается как n – мерное векторное пространство, каждая точка которого характеризуется координатами (1). Область определения этих координат формируется ЛПР в процессе подготовки предприятия к внедрению математического обеспечения разрабатываемой информационной системы. Конкретные значения координат (1) определяются в результате решения задачи идентификации аварийных ситуаций. При выдаче ЛПР запроса на поиск информации по возникшей аварийной ситуации $\left\{Z\left(\overrightarrow{b(t)},\overrightarrow{l(t)}\right)\right\}$ система определяет положение

ситуации в пространстве $\left\{Z\left(\overrightarrow{b(t)},\overrightarrow{l(t)}\right)\right\}$, устанавливает текущие значение координат ситуации $Z\left(\overrightarrow{b(t)},\overrightarrow{l(t)}\right)$ и выдает сообщение ЛПР о данных и документах, связанных с $Z\left(\overrightarrow{b(t)},\overrightarrow{l(t)}\right)$.

Разработанный подход к решению задачи определения данных и документов и упорядочивание их по степени важности предоставляемой информации позволяет дать наглядную геометрическую интерпретацию проблемы формирования пространства аварийных ситуаций (Рисунок1.).




Рисунок 1 – Определение расстояния $\rho_Z(Z_1(t), Z_2(t))$ между точками $(Z_1(t), Z_2(t))$ пространства аварийных ситуаций

Результаты исследования. В соответствии с основными положениями реализуемого подхода будем считать, что положение точки $Z\left(\overrightarrow{b(t)},\overrightarrow{l(t)}\right) \in \left\{Z\left(\overrightarrow{b(t)},\overrightarrow{l(t)}\right)\right\}$, в пространстве аварийных ситуаций определено в момент времени $t_\Omega = const$, если известны значения координат (1), характеризующих эту ситуацию, т.е. выполняется:

$$\langle Reason(t)\rangle ::= \langle' Reason(t_\Omega)'\rangle,$$
$$\langle Consequence(t)\rangle ::= \langle' Consequence(t_\Omega)'\rangle,$$
$$\langle Human\ sacrifice(t)\rangle ::= \langle' Human\ sacrifice(t_\Omega)'\rangle,$$
$$\langle Division(t)\rangle ::= \langle' Division(t_\Omega)'\rangle,$$
$$\langle Major\ material\ damage(t)\rangle ::= \langle' Major\ material\ damage(t_\Omega)'\rangle,$$
$$\left\langle \begin{matrix} Leakage\ of\ poisonous\ and \\ explosive\ substances(t) \end{matrix} \right\rangle ::= \langle' \begin{matrix} Leakage\ of\ poisonous\ and \\ explosive\ substances \end{matrix} (t_\Omega)'\rangle,$$
$$\langle Action(t)\rangle ::= \langle' Action(t_\Omega)'\rangle,$$
$$\left\langle \begin{matrix} Affecting\ recidence\ of \\ nearby\ areas(t) \end{matrix} \right\rangle ::= \left\langle \begin{matrix} 'Affecting\ recidence\ of \\ nearby\ areas(t_\Omega)' \end{matrix} \right\rangle, \qquad (2)$$
$$\langle Action(t)\rangle ::= \langle' Action(t_\Omega)'\rangle,$$
$$B_1(t) ::= {}'B_1\ \left(t_{Z_i}\right)', B_2\left(t_{Z_i}\right) ::= {}'B_2\ (t_\Omega)', B_3(t) ::= {}'B_3(t_{Z_i})', \ldots, B_n(t) ::= {}'B_n(t_\Omega)',$$
$$\langle Documents(t)\rangle ::= \langle' Documents(t_\Omega)'\rangle,$$

$$\langle Data(t)\rangle::=\langle 'Data(t_\Omega)'\rangle,$$
$$Time(t_{Z_i})::=\langle {'Time\ begining'\atop 'Time\ end'},\rangle$$

Приведенные ниже логико-лингвистические переменные и величины использованные в (2)

$$\left\langle \begin{matrix} Name(t_\Omega|), Reason(t_\Omega|), Consequence(t_\Omega|), \\ Human\ sacrifice(t_\Omega|), Time(t_\Omega|), Division(t_\Omega|), \\ Major\ material\ damage(t_\Omega|), \\ Leakage\ of\ poisonous\ and\ explosive\ substances(t_\Omega|), \\ Action(t_\Omega|), Affecting\ recidence\ of\ nearby\ areas(t_\Omega|), \\ B_1(t_\Omega|), B_2(t_\Omega|), B_3(t_\Omega|), \dots, B_n(t_\Omega|), Documents(t_\Omega|), Data(t_\Omega|) \end{matrix} \right\rangle \quad (3)$$

представляют собой значения координат аварийной ситуации $Z\left(\overrightarrow{b(t)}, \overrightarrow{l(t)}\right)$, определенных в момент времени $t_\Omega = const$.

Очевидно, что значения указанных координат аварийной ситуации будут известны, если сформирована логико-лингвистическая или графовая модель соответствующей аварийной ситуации по методике, разработанной в [14]. Отсюда следует, что в состав пространства аварийных ситуаций входят все точки $Z\left(\overrightarrow{b(t)}, \overrightarrow{l(t)}\right)$, для которых можно построить формальные модели организации данных и знаний с использованием математического аппарата нормальных форм Бэкуса.

Заключение. Разработанная методика определения расстояния между различными аварийными ситуациями, возникающими в процессе функционирования нефтеперерабатывающих предприятий, позволила сформировать ряд новых алгоритмов оперативного поиска данных и документов в системах управления нефтеперерабатывающего предприятия.

В дальнейшем эти алгоритмы будут использованы для управления процессом ликвидации аварийных ситуаций на нефтеперерабатывающих предприятиях в соответствии с методиками, разработанными в [15].

.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Днекешев, А.А. Модель и методы поддержки принятия решений для анализа последствий атмосферных выбросов химически опасных веществ на нефтеперерабатывающем предприятии [Текст] / А. А. Днекешев, А. Ф. Резчиков, И. А. Степановская [и др.] // Управление развитием крупномасштабных систем (MLSD'2023): Труды Шестнадцатой международной конференции, Москва, 26–28 сентября 2023 года. – Москва: Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН, 2023. – С. 474-480. – DOI 10.25728/mlsd.2023.0474.

2. Днекешев, А.А. Системно-динамическая модель для анализа и прогнозирования аварийных ситуаций нефтеперерабатывающих предприятий / А. А. Днекешев, В. А. Кушников, А. С. Богомолов, А. Ф. Резчиков // Управление развитием крупномасштабных систем (MLSD'2024) : Труды Семнадцатой международной конференции, Москва, 24–26 сентября 2024 года. – Москва: Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем управления им. В.А.Трапезникова Российской академии наук, 2024. – С. 1174-1182.

3. Dnekeshev A.A. et al. (2020). Models and Algorithms for Improving the Safety of Oil Refineries of the Republic of Kazakhstan. In: Silhavy, R. (eds) Applied Informatics and Cybernetics in Intelligent Systems. CSOC 2020. Advances in Intelligent Systems and Computing, vol 1226. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-51974-2_21.

4. Днекешев, А.А. Разработка дерева событий для анализа безопасности функционирования производственных процессов нефтеперерабатывающего предприятия [Текст] / А.А. Днекешев, В.А. Кушников // В сборнике: Проблемы

управления в социально-экономических и технических системах. Сборник научных статей Материалы XV Международной научно-практической конференции. 2019. С. 90-95.

5. Днекешев, А.А. Подход к формированию динамического дерева событий для анализа безопасности функционирования нефтеперерабатывающего предприятия [Текст] / А.А. Днекешев, В.А. Кушников // В сборнике: Проблемы управления в социально-экономических и технических системах. Сборник научных статей Материалы XVI Международной научно-практической конференции. 2020. С. 8-14.

6. Резчиков, А.Ф. Критические сочетания событий – причины аварий в человеко-машинных системах [Текст] / А.Ф. Резчиков, А.С. Богомолов // Управление развитием крупномасштабных систем (MLSD'2015): тр. 8-й междунар.: конф. в 2 т. – М.: ИПУ РАН, 2015. Т. 1. – С. 130 – 135.

7. Barozzi M., Contini S., Raboni M., Torretta V., Casson Moreno V., & Copelli S. (2021). Integration of Recursive Operability Analysis, FMECA and FTA for the Quantitative Risk Assessment in biogas plants: Role of procedural errors and components failures. Journal of Loss Prevention in the Process Industries, 71. https://doi.org/10.1016/j.jlp.2021.104468.

8. Irshad L., Onan Demirel H., & Tumer I. Y. (2020). Automated generation of fault scenarios to assess potential human errors and functional failures in early design stages. Journal of Computing and Information Science in Engineering, 20(5). https://doi.org/10.1115/1.4047557.

9. Bozzano M., Munk P., Schweizer, M., Tonetta S., & Vozárová V. (2020). Model-Based Safety Analysis of Mode Transitions. In Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics): Vol. 12234 LNCS. https://doi.org/10.1007/978-3-030-54549-9_7.

10. Li. F. Wang, W., Dubljevic S., Khan F., Xu J., & Yi J. (2019). Analysis on accident-causing factors of urban buried gas pipeline network by combining DEMATEL, ISM and BN methods. Journal of Loss Prevention in the Process Industries, 61, 49–57. https://doi.org/10.1016/j.jlp.2019.06.001.

11. Igenewari V., Skaf Z., & Jennions I. K. (2019). A survey of flight anomaly detection methods: Challenges and opportunities. Proceedings of the Annual Conference of the Prognostics and Health Management Society, PHM, 11(1). https://doi.org/10.36001/phmconf.2019.v11i1.898

12. Muram F.U., Javed M.A., & Punnekkat S. (2019). System of Systems Hazard Analysis Using HAZOP and FTA for Advanced Quarry Production. 2019 4th International Conference on System Reliability and Safety, ICSRS 2019, 394–401. https://doi.org/10.1109/ICSRS48664.2019.8987613.

13. Oortwijn W., & Huisman M. (2019). Formal Verification of an Industrial Safety-Critical Traffic Tunnel Control System. In Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics): Vol. 11918 LNCS. https://doi.org/10.1007/978-3-030-34968-4_23.

14. Марков, А.И. Алгоритмы идентификации аварийных ситуаций в распределенной базе данных нефтеперерабатывающих предприятий [Текст] / А.И. Марков, А.А. Днекешев // В сборнике: Проблемы управления в социально-экономических и технических системах. Материалы XVII Международной научно-практической конференции. Саратов, 2021. С. 44-52.

15. Марков, А.И. Методика формирования пространства аварийных ситуаций нефтеперерабатывающего предприятия / А.И. Марков, А.А. Днекешев [Текст] // В сборнике: Проблемы управления в социально-экономических и технических системах. Материалы XVII Международной научно-практической конференции. Саратов, 2021. С. 53-57.

REFERENCES

1. Dnekeshev, A.A. Model' i metody podderzhki prinjatija reshenij dlja analiza posledstvij atmosfernyh vybrosov himicheski opasnyh veshhestv na neftepererabatyvajushhem predprijatii [Tekst] / A. A. Dnekeshev, A. F. Rezchikov, I. A. Stepanovskaja [i dr.] // Upravlenie razvitiem krupnomasshtabnyh sistem (MLSD'2023) : Trudy Shestnadcatoj mezhdunarodnoj konferencii, Moskva, 26–28 sentjabrja 2023 goda. – Moskva: Institut problem upravlenija im. V.A. Trapeznikova RAN, 2023. – S. 474-480. – DOI 10.25728/mlsd.2023.0474.

2. Dnekeshev, A.A. Sistemno-dinamicheskaja model' dlja analiza i prognozirovanija avarijnyh situacij neftepererabatyvajushhih predprijatij / A. A. Dnekeshev, V. A. Kushnikov, A. S. Bogomolov, A. F. Rezchikov // Upravlenie razvitiem krupnomasshtabnyh sistem (MLSD'2024) : Trudy Semnadcatoj mezhdunarodnoj konferencii, Moskva, 24–26 sentjabrja 2024 goda. – Moskva: Federal'noe gosudarstvennoe bjudzhetnoe uchrezhdenie nauki Institut problem upravlenija im. V.A.Trapeznikova Rossijskoj akademii nauk, 2024. – S. 1174-1182.

3. Dnekeshev, A.A. et al. (2020). Models and Algorithms for Improving the Safety of Oil Refineries of the Republic of Kazakhstan. In: Silhavy, R. (eds) Applied Informatics and Cybernetics in Intelligent Systems. CSOC 2020. Advances in Intelligent Systems and Computing, vol 1226. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-51974-2_21.

4. Dnekeshev, A.A. Razrabotka dereva sobytij dlya analiza bezopasnosti funkcionirovaniya proizvodstvennyh processov neftepererabatyvayushchego predpriyatiya [Tekst] / A.A. Dnekeshev, V.A. Kushnikov // V sbornike: Problemy upravleniya v social'no-ekonomicheskih i tekhnicheskih sistemah. Sbornik nauchnyh statej Materialy XV Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferencii. 2019. S. 90-95.

5. Dnekeshev, A.A. Podhod k formirovaniyu dinamicheskogo dereva sobytij dlya analiza bezopasnosti funkcionirovaniya neftepererabatyvayushchego predpriyatiya [Tekst] / A.A. Dnekeshev, V.A. Kushnikov // V sbornike: Problemy upravleniya v social'no-ekonomicheskih i tekhnicheskih sistemah. Sbornik nauchnyh statej Materialy XVI Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferencii. 2020. S. 8-14.

6. Rezchikov, A.F. Kriticheskie sochetaniya sobytij – prichiny avarij v cheloveko-mashinnyh sistemah [Tekst] / A.F. Rezchikov, A.S. Bogomolov // Upravlenie razvitiem krupnomasshtabnyh sistem (MLSD’2015): tr. 8-j mezhdunar.: konf. v 2 t. – M.: IPU RAN, 2015. T. 1. – S. 130 – 135.

7. Barozzi, M., Contini, S., Raboni, M., Torretta, V., Casson Moreno, V., & Copelli, S. (2021). Integration of Recursive Operability Analysis, FMECA and FTA for the Quantitative Risk Assessment in biogas plants: Role of procedural errors and components failures. Journal of Loss Prevention in the Process Industries, 71. https://doi.org/10.1016/j.jlp.2021.104468.

8. Irshad, L., Onan Demirel, H., & Tumer, I. Y. (2020). Automated generation of fault scenarios to assess potential human errors and functional failures in early design stages. Journal of Computing and Information Science in Engineering, 20(5). https://doi.org/10.1115/1.4047557.

9. Bozzano, M., Munk, P., Schweizer, M., Tonetta, S., & Vozárová, V. (2020). Model-Based Safety Analysis of Mode Transitions. In Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics): Vol. 12234 LNCS. https://doi.org/10.1007/978-3-030-54549-9_7.

10. Li, F., Wang, W., Dubljevic, S., Khan, F., Xu, J., & Yi, J. (2019). Analysis on accident-causing factors of urban buried gas pipeline network by combining DEMATEL, ISM and BN methods. Journal of Loss Prevention in the Process Industries, 61, 49–57. https://doi.org/10.1016/j.jlp.2019.06.001.

11. Igenewari, V., Skaf, Z., & Jennions, I. K. (2019). A survey of flight anomaly detection methods: Challenges and opportunities. Proceedings of the Annual Conference of the Prognostics and Health Management Society, PHM, 11(1). https://doi.org/10.36001/phmconf.2019.v11i1.898

12. Muram, F. U., Javed, M. A., & Punnekkat, S. (2019). System of Systems Hazard Analysis Using HAZOP and FTA for Advanced Quarry Production. 2019 4th International Conference on System Reliability and Safety, ICSRS 2019, 394–401. https://doi.org/10.1109/ICSRS48664.2019.8987613.

13. Oortwijn, W., & Huisman, M. (2019). Formal Verification of an Industrial Safety-Critical Traffic Tunnel Control System. In Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics): Vol. 11918 LNCS. https://doi.org/10.1007/978-3-030-34968-4_23.

14. Markov, A.I. Algoritmy identifikacii avarijnyh situacij v raspredelennoj baze dannyh neftepererabatyvayushchih predpriyatij [Tekst] / A.I. Markov, A.A. Dnekeshev // V sbornike: Problemy upravleniya v social'no-ekonomicheskih i tekhnicheskih sistemah. Materialy XVII Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferencii. Saratov, 2021. S. 44-52.

15. Markov, A.I. Metodika formirovaniya prostranstva avarijnyh situacij neftepererabatyvayushchego predpriyatiya / A.I. Markov, A.A. Dnekeshev [Tekst] // V sbornike: Problemy upravleniya v social'no-ekonomicheskih i tekhnicheskih sistemah. Materialy XVII Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferencii. Saratov, 2021. S. 53-57.

ТҮЙІН

Қазіргі заманғы мұнай өңдеу кәсіпорындары күрделі жоғары автоматтандырылған өндірістік жүйелер болып табылады, мұнда гетерогенді технологиялық процестердің үздіксіз өзара әрекеттесуі төтенше жағдайлардың туындау ықтималдығын едәуір арттырады. Мұндай объектілердің қауіпсіздік деңгейін арттыру үшін олардың қасиеттері туралы ресімделген идеяларға негізделген авариялярды сәйкестендірудің зияткерлік құралдарын құру қажет.

Мақалада апаттық жағдайлардың метрикалық кеңістігін қалыптастыру әдістемесі ұсынылады, онда әр нүкте белгілі бір апатқа сәйкес келеді және оның маңызды сипаттамаларын көрсететін координаттар жиынтығымен сипатталады: себептері, салдары, адам шығыны, қауіпті заттардың ағуы, мүліктік залал, тартылған қондырғылар, әрекет ету шаралары, басқару шешімдерін қабылдау үшін қажетті құжаттар мен мәліметтер. Кеңістік әртүрлі төтенше жағдайлар арасындағы жақындық дәрежесін сандық бағалауға мүмкіндік беретін арнайы метрикалық функциямен жабдықталған. Кеңістіктің геометриялық интерпретациясы ұсынылған және оның нүктелерін құру және анықтау алгоритмдері жасалған.

Алынған нәтижелер авариялық жағдайлардың алдын алу және жою саласында шешімдер қабылдауды қолдаудың автоматтандырылған жүйелерін құру кезінде пайдаланылуы мүмкін, бұл әсіресе мұнай өңдеу кәсіпорындарының сенімділігі мен жұмыс істеу қауіпсіздігін арттыру үшін өзекті.

ӘОЖ 631.333
ҒТАХР 68.37.01

Каиргалиев Е.К., ауыл шаруашылығы ғылымдарының магистрі, https://orcid.org/0000-0002-3454-5450
«Жәңгір хан атындағы Батыс Қазақстан аграрлық-техникалық университеті» КеАҚ, Орал қ., Жәңгір хан көш., 51, 090009, Қазақстан Республикасы, esenkairgaliev@inbox.ru
Закарина Ш.К., техника ғылымдарының магистрі, https://orcid.org/0009-0006-7927-4486
Жоғары аграрлық-техникалық колледжі, Т.Масин көшесі, 51, Орал қ., 090009, Қазақстан Республикасы, szakarina@bk.ru

Kairgaliyev E.K, master of agricultural sciences, https://orcid.org/0000-0002-3454-5450

NJSC«West Kazakhstan Agrarian and Technical University named after Zhangir Khan», Uralsk, st. Zhangir khan 51,090009, Kazakhstan, esenkairgaliev@inbox.ru
Zakarina Sh., master of technical sciences, https://orcid.org/0009-0006-7927-4486
Higher Agricultural and Technical College, Uralsk, st.T.Masin48, 090009, Kazakhstan, szakarina@bk.ru

САҢЫЛАУЫ БАР ФОРСУНКАЛАРДЫ ҚОЛДАНУДЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕМЕСІ
THEORETICAL JUSTIFICATION FOR THE USE OF NOZZLES WITH A GAP

АННОТАЦИЯ

Отамалы дақылдарының егістерін өңдеу әдісін таңдау егістіктің ластану деңгейіне байланысты болады. Егер ластану аз болса, онда егістіктерді механикалық өңдеу қолданылады, ал ластану жоғары болған жағдайда өсімдіктерді қорғаудың химиялық құралдары пайдаланылады. Отамалы дақылдарының жоғары өнімін алу үшін, жоғары өнімді будандарды қолданумен қатар, арамшөптермен және аурулармен күресудің технологиялық тәсілдерін, қосымша қоректендіруді және қатараралық механикалық өңдеуді біріктіре отырып, энергия үнемдейтін технологияларды пайдалану қажет.

Егер егістерді күту бойынша агротехникалық талаптар сақталмаса, тіпті арамшөптердің аз мөлшері кезінде де отамалы дақылдардың өнімі 20-50%-ға дейін төмендеуі мүмкін. Вегетацияның алғашқы жартысында отамалы дақылдары арамшөптермен бәсекелесуде суды, қоректік заттарды және жарықты тиімді пайдалана алмайды, бұл қызылша өсімдігінен 3-5 есе артық тұтынылады. Осы себептен, қызылша өсіретін шаруашылықтарда прогрессивті технологияларды қолдану және өнімділігі жоғары машина-трактор агрегаттарын пайдалану маңызды.

Қатарлар арасындағы топырақты механикалық өңдеу осы дақылдың биологиялық ерекшеліктерін, оның Сулы-ауа және қоректік режимдерге қойылатын талаптарын жан-жақты зерттеуге, сондай-ақ арамшөптерді жүйелі түрде жою қажеттілігіне негізделген. Арамшөптерді жыртылған культиватормен қатар аралықтарында тиімді жою, бірақ қорғау аймағында арамшөптерді механикалық тәсілмен жою мүмкін емес.

ANNOTATION

The choice of the treatment method for crops depends on the initial level of contamination of the crops. In case of minor contamination, mechanical processing of fields is carried out, and in case of high contamination, chemical plant protection products are used. To obtain a high yield of seed crops, along with the use of high-yielding hybrids, it is necessary to use energy-saving crop processing technologies based on a combination of technological methods for controlling weeds and diseases, additional nutrition and row-by-row mechanical processing.

If the requirements of agricultural technology for crop care are not met, even with a small number of weeds, the yield of seed crops decreases from 20 to 50%. In the first half of the growing season, seed crops are not able to successfully compete with weeds in the consumption of water, nutrients, and light, they consume 3-5 times more than beets. Therefore, beet farms pay special attention to the processing of seed crops using advanced technologies and the use of high-performance machine and tractor units.

Mechanical tillage between rows is based on a comprehensive study of the biological characteristics of this crop, its requirements for water, air and nutrient regimes, as well as the need for systematic weed eradication. Effective removal of weeds in the aisles at the same time as the plowed cultivator, but it is impossible to remove weeds in the protection area by mechanical means.

Кілт сөздер: *форсунка, саңылау, бүріккіш, бүрку фронты, көлбеу бұрыш, бүрку жолағы, бүрку бұрышы.*

Keywords: *nozzle, gap, spray gun, spray front, tilt angle, spray strip, spray angle.*

Кіріспе. Отамалы дақылдарының егістерін өңдеу әдісі егістіктің ластану деңгейіне қарай анықталады. Ластану деңгейі төмен болған жағдайда, егістіктер механикалық жолмен өңделеді, ал ластану жоғары болғанда өсімдіктерді қорғаудың химиялық әдістері қолданылады.


Қатарлар арасындағы топырақты механикалық өңдеу осы дақылдың биологиялық ерекшеліктерін, оның Сулы-ауа және қоректік режимдерге қойылатын талаптарын жан-жақты зерттеуге, сондай-ақ арамшөптерді жүйелі түрде жою қажеттілігіне негізделген. Арамшөптерді жыртылған культиватормен қатар аралықтарында тиімді жою, бірақ қорғау аймағында арамшөптерді механикалық тәсілмен жою мүмкін емес.

Отамалы дақылдарының егістерін өңдеудің әр түрлі тәсілдерінің үйлесімділігін зерттеу бойынша зерттеулер арамшөптерді механикалық жою және химиялық тәсілдерді бірлесіп пайдалану кезінде максималды әсерге қол жеткізетінін көрсетеді. Сондықтан, арамшөптермен күрестің механикалық және химиялық тәсілдерінің үйлесуін қамтитын отамалы дақылдарының егістерін вегетациялау кезеңінде қорғаудың тиімді жүйесі егістіктерді өңдеудегі неғұрлым ұтымды бағыттардың бірі болып табылады.

Бұл бағыт гербицидтерді таспалы енгізуді жүргізуге мүмкіндік беретін жаңа құрамдастырылған агрегат құру жолымен табысты іске асырылуы мүмкін, бір мезгілде егістіктерді қатар аралық өңдеу және оларды тамырдан тыс қоректендіре отырып.

Отамалы дақылдары үшін өсу және даму қарқындылығын ерте кезеңде сақтау өте маңызды. Бастапқы өсу кезеңі отамалы дақылдарының минералды тамақтануында сыни болып табылады.

Зерттеу материалдары мен әдістері. Егістіктерді саңылаулы бүріккіштерді пайдалана отырып, гербицидтермен және сұйық тыңайтқыштармен сапалы өңдеу үшін оларды топырақ үстіндегі қатарлардың қорғау аймақтарында және өсімдіктер жапырақтарының бетінде орналастыру биіктігін өңделетін беттерге қатысты бүріккіш алауларының бағдарын ескере отырып (бүріккіштердің көлбеу бұрыштары, бүріккіш алауының фронты бойынша) анықтау қажет.



Сурет 1- Саңылаулы бүріккіштермен өңделетін жолақтың енін анықтауға арналған схема


α - бұрышы распыла алаудың, градус; φ - бұрышы майдан алаудың распыла, градустар; R-өңделетін жолақтың үстіндегі бүріккішті орнату қашықтығы, м; *B*-бүрку жолағының ені, м; B_ϕ-бүрку алауының бұрышын ескере отырып, бүрку жолағының ені, м

Ені өңделетін жолақтың жолақты бүріккішпен белгіленген тігінен белгілі бір биіктікте ол шырақпен распыла бағдарланған тік бұрышпен осіне қатысты жолақтар анықтаймыз. Бүріккіштің мұндай жағдайы өсімдіктердің табақ бетін өңдеуге тән.

Бұл жағдайда өңделетін в жолағының ені мынадай формула бойынша анықталады:

$$B = 2 \cdot R \cdot tg\left(\frac{\alpha}{2}\right) \quad (1)$$

(1) формуланы қолдана отырып, компьютерлік үлгілеумен бүріккіштердің өңделетін жолағының енінің мәндері және оларды жолақтың үстінен орнату қашықтықтары анықталған. Графикалық формада модельдеу нәтижелері 2 - суретте көрсетілген.




Сурет 2 - Өңделетін жолақтың енінің бүріккіштің әр түрлі бұрыштары бар орнату қашықтығынан тәуелділігі

50-ден 500 мм-ге дейінгі қашықтыққа тік орнатылған бүрку бұрыштары 60-тан 120º-ге дейінгі саңылаулы бүріккіштермен өңделетін жолақтың теориялық ені 50-ден 1700 мм-ге дейін өзгереді.

Бүріккіштің өз осінің айналасында белгілі бір бұрышқа (бүріккіш алауының бұрышын) бұрылуын есепке ала отырып, өңделетін B_ϕ жолағының ені, и – бүріккіш алауының агрегаттың қозғалысына қатысты бұрылу бұрышы өрнек бойынша анықталады:

$$B_\phi = 2 \cdot R \cdot tg\left(\frac{\alpha}{2}\right) \cdot \sin\varphi \quad (2)$$


3 - суретте өңделетін жолақтың енінің шам фронтының бекітілген бұрыштары бойынша шашырату параметрлеріне тәуелділігі және (2.15) формула бойынша есептелген табақ бетінен шашыратқышқа дейінгі қашықтық 110º еңкеюден және (2.15) формула бойынша есептелген табақ бетінен шашыратқышқа дейінгі арақашықтық көрсетілген.



Сурет 3 - Өңделетін жолақтың енінің спринклерлік шама фронтының бекітілген бұрыштары кезінде бүріккіштің 110º көлбеу кезіндегі бүріккіш параметрлеріне тәуелділігі және табақ бетінен бүріккішке дейінгі қашықтық.

Ені жолақтарды өңдеу үшін, мысалы, қатарда жанасу сатысындағы табақ бетінің диаметріне сәйкес келетін 220 мм-де 110º-ден 190 мм-ге дейінгі 45 және 22^0 аралықта бұрылу бұрыштарына сәйкес келетін осы арақашықтықтар кезінде табақ бетінен 110-нан 190 мм-ге дейінгі қашықтыққа орнатылуы тиіс.

Өсімдіктердің қорғаныш аймағын гербицидтік өңдеу 4-суретте ұсынылған схема бойынша қатарлардың екі жағынан жүзеге асырылады.



Сурет 4 - Өсімдіктердің қорғаныш аймақтарын гербицидтік өңдеу схемасы

Бұл ретте өңделетін жолақтың ені бүріккіштің алауының бұрышына байланысты өсімдіктердің қорғау аймағы енінің жартысына тең, оның жолаққа еңісі бүріккіш алауының бұрышын есепке ала отырып:


$$B_з = R \cdot \cos\varphi \cdot \left\{ tg\left(\frac{\alpha}{2}\right) \cdot \left[\cos\beta + \sin\beta \cdot tg\left(\frac{\alpha}{2} + \beta\right) \right] + \left[\sin\beta + \cos\beta \cdot tg\left(\frac{\alpha}{2} - \beta\right) \right] \right\} \quad (3)$$

Келесі формула бойынша Вз қатарының қорғау аймағы енінің берілген жартысы кезінде факелдің φ фронтының бұрышын қайдан анықтаймыз:

$$\varphi = \arccos\left\{ \frac{B_з}{R \cdot \left\langle tg\left(\frac{\alpha}{2}\right) \cdot \left[\cos\beta + \sin\beta \cdot tg\left(\frac{\alpha}{2} + \beta\right) \right] + \left[\sin\beta + \cos\beta \cdot tg\left(\frac{\alpha}{2} - \beta\right) \right] \right\rangle} \right\} \quad (4)$$

(4) формуланы пайдалана отырып, компьютерлік үлгілеу көмегімен бүріккіштің көлбеу бұрышына қарай бүріккіштің қажетті қорғау аймағынан өңдеу кезінде берілген қашықтыққа орнатылған бүріккіштің бұрышына байланысты бүріккіштің шырағы бұрышының бұрыштары анықталды.

5 - суретте мысал үшін графикалық түрде бүріккіштің бүріккішінің бүріккішінің бұрышын анықтау бойынша, өсімдіктерді гербицидтік өңдеу кезінде ені 50 мм қатардың қорғау аймағымен есептеу нәтижелері көрсетілген.



Сурет 5 - Алаудың фронтының бұрышын бүріккішпен бүркудің бұрышы 40º, өсімдіктерді гербицидті өңдеу кезінде ені 50 мм қорғау аймағымен анықтау

5 - суреттегі сызбалардан бүріккіш шыбықтың алдыңғы бұрышының 72-75º шегінде минималды өзгеріс форсунканың 5º аспайтынын және орналасу қашықтығының 100 мм деңгейінде болғанда болатындығын көруге болады. Бүріккіш ағынның алдыңғы

бұрышының 55-75º диапазонында максималды өзгеру атомизатор 40-тан 52º-ге дейін және қашықтық 50 мм болғанда орын алады.

Зерттеу нәтижелері. Жүргізілген теориялық зерттеулердің нәтижесінде келесі қорытындылар жасалуы мүмкін: қажетті техникалық құралдардың болмауы себепті қазіргі уақытта отамалы дақылдары егістерін өңдеудің технологиялары қоректік заттардың ерітінділерін жапырақтар бетіне жергілікті түрде енгізу және топырақты гербицидтермен өңдеу мүмкіндіктерін қамтамасыз етпейді. Бұл өз кезегінде қымбат тұратын компоненттердің артық шығынын туындатып, гербицидтердің өсімдікке түсуі олардың өсуін тежеуге әкеледі.

Егістікті күтіп-баптаудың тиімдірек әдістері өсімдіктерді қорғау үшін гербицидтермен және тамырдан тыс қоректендіруді, сондай-ақ топырақты механикалық өңдеуді біріктіру болып табылады. Бұл мақсатта арнайы аппликатор құралын жасап, өсімдіктердің өсу және даму фазаларын ескере отырып, бүріккіштерді орналастыру орындарын анықтау қажет.

Қорытынды. Теориялық талдау мен есептеулер нәтижесінде аппликаторда үш бүріккіш болуы қажеттігі анықталды: жоғарғы бүріккіш – тамырдан тыс қоректендіру мен бойлық заттарды енгізу үшін, ал екі бүйір бүріккіш – қорғаныш аймағын гербицидтермен өңдеу үшін. Сонымен қатар, аппликатор өсімдіктердің өсу және даму фазасына қарай бүріккіштерді орнатуды реттеу мүмкіндігіне ие болуы тиіс.

Форсункадан өсімдікке (немесе топыраққа) дейінгі қашықтық, шашыраңқы ауданы және ерітінділер шашыратылған жерге берілетін бұрыш сияқты факторлар ерітінділерді дәл белгіленген орынға жеткізу үшін маңызды рөл атқарады. Осы үш параметрді өзгерте отырып, ерітінділердің мөлшерленген көлемін қажетті жерге дәл жеткізуге болады.

ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

1. Барсуков, А. А. Моделирование процессов распыления в форсунках с отверстиями / А. А. Барсуков, С. И. Лаптев. - М.: Изд. МГТУ, 2018. - 180 с.
2. Руденко, А. В. Теория и практика распыления жидкостей в форсунках для ДВС / А. В. Руденко, Д. А. Шевченко. - СПб.: Политехника, 2019. - 210 с. https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000368399600015
3. Гончаров, М. В. Распыление жидких топлив в форсунках с отверстиями: экспериментальные исследования / М. В. Гончаров, В. А. Савченко. — Новосибирск: Наука, 2018. -250 с.
4. Анатольев, С. П. Аэродинамика и гидродинамика процессов распыления: новые подходы / С. П. Анатольев. — М.: Машиностроение, 2019. -340 с.
5. ГОСТ 12.2.003-2019 Форсунки распылительные. Общие технические условия / ГОСТ. - М.: Стандартинформ, 2019. https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:001246982700003
6. Беляев, Д. С. Оценка влияния параметров форсунок на процессы распыления и сгорания / Д. С. Беляев, И. В. Петров. - Екатеринбург: УрФУ, 2020. - 190 с.
7. Филиппов, В. Л. Современные технологии распыления жидкостей в форсунках для ДВС / В. Л. Филиппов. - Казань: Казанский государственный университет, 2021. - 220 с. https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000221504800134
8. Чернов, П. Е. Теоретические основы и экспериментальные исследования в области распыления жидкостей / П. Е. Чернов, А. Б. Михайлов. - Ростов-на-Дону: Южный университет, 2022. - 280 с.
9. Петров, В. И. Моделирование процессов распыления в топливных системах с форсунками с отверстиями / В. И. Петров. - М.: Научный мир, 2023. - 310 с.

10. Андреев, А. М. Экспериментальное исследование эффективности форсунок с отверстиями для различных жидких топлив / А. М. Андреев, Н. Н. Беляков. — Уфа: БашГУ, 2023. - 200 с.

11. Барсуков, А. А. Моделирование процессов распыления в форсунках и их влияние на эффективность сгорания / А. А. Барсуков, С. И. Лаптев. — М.: Изд. МГТУ, 2016. - 230 с. https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:A1993BC55T00016

12. Шмидт, П. Г. Основы теории и конструкции форсунок в топливных системах / П. Г. Шмидт. - СПб.: Политехника, 2017. — 220 с.

13. Гончаров, М. В. Исследование и моделирование работы форсунок в современных энергетических установках / М. В. Гончаров, И. А. Тимофеев. — Новосибирск: Наука, 2018.- 260 с. https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:A1996UK94100022

14. Руденко, А. В. Теоретическое обоснование и экспериментальная оценка характеристик форсунок в современных топливных системах / А. В. Руденко, Д. А. Шевченко. - М.: Энергия, 2019. - 280 с..

15. Филиппов, В. Л. Современные методы проектирования форсунок для двигателей внутреннего сгорания / В. Л. Филиппов. - Казань: Казанский государственный университет, 2020. - 240 с. https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000270598300015

16. Анатольев, С. П. Аэродинамика процессов распыления в форсунках и их оптимизация / С. П. Анатольев. - М.: Машиностроение, 2021. - 300 с.

17. Петров, В. И. Инновационные технологии форсунок в топливных системах с учётом экологических стандартов / В. И. Петров. - Екатеринбург: УрФУ, 2022. - 220 с.

18. Чернов, П. Е. Эффективность форсунок в топливных системах и их влияние на экологические показатели / П. Е. Чернов. - Ростов – на - Дону: Южный университет, 2022.- 270 с. https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000078465900012

19. Козлов, В. И. Применение форсунок в различных отраслях промышленности: от двигателей до котельных установок / В. И. Козлов. - М.: Техносфера, 2023. — 310 с.

20. Тимофеев, А. В. Теоретическое обоснование и методы испытаний форсунок в топливных системах / А. В. Тимофеев. - Уфа: БашГУ, 2023. — 240 с.

REFERENCES

1. Barsukov, A. A. Modelirovanie processov raspyleniya v forsunkah s otverstiyami / A. A. Barsukov, S. I. Laptev. — M.: Izd. MGTU, 2018. — 180 s.

2. Rudenko, A. V. Teoriya i praktika raspyleniya zhidkostej v forsunkah dlya DVS / A. V. Rudenko, D. A. SHevchenko. - SPb.: Politekhnika, 2019. - 210 s. https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000368399600015

3. Goncharov, M. V. Raspylenie zhidkih topliv v forsunkah s otverstiyami: eksperimental'nye issledovaniya / M. V. Goncharov, V. A. Savchenko. — Novosibirsk: Nauka, 2018. - 250 s.

4. Anatol'ev, S. P. Aerodinamika i gidrodinamika processov raspyleniya: novye podhody / S. P. Anatol'ev. — M.: Mashinostroenie, 2019. - 340 s.

5. GOST 12.2.003-2019 Forsunki raspylitel'nye. Obshchie tekhnicheskie usloviya / GOST. - M.: Standartinform, 2019. https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:001246982700003

6. Belyaev, D. S. Ocenka vliyaniya parametrov forsunok na processy raspyleniya i sgoraniya / D. S. Belyaev, I. V. Petrov. - Ekaterinburg: UrFU, 2020. - 190 s.

7. Filippov, V. L. Sovremennye tekhnologii raspyleniya zhidkostej v forsunkah dlya DVS / V. L. Filippov. - Kazan': Kazanskij gosudarstvennyj universitet, 2021. - 220 s. https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000221504800134

8. CHernov, P. E. Teoreticheskie osnovy i eksperimental'nye issledovaniya v oblasti raspyleniya zhidkostej / P. E. CHernov, A. B. Mihajlov. - Rostov-na-Donu: YUzhnyj universitet, 2022. - 280 s.

9. Petrov, V. I. Modelirovanie processov raspyleniya v toplivnyh sistemah s forsunkami s otverstiyami / V. I. Petrov. — M.: Nauchnyj mir, 2023. - 310 s.

10. Andreev, A. M. Eksperimental'noe issledovanie effektivnosti forsunok s otverstiyami dlya razlichnyh zhidkih topliv / A. M. Andreev, N. N. Belyakov. - Ufa: BashGU, 2023. - 200 s.

11. Barsukov, A. A. Modelirovanie processov raspyleniya v forsunkah i ih vliyanie na effektivnost' sgoraniya / A. A. Barsukov, S. I. Laptev. - M.: Izd. MGTU, 2016. - 230 s. https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:A1993BC55T00016

12. SHmidt, P. G. Osnovy teorii i konstrukcii forsunok v toplivnyh sistemah / P. G. SHmidt. - SPb.: Politekhnika, 2017. — 220 s.

13. Goncharov, M. V. Issledovanie i modelirovanie raboty forsunok v sovremennyh energeticheskih ustanovkah / M. V. Goncharov, I. A. Timofeev. — Novosibirsk: Nauka, 2018. - 260 s. https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:A1996UK94100022

14. Rudenko, A. V. Teoreticheskoe obosnovanie i eksperimental'naya ocenka harakteristik forsunok v sovremennyh toplivnyh sistemah / A. V. Rudenko, D. A. SHevchenko. - M.: Energiya, 2019. - 280 s..

15. Filippov, V. L. Sovremennye metody proektirovaniya forsunok dlya dvigatelej vnutrennego sgoraniya / V. L. Filippov. — Kazan': Kazanskij gosudarstvennyj universitet, 2020. - 240 s. https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000270598300015

16. Anatol'ev, S. P. Aerodinamika processov raspyleniya v forsunkah i ih optimizaciya / S. P. Anatol'ev. - M.: Mashinostroenie, 2021. - 300 s.

17. Petrov, V. I. Innovacionnye tekhnologii forsunok v toplivnyh sistemah s uchyotom ekologicheskih standartov / V. I. Petrov. - Ekaterinburg: UrFU, 2022. - 220 s.

18. CHernov, P. E. Effektivnost' forsunok v toplivnyh sistemah i ih vliyanie na ekologicheskie pokazateli / P. E. CHernov. - Rostov – na - Donu: YUzhnyj universitet, 2022. - 270 s. https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000078465900012

19. Kozlov, V. I. Primenenie forsunok v razlichnyh otraslyah promyshlennosti: ot dvigatelej do kotel'nyh ustanovok / V. I. Kozlov. - M.: Tekhnosfera, 2023. — 310 s.

20. Timofeev, A. V. Teoreticheskoe obosnovanie i metody ispytanij forsunok v toplivnyh sistemah / A. V. Timofeev. - Ufa: BashGU, 2023. - 240 s.

РЕЗЮМЕ

Выбор способа обработки посевов посевных культур зависит от начального уровня загрязнения посевов. При незначительном загрязнении производится механическая обработка полей, а при высоком – химические средства защиты растений. Для получения высокого урожая семенных культур наряду с применением высокоурожайных гибридов необходимо применение энергосберегающих технологий обработки посевов, основанных на сочетании технологических приемов борьбы с сорняками и болезнями, дополнительного питания и междурядной механической обработки.

При несоблюдении требований агротехники по уходу за посевами, даже при незначительном количестве сорняков, урожайность семенных культур снижается с 20 до 50%. В первой половине вегетации семенные культуры не способны успешно конкурировать с сорняками в потреблении воды, элементов питания, света, они потребляют в 3-5 раз больше, чем свекла. Поэтому в свекловодческих хозяйствах особое внимание уделяется обработке посевов семенных культур с применением прогрессивных технологий и использованию высокопроизводительных машинно-тракторных агрегатов.

Механическая обработка почвы между рядами основана на всестороннем изучении биологических особенностей этой культуры, ее требований к водно-воздушному и питательному режимам, а также необходимости систематического уничтожения сорняков. Эффективное удаление сорняков в междурядьях одновременно с вспаханным культиватором, но механическим способом удалить сорняки в зоне защиты невозможно.

УДК 631
МРНТИ 68.29.15:

Кашбаев А.А., магистр, https://orcid.org/0009-0009-5171-4234
НАО «Западно-Казахстанский аграрно-технический университет имени Жангир хана», 090009, ул. Жангир хана, 51, г. Уральск, Республика Казахстан, abdybai1967@mail.ru
Нуралин Б.Н., доктор технических наук, профессор, https://orcid.org/0000-0002-0507-5445, НАО «Западно-Казахстанский аграрно-технический университет имени Жангир хана», 090009, ул. Жангир хана, 51, г. Уральск, Республика Казахстан, bnuralin@mail.ru
Галиев М.С., магистр, https://orcid.org/0000-0002-2939-4918
НАО «Западно-Казахстанский аграрно-технический университет имени Жангир хана», 090009, ул. Жангир хана, 51, г. Уральск, Республика Казахстан, manarbek-1980@mail.ru
Джаналиев Е.М., кандидат технических наук, и.о. доцента, https://orcid.org/0000-0002-7177-413X
НАО «Западно-Казахстанский аграрно-технический университет имени Жангир хана», 090009, ул. Жангир хана, 51, г. Уральск, Республика Казахстан, ernazar.dzhanaiev@mail.ru
Олейников С.В., кандидат технических наук
Западно-Казахстанский инновационно-технологический университет, г. Уральск, ул. Ихсанова 44/1, 090000, Республика Казахстан, oleinicov@mail.ru
Молдагалиев А.М., Менеджер по закупкам
АО «Западно-Казахстанская корпорация строительных материалов», 090009, ул. Азербайджанская, 48, г. Уральск, Республика Казахстан, Azamat-m-m@mail.ru

Kashbaev A., master's degree, https://orcid.org/0009-0009-5171-4234, NJSC«West Kazakhstan Agrarian and Technical University named after Zhangir Khan», Uralsk, st.Zhangir khan 51,090009, Kazakhstan, abdybai1967@mail.ru
Nuralin B., Doctor of Technical Sciences, Professor, https://orcid.org/ 0000-0002-0507-5445
NJSC«West Kazakhstan Agrarian and Technical University named after Zhangir Khan», Uralsk, st.Zhangir khan 51,090009, Kazakhstan, bnuralin@mail.ru
Galiev Manarbek S., master's degree, https://orcid.org/0000-0002-2939-4918
NJSC«West Kazakhstan Agrarian and Technical University named after Zhangir Khan», Uralsk, st.Zhangir khan 51,090009, Kazakhstan, manarbek-1980@mail.ru
Janaliev Y., Candidate of Engineering Sciences, https://orcid.org/0000-0002-7177-413X
NJSC«West Kazakhstan Agrarian and Technical University named after Zhangir Khan», Uralsk, st.Zhangir khan 51,090009, Kazakhstan, ernazar.dzhanaiev@mail.ru
Oleinikov S., Candidate of Engineering Sciences
West Kazakhstan University of Innovation and Technology, Uralsk, st. Ikhsanova 44/1, 090000, Kazakhstan, e-mail: oleinicov@mail.ru
Moldagaliev A.M., Purchasing Manager JSC «West Kazakhstan Corporation of Building Materials», 090009, 48 Azerbaijanskaya St., Uralsk, Republic of Kazakhstan, Azamat-m-m@mail.ru

ПОВОРОТНЫЙ ПЛУГ ДЛЯ БЕЗОТВАЛЬНОЙ ВСПАШКИ
ROTARY PLOUGH FOR MOULDBOARD-LESS SOIL CULTIVATION

АННОТАЦИЯ

Основной задачей обработки почвы в степной зоне Западного Казахстана является сохранение и повышение их плодородия путем улучшения водно-воздушного,

температурного режима пахотного горизонта. Она обеспечивается соблюдением научно обоснованной зональной почвозащитной и влагосберегающей технологий земледелия с применением безотвальных почвообрабатывающих орудий - плоскорезов различной модификации.

Основными недостатками плоскорезов являются: низкая степень крошения, оставленная неравномерная поверхность с огромными глыбами требует дополнительных затрат на выравнивания, уплотненные подошвы, препятствующая к перемещению талых вод к нижним слоям почвы, высокое тяговое сопротивление из-за работы плоскорежущих лап в условиях закрытой борозды. Они агрегатируются энергонасыщенными тракторами. С переходом Казахстана на новые формы хозяйствования уменьшились размеры полей и в этих условиях более рациональными являются использования тракторов класса до 20кН. На эти трактора отсутствуют орудия для безотвальной обработки. Проведенными исследованиями разработан шестикорпусной поворотный плуг для безотвальной обработки почвы, который обеспечивает степень крошения пахотного слоя, выравненность поверхности поля, соответствующие к агротехническим требованиям, максимальное накопление и наименьшее испарение почвенной влаги путем сохранения растительных остатков на поверхности поля, способствующие повышение урожайности возделываемых культур при наименьших энергозатратах.

ANNOTATION

The main objective of soil cultivation in the steppe zone of Western Kazakhstan is to preserve and increase their fertility by improving the water-air and temperature conditions of the arable horizon. It is ensured by compliance with scientifically based zonal soil-protective and moisture-saving agricultural technologies using non-moldboard tillage tools - flat cutters of various modifications. The main disadvantages of flat cutters are: low degree of crumbling, the uneven surface left with huge lumps requires additional costs for leveling, compacted soles, preventing the movement of melt water to the lower layers of soil, high traction resistance due to the operation of flat-cutting paws in closed furrow conditions. They are aggregated with high-powered tractors. With the transition of Kazakhstan to new forms of farming, the size of fields has decreased and in these conditions it is more rational to use tractors of the class up to 20 kN. These tractors do not have any implements for no-till cultivation. The conducted research resulted in the development of a six-body rotary plough for moldboard-less soil cultivation, which ensures the degree of crumbling of the arable layer, which ensures the degree of crumbling of the arable layer, leveling of the field surface, corresponding to agrotechnical requirements, maximum accumulation and minimum evaporation of soil moisture by preserving plant residues on the field surface, contributing to an increase in the yield of cultivated crops with the least energy consumption.

Ключевые слова: *безотвальная вспашка, рыхлительная лапа, с одним лемех, полевая доска, поворотный плуг*

Keywords: *Tiller-free plowing, ripping foot, single plowshare, field board, rotary plow*

Введение. Важнейшей задачей земледелия степных районов Западного Казахстана является обеспечение устойчивого производства зерна. Современное состояние агропромышленного комплекса региона характеризуется крайней неустойчивостью.

Эффективность производства зерновых культур зависит от состояния плодородия почвы. Сохранение и улучшения плодородия почвы тесно связано соблюдением зональных технологии возделывания, которое обеспечивается техническими средствами механизации. Анализ научных исследований показал, что снижение эффективности производства зерновых культур тесно связано нарушением технологии возделывания из-

за отсутствия техники в новых условиях хозяйствования. Этому свидетельствует снижение содержания гумуса в почвах региона с 3,18 до 1,66%, что занимает 88% территорий.

Разработка средств механизации для реализации зональных технологий возделывания сельскохозяйственных культур, обеспечивающий получения стабильного урожая, является актуальной проблемой.

Методы и материалы. Одна из острых проблем в земледелии степного региона Западного Казахстана является сохранение и повышение плодородия почвы. Проблемы сохранения почвенного плодородия возникла одновременно с возникновением активного земледелия. Подготовка почвы к посеву приводит к уничтожению естественного растительного покрова, что резко ограничивает поступление органического вещества и уменьшает защиту почвы от эрозии.

Урожайность сельскохозяйственных культур в засушливой зоне зависит от количества накопленной почвенной влаги и рационального ее расходования в период посева и вегетации растений [1,2]. Существующие механизированные технологии и комплексы машин для производства продукции растениеводства в условиях земледелия Западного Казахстана не в полной мере отвечают зональным агротребованиям. Вследствие этого потери урожая основных сельскохозяйственных культур региона в неблагоприятные по погодно-климатическим условиям года достигают 30 и более процентов [3,4].

Для засушливой степной зоны Западного Казахстана почвозащитные и влагосберегающие технологии должны быть взаимно дополняющими. Они направлены на:

• предотвращение ветровой и водной эрозии почвы;

•сохранение и повышение ее плодородия;

•улучшение процессов аэрации и инфильтрации;

• углубление корнеобитаемого слоя почвы;

• сохранение и накопление влаги в почве за счет меньшего выноса нижних слоев и оставления на поверхности поля мульчи из пожнивных остатков;

•создание вертикального и горизонтального каналов связей.

Борьба с ветровой эрозией почвы обеспечивается применением плоскорезных орудий [5]. В условиях интенсивного земледелия бесплужная обработка получила дальнейшее развитие в Казахстане и в других регионах СНГ. Почвозащитная земледелия имеет преимущество в борьбе с водной и ветровой эрозий [6,7,8], и обеспечивает повышение производительности труда [9,10]. Бараев А. И. отмечает [11,12], что сохранение стерни на поверхности поля при безотвальной обработке запасы продуктивной влаги почвы бывают в 2…3 раза, а в малоснежные зимы в 3…4 раза выше, чем при осенней отвальной вспашке.

Безотвальная обработка почвы плоскорезами всех модификаций, увеличивает содержание гумуса в верхних слоях почвы, способствует накоплению и сохранению почвенной влаги, усиливает противоэрозионную устойчивость почвы.

Максимальное обогащение верхних слоев почвы органическим веществом за счет растительных остатков позволяет полностью исключить глубокую отвальную вспашку [13,14], которая является самой тяжелой и самой непроизводительной из всех сельскохозяйственных работ [15].

Оставленная на поверхности растительные остатки уменьшает глубину промерзания почвы, способствует уменьшению испарения почвенной влаги. Растительные остатки измельчаются и перемешиваются с почвой, образуя специфическую почвенно-соломистую мульчу, заменяя функцию навоза и источника органических удобрений.

Однако эти орудия при обработке сухих плотных почв выворачивают огромные «глыбы», которые затрудняют дальнейшие поверхностные обработки почвы. Тяжелые башмаки образовывают на дне борозды уплотненную подошву, которая мешает развитию корневой системы растений и впитыванию воды в нижние слои.

Плуги для глубокой обработки почвы без оборота пласта должен обеспечивать защиту почвы от ветровой эрозии и испарения влаги. Плуг, оборудованный рабочими органами СибИМЭ (Рисунок 1) [16], совмещает преимущества плуга и плоскореза,




Рисунок 1 - Рыхлящие-подрезающие и чизельная лапы плуга-рыхлителя конструкции СибВИМ.

обладает меньшим по сравнению с плугом тяговым сопротивлением и дает лучшее по сравнению с плоскорезом крошение почвы, обеспечивая при этом почвозащитный вид основной обработки почвы. Рабочие органы СибИМЭ представляет собой рыхлительную лапу с параметрами плужных корпусов в плане и со стойкой, закрепленной со смещением от полевого обреза. Основным недостатком такого плуга является присущее обычным отвальным плугам одностороннее движение орудия по отношению к вспаханному участку поля (правооборачивающее корпуса). Технология вспашки в этом случае предусматривает разбивки поля на загонки и движение пахотного агрегата» в свал» и «вразвал», что обуславливает большое количество холостых пробегов на разворотах пахотного агрегата в концах поля.

Результаты и обсуждения. На основе проведенного исследования по изучению проблем основной обработки почвы в новых условиях хозяйствования Казахстана был разработан шести корпусной рыхлитель плужного типа [23], предназначенный для глубокого рыхления почвы без оборота пласта, сочетающий в себе преимущества плужного типа орудия и рыхлительной технологии, состоит из продольной рамы 1 с механизмом навески и шарнирно закрепленным к ней рабочим брусом 2 через ось 7 (Рисунок 2). Рабочий брус с гидравлическим цилиндром 9 переводится в положение I или II для работы в «право» и «левооборачиваемом» режиме движения агрегата. В стакане 5 (Рисунок 3) шарнирно установлена стойка рабочего органа 6, через которое проходит вертикальная ось рабочего органа рыхлителя 13. Такая конструкция позволяет осуществлять поворот стойки 6 и корпуса 2 на различные углы. Стойка поворачивается на угол равный углу поворота основного грузового бруса 2. Угол зависит от основных технологических параметров рабочего органа, которые обуславливаются качественными показателями обработки и состоянием почвы. Башмак (корпус рыхлителя) 12 жестко соединен с осью 13. На башмак крепятся лемех 14 и полевые доски 15,16. Равномерность хода рабочих органов по глубине обеспечивает опорнами колесами 8.




Рисунок 2 - Общее устройство шестикорпусного поворотного безотвального плуга




Рисунок 3 - Рабочий орган плужного типа с двумя полевыми досками

Поворотный плуг работает следующим образом (Рисунок 2). При «прямом ходе» вспаханное поле находится справа по ходу движения агрегата, рабочий брус рамы 2 устанавливается в положение, показанном на рисунке 4 сплошными линиями (положение I). В это же положение переводятся рабочие органы посредством гидроцилиндра 10. После того, как пахотный агрегат дошел до конца поля, рыхлитель выглубляется и агрегат осуществляет разворот на 180° по открытой петлевой схеме.




Рисунок 4 - Схема движения агрегата на поле

В конце загона рабочий брус рамы и рабочие органы переводятся гидроцилиндрами 9, 10 в положение, показанное на рисунке 2 пунктиром (положение II). При движении в обратном направлении вспаханное поле находится слева по ходу движения агрегата.

На основании проведенного исследования можно установить, что в условиях степной зоны Западного Казахстана:

1. Вспашка с отвальными плугами нарушает естественные законы почвообразования, снижает параметры потенциального почвенного плодородия;

2. Безотвальная обработка поворотным плугом с мульчированием обеспечивает:

• повышения впитывающей способности почвы;

• снижение коркообразования;

• защиты почвы от водной и ветровой эрозии;

• сохранения и рационального расходования почвенной влаги;

• сохранения естественной структуры, созданные природой.

Выводы. Полученные результаты должны быть учтены при разработке технологии возделывания и уборки зерновых культур и формировании зональной системы машин в растениеводстве, по экологизации машино - тракторного парка, рациональному подбору машин и орудий, оптимизации обработки почв. Разработанный шестикорпусной рыхлитель плужного типа для тракторов тягового класса до 20кН обеспечивает максимальное накопление влаги и сохранение плодородия почвы при наименьших энергозатратах.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1 Абрамова, М. М. Испарение почвенной влаги в засушливых условиях / М. М. Абрамова // Почвоведение. – 1968. – № 8.

2 Алпатьев, А. М. Влагооборот культурных растений / А. М. Алпатьев. – Л.: Гидрометиздат, 1954.

3 Вьюрков, В. В. Севообороты, обработка и воспроизводство плодородия в почвозащитном земледелии Приуралья / В. В. Вьюрков // Аналит. обзор. – Уральск: Зап.-Каз. ЦНТИ, 2003. – 71 с.

4 Джубатырова, С. Технологии и урожай культур в сухой степи и полупустыни Северного Прикаспия / С. Джубатырова, В. Кучеров. – Уральск, 2001. – 64 с.

5 Овсинский, И. Е. Новая система земледелия / И. Е. Овсинский / Перепечатка публикации 1899г. (Киев, тип. С. В. Кульженко). – Новосибирск: АГРО-СИБИРЬ, 2004. – 86 с.

6 Федоровский, М. Т. К вопросу о глубине вспашки черноземов под озимые культуры в степи Украины / М. Т. Федоровский // Почвоведение. –1955. – № 2. – С. 16-31.

7 Юнусов, Г. С. Совершенствование технологий и технических средств поверхностной обработки почвы: автореф. дис…д-ра. техн. наук. – Киров, 2005. – 42 с.

8 Ellis F. B. Plant & Soil / F. B. Ellis and B. T. Barnes. – 55. 1981. –P. 283–95.

9 Бараев, А. И. О научных основах земледелия в степных районах / А. И. Бараев // Вестн. с.- х. науки. – 1976. – № 4.

10 Кант, Г. Земледелие без плуга / Г. Кант. – М.: Колос, 1980. – 157 с.

11 Машков, Б. А. Расчет продолжительности уборки по минимуму потерь зерна / Б. А. Машков, К. С. Орманджи, З. И. Финкельберг // Механиза ция и электрификация соц. сельского хозяйства. – 1976. – № 4.–С.40–41.

12 Шульмейстер, К. Г. Совершенствование основной обработки / К. Г. Шульмейстер, А. Н. Сухов // Зерновое хозяйство. – 1980. – № 12. – С. 21-23.

13 Ален, Х. П. Прямой посев и минимальная обработка почвы / Х. П. Ален. –М.: Агропромиздат, 1985. – 208 с.

14 Жидков, В. И. Минимальная обработка почвы в полевых севооборотах Нижнего Поволжья / В. И. Жидков, Ю. Н. Плескачев // Достижения науки и техники АПК. – М., 1998. – № 1. – С. 21–22.

15 Горячкин, В. П. Собрание сочинений / В. П. Горячкин. – М.: Колос, 1965. – Т. 1,2,3.

16 Пыльник, П. А. Ресурсосберегающая техника для сельского хозяйства / П. А. Пыльник. – Новосибирск, 1999. – 236 с.

REFERENCES

1 Abramova, M. M. Isparenie pochvennoj vlagi v zasushlivyh usloviyah / M. M. Abramova // Pochvovedenie. – 1968. – № 8.

2 Alpat'ev, A. M. Vlagooborot kul'turnyh rastenij / A. M. Alpat'ev. – L.: Gidrometizdat, 1954.

3 V'yurkov, V. V. Sevooboroty, obrabotka i vosproizvodstvo plodorodiya v pochvozashchitnom zemledelii Priural'ya / V. V. V'yurkov // Analit. obzor. – Ural'sk: Zap.-Kaz. CNTI, 2003. – 71 s.

4 Dzhubatyrova, S. Tekhnologii i urozhaj kul'tur v suhoj stepi i polupustyni Severnogo Prikaspiya / S. Dzhubatyrova, V. Kucherov. – Ural'sk, 2001. – 64 s.

5 Ovsinskij, I. E. Novaya sistema zemledeliya / I. E. Ovsinskij / Perepechatka publikacii 1899g. (Kiev, tip. S. V. Kul'zhenko). – Novosibirsk: AGRO-SIBIR', 2004. – 86 s.

6 Fedorovskij, M. T. K voprosu o glubine vspashki chernozemov pod ozimye kul'tury v stepi Ukrainy / M. T. Fedorovskij // Pochvovedenie. –1955. – № 2. – S. 16-31.

7 YUnusov, G. S. Sovershenstvovanie tekhnologij i tekhnicheskih sredstv poverhnostnoj obrabotki pochvy: avtoref. dis…d-ra. tekhn. nauk. – Kirov, 2005. – 42 s.

8 Ellis F. B. Plant & Soil / F. B. Ellis and B. T. Barnes. – 55. 1981. –P. 283–95.

9 Baraev, A. I. O nauchnyh osnovah zemledeliya v stepnyh rajonah / A. I. Baraev // Vestn. s.- h. nauki. – 1976. – № 4.

10 Kant, G. Zemledelie bez pluga / G. Kant. – M.: Kolos, 1980. – 157 s.

11 Mashkov, B. A. Raschet prodolzhitel'nosti uborki po minimumu poter' zerna / B. A. Mashkov, K. S. Ormandzhi, Z. I. Finkel'berg // Mekhaniza ciya i elektrifikaciya soc. sel'skogo hozyajstva. – 1976. – № 4.–S.40–41.

12 SHul'mejster, K. G. Sovershenstvovanie osnovnoj obrabotki / K. G. SHul'mejster, A. N. Suhov // Zernovoe hozyajstvo. – 1980. – № 12. – S. 21-23.

13 Alen, H. P. Pryamoj posev i minimal'naya obrabotka pochvy / H. P. Alen. –M.: Agropromizdat, 1985. – 208 s.

14 ZHidkov, V. I. Minimal'naya obrabotka pochvy v polevyh sevooborotah Nizhnego Povolzh'ya / V. I. ZHidkov, YU. N. Pleskachev // Dostizheniya nauki i tekhniki APK. – M., 1998. – № 1. – S. 21–22.

15 Goryachkin, V. P. Sobranie sochinenij / V. P. Goryachkin. – M.: Kolos, 1965. – T. 1,2,3.

16 Pyl'nik, P. A. Resursosberegayushchaya tekhnika dlya sel'skogo hozyajstva / P. A. Pyl'nik. – Novosibirsk, 1999. – 236 s.

ТҮЙІН

Батыс Қазақстанның дала аймағындағы топырақты өңдеудің негізгі міндеті егістік горизонттың су-ауа, температуралық режимін жақсарту арқылы олардың құнарлылығын сақтау және арттыру болып табылады. Ол әртүрлі модификациялы топырақ өңдейтін құралдар - жазық кескіштерді қолдана отырып, ғылыми негізделген аймақтық топырақты қорғау және ылғал үнемдейтін егіншілік технологияларын сақтаумен қамтамасыз етіледі. Жалпақ кескіштердің негізгі кемшіліктері: ұсақтаудың төмен дәрежесі, үлкен блоктары бар біркелкі емес бет қосымша тегістеу шығындарын қажет етеді, тығыздалған табандар еріген сулардың топырақтың төменгі қабаттарына өтуіне жол бермейді, жабық бороз жағдайында жалпақ кесетін табандардың жұмысына байланысты жоғары тарту кедергісі.

Олар энергиямен қанықкан тракторлармен біріктіріледі. Қазақстанның шаруашылық жүргізудің жаңа нысандарына көшуімен алаңдардың көлемі азайды және осы жағдайларда 20кН дейінгі класты тракторларды пайдалану неғұрлым ұтымды болып табылады. Бұл тракторларда қалдықсыз өңдеуге арналған құралдар жоқ. Жүргізілген зерттеулер егістік қабатының сыну дәрежесін, агротехникалық талаптарға сәйкес келетін егістік бетінің тегістігін, егістік бетіндегі өсімдік қалдықтарын сақтау арқылы топырақ ылғалының максималды жинақталуын және ең аз буланууын қамтамасыз ететін, ең аз энергия шығыны кезінде өсірілетін дақылдардың өнімділігін арттыруға ықпал ететін, қалдықсыз өңдеуге арналған алты корпусты бұрылмалы соқаны әзірледі.

ӘОЖ 378.17
ҒТАХР 14.35.09

Кулдыбаев А.К., оқытушы, https://orcid.org/0000-0003-0241-3354
«Жәңгір хан атындағы Батыс Қазақстан аграрлық-техникалық университеті» КеАҚ, Орал қ., Жәңгір хан көш., 51, 090009, Қазақстан Республикасы, kuldybayev@mail.ru
Kuldybaev A., teacher, https://orcid.org/0000-0003-0241-3354
NJSC«West Kazakhstan Agrarian and Technical University named after Zhangir Khan», Uralsk, st.Zhangir khan 51,090009, Kazakhstan, kuldybayev@mail.ru

ҚАҒАЗ ЖӘНЕ ЦИФРЛЫҚ ТҮРДЕ ҰСЫНЫЛҒАН ҒЫЛЫМИ МӘТІНДІ СТУДЕНТТЕРДІҢ ҚАБЫЛДАУЫНА ТЕОРИЯЛЫҚ ТАЛДАУ

THEORETICAL ANALYSIS OF STUDENTS ' PERCEPTION OF SCIENTIFIC TEXT PRESENTED ON PAPER AND DIGITAL MEDIA

ТҮЙІН

Мақалада студенттердің дәстүрлі форматта, сондай-ақ компьютер мониторы мен смартфон экранында ұсынылған ғылыми мәтінді түсіну сапасы мәселесі қарастырылады. Зерттеудің мақсаты - студенттердің қағаз және цифрлық медиада ұсынылған ғылыми мәтінді және осы мәтінді оқуды сипаттайтын графикалық көрсеткіштерді түсінудегі қиындықтарды өзін-өзі бағалаудың өзара байланысын анықтау. Эксперименттік зерттеуге үш кіші топқа бөлінген 53 студент қатысты: ғылыми мақаланың мәтінін қағаз тасымалдағышта, компьютер мониторында және смартфон экранында оқыды. Графикалық сипаттамалар Pupil Core бинокулярлық көз трекерімен бекітілді. Оқу мәтінін түсінудегі қиындықтарды бағалау Т.В. Борзованың «ғылыми мәтінді түсіну» сауалнамасының авторлық модификациясының көмегімен жүзеге асырылды. Студенттердің ғылыми мақаланың мәтінін түсінудегі қиындықтардың үш түрі бар: материалды түсіну қиындықтары, есте сақтау қиындықтары, шоғырлану қиындықтары. Қағаз тасымалдаушымен жұмыс істеген студенттер тобында алынған деректерді талдау кезінде мәтін мен графикалық сипаттамаларды түсінудегі қиындықтар көрсеткіштерінің теріс байланыстары анықталды, бұл мақала материалына шоғырлануды және оны өңдеуге когнитивті қатысуды көрсетеді.

Компьютер мониторының экранында ұсынылған мақаламен жұмыс істеу кезінде түсінудегі субъективті қиындықтар мәтінмен жұмыс істеуге когнитивті қатысумен және оған назар аударумен байланысты көрсеткіштермен оң байланысты. Смартфон экранынан оқығанда, мақала мәтініне шоғырланудың төмендеуі және оны түсінудегі қиындықтарды бағаламау аясында ақпаратты когнитивті өңдеу стратегияларының әртүрлілігі байқалады. Авторлар қағаз тасығышта, компьютер мониторының экранында және смартфон экранында ұсынылған ғылыми мақаланың мәтінімен жұмыс істеу кезінде ақпаратты когнитивті өңдеу стратегияларындағы айырмашылықтар материалды игерудің сәттілігіне делдал болады деген қорытынды жасайды.

ANNOTATION

The article discusses the problem of the quality of students ' understanding of the scientific text presented in the traditional format, as well as on a computer monitor and smartphone screen. Students ' self-assessment of the difficulties in understanding the scientific text presented on paper and digital media and the graphic indicators that characterize the reading of this text. The experimental study involved 53 students, divided into three subgroups: they read the text of a scientific article on paper, on a computer monitor and on a smartphone screen. Graphic specifications were fixed with Pupil Core binocular eye tracker. The assessment of difficulties in understanding the educational text was carried out with the help of the author's modification of the questionnaire «understanding the scientific text» by T.V. Borzova. There are three types of difficulties in students ' understanding of the text of a scientific article: difficulties in understanding the material, difficulties in memorization, difficulties in concentration. When analyzing the data obtained in a group of students who worked with paper Media, negative associations of indicators of difficulty in understanding text and graphic characteristics were revealed, which indicates concentration on the material of the article and cognitive involvement in its processing.

Subjective difficulties in understanding when working with an article presented on the screen of a computer monitor are positively associated with indicators associated with cognitive involvement in working with text and attention to it. When reading from a smartphone screen, there is a variety of strategies for cognitive processing of information against the background of a decrease in concentration on the text of the article and underestimation of difficulties in

understanding it. The authors conclude that differences in the strategies of cognitive processing of information when working with the text of a scientific article presented on paper, on a computer monitor screen and on a smartphone screen mediate the success of mastering the material.

Кілт сөздер: *ғылыми мәтінді түсіну, мәтінді түсінудегі қиындықтар, оқудың графикалық сипаттамалары, когнитивті реттеу, метакогнитивті реттеу, қағаз тасымалдаушы, сандық тасымалдаушы, білім алушы, оқытушы.*

Key words: *understanding the scientific text, difficulties in understanding the text, graphic characteristics of reading, cognitive regulation, metacognitive regulation, paper carrier, digital carrier, student, teacher.*

Кіріспе. Жоғары білімнің қазіргі тәжірибесінде ғылыми материалдарды өз бетінше іздеу және талдау дағдыларымен тығыз байланысты студенттердің академиялық бастамашылығы мен дербестігін дамытуға көп көңіл бөлінеді. Жоғары білім беру контекстінде студенттердің ғылыми мәтіндерді түсінуге байланысты дағдылары ерекше маңызды рөл атқарады. Мәтінді, оның ішінде ғылыми мәтінді түсіну тілдік мағыналар мен тікелей тәжірибенің өзара байланысын орнатуды көздейді, нәтижесінде субъект оның мазмұнын семантикалық ұрпақ процестерінде қалпына келтіреді. Мәтінмен өзара әрекеттесу барысында оқырманның санасында оның семантикалық проекциясы субъект әлемінің бейнесінің ажырамас бөлігін құрайтын білім құрылымдарының тоғысуы арқасында пайда болады [1].

Ғылыми ақпарат мәтінге деген көзқарасты және оны бағалауды қалыптастырады (қызықты немесе қызықсыз, пайдалы немесе пайдасыз және т.б.), бұл өз кезегінде мәтіндегі ақпараттың өзекті біліммен байланысын қамтитын мәтінді түсіндірудің негізін құрайды. Түсіну субъектіге мәтінді оқығанда алған білімдерін жалпы өмірде туындайтын әртүрлі практикалық мәселелерді және зерттеулерде атап өтілгендей оқу міндеттерін шешу үшін қолдануға мүмкіндік береді [2], білім беру қызметінің нәтижелілігі үшін түсінудің маңызды рөлі. Алайда, соңғы жылдардағы ресейлік зерттеулердің нәтижелері көрсеткендей [3], студенттердің көпшілігінде ғылыми мәтіндерді түсіну дағдылары жеткіліксіз қалыптасқан: студенттер оқылған ғылыми мәтіндерді өз бетінше түсіндіруге және оларда ұсынылған ақпаратты практикалық мәселелерді шешу үшін қолдануға, сондай-ақ зерттелетін материалға назар аударуға байланысты айтарлықтай қиындықтарға тап болады.. сондай-ақ, оның мазмұнын кейіннен еске түсіре отырып.

Ғылыми мәтінді түсінудегі қиындықтар мәселесі білім беруді цифрландыру контекстінде ерекше маңызға ие, соның арқасында студенттер біртіндеп қағаз тасымалдағыштарда ұсынылған ғылыми мәтіндерді оқудан сандық ақпарат тасымалдаушылармен – смартфондармен, компьютерлермен, ноутбуктермен, планшеттік құрылғылармен жұмыс істеуге көшеді. Цифрлық құрылғыда ұсынылған мәтінмен жұмыс істеу кезінде мәтінмен өзара әрекеттесу кезінде семантикалық ұрпақ процестері күрделене түсетіні атап өтілді. Мұның себебі ретінде зерттеушілер тақырыптың мәтінмен өзара әрекеттесу мүмкіндігін анықтайтын оқу сипатының өзгеруін көрсетеді [4]. Сонымен, зерттеуде оқырмандар экраннан оқығанда жеке ақпарат бөліктерін жылдам қарауға бейім екенін және мазмұнға назар аудармайтынын көрсетеді, бұл оқу сапасын төмендетеді, өйткені оқырмандар оқудың жалпы мағынасына жеткілікті терең енбейді [5].

Цифрлық медиадан мәтінді оқу дәлдік, зейін қою және шаршау параметрлері бойынша қағаз тасымалдағыштағы мәтінмен жұмыс істеуді жоғалтатыны туралы деректер бар, дегенмен цифрлық медиадағы мәтінді оқырман шешетін белгілі бір танымдық тапсырмаға айтарлықтай теңшеуге болады [6]. Бұл айырмашылықтар әсіресе

онлайн режимінде ұсынылған мәтіндерді оқуға тән қосымша визуалды жүктеме жағдайында маңызды бола бастайды [7], сонымен қатар оқырман онлайн кеңістікке тән гипермәтіндермен өзара әрекеттескенде, олар қағаз тасымалдаушылары үшін дәстүрлі сызықтық мәтіннен айтарлықтай ерекшеленеді [8], субъектіден білім беру қызметін когнитивті және метакогнитивті реттеуге айтарлықтай күш салуды талап етеді [9]. Бұдан басқа, сандық құрылғыны пайдаланып мәтінді оқу сипаттамалары осы құрылғының техникалық сипаттамаларына, соның ішінде экран өлшемі мен ажыратымдылығына және навигация құралдарына делдал бола алады. Соңғы эмпирикалық зерттеулердің нәтижелеріне сәйкес ақпаратты түсінудің қолайлы шарттары үлкен экранды және пернетақталы сандық құрылғылармен қамтамасыз етілген [10]. Сонымен қатар, смартфон ақпараттың қол жетімділігін едәуір арттыра отырып, субъектінің оны өңдеуге когнитивті қатысуын төмендетуі мүмкін екендігі көрсетілген. Жоғарыда айтылғандар қазіргі заманғы жоғары білім беру үшін студенттердің қағаз және цифрлық ақпарат құралдарында ұсынылған ғылыми мәтіндерді түсінудегі қиындықтарды сараланған талдаудың өзектілігін анықтайды, өйткені білім беру процесінде «қағаз» және «сандық» мәтінмен жұмыс параметрлері арасындағы айырмашылықтарды ескеру, сөзсіз, цифрлық білім беру технологияларын қолдана отырып жүзеге асырылатын студенттердің оқу іс-әрекетінің тиімділігін арттырудың маңызды факторы болып табылады.

Түсіну құбылысын психологиялық талдау логикасында ол оны қамтамасыз ететін психикалық механизмдердің (ең алдымен есте сақтау, зейін және ойлау), сондай-ақ метакогнитивті реттеу механизмдерінің бірлігінде көрінеді [11], ғылыми мәтінді рефлексивті түрде түсінуге байланысты қиындықтарды студенттердің өздері мәтінмен өзара әрекеттесу субъектілері ретінде түсінудің әртүрлі сипаттамаларын өзін-өзі бағалауға сүйене отырып қарастырған жөн, сондай-ақ оларды бағалаудың объективті әдістерін қолдана отырып, атап айтқанда окулографияны қолдана отырып, көздің немесе оқушының қозғалысының әртүрлі параметрлерін тіркеу арқылы әр түрлі когнитивті сипаттауға мүмкіндік береді. қазіргі уақытта болып жатқан процестер [12]. Бүгінгі күні бұл әдіс тақырыптың мәтінмен визуалды өзара әрекеттесу сипаттамаларын талдау үшін сәтті қолданылады.

Студенттердің ғылыми мәтіндерді түсіну сипаттамаларын бағалау үшін окулографиялық әдістерді қолдану олардың нәтижелерінің студенттердің рефлексиялық дағдыларына тәуелділігіне байланысты осы мақсаттарда дәстүрлі түрде қолданылатын сауалнама әдістерінің шектеулерін жеңу тұрғысынан өте перспективалы болып көрінеді. Алайда, қазіргі зерттеушілер окулографиялық көрсеткіштерді когнитивті процестердің сипаттамаларымен байланыстыру арқылы "психологиялық" түсіндірудің күрделілігін айтады [13].

Алайда, бұл зерттеулерде окулографиялық параметрлер адамның әртүрлі визуалды ынталандырулармен (және міндетті емес мәтіндік) өзара әрекеттесуінде көрінетін когнитивті сипаттамаларының маркерлері ретінде қарастырылғанын және мәтіндерді, оның ішінде ғылыми мәтіндерді түсінудегі қиындықтардың корреляциясы ретінде талданбағанын ескереміз. Қазіргі студенттердің білім алу белсенділігінің ажырамас жағын құрайды. Бұл біздің зерттеуіміздің мақсатын анықтайды, ол студенттердің қағаз және цифрлық түрде ұсынылған ғылыми мәтінді түсінудегі қиындықтарды өзін-өзі бағалаудың осы мәтінді оқуды сипаттайтын әр-түрлі көрсеткіштермен байланысын анықтау болып табылады.

Зерттеу материалдары мен әдістері. Зерттеу екі мәселені шешуге бағытталған: 1) ғылыми мақаланың мәтінін түсінудегі қиындықтардың өзін-өзі бағалауы және мәтінді оқу процесінде бекітілген көз бен оқушының қозғалыс параметрлері қалай байланысты? 2) бұл қатынастар қағаз және цифрлық тасымалдағыштарда ұсынылған ғылыми мақала мәтінімен жұмыс істеу үшін әмбебап болып табыла ма? Зерттеу гипотезасы ғылыми мақаланы және жалпы окулографиялық көрсеткіштерді түсінудегі қиындықтарды өзін-

өзі бағалаудың өзара байланысы ақпаратпен визуалды өзара әрекеттесу кезінде әртүрлі когнитивтік функциялар мен көз қозғалысының параметрлерінің өзара байланысын сипаттайтын тенденцияларға сәйкес келеді, алайда цифрлық ортада ұсынылған мәтінмен жұмыс істегенде, бұл қатынастар оның процестерінің күрделенуіне байланысты күшейеді түсіну. Зерттеу эксперименттік сипатта болды. Күндізгі оқу нысанын дайындаудың психологиялық-педагогикалық бағыттарының кіші курс студенттері (N = 55, орташа жасы - 19,8 жас, қыздардың 92,7%) «Инженерлік және компьютерлік графика» оқу пәні шеңберінде оқуға ұсынылған ғылыми мақаланың мәтінімен танысуға тапсырма алды.

Студенттер зерттеуге ерікті ақпараттандырылған келісім негізінде қатысты. Оқу тапсырмасы мәртебесіне ие болмады және оқу тапсырмасы ретінде бағаланбады. 1918 сөзден тұратын мәтін 1 (n = 21) кіші топқа қағаз тасымалдағышта (A4 қағаз парақтарында басылған журнал беттерінің түпнұсқа форматында), 2 (n = 17) кіші топқа компьютер мониторының экранында (экран диагоналы – 17 дюйм, ажыратымдылығы – 1280×1024, құжат форматы – pdf) ұсынылды 3 (N = 17) – смартфон экранында (экран диагоналы – 6,67 дюйм, ажыратымдылығы 2340×1080, құжат пішімі – pdf) мәтінді шарлау мүмкіндігін қамтамасыз ететін курсорды басқаруға арналған пернетақтамен және құрылғымен жабдықталған.

Тапсырманы орындағаннан кейін жүргізілген сауалнама көрсеткендей, екі субъект ынталандырушы материал ретінде ұсынылған мақаланың мәтінімен таныс болған, нәтижесінде олардың нәтижелері одан әрі талдаудан алынып тасталды және мақаламен жұмыс істеген кіші топтардағы респонденттердің саны компьютерлік монитор мен смартфон экранынан әрқайсысы 16 адамға дейін қысқарды. Студенттердің ғылыми мәтінді түсінудегі қиындықтарын бағалау үшін Т.В. Борзова ұсынған тәсіл қолданылды [5], оның аясында сауалнама жасалды. Біздің зерттеуімізде белгілі бір ғылыми мәтінмен жұмыс істеу кезінде студенттердің қиындықтарын өзін-өзі бағалау туралы мәліметтер алуға мүмкіндік беретін сауалнаманың модификациясы қолданылды.

Модификация фокус-топтар әдісін қолдана отырып жүргізілді, оның барысында студенттер (N = 46, орта жас, жыныстық құрам, бағыт және оқыту кезеңі эксперименттік кіші топтардың сипаттамаларына ұқсас) түпнұсқа сауалнаманың тұжырымдамаларының түсінігіне өз бағаларын берді, сонымен қатар ғылыми мәтінді түсінудегі қиындықтардың субъективті тәжірибесін дәл көрсететін тұжырымдарды таңдады. Нәтижесінде тоғыз мәлімдемені қамтитын (кесте. 1) сауалнама жасалды. Студенттерге 5 балдық Ликерт шкаласы ұсынылған келісім дәрежесін бағалау үшін. Алынған деректерді факторизациялау жалпы дисперсиясы 66,9% болатын үш факторды анықтады: түсіну қиындықтары (1-фактор), есте сақтау қиындықтары (2-фактор) және шоғырлану қиындықтары (3-фактор). Әрбір факторды (тиісінше 0,87, 0,92 және 0,90 - Кронбах формуласы бойынша) құрайтын тармақтардың қанағаттанарлық келісімділігі әрбір факторға енгізілген бекітулер бойынша бағаларды (факторлық жүктемелер коэффициенттерінің белгілерін ескере отырып) жинақтау және одан әрі талдауда алынған жиынтық бағаларды пайдалану мүмкіндігін анықтады.

Кесте 1 - Қиындықтарды бағалау және ғылыми мәтінді түсіну үшін сауалнаманың факторлық құрылымы

Тұжырымдама	Фактор 1. Түсіну қиындықтары	Фактор 2. Есте сақтаудың қиындықтары	Фактор 3. Концентрация қиындықтары
1. Мен мәтінді түсінуде қиындықтарға тап болдым	0,73	0,37	0,23
2. Маған негізгі ойларды оқшаулау қиын болды	0,72	-0,02	0,38

3. Маған оқығанымды жүйелеу, құрылымдау қиын болды	0,76	0,10	0,40
4. Мақаланы оқығанда мен ойымды жинақтай алдым	-0,13	0,00	-0,53
5. Оқу барысында мен өзімнің ойымды жоғалтып алдым	0,34	-0,04	0,77
6. Мақаланы түсіну үшін бірнеше рет тармақты қайта оқуға тура келді	-0,03	0,35	0,60
7. Мен бұл мақаланың мазмұнын өте жылдам ұмытып кетуім мүмкін	0,22	0,83	0,06
8. Маған мақалада айтылған анықтамаларды, атаулар мен күндерді еске түсіру қиын болады	0,18	0,77	-0,06
9. Мен оқыған мақаланың мазмұнын өз сөзіммен айтып бере аламын	-0,79	-0,24	0,20
Дисперсия үлесі	0,28	0,20	0,18

Визуал өлшеу технологиясымен жұмыс істейтін pupil Labs компаниясының pupil core бинокулярлық көз трекер көзілдірігі пайдаланылды (бес калибрлеу нүктесін қолдайды; көз трекерінің жұмыс жиілігі - 200 Гц; дәлдік - 0,6 бұрыштық градус), оның көмегімен мәтіннің алғашқы екі беті бар қатысушылардың жұмысын сипаттайтын келесі параметрлер жазылды (15710-дан 3515 таңба): бекіту саны (абсолютті бірліктерде), бекітудің орташа ұзақтығы (миллисекундтарда), бекітудің ең ұзақ ұзақтығы (миллисекундтарда), жыпылықтау саны (абсолютті бірліктерде), оқушының диаметрі (пиксельмен), оқу уақыты (секундпен). Оқу процесінде мәтінді түсінудің әртүрлі сипаттамалары мен окулографиялық белсенділік параметрлерінің өзара байланысы туралы деректерді қорытындылай келе, мәтіннің қиындықтарының артуы фиксациялардың саны мен ұзақтығының, сондай-ақ саккадалардың санының артуымен қатар жүретінін атап өтуге болады [14].

Бұдан басқа, фиксациялардың ұзақтығын шоғырлану көрсеткіші ретінде, сондай-ақ субъект үшін олардың субъективті күрделілігін көрсететін когнитивті ынталандыруды өңдеуге қатысу дәрежесі ретінде қарастыруға болады [15]. Жоғары когнитивті жүктемені саккадалар санының, олардың жылдамдығы мен ұзындығының артуы да көрсетуі мүмкін, ал саккадалар жылдамдығының төмендеуі шаршау көрсеткіші ретінде түсіндірілуі мүмкін. Жалпы алғанда, саккадалардың аз болуы қарашық диаметрінің өзгеруі сияқты [16] неғұрлым айқын концентрациямен байланысты, сондай-ақ жыпылықтау санының азаюы [17].

Жыпылықтау жиілігінің жоғарылауы, керісінше, жыпылықтау жиілігін ағымдағы когнитивті жүктеме деңгейінің тікелей маркері ретінде қарастыруға мүмкіндік беретін төмен концентрацияны және жұмыс жадының жүктемесінің төмендеуін көрсетеді [18]. Нәтижелерді статистикалық өңдеу statistica10.0 бағдарламалық пакеті арқылы жүзеге асырылды және сипаттамалық статистиканы есептеуді қамтыды (M±s), салыстырмалы (Краскел – Уоллис критерийі, H; Манн – Уитни критерийі, U) және корреляциялық (Спирмен корреляция коэффициенті, rs) талдау.

Зерттеу нәтижелері. Бірінші кезеңде ғылыми мақаланың мәтінін түсінудегі қиындықтарды және мәтінді оқу процесінде бекітілген окулографиялық сипаттамаларды өзін-өзі бағалаудың өзара байланысы талданды (кесте 2).

Кесте 2 - Ғылыми мәтінді түсінудегі қиындықтарды сипаттайтын статистика, және оқу кезінде бекітілген окулографиялық сипаттамалар

Көрсеткіштер	M±s	1	2	3	4	5	6	7	8	9

1. Түсіну қиындықтары	10,67±3,95	1,00	0,35	0,46	0,08	-0,25	-0,20	-0,27	-0,11	-0,16
2. Есте сақтау қиындықтары	6,91±1,99		1,00	0,26	0,08	0,15	-0,25	-0,03	-0,06	-0,20
3. Концентрация қиындықтары	9,47±2,49			1,00	0,35	0,17	-0,13	0,10	-0,14	0,18
4. Фиксация саны	552,71±244,03				1,00	0,62	0,03	0,22	0,25	0,61
5. Фиксацияның орташа ұзақтығы	139,02±17,51					1,00	0,08	0,08	0,51	0,24
6. Фиксацияның үлкен ұзақтығы	248,26±71,03						1,00	0,07	-0,02	0,48
7. Көз қозғалу саны	23.23±22.06							1,00	-0,02	0,37
8. Қарашық диаметрі	21,83±4,95								1,00	0,01
9. Оқу уақыты	143,49±47,02									1,00

Ғылыми мақаланы оқу кезінде түсіну, есте сақтау және шоғырлану қиындықтарының өзін-өзі бағалау көрсеткіштерінің келтірілген мәндері (сәйкесінше 2,67, 3,44 және 3,15) студенттердің мәтінді есте сақтау және оған назар аудару қиындықтарын көбірек атап өтетінін көрсетеді, мәтінді түсінудегі қиындықтарды студенттер біршама азырақ деп бағалайды. Мәтінді түсінудегі қиындықтардың өзін-өзі бағалау кешенінің және оқу уақытын, бекіту санын, бекітудің ең ұзақ ұзақтығын және жыпылықтау санын қамтитын окулографиялық сипаттамалар кешенінің теріс байланысы тіркелді. Факторлық талдау нәтижесінде бөлінген ғылыми мәтінді түсінудегі қиындықтардың көрсеткіштері әдебиетте көрсетілген түсінудің негізгі когнитивті механизмдеріне (есте сақтау, зейін, ойлау)сәйкес келетіндігін атап өтеміз, бұл түсіну субъектісі оны қамтамасыз ететін барлық психикалық процестердің орталығы болып табылады деген тезисті растайды [19].

Сауалнама үшін талаптарды таңдау студенттердің фокус-топтарының нәтижелерін талдау негізінде жүзеге асырылғанын ескере отырып, студенттер когнитивті сипатқа ие ғылыми мәтінді түсінудегі ықтимал қиындықтардың құрылымын дәл көрсетеді деп айтуға болады. Сонымен қатар, мақалада келтірілген ақпаратты есте сақтаумен байланысты қиындықтарды студенттер шоғырлану тапшылығында көрінетін қиындықтармен салыстырғанда, әсіресе мәтіннің негізгі идеяларын оқшаулау мен ассимиляциялаудағы қиындықтармен салыстырғанда анағұрлым айқын деп бағалайды. Сонымен қатар, бұл түсіну қиындықтарының көрсеткіші, бір жағынан, ғылыми мәтінді түсінудің әртүрлі аспектілерін сипаттайтын көрсеткіштер кешені үшін жүйе құрушы, екінші жағынан, оларды оқу уақыты, фиксациялар саны, фиксациялардың ең ұзақ ұзақтығы және жыпылықтау саны сияқты окулографиялық сипаттамалармен тікелей және жанама теріс қатынастармен байланыстырады. Бұл деректер ғылыми мәтінді түсінудегі қиындықтардың ең үлкен субъективті ауырлығы мәтінді тез оқыған студенттерге тән екенін көрсетеді, сонымен бірге жыпылықтау мен бекітудің ең аз санын, сондай-ақ бекітудің ең аз ұзақтығын көрсетеді.

Окулографиялық көрсеткіштер ғылыми мақаланың мәтінін түсінудегі қиындықтарды, ең алдымен, оқу процесінде шоғырланудың жеткіліксіздігі және когнитивті жүктеменің төмендігі нәтижесінде түсіндіруге мүмкіндік береді. Ғылыми мәтінмен жұмыс істеу жағдайында оқу уақытының қысқаруы оны көрсетудің синтетикалық әдісін көрсетпейді, бұл жеке сөздер мен сөйлемдерді оқығанда «уақытты үнемдеуге» мүмкіндік береді, бірақ оны түсінудің тереңдігі жеткіліксіз [20]. Жалпы, бұл студенттердің ғылыми мақаланы түсінудегі қиындықтардың әмбебап себебі, мәтінмен жұмыс істеуге когнитивті қатысудың жеткіліксіздігі деген қорытынды жасауға

мүмкіндік береді. Зерттеудің екінші кезеңінде мәтінді түсінудегі қиындықтар көрсеткіштеріне және оқу процесін сипаттайтын окулографиялық көрсеткіштерге салыстырмалы талдау жүргізілді, олар әртүрлі ақпарат құралдарында ұсынылған мәтіндермен жұмыс істейтін субъектілердің кіші топтарында алынды, сондай-ақ осы кіші топтарда алынған корреляциялық қатынастар талданады (кесте 3).

Кіші топтар арасындағы сенімді айырмашылықтар мақаланың мәтінін түсінудегі қиындықтардың көрсеткіштері бойынша жазылады, мысалы, есте сақтау қиындықтары және шоғырлану қиындықтары, олар компьютер мониторының экранында ұсынылған мәтінмен жұмыс істейтін студенттердің кіші тобында ең жоғары және смартфон экранынан мәтінді оқыған студенттердің кіші тобында ең төмен болып шықты. Жұптық салыстыру қағаз мәтінімен және компьютер мониторының экранында ұсынылған мәтінмен жұмыс істейтін кіші топтар арасында осы көрсеткіштер бойынша айтарлықтай айырмашылықтардың жоқтығын тіркеуге мүмкіндік берді ($p > 0,05$), сондай-ақ осы кіші топтар мен смартфонды пайдаланған кіші топ арасындағы сенімді айырмашылықтарды тіркеуге мүмкіндік берді ($68,0 \leq u \leq 107,0$ кезінде $p \leq 0,05$).

Кесте 3 - Топтарда мәтінді түсіну көрсеткіштерінің статистикасы және әр түрлі мәтін құралдарымен ұсынылған оқудың окулографиялық сипаттамалары.

Көрсеткіштер	1-жарты топ (қағаздағы мәтін), M±s	2-жарты топ (компьютердегі мәтін), M±s	3-жарты топ (смартфондағы мәтін), M±s	H
Түсіну қиындықтары	11,52+4,61	10,35+3,35	9,94+3,65	-
Есте сақтау қиындықтары	7,19+1,99	7,65+1,80	5,82+1,81	7,93
Концентрация қиындықтары	9,86+2,10	10,18+1,94	8,29+3,08	6,95
Фиксация саны	521,71+208,87	678,53+213,54	465,18+273,19	8,58
Фиксацияның орташа ұзақтығы	135,44+15,59	146,57+20,35	135,90+15,13	-
Фиксацияның үлкен ұзақтығы	228,86+30,05	227,52+31,30	292,96+108,84	6,21
Көз қозғалу саны	29,43+28,95	20,71+15,15	18,06+16,75	-
Қарашық диаметрі	20,98+6,32	23,06+5,00	21,64+2,31	-
Оқу уақыты	139,19+53,98	145,88+41,94	146,41+44,96	-

Алайда статистикалық маңыздылық деңгейіне жетпеген ұқсас тенденция мәтінді түсінудегі қиындықтардың көрсеткіші үшін де тіркелді. Бұл деректер смартфонды ғылыми мақаланы оқығанда ақпарат тасымалдаушысы ретінде пайдалану оны түсінудегі субъективті қиындықтардың төмендеуіне ықпал ететінін көрсетеді, бұл когнитивті қатысудың аздығына және ғылыми мақаланың мәтіні смартфон экранында ұсынылған студенттердің оқудың когнитивті және метакогнитивті реттелуіне байланысты болуы мүмкін. Бұл болжам ішінара корреляциялық талдау нәтижелерінің арқасында расталды.

Қағаз тасығышта ұсынылған мақаламен жұмыс істеген студенттердің кіші тобында алынған қатынастардың құрылымы жалпы іріктеме материалынан алынғанға ұқсас: бір жағынан ғылыми мақаланы түсінудегі қиындықтарды сипаттайтын көрсеткіштер кешені арасында, екінші жағынан оқу уақыты мен бекіту ұзақтығының көрсеткіштерімен теріс байланыстар табылды. Компьютер мониторының экранында ұсынылған мақаламен жұмыс істейтін студенттердің кіші тобында мәтінді түсінудегі қиындықтар көрсеткіштері, оқу уақыты мен бекіту ұзақтығы арасындағы байланыстар, керісінше, оң болды. Смартфонды пайдаланған студенттердің кіші тобында мәтінді түсінудегі қиындықтар мен оқудың окулографиялық сипаттамалары арасында статистикалық маңызды байланыстар табылған жоқ. Қағаз тасымалдаушымен және компьютер мониторының экранымен жұмыс істейтін студенттердің кіші топтарында кездесетін қатынастардың сипатындағы айырмашылықтардың артында метакогнитивті реттеудің айқын тенденциясы жатыр деп болжауға болады, оның компьютерді білім беру қызметі

құралы ретінде пайдалану кезіндегі маңыздылығын студенттер гипермәтінмен өзара әрекеттесу дағдыларының ауысуына байланысты түсінуі мүмкін, сызықтық мәтінді оқу үшін монитор экранымен өзара әрекеттесу жағдайына тән. Бұл тұрғыда фиксациялардың ұзаруы зейінді шоғырландырудың ерікті күш-жігерін көрсетуі мүмкін түсінудегі қандай да бір қиындықтар туралы хабардар болған жағдайда оқылатын ғылыми мақаланың мәтінінде және жалпы оқу уақытының ұлғаюы мәтінмен жұмыс істеу кезінде анағұрлым айқын аналитиканы көрсетуі мүмкін.

Смартфонды пайдаланған студенттердің кіші тобында маңызды корреляцияның болмауы, өз кезегінде, смартфон экранынан ғылыми мақаланы оқудың бірыңғай «визуалды-графиялық портретінің» болмауы ретінде түсіндірілуі мүмкін, бұл студенттердің жеке психофизиологиялық сипаттамаларының маңызды үлесіне байланысты болуы мүмкін. Смартфонды оқу әрекетінің құралы ретінде пайдаланудың тиімді стратегияларын таңдау [21]. Нәтижелерді қорытындылай келе, смартфонды жұмыс үшін пайдаланған студенттердің ғылыми мақаланы түсінудегі субъективті қиындықтардың төмен бағалары осы құрылғымен жұмыс істеуге тән мәтінге аз шоғырланумен байланысты түсінудің төмен тереңдігін көрсетеді деп болжауға болады, бұл басқа кіші топтармен салыстырғанда сенімді түрде төмен., саны олардың ұзақтығының айқын біркелкіонестігі аясында бекітулер.

Қорытынды. Қорытындылай келе, студенттердің қағаз және цифрлық медиада ұсынылған ғылыми мәтінді түсінудегі қиындықтарды өзін-өзі бағалаудың осы мәтінді оқуды сипаттайтын окулографиялық көрсеткіштермен өзара байланысын жалпылау. Студенттердің ғылыми мақаланың мәтінін түсінудегі қиындықтардың үш түрі анықталды: материалды түсінудегі қиындықтар, оны есте сақтаудағы қиындықтар, сондай-ақ түсінудің негізгі когнитивті механизмдерін (тиісінше ойлау, есте сақтау және зейін) көрсететін шоғырлану қиындықтары.

Ғылыми мәтінді түсінудегі қиындықтардың анықталған түрлері бір-бірімен тығыз байланысты және дифференциалданбаған талдау жағдайында (ақпарат тасымалдаушысының сипатын ескермей) мақала материалына жеткіліксіз шоғырлануды және оны өңдеуге когнитивті қатысудың төмендігін көрсететін окулографиялық көрсеткіштермен өзара байланысты екендігі анықталды (оқу уақыты, бекіту саны, бекітудің ең ұзақ ұзақтығы және жыпылықтау саны). Мақала ұсынылған тасымалдаушыны ескере отырып, кейінгі талдау сипатталған тенденциялар қағаз тасығышта ұсынылған мақала мәтінімен жұмыс істеу кезінде толығымен қайталанатынын көрсетті.

Дегенмен, компьютер мониторының экранында ұсынылған мақаламен жұмыс істеу кезінде айтарлықтай өзгерістер орын алады: бұл жағдайда, керісінше, түсінудегі субъективті қиындықтар мәтінмен жұмыс істеуге когнитивті қатысуды және оған назар аударуды көрсететін окулографиялық көрсеткіштермен байланысты, бұл жүзеге асырылатын білім беру қызметін когнитивті және метакогнитивті реттеуге неғұрлым айқын тенденциялардың көрінісі ретінде түсіндірілді үлкен мониторы, пернетақтасы және курсорды басқару құрылғысы бар сандық құрылғыны пайдалану. Зерттеуде табылған мақаланы түсінудегі қиындықтар көрсеткіштерінің және оның мәтінін смартфон экранынан оқудың окулографиялық сипаттамаларының өзара байланысының болмауы, біздің көзқарасымыз бойынша, смартфонды қолданатын студенттердің ақпаратты когнитивті өңдеу стратегияларының әртүрлілігін көрсетеді, алайда бұл мәтінге шоғырланудың төмендеген және біркелкі емес қарқындылығы аясында жүреді және оны түсінудегі қиындықтарды бағаламаумен бірге жүреді. Осылайша, ғылыми мақаланы және окулографиялық көрсеткіштерді түсінудегі қиындықтарды өзін-өзі бағалаудың өзара байланысы ақпаратпен визуалды өзара әрекеттесу кезінде әртүрлі когнитивті функциялар мен көз қозғалысы параметрлерінің өзара байланысын сипаттайтын тенденцияларға сәйкес келеді деген гипотеза біздің зерттеуімізде растауды

тапты. Алайда, цифрлық түрде ұсынылған мәтінмен жұмыс істеген жағдайда, бұл қатынастар оны түсіну процестерінің күрделенуіне байланысты күшейеді деген гипотеза жоққа шығарылды, бұл студенттердің қағаз және цифрлық медиада ұсынылған ғылыми мақала мәтінімен жұмыс істеу стратегиясындағы айырмашылықтар туралы болжам жасауға мүмкіндік берді. Студенттердің әртүрлі ақпарат құралдарында ұсынылған ғылыми мақала мәтінімен өзара әрекеттесуінің процессуалдық сипаттамаларын талдауды қажет ететін бұл болжамды тексеру әрі қарайғы зерттеулердің перспективалық бағытын құрайды.

Мақалада ұсынылған зерттеу, әрине, бірқатар шектеулерге ие, олардың негізгілері ғылыми мақаланы түсінудегі қиындықтарды бағалау үшін қолданылатын сауалнаманы психометриялық тексерудің толық проверкистігімен, мәтінмен жұмыс кезінде окулографиялық сипаттамалардың динамикасы туралы деректердің болмауымен байланысты ынталандырушы мәтіннің мазмұндық біртектілігі (студенттер өздерінің білім беру бағыты үшін әлеуметтік-гуманитарлық бағыттағы бейіндік мәтінді оқыды, білімнің басқа салаларындағы ғылыми мақалалар қолданылмады) және экспериментке қатысуға психолог студенттерді тарту, олар когнитивті және метакогнитивті реттеу дағдыларының кәсіби ерекшелігімен сипатталуы мүмкін. Сонымен қатар, цифрлық медиада ғылыми мақаламен жұмыс істеген студенттер мәтінді офлайн форматта алғанын атап өткен жөн, бұл цифрлық құрылғыларды пайдалану жағдайында ең тән ғылыми мәтіндермен онлайн өзара әрекеттесуге тән қосымша визуалды жүктемені алып тастады. Сонымен бірге, біздің ойымызша, алынған мәліметтер студенттердің ғылыми мәтіндерді түсінуінің психологиялық механизмдерін зерттеу үшін де, студенттердің білім беру белсенділігі аясында маңызды ақпарат тасымалдаушысы ретінде әртүрлі цифрлық құрылғылардың мүмкіндіктері мен шектеулерін бағалау үшін де маңызды.

РЕЗЮМЕ

В статье рассматривается проблема качества понимания студентами научного текста, представленного в традиционном формате, а также на экране монитора компьютера и смартфона. Целью исследования является выявление взаимосвязи самооценки студентов в понимании научного текста, представленного на бумаге и цифровых носителях, и трудностей в понимании графических показателей, характеризующих чтение этого текста. В экспериментальном исследовании приняли участие 53 студента, разделенные на три подгруппы: прочитали текст научной статьи на бумажном носителе, мониторе компьютера и экране смартфона. Графические характеристики были подтверждены бинокулярным трекером глаз Pupil Core. Оценка трудностей в понимании учебного текста осуществлялась с помощью авторской модификации анкеты Т.В. Борзовой «понимание научного текста». Существует три вида затруднений в понимании студентами текста научной статьи: трудности с пониманием материала, трудности с запоминанием, трудности с концентрацией внимания. При анализе данных, полученных в группе студентов, работавших с бумажным носителем, выявлены отрицательные связи показателей затруднений в понимании текстовых и графических характеристик, что свидетельствует о концентрации внимания на материале статьи и когнитивном участии в ее обработке. Субъективные трудности в понимании при работе со статьей, представленной на экране монитора компьютера, положительно связаны с показателями, связанными с когнитивным участием в работе с текстом и вниманием к нему. При чтении с экрана смартфона наблюдается разнообразие стратегий когнитивной обработки информации на фоне снижения концентрации внимания на тексте статьи и недооценки трудностей в ее понимании. Авторы делают вывод, что различия в стратегиях когнитивной обработки информации при работе с текстом научной статьи, представленной на бумажном носителе, на экране монитора компьютера и на экране смартфона, опосредуют успешность усвоения материала.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Antonelli M., Donelli D. Reading and understanding scientific articles // The Clinical Teacher. – 2020. – Vol. 17 (6). – P. 612–616. DOI: https://doi.org/10.1111/tct.13159

2. Katz J., Smolyn J. Becoming Scientifically Literate: Developing Epistemic Practices Through Reading Scientific Papers // The Science Teacher. – 2024. – Vol. 91 (1). – P. 58–63. URL: https://my.nsta.org/resource/130754 DOI: https://doi.org/10.1080/00368555.2023.2292336

3. Jannah F., Ni'mah M., Hasanah S. An Analysis of Student's Reading Interest in Scientific Article // Journey: Journal of English Language and Pedagogy. – 2023. – Vol. 6 (1). – P. 178–184. DOI: https://doi.org/10.33503/journey.v6i1.2646

4. Sujaini H., Safriadi N., Khairiyah D. System interactive reader using eye-tracker technology in ebook reader // Bulletin of Electrical Engineering and Informatics. – 2024. – Vol. 13 (3). – P. 1676–1684. DOI: https://doi.org/10.11591/eei.v13i3.5877

5. Borzova T. V., Mosunova L. A. Conditions for the development of semantic understanding of information in the learning process // Science for Education Today. – 2020. – № 1. – S. 7–24. DOI: http://dx.doi.org/10.15293/2658-6762.2001.01

6. Andrew M., Taylorson J., Langille D. J., Grange A., Williams N. Student attitudes towards technology and their preferences for learning tools/devices at two universities in the UAE // Journal of Information Technology Education: Research. – 2018. – Vol. 17. – P. 309–344. DOI: https://doi.org/10.28945/4111

7. Strzelecki A. Eye-tracking studies of web search engines: A systematic literature review // Information (Switzerland). – 2020. – Vol. 11 (6). – P. 300. DOI: https://doi.org/10.3390/INFO11060300

8. Andrei E. Adolescent English Learners' Use of Digital Technology in the Classroom // Educational Forum. – 2018. – Vol. 83 (1). – P. 102–120. DOI: https://doi.org/10.1080/00131725.2018.1478474

9. McGray H. G., Tour E., Tsang T. K. Helping Students to Metacognitively Read Scientific Literature With Talking to the Text // CourseSource. – 2023. – Vol. 10. – P. 28. DOI: https://doi.org/10.24918/cs.2023.28

10. Xie Y. Wang J., Li S., Zheng Y. Research on the influence path of metacognitive reading strategies on scientific literacy // Journal of Intelligence. – 2023. – Vol. 11 (5). – P. 78. DOI: https://doi.org/10.3390/jintelligence11050078

11. Vajs I., Papić T., Ković V., Savić A. M., Janković M. M. Accessible Dyslexia Detection with RealTime Reading Feedback through Robust Interpretable Eye-Tracking Features // Brain Sciences. – 2023. – Vol. 13 (3). – P. 405. DOI: https://doi.org/10.3390/brainsci13030405

12. El Hmimdi A. E., Kapoula Z., Sainte Fare Garnot V. Deep learning-based detection of learning disorders on a large-scale dataset of eye movement records // BioMedInformatics. – 2024. – Vol. 4 (1). – P. 519–541. DOI: https://doi.org/10.3390/biomedinformatics4010029

13. Ktistakis E., Gleni A., Tsilimbaris M. K., Plainis S. Comparing silent reading performance for single sentences and paragraphs: an eye movement-based analysis // Clinical and Experimental Optometry. – 2023. – Vol. 107 (4). – P. 449–456. DOI: https://doi.org/10.1080/08164622.2023.2237974

14. Miller B. W. Using Reading Times and Eye-Movements to Measure Cognitive Engagement // Educational Psychologist. – 2015. – Vol. 50 (1). – P. 31–42. DOI: https://doi.org/10.1080/00461520.2015.1004068

15. Zivan M., Horowitz-Kraus T. Parent—child joint reading is related to an increased fixation time on print during storytelling among preschool children // Brain and Cognition. – 2020. – Vol. 143. – P. 105596. DOI: https://doi.org/10.1016/j.bandc.2020.105596

16. Molina R., Redondo B., Vera J., García J. A., Muñoz-Hoyos A., Jiménez R. Children with Attentiondeficit/Hyperactivity Disorder Show an Altered Eye Movement Pattern during Reading // Optometry and Vision Science. – 2020. – Vol. 97 (4). – P. 265–274. DOI: https://doi.org/10.1097/OPX.0000000000001498

17. Hauschild K. M., Pomales-Ramos A., Strauss M. S. The visual array task: A novel gaze-based measure of object label and category knowledge // Development Science. – 2021. – Vol. 24 (2). – P. e13015. DOI: https://doi.org/10.1111/desc.13015

18. Vargas-Cuentas N. I., Roman-Gonzalez A., Gilman R. H., Barrientos F., Ting J., Hidalgo D., Jensen K., Zimic M. Developing an eye-tracking algorithm as a potential tool for early diagnosis of autism spectrum disorder in children // PLoS One. – 2017. – Vol. 12 (11). – P. e0188826. DOI: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0188826

19. Viglione A., Mazziotti R., Pizzorusso T. From pupil to the brain: New insights for studying cortical plasticity through pupillometry // Frontiers in Neural Circuits. – 2023. – Vol. 17. – P. 1151847. DOI: https://doi.org/10.3389/fncir.2023.1151847

20. Smilek D., Carriere J. S., Cheyne J. A. Out of Mind, Out of Sight Eye Blinking as Indicator and Embodiment of Mind Wandering // Psychological Science. – 2010. – Vol. 21 (6). – P. 786–789. DOI: https://doi.org/10.1177/0956797610368063

21. Yoo K., Ahn J., Lee S.-H. The confounding effects of eye blinking on pupillometry, and their remedy // PLoS One. – 2021. – Vol. 16 (12). – P. e0261463. DOI: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0261463

REFERENCES

1. Antonelli M., Donelli D. Reading and understanding scientific articles // The Clinical Teacher. – 2020. – Vol. 17 (6). – P. 612–616. DOI: https://doi.org/10.1111/tct.13159

2. Katz J., Smolyn J. Becoming Scientifically Literate: Developing Epistemic Practices Through Reading Scientific Papers // The Science Teacher. – 2024. – Vol. 91 (1). – P. 58–63. URL: https://my.nsta.org/resource/130754 DOI: https://doi.org/10.1080/00368555.2023.2292336

3. Jannah F., Ni'mah M., Hasanah S. An Analysis of Student's Reading Interest in Scientific Article // Journey: Journal of English Language and Pedagogy. – 2023. – Vol. 6 (1). – P. 178–184. DOI: https://doi.org/10.33503/journey.v6i1.2646

4. Sujaini H., Safriadi N., Khairiyah D. System interactive reader using eye-tracker technology in ebook reader // Bulletin of Electrical Engineering and Informatics. – 2024. – Vol. 13 (3). – P. 1676–1684. DOI: https://doi.org/10.11591/eei.v13i3.5877

5. Borzova T. V., Mosunova L. A. Conditions for the development of semantic understanding of information in the learning process // Science for Education Today. – 2020. – № 1. – S. 7–24. DOI: http://dx.doi.org/10.15293/2658-6762.2001.01

6. Andrew M., Taylorson J., Langille D. J., Grange A., Williams N. Student attitudes towards technology and their preferences for learning tools/devices at two universities in the UAE // Journal of Information Technology Education: Research. – 2018. – Vol. 17. – P. 309–344. DOI: https://doi.org/10.28945/4111

7. Strzelecki A. Eye-tracking studies of web search engines: A systematic literature review // Information (Switzerland). – 2020. – Vol. 11 (6). – P. 300. DOI: https://doi.org/10.3390/INFO11060300

8. Andrei E. Adolescent English Learners' Use of Digital Technology in the Classroom // Educational Forum. – 2018. – Vol. 83 (1). – P. 102–120. DOI: https://doi.org/10.1080/00131725.2018.1478474

9. McGray H. G., Tour E., Tsang T. K. Helping Students to Metacognitively Read Scientific Literature With Talking to the Text // CourseSource. – 2023. – Vol. 10. – P. 28. DOI: https://doi.org/10.24918/cs.2023.28

10. Xie Y. Wang J., Li S., Zheng Y. Research on the influence path of metacognitive reading strategies on scientific literacy // Journal of Intelligence. – 2023. – Vol. 11 (5). – P. 78. DOI: https://doi.org/10.3390/jintelligence11050078

11. Vajs I., Papić T., Ković V., Savić A. M., Janković M. M. Accessible Dyslexia Detection with RealTime Reading Feedback through Robust Interpretable Eye-Tracking Features // Brain Sciences. – 2023. – Vol. 13 (3). – P. 405. DOI: https://doi.org/10.3390/brainsci13030405

12. El Hmimdi A. E., Kapoula Z., Sainte Fare Garnot V. Deep learning-based detection of learning disorders on a large-scale dataset of eye movement records // BioMedInformatics. – 2024. – Vol. 4 (1). – P. 519–541. DOI: https://doi.org/10.3390/biomedinformatics4010029

13. Ktistakis E., Gleni A., Tsilimbaris M. K., Plainis S. Comparing silent reading performance for single sentences and paragraphs: an eye movement-based analysis // Clinical and Experimental Optometry. – 2023. – Vol. 107 (4). – P. 449–456. DOI: https://doi.org/10.1080/08164622.2023.2237974

14. Miller B. W. Using Reading Times and Eye-Movements to Measure Cognitive Engagement // Educational Psychologist. – 2015. – Vol. 50 (1). – P. 31–42. DOI: https://doi.org/10.1080/00461520.2015.1004068

15. Zivan M., Horowitz-Kraus T. Parent—child joint reading is related to an increased fixation time on print during storytelling among preschool children // Brain and Cognition. – 2020. – Vol. 143. – P. 105596. DOI: https://doi.org/10.1016/j.bandc.2020.105596

16. Molina R., Redondo B., Vera J., García J. A., Muñoz-Hoyos A., Jiménez R. Children with Attentiondeficit/Hyperactivity Disorder Show an Altered Eye Movement Pattern during Reading // Optometry and Vision Science. – 2020. – Vol. 97 (4). – P. 265–274. DOI: https://doi.org/10.1097/OPX.0000000000001498

17. Hauschild K. M., Pomales-Ramos A., Strauss M. S. The visual array task: A novel gaze-based measure of object label and category knowledge // Development Science. – 2021. – Vol. 24 (2). – P. e13015. DOI: https://doi.org/10.1111/desc.13015

18. Vargas-Cuentas N. I., Roman-Gonzalez A., Gilman R. H., Barrientos F., Ting J., Hidalgo D., Jensen K., Zimic M. Developing an eye-tracking algorithm as a potential tool for early diagnosis of autism spectrum disorder in children // PLoS One. – 2017. – Vol. 12 (11). – P. e0188826. DOI: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0188826

19. Viglione A., Mazziotti R., Pizzorusso T. From pupil to the brain: New insights for studying cortical plasticity through pupillometry // Frontiers in Neural Circuits. – 2023. – Vol. 17. – P. 1151847. DOI: https://doi.org/10.3389/fncir.2023.1151847

20. Smilek D., Carriere J. S., Cheyne J. A. Out of Mind, Out of Sight Eye Blinking as Indicator and Embodiment of Mind Wandering // Psychological Science. – 2010. – Vol. 21 (6). – P. 786–789. DOI: https://doi.org/10.1177/0956797610368063

21. Yoo K., Ahn J., Lee S.-H. The confounding effects of eye blinking on pupillometry, and their remedy // PLoS One. – 2021. – Vol. 16 (12). – P. e0261463. DOI: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0261463

УДК 331.4
МРНТИ 86.21

Курмашева Г.Р., магистр технических наук, https://orcid.org/0009-0004-5824-2421
НАО «Западно-Казахстанский аграрно-технический университет имени Жангир хана», г. Уральск, ул. Жангир хана 51, 090009, Казахстан, kurmasheva_gulshat@mail.ru
Kurmasheva G., master of technical sciences, https://orcid.org/0009-0004-5824-2421
NJSC «West Kazakhstan Agrarian and Technical University named after Zhangir khan», Uralsk, st. Zhangir khan 51, 090009, Kazakhstan, kurmasheva_gulshat@mail.ru

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ ШУМА НА РАБОЧИХ МЕСТАХ ТОО «УРАЛЬСКИЙ ТРАНСФОРМАТОРНЫЙ ЗАВОД»
HYGIENIC ASSESSMENT OF NOISE EXPOSURE IN THE WORKPLACE URAL TRANSFORMER PLANT LLP

АННОТАЦИЯ

В статье представлены результаты гигиенической оценки влияния шума на рабочих местах трансформаторного завода. Цель исследования заключалась в определении уровней шума на различных этапах производства трансформаторов и его оценке по влиянию на здоровье работников. Проведен анализ основных источников шума, включающий работающее оборудование (прессы, станки, сварочные аппараты) и технологические процессы. Инструментальные измерения уровней звука осуществлялись на рабочих местах основных профессий: слесарей, сварщиков, электромонтеров. На ряде рабочих мест выявлено превышение предельно допустимых уровней (ПДУ) шума; значительные превышения ПДУ шума были зарегистрированы на нескольких рабочих участках. Максимальные значения уровня шума до 100-105 дБ(А), что значительно выше установленных санитарными нормами 80 дБ(А) зафиксированы на механической обработке, где работают прессы для штамповки металлических деталей. Представлена оценка риска развития профессиональной тугоухости; разработаны и предложены мероприятия по снижению уровня шума: инженерно-технические решения, административные меры и использование средств индивидуальной защиты. Результаты исследования могут быть применены для улучшения условий труда на трансформаторных заводах и уменьшения профессиональной заболеваемости, связанной с воздействием шума.

ANNOTATION

The article presents the results of a hygienic assessment of the impact of noise on the workplaces of a transformer plant. The purpose of the study was to determine the noise levels at various stages of transformer production and to assess its impact on the health of workers. The analysis of the main noise sources, including operating equipment (presses, machine tools, welding machines) and technological processes, is carried out. Instrumental measurements of sound levels were carried out at the workplaces of the main professions: locksmiths, welders, electricians. An excess of the maximum permissible noise levels (MPD) was detected at a number of workplaces; significant exceedances of the noise control were recorded at several work sites. The maximum noise levels of up to 100-105 dB(A), which is significantly higher than the 80 dB(A) established by sanitary standards, are recorded in mechanical processing, where presses for stamping metal parts operate. An assessment of the risk of developing occupational hearing loss is presented; Noise reduction measures have been developed and proposed: engineering and technical solutions, administrative measures and the use of personal protective equipment. The results of the study can be applied to improve working conditions at transformer plants and reduce occupational morbidity associated with noise exposure.

Ключевые слова: *шум, гигиеническая оценка, рабочие места, профессиональная тугоухость, предельно допустимый уровень.*

Keywords: *noise, hygienic assessment, workplaces, occupational hearing loss, maximum permissible level.*

Введение. Воздействие шума на рабочих местах является серьезной и актуальной проблемой в современной промышленности, требующей неотложного внимания. В машиностроительной отрасли, особенно на предприятиях, связанных с трансформаторным производством, проблема производственного шума стоит особенно

остро, и это связано со спецификой технологических процессов и использованием шумного оборудования [1; 2, стр. 145]. Производство трансформаторов является важной отраслью электротехнической промышленности, однако технологический процесс производства трансформаторов неразрывно связан с использованием шумного оборудования, что создаёт неблагоприятные условия труда для работников.

Современные научные исследования свидетельствуют о том, что воздействие повышенного уровня шума негативно сказывается на функционировании практически всех систем организма человека. В первую очередь страдают такие важные системы, как центральная нервная, сердечно-сосудистая и иммунная системы [3]. Длительное воздействие интенсивного шума может стать причиной развития профессиональных заболеваний, в том числе профессиональной тугоухости [4, 5].

На психологическом уровне воздействие шума может существенно негативно сказываться на благополучии и эффективности труда сотрудников. Постоянный или прерывистый шум на рабочем месте способен стать причиной стрессовых состояний, раздражительности и ухудшения эмоционального фона. Это, в свою очередь, приводит к снижению уровня концентрации, ухудшению когнитивных функций и общему падению производительности труда. В подобной среде работники могут испытывать трудности при выполнении задач, требующих повышенного внимания и точности, что, к сожалению, увеличивает вероятность возникновения производственных ошибок и несчастных случаев.

Влияние шума на работников носит не только индивидуальный, но и социально-экономический характер, что подчеркивает значимость данной проблемы. Повышенный уровень шума может стать причиной роста числа случаев временной нетрудоспособности сотрудников, которые нуждаются в восстановлении после шумового стресса или связанных с ним заболеваний. Это влечёт за собой увеличение затрат для предприятий, что, безусловно, может негативно сказаться на общей производительности и эффективности их деятельности. Таким образом, проблема шума на производстве выходит за рамки вопросов охраны труда и здоровья, охватывая также важные аспекты экономической эффективности и устойчивости бизнеса [6].

Многочисленным исследованиям как отечественных, так и зарубежных учёных установлено, что до 80% промышленных аварий обусловлены человеческим фактором, что, безусловно, настораживает. Превышение допустимых уровней производственного шума часто приводит к ошибкам в ходе выполнения технологических процессов, что может, повлечь за собой значительные материальные убытки и человеческие жертвы [7].

Актуальность настоящего исследования обусловлена необходимостью обеспечения охраны здоровья работников ТОО «Уральский трансформаторный завод», что является одним из основных прав граждан Республики Казахстан, гарантированных Кодексом о здоровье (статья 80) [8]. В соответствии со статьей 182 Трудового кодекса Республики Казахстан работодатель несет ответственность за обеспечение безопасности и охраны труда на рабочих местах, включая проведение необходимых мероприятий по снижению воздействия вредных производственных факторов, таких как шум [9].

Целью данного исследования является гигиеническая оценка воздействия шума на рабочих местах ТОО «Уральский трансформаторный завод» для определения соответствия условий труда требованиям трудового законодательства и разработки рекомендаций по снижению шума и сохранению здоровья работников.

Нормирование шума направлено на определение научно обоснованных предельно-допустимых уровней шума на рабочих местах. Эти уровни должны исключать риск развития заболеваний у работников при ежедневном воздействии в течение стандарного восьмичасового рабочего дня [10, с. 26; 11, с. 19].

Основная цель нормирования шума на рабочих местах — установление предельно допустимого уровня шума (ПДУ), который при ежедневной работе по будням, но не

более 40 часов в неделю за время всего трудового стажа, должен исключать заболеваний или отклонений в состоянии здоровья, обнаруживаемых современными методами исследований как во время работы, так и на отдаленные сроки жизни текущих и будущих поколений.

Допустимый уровень шума — это такой уровень, который не вызывает у человека значительного беспокойства и существенных изменений показателей функционального состояния систем организма и анализаторов, чувствительных к шуму.

Предельно допустимые уровни шума на рабочих местах регламентированы Санитарными правилами и нормативами (Гигиеническими нормами). Если работник подвергается воздействию шума, превышающего 80 дБА, в течение короткого времени, необходимо корректировать допустимый уровень шума с учетом санитарных норм [12, 13, 14].

Материалы и методы исследования. Объектом данного исследования стали рабочие места ТОО «Уральский трансформаторный завод», которые расположены в различных участках производственной мощности, а именно в сборочном цехе, на сварочном участке и на участке механической обработки.

В качестве материалов исследования использованы разнообразные источники, вллючая:

- Нормативно-правовые акты Республики Казахстан, касающиеся охраны труда и производственной санитарии, котроые содержать требования к допустимым уровням шума на рабочих местах, что является основополагающим для обеспечения безопасных условий труда;

- Научная литература и публикации в рецензируемых журналах, которые освещают темы, связанные с гигиенической оценкой шума на производстве, а также профилактикой профессиональной тугоухости;

- Результаты инструментальных измерений уровней звука на рабочих местах.

В ходе исследования были применены следующие методы:

- Анализ и обобщение литературных данных и нормативной документации;

- Инструментальные измерения уровней шума на рабочих местах, проведенные в соответствии с требованиями ГОСТ 17187-2010 [15]. Измерения осуществлялись с использованием сертифицированного шумомера-анализатора Bruel & Kjaer 2250, что гарантирует высокую точность получаемых данных. Измерения проводились в течение полной рабочей смены для каждой профессии, включая различные технологические операции и режимы работы оборудования. Эти замеры проводились в соответствии с требованиями ГОСТ ISO 9612-2016 [16]. В каждой точке измерения выполнялось не менее двух замеров уровня звука. Для адекватной оценки воздействия шума на работников был рассчитан эквивалентный уровень шума за рабочую смену;

- Проведение хронометражных наблюдений для точного определения времени воздействия шума на работников, которые позволили установить факторы, способствующие возникновению опасных условий труда и выявить критические моменты в процессе работы;

- Оценка риска развития профессиональной тугоухости на основе анализа уровней шума и времени его воздействия. Методика, использованная для оценки риска, основывалась на длительности воздействия и уровне шума, что позволило получить более точные результаты.

- Обработка полученных данных с использованием статистических методов.

Результаты анализа риска были представлены в виде вероятностных оценок развития профессиональной тугоухости в течение различных временных периодов, таких как 5, 10 и 20 лет.

Результаты и их обсуждение. В ходе проведенного исследования были выявлены основные источники шума на рабочих местах трансформаторного завода:

- работа прессов для штамповки деталей трансформаторов;
- работа станков для обработки металла;
- работа сварочных аппаратов при сварке деталей трансформаторов;
- работа вентиляционного оборудования;
- транспортировка деталей и материалов и т.д.

Результаты измерений уровней шума на рабочих местах ТОО «Уральский трансформаторный завод» представлены в таблице 1.

Таблица 1 - Результаты измерений уровней шума

Рабочее место	Измеренный уровень шума (дБА)	Эквивалентный уровень шума (дБА)	Превышение гигиенических нормативов
Цех механической обработки	100 -105	102	20-25
Сварочный участок	98 - 102	100	18-22
Электромонтажный цех	90 - 95	92	10-15
Цех сборки (оператор станка)	90 -98	94	10-18

Данные, представленные в таблице 1, наглядно демонстрируют и показывают превышение предельно допустимых уровней (ПДУ) шума, установленного на уровне 80 дБА, которое было зафиксировано на рабочих местах, а именно в различных производственных цехах предприятия:

- Наиболее высокие и значительные уровни шумового воздействия были зафиксированы в цехе механической обработки, где, как известно, расположены мощные и шумные прессы для штамповки металлических деталей. Замеры, проведенные в этом цехе, показали превышение допустимых уровней шума на 20-25 дБА в непосредственной близости от прессов, особенно в моменты, когда осуществляется обработка толстолистового металла. Анализ и исследование источников шума выявило, что основными факторами, способствующими повышению уровня шума, являются вибрация прессового оборудования, ударные нагрузки, возникающие в процессе штамповки, а также шум от контакта металла с металлом, который также вносит свою лепту в общее шумовое фоновое воздействие.

- Аналогичная ситуация и проблемы наблюдаются на участке сварки, где уровень шума превышает допустимые нормы на 13-22 дБА вследствие работы сварочных аппаратов, особенно в моменты, когда осуществляется сварка крупных металлических конструкций, которые требуют значительных усилий и внимания. К шуму, исходящему от самого оборудования, добавляются различные звуковые эффекты от искрения и разбрызгивания металла, которые также влияют на общую шумовую картину.

- На рабочих местах электромонтеров также были зафиксированы превышения допустимых уровней шума на 10-15 дБА, связанные с использованием громких перфораторов и другого электроинструмента, который применяется в их повседневной деятельности.

- В цехе сборки источники шума разнообразны и многообразны: среди них можно выделить сборочные линии, электродвигатели и генераторы, пневматические и электрические инструменты, а также процесс упаковки и перемещения материалов и т.д., все это вносит свой вклад в общее шумовое воздействие на рабочую среду.

Анализ полученных данных показал высокую вероятность и степень развития профессиональной тугоухости у работников, которые подвержены длительному воздействию повышенного уровня шума. Особенно высок риск у слесарей цеха механической обработки и сварщиков, которые ежедневно сталкиваются с шумом на уровнях, превышающих допустимые. Хотя уровень риска для электромонтеров был

ниже, чем в других профессиях, однако он все равно оставался выше приемлемых норм, что тоже является важным фактором, требующим внимания и вмешательства.

Результаты гигиенической оценки воздействия шума на рабочих местах ТОО «Уральский трансформаторный завод» выявили явную необходимость в принятии мер по снижению шумовой нагрузки, что особенно важно, сохранению здоровья работников. Для эффективного и всестороннего снижения шумового воздействия на работников необходимо применять комплексный подход, который включает в себя использование различных классов средств и методов защиты от шума в полном соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.003-2014 [17]. Для сохранения здоровья работников и создания более комфортных условий труда рекомендуется предпринять следующие меры:

- Замена устаревшего и шумного оборудования на более современное и тихое, которое будет значительно менее шумным и более эффективным.
- Модернизация прессов и сварочных аппаратов с использованием звукоизолирующих и звукопоглощающих материалов и конструкций, а также установка виброизоляторов для минимизации проникновения шума.
- Использование виброгасящих и шумопоглощающих материалов при монтаже оборудования, чтобы существенно снизить уровень вибраций, которые, как известно, способствуют увеличению шума.
- В цехе механической обработки рекомендуется учитывать установку шумозащитных экранов вокруг наиболее шумного оборудования, а также установку звукоизолирующих кожухов, которые могут существенно помочь в снижении уровня шума. Также необходимо пересмотреть и изменить технологический процесс штамповки для снижения ударных нагрузок и вибрации, что также может положительно сказаться на уровне шума.
- Модернизация вентиляционных систем для снижения уровня шума, который они могут генерировать во время работы.
- Сокращение времени пребывания работников в шумных условиях, что поможет снизить риск возникновения профессиональных заболеваний.
- Проведение ротации работников между шумными и тихими участками производства для равномерного распределения нагрузки на работников и уменьшения воздействия шума на здоровье.
- Организация перерывов для отдыха работников в специально отведенных тихих помещениях, где они смогут восстановить свои силы и избежать шумового стресса.
- Регулярный мониторинг уровня шума на рабочих местах, который позволит отслеживать изменения и принимать необходимые меры в случае его увеличения.
- Обучение работников правилам безопасной работы в условиях повышенного шума, а также по вопросам профилактики профессиональной тугоухости, что является важным шагом в поддержании их здоровья.
- Организация проведения обязательных периодических медицинских осмотров работников для своевременного выявления ранних признаков профессиональных заболеваний, связанных с воздействием шума.
- Проведение регулярных аудиометрических исследований всех работников, занятых на шумных участках, не реже одного раза в год [18, с.11; 19, с. 9], что поможет выявлять проблемы с слухом на ранних стадиях.
- Обеспечение работников качественными противошумными наушниками и берушами, которые соответствуют требованиям ГОСТ EN 13819-1-2021 [20], для снижения воздействия шума на их здоровье.
- Контроль за правильным и эффективным использованием средств индивидуальной защиты (СИЗ), чтобы гарантировать их максимальную эффективность.

- Проведение регулярных проверок работоспособности средств индивидуальной защиты, чтобы убедиться, что они функционируют как положено и действительно обеспечивают необходимую защиту.

Заключение. Проведённая гигиеническая оценка воздействия шума на рабочих местах ТОО «Уральский трансформаторный завод» выявила значительную и опасную шумовую нагрузку на работников, которая значительно превышает установленные гигиенические нормы и стандарты.

Разработанные мероприятия по снижению уровня шума, включающие инженерно-технические решения, административные меры, а также использование современных средств индивидуальной защиты, позволят в значительной степени снизить риск развития профессиональной тугоухости и улучшить условия труда на предприятии.

Реализация предложенных мероприятий не только позволит существенно снизить риск возникновения профессиональных заболеваний, связанных с воздействием повышенного уровня шума, но и повысит производительность труда, что, безусловно, является важной целью для любого предприятия. Кроме того, улучшение условий труда повлечет за собой позитивные изменения в морально-психологическом климате в коллективе, способствуя созданию более благоприятной и комфортной рабочей атмосферы. Все это в совокупности позволит значительно повысить уровень удовлетворенности работников, что, в конечном итоге, приведет к лучшим результатам и эффективности работы всего предприятия.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Искандарова, Г.Т., Самигова, Н.Р., Хаджаева У.А. Изучение основных этапов технологического процесса машиностроительного производства для выявления неблагоприятных факторов воздействия [Текст] / Г.Т. Искандарова, Н.Р. Самигова, У.А. Хаджаева // Молодой ученый. – 2021. – № 20 (362). – С. 65-68.

2. Измеров, Н.Ф., Кириллов, В.Ф. Гигиена труда: учебник, 2-е изд., перераб. и доп. [Текст] / Н.Ф. Измеров, В.Ф. Кириллов // М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. -317 с.

3. Измеров, Н.Ф. Охрана здоровья рабочих и профилактика профзаболеваний на современном этапе [Текст] / Н.Ф. Измеров // Медицина труда. – 2002. – №1. – С. 1-7.

4. Вильк, М.Ф., Панкова, ВБ., Федина, И.Н. Профессиональная тугоухость — социально значимая проблема [Текст] / М.Ф. Вильк, ВБ. Панкова, И.Н. Федина // Health care of the Russian Federation, Russian journal. – 2019. – № 63(5). – С. 258-263. DOI: http://dx.doi.org/10.18821/0044-197X-2019-63-5-258-263

5. Окунев, А.А. Шум в производственных помещениях и его влияние на человека [Текст] / А.А. Окунев // Современные наукоемкие технологии. – 2014. – № 5-2. – С. 105-106.

6. Лисицкий, В.Н., Поздняков, С.В. Шум, как вредный производственный фактор [Текст] / В.Н. Лисицкий, С.В. Поздняков // Журнал «Научный лидер». – 2024. – №2 (152). – С. 31-36.

7. Алянин, Р.Ф., Галлямов, М.А., Абдрахманова, Э.Н. Производственный шум. Проблемы и решения [Текст] / Р.Ф. Алянин, М.А. Галлямов, Э.Н. Абдрахманова // Сетевое издание «Нефтегазовое дело». – № 2 (2019). – С. 128-142.

8. Кодекс Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» от 7 июля 2020 года № 360-VI ЗРК [Текст]. https://adilet.zan.kz/rus/docs/K2000000360

9. Трудовой кодекс Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года № 414-V ЗРК [Текст]. https://adilet.zan.kz/rus/docs/K1500000414

10. Колосов, Ю.В., Барановский, В.В. Защита от вибраций и шума на производстве. Учебное пособие [Текст] / Ю.В. Колосов, В.В. Барановский // СПб: СПбГУ ИТМО, 2011. – 38 с.

11. Рахимов, Н.Н., Проскурина, Л.Г., Колобова, Е.А. Производственный шум. Нормирование. Методы снижения шума: учебное пособие [Текст] / Н.Н. Рахимов, Л.Г. Проскурина, Е.А. Колобова // Оренбург: ГОУ ОГУ, 2009. – 106 с.

12. Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан «Об утверждении Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к зданиям и сооружениям производственного назначения» от 3 августа 2021 года № ҚР ДСМ-72 [Текст]. https://adilet.zan.kz/rus/docs/V2100023852

13. Приказ и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан «Об утверждении Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям работы с источниками физических факторов, оказывающих воздействие на человека» от 6 августа 2021 года № ҚР ДСМ-79 [Текст]. https://adilet.zan.kz/rus/docs/V2100023897

14. Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан «Об утверждении Гигиенических нормативов к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека» от 16 февраля 2022 года № ҚР ДСМ-15 [Текст]. https://adilet.zan.kz/rus/docs/V2200026831

15. ГОСТ 17187-2010 Шумомеры. Часть 1. Технические требования [Текст] / Москва: Стандартинформ, 2012. – 36 с. https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293792/4293792077.pdf

16. ГОСТ ISO 9612-2016 Акустика. Измерения шума для оценки его воздействия на человека. Метод измерений на рабочих местах [Текст] / Москва: Стандартинформ, 2016. – 45 с.

17. ГОСТ 12.1.003-2014 Система стандартов безопасности труда. Шум. Общие требования безопасности [Текст] / Москва: Стандартинформ, 2016. – 27 с. https://ntm.ru/UserFiles/File/document/SHUM/NORM/GOST%20ISO%209612-2016.pdf

18. Кудрин, А.Н. Защита от производственного шума: Методические указания к лабораторной работе [Текст] / А.Н. Кудрин // Ульяновск: УлГТУ, 2001. - 32 с.

19. Затолок, П.А. Методы исследования слуха: учеб.-метод. пособие [Текст] / П.А. Затолок // Минск: БГМУ, 2009. – 16 с.

20. ГОСТ EN 13819-1-2021 Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органа слуха. Методы испытаний. Часть 1. Методы физических испытаний [Текст] / Минск: Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации, 2021. - 28 с. https://internet-law.ru/gosts/gost/80760/

REFERENCES

1. Iskandarova, G.T., Samigova, N.R., Hadzhaeva U.A. Izuchenie osnovnyh etapov tekhnologicheskogo processa mashinostroitel'nogo proizvodstva dlya vyyavleniya neblagopriyatnyh faktorov vozdejstviya [Tekst] / G.T. Iskandarova, N.R. Samigova, U.A. Hadzhaeva // Molodoj uchenyj. – 2021. – № 20 (362). – S. 65-68.

2. Izmerov, N.F., Kirillov, V.F. Gigiena truda: uchebnik, 2-e izd., pererab. i dop. [Tekst] / N.F. Izmerov, V.F. Kirillov // M.: GEOTAR-Media, 2016. -317 s.

3. Izmerov, N.F. Ohrana zdorov'ya rabochih i profilaktika profzabolevanij na sovremennom etape [Tekst] / N.F. Izmerov // Medicina truda. – 2002. – №1. – S. 1-7.

4. Vil'k, M.F., Pankova, VB., Fedina, I.N. Professional'naya tugouhost' — social'no znachimaya problema [Tekst] / M.F. Vil'k, VB. Pankova, I.N. Fedina // Health care of the Russian Federation, Russian journal. – 2019. – № 63(5). – S. 258-263. DOI: http://dx.doi.org/10.18821/0044-197X-2019-63-5-258-263

5. Okunev, A.A. SHum v proizvodstvennyh pomeshcheniyah i ego vliyanie na cheloveka [Tekst] / A.A. Okunev // Sovremennye naukoemkie tekhnologii. – 2014. – № 5-2. – S. 105-106.

6. Lisickij, V.N., Pozdnyakov, S.V. SHum, kak vrednyj proizvodstvennyj faktor [Tekst] / V.N. Lisickij, S.V. Pozdnyakov // ZHurnal «Nauchnyj lider». – 2024. – №2 (152). – S. 31-36.

7. Alyanin, R.F., Gallyamov, M.A., Abdrahmanova, E.N. Proizvodstvennyj shum. Problemy i resheniya [Tekst] / R.F. Alyanin, M.A. Gallyamov, E.N. Abdrahmanova // Setevoe izdanie «Neftegazovoe delo». – № 2 (2019). – S. 128-142.

8. Kodeks Respubliki Kazahstan «O zdorov'e naroda i sisteme zdravoohraneniya» ot 7 iyulya 2020 goda № 360-VI ZRK [Tekst]. https://adilet.zan.kz/rus/docs/K2000000360

9. Trudovoj kodeks Respubliki Kazahstan ot 23 noyabrya 2015 goda № 414-V ZRK [Tekst]. https://adilet.zan.kz/rus/docs/K1500000414

10. Kolosov, YU.V., Baranovskij, V.V. Zashchita ot vibracij i shuma na proizvodstve. Uchebnoe posobie [Tekst] / YU.V. Kolosov, V.V. Baranovskij // SPb: SPbGU ITMO, 2011. – 38 s.

11. Rahimov, N.N., Proskurina, L.G., Kolobova, E.A. Proizvodstvennyj shum. Normirovanie. Metody snizheniya shuma: uchebnoe posobie [Tekst] / N.N. Rahimov, L.G. Proskurina, E.A. Kolobova // Orenburg: GOU OGU, 2009. – 106 s.

12. Prikaz Ministra zdravoohraneniya Respubliki Kazahstan «Ob utverzhdenii Sanitarnyh pravil «Sanitarno-epidemiologicheskie trebovaniya k zdaniyam i sooruzheniyam proizvodstvennogo naznacheniya» ot 3 avgusta 2021 goda № ҚR DSM-72 [Tekst]. https://adilet.zan.kz/rus/docs/V2100023852

13. Prikaz i.o. Ministra zdravoohraneniya Respubliki Kazahstan «Ob utverzhdenii Sanitarnyh pravil «Sanitarno-epidemiologicheskie trebovaniya k usloviyam raboty s istochnikami fizicheskih faktorov, okazyvayushchih vozdejstvie na cheloveka» ot 6 avgusta 2021 goda № ҚR DSM-79 [Tekst]. https://adilet.zan.kz/rus/docs/V2100023897

14. Prikaz Ministra zdravoohraneniya Respubliki Kazahstan «Ob utverzhdenii Gigienicheskih normativov k fizicheskim faktoram, okazyvayushchim vozdejstvie na cheloveka» ot 16 fevralya 2022 goda № ҚR DSM-15 [Tekst]. https://adilet.zan.kz/rus/docs/V2200026831

15. GOST 17187-2010 SHumomery. CHast' 1. Tekhnicheskie trebovaniya [Tekst] / Moskva: Standartinform, 2012. – 36 s. https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293792/4293792077.pdf

16. GOST ISO 9612-2016 Akustika. Izmereniya shuma dlya ocenki ego vozdejstviya na cheloveka. Metod izmerenij na rabochih mestah [Tekst] / Moskva: Standartinform, 2016. – 45 s.

17. GOST 12.1.003-2014 Sistema standartov bezopasnosti truda. SHum. Obshchie trebovaniya bezopasnosti [Tekst] / Moskva: Standartinform, 2016. – 27 s. https://ntm.ru/UserFiles/File/document/SHUM/NORM/GOST%20ISO%209612-2016.pdf

18. Kudrin, A.N. Zashchita ot proizvodstvennogo shuma: Metodicheskie ukazaniya k laboratornoj rabote [Tekst] / A.N. Kudrin // Ul'yanovsk: UlGTU, 2001. - 32 s.

19. Zatolok, P.A. Metody issledovaniya sluha: ucheb.-metod. posobie [Tekst] / P.A. Zatolok // Minsk: BGMU, 2009. – 16 s.

20. GOST EN 13819-1-2021 Sistema standartov bezopasnosti truda. Sredstva individual'noj zashchity organa sluha. Metody ispytanij. CHast' 1. Metody fizicheskih ispytanij [Tekst] / Minsk: Evrazijskij sovet po standartizacii, metrologii i sertifikacii, 2021. - 28 s. https://internet-law.ru/gosts/gost/80760/

ТҮЙІН

Мақалада трансформатор зауытының жұмыс орындарындағы шудың әсерін гигиеналық бағалау нәтижелері келтірілген. Зерттеудің мақсаты трансформаторлар өндірісінің әртүрлі кезеңдеріндегі шу деңгейін анықтау және оны жұмысшылардың денсаулығына әсері бойынша бағалау болды. Жұмыс істеп тұрған жабдықты (престер,

станоктар, дәнекерлеу аппараттары) және технологиялық процестерді қамтитын шудың негізгі көздеріне талдау жүргізілді. Дыбыс деңгейлерін аспаптық өлшеу негізгі кәсіптердің жұмыс орындарында жүзеге асырылды: слесарлар, дәнекерлеушілер, Электромонтерлер. Бірқатар жұмыс орындарында шудың шекті рұқсат етілген деңгейлерінің (ШЖҚ) асып кетуі анықталды; шудың ШЖҚ-дан едәуір асып кетуі бірнеше жұмыс учаскелерінде тіркелді. Шу деңгейінің максималды мәні 100-105 дБ(А) дейін, бұл санитарлық нормалармен белгіленгеннен едәуір жоғары 80-85 ДБ(А) металл бөлшектерін штамптауға арналған престер жұмыс істейтін механикалық өңдеуде бекітілген. Кәсіби есту қабілетінің жоғалу қаупін бағалау ұсынылады; шу деңгейін төмендету бойынша іс-шаралар әзірленді және ұсынылды: инженерлік-техникалық шешімдер, әкімшілік шаралар және жеке қорғаныс құралдарын пайдалану. Зерттеу нәтижелерін трансформаторлық зауыттардағы еңбек жағдайларын жақсарту және шудың әсерінен болатын кәсіби ауруды азайту үшін қолдануға болады.

ӘОЖ 629.1.07
ҒТАХР 73.31.41:

Махашева С.С., техника ғылымдарының магистрі, https://orcid.org/0000-0002-2369-6579
«Жәңгір хан атындағы Батыс Қазақстан аграрлық-техникалық университеті» КеАҚ, Орал қ., Жәңгір хан көш., 51, 090009, Қазақстан Республикасы, simbat.salimovna@mail.ru
Меңдешев Д.Д., ғылым магистрі, https://orcid.org/0000-0001-9131-4299
«Жәңгір хан атындағы Батыс Қазақстан аграрлық-техникалық университеті» КеАҚ, Орал қ., Жәңгір хан көш., 51, 090009, Қазақстан Республикасы, m.dauir.kz@mail.ru
Игілік Д. Н., https://orcid.org/0009-0005-5618-0914,
«Жәңгір хан атындағы Батыс Қазақстан аграрлық-техникалық университеті» КеАҚ, Орал қ., Жәңгір хан көш., 51, 090009, Қазақстан Республикасы, diasigilik88@gmail.com
Давлетьяров Н.А., Директорының орынбасары,
«Жайық жарығы» ЖШС, Орал қ., Демократическая көш., 1/2, 090009, Қазақстан Республикасы, Nurxat.90@mail.ru

Makhasheva S., master of technical sciences, https://orcid.org/0000-0002-2369-6579
NJSC«West Kazakhstan Agrarian and Technical University named after Zhangir Khan», Uralsk, st.Zhangir khan 51,090009, Kazakhstan, simbat.salimovna@mail.ru
Mengdeshev D., master of science, https://orcid.org/0000-0001-9131-4299
NJSC«West Kazakhstan Agrarian and Technical University named after Zhangir Khan», Uralsk, st.Zhangir khan 51,090009, Kazakhstan, m.dauir.kz@mail.ru
Igilik D., https://orcid.org/0000-0002-2369-6579
NJSC«West Kazakhstan Agrarian and Technical University named after Zhangir Khan», Uralsk, st.Zhangir khan 51,090009, Kazakhstan, diasigilik88@gmail.com
Davletyarov N. A., Deputy Director, LLP" zhayyk zharysy", Uralsk, Demokraticheskaya STR., 1/2, 090009, Republic Of Kazakhstan, Nurxat.90@mail.ru

ҚОЗҒАЛТҚЫШ БӨЛШЕКТЕРІНІҢ ТОЗУЫН АЗАЙТУ ТӘСІЛДЕРІ
WAYS TO REDUCE WEAR ON ENGINE PARTS

АҢДАТПА

Қазіргі заманғы машина жасау және автокөлік өнеркәсібінде қозғалтқыштардың сенімділігі мен ұзақ мерзімділігін арттыру маңызды мәселелердің бірі болып табылады. Қозғалтқыштың негізгі бөлшектері жұмыс барысында үнемі жоғары температура, үлкен жүктеме және үйкеліс әсеріне ұшырайды, бұл олардың тозуына әкеледі. Тозу үдерісі қозғалтқыштың тиімділігін төмендетіп қана қоймай, оның қызмет ету мерзімін қысқартады және жөндеу шығындарын арттырады. Сондықтан қозғалтқыш

бөлшектерінің тозуын азайту әдістерін зерттеу өзекті ғылыми-техникалық мәселе болып табылады.

Бүгінде бұл мәселені шешу үшін бірнеше бағытта зерттеулер жүргізілуде. Оларға үйкеліс пен тозуды төмендететін жаңа материалдар мен жабындарды қолдану, майлау жүйелерін жетілдіру, қозғалтқыш конструкциясын оңтайландыру және интеллектуалды диагностика жүйелерін енгізу жатады. Сонымен қатар, нанотехнологиялардың дамуы, инновациялық майлау материалдары мен гибридті қозғалтқыштардың пайда болуы да қозғалтқыштың тозу үдерісін бәсеңдетуге мүмкіндік береді.

Қозғалтқыш бөлшектерінің тозуын азайту әдістері қазіргі уақытта көлік құралдарының, техниканың және түрлі өндірістік механизмдердің тиімді жұмысын қамтамасыз ету үшін маңызды. Тозуды азайту арқылы қозғалтқыштың қызмет ету мерзімі ұзарады, жұмыс қуаты артады және отын шығыны төмендейді. Бұл мақсатқа жету үшін түрлі технологиялар мен тәсілдер қолданылады. Тозудың азаюы тек қозғалтқыштың тиімділігін арттырып қана қоймай, қоршаған ортаға зиянды заттардың шығуын да азайтады. Сондықтан қозғалтқыш бөлшектерінің тозуын азайту мәселесі өте маңызды.

Қозғалтқыш бөлшектерінің тозуын азайтуға арналған негізгі тәсілдер майлау жүйесін жетілдіруден бастап, қозғалтқыштың жұмыс режимін дұрыс реттеуге дейінгі кең ауқымды шараларды қамтиды. Осы тәсілдерді қолдану арқылы қозғалтқыштың бөлшектерінің тозуын айтарлықтай төмендетуге болады.

ANNOTATION

In the modern mechanical engineering and automotive industry, improving the reliability and durability of engines is one of the most important issues. The main engine parts are constantly exposed to high temperatures, large loads and friction during operation, which leads to their wear. The Wear process not only reduces the efficiency of the engine, but also shortens its service life and increases repair costs. Therefore, the study of methods for reducing wear of engine parts is an urgent scientific and technical problem.

Today, research is being conducted in several areas to solve this problem. These include the use of new materials and coatings that reduce friction and wear, the improvement of lubrication systems, the optimization of engine design, and the introduction of intelligent diagnostics systems. In addition, the development of nanotechnology, the emergence of innovative lubricants and hybrid engines also make it possible to slow down the process of engine wear.

Methods of reducing the wear of engine parts are currently important to ensure the efficient operation of vehicles, machinery and various production mechanisms. By reducing wear, the service life of the engine increases, the operating power increases and fuel consumption decreases. Various technologies and approaches are used to achieve this goal. Reducing wear not only improves engine efficiency, but also reduces emissions of harmful substances into the environment. Therefore, it is very important to reduce the wear of engine parts.


The main approaches to reducing engine wear include a wide range of measures, ranging from improving the lubrication system to properly adjusting the engine operating mode. Using these approaches, it is possible to significantly reduce the wear of engine parts.

Кілт сөздер: *тозу, абразивтік тозу, адгезиялық тозу, корррозия, қозғалтқыш, механикалық факторлар, металлографиялық талдау, клапан*

Keywords: *wear, abrasive wear, adhesive wear, corrosion, motor, mechanical factors, metallographic analysis, valve*

Кіріспе. Бұл мақалада қозғалтқыш бөлшектерінің тозу түрлері, тозу үдерісіне әсер ететін негізгі факторлар, сондай-ақ оны азайтудың заманауи әдістері қарастырылады. Сонымен қатар, қозғалтқыш бөлшектерінің беріктігін арттыруға бағытталған болашақ зерттеу бағыттары талданады. Бұл зерттеулердің нәтижелері автокөлік қозғалтқыштарының жұмыс сенімділігін жақсартып, олардың техникалық қызмет көрсету аралығын ұлғайтуға және пайдалану шығындарын азайтуға мүмкіндік береді.

Зерттеу материалдары мен әдістері. Тозу - қозғалтқыш бөлшектерінің ұзақ уақыт бойы жұмыс істеу нәтижесінде материалдың физикалық және химиялық өзгерістерге ұшырауы. Бұл құбылыс бөлшектердің сенімділігі мен қызмет ету мерзімін төмендетеді. Қозғалтқыш бөлшектерінің тозуын бірнеше негізгі түрге бөлуге болады: Абразивтік тозу, адгезиялық тозу, коррозиялық тозу, жылулық тозу, эрозиялық тозу, шаршаулық тозу.



Сурет 1 - Қозғалтқыш бөлшектерінің тозу түрлері

Абразивтік тозу. Абразивтік тозу үйкелетін беттердің арасында бөгде қатты бөлшектердің болуы нәтижесінде пайда болады. Бұл бөлшектер қозғалтқыш майының сапасыздығынан немесе ауа мен отын сүзгілерінің дұрыс жұмыс істемеуінен қозғалтқышқа түсуі мүмкін.




Сурет 2 - Абразивті тозу

Абразивтік тозудың негізгі себептері: Май құрамындағы металл бөлшектері, шаң және күйе қалдықтары, ауа сүзгісінің ластануы немесе сапасыз сүзгілерді қолдану, майлау жүйесінің дұрыс жұмыс істемеуі және т.б.

Абразивтік тозудың негізгі зардаптары: Цилиндрлер мен поршеньдердің ішкі беттері тозып, қозғалтқыштың қысу коэффициенті төмендейді, иінді білік пен подшипниктердің қызмет ету мерзімі қысқарады, үйкеліс күші артатындықтан, қозғалтқыштың отын шығыны көбейеді және т.б.

Алдын алу жолдары: Жоғары сапалы май және сүзгілер қолдану, майлау жүйесін уақытында тазалау және жаңарту, қозғалтқышқа сыртқы шаң мен кірдің түсуін болдырмау.

Адгезиялық тозу. Адгезиялық тозу үйкеліс беттері арасындағы жоғары қысым мен температураның әсерінен пайда болады. Бұл құбылыста үйкеліс беттері бір-біріне жабысып, кейіннен бөлінген кезде микрооқшауланған материал бөлшектері үзіледі.



Сурет 3 - Адгезиялық тозу

Адгезиялық тозудың негізгі себептері: Майлау қабатының жетіспеушілігі немесе оның толық бұзылуы, үйкеліс беттерінің жоғары температураға дейін қызуы,жоғары қысым әсерінен материалдардың пластикалық деформацияға ұшырауы.

Адгезиялық тозудың негізгі зардаптары: Поршень сақиналары мен цилиндр қабырғалары зақымдалады, иінді біліктің мойынтіректері істен шығады, қозғалтқыштың қуаты төмендейді және оның тозуы жылдамдайды.

Алдын алу жолдары: Майлау жүйесінің жұмысын қадағалау және май сапасын бақылау, үйкеліс беттерін арнайы жабындармен қаптау (DLC, молибден дисульфиді және қозғалтқышты артық жүктемеден сақтандыру.

Коррозиялық тозу. Коррозиялық тозу қозғалтқыш бөлшектеріне химиялық заттардың әсерінен туындайды. Бұл процесте жану өнімдеріндегі күкірт, азот және басқа да агрессивті қосылыстар металмен әрекеттесіп, оны әлсіретеді.



Сурет 4 - Коррозиялық тозу

Коррозиялық тозудың негізгі себептері сапасыз отын қолдану (күкірт пен қоспалары көп отын), қозғалтқышта толық жанбайтын қалдықтардың жиналуы, май құрамында химиялық реакцияға түсетін қышқылдардың болуы болып табылады.

Коррозиялық тозудың негізгі зардаптары цилиндрлер мен клапандардың ішкі беттері эрозияға ұшырауынан, қозғалтқыштың жану камерасында шөгінділер пайда болуынан, металл құрылымының әлсіреуі салдарынан бөлшектердің мерзімінен бұрын істен шығуынан туындайды.

Алдын алу жолдары:

- Жоғары сапалы және төмен күкіртті отын пайдалану;
- Коррозияға төзімді материалдар мен жабындар қолдану (никель, хром, молибден қорытпалары);
- Қозғалтқыштың жану жүйесін дұрыс реттеу.

Температуралық тозу. Температуралық тозу қозғалтқыштың жоғары температурада ұзақ уақыт бойы жұмыс істеуінен туындайды. Бұл құбылыс материалдардың құрылымдық өзгерістеріне, беткі қабаттардың еруіне және бөлшектердің механикалық беріктігінің төмендеуіне алып келеді.



Сурет 5 -Температуралық тозу

Температуралық тозу қозғалтқыштың артық қызуы, салқындату жүйесінің дұрыс жұмыс істемеуі, жану температурасының жоғары болуы себептерінен туындайды.

Температуралық тозудың негізгі зардаптары поршеньдер мен клапандарда жарықтардың пайда болуынан, қозғалтқыш майының тотығуы және оның майлау қасиеттерінің төмендеуінен, бөлшектердің кеңеюі салдарынан үйкеліс күші артып, қосымша тозу орын алады.

Алдын алу жолдары:

- Қозғалтқыштың салқындату жүйесін уақытылы тексеру және күту;
- Қозғалтқышты дұрыс пайдалануды қамтамасыз ету (жоғары жүктемелерден аулақ болу);
- Жоғары температураға төзімді қорытпалар мен жабындарды қолдану.

Эрозиялық тозу. Эрозиялық тозу жоғары жылдамдықпен қозғалып тұрған газдардың немесе сұйықтықтардың бөлшектерге соқтығысуы нәтижесінде пайда болады. Бұл құбылыс көбінесе турбокомпрессорларда, клапандарда және газ шығару жүйелерінде кездеседі.



Сурет 6 - Эрозиялық тозу

Эрозиялық тозудың негізгі себептері:

- Жоғары жылдамдықтағы жану өнімдерінің металға әсері;
- Қозғалтқыш жүйесінде көміртегі шөгінділерінің пайда болуы;
- Газ немесе сұйықтық ағындарының дұрыс бағытталмауы.

Эрозиялық тозудың негізгі зардаптары:
- Қозғалтқыш клапандары мен турбина қалақтарының зақымдалуы;
- Газ шығару жүйесінің өткізу қабілетінің төмендеуі;
- Тиімділіктің азаюы және отын шығынының көбеюі.

Алдын алу жолдары:
- Жоғары сапалы отын мен майлау материалдарын пайдалану;
- Қозғалтқыштың газ шығару жүйесін дұрыс реттеу.

Қозғалтқыш бөлшектерінің тозу жылдамдығы мен қарқындылығы көптеген факторларға тәуелді. Бұл факторларды механикалық, физикалық, химиялық және пайдалану шарттарына байланысты бірнеше топқа бөліп қарастыруға болады.

Кесте 1 - Қозғалтқыш бөлшектерінің тозу жылдамдығы мен қарқындылығы

Механикалық факторлар	Физикалық факторлар	Химиялық факторлар	Пайдалану шарттарына байланысты факторлар
Үйкеліс күші және оның түрлері	Жоғары температура және термиялық тозу	Отынның сапасы және жану өнімдері	Жүктеме және қозғалыс режимдері
Механикалық жүктемелер	Майлау жүйесінің жағдайы	Қышқылдық орта және коррозия	Ауа-райы және қоршаған орта жағдайлары
Діріл (вибрация) және соққы жүктемелері	Температуралық циклдер және термиялық шаршау	Жану камерасындағы оттегі концентрациясы	Техникалық қызмет көрсету және бөлшектер сапасы

Механикалық факторлар - бұл материалдар мен құрылымдарға әсер ететін күштер, қозғалыстар және жүктемелер, олар бөлшектердің тозуы, деформациясы немесе сынуына әкелуі мүмкін.

Физикалық факторлар - бұл материалдар мен механизмдердің жұмыс істеуіне әсер ететін табиғи және физикалық әсерлер. Олар бөлшектердің тозуы, қасиеттерінің өзгеруі және істен шығуы сияқты процестерге ықпал етеді.

Химиялық факторлар - бұл автомобиль бөлшектерінің химиялық реакциялар нәтижесінде өзгеруіне, тозуына немесе бұзылуына әкелетін әсерлер. Бұл факторлар металдардың коррозиясына, майлау материалдарының тозуына және резеңке мен пластик элементтердің қартаюына ықпал етеді.

Пайдалану шарттарына байланысты факторлар - автомобильдің техникалық күйі мен бөлшектерінің тозуына оның пайдалану шарттары айтарлықтай әсер етеді. Бұл факторлар қозғалыс жағдайларына, жүргізу стиліне, ауа райына және техникалық қызмет көрсетуге байланысты өзгереді. Қозғалтқыш бөлшектерінің тозуын азайту тәсілдері

Қозғалтқыш бөлшектерінің тозуын азайту үшін олардың жұмыс жағдайларын оңтайландырып, техникалық қызмет көрсету шараларын уақытында орындау қажет.

Майлау жүйесін қадағалау. Сапалы мотор майын қолдану - қозғалтқыштың техникалық талаптарына сай майды пайдалану үйкелісті азайтады. Май деңгейін үнемі тексеру - майдың жетіспеуі бөлшектердің тікелей қажалуына әкеледі. Май мен сүзгілерді

уақытында ауыстыру - ескі май үйкелісті күшейтіп, бөлшектердің қызмет ету мерзімін қысқартады.

Салқындату жүйесін дұрыс ұстау. Радиаторды таза ұстау - оның ластануы қозғалтқыштың қызып кетуіне және бөлшектердің тез тозуына әкеледі. Салқындатқыш сұйықтықты уақытында ауыстыру - ол коррозиядан қорғайды және қызып кетудің алдын алады.Термостаттың дұрыс жұмыс істеп тұрғанын тексеру - салқындату жүйесіндегі ақаулар қозғалтқыштың қызып кетуіне немесе тым суық жұмыс істеуіне себеп болуы мүмкін.

Жанармай сапасына мән беру. Тек сапалы отынды пайдалану - төмен сапалы жанармай жану камерасында күйе (нагар) жинап, бөлшектердің тозуын арттырады. Отын сүзгілерін уақытында ауыстыру - лас жанармай инжекторлар мен клапандардың тез істен шығуына себеп болады. Қоспалар мен қоспаларды қолдану - қозғалтқыштың тазалығын сақтау үшін арнайы қоспалар көмектеседі.

Жұмыс тәртібін сақтау. Қозғалтқышты суық күйінде жоғары жүктememен жұмыс істетпеу - алғашқы іске қосылған кезде қозғалтқышты бірден жоғары жылдамдықта жүргізу майлау жүйесінің толық жұмыс істеуіне мүмкіндік бермейді. Қозғалтқышты тұрақты жүктемеде пайдалану - жиі және күрт үдету бөлшектерге артық жүктеме түсіреді. Артық жүктемеден аулақ болу - шамадан тыс жүк қозғалтқышқа, беріліс қорабына және салқындату жүйесіне қосымша қысым түсіреді.

Ауа сүзгісін бақылау. Ауа сүзгісін уақытында тазалау және ауыстыру - лас сүзгі жану камерасына шаң мен кірдің түсуіне әкеледі, бұл цилиндрлер мен поршеньдердің тозуын жылдамдатады.

Қозғалтқыштың жұмыс жағдайларын бақылау. Діріл мен шусыз жұмысын тексеру - қозғалтқыштан тыс дыбыстар немесе дірілдер механикалық ақаулардың белгісі болуы мүмкін. Компьютерлік диагностика жүргізу - электрондық басқару жүйесіндегі қателерді ерте анықтау бөлшектердің зақымдануын болдырмауға көмектеседі.

Техникалық қызмет көрсетуді уақытында орындау. Жөндеу жұмыстарын кешіктірмеу - қозғалтқыштағы кез келген кішігірім ақау уақыт өте келе күрделі проблемаларға әкелуі мүмкін. Клапандар мен поршеньдік топтардың саңылауларын тексеру - дұрыс реттелмеген клапандар мен тозған поршень сақиналары қозғалтқыштың тиімділігін төмендетеді.

Зерттеу нәтижелері. Зерттеу барысында көп дизельді қозғалтқыштар температуралық тозуға ұшырайтындығы анықталды. Қозғалтқыштың нақты қай бөлшектері, бөліктері тозуға ұшырайтындығы белгілі болды. Қоғалтқыштарға металлографиялық талдау жасалды. Металлографиялық талдау дегеніміз - металдардың құрылымын зерттеу үшін қолданылатын әдіс. Бұл әдіс металл дәндерінің өлшемін, фазалық құрамын, жарықшақтарды, тозу іздерін және басқа да микроқұрылымдық өзгерістерді анықтауға көмектеседі. Дизельді қозғалтқыштағы жылулық тозу металл құрылымының өзгеруіне әкеледі. Сондықтан, металлографиялық талдау поршеньдер, клапандар, цилиндр бастиектері және жану камерасының элементтеріндегі өзгерістерді зерттеу үшін қолданылады.

Талдау жасау үшін алюминий қорытпасынан жасалған поршень мен болаттан жасалған шығару клапаны алынды:

Поршеньнің жылулық тозуын зерттеу нәтижесі. Поршеньдің жоғарғы бөлігінде (жану камерасына жақын) дәндердің іріленуі, микрожарықшақтар анықталды. Бұл жоғары температураның әсерінен поршеньнің механикалық беріктігінің төмендегенін көрсетеді.

Клапанның жылулық қажалуын зерттеу нәтижесі. Микроскопиялық зерттеу клапан шетінде дисперсті карбидтер мен жарықшақтар бар екенін көрсетті. Бұл клапанның температуралық тозу әсерінен әлсірегенін дәлелдейді.

Қорытынды. Қорытындылай келе, металлографиялық талдау - дизельді қозғалтқыш бөлшектерінің жылулық тозуын зерттеудің маңызды әдіс болып табылды. Микроскопиялық зерттеу арқылы жарықшақтар, фазалық өзгерістер және дәндердің іріленуі анықталады.

Бұдан шығаратын түйін: қозғалтқыш бөлшектерін жасау үшін термотөзімді материалдарды таңдау, жылулық тозуға төзімді қорытпалар мен жабындар қолдану, қозғалтқыштың салқындату және майлау жүйелерін жетілдіру.

Қозғалтқыш бөлшектерінің тозуын азайту - автомобиль және машина жасау саласындағы ең өзекті мәселелердің бірі. Қозғалтқыштың тиімділігі мен сенімділігі оның бөлшектерінің тозу дәрежесіне тікелей байланысты болғандықтан, бұл мәселені шешу үшін кешенді тәсіл қажет. Зерттеу барысында қозғалтқыш бөлшектерінің тозуына әсер ететін негізгі факторлар қарастырылды. Олардың ішінде механикалық үйкеліс, жүктемелер, жоғары температура, химиялық коррозия, сапасыз отын және май, сондай-ақ қозғалтқыштың пайдалану режимдері ерекше рөл атқарады. Әрбір фактор бөлшектердің қызмет ету мерзіміне айтарлықтай әсер етеді, сондықтан оларды барынша бақылау және басқару маңызды. Тозуды азайтудың негізгі әдістеріне сапалы майлау жүйелерін қолдану, заманауи материалдар мен жабындарды пайдалану, қозғалтқыш конструкциясын жетілдіру және пайдалану тәртібін оңтайландыру жатады. Майлау материалдарының сапасын арттыру, нанотехнологияларды енгізу және интеллектуалды диагностика жүйелерін дамыту қозғалтқыш бөлшектерінің қызмет ету мерзімін ұзартуға мүмкіндік береді. Сонымен қатар, болашақ зерттеулер жаңа технологияларды, жасанды интеллект пен цифрлық модельдеуді, сондай-ақ экологиялық таза жанармай түрлерін қолдану мүмкіндіктерін қарастыруға бағытталған. Электр және гибридті қозғалтқыштардың дамуы да іштен жанатын қозғалтқыштардың тозуын азайтуға әсер ететін маңызды факторлардың бірі болып табылады.

Қорыта айтқанда, қозғалтқыш бөлшектерінің тозуын азайту - көп салалы зерттеулер мен технологиялық жаңашылдықтарды қажет ететін күрделі процесс. Оны тиімді шешу үшін жаңа ғылыми жетістіктер мен өндірістік технологияларды үйлестіру, сапалы материалдар қолдану және қозғалтқышты дұрыс пайдалану маңызды. Бұл бағыттағы кешенді шаралар тек қозғалтқыштардың сенімділігі мен ұзақ мерзімділігін қамтамасыз етіп қана қоймай, жанармай үнемділігін арттырып, қоршаған ортаға зиянды әсерін төмендетуге де ықпал етеді.

Бұл зерттеуде қозғалтқыш бөлшектерінің тозу түрлері, оған әсер ететін факторлар және тозуды азайту тәсілдері қарастырылды. Қозғалтқыштың сенімділігі мен ұзақ мерзімді жұмыс істеуі үшін сапалы майлау материалдарын қолдану, заманауи жабындар мен жаңа технологияларды енгізу қажет.

ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

1. Жанғозин А.М., Нұрғалиев Б.М. Іштен жанатын қозғалтқыштар: Оқу құралы. - Алматы: ҚазҰТЗУ, 2020. - 320 б.

2. Кулешов П.Г., Мельников Н.Н. Двигатели внутреннего сгорания: Теория и конструкция. - Москва: Машиностроение, 2018. - 456 с. https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000464583700093

3. Ахметов С.Р. Автомобиль қозғалтқыштарының диагностикасы және жөндеу әдістері. - Астана: ЕҰУ баспасы, 2019. - 280 б.

4. Кириллов В.А., Дмитриев С.Г. Трибология и износостойкость деталей машин. - Санкт-Петербург: Политехника, 2017. - 398 с. https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000348254500013

5. Дүйсенбаев А.С., Исабаев Е.М. Қозғалтқыш бөлшектерінің тозуын азайту технологиялары: Монография. - Алматы: Техника, 2021. - 272 б. https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000284855100012

6. ISO 4406:1999 Hydraulic fluid power - Fluids - Method for coding the level of contamination by solid particles.

7. SAE International Journal of Engines Research papers on engine wear reduction and lubrication technology, 2022.

8. Иванов В.В., Сорокин А.Н. Нанотехнологии в машиностроении: Учебное пособие. - Москва: Высшая школа, 2019. - 312 с. https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000413595400025

9. Bosch Automotive Handbook, 10th Edition - Robert Bosch GmbH, 2020. - 1520 p. https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000322093600003

10. Глобальные тренды в области моторных масел и смазочных материалов - Журнал «АвтоМеханика», №4 (2023), с. 45-57.

11. Малиновский, М.В. Производственно-техническая инфраструктура предприятий автомобильного сервиса [Текст] : учебное пособие/ М.В. Малиновский, Н.Т. Тищенко. - Томск: Изд-во Том. гос. архит.-строит. ун-та, 2012. - 176 с.

12. Родионов, Ю.В. Производственно-техническая инфраструктура предприятий автомобильного транспорта: практикум: учеб. пособие. / Ю.В. Родионов, Н.С. Севрюгина. - Пенза: ПГУАС, 2014. - 196 с. https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000817951600032

13. Оверченко, Г.И. Учебное пособие по курсу «Производственно-техническая база автотранспортных предприятий» для магистрантов специальности 6М071300-Транспорт, транспортная техника и технология» / сост.: Г. И. Оверченко, Ю. Н. Ефремов. - Уральск : ЗКАТУ им. Жангир хана, 2013. - 109 с.

14. Проектирование АТП [Электронный ресурс] / - Режим доступа: http://proekt-sto.ucoz.ru/publ/proektirovanie_atp/1-1-0-28

15. Ибраев, А.С. 5В071300 - «Көлік, көлік техникасы және технологиялары» мамандығының күндізгі және сырттай бөлімі студенттері «Техникалық қызмет көрсету станциялары мен автокөлік кәсіпорындарының өндірістік базасы» пәнінен «Техникалық қызмет көрсету мен жөндеу бойынша өндірістік-техникалық базаны жобалау» тақырыбына курстық жұмысты орындауға арналған әдістемелік нұскау / А.С. Ибраев, Ж.С. Азгалиев - Уральск. : РИО ЗКАТУ Жангир хана. 2014. - 56б.

16. Болбас, М.М. Проектирование производственных участков автотранспортных предприятий : учебно-методическое пособие / М. М. Болбас, К. В. Буйкус, И. А. Ротько, Е. Л. Савич. - Минск : БНТУ, 2018. - 36 с. - ISBN 978-985-550-901-2. - Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. - URL: https://e.lanbook.com/book/248387 (дата обращения: 25.05.2023). - Режим доступа: для авториз. пользователей.

17. Колчин, В.С. Технологическое проектирование транспортных предприятий: учебное пособие/ сост.: В.С.Колчин, З.В. Горбунова. - Иркутск. Изд-во ИРНИТУ. 2017. - 113 с. https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000277598600008

18. Лялин, К.В. Технологический расчет и планировка станций технического обслуживания автомобилей[Электронный ресурс]: учебное пособие/ К. В. Лялин, В. П. Лялин. Екатеринбург: Изд-во Рос. гос. проф.-пед. ун-та, 2019. 124 с. Режим доступа: http://elar.rsvpu.ru/978-5-8050-0676-1.

19. Оценка проектных решений на транспорте: учеб. пособие/Коновалова, Т.В. [и др.] .- Краснодар : Изд. ФГБОУ ВО «КубГТУ», 2020. - 343 с.

20. Монтик, С. В. Проектирование станций технического обслуживания автомобилей : метод. рек. / С. В. Монтик [и др.]. - Гродно : ГрГУ, 2020. - 38 с.

REFERENCES

1. Zhangozin A.M., Nurgaliev B.M. Ishten zhanatyn kozgaltkyshtar: Oku kuraly. - Almaty: KazUTZU, 2020. - 320 b.

2. Kuleshov P.G., Mel'nikov N.N. Dvigateli vnutrennego sgoraniya: Teoriya i konstrukciya. - Moskva: Mashinostroenie, 2018. - 456 s. https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000464583700093

3. Ahmetov S.R. Avtomobil' kozgaltkyshtarynyn diagnostikasy zhane zhondeu adisteri. - Astana: EUU baspasy, 2019. - 280 b.

4. Kirillov V.A., Dmitriev S.G. Tribologiya i iznosostojkost' detalej mashin. - Sankt-Peterburg: Politekhnika, 2017. - 398 s. https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000348254500013

5. Duisenbaev A.S., Isabaev E.M. Kozgaltkysh bolshekterinin tozuyn azaitu tekhnologiyalary: Monografiya. - Almaty: Tekhnika, 2021. - 272 b. https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000284855100012

6. ISO 4406:1999 Hydraulic fluid power - Fluids - Method for coding the level of contamination by solid particles.

7. SAE International Journal of Engines Research papers on engine wear reduction and lubrication technology, 2022.

8. Ivanov V.V., Sorokin A.N. Nanotekhnologii v mashinostroenii: Uchebnoe posobie. - Moskva: Vysshaya shkola, 2019. - 312 s. https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000413595400025

9. Bosch Automotive Handbook, 10th Edition - Robert Bosch GmbH, 2020. - 1520 p. https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000322093600003

10. Global'nye trendy v oblasti motornyh masel i smazochnyh materialov - ZHurnal «AvtoMekhanika», №4 (2023), s. 45-57.

11. Malinovskij, M.V. Proizvodstvenno-tekhnicheskaya infrastruktura predpriyatij avtomobil'nogo servisa [Tekst] : uchebnoe posobie/ M.V. Malinovskij, N.T. Tishchenko. - Tomsk: Izd-vo Tom. gos. arhit.-stroit. un-ta, 2012. - 176 s.

12. Rodionov, YU.V. Proizvodstvenno-tekhnicheskaya infrastruktura predpriyatij avtomobil'nogo transporta: praktikum: ucheb. posobie. / YU.V. Rodionov, N.S. Sevryugina. - Penza: PGUAS, 2014. - 196 s. https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000817951600032

13. Overchenko, G.I. Uchebnoe posobie po kursu «Proizvodstvenno-tekhnicheskaya baza avtotransportnyh predpriyatij» dlya magistrantov special'nosti 6M071300- «Transport, transportnaya tekhnika i tekhnologiya» / sost.: G. I. Overchenko, YU. N. Efremov. - Ural'sk : WKAU named after ZHangir hana, 2013. - 109 s.

14. Proektirovanie ATP [Elektronnyj resurs] / - Rezhim dostupa: http://proekt-sto.ucoz.ru/publ/proektirovanie_atp/1-1-0-28

15. Ibraev, A.S. 5V071300 - «Kolik, kolik tekhnikasy zhane tekhnologiyalary» mamandygynyn kundizgi zhane syrttai bolimi studentteri «Tekhnikalyk kyzmet korsetu stanciyalary men avtokolik kasiporyndarynyn ondiristik bazasy» paninen «Tekhnikalyk kyzmet korsetu men zhondeu boiynsha ondiristik-tekhnikalyk bazany zhobalau» takyrybyna kurstyk zhumysty oryndauga arnalgan adistemelik nuskau / A.S. Ibraev, ZH.S. Azgaliev - Ural'sk. : RIO ZKATU ZHangir hana. 2014. - 56b.

16. Bolbas, M.M. Proektirovanie proizvodstvennyh uchastkov avtotransportnyh predpriyatij : uchebno-metodicheskoe posobie / M. M. Bolbas, K. V. Bujkus, I. A. Rot'ko, E.

L. Savich. - Minsk : BNTU, 2018. - 36 s. - ISBN 978-985-550-901-2. - Tekst : elektronnyj // Lan' : elektronno-bibliotechnaya sistema. - URL: https://e.lanbook.com/book/248387 (data obrashcheniya: 25.05.2023). - Rezhim dostupa: dlya avtoriz. pol'zovatelej.

17. Kolchin, V.S. Tekhnologicheskoe proektirovanie transportnyh predpriyatij: uchebnoe posobie/ sost.: V.S.Kolchin, Z.V. Gorbunova. - Irkutsk. Izd-vo IRNITU. 2017. - 113 s. https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000277598600008

18. Lyalin, K.V. Tekhnologicheskij raschet i planirovka stancij tekhnicheskogo obsluzhivaniya avtomobilej[Elektronnyj resurs]: uchebnoe posobie/ K. V. Lyalin, V. P. Lyalin. Ekaterinburg: Izd-vo Ros. gos. prof.-ped. un-ta, 2019. 124 s. Rezhim dostupa: http://elar.rsvpu.ru/978-5-8050-0676-1.

19. Ocenka proektnyh reshenij na transporte: ucheb. posobie/Konovalova, T.V. [i dr.] .- Krasnodar : Izd. FGBOU VO «KubGTU», 2020. - 343 s.

20. Montik, S. V. Proektirovanie stancij tekhnicheskogo obsluzhivaniya avtomobilej : metod. rek. / S. V. Montik [i dr.]. - Grodno : GrGU, 2020. - 38 s.

РЕЗЮМЕ

Современное машиностроение и автомобилестроение сталкиваются с важной задачей повышения надежности и долговечности двигателей. Основные элементы двигателя в процессе работы постоянно подвергаются воздействию высоких температур, больших нагрузок и трения, что приводит к их износу. Процесс износа не только снижает эффективность работы двигателя, но и сокращает его срок службы, увеличивая затраты на ремонт. Поэтому исследование методов уменьшения износа элементов двигателя является актуальной научно-технической проблемой.

В настоящее время для решения этой задачи проводятся исследования в нескольких направлениях. К ним относятся использование новых материалов и покрытий, снижающих трение и износ, усовершенствование систем смазки, оптимизация конструкции двигателя и внедрение интеллектуальных диагностических систем. Кроме того, развитие нанотехнологий, инновационные смазочные материалы и появление гибридных двигателей также открывают возможности для замедления процесса износа двигателя.

Методы уменьшения износа элементов двигателя в настоящее время являются важными для обеспечения эффективной работы транспортных средств, техники и различных производственных механизмов. Снижение износа способствует увеличению срока службы двигателя, повышению его мощности и снижению расхода топлива. Для достижения этой цели используются различные технологии и методы. Уменьшение износа не только повышает эффективность работы двигателя, но и снижает выбросы вредных веществ в окружающую среду. Поэтому проблема уменьшения износа элементов двигателя имеет большое значение.

Основные методы снижения износа элементов двигателя включают улучшение системы смазки и правильную настройку рабочего режима двигателя, охватывая широкий спектр мероприятий. Применение этих методов позволяет значительно снизить износ деталей двигателя.

UDC 534.08
МРНТИ 30.51.43

Genvareva Yu.A., Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor https://orcid.org/0000-0001-7861-166X
«Orenburg Institute of Railway Engineering – branch of the Samara State University of Railway Engineering», Orenburg, Russia, genvar@mail.ru

Sayfutdinova G.S., Candidate of Pedagogical Sciences, Senior Lecturer. https://orcid.org/0000-0002-7298-0912
NJSC«West Kazakhstan Agrarian and Technical University named after Zhangir Khan», Uralsk, st. Zhangir khan 51,090009, Kazakhstan, 20051984@bk.ru
Taskairova A.A., Master of Natural Sciences. https://orcid.org/0000-0002-8425-7721
NJSC«West Kazakhstan Agrarian and Technical University named after Zhangir Khan», Uralsk, st.Zhangir khan 51,090009, Kazakhstan, a_aina_t@mail.ru

BIOMECHANICS AS THE BASIS FOR ATHLETES' TRAINING SAFETY
БИОМЕХАНИКА СПОРТШЫЛАРДЫҢ ЖАТТЫҒУ ҚАУІПСІЗДІГІНІҢ НЕГІЗІ РЕТІНДЕ

ANNOTATION

This article examines topical issues of biomechanics in sports as the basis of safety in the formation and training of future athletes; the concept of biomechanics, the principles of its operation, the history of discovery, as well as the importance of studying biomechanics in a sports environment are disclosed. The study is aimed at studying the connection between the actions of the human musculoskeletal system and the laws of biomechanics. An interdisciplinary approach to the training of future athletes is presented. A graphical analysis of the athlete's motor actions through compliance with the laws of statics, kinematics and dynamics is provided. We consider the forces of friction of the ligaments, mechanical tension of the joints, muscle traction forces arising in the musculoskeletal system of the athlete. Theoretical analysis of domestic and foreign literature on biomechanics is given in order to increase the efficiency of sports activities. The problem of research is determined by the need to know the basics of biomechanics in the preparation of future athletes and insufficient study of the problem, insufficient qualifications of the coach, which can lead to a large number of mistakes of athletes, and as a result, lack of results, progress, loss of interest in athletes and usually to a decrease in training safety. Knowledge of biomechanics allows everyone to increase their understanding of their body, put the right technique, work their muscles correctly, efficiently and without harm to health, correctly choose sports equipment and training tools. An overview of methods for studying motor actions, developmental trends is presented. The results of our research show that the process of basic theorizing of sports biomechanics in relation to the study of motor actions should be carried out in the following sequence: from identifying the mechanism of movement, establishing the relationship between the kinematics of movement and the forces acting on the body, to studying the main kinematic mechanisms underlying the action of movement.

АҢДАТПА

Бұл бапта болашақ спортшыларды қалыптастыру мен даярлаудағы қауіпсіздік негізі ретінде спорттағы биомеханиканың өзекті мәселелері қаралады; биомеханика ұғымы, оның әрекет ету принциптері, ашылу тарихы, сондай-ақ спорт ортасында биомеханиканы зерделеудің маңызы ашылады. Зерттеу адамның тірек-қимыл аппараты мен биомеханика заңдарының байланысын зерттеуге бағытталған. Болашақ спортшыларды даярлаудың пәнаралық тәсілі ұсынылған. Статика, кинематика және динамика заңдарын сақтау арқылы спортшының қозғалыс әрекеттеріне графикалық талдау келтіріледі. Спортшының тірек-қозғалыс аппаратында пайда болатын байламдардың үйкелу күштері, буындардың механикалық керілуі, бұлшық ет тарту күштері қаралады. Спорт сабақтарының тиімділігін арттыру мақсатында биомеханика бойынша отандық және шетелдік әдебиеттерге теориялық талдау берілді. Зерттеу проблемасы болашақ спортшыларды даярлау кезінде биомеханика негіздерін білу қажеттілігімен және проблеманың жеткіліксіз зерттелуімен, жаттықтырушының біліктілігінің жеткіліксіздігімен айқындалады, бұл спортшылардың көп қателіктеріне,

соның салдарынан нәтижелердің, прогрестің жоқтығына, спортшыларға деген қызығушылықтың жоғалуына және әдетте жаттығулар қауіпсіздігінің төмендеуіне әкелуі мүмкін. Биомеханиканы білу әркімге өз денесін түсінуді арттыруға, дұрыс техника орнатуға, дұрыс, сапалы және денсаулыққа зиян келтірмей бұлшық еттерді жұмыс істеуге, спорттық жаттығу құралдарын сауатты таңдауға мүмкіндік береді. Қозғалыс әрекеттерін, даму үрдістерін зерттеу әдістеріне шолу ұсынылған. Біздің зерттеулеріміздің нәтижелері спорттық биомеханиканы базалық теориялау процесі қозғалыс әрекеттерін зерделеуге қатысты мынадай жүйелікпен жүзеге асырылуы тиіс екенін көрсетеді: қозғалыс механизмін сәйкестендіруден, қозғалыс кинематикасы мен денеге әсер ететін күштер арасындағы өзара байланысты белгілеуден бастап қозғалыс әрекеттерінің негізіне жататын негізгі кинематикалық механизмдерді зерделеуге дейін көрсетілген.

Key words: *biomechanics application, training efficiency, sport, biomechanics in sport, training safety.*

Түйін сөздер*: биомеханиканы қолдану, жаттығу тиімділігі, спорт, спорттағы биомеханика, жаттығу қауіпсіздігі.*

Introduction. The modern state of general biomechanics is characterized by the rapid development and implementation in the practice of experimental research of new technologies and modern research methods created on their basis. Sports biomechanics, which represents one of the directions of general biomechanics, is no exception in this respect. Among the numerous tasks of this science, the leading place still belongs to the study of the technique of competitive and training exercises, which are the main specific means of physical education and sports training. Finding and justifying the most rational ways of performing physical exercises and increasing their effectiveness are the necessary conditions for the growth of athletic skill and the guarantee of success in the athletes' competitive activity. Therefore, the problem of technical training of athletes is the subject of study of national and foreign specialists.

Objects and methods of research. The problem of research is determined by the need to know the basics of biomechanics in the preparation of future athletes and insufficient study of the problem, the lack of qualification of the coach, which can lead to a large number of athletes' errors, and as a consequence, a lack of results, progress, loss of athletes' interest, and usually to a decrease in training safety. Biomechanics as a science of human musculoskeletal activity and its potential is aimed at improving efficiency and preventing injuries. The human musculoskeletal system in terms of biomechanics is considered as a simplified model of the human body, used to study the laws of motion, the musculo-skeletal system as a working machine, taking into account its biomechanical characteristics.

This problem is covered in the works of the ancient Greek scientist Aristotle (study of different types of gait, what forces act on a person when walking); the classic of Greek medicine, Claudius Galen (study of functions about mechanics of motor activity of the body); the outstanding Italian artist Leonardo da Vinci (study of location of muscles and organs inside a person); Archibald Vivien Hill study of muscle structure and the principle of their work.

According to the summarized work of the scientific school of biomechanics at LSU and the Institute of Physical Culture named after P. F. Lesgaft. (I.M. Sechenov, A.A. Ukhtomsky, E.K. Zhukov, V.P. Tugarinov, P.F. Lesgaft, E.A. Krasuskaya, D.A. Semenov, E.G. Kotelnikova) it follows that the subject of biomechanics of physical exercises is the study of the mutual relations between mechanical, morphological, functional and mental phenomena and processes which determine human motor activity.

Biomechanics is aimed at studying the mechanical and biological causes of the

peculiarities of the construction and occurrence of movements in various conditions. Biomechanics takes into account the role of human consciousness incontrolling its movements, in identifying the causes of their occurrence from the point of view of physics and biology. Mechanical movement in living systems, in particular in human movements, manifests itself: in the movement of the biosystem relative to the external environment; the deformation of the biosystem itself is the movement of some parts of it relative to others. Movements of absolutely rigid bodies that do not deform, they are described by Newton's basic laws. In living systems, the work of external forces (gravity, friction, environmental resistance, etc.), as well as internal forces (muscle traction), is also spent on deformation of the musculoskeletal system [1-4].

The action of internal forces is due to the control of the central nervous system. Therefore, for a correct description of the patterns of human movements, it is not enough to limit oneself to studying the mechanics of movement directly, it is also necessary to consider the biological essence of the organization of the action of internal forces in the studied motor action. Exactly motion control with the help of internal forces ensures high efficiency of motor actions in various performance conditions.

The patterns of functioning of the muscular apparatus of the human body are determined by a number of features (dependence "strength – speed", dependence "strength – joint angle", inertia of the process of muscle tension, postural reflexes, etc.), which must be taken into account when constructing movements. All this is not the subject of research in classical mechanics, and therefore the content of biomechanics differs significantly from classical mechanics.

Theoretical analysis of national and foreign literature on biomechanics defines the basic knowledge of mechanical principles in order to improve the effectiveness of sports performance. Understanding how the human body moves is important for coaches is essential for the future development of an athletic career. The difference between biomechanics and classical mechanics, which usually deals with motion and various interactions between objects, is that it analyzes and studies the movements of specifically human beings.

Biomechanics is of great importance in the life of any person engaged in sports that require physical mobility and extensive muscle work [1, p.11]. It is based on geometry, mathematics, anatomy, physiology as well as physics in the mechanics section. Our musculoskeletal structure is controlled by the muscles, coordinated by the work of the brain. Muscle work is a biological process in which muscle fibers are activated to move parts of the body. A certain expenditure of energy is required to perform a motor action. From the point of view of biomechanics, a human being is a system that has its own, internal, source of energy, naturally of biological origin. To control the central nervous system, the brain uses the functions of our psyche. These include: motivation, awareness and some other functions that have a direct influence on the execution of certain commands [2-7].

The study used methods of theoretical analysis, questionnaire survey, comparative analysis and summarizing the experience of physical training with the use of testing methods and the selection of practical tasks and exercises. Along with testing, pedagogical observation of the preparation of future athletes and conversations with coaches were used. [11, p-1467].

Research results. Results and discussion analysis of the literature and comparative analysis allow us to note the necessity of understanding the basics of biomechanics for the correct performance of practical exercises. The effectiveness of the use of various methods of research of motor actions used in sports biomechanics depends on the methodological elaboration of the weak and strong points of these methods, the study of the ways, conditions and limits of their application. On this basis, it can be assumed that the results of the logical and content analysis of the methodological problems of using and developing new research methods on the basis of the concepts of kinematic mechanisms and biomechanisms of motor actions will allow to advance in understanding the structure of motor actions and the place of biomechanics as a science in solving this problem [3].

Taking into account the laws of biomechanics in the training method is aimed at increasing the quality of exercising and raising its efficiency by means of proper supplying theoretical knowledge, techniques of performing a certain workout and their subsequent consolidation in practice. Non-observance of execution technique affects many factors: the load of a certain muscle group, isolation in a certain movement, movement safety and many more. [20, p-79].

It follows from classical mechanics that the more distant from the axis force is applied, the greater the lever arm will increase the coefficient of efficiency, and accordingly the work will be done with less effort. In biomechanics the same principle - if the muscle is attached further from the fulcrum (bone), then its force will be used more advantageously. To perform any movement it is important to have two muscles, which must be located on opposite sides of the bone, relative to each other. Thus, as a result of bending the joint, one of them, by contracting, shortens the other stretches. Taking the hip as an example, the biceps muscle is involved in bending the leg at the knee, while the quadriceps muscle is responsible for extending the leg.

Knowledge and analysis of the laws of biomechanics of the musculoskeletal system contributes to the growth of athletic performance of an athlete by identifying the risks of injury or low efficiency of the exercise technique [7-12].

Biomechanics makes it possible to develop safe training methods, since it is aimed at studying the causes of injuries. For example, when running, it is important to keep in mind that the center of gravity of the body must be above the midpoint of support in order to avoid falling. If the center of gravity is in front of the midpoint of support, then this can lead to injuries to the knees and ankle joints.

The human body is a complex system for controlling which the brain combines a part of its components into corresponding subsystems (main kinematic mechanisms), which can act independently of each other, but their functioning is aimed at achieving a common goal of action. Each of the kinematic mechanisms can be formed both from different and from the same body parts; they have a fundamental difference in their functioning, but can be implemented in different ways depending on the motor task performed [4, p.89]. The realization of each kinematic mechanism is conditioned by the structure of the human musculoskeletal apparatus and the biomechanical characteristics of the muscles involved in the execution of a kinematic action. The following basic kinematic mechanisms underlie the interaction with the support in various jumping exercises: extension of legs (leg) and straightening of the torso, the movement of the body's torso links. [15, p-368].

In order to understand fully how the mechanics act on the physical factors of athletes, let's take a look at a few different exercises. For instance, the "Deadlift" exercise and two variations of its performance, namely the "Classic" and the "Sumo" pull. Let us begin with the classical version of this exercise. Here we look at the waist, hip and knee joints (Fig. 1). Under the action of gravity, due to the hands holding the grip, we have a long shoulder for the lumbar and hip joint, and a zero shoulder for the knee joint, because the force goes through the knee joint. So under the action of gravity, the upper part of the spine tends to the bottom, i.e. bend, this is counteracted by the extensor muscles of the spine. Then in the same way the hip joint is flexed, and here the extensor muscles are also involved - gluteus maximus, biceps, semitendinosus and others. The muscles are not involved under the action of gravity in the knee joint. There is also the reaction force of the support, and the support is provided directly by the feet [12-20].




Figure 1 – "Classic" pull

So, Sumo deadlift, what is the difference? The difference from the classical pull is minimal in terms of technique, but great in terms of the maximum possible load, the difference is only in the setting of the legs, in the Sumo pull it is wider (Fig. 2). With this kind of exercise, there is a minimum shoulder for the hip joint, as well as for the extensor muscles of the spine. For the knee joint, it's still the same zero shoulder. And in comparison with the classical technique, we see that there is less leverage and therefore the execution is much easier. This technique is mainly used in competitions, where it is mandatory to lift the maximum possible weight.




Figure 2 – Sumo deadlift

The classic version allows you to work out and strengthen your muscles, so as to prepare them for the Sumo version of the pull. Sumo pull is used mainly to set records at competitions and takes advantage of the maximum weight that can be lifted [5, p-312].

Next we will examine such exercise as pulling the arm to the side. Again, there will be two variations, the first of which is abduction with dumbbell, and the second abduction in crossover. Let's remember that both of these exercises are aimed at the middle bundle of the deltoid muscle, our goal is just to find out which of them is the most effective.[6, p.110]

Let's start with dumbbell abduction. Here, the dumbbell is directed to the side and pulls the arm down, so the vector of force is also directed downwards (F). From the shoulder girdle we pass shoulder (d) perpendicular to the force vector (Fig. 3). In our case the shoulder girdle also serves as a rotation axis. What we can see is that under the influence of gravity the dumbbell pulls our arm down, this is called flexion, and we counteract with extension, engaging the supraspinous and middle deltoid muscles.

Looking at the lower arm position, we see that the force of gravity is downward (Fig. 4). Can we move the arm away from the axis of rotation? No we cannot because the force passes through the axis of rotation meaning d=0, so there is no torque here. Why? Because the formula for the torque is M=F*d and if d=0 then all the result is zero [6, p.89].




Figure 3 – Dumbbell arms moving sideways

Hence we realize that in the lower point no muscles are working as agonists [7].




Figure 4 – Dumbbell arms sideways. Execution technique.

Let's look at the crossover exercise (Fig. 5). As we have a rope in our hand in this case, the vector of force will lie in its direction. Similarly, we carry out the lever perpendicular to the line of force, and the axis of rotation remains unchanged (Fig. 5). The work of the muscles is the same here, but with one small difference.




Figure 5 – Crossover Exercise

Here you can move the shoulder and see that with the same arm position the muscles are still engaged, and all because, the force directed along the cable line does not stop in the lower position, but still pulls the arm, as a result, the super and middle deltoid muscles are still engaged in the work (Fig. 6).




Figure 6 – Execution technique of the crossover exercise

Results of biomechanics knowledge application in preparation of future athletes:

1. Conscious study of the biomechanics foundations as a basis for the preparation of the athlete.

2. Application of the acquired knowledge for health and strengthening in the training process.

3. Using the above techniques to assess the level of safety during training.

4. Mastering the selection of exercises for safe and effective training based on the biomechanics laws.

Conclusion. The results of the study provide an opportunity to improve training programs for future athletes:

1. When performing an exercise with a dumbbell, the muscles work cyclically, at some point, in the lower phase, stopping the work. But at the same time this exercise is more preferred among large athletes, because, due to the relaxation in the lower position it allows you to use large weights in contrast to the crossover.

2. When performing crossover abduction, the muscles are in constant work, which allows you to work the muscle more qualitatively, but it does not allow you to use the same weights as in the dumbbell exercise.

The knowledge of biomechanics allows everyone to enhance the understanding of your body, to put the proper technique, to work your muscles correctly, qualitatively and without harm to your health, and to choose sports equipment and training aids wisely. In addition, there have long been invented simulators that help to focus on proper biomechanics and, accordingly, technique, which makes the movements of athletes safer and more effective during training, as well as allowing to achieve better results. The review of research methods of motor actions, development tendencies, as well as the results of our own studies show that the process of basic theorizing of sports biomechanics, as applied to the study of motor actions, should be carried out in the following sequence: from identifying the motion mechanism, establishing the relationship between the movement kinematics and the forces acting on the body, to the study of basic kinematic mechanisms underlying the motion action.

REFERENCES

1. Brendan, Burket. Applied Sports Mechanics/Sports Mechanics for Coaches [Text] / B.Brendan // Fourth edition School of health and sport sciences university of the sunshine coast. – Australia, 2021. – 10-16 p.

2. Fernando, Pareja-Blanco. Time Course of Recovery Following Resistance Exercise with Different Loading Magnitudes and Velocity Loss in the Set [Text] / Fernando Pareja-Blanco // Sports. – 2022. – 7(3). – P. 59. https://doi.org/10.3390/sports7030059

3. Verxoshanskij, Yu. Basics of Special strength training in sports [Text]: monografiya. – Moskva: Sovetskij sport, 2020. – 215 p.

4. Evseev, V.I. Biomechanics of degenerative-dystrophic diseases of the spine (osteochondrosis, spondylosis, spondyloarthrosis [Text]: – Rusajns, 2023. – 928 p.

5. Kashuba V. A. Biomechanics of posture [Text]: monografiya. – Olimpijskaya literatura - Moskva, 2021. - 280 p

6. Popov, G.I. Biomechanics of motor activity [Text]: Uchebnik - M.: Academia, 2021. - 88 p.

7. Roupa, Ivo. On the Modeling of Biomechanical Systems for Human Movement Analysis: A Narrative Review [Text] / I.Roupa // Archives of Computational Methods in Engineering. – 2022. – 4915 – 4958p.

8. Rodrigues, Silva. Comprehensive Review on Biomechanical Modeling Applied to Device-Assisted Locomotion [Text] / Rodrigues da Silva // Archives of Computational Methods in Engineering. –2022. –1897-1960p.

9. Rodrigues, Silva. An improved methodology to restrict the range of motion of

mechanical joints [Text] / Rodrigues da Silva // Nonlinear Dynamics. –2024. –315 – 328p.

10. Marques, Filipe Examination and comparison of different methods to model closed loop kinematic chains using Lagrangian formulation with cut joint, clearance joint constraint and elastic joint approaches [Text] /F. Marques// Mechanism and Machine Theory –2021. – 113– 1465-1472p.

11. Kipp, Kristof. Applications of regularized regression models in sports biomechanics research [Text] / John Warmenhoven // Sports biomechanics.–2022. –257 – p.1-19.

12. Ortiz, Padilla. Survey on Video-Based Biomechanics and Biometry Tools for Fracture and Injury Assessment in Sports [Text] / E.Vanessa // Applied Sciences.–2022. –501 – p.110-127.

13. Hughes, G. Novel technology in sports biomechanics: some words of caution [Text] / G. Hughes // Sports biomechanics. – 2021. –1 – p.1-9.

14. Pataky, T. Simultaneous inference for functional data in sports biomechanics [Text] / T. Pataky // AStA Advances in Statistical Analysis.–2021. –107 – p. 369-392.

15. Avedesian, J. Landing Biomechanics in Adolescent Athletes With and Without a History of Sports-Related Concussion [Text] / J. Avedesian // Journal of applied biomechanics. – 2020. –2 – p. 1-11.

16. Knudson, D. Citation metrics of excellence in sports biomechanics research [Text] / D. Knudson // Sports Biomechanics.–2019.–18. – p.289 - 296.

17. Lin, Sh. The Implications of Sports Biomechanics Studies on the Research and Development of Running Shoes: A Systematic Review [Text] / Sh. Lin // Bioengineering.– 2022.–9. – p.619 - 635.

18. Ortega, A. Biomechanics of the Upper Limbs: A Review in the Sports Combat Ambit Highlighting Wearable Sensors [Text] / A.Ortega // Sensors.–2022.–20. – p.78-86.

РЕЗЮМЕ

В данной статье рассматриваются актуальные вопросы биомеханики в спорте как основы безопасности в формировании и подготовке будущих спортсменов; раскрывается понятие биомеханики, принципы ее действия, история открытия, а также значение изучения биомеханики в спортивной среде. Исследование направлено на изучение связи действий опорно-двигательного аппарата человека и законов биомеханики. Представлен междисциплинарный подход к подготовке будущих спортсменов. Приводится графический анализ двигательных действий спортсмена посредством соблюдения законов статики, кинематики и динамики. Рассматриваются силы трения связок, механическое натяжение суставов, силы тяги мышц, возникающие в опорно-двигательном аппарате спортсмена. Дан теоретический анализ отечественной и зарубежной литературы по биомеханике с целью повышения эффективности спортивных занятий.

Проблема исследования определяется необходимостью знания основ биомеханики при подготовке будущих спортсменов и недостаточной изученностью проблемы, недостаточной квалификацией тренера, что может привести к большому количеству ошибок спортсменов, и как следствие отсутствие результатов, прогресса, потеря интереса к спортсменам и обычно к снижению безопасности тренировок. Знание биомеханики позволяет каждому повысить понимание своего тела, поставить правильную технику, правильно, качественно и без вреда для здоровья проработать мышцы, грамотно выбрать спортивный инвентарь и средства тренировки. Представлен обзор методов исследования двигательных действий, тенденций развития. Результаты наших исследований показывают, что процесс базового теоретизирования спортивной биомеханики применительно к изучению двигательных действий должен осуществляться в следующей последовательности: от идентификации механизма движения, установления взаимосвязи между кинематикой движения и силами,

действующими на тело, до изучения основных кинематических механизмов, лежащих в основе действия движения.

УДК 628.31.,628.39
МРНТИ 75.31.17

Сарбалина Б.Д., магистр агроинженерии, https://orcid.org/ 0000-0003-3762-8873
НАО «Западно-Казахстанский аграрно-технический университет имени Жангир хана», 090009, ул. Жангир хана, 51, г. Уральск, Республика Казахстан, Rumasa79@mail.ru
Абдрахманов Ж.Р., начальник производственного технического отдела
ТОО «Батыс Су арнасы», город Уральск, улица Сырым Датова 4/4, 090005, Казахстан, uvodok.pto@mail.ru

Sarbalina B., Postgraduate student, Master of Agricultural Engineering, https://orcid.org/ 0000-0003-3762-8873
NJSC«West Kazakhstan Agrarian and Technical University named after Zhangir Khan», Uralsk, st.Zhangir khan 51,090009, Kazakhstan, Rumasa79@mail.ru
Abdrakhmanov J.R., Head of the Production Technical Department Batys Su Arnasy LLP, Uralsk, Syrym Datova Street 4/4, 090005, Kazakhstan, uvodok.pto@mail.ru

ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ В ЭКСПЛУАТАЦИИ СЕПТИКОВ И КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СИСТЕМ ЧАСТНЫХ ДОМОВ ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ
PROBLEMS AND SOLUTIONS IN THE OPERATION OF SEPTIC TANKS AND SEWAGE SYSTEMS OF PRIVATE HOMES IN THE WEST KAZAKHSTAN REGION

АННОТАЦИЯ

Эксплуатация септиков и канализационных систем в частных домах Западно - Казахстанской области сталкивается с рядом проблем, обусловленных климатическими условиями, неэффективной установкой и недостаточным обслуживанием. Одной из основных проблем является переполнение септиков из-за интенсивного использования, а также загрязнение грунтовых вод. Часто встречается и неправильная утилизация осадков, что приводит к ухудшению санитарных условий. Зимой замерзание труб и систем очистки в условиях холодного климата также является значимой проблемой.

Решения этих проблем включают улучшение проектирования и монтажа канализационных систем, использование высококачественных материалов, а также регулярное обслуживание септиков. Важно внедрение современных технологий очистки воды, таких как биологические фильтры и аэробные установки. Не менее значимым является повышение осведомленности населения о правильной эксплуатации и обслуживании канализационных систем, что поможет предотвратить частые поломки и загрязнение окружающей среды.

Кроме того, для предотвращения переполнения септиков важно контролировать их загрузку и регулярно проводить откачку осадков, что поможет продлить срок службы системы. Использование утеплителей для труб и оборудования может значительно снизить риск замерзания в холодные зимы. Внедрение автоматизированных систем контроля, таких как датчики уровня воды в септике, поможет своевременно выявлять проблемы и избегать их обострения. Необходимо также усилить контроль за качеством воды, поступающей в систему, чтобы предотвратить попадание в септики веществ, которые могут нарушить их нормальную работу. Важно разработать и внедрить программы обучения для владельцев частных домов, чтобы они могли самостоятельно

проводить минимальное обслуживание и своевременно реагировать на возникающие неисправности.

Регулярные проверки и профилактическое обслуживание являются ключевыми мерами для поддержания устойчивости и долгосрочной работы системы канализации.

ANNOTATION

The operation of septic tanks and sewage systems in private homes in the West Kazakhstan region faces a number of problems due to climatic conditions, inefficient installation and insufficient maintenance. One of the main problems is the overflow of septic tanks due to intensive use, as well as contamination of groundwater. Improper disposal of precipitation is also common, which leads to deterioration of sanitary conditions. In winter, freezing of pipes and cleaning systems in cold climates is also a significant problem.

Solutions to these problems include improved design and installation of sewage systems, the use of high-quality materials, and regular septic tank maintenance. It is important to introduce modern water purification technologies such as biological filters and aerobic plants. Equally important is to raise public awareness about the proper operation and maintenance of sewage systems, which will help prevent frequent breakdowns and environmental pollution.

In addition, to prevent septic tanks from overflowing, it is important to monitor their loading and regularly pump out precipitation, which will help extend the service life of the system. The use of insulation materials for pipes and equipment can significantly reduce the risk of freezing during cold winters. The introduction of automated monitoring systems, such as septic tank water level sensors, will help identify problems in a timely manner and avoid their exacerbation. It is also necessary to strengthen control over the quality of water entering the system in order to prevent substances from entering septic tanks that may disrupt their normal operation. It is important to develop and implement training programs for owners of private homes so that they can independently carry out minimal maintenance and respond in a timely manner to malfunctions.

Regular inspections and preventive maintenance are key measures to maintain the sustainability and long-term operation of the sewage system.

Ключевые слова: *Септики, канализационные системы, частные дома, проблемы эксплуатации, Западно - Казахстанская область, водоочистка, обслуживание.*

Key words: *Septic tanks, sewage systems, private houses, operational problems, West Kazakhstan region, water treatment, maintenance.*

Введение. Септики и канализационные системы играют ключевую роль в обеспечении санитарных условий жизни в частных домах, особенно в сельской местности. В Западно -Казахстанской области, где многие населённые пункты не имеют централизованного водоснабжения и канализации, проблема организации индивидуальных систем водоотведения и очистки сточных вод становится особенно актуальной. Системы септиков, предназначение для очистки сточных вод, являются основным методом утилизации отходов в таких регионах [1].

Однако, несмотря на распространённость этих сооружений, эксплуатация септиков и канализационных систем в частных домах сталкивается с множеством проблем, которые требуют внимательного подхода.

Одной из основных трудностей является неправильная установка и проектирование септиков, что может привести к их быстрому выходу из строя, переполнению и загрязнению грунтовых вод. Невозможность адекватного контроля за состоянием канализационных систем и их частое отсутствие в реестре проверок со стороны властей ещё больше усугубляют ситуацию. Кроме того, неправильная эксплуатация септиков, включая использование неподобающих моющих средств и

несоответствующую утилизацию осадков, может привести к загрязнению окружающей среды и ухудшению санитарных условий. В условиях Западно -Казахстанской области, где зимы могут быть очень холодными, дополнительной проблемой является замерзание труб и систем очистки, что вызывает их поломки и требует значительных затрат на восстановление [2].

Системы очистки сточных вод, устанавливаемые в частных домах, должны обеспечивать эффективное очищение воды, минимизируя влияние на окружающую среду. Однако многие владельцы частных домов не обладают необходимыми знаниями для правильной эксплуатации таких систем, что ведет к их быстрому износу и плохим экологическим последствиям. Поэтому крайне важно разработать и внедрить эффективные решения, которые помогут улучшить эксплуатацию септиков и канализационных систем, а также минимизировать их негативное воздействие на природу.

На сегодняшний день в Западно -Казахстанской области существует значительная проблема с управлением и обслуживанием индивидуальных систем водоотведения, что связано с нехваткой квалифицированных специалистов и нехваткой информации среди владельцев частных домов. Существующие методы очистки и утилизации сточных вод требуют модернизации и внедрения более эффективных технологий, которые будут соответствовать современным экологическим стандартам (Рисунок1).



Рисунок 1 - Схема очистных сооружений канализации

Важно, чтобы власти и общественные организации принимали участие в повышении осведомленности населения об эффективной эксплуатации септиков и канализационных систем, а также предоставляли необходимые ресурсы для решения этих проблем [3].

Таким образом, целью данной работы является анализ основных проблем, с которыми сталкиваются владельцы частных домов при эксплуатации септиков и канализационных систем, а также разработка возможных решений для улучшения ситуации. Важно учитывать не только технические, но и социальные аспекты, чтобы обеспечить комплексный подход к решению проблемы и улучшению качества жизни в регионе [4].

Материалы и методы исследования. Для изучения проблем эксплуатации септиков и канализационных систем в частных домах Западно -Казахстанской области использовался комплексный подход, включающий как теоретические, так и эмпирические методы исследования. Основными источниками информации стали как вторичные данные, так и первичные исследования, что позволило получить всестороннюю картину текущей ситуации в регионе [5].

1. Анализ литературы и нормативных документов. Для теоретической базы исследования были использованы публикации в области экологии, инженерных систем водоотведения и очистки сточных вод. В частности, исследовались работы по проектированию и эксплуатации септиков, а также нормативно-правовые акты, регулирующие установку и использование канализационных систем в частных домах. Обзор нормативных документов позволил выявить ключевые требования и стандарты, касающиеся безопасности эксплуатации таких систем в условиях Западно - Казахстанской области [6].

2. Полевые исследования и анкетирование. Для более глубокого понимания проблем эксплуатации канализационных систем были проведены полевые исследования в нескольких районах Западно -Казахстанской области. В рамках этих исследований проводилось анкетирование владельцев частных домов, использующих септики и канализационные системы. Анкеты содержали вопросы, касающиеся особенностей эксплуатации систем, частоты поломок, мероприятий по обслуживанию, а также проблем с загрязнением окружающей среды (Рисунок2). Это позволило собрать информацию о реальных условиях эксплуатации и выявить основные трудности, с которыми сталкиваются жители региона [7].

3.




Рисунок 2- Проблема с загрязнением окружающей среды

4. Интервью с экспертами. Для уточнения технических и экологических аспектов проблемы были проведены интервью с представителями местных органов власти, специалистами в области проектирования и установки септиков, а также экологами. Эксперты поделились своими наблюдениями по поводу текущего состояния инфраструктуры водоотведения в регионе, а также предложили пути решения выявленных проблем.

5. Анализ состояния экологии. Одним из методов исследования была оценка влияния эксплуатации септиков на экологическую ситуацию в регионе. Для этого использовались данные о загрязнении грунтовых вод и почвы в районах, где активно используются септики. Это позволило оценить степень воздействия неправильно эксплуатируемых систем очистки сточных вод на экосистему [8].

6. Сравнительный анализ технологий очистки сточных вод. Важной частью исследования стало сравнение различных технологий очистки сточных вод, применяемых в Западно -Казахстанской области и других регионах. Это включало как традиционные методы (например, накопительные септики), так и более современные решения, такие как биологические фильтры и аэробные установки. Этот анализ позволил выделить наиболее эффективные и экологически безопасные технологии для эксплуатации в условиях данного региона.

7. Математическое моделирование и расчет оптимальных решений. Для оценки эффективности различных методов очистки сточных вод и септиков были проведены

расчеты, основанные на математических моделях, учитывающих климатические и географические особенности региона. Это позволило предложить технически обоснованные рекомендации по улучшению эксплуатации систем водоотведения и очистки [9].

Таким образом, материалы и методы исследования обеспечили всесторонний анализ текущего состояния эксплуатации септиков и канализационных систем в частных домах Западно -Казахстанской области, а также позволили разработать конкретные рекомендации по улучшению ситуации.

Результаты исследования. В ходе исследования эксплуатации септиков и канализационных систем в частных домах Западно -Казахстанской области были получены следующие результаты, которые позволяют выявить основные проблемы, а также предложить возможные пути их решения.

1. Проблемы установки и эксплуатации септиков
Одной из наиболее распространённых проблем является неправильная установка и проектирование септиков. По данным анкетирования, около 30% опрошенных владельцев частных домов столкнулись с проблемой недостаточной глубины заложения системы, что приводит к её частичному замерзанию зимой. Многие владельцы не учитывают особенности почвы, что также способствует быстрому выходу из строя оборудования. Более того, в ряде случаев монтаж септиков выполнялся без должного соблюдения норм и стандартов, что приводит к утечкам и загрязнению грунтовых вод.

2. Загрязнение грунтовых вод и почвы. Загрязнение почвы и грунтовых вод является одной из серьёзных проблем, связанных с эксплуатацией септиков. Более 40% владельцев сообщили о признаках загрязнения окружающей среды: наличие неприятного запаха, ухудшение качества воды в колодцах и источниках, расположенных вблизи от септиков. Этот факт подтверждается результатами экологических исследований, проведённых в рамках исследования. В некоторых районах, особенно вблизи старых поселений, наблюдается высокая концентрация загрязняющих веществ, таких как аммонийные и нитратные соединения, что оказывает негативное воздействие на здоровье местных жителей [10].

3. Проблемы замерзания систем в зимний период. В условиях Западно - Казахстанской области с холодными зимами значительной проблемой является замерзание труб и септиков. Около 25% опрошенных владельцев сообщают о том, что в зимнее время их системы канализации и очистки сточных вод переставали работать из-за замерзания. Это приводит к значительным затратам на ремонт и восстановление работоспособности систем. Многие владельцы не знают, как правильно утеплять трубы и септики, что усугубляет проблему [11].

4. Нехватка регулярного обслуживания и контроля. Регулярное обслуживание септиков и канализационных систем также является серьёзной проблемой. В большинстве случаев владельцы частных домов проводят обслуживание крайне редко, что приводит к накоплению осадков в системах и их переполнению (Рисунок3). Более 50% респондентов признались, что не проводят регулярную чистку септиков и не осуществляют должного контроля за состоянием своих систем, что ускоряет их износ и ведёт к поломкам [12].



Рисунок 3 - Переполненный септик

5. Отсутствие знаний и квалифицированных специалистов. По результатам интервью с экспертами было установлено, что одной из причин неисправности систем является отсутствие квалифицированных специалистов, которые могли бы правильно установить и обслужить системы. Множество домовладельцев не знают об обязательности регулярного техобслуживания септиков, а также не имеют информации о правильном использовании моющих средств, которые могут повредить фильтрационные элементы системы.

6. Сравнительный анализ технологий очистки сточных вод. В ходе исследования также было проведено сравнение существующих технологий очистки сточных вод. Современные системы, такие как биологические фильтры и аэробные установки, показали значительно большую эффективность по сравнению с традиционными септиками, особенно в условиях частых замерзаний и загрязнения. Использование таких технологий может значительно улучшить качество очистки сточных вод, уменьшить нагрузку на экосистему и обеспечить долговечность системы [13].

7. Рекомендации по улучшению эксплуатации септиков. На основе полученных данных были разработаны следующие рекомендации:

Улучшение проектирования и монтажа. Рекомендуется соблюдать все нормы и стандарты при установке септиков, учитывать особенности почвы и глубины заложения. Также стоит использовать материалы, устойчивые к перепадам температур [14].

Регулярное обслуживание и контроль. Важно проводить регулярную очистку септиков и проверку состояния канализационных систем не реже одного раза в год [15].

Внедрение современных технологий. Использование более эффективных и безопасных технологий очистки, таких как биологические фильтры и аэробные установки, позволит значительно повысить качество очистки сточных вод и минимизировать воздействие на окружающую среду [16].

Обучение и повышение осведомленности. Необходимо проводить информационные кампании среди владельцев частных домов, чтобы повысить их осведомлённость о правильной эксплуатации и обслуживании септиков.

Таким образом, результаты исследования позволили выявить основные проблемы, с которыми сталкиваются владельцы частных домов Западно -Казахстанской области при эксплуатации септиков и канализационных систем, и предложить эффективные пути решения для улучшения экологической ситуации и снижения расходов на обслуживание (Рисунок4).



Рисунок 4 - Основная проблема владельцев частных домов

Вывод. Исследование эксплуатации септиков и канализационных систем в частных домах Западно -Казахстанской области выявило ряд проблем, существенно влияющих на эффективность функционирования этих систем, а также на экологическую ситуацию в регионе.

Основными проблемами являются неправильная установка и проектирование систем, недостаточное обслуживание, загрязнение грунтовых вод, замерзание труб в зимний период и нехватка квалифицированных специалистов. Все эти факторы ведут к частым поломкам, загрязнению окружающей среды и повышенным затратам на ремонт [17].

Неправильная эксплуатация септиков, отсутствие регулярного обслуживания и контроля за состоянием систем существенно сокращают их срок службы и ухудшают качество очистки сточных вод. Особенно в условиях сурового климата Западно - Казахстанской области, где зимние температуры могут достигать низких значений, системы очистки требуют особого внимания и правильного утепления [18].

Для улучшения ситуации требуется комплексный подход, включающий как технические, так и организационные меры. Среди ключевых рекомендаций: улучшение проектирования и монтажа септиков, использование более современных и эффективных технологий очистки сточных вод, таких как биологические фильтры и аэробные установки, регулярное обслуживание и обучение владельцев частных домов основам правильной эксплуатации [19].

Таким образом, решения, направленные на улучшение эксплуатации канализационных систем и септиков, способствуют не только повышению их эффективности, но и улучшению экологической ситуации в регионе [20]. Внедрение современных технологий и систематическое обслуживание помогут снизить затраты на ремонт и повысить уровень санитарной безопасности, что, в свою очередь, будет способствовать улучшению качества жизни населения Западно -Казахстанской области.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1 Берг, А. В. Проектирование и эксплуатация очистных сооружений сточных вод / А. В. Берг. — Москва: Стройиздат, 2014. — 320 с.

2 Гарбер, М. Н. Экологическое нормирование в водоснабжении и водоотведении / М. Н. Гарбер. — Санкт-Петербург: Гидрометеоиздат, 2016. — 270 с.

3 Дьяков, В. А. Современные технологии очистки сточных вод: теоретические и практические аспекты / В. А. Дьяков. — Алматы: Наука, 2015. — 350 с.

4 Еремин, И. В. Основы экологии: проблемы загрязнения водоемов и почв / И. В. Еремин. — Москва: Академия, 2017. — 280 с.

5 Журавлев, Ю. И. Системы очистки сточных вод в частных домах / Ю. И. Журавлев. — Санкт-Петербург: Энергоатомиздат, 2018. — 200 с.

6 Захаров, П. С. Технологии водоотведения и водоснабжения для частных домов / П. С. Захаров. — Новосибирск: Сибириада, 2013. — 290 с.

7 Казаков, И. В. Оценка воздействия очистных сооружений на окружающую среду / И. В. Казаков. — Екатеринбург: УралГИЗ, 2014. — 180 с.

8 Кочетков, А. И. Биологическая очистка сточных вод и её применение в сельских районах / А. И. Кочетков. — Челябинск: Южный Урал, 2016. — 210 с.

9 Мартынов, В. А. Канализация и водоотведение в условиях холодного климата / В. А. Мартынов. — Алматы: Наука, 2017. — 260 с.

10 Мельников, М. Г. Проблемы эксплуатации септиков и их решение / М. Г. Мельников. — Екатеринбург: Стройиздат, 2015. — 230 с.

11 Михайлов, И. В. Технологии очистки сточных вод в регионах с ограниченными водными ресурсами / И. В. Михайлов. — Москва: Гидрометеоиздат, 2019. — 310 с.

12 Николаев, В. Д. Экология и загрязнение водных ресурсов: теории и практики очистки / В. Д. Николаев. — Санкт-Петербург: Наука, 2016. — 250 с.

13 Петров, Д. В. Современные методы очистки сточных вод: биологические и химические процессы / Д. В. Петров. — Москва: Энергоатомиздат, 2014. — 320 с.

14 Румянцев, И. В. Системы водоотведения в частном строительстве: проектирование и монтаж / И. В. Румянцев. — Челябинск: Южный Урал, 2017. — 200 с.

15 Смирнов, В. В. Проектирование и эксплуатация систем водоотведения в частных домах / В. В. Смирнов. — Екатеринбург: УралГИЗ, 2015. — 280 с.

16 Соколова, Т. А. Проблемы загрязнения водоемов и способы их решения / Т. А. Соколова. — Москва: Просвещение, 2013. — 270 с.

17 Толстов, И. В. Технологии очистки сточных вод в условиях регионов с холодным климатом / И. В. Толстов. — Санкт-Петербург: Гидрометеоиздат, 2017. — 240 с.

18 Шульга, А. Н. Эффективность эксплуатации септиков в условиях Западно-Казахстанской области / А. Н. Шульга. — Алматы: Наука, 2015. — 210 с.

19 Юрьев, А. П. Утилизация сточных вод в частных домах: от теории к практике / А. П. Юрьев. — Тюмень: УралГИЗ, 2014. — 190 с.

20 Яковлев, В. С. Экологическая безопасность канализационных систем в частных домах / В. С. Яковлев. — Москва: Стройиздат, 2016. — 220 с.

REFERENCES

1 Berg, A. V. Proektirovanie i jekspluatacija ochistnyh sooruzhenij stochnyh vod / A. V. Berg. — Moskva: Strojizdat, 2014. — 320 s.

2 Garber, M. N. Jekologicheskoe normirovanie v vodosnabzhenii i vodootvedenii / M. N. Garber. — Sankt-Peterburg: Gidrometeoizdat, 2016. — 270 s.

3 D'jakov, V. A. Sovremennye tehnologii ochistki stochnyh vod: teoreticheskie i prakticheskie aspekty / V. A. D'jakov. — Almaty: Nauka, 2015. — 350 s.

4 Eremin, I. V. Osnovy jekologii: problemy zagrjaznenija vodoemov i pochv / I. V. Eremin. — Moskva: Akademija, 2017. — 280 s.

5 Zhuravlev, Ju. I. Sistemy ochistki stochnyh vod v chastnyh domah / Ju. I. Zhuravlev. — Sankt-Peterburg: Jenergoatomizdat, 2018. — 200 s.

6 Zaharov, P. S. Tehnologii vodootvedenija i vodosnabzhenija dlja chastnyh domov / P. S. Zaharov. — Novosibirsk: Sibiriada, 2013. — 290 s.

7 Kazakov, I. V. Ocenka vozdejstvija ochistnyh sooruzhenij na okruzhajushhuju sredu / I. V. Kazakov. — Ekaterinburg: UralGIZ, 2014. — 180 s.

8 Kochetkov, A. I. Biologicheskaja ochistka stochnyh vod i ejo primenenie v sel'skih rajonah / A. I. Kochetkov. — Cheljabinsk: Juzhnyj Ural, 2016. — 210 s.

9 Martynov, V. A. Kanalizacija i vodootvedenie v uslovijah holodnogo klimata / V. A. Martynov. — Almaty: Nauka, 2017. — 260 s.

10 Mel'nikov, M. G. Problemy jekspluatacii septikov i ih reshenie / M. G. Mel'nikov. — Ekaterinburg: Strojizdat, 2015. — 230 s.

11 Mihajlov, I. V. Tehnologii ochistki stochnyh vod v regionah s ogranichennymi vodnymi resursami / I. V. Mihajlov. — Moskva: Gidrometeoizdat, 2019. — 310 s.

12 Nikolaev, V. D. Jekologija i zagrjaznenie vodnyh resursov: teorii i praktiki ochistki / V. D. Nikolaev. — Sankt-Peterburg: Nauka, 2016. — 250 s.

13 Petrov, D. V. Sovremennye metody ochistki stochnyh vod: biologicheskie i himicheskie processy / D. V. Petrov. — Moskva: Jenergoatomizdat, 2014. — 320 s.

14 Rumjancev, I. V. Sistemy vodootvedenija v chastnom stroitel'stve: proektirovanie i montazh / I. V. Rumjancev. — Cheljabinsk: Juzhnyj Ural, 2017. — 200 s.

15 Smirnov, V. V. Proektirovanie i jekspluatacija sistem vodootvedenija v chastnyh domah / V. V. Smirnov. — Ekaterinburg: UralGIZ, 2015. — 280 s.

16 Sokolova, T. A. Problemy zagrjaznenija vodoemov i sposoby ih reshenija / T. A. Sokolova. — Moskva: Prosveshhenie, 2013. — 270 s.

17 Tolstov, I. V. Tehnologii ochistki stochnyh vod v uslovijah regionov s holodnym klimatom / I. V. Tolstov. — Sankt-Peterburg: Gidrometeoizdat, 2017. — 240 s.

18 Shul'ga, A. N. Jeffektivnost' jekspluatacii septikov v uslovijah Zapadno-Kazahstanskoj oblasti / A. N. Shul'ga. — Almaty: Nauka, 2015. — 210 s.

19 Jur'ev, A. P. Utilizacija stochnyh vod v chastnyh domah: ot teorii k praktike / A. P. Jur'ev. — Tjumen': UralGIZ, 2014. — 190 s.

20 Jakovlev, V. S. Jekologicheskaja bezopasnost' kanalizacionnyh sistem v chastnyh domah / V. S. Jakovlev. — Moskva: Strojizdat, 2016. — 220 s.

ТҮЙІН

Батыс Қазақстан облысының жеке үйлерінде септиктер мен кәріз жүйелерін пайдалану климаттық жағдайларға, тиімсіз орнатуға және жеткіліксіз қызмет көрсетуге байланысты бірқатар проблемаларға тап болады. Негізгі мәселелердің бірі-қарқынды пайдалану салдарынан септиктердің толып кетуі, сондай-ақ жер асты суларының ластануы. Жауын-шашынның дұрыс жойылмауы сирек емес, бұл санитарлық жағдайдың нашарлауына әкеледі. Қыста суық климатта құбырлар мен тазалау жүйелерін мұздату да маңызды мәселе болып табылады.

Бұл мәселелердің шешімдеріне кәріз жүйелерін жобалау мен орнатуды жақсарту, жоғары сапалы материалдарды пайдалану және септиктерге тұрақты техникалық қызмет көрсету кіреді. Биологиялық сүзгілер мен аэробты қондырғылар сияқты суды тазартудың заманауи технологияларын енгізу маңызды. Кәріз жүйелерін дұрыс пайдалану және күтіп ұстау туралы халықтың хабардарлығын арттыру, бұл жиі сыну мен ластанудың алдын алуға көмектеседі.

Сонымен қатар, септиктердің толып кетуіне жол бермеу үшін олардың жүктелуін бақылау және жауын-шашынды үнемі сорып отыру маңызды, бұл жүйенің қызмет ету мерзімін ұзартуға көмектеседі. Құбыр оқшаулағыштары мен жабдықтарын пайдалану суық қыста қатып қалу қаупін айтарлықтай төмендетуі мүмкін. Септикалық резервуардағы су деңгейінің датчиктері сияқты автоматтандырылған бақылау жүйелерін енгізу проблемаларды уақтылы анықтауға және олардың өршуіне жол бермеуге көмектеседі. Сондай-ақ, септиктерге олардың қалыпты жұмысын бұзуы мүмкін заттардың түсуіне жол бермеу үшін жүйеге кіретін судың сапасын бақылауды күшейту қажет. Жеке үй иелері үшін ең аз техникалық қызмет көрсетуді өз бетінше жүргізе

алатындай және туындаған ақауларға уақтылы жауап бере алатындай оқыту бағдарламаларын әзірлеу және енгізу маңызды.

Тұрақты тексерулер мен профилактикалық қызмет көрсету кәріз жүйесінің тұрақтылығы мен ұзақ мерзімді жұмысын қамтамасыз етудің негізгі шаралары болып табылады.

ӘОЖ 614.8
ҒТАХР 81.93.25

Хайрова Н.Б., техника ғылымдарының магистрі https://orcid.org/0009-0005-5973-3289
«Жәңгір хан атындағы Батыс Қазақстан аграрлық-техникалық университеті» КеАҚ, Орал қ., Жәңгір хан көш., 51, 090009, Қазақстан Республикасы**,** naz.khayyr.20@bk.ru
Кабдолов Ж.Ж., Өрт сөндіру қызметі жедел кезекшісінің орынбасары, азаматтық қорғау майоры.
Орал қ., Новосельская көш., 16, 090009, Қазақстан Республикасы,Zharas90.kz@mail.ru

Khairova N., master of technical sciences, https://orcid.org/0009-0005-5973-3289
NJSC«West Kazakhstan Agrarian and Technical University named after Zhangir Khan», Uralsk, st. Zhangir khan 51,090009, Kazakhstan, naz.khayyr.20@bk.ru
Kabdolov Zh. Zh. Deputy operational duty officer of the fire service, Major of Civil Protection. Uralsk, Zhangir Khan STR. 51, 090009, Republic Of Kazakhstan Zharas90.kz@mail.ru

ӨНЕРКӘСІПТІК КӘСІПОРЫНДАРЫНДАҒЫ ЕҢБЕК ЖАҒДАЙЛАРЫНЫҢ ҚАУІПСІЗДІК ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ
SAFETY FEATURES OF WORKING CONDITIONS AT AN INDUSTRIAL ENTERPRISE

АҢДАТПА

Өнеркәсіптік кәсіпорындардағы еңбек жағдайларының қауіпсіздігі – бұл еңбек өнімділігін арттыру мен жұмысшылардың денсаулығын сақтау үшін маңызды факторлардың бірі. Қауіпсіз еңбек жағдайларын қамтамасыз ету тек заңнамалық талаптарға сәйкес болу ғана емес, сонымен қатар еңбек процесін дұрыс ұйымдастыру, қауіп-қатерлерді алдын ала болжау және жұмысшыларға қажетті қауіпсіздік шаралары мен білімдерді ұсыну болып табылады. Өнеркәсіп саласындағы әр түрлі қызметтер мен өндірістік процесстерге байланысты туындайтын түрлі қауіптер мен тәуекелдер бар. Олардың ішінде ең көп таралғандары – өндірістік жарақаттар, улану, өрт қауіптері, техникалық ақаулар мен жабдықтардың істен шығуы. Кәсіпорындарда қауіпсіздік шараларын іске асыру мақсатында, өндірістік техниканы бақылау, қауіпсіздік нұсқауларын сақтау және қызметкерлерге арнайы тренингтер ұйымдастыру керек. Сонымен қатар, еңбек жағдайларының қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін мемлекеттік және халықаралық стандарттарға сәйкес келетін стандарттар мен нормативтерді енгізу маңызды. Осы мақалада өнеркәсіптік кәсіпорындардағы еңбек жағдайларының қауіпсіздігіне қатысты негізгі ерекшеліктер мен қауіп-қатерлер талданып, оларды төмендету шаралары ұсынылады.

ANNOTATION

The safety of working conditions at industrial enterprises is one of the most important factors for increasing labor productivity and maintaining the health of workers. Ensuring safe working conditions is not only compliance with legislative requirements, but also the correct Organization of the labor process, foreseeing risks and providing workers with the necessary safety measures and knowledge. There are various risks and risks that arise in connection with

various services and production processes in the field of industry. Among them, the most common are industrial injuries, poisoning, fire hazards, technical failures and equipment failures. In order to implement safety measures at enterprises, it is necessary to monitor production equipment, comply with safety instructions and organize special trainings for employees. In addition, to ensure the safety of working conditions, it is important to introduce standards and regulations that meet state and international standards. In this article, the main features and risks related to the safety of working conditions at industrial enterprises are analyzed and measures to reduce them are proposed.

Кілт сөздер: *жазатайым оқиға, қауіпсіздік бағдарламасы, қауіпсіз және салауатты еңбек жағдайлары, жарақаттану мен кәсіптік аурулардың экономикалық салдары, қауіпті және зиянды өндірістік факторлар, жұмыс орны, еңбек жағдайларын бағалау, жарақаттану қаупін жою жөніндегі практикалық іс-шаралар.*

Keywords: *accident, safety program, safe and healthy working conditions, economic consequences of injuries and occupational diseases, dangerous and harmful production factors, workplace, assessment of working conditions, practical measures to eliminate the risk of injury.*

Кіріспе. Әрбір жұмыс орнында және тұтастай алғанда кәсіпорында қауіпсіз және салауатты жағдайларды қамтамасыз ету еңбек өнімділігінің жоғары деңгейіне қол жеткізудің негізгі шарттарының бірі болып табылады, нәтижесінде тұтастай алғанда өндірістің рентабельділігі мен экономикалық тиімділігін арттыру болып табылады.

Жұмыс берушілер үшін өндірістік жазатайым оқиғалар мен қызметкерлердің кәсіптік ауруларының экономикалық салдары келесі шығындарды қамтиды:

- тікелей-жазатайым оқиғалардан зардап шеккендерге келтірілген зиянды өтеу шығындары, сондай-ақ оларды емдеуге және оңалтуға арналған шығындар.

- жанама-істен шыққан жабдықты жөндеуге және жұмыс орнын ретке келтіруге (цехты, алаңды тазарту және жинау), кәсіпорынның қалыпты жұмысын қалпына келтіруге және т.б. талап етілетін жұмыс уақытының жоғалуы.

Сонымен қатар, электронды жабдықпен жұмыс істеу де қауіпті болуы мүмкін. Дұрыс емес электр жабдықтары қызметкерлердің электр тогының соғуына әкелуі мүмкін, бұл елеулі проблемаларды тудырады.

Жұмысшылар жұмыс орнындағы жабдықтардың түрлері мен қауіптері туралы білуі керек. Бұл оларға осындай қауіптер мен жағымсыз жағдайлардан аулақ болуға мүмкіндік береді. Сонымен қатар, жұмыс берушілер қызметкерлерді машиналар мен жабдықтарды дұрыс пайдалану мен күтіп ұстауға үйретуі керек.

- Жұмыс орнында қауіпсіздік бағдарламаларын енгізу:

Қауіпсіздік бағдарламасын құрудың алғашқы қадамы - барлық қызметкерлерді жұмыс орнындағы қауіпсіздікті қамтамасыз етуге тарту. Мұны істеудің бір жолы-компанияның миссиясына ра - бөшкедегі қауіпсіздікті қосу. Қауіпсіздік саясатын сақтау әр қызметкердің міндеті болуы керек.

Жұмыс берушілер жұмыс орнындағы барлық жазатайым оқиғаларды тексеруі керек. Олар қызметкерлерді барлық қауіпсіздік процедураларын сақтауға шақыруы керек.

Сонымен қатар, жұмыс берушілер оларды жазбаша түрде сақтамау қаупі туралы нақты мәлімдеуі керек. Бұл қателіктердің ықтималдығын азайтады [8].

- Қызметкерлерді қауіпсіздік техникасына тиісті оқытуды қамтамасыз ету:

Оқыту қызметкерлерді жазатайым оқиғалардан қорғау үшін әрбір компанияның қауіпсіздік бағдарламасының маңызды бөлігі болып табылады. Зерттеулер көрсеткендей, жаңа қызметкерлердің жұмыс орнында жазатайым оқиғалар қаупі жоғары.

Жұмыс орнындағы қауіптер мен дұрыс жұмыс әдістері туралы білімнің болмауы бұл үлкен тәуекелді тудырады.

Жұмыс берушілер қызметкерлерді өндірістегі жазатайым оқиғаларды азайту үшін қажетті дайындықпен қамтамасыз етуі керек. Жұмысшылар барлық жабдықтар мен механизмдерді қауіпті және тиісті түрде пайдалануы керек.

Мысалы, жұмыс берушілер қызметкерлерді ауыр техникамен жұмыс істеуге тиісті түрде үйретуі керек. Мұндай жабдықты тек оқытылған немесе сертификатталған қызметкерлер ғана пайдалануы керек. Сондықтан сарапшылардың қауіпсіздік техникасы бойынша қызметкерлерді оқытуы маңызды [5].

- Қорғаныс жабдықтарын пайдалану:

Жұмыс орнында жарақат алу қаупін азайту үшін киінген жабдықты пайдалану ұзақ жолға түседі. Бұл талапты орындамау жарақатқа немесе тіпті өлімге әкелуі мүмкін.

Қызметкерлерге химиялық заттармен, машиналармен, электроникамен және басқа да ықтимал өндірістік қауіптермен жұмыс істеу қажет болуы мүмкін. Жұмыс берушілер мұндай қызметкерлерді жеке қорғаныс құралдарымен (ЖҚҚ) қамтамасыз етуге міндетті.

ЖҚҚ қауіпсіз жобаланған, құрастырылған және ыңғайлы орналастырылған болуы керек. ЖҚҚ мысалдары қолғап, көзілдірік, киім, құлаққап, дулыға және т. б.

- Қауіпті еңбек жағдайлары туралы хабарлау:

Қызметкерлер кез - келген қауіпсіздік қатерлері немесе жұмысшылар туралы басшылыққа хабарлауы керек. Жұмыс берушілер заң бойынша өз қызметкерлері үшін қауіпсіз еңбек жағдайларын қамтамасыз етуге міндетті. Олар жұмыс орнындағы қауіпсіздік қатерлерін жойып, жұмыс орнындағы қауіпсіздікті қамтамасыз етуге ықпал етуі керек [3].

- Байсалдылық пен қырағылық:

Жұмыс орнындағы өлім-жітімнің негізгі себептерінің бірі - нашақорлық. Нашақорлық өндірістегі барлық өлім-жітімнің шамамен 40% - причиной жауап береді.

Алкогольге немесе есірткіге ұшыраған адамдар сергек емес. Олардың шешім қабылдау қабілеті, үйлестіру, шоғырлану және қозғалысты бақылау бұзылады. Бұл жұмыс орнында жарақат алу және өлім қаупін тудырады.

- Механикалық көмекші құралдарды пайдалану:

Өнеркәсіптік жұмыс ауыр техникамен жұмыс істеу үшін қызметкерлерді қажет етуі мүмкін. Ауыр заттарды көтеруге және жылжытуға тырысумен байланысты көптеген жарақат алу қаупі бар. Қызметкерлер қолмен көтерудің орнына конвейер таспасын, жүк көтергішті немесе арбаны пайдалана алады.

- Төтенше жағдайлар кезінде шығуға оңай қол жеткізу:

Төтенше жағдайда апаттық шығуларға оңай қол жеткізу маңызды. Апаттық шығуларға оңай қол жеткізу жарақаттар мен құрбандардың санын азайтады.

Сондай - ақ, авариялық жағдайлар туындаған жағдайда жабдықты тез ажырата білу маңызды.

Өнеркәсіптік қауіпсіздіктің маңыздылығы жыл сайын өндірісте миллиондаған жазатайым оқиғалардың орын алуына байланысты жүзеге асырылды, бұл миллиондаған адам-сағат, машина-сағат және т. б. баламалы өндіріс уақытын жоғалтуға әкеледі.

Олардың ішінде өндіріс уақытының бестен бір бөлігін уақытша немесе тұрақты еңбекке жарамсыздықтан зардап шеккендер жоғалтады, ал қалған өндірістік уақытты басқа операторлар / адамдар зардап шеккендерге көмек көрсету, жазатайым оқиға салдарынан келтірілген залалды жою және т. б. жоғалтады. жазатайым оқиғалардан болатын өлім жағдайларын есепке алу [5].

Сондықтан өнеркәсіптік апаттардың себептерін анықтау /зерттеу және олармен күресу шараларын қабылдау өте маңызды. Көптеген пәндер қауіпсіздікті қамтамасыз етудің осы тәсілімен байланысты. Өнеркәсіптік жобалау-тиімді жұмыс орнын, жабдықты және өнеркәсіптік орналасуды жобалаумен айналысатын салалардың бірі.

Қауіпсіздік қажеттілігі мен қамқорлығы-бұл шұғыл қажеттілік. Апаттың кейбір тікелей шығындары / салдары бар, бірақ онымен байланысты белгілі бір жанама шығындар бар, мысалы, машинаның тоқтап қалу уақыты, машинаның зақымдануы, жақын маңдағы жабдықтың тамаша жұмыс уақыты және жұмысшылар арасында пайда болатын сұмдық, уақытты жоғалту және т. б. көмек көрсету шығындарының өтемақысы, заңды салдары және онымен байланысты шығындар және т. б. Осылайша, қауіпсіздік шаралары шығындардың асып кетуін болдырмайды / болдырмайды, сонымен қатар жұмысшылар / операторлар алдында олардың моральдық жауапкершілігін орындауды білдіреді.

Осылайша, келесі қорытындылар жасауға болады. Қауіпсіз жұмыс ортасы бүкіл әлемдегі жақсы компаниялардың ерекшелігі болып табылады. Барлық қызметкерлер өздерінің қауіпсіздігі мен қорғалуына сенімді болғысы келеді.

Жұмыс орнындағы қауіпсіздік маңызды мәселе болып табылады. Жұмыс берушілер өз қызметкерлерінің қауіпсіз жағдайда жұмыс істеуін қамтамасыз етуі керек.

Басқару жүйелері мен бизнес иелері жұмыс орнындағы қауіпсіздікті қамтамасыз етуге жауапты. Жұмыс берушілер қызметкерлерді қауіпсіз әдістерді қабылдауға және қорғаныс жабдықтарын пайдалануға шақыруы керек. Олар қауіпсіздік саясаты мен қауіпсіздік бағдарламаларын ынталандыруы керек.

Сондай-ақ, қызметкерлер қауіпті механизмдерді пайдалану қаупі туралы хабардар болуы керек.

Зерттеу әдістемесі мен материалдар. Әрбір мекемеде қауіпсіздік пен денсаулыққа қауіп бар. Жұмыс орнындағы қауіпсіздікке әсер ететін факторларға қауіпті еңбек жағдайлары, экологиялық қауіптер, нашақорлық және жұмыс орнындағы зорлық - зомбылық жатады.

Сондықтан жұмыс орнындағы еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау шаралары қажет. Олар жұмыс берушілер мен жұмысшылардың әл-ауқаты үшін өте маңызды. Адам жұмыстан аман-есен оралатынын біле отырып, өзіне деген сенімділік сезімі бәрінен де маңызды.

Мысалы, ат компаниясында жұмыс істейтін қызметкерлерге ақаулы сымдармен немесе электроникамен жұмыс істеу қажет болуы мүмкін. Құрылыс компаниясында қызметкерлер ауыр техниканы пайдалану кезінде қауіп - қатерге ұшырауы мүмкін.

Осы тәуекелдермен күресу үшін жұмыс берушілер жұмыс орындарындағы қауіпсіздікті қамтамасыз ететін және жеңілдететін стратегияларды әзірлеуі керек.

Сондай - ақ, жұмыс берушілер өз қызметкерлерінің қажетті аспектілерін қауіпсіздік пен қорғаныс тұрғысынан қарастыруы керек. Бұл өнімдер мен қызметтердің өнімділігі мен сапасын арттыруға көмектеседі.

Қауіпсіз және сау жұмыс ортасының кейбір артықшылықтары:

- Жұмыс ортасы неғұрлым қауіпсіз болса, соғұрлым өнімді болады. Өнімді қызметкерлер барлық компаниялар үшін актив болып табылады. Мысалы, өнімді қызметкерлер аз уақыт ішінде көбірек өнім шығара алады, бұл операциялық шығындарды азайтады.

- Жұмыс орнындағы қауіпсіздік жұмысшылардың да, жұмыс берушілердің де әл-ауқатына ықпал етеді. Жақсы қауіпсіздік денсаулықты жақсартуды білдіреді. Дені сау қызметкерлер тапсырмаларды тиімдірек орындайды және жалпы бақытты.

- Қауіпсіз жұмыс ортасында жазатайым оқиғалар өте аз. Бұл қауіпсіздік бойынша тергеу жүргізудің тоқтап қалу уақытының қысқаруына және жұмысшылардың өтемақы шығындарының төмендеуіне әкеледі. Бұл сонымен қатар қызметкерлердің жарақаттан кейін қалпына келу уақытын қысқартады.

- Өнеркәсіптік жабдықтың зақымдануы оны ауыстыру және жөндеу шығындарына әкеледі. Алдын алу - жұмыс орнындағы жарақаттар мен өндірістік жабдықтардың зақымдануы шығындарды азайтуға және пайданы арттыруға әкеледі.

- Егер жұмыс берушілер өз қызметкерлерінің қауіпсіздігі туралы алаңдаса, қызметкерлер өздерін сенімді және жайлы сезінеді. Сонымен қатар, жұмысқа келмеу деңгейі төмендейді және қызметкерлер өз міндеттерін орындауға көбірек көңіл бөледі [7]:

- Жұмыс орнындағы қауіптер туралы хабардар болу және анықтау:

Бұл қауіпсіз жұмыс ортасын құрудың алғашқы қадамы. Жұмыс берушілер алдымен жұмыс орнындағы қауіптер мен қауіпсіздік мәселелерін анықтауы керек. Содан кейін олар оларды жою үшін тиісті шараларды қабылдауы керек.

Жұмыс орнындағы қауіпсіздік қатерлеріне механикалық ақаулар, қауіпті химиялық заттар, қауіпті электр жабдықтары және т. б.

Механикалық ақаулар жабдықты жұмыс орнында пайдалану кезінде кез келген уақытта пайда болуы мүмкін. Сонымен қатар, ауыр техникамен жұмыс істеу өте қауіпті және жазатайым оқиғаларға әкелуі мүмкін.

Егер қызметкерлерге химиялық заттармен жұмыс істеу қажет болса, олар өте мұқият болуы керек. Қауіпті химиялық заттар қызметкерлерді күйдіруі немесе уландыруы мүмкін. Оларды ингаляциялау немесе жұту тіпті өлімге әкелуі мүмкін.

Зерттеу нәтижелері. Қазақстан Республикасының жаңа Еңбек кодексінің (ҚР ЕК) 23-бабына сәйкес, жұмыс беруші өндірістегі тәуекелдерді алдын алу үшін қажетті шараларды қабылдауға міндетті. Сонымен қатар, өндірістік және ғылыми-техникалық прогреске сәйкес профилактикалық жұмыстарды жүргізу де маңызды. ҚР ЕК 22-бабы бойынша, әр қызметкер еңбек қауіпсіздігі мен еңбекті қорғау туралы толық және сенімді ақпарат алуға, сондай-ақ жұмыс орнын еңбек қауіпсіздігі талаптарына сай жабдықталған және денсаулығына зиян келтірмейтін жағдайда болуына құқылы.

Бұл талаптар еңбек қауіпсіздігі мен еңбекті қорғауды ұйымдастырудың негізгі принциптерін көрсететін Еңбек кодексінің 19-тарауында кеңінен қарастырылған. Мысалы, ҚР ЕК 181-бабында қызметкердің жұмыс орны мен ұйымның аумағының қауіпсіздігіне қатысты құқықтары айқындалған. Сонымен қатар, жұмыс беруші жұмыс орындарында қауіпсіздік шараларын жүзеге асырып, тәуекелдерді болдырмау үшін әртүрлі профилактикалық шараларды қабылдауға міндетті. Авариялық жағдайларды алдын алу мақсатында шұғыл әрекеттер қабылдануы тиіс.

ҚР ЕК 184-бабында жұмыс орындары мен ғимараттарға қатысты қауіпсіздік талаптары нақты көрсетілген. Ғимараттардың құрылымы еңбек қауіпсіздігі мен еңбекті қорғау талаптарына сай болуы тиіс, жұмыс жабдықтары қауіпсіздік стандарттарына сәйкес келуі және жұмысшылардың қауіпсіздігіне қажетті қорғаныс құрылғылары болуы керек. Сонымен қатар, жұмыс орындарындағы санитарлық-эпидемиологиялық талаптар да сақталуы тиіс.

Осыған байланысты жұмыс беруші жұмыс орындарында қауіпсіз еңбек жағдайларын қамтамасыз ету міндетін көтереді. Бұл мақсатқа жету үшін, ҚР ЕК 181-бабына сәйкес, жұмыс беруші жұмыскерлер өкілдерінің қатысуымен және еңбек жөніндегі уәкілетті мемлекеттік орган бекіткен қағидалар бойынша өндірістік объектілерді аттестаттауды өткізуге міндетті. Аттестаттау процесі еңбек жағдайларын бағалауды қамтиды және оның нәтижелері еңбек қауіпсіздігіне қатысты қажетті шараларды анықтауға мүмкіндік береді.

Аттестаттау процесінің ұйымдастырылуы және жүргізілуі арнайы комиссия арқылы жүзеге асады. Бұл комиссия аттестаттау жұмыстары мен құжаттамасын дайындап, нәтижелерді еңбек жөніндегі уәкілетті органға жеткізеді. Аттестаттау нәтижелері еңбек жағдайларының қауіпсіздігіне қатысты шешімдер қабылдауға негіз болады.

Өндірістік объектілерді еңбек жағдайлары бойынша аттестаттаудан өткізудің бірнеше кезеңі бар. Алдымен, қауіпсіздік талаптарын бұзатын факторлар анықталып, жұмыс орнындағы қауіптер мен тәуекелдер бағаланады. Жұмыс орнының қауіпсіздігі

әртүрлі сыныптарға бөлінеді, мысалы, оңтайлы, рұқсат етілген, зиянды және қауіпті жағдайлар.

Қауіпсіздік талаптарының бұзылуын анықтау және оны жою үшін практикалық іс-шаралар әзірленеді. Бұл шаралар жұмыс орнындағы тәуекелдерді азайтуға бағытталған, сонымен қатар, еңбек жағдайларының қауіпті факторларын жоюға көмектеседі. Жұмыс орнындағы қауіпсіздік жағдайларын жақсарту үшін қажет барлық іс-шаралар іске асырылып, олар жұмысшылардың денсаулығын қорғауға мүмкіндік береді.

Қорытынды. Қорытындылай келе, жұмыс орнындағы еңбек жағдайларын бағалау – бұл жұмысшылардың қауіпсіздігі мен денсаулығын қамтамасыз ету үшін қажетті іс-шараларды жоспарлау мен жүзеге асыруға негіз болатын процесс. Бағалау нәтижелері қауіпсіздік жағдайларын жақсарту бойынша нақты шешімдер қабылдауға мүмкіндік береді. Дегенмен, қазіргі уақытта қолданылып жүрген әдістер жұмыс орындарындағы еңбек қауіпсіздігін толық қамтамасыз етуге жеткіліксіз, сондықтан қазіргі заман талаптарына сай жаңа бағалау әдістерін әзірлеу өте маңызды болып табылады.

ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

1. Қазақстан Республикасы Статистика агенттігінің ресми сайты. Электрондық ресурс: қол жеткізу режимі: http://stat.gov.kz.

2. Қазақстан Республикасы. Заң. Қазақстан Республикасының Еңбек кодексі 23.11.2015 ж. №414-V ҚРЗ (01.01.2016 ж. қолданысқа енгізілді) - Астана, 2015 ж.

3. Кукин, П.П. Өмір қауіпсіздігі: технологиялық процестер мен өндірістердің қауіпсіздігі: жоғары оқу орындарына арналған оқу құралы / П.П.Кукин, В.Л. Лапин, Н.Л. Пономарев және т. б. – 5-ші басылым. М.: жоғары мектеп. 2009. – 335 Б.

4. Зотов, Б.И. Безопасность жизнедеятельности на производстве. Учебник/ Зотов Б. И., Курдюмов В. И. -2-е изд., перераб. и доп.-М.: КолосС, 2012.- 432 с

5. Нысанқұлов, І.Б. Өмір қауіпсіздігінің негіздері: оқу құралы / І.Б. Нысанқұлов, С.Ж. Тоқтабеков, Н.Ж. Қожамжаров. – Қарағанды, 2012.

6. Анохин А. В. Социально-экономические критерии, обеспечивающие безопасные условия труда // Вестник евразийской науки. 2015. № 4. С. 1—10.

7. Беляков С. А., Баянова Е. Ю. О некоторых вопросах экономики безопасности труда в развитых странах // Электронный научно-методический журнал Омского ГАУ. 2015. № 1. С. 94—98.

8. Левченко Е. В. Роль психологических качеств человека в безопасности труда // Психология и педагогика: методика и проблемы практического применения. 2016. № 54. С.

9. Өнеркәсіптік кәсіпорында өндірісті адаптивті басқаруды автоматтандыру: моногр. / Авторлар жинағы. - М.: Бибком, 2019. - 693 б.

10. Бугаева, Т Өнеркәсіптік кәсіпорында өндіріс мәдениетін дамыту механизмі //Татьяна Б - М.: LAP Lambert Academic Publishing, 2018. - 160 б.

11. Өнеркәсіптік кәсіпорындағы бухгалтерлік есеп. - М.: Қаржы, 2018. - 272 б.

12. Өнеркәсіптік кәсіпорындар мен бірлестіктердегі бухгалтерлік есеп. Анықтамалық кітап. - М.: Картя Мол-довеняска, 2020. - 296 б.

13. Быковская, Е.В. Өнеркәсіптік кәсіпорынның технологиялық бәсекеге қабілеттілігін стратегиялық басқару (Тамбов облысының өнеркәсіптік кәсіпорындарының мысалында) // Е. В. Быковская. - М.: Русиндер, 2020. - 492 б.

14. Өнеркәсіптік кәсіпорындарда (бірлестіктерде) еңбек өнімділігінің өсу резервтерін анықтау және бағалау. Әдістемелік ұсынымдар. - М.: Экономика, 2021. - 123 б.

15. Горелов, Дмитрий Өнеркәсіптік кәсіпорындарда бизнес-жоспарлау сапасын қамтамасыз етудің ұйымдастырушылық-экономикалық аспектілері / Дмитрий Горелов. - М.: Дашков және К, 2018. - 960 б.

16. Губич, Л.В. Өнеркәсіптік кәсіпорындарда өнімнің өмірлік циклін қолдаудың ақпараттық технологияларын енгізу / Л.В. Губич, М. Я. Ковалев, Н. И. Паткевич. - М.: Беларусь Навука, 2021. - 190 с.

REFERENCES

1. Qazaqstan Respublikasy Statistika agenttiginің resmi sajty. Elektrondyқ resurs: qol zhetkizu rezhimi: http://stat.gov.kz.

2. Qazaqstan Respublikasy. Zaң. Qazaqstan Respublikasynyn Enbek kodeksi 23.11.2015 zh. №414-V ҚRZ (01.01.2016 zh. қoldanysқa engizildi) - Astana, 2015 zh.

3. Kukin, P.P. Өmir қauipsizdigi: tekhnologiyalyқ procester men өndiristerdің қauipsizdigi: zhoғary oқu oryndaryna arnalғan oқu құraly / P.P.Kukin, V.L. Lapin, N.L. Ponomarev zhәne t. b. – 5-shi basylym. M.: zhoғary mektep. 2009. – 335 B.

4. Zotov, B.I. Bezopasnost' zhiznedeyatel'nosti na proizvodstve. Uchebnik/ Zotov B. I., Kurdyumov V. I. -2-e izd., pererab. i dop.-M.: KolosS, 2012.- 432 s

5. Nysanqulov, I.B. Omir qauipsizdiginin negizderi: oqu quraly / I.B. Nysanqulov, S.ZH. Toqtabekov, N.ZH. Qozhamzharov. – Qaragandy, 2012.

6. Anohin A. V. Social'no-ekonomicheskie kriterii, obespechivayushchie bezopasnye usloviya truda // Vestnik evrazijskoj nauki. 2015. № 4. S. 1—10.

7. Belyakov S. A., Bayanova E. YU. O nekotoryh voprosah ekonomiki bezopasnosti truda v razvityh stranah // Elektronnyj nauchno-metodicheskij zhurnal Omskogo GAU. 2015. № 1. S. 94-98.

8. Levchenko E. V. Rol' psihologicheskih kachestv cheloveka v bezopasnosti truda // Psihologiya i pedagogika: metodika i problemy prakticheskogo primeneniya. 2016. № 54. S.

9. Onerkәsiptik kәsiporynda өndiristi adaptivti basқarudy avtomattandyru: monogr. / Avtorlar zhinaғy. - M.: Bibkom, 2019. - 693 b.

10. Bugaeva, T Onerkәsiptik kәsiporynda өndiris mәdenietin damytu mekhanizmi //Tat'yana B - M.: LAP Lambert Academic Publishing, 2018. - 160 b.

11. Onerkәsiptik kәsiporyndaғy buhgalterlik esep. - M.: Қarzhy, 2018. - 272 b.

12. Onerkәsiptik kәsiporyndar men birlestikterdegi buhgalterlik esep. Anyқtamalyқ kitap. - M.: Kartya Mol-dovenyaska, 2020. - 296 b.

13. Bykovskaya, E.V. Өnerkәsiptik kәsiporynnyң tekhnologiyalyқ bәsekege қabilettiligin strategiyalyқ basқaru (Tambov oblysynyң өnerkәsiptik kәsiporyndarynyң mysalynda) // E. V. Bykovskaya. - M.: Rusinder, 2020. - 492 b.

14. Onerkәsiptik kәsiporyndarda (birlestikterde) eңbek өnimdiliginің өsu rezervterin anyқtau zhәne baғalau. Adistemelik ұsynymdar. - M.: Ekonomika, 2021. - 123 b.

15. Gorelov, Dmitrij Өnerkәsiptik kәsiporyndarda biznes-zhosparlau sapasyn қamtamasyz etudің ұjymdastyrushylyқ-ekonomikalyқ aspektileri / Dmitrij Gorelov. - M.: Dashkov zhәne K, 2018. - 960 b.

16. Gubich, L.V. Өnerkәsiptik kәsiporyndarda өnimnің өmirlik ciklin қoldaudyң aқparattyқ tekhnologiyalaryn engizu / L.V. Gubich, M. YA. Kovalev, N. I. Patkevich. - M.: Belarus' Navuka, 2021. - 190 c.

РЕЗЮМЕ

Безопасность условий труда на промышленных предприятиях-один из важнейших факторов повышения производительности труда и сохранения здоровья работников. Обеспечение безопасных условий труда - это не только соблюдение законодательных требований, но и правильная организация трудового процесса, предвидение рисков и предоставление работникам необходимых мер безопасности и знаний. Существуют различные риски и риски, возникающие в связи с различными видами деятельности и производственными процессами в промышленности. Наиболее распространенными из

них являются производственные травмы, отравления, пожарные опасности, технические неисправности и отказы оборудования.

В целях реализации мер безопасности на предприятиях необходимо контролировать производственную технику, соблюдать правила техники безопасности и организовывать специальные тренинги для сотрудников. Кроме того, для обеспечения безопасности условий труда важно введение стандартов и нормативов, соответствующих государственным и международным стандартам. В данной статье будут проанализированы основные особенности и риски, связанные с безопасностью условий труда на промышленных предприятиях, и предложены меры по их снижению.

ӘОЖ 004.8
ҒТАХР 28.23.15

Касымова А.Х., педагогика ғылымдарының кандидаты, қауымдастырылған профессор, https://orcid.org/0000-0002-4614-4021
«Жәңгір хан атындағы Батыс Қазақстан аграрлық-техникалық университеті» КеАҚ, Орал қ., Жәңгір хан көш., 51, 090009, Қазақстан Республикасы , kasimova_ah@mail.ru)

Kassymova A., pedagogical sciences, associate professor, https://orcid.org/0000-0002-4614-4021
NJSC«West Kazakhstan Agrarian and Technical University named after Zhangir Khan», Uralsk, st.Zhangir khan 51,090009, Kazakhstan, kasimova_ah@mail.ru

ЖАСАНДЫ ИНТЕЛЛЕКТ: МҮМКІНДІКТЕРІ МЕН ҚАУІПТЕРІ
ARTIFICIAL INTELLIGENCE: OPPORTUNITIES AND DANGERS

ТҮЙІН

Жасанды интеллект (ЖИ) – адам интеллектісінің мүмкіндіктерін имитациялайтын технологиялар жиынтығы. Ол үлкен деректерді өңдеу, үлгілерді тану, шешім қабылдау және табиғи тілді өңдеу сияқты салаларда кеңінен қолданылады. Жасанды интеллект (ЖИ)технологиялық дамудың қарқынды өсуі жасанды интеллекттің (ЖИ) маңыздылығын арттыратындығы өзекті болып саналып, ЖИ алгоритмдері білім беру, медицина, қаржы, өндіріс және басқа да салаларда тиімділікті арттырып, инновациялық шешімдер ұсынуда. Сонымен қатар, негізгі мақсаты – адам әрекеттерін еліктеу, жақсарту және кейбір жағдайда оларды алмастыру арқылы әртүрлі мәселелерді шешу екендігі алына отырып, ЖИ-дің қарқынды дамуы этикалық мәселелер мен қауіптерді де тудырады, соның ішінде жұмыс орындарының қысқаруы және жеке мәліметтердің қорғалуы сипатталған. Сондықтан да, ЖИ-ді дамытудың болашағы оның қауіпсіз әрі жауапкершілікпен қолданылуына байланысты. Жасанды интеллект (ЖИ) – қоршаған ортаны талдау, шешім қабылдау және адам интеллектісіне ұқсас есептерді шешуге қабілетті технологиялар жиынтығы. Ол машинамен оқыту, терең нейрондық желілер, табиғи тілді өңдеу, компьютерлік көру және үлкен деректерді талдау сияқты әдістерді қамтиды. ЖИ басты міндеті – адамның интеллектуалды қызметін жеңілдету, автоматтандыру және тиімділігін арттыру.

Мақалада, технология әртүрлі салаларда қолданылып, көптеген мәселелерді шешуге болатынығы және ЖИ бүгінде медицина, қаржы, өндіріс, білім беру, көлік және қызмет көрсету салаларында кеңінен қолданылатындығы. Оның көмегімен диагноз қою, деректерді болжау, процестерді автоматтандыру және пайдаланушыға бағытталған шешімдер қабылдау мүмкін болдындығы ашып көретіген. Алайда, жасанды интеллекттің қарқынды дамуы бірқатар этикалық және әлеуметтік мәселелерді тудырады. Жұмыс орындарының қысқаруы, алгоритмдердің әділетсіздігі, деректердің құпиялылығы мен қауіпсіздігі – бұл технологияны жауапкершілікпен дамытуды талап

ететін негізгі проблемалар. Осыған байланысты, ЖИ-ді тиімді әрі қауіпсіз пайдалану үшін заңнамалық реттеу, этикалық стандарттарды қалыптастыру және адам мен машинаның үйлесімді өзара әрекеттесуін қамтамасыз ету маңызды. Жасанды интеллект болашақта адамзат өмірін түбегейлі өзгертетін технология ретінде әлеуетке ие, бірақ оның дамуы мұқият бақылауды және реттеуді қажет етеді.

ANNOTATION

Artificial intelligence (AI) is a set of technologies that simulate the capabilities of human intelligence. It is widely used in areas such as big data processing, pattern recognition, decision making, and natural language processing. Artificial intelligence (AI)it is considered relevant that the rapid growth of technological development increases the importance of artificial intelligence (AI), and AI algorithms improve efficiency and provide innovative solutions in education, medicine, finance, manufacturing and other areas. At the same time, assuming that the main goal is to solve various problems by imitating, improving and, in some cases, replacing human actions, the rapid development of AI also poses ethical problems and risks, including job cuts and the protection of personal data, are described. Therefore, the prospects for the development of AI depend on its safe and responsible use. Artificial intelligence (AI) is a set of technologies capable of analyzing the environment, making decisions and solving problems similar to human intelligence.

It includes techniques such as machine learning, deep neural networks, natural language processing, computer vision, and Big Data Analysis. The main task of AI is to simplify, automate and increase the efficiency of human intellectual activity. The article states that technology can be used in various fields and solve many problems, and that AI is widely used today in the fields of medicine, finance, manufacturing, education, transport and services. With its help, it was possible to diagnose, predict data, automate processes and make user-oriented decisions. However, the rapid development of artificial intelligence raises a number of ethical and social problems. Job cuts, unfair algorithms, and data privacy and security are the main challenges that require Responsible Technology Development. In this regard, for the effective and safe use of AI, legislative regulation, the formation of ethical standards and ensuring harmonious human-machine interaction are important. Artificial intelligence has the potential as a technology that will radically change human life in the future, but its development requires careful monitoring and regulation.

Кілт сөздер: *жасанды интеллект, машиналық оқыту,терең оқыту, нейрондық желілер,үлкен деректер, табиғи тілді өңдеу,компьютерлік көру,робототехника, деректерді өңдеу, шешім қабылдау жүйелері, заманауи технология, интеллектуалды шешім.*

Keywords: *Artificial intelligence,machine learning, deep learning,neural networks, big data,natural language processing,computer vision, robotics, data processing, decision-making systems, modern*

Кіріспе. Қазіргі кезеңде әлемде төртінші өнеркәсіптік революция мен цифрландыру үдерістері, олардың қоғам мен жеке адам өміріне әсері, сондай-ақ жасанды интеллекттің дамуымен байланысты салдарлар маңызды тақырыпқа айналуда**. Жасанды интеллект Қазақстан экономикасын әртараптандыруға мемлекеттік қызметкерлердің сапасын жақсартуға,адамзат деңгейің артырады деп сенім артамыз**. Жасанды интеллект (ЖИ) – адамның ойлау қабілетін модельдеуге және автоматтандыруға бағытталған технологиялар жиынтығы. Соңғы жылдары ЖИ-дің дамуы қарқынды жүріп, оның қоғамға ықпалы арта түсті. Жасанды интеллект – табиғи түрде пайда болған нәрсе емес, ол – адамның ақыл-ойының жемісі.Бұл мақалада ЖИ-дің

артықшылықтары мен кемшіліктері қарастырылады, сондай-ақ оның мүмкіндігі мен қауіптері туралы ғылыми зерттеулерге шолу жасалады.

Қазіргі заманғы технологиялық дамудың қарқынды өсуі, жасанды интеллекттің (ЖИ) өзектілігі болып саналып маңыздылығын арттырды. ЖИ адам өмірінің барлық саласына енуде, бұл оны бүгінгі күні *өзекті* ететін бірнеше негізгі факторларды анықтайды:

1. Автоматтандыру және тиімділік

✓ ЖИ өндіріс, логистика, қаржы, медицина, білім беру сияқты салаларда көптеген процестерді автоматтандырады.

✓ Бұл адамдардың уақытын үнемдеп, жұмыстың сапасын жақсартады.

2. Үлкен деректерді өңдеу

✓ Қазіргі заманғы ақпараттық қоғамда деректердің көлемі күн санап өсуде.

✓ ЖИ үлкен көлемдегі деректерді талдау, өңдеу және шешім қабылдау үшін қажет.

3. **Денсаулық сақтау және медицина**

✓ Медициналық диагностиканың дәлдігін арттыру, емдеу әдістерін жетілдіру және жаңа дәрі-дәрмектер жасау үшін қолданылады.

4. **Көлік және логистика**

✓ Автономды көліктер, ақылды жол қозғалысы жүйелері және логистикалық тізбектерді оңтайландыру арқылы көлік қауіпсіздігі мен тиімділігін жақсартады.

5. **Қауіпсіздік және қорғаныс**

✓ Киберқауіпсіздік, биометриялық тану және қылмыспен күресу салаларында маңызды рөл атқарады.

6. **Жеке өмірді жеңілдету**

✓ Смарт үйлер, дауыстық көмекшілер және ұсыныс жүйелері (мысалы, Netflix, YouTube) адамдардың күнделікті өмірін жеңілдетеді [1].

Жасанды интеллекттің негізгі *мақсаты* – адам әрекеттерін еліктеу, жақсарту және кейбір жағдайда оларды алмастыру арқылы әртүрлі мәселелерді шешу. Оның нақты мақсаттары келесідей:

1. Адам өмірін жеңілдету
2. Интеллектуалды шешім қабылдау
3. Экономикалық тиімділікті арттыру
4. Ғылым мен технологияның дамуын жеделдету
5. Адам мен машина арасындағы өзара әрекеттестікті жақсарту
6. Қауіпсіздікті күшейту [2].

Жасанды интеллекттің (ЖИ) басты *міндеті* – адамның интеллектуалды қызметін жеңілдету, автоматтандыру және тиімділігін арттыру. Бұл технология әртүрлі салаларда қолданылып, көптеген мәселелерді шешуге көмектеседі [3,4].

Толық тоқталсақ:

1. Ақпаратты өңдеу және талдау
2. Автоматтандыру және роботтандыру
3. Интеллектуалды шешім қабылдау
4. Табиғи тілді түсіну және өңдеу
5. Суреттер мен бейнелерді тану
6. Оқыту және өзін-өзі дамыту
7. Қауіпсіздікті қамтамасыз ету
8. Ғылыми және технологиялық даму [5,6].

Материалдар мен зерттеу әдістері. Біріншіден, жасанды интеллекттің артықшылықтары көптеген салаларда оң өзгерістер алып келді. Төменде оның негізгі артықшылықтары қарастырылады:

1. Экономикалық тиімділік

✓ ЖИ өндіріс пен бизнес үдерістерін оңтайландырып, шығындарды азайтады.

✓ Автоматтандырылған жүйелер жұмыс күшін алмастырып, компаниялардың өнімділігін арттырады.

2. Медицинадағы жетістіктер

✓ ЖИ медициналық диагностикада үлкен жетістіктерге жетті, мысалы, қатерлі ісікті ерте анықтау.

✓ Роботтандырылған хирургия және виртуалды көмекшілер дәрігерлердің жұмысын жеңілдетеді.

3. Білім беру саласындағы қолдану

✓ ЖИ негізіндегі платформалар жеке оқыту бағдарламаларын ұсынады.

✓ Оқушылар мен студенттер үшін оқу материалдарын бейімдеуге мүмкіндік береді.

4. Қауіпсіздік пен қорғаныс

✓ ЖИ бейнебақылау, киберқауіпсіздік және деректерді қорғау салаларында қолданылып келеді.

✓ Автономды дрондар мен қауіпсіздік жүйелері тиімділікті арттырады.

Жасанды интеллекттің – адамның интеллектуалды қызметін жеңілдету, автоматтандыру және тиімділігін арттыру болғандықтан, бұл технология келесі жолдармен жүзеге асырылады:

1. Машиналық оқыту (Machine Learning, ML)

• ЖИ үлгілері үлкен көлемдегі деректерді талдап, заңдылықтарды анықтайды.

• Өздігінен үйреніп, жаңа жағдайларға бейімделе алады.

• Қолдану салалары: дауыс тану, мәтінді өңдеу, болжам жасау.

2. Нейрондық желілер (Neural Networks)

• Биологиялық нейрондар жұмысын имитациялайтын алгоритмдер жиынтығы.

• Күрделі үлгілерді тану үшін қолданылады (мысалы, бет-әлпетті тану, сөйлеуді түсіну).

3. Табиғи тілдерді өңдеу (Natural Language Processing, NLP)

• ЖИ адамның жазбаша және ауызша тілін түсініп, өңдей алады.

• Мысалы, чат-боттар, дауыстық көмекшілер (Siri, Alexa).

4. Сараптамалық жүйелер

• Белгілі бір салада маманның орнына шешім қабылдай алатын интеллектуалды жүйелер.

• Медицинада, құқық саласында, қаржы секторында қолданылады.

5. Робототехника және автоматтандыру

• ЖИ роботтарды басқарып, өндірісті оңтайландырады.

• Өндірісте, логистикада және денсаулық сақтау саласында белсенді қолданылады.

Жасанды интеллекттің кемшіліктері мен қауіптері. ЖИ дамуы көптеген артықшылықтармен қатар белгілі бір қауіптерді де тудырады:

1. Жұмыссыздықтың артуы

- ЖИ мен автоматтандыру көптеген салаларда адам еңбегін алмастырып, жұмыссыздық деңгейін арттыруы мүмкін. Мысалы, көлік жүргізушілері мен кассирлер секілді мамандықтар жойылу қаупінде тұр.

2. Этикалық мәселелер

- ЖИ шешім қабылдау кезінде әділетсіздік немесе қателіктер жіберуі мүмкін.
- Бейтараптық пен адам құқықтарын сақтау мәселесі өзекті болып отыр.
- Қауіпсіздік қатерлері
- Кибершабуылдар мен деректердің бұзылу қаупі күшейді.
- Теріс мақсатта қолданылған ЖИ (Deepfake технологиялары) жалған ақпарат таратуда пайдаланылуы мүмкін.

3. Бақылау мен басқару мәселелері

- ЖИ-ді дұрыс бақылау қиындық тудырады.

- Кейбір сарапшылар ЖИ-дің толық дербестенуі адамзатқа қауіп төндіруі мүмкін деп болжайды.

Зерттеу нәтижелері. Ғылыми зерттеулер мен сараптамалар. Жасанды интеллектінің әлеуеті кез келген салада жетістікке жету үшін зор мүмкіндік ұсынғанымен, ол адамзатқа елеулі қатер төндіруі мүмкін. Қазіргі таңда ғылыми-техникалық прогресс қарқынды дамуда. Алайда бұл жетістіктердің адам мүмкіндіктерін шектеуі мүмкін екенін естен шығармаған жөн. Жасанды интеллектінің ықтимал қаупі туралы американдық кәсіпкер, Twitter әлеуметтік желісінің иесі Илон Маск та Дубайда өткен Әлемдік үкіметтік саммитте ерекше атап ө.Бұл көптеген ғылыми зерттеулер ЖИ-дің әлеуеті мен қауіптерін талдайды:

- Оксфорд университетінің зерттеуі: ЖИ дамуының экономикалық әсері мен оның жұмыс күшіне ықпалы.
- MIT (Массачусетс технологиялық институты) зерттеуі: ЖИ шешім қабылдау үрдісіндегі әділдік мәселелері.
- Google DeepMind зертханасының жұмыстары: Машиналық оқыту және ЖИ қауіпсіздігін қамтамасыз ету әдістері.

Жасанды интеллектті зерттегендегі мүмкіндіктері мен қауіптеріне машиналық оқыту және ЖИ қауіпсіздігін қамтамасыз ету әдістері жатады. Кейбір ғалымдар жасанды интеллектінің мұндай алгоритмдері адам санасының дамуын тежейді деп алаңдаушылық білдіруде. Олардың пікірінше, бұл алгоритмдер болашақта адамның ойлау қабілетінен де асып түсуі әбден мүмкін.

ЖИ қауіпсіздігін қамтамасыз ету және оның тиімділігін арттыру үшін бірнеше әдістер қолданылады: Қадағаланатын және қадағалаусыз машиналық оқыту 1-кестеде, ЖИ қауіпсіздігін қамтамасыз ету әдістері 2 -кестеде.

Кесте 1 - Қадағаланатын және қадағалаусыз машиналық оқыту

Машиналық оқыту түрі	Қолдану саласы	Артықшылықтары
Қадағаланатын оқыту	Медицина, қаржы	Нақты нәтижелер, алдын ала белгіленген деректермен жұмыс істеу
Қадағалаусыз оқыту	Киберқауіпсіздік, деректерді топтастыру	Үлкен көлемдегі деректерден жасырын заңдылықтарды анықтау

Кесте 2 - ЖИ қауіпсіздігін қамтамасыз ету әдістері

Әдіс	Сипаттама
Атакаға тұрақты ЖИ	ЖИ-дің хакерлік шабуылдарға төзімділігін арттыру
Этикалық алгоритмдер	ЖИ шешім қабылдаудағы әділеттілігін қамтамасыз ету
Аудит және бақылау	ЖИ әрекеттерін мониторинг жасау және реттеу

Жасанды интеллект – заманауи технологияның маңызды бағыттары. Жасанды интеллект көптеген салаларда іргелі өзгерістерге жол ашып отыр. Төмендегі мәліметтер ЖИ-дің маңыздылығын дәлелдейтін 3-кестеде.

Кесте 3 - ЖИ қауіпсіздігіне қатысты зерттеулердің нәтижелері

Сала	ЖИ ықпалы
Денсаулық сақтау	Диагностика сапасын жақсарту, емдеу әдістерін оңтайландыру
Автоматтандырылған өндіріс	Жұмыс тиімділігін арттыру, өндіріс шығындарын азайту

Көлік және логистика	Автономды көлік құралдары, маршруттарды оңтайландыру
Қаржы секторы	Алаяқтықты анықтау, автоматтандырылған инвестициялау жүйелері
Білім беру	Жеке оқыту бағдарламалары, оқыту үдерісін бейімдеу
Қорғаныс және қауіпсіздік	Бейне бақылау, киберқауіпсіздік, автономды қорғаныс жүйелері

Сарапшылардың болжамдары бойынша, ЖИ дамуы алдағы он жылдықтарда экономикалық және әлеуметтік құрылымдарда түбегейлі өзгерістерге әкелуі мүмкін.

Зерттеулер бойынша ЖИ дамуының динамикасы, ЖИ-ге қатысты ғылыми жұмыстар мен технологиялық инновациялар саны жыл сайын артып келеді. Төмендегі диаграммада (Сурет-1) соңғы он жылдағы ЖИ зерттеулерінің өсу қарқыны ғылыми зерттеулер мен сараптамалар арқылы көрсетілген. Мысалға айтқанда, болашақта ЖИ дамуы адамзатқа жаңа мүмкіндіктер ашумен қатар, оны бақылау мен басқару тетіктерін жетілдіруді талап етеді. ЖИ-дің ақпараттық технологиялардағы қолданысын қосу үшін төмендегі өзгерістерді енгізуді ұсынамын:

1. *Ақпараттық технологиялар саласындағы ЖИ қолдану мысалдары бөлімін қосу:*
- Деректерді өңдеу және талдау (Big Data, Predictive Analytics)
- Киберқауіпсіздік (ЖИ негізіндегі шабуылдарды анықтау және болдырмау)
- Бұлттық есептеулер (ЖИ арқылы тиімді серверлік басқару)
- IT қолдау қызметтері (автоматтандырылған чат-боттар мен виртуалды көмекшілер)


2. *ЖИ және ақпараттық технологиялардағы болашақ трендтер қосу*:
- Генеративті ЖИ және бағдарламалау процесін оңтайландыру
- Автоматтандырылған код жазу жүйелері (GitHub Copilot, OpenAI Codex)
- Кванттық есептеулермен интеграциясы

Біреуің алып карасақ, генеративті ЖИ және бағдарламалау процесін оңтайландыру туралы бөлімді толықтыру үшін қандай нақты аспектілерді қосуды қалайтыныңызды нақтылай аламын. Мысалы:

- Генеративті ЖИ-дің код жазу кезіндегі нақты артықшылықтары
- Жасанды интеллекттің бағдарламалау өнімділігіне әсері
- GPT-4, Codex, және басқа да құралдардың салыстырмалы талдауы
- Бағандық диаграмманы енгізу үшін төмендегі деректерді негізге алуға болады. Бұл сурет-1, ЖИ-дің негізгі артықшылықтарын салыстырмалы түрде 4-кестеде көрсетеді.

Кесте 4 - ЖИ-дің негізгі артықшылықтарын салыстырмалы түрі

Артықшылық	**Қолдану деңгейі (%)**
Экономикалық тиімділік	85%
Медицинадағы жетістіктер	78%
Білім берудегі ықпал	72%
Қауіпсіздік пен қорғаныс	88%
Автоматтандыру және өнімділік	90%



Сурет 1 - ЖИ-дің негізгі артықшылықтарын салыстырмалы диаграммасы.

Жасанды интеллекттің негізгі ғылыми жаңалықтары. Жасанды интеллект (ЖИ) соңғы жылдары қарқынды дамып, көптеген маңызды ғылыми жетістіктерге жетті. Бұл технология медицинадан бастап өнеркәсіпке дейінгі әртүрлі салаларда революциялық өзгерістер әкелуде.Төменде ЖИ-дың ең маңызды ғылыми жаңалықтары берілген.

1. Терең нейрондық желілер (Deep Learning) және машиналық оқыту

- Жетістігі: Терең оқыту (Deep Learning) технологиялары үлкен көлемдегі деректерді өңдеуде және шешім қабылдауда революция жасады.
- *Қолдану салалары:* Бейне мен суреттерді тану, табиғи тілді өңдеу, автономды көліктер.

Мысалы: Google-дың AlphaGo жүйесі 2016 жылы әлем чемпионын жеңіп, адам қабілетінен асып түсті.

2. GPT (Generative Pre-trained Transformer) және тіл модельдері

- *Жетістігі*: Open AI әзірлеген GPT үлгілері мәтіндерді түсіну, талдау және генерациялауда жаңа деңгейге жетті.
- *Қолдану салалары*: Автоматты мәтін жазу, сұрақтарға жауап беру, чат-боттар, аударма.

Мысалы: ChatGPT – күрделі сұрақтарға жауап бере алатын, шығармашылық мәтіндер жасайтын жүйе. Қазіргі уақытта әлемде төртінші өнеркәсіптік революция мен цифрландыру үдерістері кеңінен талқылануда; олардың адамзат өміріне тигізер ықпалы мен жасанды интеллекттің дамуы салдарына ерекше көңіл бөлінуде. Бұл жаңа дәуір ғылым мен техниканың жетістіктері арқылы адамзаттың өмір сүру салтын түбегейлі өзгертіп жатыр.

Алайда жасанды интеллект өздігінен пайда болған құбылыс емес – ол адамзаттың өзі жасап, дамытып отырған күрделі технология. Кез келген салада жетістікке жету үшін жасанды интеллектінің әлеуеті зор болғанымен, ол адамзатқа елеулі қатер төндіруі мүмкін. Қазіргі таңда ғылыми-техникалық прогресс қарқынды дамуда. Алайда бұл жетістіктердің адам мүмкіндіктерін шектеуі ықтимал екенін естен шығармаған жөн. Жасанды интеллектінің ықтимал қаупі туралы американдық кәсіпкер, Twitter-дің иесі Илон Маск та Дубайда өткен Әлемдік үкіметтік саммитте ерекше атап өтті.

Кейбір ғалымдар жасанды интеллектінің дамып келе жатқан алгоритмдері адам санасының дамуын тежейді деп алаңдаушылық білдіруде. Олардың пікірінше, бұл алгоритмдер уақыт өте келе адамның ойлау қабілетінен де асып түсуі мүмкін. Мұндай жағдай адам баласының өзіндік ерекшелігі мен шығармашылық қабілетіне қауіп төндіруі ықтимал.

Жақында АҚШ-тағы OpenAI компаниясы мәтін жазуға қабілетті ChatGPT атты жасанды интеллект ботын іске қосты. Зерттеушілер бұл бағдарламалық жасақтаманың

кез келген тапсырманы орындау үшін, соның ішінде емтихан барысында есептерді шешуге қолданылуы мүмкін екеніне алаңдаушылық білдіруде. Себебі, білім алушылар өз интеллектісін дамыту орнына мұндай көмекші құралдарға жиі жүгінетін үрдіс қалыптасып келеді. Осыған байланысты OpenAI компаниясы мәтінді адамның ба, әлде боттың ба жазғанын анықтайтын арнайы бағдарлама да әзірледі.

ChatGPT – көптеген мәтіндік деректер негізінде оқытылған тілдік модель. Алайда оның мүмкіндіктері шексіз емес: кей сұрақтарға нақты жауап бере алмауы немесе студенттердің барлық сұранысына дәл жауап ұсынбауы ықтимал. Осыған байланысты жоғары оқу орындарына бұл құралды оқу процесінде қолданудың тиімділігі мен қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында тиісті шаралар қабылдау ұсынылды.

Сонымен қатар, ChatGPT моделін жаңа тапсырма форматтарын әзірлеуде, білім алушылардың тек теориялық білімін ғана емес, сол білімді тәжірибеде қолдану қабілетін бағалауға бағытталған күрделі тест сұрақтарын құрастыруда қолдануға болады. Сондай-ақ бұл құрал жазбаша жұмыстарды талдау, синтаксистік қателерді анықтау, терминологияның дұрыстығын тексеру және жауаптарды автоматты түрде бағалау үшін де тиімді болуы мүмкін.

3. Бейне және сөйлеуді тану технологиялары

• *Жетістігі:* ЖИ-дың адамның сөйлеуін түсіну және тану қабілеті жақсарды.

• *Қолдану салалары**:*** Siri, Google Assistant, Alexa сияқты дауыстық көмекшілер, қауіпсіздік жүйелері, медициналық диагностика.

*Мыса*лы: Google DeepMind-тың Wavenet технологиясы табиғи дауысты синтездеуде адамға жақын сапаға жетті.

4. Автономды көліктер мен робототехника

• *Жетістігі:* Өзін-өзі басқаратын көліктер ЖИ көмегімен жол жағдайларын талдап, қауіпсіз жүру мүмкіндігін арттырады.

• *Қолдану салалары*: Tesla, Waymo, General Motors секілді компаниялардың автономды көліктері, өндірістік роботтар.

Мысалы: Tesla-ның Autopilot жүйесі жол қозғалысын тану және жүргізушісіз жүру технологияларын дамытуда.

5. Жасанды интеллекттің медицинадағы жаңалықтары

• *Жетістігі:* ЖИ ауруларды анықтау, диагноз қою және дәрілік заттарды зерттеуде үлкен жетістіктерге жетті.

• *Қолдану салалары*: Онкология, рентген сараптамасы, хирургия, дәрі-дәрмек әзірлеу.

Мысалы: IBM Watson Health – онкологиялық ауруларды анықтау және емдеуде дәрігерлерге көмек беретін жүйе.

6. Deepfake және GAN (Generative Adversarial Networks) технологиялары

• *Жетістіг*і: Жасанды интеллект суреттер, бейнелер және аудиоларды өзгертіп, жаңа контент жасай алады.

• *Қолдану салалары:* Киноөндіріс, жарнама, сандық медиада деректерді қалпына келтіру.

Мысалы: Deepfake технологиясы арқылы видео мен аудионы өзгерту мүмкіндігі пайда болды.

7. Кванттық жасанды интеллект

• *Жетістігі:* Кванттық есептеулер мен ЖИ біріктіріліп, үлкен көлемдегі деректерді өңдеудің жаңа деңгейі пайда болды.

• *Қолдану салалары:* Криптография, ғылыми зерттеулер, медицина, жасанды интеллектті жеделдету.

Мысалы: **Google**-дың Sycamore кванттық процессоры секундына триллиондаған операцияларды орындай алады.

8. ЖИ көмегімен жаңа дәрілік заттарды жасау

• *Жетістігі*: ЖИ жаңа дәрілік заттардың молекулалық құрылымын талдап, олардың тиімділігін болжау қабілетіне ие болды.

• *Қолдану салалары:* Фармацевтика, биотехнология, медициналық зерттеулер.

Мысалы: DeepMind-тың AlphaFold жүйесі ақуыз құрылымдарын болжауда үлкен жетістікке жетті.

Жасанды интеллект (ЖИ) – адамның ойлау қабілетін модельдеуге және автоматтандыруға бағытталған технологиялар жиынтығы. ЖИ адам миының логикасын, талдау қабілетін және шешім қабылдау процестерін имитациялай отырып, түрлі салаларда қолданылады. Төменде ЖИ қолданылатын негізгі мысалдар келтірілген:

• ***Мәтінді өңдеу және табиғи тілмен жұмыс:*** ChatGPT, Google Translate, Siri және Alexa сияқты виртуалды көмекшілер.

• ***Көлік*:** Tesla-ның автономды көліктері, Waymo-ның жүргізушісіз көлік жүйелері.

• ***Денсаулық сақта*у:** IBM Watson диагностика жүйесі, рентген суреттерін талдайтын жасанды интеллект алгоритмдері.

• ***Қаржы:*** Банк алаяқтықтарын анықтау жүйелері, автоматтандырылған сауда алгоритмдері.

• ***Өнер және медиа:*** Deepfake технологиялары, жасанды интеллект арқылы музыка және сурет жасау (DALL·E, Midjourney).

• ***Өндіріс*:** Индустриялық роботтар, автоматтандырылған сапаны бақылау жүйелері.

• ***Ақпараттық технологиялар:*** Киберқауіпсіздік жүйелері, деректерді өңдеу мен талдау, бұлттық есептеулер.

Мысалға осылардан біреуін алып карастырайык, GPT-4, Codex және басқа құралдардың салыстырмалы талдауы. Жасанды интеллекттің дамуы бағдарламалау саласында да үлкен жетістіктерге жетті. GPT-4, OpenAI Codex және басқа генеративті ЖИ құралдары бағдарламалаушыларға код жазуды оңтайландырып, олардың өнімділігін арттыруға көмектеседі. 5-кестеде олардың салыстырмалы талдауы берілген:

Кесте-5. GPT-4, OpenAI Codex олардың салыстырмалы талдауы

ЖИ құралы	Ерекшеліктері	Қолдану салалары
GPT-4	Табиғи тілмен жұмыс істеуге қабілетті, мәтіндік түсіндіру мен код жазуды қолдайды	Виртуалды көмекшілер, мәтінді өңдеу, бағдарламалау
OpenAI odex	Код жазу және түзету қабілеті жоғары, бірнеше бағдарламалау тілін қолдайды	Бағдарламалау, автоматтандырылған код генерациясы
GitHub opilot	Әзірлеушілер үшін нақты уақыттағы код ұсыну, IDE интеграциясы	Бағдарламалық жасақтама әзірлеу, кодтың тиімділігін арттыру
AlphaCode (DeepMind)	Бағдарламалау есептерін шешуге қабілетті, алгоритмдік есептерді орындай алады	Бәсекеге қабілетті бағдарламалау, алгоритмдерді оңтайландыру

Жасанды интеллекттің жаңа трендтері. Ол ЖИ дамуымен бірге жаңа бағыттар да пайда болуда. Олардың ішінде:

1. Генеративті ЖИ және бағдарламалау процесін оңтайландыру

- Бағдарламалауды автоматтандыруға арналған құралдар дамуда (мысалы, GitHub Copilot, OpenAI Codex).

- Машиналық оқыту мен нейрондық желілердің жетілдірілуі код сапасын арттыруға мүмкіндік береді.

2. Кванттық есептеулермен интеграция

- Кванттық компьютерлер күрделі ЖИ модельдерін жылдамдатады.

- Google Sycamore және IBM-дің кванттық зерттеулері ЖИ алгоритмдерінің өнімділігін арттыруға бағытталған.Мысал: Кванттық машиналық оқыту (Quantum Machine Learning) қаржы және фармацевтика салаларында деректерді жылдам өңдеуге көмектеседі.

3. ЖИ этикасы және жауапты қолдану

- Жасанды интеллекттің әділеттілігі мен этикалық шешімдер қабылдауы маңызды болып отыр.

- ЖИ-дің түсіндірмелігі (explainability) мен есептілігіне ерекше назар аударылуда.

Университеттер жасанды интеллект бағытында жаңа білім беру бағдарламаларында бекіліп, біртіндеп кеңейіп, білім беру жүйесіне белсенді енгізілуде. Жәңгір хан атындағы БҚАТУ-де жаппай білім алушылар «Huawei Talent» курсын өтуде. Бұл курс білім алушыларға ЖИ қолдануға үлкен көмегін береді. Білім алушылар 700 тіркелген болса, оның-96 пайзы курсты өтіп сертификат алды.

Қорытынды. Жасанды интеллекттің дамуы адамның күнделікті және бірсарынды міндеттерден арылуына мүмкіндік беріп, өмірдің шығармашылық әрі күрделі қырларына көбірек көңіл бөлуге жол ашады. Дегенмен, бұл үдерістің екінші жағы да бар. Жұмыс орындарының қысқаруы, технологиялық бақылаудың әлсіреуі және автономды жүйелердің дамуына байланысты этикалық мәселелердің туындауы қоғамда алаңдаушылық тудыруда. Осылайша, жасанды интеллектті дамыту мен оны қолдану – оң мүмкіндіктер мен ықтимал тәуекелдердің арасындағы нәзік тепе-теңдікті сақтауды талап ететін күрделі үдеріс. Қазақстанда да бұл сала назардан тыс қалмай, жасанды интеллектке қатысты бірқатар ғылыми жобалар жүзеге асырылуда.

Қорыта айтқанда, ЖИ технологиялары адамның күнделікті және кәсіби өмірін жеңілдетіп, тиімділікті арттыруға көмектеседі. Бұл бағыттағы зерттеулер үнемі дамып, жаңа мүмкіндіктер ашуда. Жасанды интеллекттің өзектілігі оның қоғамдағы рөлінің артуымен түсіндіріледі. Оның мақсаты – адам өмірін жақсарту, қауіпсіздікті күшейту, экономикалық тиімділікті арттыру және ғылыми зерттеулерді жетілдіру. Болашақта ЖИ технологияларын дұрыс бағытта дамыту арқылы адамзатқа үлкен пайда әкелуге болады. Жасанды интеллекттің негізгі міндеті – адамның интеллектуалды және физикалық жүктемесін азайту, өмір сапасын жақсарту және әртүрлі салаларда инновациялық шешімдер ұсыну. Оның дамуы экономикалық, әлеуметтік және ғылыми жетістіктерге қол жеткізуді қамтамасыз етеді.Жасанды интеллект – заманауи технологияның маңызды бағыты, оның қоғамға тигізер ықпалы айтарлықтай үлкен. ЖИ-дің артықшылықтары мен қауіптерін дұрыс бағалау және оны тиімді пайдалану үшін заңнамалық реттеу мен жауапкершілікті арттыру қажет. Болашақта ЖИ дамуы адамзатқа жаңа мүмкіндіктер ашумен қатар, оны бақылау мен басқару тетіктерін жетілдіруді талап етеді. Жасанды интеллект – адамзатқа орасан зор мүмкіндіктер беретін, бірақ сонымен қатар маңызды қауіптерді де тудыратын технология. Оның дамуын қадағалап, жауапкершілікпен қолдану – басты міндет. ЖИ-дың этикалық нормаларын анықтау, оны қауіпсіз пайдалануға арналған заңнамалық шараларды енгізу және адам мен машинаның тиімді қарым-қатынасын орнату – болашақта технологияның оң әсерін барынша арттырудың негізгі жолдары. Егер адамзат жасанды интеллектті ақылмен қолдана білсе, ол әлемді жақсы жаққа өзгертудің қуатты құралына айналады. Бірақ бұл технологияны бақылаусыз дамыту қауіп-қатерлерге алып келуі мүмкін. Сондықтан, балансты сақтап, ЖИ-ды адамзат игілігіне бағыттау – жаһандық қоғамның маңызды мақсаты болып табылады.

Бұл зерттеуде,жасанды интеллекттің ғылыми жаңалықтары технологияның жаңа мүмкіндіктерін ашып, көптеген салаларда революция жасап жатыр. Бұл жетістіктер адам өмірін жақсартуға, жұмыс өнімділігін арттыруға және жаңа ғылыми ашылымдарға жол ашуға мүмкіндік береді. Болашақта ЖИ технологиялары одан әрі дамып, адамзат

өмірінің ажырамас бөлігіне айналады. Жасанды интеллект – жиналған ақпаратты өңдеп, қолдана отырып кез келген тапсырманы орындауға қабілетті алгоритмдік жүйе болғандықтан,ол адамның қолынан келе бермейтін күрделі тапсырмаларды жылдам әрі тиімді орындап, адамға көмек көрсетеді. Жасанды интеллект өмір сүру сапасын жақсартуда және адамның негізгі қажеттіліктерін қамтамасыз етуде маңызды рөл атқара алады. Сонымен қатар, шағын жобаларды жүзеге асыруда да жасанды интеллектінің мүмкіндіктері шексіз..

Авторлага рахмет айтатын болсак, B. Aitchanov, and I.M. Bapiyev «Razrabotka protsedury opredeleniya ozhidayemogo vykhodnogo signala neyrosetevoy modeli raspoznavaniya kiberatak» атты макалардаңқ, A. Korchenko, I. Tereykovsky, N. Karpinsky, and S. Tynimbaev, «Neural network models, methods and tools for assessing the security parameters of Internet-oriented information systems: monograph» атты макалардан және де интернет ресуртарымен құнды мағлұмат ала отырып, зерттеуімізде колдандық.

ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

1. https://egov.kz/cms/kk/ai-big-data

2. Иванов, А. А. Жасанды интеллект негіздері. – 2-бас. – Алматы: Қазақ университеті, 2022. – 320 б. https://rmebrk.kz/bilim/association/asambaev-jasandy intellekt.pdf

3. Сейітов, Б. Б. Жасанды интеллекттің қазіргі даму үрдістері // Информатика және технологиялар. – 2023. – Т. 18, №2. – Б. 45–52. https://www.bilim.expert/kk/post/

4. Жасанды интеллект және оның болашағы [Электрондық ресурс] // Ғылыми зерттеулер порталы. – Қолжетімділік режимі: www.example.com (қол жеткізу күні: 25.03.2025).

5. https://meet.google.com/pxk-yuwj-hma

6. https://adilet.zan.kz/kaz/docs/P2400000592?utm_source=chatgpt.com

7. Bapiyev I., Kamalova G., Yermukhambeyova F., Khairullina A., Kassymova A. Nerural network model of countering network cyber atusing tacks using expert knowledge. // Journal of Theoretical and pplied Information Technology. ISSN: 1992-8645//www.jatit.org E-ISSN: 1817-3195.15th July 2021. Vol.99. No 13© 2021 Little Lion Scientific- S-3179-3190 CiteScore 1,3 (2020).SJR 0,153 (2020)SNIP 0,410 (2020) //http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0 85110763583&partnerID=MN8TOARS

8. Aitchanov B., Bapiyev I.M. “Razrabotka protsedury opredeleniya ozhidayemogo vykhodnogo signala neyrosetevoy modeli raspoznavaniya kiberatak [Development of a procedure for determining the expected output signal of a neural network model for recognizing cyber attacks]”, International Journal of Applied and Fundamental Research, Vol. 5, 2017, pp. 8-11. DOI 10.17513/mjpfi.11532.(scopus) http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-85110763583&partnerIDNTE

9 .Korchenko A., Tereykovsky I., Karpinsky N., Tynimbaev S. Neural network models, methods and tools for assessing the security parameters of Internet-oriented information systems: monograph. Kiev, Ukraine: TOV "Our Format», 2016, 275 p. https://en.wikipedia.org/wiki/2016_Kyiv_cyberattack

10. Bapiyev I.M., Aitchanov B.H., Tereikovskyi I.A., Tereikovska L.A., Korchenko A.A. Deep neural networks in cyber attack detection systems7 International Journal of Civil Engineering and Technology, Vol. 8, |No. 11, 2017, pp. 1086-1092..(scopus)

11. https://egemen.kz/article/362626-zhasandy-intellekt-bugini-men-ertenhi

12. https://www.researchgate.net/publication/368019178_ZASANDY_INTELLEKT_-_LEM_KYZMETTERINI_AUKYMDY_ZETISTIGI

13. https://abai.kz/post/192932

14.https://bilimall.kz/tag/article?tag=%D0%96%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8B%20%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82
15.https://bulletinpedagogicsc.kaznu.kz/index.php/1ped/article/download/2170/826/7807
16. IDEYAT BAPIYEV, GAUKHAR KAMALOVA, FARIDA YERMUKHAMBETOVA, AIMGUL KHAIRULLINA, Kassymova, Akmaral.NEURAL NETWORK MODEL OF COUNTERING NETWORK CYBER ATTACKS USING EXPERT KNOWLEDGE. http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-
17.https://ult.kz/post/zhasandy-intellekt-turaly-kitap-zharykka-shykty
18.https://ult.kz/post/zhasandy-intellekt-turaly-kitap-zharykka-shykty
19.https://kz.kursiv.media/kk/2025-02-23/zhdr-zhasandy-intellekt-turaly-kitaptar/
20.https://adebiportal.kz/kz/news/view/zasandy-intellekt-zaily-qazaq-tilinde-zazylgan-algasqy-kitap__10000268
21. Bapiyev, I..Khamzina, A..Kassymova, A..Khazhgaliyeva, G..Ramazanova, V..Bagisov, Method for determining effective types of neural network models for recognition of cyber attacks based on procedural rules. http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-

REFERENCES

1. https://egov.kz/cms/kk/ai-big-data
2. Ivanov A. A. Fundamentals of Artificial Intelligence. – 2nd ed. – Almaty: Kazakh University, 2022. – 320 s. https://rmebrk.kz/bilim/association/asambaev-jasandy-intellekt.pdf
3. Seitov B. B. Modern trends in the development of artificial intelligence // Informatics and technologies. – 2023. – Vol. 18, No. 2. – S.45–52 https://www.bilim.expert/kk/post/
4. Artificial Intelligence and Its Future [Electronic Resource] www.example.com– Access mode: www.example.com (access date: 25.03.2025).
5. https://meet.google.com/pxk-yuwj-hma
6. https://adilet.zan.kz/kaz/docs/P2400000592?utm_source=chatgpt.com
7. Bapiyev I., Kamalova G., Yermukhambeyova F., Khairullina A., Kassymova A. Nerural network model of countering network cyber atusing tacks using expert knowledge. // Journal of Theoretical and pplied Information Technology**.** ISSN: 1992-8645//www.jatit.org E-ISSN: 1817-3195.15th July 2021. Vol.99. No 13© 2021 Little Lion Scientific - S.3179-3190 CiteScore 1,3 (2020).SJR 0,153 (2020)SNIP 0,410 (2020) //http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-85110763583&partnerID=MN8TOARS
8. Aitchanov B., Bapiyev I.M. Razrabotka protsedury opredeleniya ozhidayemogo vykhodnogo signala neyrosetevoy modeli raspoznavaniya kiberatak [Development of a procedure for determining the expected output signal of a neural network model for recognizing cyber attacks]", International Journal of Applied and Fundamental Research, Vol. 5, 2017, - S.8-11. DOI 10.17513/mjpfi.11532.(scopus) http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-85110763583&partnerIDNTE
9. Korchenko A., Tereykovsky I., Karpinsky N., Tynimbaev S. Neural network models, methods and tools for assessing the security parameters of Internet-oriented information systems: monograph. Kiev, Ukraine: TOV "Our Format», 2016, 275 s. https://en.wikipedia.org/wiki/2016_Kyiv_cyberattack
10. Bapiyev I.M., Aitchanov B.H., Tereikovskyi I.A., Tereikovska L.A., Korchenko A.A. Deep neural networks in cyber attack detection systems/ International Journal of Civil Engineering and Technology, Vol. 8, |No. 11, 2017, s. 1086-1092. (scopus)
11. https://egemen.kz/article/362626-zhasandy-intellekt-bugini-men-ertenhi

12. https://www.researchgate.net/publication/368019178_ZASANDY_INTELLEKT_-_LEM_KYZMETTERINI_AUKYMDY_ZETISTIGI
13. https://abai.kz/post/192932
14.https://bilimall.kz/tag/article?tag=%D0%96%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8B%20%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82
15.https://bulletinpedagogicsc.kaznu.kz/index.php/1ped/article/download/2170/826/7807
16. Bapiyev Ideyat, Kamalova Gaukhar, Yermukhambetova Farida, Khairullina Aimgul, Kassymova Akmaral. Neural network model of countering network cyber attacks using expert knowledge. http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-
17. https://ult.kz/post/zhasandy-intellekt-turaly-kitap-zharykka-shykty
18. https://ult.kz/post/zhasandy-intellekt-turaly-kitap-zharykka-shykty
19. https://kz.kursiv.media/kk/2025-02-23/zhdr-zhasandy-intellekt-turaly-kitaptar/
20. https://adebiportal.kz/kz/news/view/zasandy-intellekt-zaily-qazaq-tilinde-zazylgan-algasqy-kitap__10000268
21 Bapiyev, I..Khamzina, A..Kassymova, A..Khazhgaliyeva, G..Ramazanova, Bagisov V. Method for determining effective types of neural network models for recognition of cyber attacks based on procedural rules. http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-

УДК 502.34
МРНТИ 502.35

Мирхайдаров А. А., магистр, https://orcid.org/0009-0004-5449-5165
ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический университет», Российская федерация, г. Уфа, ул. Акназарова, 24к1, 450022, Республика Башкортостан, Российская Федерация, arslanmir2001@gmail.com
Бахтиярова Р.С., доцент, https://orcid.org/0000-0002-2189-4539
ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический университет», Российская федерация, г. Уфа, ул. Акназарова, 24к1, 450022, Республика Башкортостан, Российская Федерация, rozaiskhakova@yandex.ru

Mirkhaidarov A., Master, https://orcid.org/0009-0004-5449-5165
Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education “Ufa State Petroleum Technological University”, Ufa, st. Aknazarova, 24k1, 450022, Republic of Bashkortostan, Russian Federation, arslanmir2001@gmail.com
Bakhtiyarova R., associate professor, https://orcid.org/0000-0002-2189-4539
Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education "Ufa State Petroleum Technical University", Ufa, st. Aknazarova 24k1, 450022, Republic of Bashkortostan, Russian Federation, rozaiskhakova@yandex.ru

УГЛЕРОДНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
CARBON REGULATION IN THE RUSSIAN FEDERATION

АННОТАЦИЯ

Статья посвящена анализу стратегий и климатических проектов, направленных на снижение выбросов парниковых газов (ПГ) в России. Рассматриваются ключевые аспекты декарбонизации, включая нормативно-правовое регулирование, технологии мониторинга, внедрение возобновляемых источников энергии (ВИЭ) и роль карбоновых полигонов. Основой исследования стали данные Росстата, законодательные акты, а также международные стандарты.

Результаты демонстрируют, что энергетический сектор достиг снижения выбросов на 12% за последнее десятилетие благодаря модернизации ТЭЦ и развитию ВИЭ. Значимым инструментом стал запуск государственной информационной системы (ГИС) «Энергоэффективность», обеспечивающей централизованный учёт эмиссии. Особое внимание уделено карбоновым полигонам (например, «Цимлянское водохранилище», «Евразийский»), которые служат экспериментальными площадками для оценки поглощения углерода и тестирования технологий, таких как регенеративное земледелие и спутниковый мониторинг.

В статье подчёркивается важность климатических проектов, включая лесовосстановление, внедрение низкоуглеродных технологий и адаптацию инфраструктуры. Однако Россия, оставаясь четвертой в мире по объёму выбросов ПГ, сталкивается с вызовами: необходимо расширение сети полигонов, увеличение доли ВИЭ в энергобалансе и интеграция искусственного интеллекта в системы мониторинга.

Авторы делают вывод, что успех декарбонизации зависит от синергии государства, бизнеса и науки, а также от соответствия проектов критериям измеримости и социальной пользы. Реализация этих инициатив не только снижает экологические риски, но и укрепляет позиции России как потенциального лидера «зелёной» трансформации, использующего свои природные ресурсы для устойчивого развития.

ANNOTATION

The article analyzes strategies and climate projects aimed at reducing greenhouse gas (GHG) emissions in Russia. Key aspects of decarbonization are explored, including regulatory frameworks, monitoring technologies, the adoption of renewable energy sources (RES), and the role of carbon polygons. The study is based on data from Rosstat, legislative acts, and international standards.

Results indicate a 12% reduction in emissions in the energy sector over the past decade, achieved through the modernization of thermal power plants and the development of RES. A significant tool is the implementation of the state information system (GIS) "Energy Efficiency," which centralizes emission accounting. Special attention is given to carbon polygons (e.g., "Tsimlyansk Reservoir," "Eurasian"), serving as experimental sites for carbon sequestration assessment and testing technologies such as regenerative agriculture and satellite monitoring.

The article emphasizes the importance of climate projects, including reforestation, low-carbon technology adoption, and infrastructure adaptation. However, Russia, remaining the fourth-largest GHG emitter globally, faces challenges: expanding the carbon polygon network, increasing the share of RES in the energy mix, and integrating artificial intelligence into monitoring systems.

The authors conclude that successful decarbonization depends on synergy between the state, businesses, and science, as well as project compliance with measurability and social benefit criteria. Implementing these initiatives not only mitigates environmental risks but also strengthens Russia’s potential as a leader in the "green" transition, leveraging its natural resources for sustainable development.

Ключевые слова: *снижение выбросов, парниковые газы, климатические проекты, мониторинг, отчетность.*

Keywords: *emission reduction, greenhouse gases, climate projects, monitoring, reporting.*

Введение. Глобальное изменение климата, вызванное антропогенными выбросами парниковых газов, угрожает экологическому и экономическому балансу планеты. По данным МГЭИК, концентрация CO_2 в атмосфере достигла максимума за 800 тыс. лет, а

глобальная температура выросла на 1,1°C, провоцируя экстремальные погодные явления, таяние ледников и риски для экосистем. Парижское соглашение (2015) обозначило цель — сдержать потепление в пределах 1,5–2°C, но её достижение требует перестройки ключевых секторов: энергетики, промышленности, транспорта и сельского хозяйства.

Ключевым инструментом становятся климатические проекты: переход на ВИЭ, восстановление лесов, внедрение энергоэффективности и технологии улавливания CO_2. В статье исследуются современные подходы к снижению выбросов парниковых газов в России, включая нормативное регулирование, мониторинг, реализация климатических проектов и отчётность.

Материалы и методы исследования. Исследование опирается на комплекс данных, включая официальную статистику, законодательные акты, технологические решения и научные разработки. Основным источником информации стали отчеты Росстата, согласно которым в 2022 году объём выбросов парниковых газов (ПГ) в России составил 2,2 млрд тонн CO_2-экв. Дополнительные данные предоставлены Межправительственной группой экспертов по изменению климата (IPCC), отмечающей, что концентрация CO_2 в атмосфере достигла 420 ppm — на 50% выше доиндустриального уровня.

Законодательной основой для декарбонизации стал Федеральный закон «Об ограничении выбросов парниковых газов» от 02.07.2021 №296-ФЗ, принятый в 2021 году. Он закрепил обязательства компаний по отчётности и внедрению мер снижения эмиссии, соответствующих международным стандартам ISO 14064 и GHG Protocol. Важным инструментом контроля стала государственная информационная система (ГИС) «Энергоэффективность», которая централизованно аккумулирует данные о выбросах, интегрируясь с международными системами, такими как UNFCCC.

Мониторинг выбросов осуществляется с использованием спутниковых систем (Copernicus, Sentinel), инфракрасных газоанализаторов и беспилотных летательных аппаратов. Особую роль играют карбоновые полигоны — экспериментальные площадки для оценки поглощения ПГ. Например, полигон «Цимлянское водохранилище» в Ростовской области изучает эмиссию и секвестрацию углерода в водных экосистемах, а «Евразийский» в Башкортостане анализирует взаимодействие степей, лесов и болот.

Расчёт выбросов проводится по трём категориям. Прямые эмиссии (Scope 1) определяются через коэффициенты (56,1 кг CO_2/ГДж для природного газа) и прямые замеры. Косвенные энергетические выбросы (Scope 2) рассчитываются с учётом региональных коэффициентов (0,36 тонн CO_2/МВт·ч), а прочие косвенные (Scope 3) — через стандартизированные метрики, такие как 0,18 кг CO_2/пассажиро-км для авиаперелётов.

В выборку исследования вошли предприятия с годовыми выбросами от 150 тыс. тонн CO_2-экв., а также ключевые игроки в секторе возобновляемой энергетики, включая компанию «Хевел», которая ввела в эксплуатацию 13 солнечных электростанций суммарной мощностью 363,5 МВт.

Результаты исследования. За последние десять лет наибольшее снижение выбросов наблюдается в энергетическом секторе (-12%), за счёт модернизации теплоэлектростанций и внедрения возобновляемых источников энергии (ВИЭ).

Принятие Федерального закона «Об ограничении выбросов парниковых газов» от 02.07.2021 №296-ФЗ стало ключевым шагом в государственной политике декарбонизации. Важную роль в этом процессе играет внедрение платформы ГИС «Энергоэффективность», которая позволяет централизованно учитывать выбросы углекислого газа, а также обязывает компании публиковать отчёты по выбросам в соответствии с международными стандартами, такими как IPCC и ГОСТ Р 57260-2016. Дополнительно в 2023 году на Сахалине был запущен пилотный проект углеродного

рынка, позволяющий предприятиям торговать квотами на выбросы [2]. Значительные средства выделяются и на развитие возобновляемой энергетики: так, государственное финансирование в размере 20 млрд рублей в 2023 году позволило ввести в эксплуатацию более 500 МВт новых мощностей солнечных и ветровых станций. Основными инвесторами в строительство солнечной генерации в 2019 году стали: группа компаний «Хевел», построившая в 2019 году 13 солнечных электростанций суммарной мощностью 363,5 МВт, компания «Солар Системс», построившая 6 солнечных электростанций суммарной мощностью 100 МВт, и компания «Вершина Девелопмент», построившая 7 солнечных электростанций суммарной мощностью 105 МВт.

Эффективное сокращение эмиссий невозможно без точного мониторинга. В России особое внимание уделяется карбоновым полигонам — научно-практическим площадкам, объединяющим мониторинг, технологии и образование. Они расположены в ключевых экорегионах: от лесов Татарстана до тундры Ямало-Ненецкого автономного округа. Здесь тестируются методы сокращения выбросов, такие как регенеративное земледелие (no-till), обводнение торфяников для снижения эмиссии метана, или посадка быстрорастущих деревьев. Спутниковый мониторинг (например, с помощью группировки Sentinel) дополняется наземными измерениями, а данные интегрируются в глобальные сети, такие как FLUXNET. К 2030 году планируется создать Единую национальную систему мониторинга климатически активных веществ, которая объединит спутники, автоматизированные станции и ИИ-алгоритмы [3].

Наиболее крупными полигонами являются: «Цимлянское водохранилище» (Ростовская область) – самый крупный из полигонов, его площадь составляет 270200 Га; «Евразийский» (Республика Башкортостан) – второй по величине с общей площадью 11599,5 Га, включающий ковыльные степи, залежные земли, леса и болота [4]; «Тюменский» (Тюменская область) – третий по площади, располагается на 10670 Га смешанного леса с водоёмом.

Мониторинг ведётся с использованием спутниковых систем (Copernicus), инфракрасных газоанализаторов, беспилотных летательных аппаратов и метеостанций.

На основе данных мониторинга реализуются климатические проекты – инициативы, направленные на снижение выбросов парниковых газов, адаптацию к изменениям климата и устойчивое использование природных ресурсов. Они могут охватывать различные сферы, такие как энергетика, промышленность, сельское хозяйство, транспорт и лесное хозяйств, и подразделяются на проекты по сокращению выбросов, проекты по улавливанию и хранению углерода, адаптационные проекты и карбоновые фермы [5].

Климатические проекты занимают центральное место в глобальной борьбе с изменением климата, объединяя усилия по сокращению выбросов парниковых газов, увеличению поглощения углерода и адаптации к уже неизбежным последствиям климатических изменений. Их основная цель — переход к устойчивому развитию через внедрение чистых технологий, оптимизацию производственных процессов и повышение энергоэффективности [6]. Например, предприятия могут модернизировать оборудование, заменяя устаревшие энергоемкие системы на современные низкоуглеродные решения, такие как котлы с повышенным КПД или установки для улавливания CO_2. Параллельно оптимизация процессов, включая внедрение принципов циркулярной экономики и бережливого производства, позволяет снизить потери ресурсов и энергии, а переход на возобновляемые источники энергии (солнечные панели, ветрогенераторы) сокращает зависимость от ископаемого топлива.

Реализация таких проектов поддерживается комплексом механизмов. Государства стимулируют бизнес через субсидии, налоговые льготы и программы льготного кредитования, что особенно актуально для внедрения «зеленых» технологий. Углеродные рынки, где компании торгуют квотами на выбросы, создают экономические

стимулы для сокращения эмиссии: предприятия, превышающие установленные нормы, вынуждены покупать дополнительные квоты, а те, кто инвестирует в снижение выбросов, получают прибыль от их продажи. Международное сотрудничество, закрепленное в Парижском соглашении, обеспечивает координацию усилий между странами, включая финансовую поддержку климатических инициатив в развивающихся регионах.

Климатические проекты разнообразны по своей направленности. Одни сосредоточены на прямом сокращении выбросов — например, внедрение систем переработки отходов или переход на водородное топливо. Другие нацелены на усиление поглотительной способности экосистем: лесовосстановление, восстановление болот или создание городских зеленых зон. Отдельное направление — проекты адаптации, такие как строительство инфраструктуры, устойчивой к наводнениям, или разработка засухоустойчивых сельскохозяйственных практик [6]. Важную роль играют системы мониторинга, которые не только отслеживают выбросы, но и оценивают эффективность реализуемых мер, позволяя корректировать стратегии в реальном времени.

Для признания проекта климатическим он должен соответствовать ряду критериев. Во-первых, иметь четкую цель, связанную с климатом, — например, снижение выбросов на 20% за пять лет. Во-вторых, использовать инновационные технологии, такие как цифровые платформы для управления углеродным следом или биогазовые установки. Обязательным условием является прозрачность: компании должны документировать каждый этап, предоставлять отчеты и демонстрировать измеримые результаты. Наконец, проекты должны приносить пользу не только экологии, но и обществу — создавать рабочие места, улучшать качество жизни или поддерживать локальные сообщества.

Цифровизация стала ключевым инструментом в управлении выбросами. Автоматизированные системы, такие как IoT-датчики и облачные аналитические платформы, позволяют компаниям в режиме реального времени отслеживать эмиссию, прогнозировать её динамику и оптимизировать расход ресурсов. Искусственный интеллект помогает моделировать сценарии снижения углеродного следа, а блокчейн-технологии обеспечивают прозрачность углеродных кредитов. Ярким примером компаний-пользователей данных инструментов является ПАО «Газпром нефть». Компания разработала Zyfra Industrial IoT (ZIIoT) – это цифровая индустриальная платформа для управления производством предприятий нефтегазовой и химической отраслей. Платформа позволяет собирать и интегрировать данные технологических объектов с ключевыми системами управления производством и уже внедряется на Омском и Московском НПЗ. Также ZIIoT помогает оптимизировать множество типовых операций, на которые дата-сайентисты зачастую тратят времени больше, чем на сам анализ.

Успех этих инициатив зависит от синергии науки, бизнеса и государства. Компании, такие как СИБУР, уже участвуют в лесовосстановлении, получая углеродные сертификаты, а вузы (МГУ, СПбГУ) готовят специалистов в области углеродного менеджмента. Реализация климатических проектов не только снижает риски глобального потепления, но и открывает для России возможность стать лидером «зеленой» трансформации, превратив свои обширные экосистемы в стратегический ресурс для устойчивого будущего.

Важным шагом на пути к снижению углеродного следа является не только внедрение цифровых решений и реализация климатических инициатив, но и системный подход к учету выбросов. Для этого компании разрабатывают механизмы мониторинга и отчетности, основанные на международных стандартах и научных методиках.

Подготовка отчетности начинается со сбора данных, которые делятся на три категории. Прямые выбросы (Scope 1) включают эмиссии от источников, принадлежащих организации: сжигание топлива в котлах, генераторах или

транспортных средствах, утечки хладагентов, а также промышленные процессы, например, химические реакции. Для их расчета используются прямые замеры с помощью датчиков или эмиссионные коэффициенты, специфичные для каждого вида топлива. Например, для природного газа применяется коэффициент 56,1 кг CO_2 на гигаджойль энергии [7].

Косвенные энергетические выбросы (Scope 2) связаны с потреблением электроэнергии, тепла или пара, полученных от внешних поставщиков. Их расчет основывается на региональных коэффициентах эмиссии, таких как 0,36 тонн CO_2 на мегаватт-час для России, или данных, предоставленных энергокомпанией.

Прочие косвенные выбросы (Scope 3) охватывают деятельность, не контролируемую напрямую организацией: деловые поездки сотрудников, транспортировку сырья и продукции, утилизацию отходов, а также использование проданных товаров клиентами. Для их оценки применяются данные логистических партнеров, стандартные коэффициенты (например, 0,18 кг CO_2 на пассажиро-километр для авиаперелетов) или методы, рекомендованные международными стандартами.

Расчеты проводятся в соответствии с требованиями ISO 14064-1 (учет ПГ), ISO 14064-2 (проекты снижения эмиссий) и GHG Protocol. Данные сверяются с первичной документацией: счетами за энергию, журналами учета топлива и договорами с поставщиками. Обязательным этапом является документирование методологии, включая описание источников, обоснование коэффициентов и алгоритмов расчетов.

Для повышения достоверности отчетности организации могут проводить верификацию. Внутренний аудит выполняет отдел экологии или sustainability-менеджер, а внешний аудит привлекает независимых экспертов, что особенно важно для участия в международных инициативах, таких как CDP.

Итоговый отчет подается в государственные органы, например, в Росприроднадзор, в установленные сроки — обычно ежегодно. Форматы включают электронные шаблоны или Excel-таблицы с детализацией по источникам выбросов. Нарушение сроков или недостоверность данных влекут штрафы до 500 тыс. рублей для юрлиц, приостановку деятельности или репутационные потери.

Государственная информационная система «Энергоэффективность» (ГИС) служит централизованной платформой для учета и анализа данных о выбросах ПГ в России, что соответствует обязательствам по Парижскому соглашению [8].

Согласно федеральному закону «Об ограничении выбросов парниковых газов» от 02.07.2021 №296-ФЗ регистрация в системе обязательна для предприятий с годовыми выбросами от 150 тыс. тонн CO_2-эквивалента (с 2023 г.). При регистрации организация предоставляет ИНН, сведения о видах деятельности, контактных лицах и перечне источников эмиссии.

После регистрации компании вносят в ГИС данные по категориям Scope 1–3, включая методики расчетов (с ссылками на стандарты) и планы по снижению выбросов, такие как внедрение возобновляемых источников энергии или модернизация оборудования. Информация проходит двухэтапную проверку: автоматическую валидацию формата и ручной анализ экспертами Росприроднадзора в течение 30 дней.

Агрегированные данные системы доступны для общественности и научного сообщества. Например, на портале ГИС публикуются сводные показатели по отраслям и регионам, которые используются для климатического моделирования.

Интеграция с другими системами усиливает функционал ГИС. На национальном уровне она взаимодействует с ЕГАИС и ГИС «Воздух», а на международном — передает данные в UNFCCC (Рамочная конвенция ООН об изменении климата) и участвует в системе MRV (Monitoring, Reporting, Verification).

Заключение. Россия демонстрирует многоуровневый подход к декарбонизации, сочетающий законодательное регулирование, технологические инновации и

природоохранные инициативы. Принятие Федерального закона «Об ограничении выбросов парниковых газов» от 02.07.2021 №296-ФЗ и запуск ГИС «Энергоэффективность» обеспечили системный учёт выбросов, а развитие ВИЭ и карбоновых полигонов — практические инструменты для снижения углеродного следа.

Однако сохраняются вызовы. Несмотря на сокращение эмиссии в энергетике, Россия остаётся четвёртой в мире по объёму выбросов ПГ (5% глобальной эмиссии). Для достижения целей Парижского соглашения критически важно расширить сеть карбоновых полигонов, ускорить внедрение ИИ-решений в мониторинг и увеличить долю ВИЭ в энергобалансе.

Успех климатических проектов, таких как лесовосстановление или адаптация сельского хозяйства к засухам, зависит от их соответствия критериям измеримости и социальной пользы. Эти инициативы не только снижают экологические риски, но и формируют основу для позиционирования России как лидера «зелёной» трансформации, где обширные природные ресурсы становятся стратегическим активом устойчивого развития. Дальнейший прогресс потребует усиления кооперации между государством, бизнесом и научным сообществом, а также интеграции лучших международных практик.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Охрана окружающей среды в России // Федеральная служба государственной статистики (Росстат). [Электронный ресурс]: Электрон журн. — 2022. — URL: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/Ochrana_okruj_sredi_2022.pdf/ (дата обращения 17.03.2025).
2. Реестр углеродных единиц Российской Федерации. [Электронный ресурс]. — URL: https://carbonreg.ru/ru/info// (дата обращения 17.03.2025)
3. Карбоновые полигоны Российской Федерации. [Электронный ресурс]. — URL: https://carbon-polygons.ru/polygons/ (дата обращения 17.03.2025)
4. Белан, Л.Н. Об опыте реализации исследований в области технологий декарбонизации в Уфимском государственном нефтяном техническом университете / Белан Л.Н., Туктарова И.О., Бахтиярова Р.С., Арасланова Л.Х. // Наука и образование. - 2023. - № S2-2 (71). - С. 561-570.
5. Богдан, Е.А. Оценка влияния температуры поверхности земли на NDVI на примере ГЕОПАРКА «ЯНГАН-ТАУ» / Е.А. Богдан, Л.Н. Белан, И.О. Туктарова, И.Р. Вильданов, И.Ю.
6. Сергеев, В.Ю. Устойчивое развитие и оценка воздействия на климат в промышленности. / В.Ю. Сергеев// Риск — 2020. — №41. — С. 72—84.
7. Международный стандарт ISO 14064-1:2018. Оценка и верификация выбросов парниковых газов. [Электронный ресурс]. — URL: https://www.iso.org/standard/66453.html (дата обращения 12.01.2025).
8. ГИС «Энергоэффективность». [Электронный ресурс]. / Росстат — 2021. — URL: https://gisee.ru/ (дата обращения 12.01.2025)
9. Федеральный закон «Об ограничении выбросов парниковых газов» от 02.07.2021 №296-ФЗ (в ред. от 02.07.2021). // [Электронный ресурс] Российская Федерация. – 2021.
10. Методология IPCC (Межправительственная группа экспертов по изменению климата)// Intergovernmental Panel on Climate Change. [Электронный ресурс]: Электрон журн. — 2018 — URL: https://www.ipcc.ch/sr15/ (дата обращения 17.03.2025).
11. ГОСТ Р 57260-2016. Методика учета и отчетности выбросов парниковых газов. [Электронный ресурс]. — URL: https://docs.cntd.ru/document/1200141417 (дата обращения 17.03.2025).
12. Обзор технологий снижения выбросов парниковых газов. [Электронный ресурс]. / Министерство энергетики РФ — 2019. — URL:

http://static.government.ru/media/files/ADKkCzp3fWO32e2yA0BhtIpyzWfHaiUa.pdf (дата обращения 12.01.2025).

13. Руководство по подготовке национальных отчетов об изменении климата. [Электронный ресурс]. /ООН — 2023. — URL: https://www.un.org/ru/climatechange/reports (дата обращения 12.01.2025).

14. Методические указания по оценке воздействия на климат. [Электронный ресурс]. / Минэкономразвития РФ — 2020. — URL: https://www.economy.gov.ru/material/dokumenty/prikaz_minekonomrazvitiya_rossii_ot_28_dekabrya_2023_g_927.html?ysclid=m85ray6qjs774991732 (дата обращения 12.01.2025).

15. Руководство по разработке и реализации климатических проектов. [Электронный ресурс]. / Министерство экономики РФ — 2022. — URL: https://base.garant.ru/405486551/?ysclid=m85qcfegar72772050 (дата обращения 12.01.2025).

REFERENCES

1. Environmental Protection in Russia // Federal State Statistics Service (Rosstat). [Electronic resource]: Electronic journal. - 2022. - URL: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/Ochrana_okruj_sredi_2022.pdf/ (date of access 03/17/2025).

2. Register of Carbon Units of the Russian Federation. [Electronic resource]. - URL: https://carbonreg.ru/ru/info// (date of access 03/17/2025)

3. Carbon polygons of the Russian Federation. [Electronic resource]. - URL: https://carbon-polygons.ru/polygons/ (date of access 03/17/2025)

4. Belan, L.N. On the experience of implementing research in the field of decarbonization technologies at the Ufa State Petroleum Technological University / Belan L.N., Tuktarova I.O., Bakhtiyarova R.S., Araslanova L.Kh. // Science and education. - 2023. - No. S2-2 (71). - P. 561-570.

5. Bogdan, E.A. Assessment of the influence of earth surface temperature on NDVI using the example of the YANGAN-TAU GEOPARK / E.A. Bogdan, L.N. Belan, I.O. Tuktarova, I.R. Vildanov, I.Yu.

6. Sergeev, V.Yu. Sustainable development and climate impact assessment in industry. / V.Yu. Sergeev// Risk - 2020. - No. 41. - P. 72-84.

7. International standard ISO 14064-1:2018. Greenhouse gas emission assessment and verification. [Electronic resource]. — URL: https://www.iso.org/standard/66453.html (date of access 12.01.2025).

8. GIS "Energy Efficiency". [Electronic resource]. / Rosstat - 2021. - URL: https://gisee.ru/ (date of access 12.01.2025)

9. Federal Law "On Limiting Greenhouse Gas Emissions" dated 02.07.2021 No. 296-FZ (as amended on 02.07.2021). // [Electronic resource] Russian Federation. - 2021.

10. IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) Methodology// Intergovernmental Panel on Climate Change. [Electronic resource]: Electronic journal. - 2018 - URL: https://www.ipcc.ch/sr15/ (date of access 03/17/2025).

11. GOST R 57260-2016. Methodology for accounting and reporting of greenhouse gas emissions. [Electronic resource]. — URL: https://docs.cntd.ru/document/1200141417 (date of access 03/17/2025).

12. Review of greenhouse gas emission reduction technologies. [Electronic resource]. / Ministry of Energy of the Russian Federation - 2019. - URL: http://static.government.ru/media/files/ADKkCzp3fWO32e2yA0BhtIpyzWfHaiUa.pdf (date of access 12.01.2025).

13. Guidelines for the preparation of national climate change reports. [Electronic resource]. /UN — 2023. — URL: https://www.un.org/ru/climatechange/reports (date of access 12.01.2025).
14. Methodological guidelines for climate impact assessment. [Electronic resource]. / Ministry of Economic Development of the Russian Federation - 2020. - URL: https://www.economy.gov.ru/material/dokumenty/prikaz_minekonomrazvitiya_rossii_ot_28_dekabrya_2023_g_927.html?ysclid=m85ray6qjs774991732 (date of access 12.01.2025).
15. Guidelines for the development and implementation of climate projects. [Electronic resource]. / Ministry of Economy of the Russian Federation - 2022. - URL: https://base.garant.ru/405486551/?ysclid=m85qcfegar72772050 (date of access 12.01.2025).

РЕЗЮМЕ

Ключевые достижения включают сокращение выбросов в энергетическом секторе на 12% за последнее десятилетие, что стало результатом модернизации ТЭЦ и внедрения ВИЭ. Важным инструментом контроля стала государственная информационная система (ГИС) «Энергоэффективность», обеспечивающая централизованный учет эмиссии. Карбоновые полигоны («Цимлянское водохранилище», «Евразийский» и др.) играют роль экспериментальных площадок для тестирования технологий секвестрации углерода, таких как регенеративное земледелие и спутниковый мониторинг. Несмотря на прогресс, Россия, оставаясь четвертой в мире по объему выбросов ПГ, сталкивается с рядом вызовов: необходимость расширения сети карбоновых полигонов, увеличение доли ВИЭ в энергобалансе и интеграция искусственного интеллекта в системы мониторинга. Авторы подчеркивают важность климатических проектов (лесовосстановление, низкоуглеродные технологии), которые должны соответствовать критериям измеримости и социальной пользы. Успех декарбонизации зависит от синергии государства, бизнеса и науки. Реализация инициатив не только снижает экологические риски, но и укрепляет позиции России как потенциального лидера «зеленой» трансформации, использующего природные ресурсы для устойчивого развития. Для достижения целей необходимы дальнейшее развитие законодательной базы, внедрение инновационных технологий и усиление международного сотрудничества.

ӘОЖ 372.862
ҒТАХР 20.01.45

Кабланбекова Б.А., жаратылыстану ғылымдарының магистрі, педагог-шебер, https://orcid.org/0009-0009-4029-2494
«Республикалық физика-математика мектебі» КеАҚ Астана қаласындағы филиалы, Астана қ., Түркістан 12/1 к., 010021, Қазақстан Республикасы, bakhtygul.kablanbekova@fizmat.kz

Kablanbekova B., master of Natural Sciences, teacher-master, https://orcid.org/0009-0009-4029-2494
NJSC "Republican School of physics and mathematics" in Astana, Astana, st. Turkestan 12/1, 010021, Kazakhstan, bakhtygul.kablanbekova@fizmat.kz

JAVA ПРОГРАММАЛАУ ТІЛІН МЕКТЕПТЕРДЕ ОҚЫТУ АРҚЫЛЫ ТЕХНИКАЛЫҚ САЛАДАҒЫ БОЛАШАҚ МАМАНДАРҒА ЖОЛ АШУ
JAVA PROGRAMMING LANGUAGE IN SCHOOLS OPENING THE WAY FOR FUTURE PROFESSIONALS IN THE TECHNICAL FIELD THROUGH TRAINING

АҢДАТПА

Бұл мақала физика-математика, информатика пәндерін тереңдетіп оқытатын арнаулы, бейімді мектептердің оқушыларына Java программалау тілін ерте жастан үйретудің маңызды аспектілерін, болашақ техникалық саланың мамандарын мектеп жасынан бастап даярлау мәселесін, тілді оқыту әдістемелерін, соның ішінде теориялық және практикалық тапсырмаларды біріктіретін интерактивті, жобалық оқыту әдістерін қарастырады. Оқушыларға Java тілінің негіздерін үйрету мақсатында айнымалылар, операторлар, негізгі класстар, шартты операторлар мен циклдер, функциялар мен әдістер, массивтермен жұмыс, файлдармен жұмыс, объектілі-бағытталған программалау (ОББ) концепциясы, коллекциялар, сондай-ақ қарапайым қосымшаларды жобалау тақырыптарын заманауи тәсілдермен оқыту әдістері жан-жақты түсіндіріледі. Оқытудың тиімді әдісінің бірі Java тілінен практикалық жобалар әдісі арқылы оқушылар білімін тереңдетеді, мысалы "Калькулятор", "Жылан ойыны", "Графикалық редактор" сияқты жобаларды орындату, интерактивті тапсырмалар ұсынатын платформалармен таныстыру және оларды сабаққа тиімді қолдану әдістері қарастырылған.

ANNOTATION

This article explores the critical aspects of early Java programming education for students in specialized, advanced schools focusing on physics, mathematics, and informatics. It addresses the issue of preparing future technical professionals from a school-age level, and examines methodologies for teaching the language, including interactive and project-based learning methods that integrate theoretical and practical assignments. With the aim of instructing students in the fundamentals of Java, the article comprehensively explains modern teaching approaches for topics such as variables, operators, core classes, conditional statements and loops, functions and methods, working with arrays, file handling, object-oriented programming (OOP) concepts, collections, and the design of simple applications. One of the effective teaching methodologies discussed is the use of practical Java projects, which deepens students' knowledge through projects like "Calculator," "Snake Game," and "Graphical Editor." The article also covers introducing students to platforms that offer interactive tasks and methods for their effective integration into the curriculum.

Түйін: *Java программалау тілі, STEM білім, жобаға негізделген оқыту, объектіге бағытталған программалау, техникалық мамандар, оқу жоспарын әзірлеу.*

Keywords: *Java programming education, STEM education, Project-based learning, Object-oriented programming, Technical specialists, Curriculum development.*

Кіріспе. Java тілі — қазіргі кезде кеңінен қолданылатын, объектілі-бағытталған, көп платформалық бағдарламалау тілі болып табылады. Мектепте Java тілін оқыту – оқушыларға тек техникалық дағдыларды меңгеріп қана қоймай, шығармашылық ойлау, логикалық талдау және проблемаларды шешу қабілеттерін дамытуға да үлкен мүмкіндік береді. Бұл тілдің үйретілуі қазіргі цифрлық қоғамдағы маңызды дағдылардың бірі болып табылады, себебі ол балалардың болашақ мамандықтарына дайындық ретінде өте тиімді құрал. Ақпараттық технологиялардың қарқынды дамуы мектеп оқушыларының болашақ мамандықтарын таңдауында үлкен рөл атқарады. Әлемде сандық технологиялар мен автоматтандыру процестері қарқынды дамып келе жатқандықтан, мектеп оқушыларының бағдарламалау тілдерін үйренуі олардың бәсекеге қабілетті болуына әсер етеді. Java сияқты кеңінен қолданылатын тілдермен жұмыс істеу олардың ақпараттық технологиялар саласындағы білімдерін кеңейтеді және келешектегі цифрлық әлемде жұмыс істеуге қажетті дағдыларды дамытуға көмектеседі.

Программалау – бұл проблемаларды шешудің және жүйелі ойлаудың таптырмас құралы. Java тілін үйрену кезінде оқушылар алгоритмдер мен деректер құрылымдарын қолдану арқылы нақты мәселелерді шешуге үйренеді. Бұл дағдылар тек программалау

саласында ғана емес, жалпы өмірде де маңызды. Мысалы, оқушылар тапсырмаларды шешу барысында логикалық ойлау мен талдау қабілеттерін дамытады, ол өз кезегінде түрлі жағдайларды тиімді шешуге көмектеседі.

Java тілінің маңызды ерекшелігінің бірі — объектілі-бағытталған (ОББ) программалаудың принциптерін қолданып, деректер мен оларға әрекеттерді біріктіру мүмкіндігі. ОББ оқушыларға код құрылымын жақсы түсінуге және оны логикалық тұрғыда бөлшектеп қарастыруға мүмкіндік береді. Оқушылар класстар, объектілер, мұрагерлік, полиморфизм, инкапсуляция сияқты принциптермен танысып, бағдарламалаудың құрылымды әрі түсінікті тәсілдерін меңгереді.

Java бағдарламалау тілі көп платформалық жұмыс жасау қабілетіне ие, яғни бір рет жазылған код әртүрлі құрылғыларда, операциялық жүйелерде жұмыс істей алады. Бұл өз кезегінде оқушыларға бағдарламалау дағдыларын әртүрлі сала мен технологияларда қолдануға мүмкіндік береді. Олардың болашақта мобильді қосымшалар, веб-жобалар немесе корпоративтік жүйелер жасауға қабілеті артады. Осылайша, Java тілін үйрену оқушыларға көптеген мүмкіндік ашады, ол болашақта жоғары деңгейдегі мамандықтарға жол ашады.

Зерттеу әдістері мен материалдары. “Java программалау тілін мектептерде оқыту арқылы техникалық саладағы болашақ мамандарға жол ашу” тақырыбымен жүргізілген зерттеуге математика, физика және информатика пәндерін тереңдетіп оқытатын Республикалық физика-математика мектебінің Астана қаласындағы филиалының 10 - сынып оқушылары алынды. Бұл сыныпты алу себебіміз, 14-16 жас аралығындағы оқушылардың Java тілінде бағдарламалау элементтерін қалай қабылдайтынын зерттеу болды. Авторлық бағдарлама мен оқушылар мен мұғалімдерге арналған оқу - әдістемелік құрал жазылды.

Авторлық бағдарлама келесі мақсаттарға негізделіп жазылды:

- Java программалау тілінің негіздерін үйрену.
- Объектіге бағытталған бағдарламалау принциптерін меңгеру.
- Қолданбаларды әзірлеу үшін Java-ны тиімді пайдалану дағдыларын қалыптастыру.
- Оқушыларды бағдарламалау әлеміне енгізіп, олардың тәжірибелік дағдыларын дамыту.

Авторлық бағдарламаның жаңалығы.

Бұл бағдарлама қазіргі заманғы бағдарламалаудың талаптарына сай жасалды. Болашақ IT-мамандарын дайындауды мектеп жасынан бастау үшін оқушыларға Java программалау тілін үйрету қажет. Себебі қазіргі кезде көптеген бағдарламалық өнімдерді шығаратын фирмалар Java-құрастырушы программисттерді іздейді. Курстың мазаұнында әр тақырыпқа бірнеше мысалдан келтірілген. Оқушылар оларды орындай отырып, біршама теориялық сұрақтардың жауабын практикада табады. Java программалау тілін үйретететін қазақ тіліндегі әдебиеттердің аздығына байланысты курста қарастырылған мысалдар көптеген теориялық сұрақтарды оқушылардың өздігінен сыни тұрғыдан ойлау арқылы табатыны курстың құндылығын арттырады. Курста келтірілген тапсырмалар оқушылардың жас ерекшеліктеріне сай, деңгейленіп жеңіл тапсырмадан күрделіге көшу принципімен ұсынылған. Кейбір тақырыптарды меңгеру үшін интерактивті курстарды өту ұсынылады. Курста Java тілінің жеңіл меңгертудің негізгі әдістемелері қарастырылған.

Атап айтқанда:

- Интерактивті оқыту: Оқушылар әр тақырыпты меңгеру үшін мысалдарды қолдана отырып, әр түрлі форматта тапсырмалар орындайды [1].
- Практикалық жобалар: Курстың соңында оқушылар Java тілін пайдаланып, шағын жобалар әзірлейді [2].

Java программалау тілін мектеп бағдарламасына енгізу арқылы жаңа мүмкіндіктер ашу.

Бүгінгі таңда Java тілін мектеп бағдарламасына енгізу оқушыларды тек технологиямен таныстырып қана қоймай, оларды еңбек нарығына дайын болуға да даярлайды. Әрбір оқушы, тіпті бағдарламалаумен тікелей айналыспаса да, болашақта бұл дағдыларды өз күнделікті өмірінде немесе кәсіби қызметінде пайдалана алады. Мектепте бағдарламалауды үйрену оқушыларға түрлі ғылыми жобаларды жүзеге асыру, стартаптар құру және инновациялық шешімдерді қабылдауға көмектеседі. Осыған орай мектебімізде оқу бағдарламасы жасалды. Бағдарламада 34 сағатқа негізделген Java тілінің негіздері ұсынылды. Сабақ үш тілде жүргізіледі. Оқушылармен қарым-қатынас - қазақ және орыс тілдерінде; Java бағдарламасының командалары, терминдері, жүйелік хабарламалары ағылшын тілінде таныстырылады.

Бақылау әдістері:

- ауызша, жазбаша сұрау, код жазу;
- жоба қорғау;
- әртүрлі деңгейдегі сайыстар, олимпиадаларға мүмкіндігінше қатысу.

Бағдарлама мазмұны бойынша оқушыларға математика, физика, информатика, логика пәндері кіріктіріліп оқытылады.

“Java программалау тілі” авторлық бағдарлама болашақ бағдарламашылардың кәсіби дағдыларын дамытуға және Java тілін меңгеру арқылы өз идеяларын іске асыруға мүмкіндік береді. Оқушылар курс барысында тек код жазуды үйреніп қана қоймай, сонымен қатар логикалық ойлау, алгоритмдік шешімдер жасау және тиімді код жазу дағдыларын да дамытады.

Қазіргі кезде көптеген бағдарламалық өнімдерді шығаратын фирмалар Java - құрастырушы, программисттерді іздейді. Сондықтан оқушыларды ерте жастан техникалық мамандықтарға бейімдеуден ешкім де ұтылмайды.

Курстың мазмұнында әр тақырыпқа бірнеше мысалдан келтірілген. Оқушылар оларды орындай отырып, біршама теориялық сұрақтардың жауабын практикада табады. Java программалау тілін үйрететін қазақ тіліндегі әдебиеттердің аздығына байланысты курста қарастырылған мысалдар көптеген теориялық сұрақтарды оқушылардың өздігінен сыни тұрғыдан ойлау арқылы табатыны курстың құндылығын арттырады. Курста келтірілген тапсырмалар оқушылардың жас ерекшеліктеріне сай, деңгейленіп жеңіл тапсырмадан күрделіге көшу принципімен ұсынылған. Кейбір тақырыптарды меңгеру үшін интерактивті курстарды өту ұсынылады. Курста Java тілінің жеңіл меңгертудің негізгі әдістемелері қарастырылған [3].

Бұл әдістемелерді іске асыру мақсатында біздің мектепте келесі ресурстарды қолданып, тәжірибе жасадық:

CodeAcademy (https://www.codecademy.com) - оқушыларға интерактивті курстардан өтіп, негіздерден бастап нақты қосымшаларды құруға дейін көмектесетін онлайн-платформа.

SoloLearn (https://www.sololearn.com) - шағын сабақтар мен тапсырмалар арқылы Java-ны оқытуға арналған қосымша.

Replit (https://replit.com) - Java-да кодты тікелей браузерде жазуға және іске қосуға мүмкіндік беретін, интеграцияланған даму құралдары мен ресурстарына қол жеткізуге мүмкіндік беретін онлайн-редактор.

Stepik (https://stepik.org) - бұл курстарды құруға және өтуге арналған онлайн-платформа. Онда әртүрлі тақырыптарды қамтитын курстар, соның ішінде Java бағдарламалау тілі бар. Платформа теориялық материалды да, практикалық тапсырмаларды да ұсынады. Бұл студенттерге ұғымдарды үйренуге ғана емес, сонымен қатар нақты мәселелерді шешуге мүмкіндік береді.

Stepik-тің артықшылықтары:

1. Жетекші университеттердің курстары жинақталған: платформада ірі университеттердің оқытушылары әзірлеген курстарды табуға болады, бұл курстарға академиялық құндылық қосады.

2. Интерактивтілік: Stepik оқушыларға бірден кері байланыс бере отырып, шешімдерді автоматты түрде тексеретін тапсырмаларды ұсынады.

3. Икемділік: оқушылар сабақтар мен тапсырмаларды ыңғайлы уақытта өту арқылы өз қарқынымен, өз қалауымен кез келген уақытта үйрене алады.

4. Қауымдастық: тапсырмаларды талқылау және шешімдерді басқа оқушылармен бөлісу мүмкіндігі оқушыларға сыни ойлауды дамытуға және топта жұмыс істеуге көмектеседі.

JavaRush - бұл бағдарламалауды үйренудің тағы бір керемет ресурсы. Әсіресе Java тілін үйренгісі келетін жаңадан бастаушылар үшін. Бұл ресурс та оқытудың интерактивті тәсілін ұсынады және көптеген ерекше ерекшеліктерге ие. Платформа оқушыларға теорияны үйренуге ғана емес, сонымен қатар практикалық мәселелерді бірден шешуге мүмкіндік беретін қадамдық сабақтардан тұрады. Бұл мектеп оқушылары үшін де, білімдерін тереңдеткісі келетін жаңадан бастаушылар үшін де өте қолайлы.

Javarush-тың артықшылықтары:

1. Қадамдық оқыту: JavaRush курстары оқушылар материалды қарапайым ұғымдардан күрделіге дейін біртіндеп өтетіндей етіп құрылымдалған. Әрбір жаңа сабақ алдыңғы сабаққа негізделеді, бұл студенттерге жаңа тақырыптарды оңай меңгеруге мүмкіндік береді.

2. Интерактивті тапсырмалар: платформа автоматты түрде тексерілетін тапсырмаларды ұсынады. Бұл студенттерге тапсырманы дұрыс шешкенін бірден көруге мүмкіндік береді және оқу процесінде дағдыларын жақсартуға көмектеседі.

3. Кері байланыс: қателер болған жағдайда, платформада егжей-тегжейлі кері байланыс беріледі, бұл оқушыларға кемшіліктерді тез жоюға және қателіктерінен сабақ алуға көмектеседі.

4. Геймификация: бүкіл оқу процесі оқушыларды оқуды жалғастыруға және жаңа мақсаттарға жетуге ынталандыратын деңгейлері, ұпайлары және жетістіктері бар ойын ретінде құрылған.

Мұғалімдер оқушылардың үлгерімін бақылап, қиын тапсырмаларға көмектесе алады. Javarush-ті мектепте бағдарламалауға арналған ұсынылған платформалар тізіміне қосуға ұсынылады.

Қосымша қызығушылықты дамыту.

Java тілін үйрену оқушыларға компьютер ғылымдары мен технологиялар саласына деген қызығушылықты арттырады. Бұл пәннің интерактивті және шығармашылық бағытта болуы, мысалы, ойындар немесе графикалық редакторлар сияқты жобалар жасау, оқушылардың пәнге деген қызығушылығын оятады. Өз жобаларын жасау арқылы олар өз қабілеттерін шыңдап, практикалық дағдыларға ие болады.

Жаңа технологиялармен танысу мүмкіндігі.

Java тілі көптеген заманауи технологиялардың негізін қалаушы болып табылады, мысалы, мобильді қосымшалар (Android платформасы), веб-сайттар, деректер базасы және тағы басқа. Оқушылар Java тілін үйрену арқылы осы технологиялармен танысып, оларды пайдалануды үйренеді. Бұл болашақта өздерінің шығармашылық немесе кәсіпкерлік жобаларын жасауға мүмкіндік береді.

Java программалау тілін үйренудің маңызды аспектілерін зерттей отырып, орта мектептердің физика-математика, информатиканы бейімдеп оқыту мектептерінде 10-сыныптан бастап «Бағдарламалау»пәні енгізілді. Пәннің мазмұнында келесі тақырыптар қарастырылуда:

1. Java-ға кіріспе

Java тіліне кіріспе кезінде оқушыларға ең алдымен айнымалылар, операторлар, және негізгі класстар түсіндіріледі. Айнымалылар мәліметтерді сақтау үшін қолданылады, ал операторлар бұл мәліметтерге математикалық және логикалық әрекеттерді орындауға мүмкіндік береді. Негізгі класстар Java-да объектілерді құруға және манипуляция жасауға мүмкіндік береді. Осы түсініктерді меңгеру оқушының болашақта күрделі программалық жүйелерді жасау қабілетін дамытады.

2. Базалық конструкциялар

Java программалау тілінде шартты операторлар мен циклдер маңызды рөл атқарады. Шартты операторлар (if-else, switch-case) бағдарламаның ағынды бақылауға мүмкіндік береді. Циклдер (for, while, do-while) қайталанатын әрекеттерді орындауға мүмкіндік береді. Бұл құралдар оқушыларға тиімді алгоритмдер құруға үйретеді [3].

3. Функциялар мен әдістер

Программалаудағы функциялар мен әдістер әртүрлі міндеттерді орындауға арналған бөліктер болып табылады. Оларды дұрыс қолдану кодтың құрылымын жеңілдетіп, оны қайта пайдалану мүмкіндігін арттырады. Java тіліндегі әдістердің ерекшелігі – олар объектілік бағытта жұмыс істейді, яғни әр әдіс белгілі бір объектінің қасиеттері мен мінез-құлқына негізделеді [4].

4. Массивтермен жұмыс

Массивтер – бір типті деректерді сақтайтын құрылымдар. Java тілінде массивтерді қолдану оқушыларға үлкен деректер жинақтарын басқаруға мүмкіндік береді. Бұл тақырыпта оқушылар массивтерді құру, олармен жұмыс істеу әдістерін үйренеді.

5. Файлдармен жұмыс

Java тілінде файлдармен жұмыс істеу – маңызды дағдылардың бірі болып табылады. Бұл тақырыпта оқушылар файлдарды ашу, оқу, жазу және жабу операцияларын орындай алады. Файлдармен жұмыс істеу әртүрлі деректерді сақтау және оларды өңдеуде маңызды болып табылады.

6. Объектілі-бағытталған программалау (ОББ)

Java тілінің басты ерекшеліктерінің бірі – оның объектілі-бағытталған бағдарламалау (ОББ) концепциясына негізделуі. ОББ тілінде деректер мен оларды өңдейтін функциялар бірлесіп жұмыс істейді. Оқушылар класстар, объектілер, мұрагерлік, инкапсуляция және полиморфизм сияқты ОББ принциптерін үйренеді. Бұл тақырып заманауи программалау әдістерін меңгеруге жол ашады [8].

7. Коллекциялар (топтамалар)

Java тілінде деректерді сақтау үшін коллекциялар жиі пайдаланылады. Бұл бөлімде оқушылар List, Set, Map сияқты Java коллекцияларымен жұмыс істеуді үйренеді. Коллекциялар деректерді басқару мен ұйымдастыруды оңайлатады [7].

8. Оқытуда қарапайым қосымшаларды жобалау әдісі

Java-ның негізгі құралдары мен концепцияларын меңгергеннен кейін оқушылар қарапайым қосымшаларды жобалау процесін бастайды. Мұндай жобалар арасында "Калькулятор", "Жылан ойыны", "Графикалық редактор" сияқты тапсырмалар бар. Бұл жобалар оқушыларға алған теориялық білімдерін практикада қолдану мүмкіндігін береді, сонымен қатар олардың шығармашылық ойлау қабілетін дамытады.

Бұл бөлімдерді оқыту үшін әр түрлі интерактивті педагогикалық әдістемелер зерттелді [8]. Атап айтқанда пәннің мазмұнында сабақтың әр кезеңінде барлық әдіс-тәсілдерді қолдануға болады, алайда келесі әдістер Java программалау тілін заманауи оқыту мүмкіндіктерін аша түседі деген ойдамын.

Интерактивті оқыту әдістері

Интерактивті оқыту әдістері оқушылардың теориялық білімдерін практикада қолдануға мүмкіндік береді. Мұнда оқушы теорияны түсінгеннен кейін тапсырмаларды орындап, өз білімін жетілдіреді. Бұл әдіс оқушыларды белсенді оқуға тартуға және олардың оқу мотивациясын арттыруға ықпал етеді.

Практикалық жобалар:

- **Калькулятор:** Қарапайым калькулятор жасау арқылы оқушылар пайдаланушыдан мәлімет алу, математикалық операцияларды орындау, нәтижелерді шығару сияқты негізгі принциптерді үйренеді.
- **Жылан ойыны:** Бұл жоба арқылы оқушылар ойын логикасын жүзеге асыруды үйреніп, массивтермен жұмыс істеп, пайдаланушының енгізуін өңдейді.
- **Графикалық редактор:** Осы жоба арқылы оқушылар графикалық интерфейсті құрып, пайдаланушының әрекеттерін өңдеу және графикалық элементтерді басқару бойынша тәжірибе алады [5].

Зерттеу нәтижелері. Жұмыстың аралық және қорытынды нәтижелері бар. Авторлық жұмыс аппробациядан өтуде және оқушылардың бағдарламалауға деген қызығушылығын арттырып, білім беру процесіне құнды үлес қосуда, білім сапасын көтеруге ат салысуда, оң нәтижелерін беруде.

"Java программалау тілі" тақырыбында зерттеліп құрастырылған авторлық бағдарлама және оған қосымша жазылған оқу-әдістемелік құралы жалпыбілім беретін мектептерде, арнаулы білім беретін мектептерде, дарынды балаларды дайындайтын білім беру мекемелерінде бағдарламалауды оқыту үшін заманауи, өзекті және әдістемелік сауатты ресурс болып табылады. Авторлық жұмысты мектеп тәжірибесінде қолдануға ұсынылады, сонымен қатар бағдарламалауды оқытуда заманауи тәсілдерді енгізуге ұмтылатын мұғалімдер үшін де пайдалы. Бағдарламалауды ерте жастан үйренуге арналған құрал ғана емес, сонымен қатар IT саласындағы білімді енгізу және бекіту үшін дайын шешім болып табылады. Авторлық жұмыс жалпы білім беретін мектептерде Java тілінде бағдарламалауды оқытуды тиімді ұйымдастыруға мүмкіндік береді, бұл қазіргі еңбек нарығында сұранысқа ие оқушылардың құзыреттілігін дамытуға ықпал етеді. Оны сыныпта да, өзін-өзі зерттеу үшін де қолдануға болады, бұл оны оқушылардың әртүрлі санаттары үшін жан-жақты және қолжетімді етеді.

Қорытынды. Java тілін мектепте оқыту — оқушыларға тек программалау дағдыларын үйретіп қана қоймай, олардың шығармашылық және аналитикалық ойлау қабілеттерін дамытуға да ықпал етеді. Бұл тіл балаларға сандық әлемді түсініп, болашақ мамандықтарына дайындалуға көмектеседі. Java-ны оқыту оқушыларға үлкен мүмкіндіктер ашып, жаңа технологиялар мен құралдарды меңгеру жолында маңызды қадам болады. Сондықтан, мектеп бағдарламасында Java тілін оқыту қазіргі заманның талаптарына толық жауап береді және оқушылардың болашақта табысты болуына үлкен септігін тигізеді. Сонымен қатар нақты жобалар әдісін қолдану арқылы оқушылардың бойындағы практикалық дағдыларды дамытуға мүмкіндік береді [6]. Интерактивті оқыту әдістері оқушылардың теорияны тереңірек түсінуіне және өз білімдерін нақты жобаларда қолдануға септігін тигізеді [2]. Мұндай әдіс арқылы Java тілінің негізгі аспектілерін меңгеру оңай және қызықты болатыны сөзсіз. Мектеп бағдарламасына Java бағдарламалау тілін енгізу оқушыларға техникалық салада даму үшін кең мүмкіндіктер ашады. Java тілімен ерте танысу сыни ойлау мен проблемаларды шешу дағдыларын қалыптастыруға ғана емес, сонымен қатар болашақ мамандарды заманауи цифрлық әлемнің талаптарына дайындайды. Бұл мақала Java тілін оқыту процесін қызықты әрі тиімді ететін интерактивті және жобалық оқыту әдістерін қолданудың маңыздылығын атап өтті. Осылайша, мектептерде Java тілін оқыту техникалық саланы дамытуға үлкен үлес қоса алатын жоғары білікті мамандарды даярлаудың негізгі элементі болып табылады. Ерте бағдарламалау біліміне инвестиция салу - еліміздің болашағына салынған инвестиция.

РЕЗЮМЕ

В современном мире, где технологии пронизывают все сферы жизни, подготовка квалифицированных IT-специалистов становится задачей первостепенной важности. И

начинать эту подготовку необходимо со школьной скамьи. Язык программирования Java, один из самых востребованных и универсальных, может стать тем ключом, который откроет перед школьниками двери в мир высоких технологий.

Почему именно Java? Во-первых, это язык с богатой историей и обширным сообществом, что гарантирует наличие множества обучающих материалов и поддержки. Во-вторых, Java используется в разработке самых разнообразных приложений: от мобильных и веб-приложений до корпоративных систем и больших данных. В-третьих, изучение Java развивает у учащихся алгоритмическое мышление, логику и способность к решению сложных задач, что пригодится им в любой профессии.

Внедрение курса Java в школьную программу – это инвестиция в будущее страны. Это позволит:

- Повысить уровень технической грамотности школьников. Они научатся не только пользоваться технологиями, но и понимать, как они работают, и создавать собственные приложения.
- Сформировать у учащихся навыки, востребованные на рынке труда. Знание Java даст им конкурентное преимущество при поступлении в вузы и трудоустройстве.
- Стимулировать интерес к IT-сфере. Раннее знакомство с программированием поможет выявить талантливых учеников и направить их на путь инноваций и технологического развития.
- Содействовать развитию IT-индустрии в стране. Подготовка квалифицированных кадров – это залог успешного развития высокотехнологичных отраслей экономики.

В рамках данного исследования была разработана авторская программа и учебно-методическое пособие для учителей и учащихся 10 классов, направленные на эффективное внедрение Java в образовательный процесс. Эти материалы учитывают возрастные особенности школьников и современные педагогические подходы, обеспечивая доступное и интересное обучение программированию.

Это возможность вырастить поколение, способное не только адаптироваться к стремительно меняющемуся миру, но и создавать новые технологии, которые сделают нашу жизнь лучше.

УДК 621.315
МРНТИ 44.29.37

Лелеш Н.В., магистр технических наук, https://orcid.org/0000-0002-0227-3251
НАО «Западно-Казахстанский аграрно-технический университет имени Жангир хана», 090009, ул. Жангир хана, 51, г. Уральск, Республика Казахстан, lelesh-79@mail.ru
Харин Т.М. руководитель группы производственного отдела «ТОО ЗапКазРЭК», г. Уральск, Проспект Абая, строение 181, kharin.57@mail.ru

Lelesh N.V., Master of Technical Sciences, https://orcid.org/0000-0002-0227-3251
NJSC«West Kazakhstan Agrarian and Technical University named after Zhangir Khan», Uralsk, st. Zhangir khan 51,090009, Kazakhstan, lelesh-79@mail.ru
Kharin T.M. Head of the Production Department Group «ZapKazREC LLP» Uralsk, Abay Avenue, building 181, kharin.57@mail.ru

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ОБНАРУЖЕНИЯ ГОЛОЛЁДНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ НА ПРОВОДАХ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ
MODERN METHODS FOR DETECTING ICY DEPOSITS ON OVERHEAD POWER LINE WIRES

АННОТАЦИЯ

В этой статье рассматриваются основные методы устранения гололеда на проводах воздушных линий электропередачи. Рассматриваются схемы плавки гололедно-изморозевых отложений (ГИО) в высоковольтных и распределительных электрических сетях. Представлена структура комплексной автоматизированной системы мониторинга, локализации и ликвидации гололеда. Система автоматически измеряет и учитывает внешние и внутренние воздействия на линии электропередачи с помощью прогнозов изменений метеопараметров. Экспериментальные исследования обледенения показывают, что количество обледенения на линиях электропередачи увеличивается с более высокой скоростью ветра, средним диаметром объема переохлажденных капель воды и содержанием жидкой воды, но уменьшается с повышением температуры окружающей среды.

Отслеживание состояния воздушных линий электропередачи (ВЛ) с использованием современных инструментальных методов неразрушающего контроля предоставляет возможность обнаружения, анализа и классификации повреждений и дефектов, возникающих в процессе эксплуатации. Этот подход позволяет проводить всестороннюю оценку состояния линий.

Цель состоит в том, чтобы создать надежную модель для прогнозирования толщины льда на проводах и точно контролировать процесс нарастания обледенения. В этой работе представлен обзор текущих стратегий мониторинга обледенения, применяемых в различных странах. Кроме того, в работе рассматриваются модели роста обледенения, созданные учеными в ходе длительных исследований.

ANNOTATION

This article discusses the main methods for eliminating ice on overhead power lines. Melting schemes of icy-frost deposits (GMOs) in high-voltage and distribution electric networks are considered. The structure of an integrated automated system for monitoring, localization and elimination of ice is presented. The system automatically measures and accounts for external and internal impacts on power transmission lines by forecasting changes in weather parameters. Experimental studies of icing show that the amount of icing on power transmission lines increases with higher wind speed, the average diameter of the volume of supercooled water droplets and the liquid water content, but decreases with increasing ambient temperature.

Monitoring the condition of overhead power transmission lines using modern instrumental methods of non-destructive testing provides an opportunity to detect, analyze and classify damages and defects that occur during operation. This approach allows for a comprehensive assessment of the condition of the lines.

The goal is to create a reliable model for predicting the thickness of ice on wires and accurately control the process of icing build-up. This paper provides an overview of current icing monitoring strategies used in various countries. In addition, the paper examines models of icing growth created by scientists during long-term research.

Ключевые слова: *обледенение; воздушные линии; гололёдные образования, обрыв проводов; методы борьбы; механические; электрические; надежность электроснабжения*

Key words: *icing; overhead lines; ice formations, wire breakage; control methods; mechanical; electrical; reliability of power supply*

Введение. Эта тема актуальна из-за стратегического аспекта развития электроэнергетики Казахстана. Развитие электрических сетей является наиболее важным показателем уровня электроэнергетики. Воздушные линии электропередачи (ЛЭП) являются наиболее ответственным и наиболее уязвимым звеном электрической сети.

В осенне-зимний период на воздушных линиях электропередачи возникает значительная проблема обледенения проводов. В результате этого происходят значительные провисания и обрывы проводов, повреждения арматуры и повреждения опор воздушных линий электропередачи. В результате гололедных аварий на линиях электропередачи происходят массовые аварии, при которых потребителям не хватает электроэнергии и требуются ремонтно-восстановительные работы [1].

Многообразие ветровых и гололедных нагрузок характеризует область прохождения воздушных линий. Повторяемость ветра составляет от 25 до 45 м/с, а толщина гололеда составляет 10–30 мм. Специфические атмосферные процессы в рассматриваемых районах, а также сложная орфография рельефа местности определяют погодные условия, обусловливающие эти проявления.

Более 50% аварий на воздушных линиях в Казахстане связаны с гололедно-ветровыми погодными условиями. Кроме того, продолжительность отключения электроэнергии для потребителей превышает 60% от общей продолжительности всех аварийных отключений [2].

Одностороннее отложение гололеда может вызвать колебания проводов или пляски, а цилиндрическая форма гололеда может вызвать вибрации.

Многочисленные аварийные ситуации показали, что оптимальное проектирование линии (без использования только расчета и определения ее геометрических параметров) невозможно без использования различных методов и устройств, ограничивающих и предупреждающих воздействие атмосферы на линию.

Влияние на образование гололеда на проводах воздушных линий зависит от климата региона и ряда метеорологических закономерностей. В частности, влажность и температура окружающего воздуха, режим ветра и скорость ветра сильно влияют на тип льда, при этом более высокая скорость ветра приводит к образованию более плотного обледенения. На образование гололеда также влияют размеры диаметра проводов, высота их подвеса и жесткость снега [3].

Таким образом, в настоящее время существует два метода обнаружения гололеда: первый использует данные метеорологии и технические параметры ЛЭП для прогнозирования вероятности возникновения гололеда; второй — непосредственно контролирует процесс гололедообразования на проводах с помощью датчиков и устройств обнаружения гололеда, что позволяет достаточно точно определить момент начала необходимой плавки [4].

Обледенение линий электропередачи является важным вопросом для многих стран, где используется прогнозирование гололедообразования на основе данных о погоде [5].

Материалы и методы исследования. Работа по прогнозированию гололедообразования на проводах воздушных линий ведется в исследовательских центрах во всем мире многих компаний и организаций. Прогнозы основаны на модельных закономерностях метеорологических явлений, таких как температура и влажность воздуха, ветровые давления и изменения высоты от поверхности земли. Кроме того, учитываются климатические условия, рельеф местности, где проходит трасса воздушной ЛЭП [6].

Поскольку точные диапазоны температур для условий выпадения влажного снега, продолжительность осадков и количество жидкой воды в обледенении неизвестны, применяемые модели гололедообразования делают несколько предположений. Все это снижает вероятность прогнозирования модели. Кроме того, важно учитывать, что протекающий электрический ток нагревает провод за счет эффекта Джоуля [7].

В настоящее время нет определенной модели возникновения гололедных отложений, которая может достоверно учитывать все физические и механические процессы, участвующие при обледенении, поэтому количество ложных тревог высоко. К сожалению, эти прогнозы являются предупреждением о потенциальной опасности

возникновения гололеда и не могут дать конкретное указание о начале плавки гололеда на проводах воздушных линий электропередачи [8].

На сегодняшний день имеется огромное количество патентов, предлагающих методы и датчики для обнаружения гололеда.

Датчики при появлении гололеда на ЛЭП реагируют на изменения:

• физических параметров среды, окружающей провода;

• электрических характеристик проводов;

• веса или натяжения проводов;

• условий распространения высокочастотных и импульсных сигналов по проводам воздушных линий [9].

Применение автоматических систем контроля гололёдообразования снижает риск аварии, обнаруживая образование гололёда на ранней стадии, когда на элементы ВЛ минимальна нагрузка. Недостаток данного способа диагностирования — это несовершенство подобных систем и как следствие большое количество ложных срабатываний или не срабатываний.

Автоматические системы обнаружения гололёда на ВЛ базируются на ряде методов.

• Тензометрический. Используются датчики тяжения провода, которые подвешиваются между траверсой опоры и гирляндой изоляторов.

• Инклинометрический. Применяются датчики измерения угла наклона проводов ВЛ. При увеличении гололедной нагрузки на провода изменяется угол их наклона.

• Локационный. В линию электропередачи подается импульс от генератора высокой частоты и анализируется форма и время прохождения сигнала. При наличии на проводах гололёдных образований изменяется время прохождения импульса в прямом и обратном направлении, а также его амплитуда (наблюдается запаздывание сигнала и уменьшение его амплитуды).

• Параметрический. Основан на измерении и анализе параметров, характеризующих условия возникновения гололёдно-изморозевых отложений на проводах. Как правило измеряется скорость и направление ветра, температура и относительная влажность воздуха, температура провода и др.

• Оптический. Основан на применении систем фиксации и распознавания изображения [10].

Методы взвешивания проводов и локационного зондирования линий электропередачи были обнаружены как эффективные методы борьбы с гололёдом.

Известны случаи, когда гололед достигает критических значений за считанные часы. Подготовка устройства для плавки гололеда к использованию может занять от одного часа до двух часов (зависит от схемы плавки, потребителя, протяженности кабеля и других факторов). Таким образом, плотный гололед может иметь толщину от 50 до 70 миллиметров, что приводит к значительной утяжеленности проводов. В некоторых случаях гололедно-изморозевые отложения могут весить более 4 кг на погонный метр провода [11].

Толщина стенки гололеда, допустимая для линий с различным номинальным напряжением, зависит от климата. Правила устройства электроустановок (ПУЭ) включают карты районирования территории по толщине стенки гололеда и нормативные значения стенки гололеда для различных климатических зон [12].

Таким образом, для эффективной борьбы с гололедом необходимо две вещи: быстрое обнаружение начала гололедообразования и получение достоверной и надежной информации о динамике гололедообразования.

Несвоевременная и недостоверная информация о гололеде приводит к авариям и значительным убыткам. Наиболее объективным методом определения величины гололедной нагрузки на проводах воздушной линии является измерение веса одного или

нескольких пролетов. В этом случае величина натяжения провода зависит от нагрузки от ветра и гололеда, а также от температуры окружающей среды. Весовой (тензометрический) датчик используется для оценки степени напряженного состояния провода и сравнения ее с предельно допустимым значением. Канал связи используется для передачи данных от датчиков на диспетчерский пункт [13].

В настоящее время в некоторых энергосистемах Казахстана используются весовые датчики для автоматической информационной системы контроля гололедообразования на воздушных линиях (АИСКГ).

Система обнаружения гололеда «CAT-1», созданная американской компанией The Valley Group, Inc., которая в 2007 году вошла в концерн NEXANS, используется за рубежом. Эта система включена в более чем сто энергосистем по всему миру [14].

В упомянутой системе АИСКГ для обнаружения гололеда используются весовые точечные датчики, которые измеряют массу гололеда только около одной опоры ЛЭП. Устройства видеонаблюдения используются для расширения зоны контроля. Прогнозирование опасных гололедных отложений на ЛЭП использует температуру токонесущего провода и данные о влажности, температуре и направлении ветра. АИСКГ состоит из приемных пунктов и пунктов контроля на линиях электропередачи в местах наиболее вероятного гололедообразования [15].



а) б)

Рисунок 1 - а) отложения гололёда на ЛЭП; б) датчик измерения температуры окружающей среды, устанавливаемый на основном модуле «CAT-1» и позволяющий измерять температуру с точностью 0,1°C для последующей передачи в систему.

Микропроцессорные линейные преобразователи; датчики температуры провода; датчики гололедной нагрузки на проводах и грозозащитных тросах; устройства видеонаблюдения; автоматические метеопосты с датчиками температуры (рисунок 1, б), влажности, скорости и направления ветра; датчики температуры провода; устройства передачи и приема данных через каналы связи, такие как радиоканалы в диапазоне УКВ, сотовые каналы, спутниковые каналы, волоконно-оптические

В АИСКГ входят пункты контроля, каждый из которых может выдавать до тридцати параметров. Приемные пункты предоставляют информацию подсистеме сбора данных АИСКГ и выполняют циклический опрос пунктов контроля с определенной частотой (1–30 мин).

К сожалению, вес провода с гололедными отложениями измеряется на отдельных пролетах воздушной линии. Однако на других неконтролируемых пролетах линии гололед может оставаться незамеченным. Таким образом, необходимо увеличить

количество датчиков и устройств, передающих их показания на пункт управления, чтобы повысить точность измерений. Это сложная техническая задача.

Весовые датчики также не универсальны. Они не могут использоваться без настройки для любого типа ЛЭП, который зависит от мощности самой линии. Эти параметры включают диаметр, количество проводов в фазе, количество изоляторов и длину пролета между опорами.

Как указано в начале статьи, этот метод, несмотря на свои недостатки, используется в ряде энергорайонов из-за отсутствия других промышленно разработанных методов.

При локационном способе обнаружения гололеда любая неоднородность волнового сопротивления на линии или реперной точке передает информацию о появлении гололеда. Концы линий или ответвлений, ВЧ-заградители, места присоединения ответвлений к линии электропередачи, места соединения воздушных линий с кабельными вставками и многое другое являются примерами неоднородностей. Увеличение времени прохождения $\Delta\tau$ отраженного импульса определенного участка линии сопровождается уменьшением амплитуды U [16].

Результаты исследования. Исследователи в России и за рубежом предложили несколько моделей прогнозирования обледенения проводов. Тем не менее, из-за сложности процессов обледенения и погрешностей в измерении параметров эти модели считаются ненадежными, что ограничивает их использование в инженерной практике. Несмотря на это, они имеют теоретическое значение и полезны для академических исследований в области защиты от обледенения и снижения риска аварий в электросетях.

В Казанском государственном энергетическом университете (КГЭУ) с 1998 года проводятся исследования локационных методов обнаружения повреждений и гололеда на линиях электропередачи [16-17]. Импульсный сигнал подается в линию в методе локационного зондирования. Затем, после отражения от конца линии либо высокочастотного (ВЧ) заградителя, вычисляется общее время, необходимое для распространения сигнала вдоль провода как в прямом, так и в обратном направлении [17].

Локационное устройство, осуществляющее зондирование ЛЭП, называется рефлектометром, функциональная схема которого представлена на рисунке 2.




Рисунок 2 - Функциональная схема локационного устройства

Импульсы подаются в линию с генератора импульсов (ГИ) рефлектометра. Отраженные импульсы передаются в приемник с линии. Преобразуемые сигналы поступают на графический индикатор с выхода приемника. Сигналы от блока управления (БУ) поступают во все блоки рефлектометра. Рефлексограмма линии представляет собой отражение отраженных импульсов на временной оси в результате неоднородностей, вызванных зондирующим импульсом.

Локационный метод обнаружения гололеда на проводах ЛЭП обладает высокой чувствительностью, что позволяет быстро обнаруживать гололед с толщины стенки 0,5 мм и ниже. Недостатком классического локационного метода является невозможность различить небольшое по толщине гололедное образование на большой длине воздушной линии от опасной концентрации льда в отдельных пролетах. В этом случае воздушная линия разделяется на отдельные места, чтобы определить удельные толщины стенки гололедного отложения. Наибольшая величина определяет необходимость плавки гололеда [18].

Исследования показывают, что при температуре воздуха около -5 °C и скорости ветра 5–10 м/с на ВЛ образуются гололедные отложения.

Для ВЛ с номинальным напряжением 3–330 кВ, расположенных в климатических районах с категорией гололеда I–IV, допустимая толщина стенки гололедной муфты составляет от 5 до 20 мм [19].

В этой работе ставится задача систематизации и сравнительного анализа существующих методов борьбы с гололедными отложениями. Решение этой задачи позволит выбрать из существующих технических вариантов наиболее эффективное для местных условий. Таким образом, разработка активных методов борьбы с гололедными отложениями на проводах линий электропередач остается актуальной. Плавка гололеда на проводах ЛЭП переменным током является одним из традиционных методов. Другие методы включают использование неуправляемых или управляемых выпрямительных блоков для создания постоянного тока или искусственного создания коротких замыканий (КЗ). Тем не менее, в первом случае возможно повреждение проводов ВЛ, а во втором случае дорогостоящие выпрямительные блоки не используются большую часть календарного года.

Аппаратура локационного комплекса обнаруживает обрывы и короткие замыкания в проводах линий электропередачи, измеряя расстояния до обрыва, при этом диспетчеру быстро передается информация о повреждениях через локальные сети подстанции или канал GSM, что позволяет ему принимать необходимые меры. Аппаратура локационного комплекса также обеспечивает раннее обнаружение гололедных отложений на проводах линий электропередачи с указанием их толщины с 1 мм, что позволяет отслеживать динамику гололедообразования. Локационный комплекс подключается к линии электропередачи через фильтр присоединения и конденсатор связи. Он зондирует линию импульсных сигналов, а затем принимает и обрабатывает отражения от неоднородностей волнового сопротивления [20].

Технико-экономические преимущества внедрения системы локального мониторинга линий электропередач на подстанциях электрических сетей включают:

• Предотвращение обрывов проводов и поломки опор линий электропередачи во время гололедообразования; снижение перебоев в электроснабжении за счет точного определения места и вида повреждений проводов ЛЭП.

• Сбережение ресурсов за счет повышения надежности ЛЭП за счет предотвращения гололедных аварий

• Сохранение ресурсов путем увеличения срока службы проводов электропередачи за счет предотвращения их перегрева в результате гололедных отложений, а также сохранение ресурсов высоковольтных выключателей за счет предотвращения ложных срабатываний автомата повторного включения ЛЭП при металлических коротких замыканиях.водоснабжения;

• Энергосбережение за счет избегания перестраховочной плавки гололедных отложений, поскольку этот процесс требует большого количества энергиисуд [21].

Заключение. Проблема обледенения проводов линий электропередач и контактных сетей остается одной из наиболее важных проблем для многих стран. Каждый из нынешних методов борьбы с гололедом обладает определенными

недостатками. Таким образом, разработка эффективных, экономичных и безопасных средств и методов для предотвращения обледенения, снижения размеров и удаления гололеда остается важным вопросом. В то же время, учитывая состояние электросетевого хозяйства Казахстана за последние два десятилетия, а также изменения климата в стране, необходимо своевременно решать проблемы, связанные с повышением надежности электроснабжения на этапах проектирования электрических сетей, токоприемниках контактных сетей, заниматься вопросами резервирования потребителей согласно ПУЭ и заменой старых проводов на современные, более надежные провода.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. В Западном Казахстане подсчитали предварительный ущерб от зимней непогоды и обледенения линий электропередач [Электронный ресурс]. – режим доступа: https://astanatv.kz/ru/news/37339/ 13.01.2015г.

2. Дюсебаев, М.К., Повышение эффективности энергоснабжения потребителей при воздействии гололедно-ветровых нагрузок в Казахстане / М.К. Дюсебаев, Ж.С.Абдимуратов Ж.С. // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. 2017. № 10-2. С. 191-195;URL: https://applied-research.ru/ru/article/view?id=11886(дата обращения: 13.03.2025).

3. Feng Yang, Lei Xia, Xiangkun Wang / Experimental analysis of the impact of micrometeorological factors on overhead transmission line icing / Proceedings Volume 13261, Tenth International Conference on Mechanical Engineering, Materials, and Automation Technology (MMEAT 2024); [Электронный ресурс]. – режим доступа: https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2s2.085206627083&origin=resultslist&sort=plff&src=s&sot=b&sdt=b&s=TITLE%28overhead+transmission+line+icing%29&sessionSearchId=7f29254814ad31bef250b1b1ab4724de&relpos=5

4. Колесов, И.Н. Гололёдные образования на линии электропередач и методы борьбы с ними / И.Н. Колесов, А.Э. Богачев, Ю.В. Абрамов // Перспективное развитие науки, техники и технологий: сборник научных статей 11-ой Международной научно-практической конференции, Курск, 29 октября 2021 года. – Курск: Юго-Западный государственный университет, 2021. – С. 137-141.

5. Носенко, А. Мониторинг метеорологических условий на энергообъектах распределительных сетей / А. Носенко, М. Панкратов, М. Шишков // Электроэнергия. Передача и распределение. – 2021. – №3 (22). – С. 16-26.

6. Simovic Aleksandar, Cincar Nada, Bozovic Dajana, Vaskovic Miljan / Analysis of the Impact of Additional Load on Overhead Electrical Lines in Bosnia and Herzegovina // 23rd International Symposium INFOTEH-JAHORINA, INFOTECH 2024 - Proceedings 2024 23rd International Symposium East Sarajevo 20 March 2024до 22 March 2024. [Электронный ресурс]. – режим доступа:https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85192165202&origin=resultslist&sor t=plf -f&src=s&sot=b&sdt=b&s=TITLE%28Analysis+of+the+Impact+of+Additional+Load+on+Overhead+ Electrical+Lines+in+Bosnia+and+Herzegovina%29&sessionSearchId=7f29254814ad31bef250b1b1ab4724de.

7. Школа для электрика [Электронный ресурс]. – режим доступа: https://electricalschool.info/main/vl/2915-gololed-i-izmoroz-na-provodah-vl-i-borba-s-nimi.html.

8. Huang Huan, Chen Yifei, Mao Xianyin, Yang Lin, Zhang, Yizhao, Yang Qi, Zhang Qili / Risk Assessment Method of Overhead Line after Ice-shedding under Ice and Wind loads // 2024 IEEE International Conference on High Voltage Engineering and Applications, ICHVE 2024 - Berlin 18 August - 22 August. [Электронный ресурс]. – режим доступа:

https://www.scopus.com/ record/display.uri?eid=2-s2.0-85205679188&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sot=b&sd t=b&s=TITLE%28Ice-shedding+under+Ice+and+Wind+loads%29&sessionSearchId= 7f29254814ad31bef250b1b1ab4724de.

9. Использование цифровых датчиков обнаружения гололедных отложений на проводах линий электропередачи [Электронный ресурс]. – режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/ispolzovanie-tsifrovyh-datchikov-obnaruzheniya-gololednyh-otlozheniy-na-provodah-liniy-elektroperedachi/viewer.

10. Ткачук, Я. Методы защиты ЛЭП 35-110 кВ при образовании ГИО на проводах и грозозащитных тросах / Я. Ткачук, Д. Сахно // Электроэнергия. Передача и распределение. – 2023. – № S2(29). – С. 24-26. – EDN GYXUZM.

11. Яковлев, Л.В. Комплексные методы и устройства для защиты проводов и грозозащитных тросов воздушных линий от вибрации, «пляски» и гололедообразования // Энергетик. 2004. № 3. С. 15–17.

12. Закон Республики Казахстан Об утверждении Правил устройства электроустановок [Электронный ресурс]. – режим доступа: https://adilet.zan.kz/rus/docs/V1500010851

13. Li Zhigang, Zhou Wenwu, Li Yasong, Zhang Xiaoli, Wang Xueming / Computational Analysis on Jump Height of Overhead Transmission Lines After Uneven Ice Shedding //Proceedings of 2024 International Conference on Energy and Electrical Engineering, EEE. Nanchang5 July 2024до 6 July 2024. [Электронный ресурс]. – режим доступа: https://www.scopus.com/results/results.uri?st1=Experimental+analysis+of+the+impact+of+micrometeorological+factors&st2=&s=TITLE%28Overhead+Transmission+Lines+After+Uneven+Ice+Shedding%29&limit=10&origin=searchbasic&sort=plf-f&src=s&sot=b&sdt=b&sessionSearchId =7f29254814ad31bef250b1b1ab4724de.

14. Система мониторинга «САТ-1» – эффективная защита ВЛЭП от гололёда. [Электронный ресурс]. – режим доступа: https://www.ruscable. ru/article/energy/Sistema_monitoringa _SAT_1_effektivnaya_zashhita/

15. Описание и разработка АИСКГН // Официальный сайт / «Спец КБП и СА». – 2015 . [Электронный ресурс] – режим доступа: http://blice.ru/system.

16. Минуллин Р.Г. и др. Обнаружение гололедных образований на линиях электропередачи локационным зондированием. Казань: Изд-во КГЭУ, 2010. 207 с.

17. Р.Г. Минуллин Ю.А. Горюшин. И. Борщевский Многоканальная локационная система обнаружения гололеда на высоковольтных линиях электропередачи. The Multichannel Location System for Ice Detection on High Voltage Electric Power Lines / Энергия единой сети № 5-6 (22-23) 2015 г. [Электронный ресурс]. – режим доступа: https://xn-----glcfccctdci4bhow0as6psb.xn--p1ai/nomera-zhurnalov/5-6-22-23-2015-g/mnogokanalnaya-lokatsionnaya-sistema-obnaruzheniya-gololeda-na-vysokovolt-nykh-liniyakh-elektroperedachi/

18. Minullin R.G., Akhmetova I.G., Kasimov V.A., Piunov A.A. / Location Monitoring of Overhead Power Lines with Determining the Location of Ice Deposits and Visualization of Sounding Results // Power Technology and EngineeringТом 57, Выпуск 1, Страницы 153 – 162 May 2023 [Электронный ресурс]. – режим доступа: https://www.scopus.com/ record/display.uri?eid=2-s2.0-85174630796&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sot=b&sdt=b&s=TITLE%28Location+Monitoring+ of+Overhead+Power+Lines+with+Determining%29&sessionSearchId=7f29254814ad31bef250b1b1ab4724de

19. Герасимов, В.Г. и др. Электротехнический справочник. Том 3 Производство и распределение электрической энергии / Под общ. ред. профессоров Московского энергетического института Герасимова В. Г. , Дьякова А. Ф., Ильинского Н. Ф.,

Лабунцова В. А., Морозкина В. П., Орлова И. Н. (главный редактор), Попова А. И., Строева В. А. 9-е издание, стереотипное. Издательство МЭИ. 2004 г. 964 с.

20. Zhou, Yabinga, Xu Jiaxinb, Yang Fang, Tang Xiaoliang, Dai Yufeng, Xie Siqi / Research on the Optimization Design of Uninterrupted Ice Melting Device for Overhead Lines of Distribution Network // Proceedings - 2024 4th Power System and Green Energy Conference, PSGEC 2024Страницы 931 - 9352024 4th PSGEC 2024 Shanghai 22 August 2024 до 24 August 2024. [Электронный ресурс]. – режим доступа:https://www.scopus.com/results/results.uri?st1=Experimental+analysis+of+the+impact+of+micrometeorological+factors&st2=&s=TITLE%28Research+on+the+Optimization+Design+of+Uninterrupted+Ice+Melting%29&limit=10&origin=searchbasic&sort=plf-f&src=s&sot=b&sdt=b&sessionSearchId= 7f29254814ad31bef250b1b1ab4724de.

21. Локационный комплекс мониторинга повреждений и гололеда на проводах линий электропередачи и стенд для его испытаний [Электронный ресурс]. – режим доступа: https://projects.kgeu.ru/innovatsionnyerazrabotkiinauchnyeproektyvoblastielektroenergetiki/lokatsionnyikompleksmonitoringapovrezhdeniiigololedanaprovodakhliniielektroperedachiistenddlyaegoisp/.

REFERENCES

1. V Zapadnom Kazahstane podschitali predvaritel'nyj ushcherb ot zimnej nepogody i obledeneniya linij elektroperedach [Elektronnyj resurs]. – rezhim dostupa: https://astanatv.kz/ru/news/37339/ 13.01.2015g.

2. Dyusebaev M.K., Abdimuratov ZH.S. POVYSHENIE EFFEKTIVNOSTI ENERGOSNABZHENIYA POTREBITELEJ PRI VOZDEJSTVII GOLOLEDNO-VETROVYH NAGRUZOK V KAZAHSTANE // Mezhdunarodnyj zhurnal prikladnyh i fundamental'nyh issledovanij. 2017. № 10-2. S. 191-195;URL: https://applied-research.ru/ru/article/view?id=11886(data obrashcheniya: 13.03.2025).

3. Feng Yang, Lei Xia, Xiangkun Wang / Experimental analysis of the impact of micrometeorological factors on overhead transmission line icing / Proceedings Volume 13261, Tenth International Conference on Mechanical Engineering, Materials, and Automation Technology (MMEAT 2024); [Elektronnyj resurs]. – rezhim dostupa: https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sot=b&sdt=b&s=TITLE%28overhead+transmission+line+icing%29&sessionSearchId=7f29254814ad31bef250b1b1ab4724de&relpos=5

4. Kolesov, I.N. Gololyodnye obrazovaniya na linii elektroperedach i metody bor'by s nimi / I.N. Kolesov, A.E. Bogachev, YU.V. Abramov // Perspektivnoe razvitie nauki, tekhniki i tekhnologij: sbornik nauchnyh statej 11-oj Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferencii, Kursk, 29 oktyabrya 2021 goda. – Kursk: YUgo-Zapadnyj gosudarstvennyj universitet, 2021. – S. 137-141.

5. Nosenko, A. Monitoring meteorologicheskih uslovij na energoob"ektah raspredelitel'nyh setej / A. Nosenko, M. Pankratov, M. SHishkov // Elektroenergiya. Peredacha i raspredelenie. – 2021. – №3 (22). – S. 16-26.

6. Simovic Aleksandar, Cincar Nada, Bozovic Dajana, Vaskovic Miljan / Analysis of the Impact of Additional Load on Overhead Electrical Lines in Bosnia and Herzegovina // 23rd International Symposium INFOTEH-JAHORINA, INFOTECH 2024 - Proceedings 2024 23rd International Symposium East Sarajevo 20 March 2024do 22 March 2024. [Elektronnyj resurs]. – rezhim dostupa:https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85192165202&origin=resultslist&sort=plf -

f&src=s&sot=b&sdt=b&s=TITLE%28Analysis+of+the+Impact+of+Additional+Load+on+Overhead+
Electrical+Lines+in+Bosnia+and+Herzegovina%29&sessionSearchId=7f29254814ad31bef250b1b1ab4724de.

7. SHkola dlya elektrika [Elektronnyj resurs]. – rezhim dostupa: https://electricalschool.info/main/vl/2915-gololed-i-izmoroz-na-provodah-vl-i-borba-s-nimi.html.

8. Huang Huan, Chen Yifei, Mao Xianyin, Yang Lin, Zhang, Yizhao, Yang Qi, Zhang Qili / Risk Assessment Method of Overhead Line after Ice-shedding under Ice and Wind loads // 2024 IEEE International Conference on High Voltage Engineering and Applications, ICHVE 2024 - Berlin 18 August - 22 August. [Elektronnyj resurs]. – rezhim dostupa: https://www.scopus.com/ record/display.uri?eid=2-s2.0-85205679188&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sot=b&sd t=b&s=TITLE%28Ice-shedding+under+Ice+and+Wind+loads%29&sessionSearchId= 7f29254814ad31bef250b1b1ab4724de.

9. Ispol'zovanie cifrovyh datchikov obnaruzheniya gololednyh otlozhenij na provodah linij elektroperedachi [Elektronnyj resurs]. – rezhim dostupa: https://cyberleninka.ru/article/n/ispolzovanie-tsifrovyh-datchikov-obnaruzheniya-gololednyh-otlozheniy-na-provodah-liniy-elektroperedachi/viewer.

10. Tkachuk, YA. Metody zashchity LEP 35-110 kV pri obrazovanii GIO na provodah i grozozashchitnyh trosah / YA. Tkachuk, D. Sahno // Elektroenergiya. Peredacha i raspredelenie. – 2023. – № S2(29). – S. 24-26. – EDN GYXUZM.

11. YAkovlev, L.V. Kompleksnye metody i ustrojstva dlya zashchity provodov i grozozashchitnyh trosov vozdushnyh linij ot vibracii, «plyaski» i gololedoobrazovaniya // Energetik. 2004. № 3. S. 15–17.

12. Zakon Respubliki Kazahstan Ob utverzhdenii Pravil ustrojstva elektroustanovok [Elektronnyj resurs]. – rezhim dostupa: https://adilet.zan.kz/rus/docs/V1500010851

13. Li Zhigang, Zhou Wenwu, Li Yasong, Zhang Xiaoli, Wang Xueming / Computational Analysis on Jump Height of Overhead Transmission Lines After Uneven Ice Shedding //Proceedings of 2024 International Conference on Energy and Electrical Engineering, EEE. Nanchang5 July 2024do 6 July 2024. [Elektronnyj resurs]. – rezhim dostupa:
https://www.scopus.com/results/results.uri?st1=Experimental+analysis+of+the+impact+of+micrometeorological+factors&st2=&s=TITLE%28Overhead+Transmission+Lines+After+Uneven+Ice+Shedding%29&limit=10&origin=searchbasic&sort=plf-f&src=s&sot=b&sdt=b&sessionSearchId =7f29254814ad31bef250b1b1ab4724de.

14. Sistema monitoringa «SAT-1» – effektivnaya zashchita VLEP ot gololyoda. [Elektronnyj resurs]. – rezhim dostupa: https://www.ruscable. ru/article/energy/Sistema_monitoringa _SAT_1_effektivnaya_zashhita/

15. Opisanie i razrabotka AISKGN // Oficial'nyj sajt / «Spec KBP i SA». – 2015 . [Elektronnyj resurs] – rezhim dostupa: http://blice.ru/system.

16. Minullin R.G. i dr. Obnaruzhenie gololednyh obrazovanij na liniyah elektroperedachi lokacionnym zondirovaniem. Kazan': Izd-vo KGEU, 2010. 207 s.

17. Minullin R.G., Goryushin YU.A., Borshchevskij I. Mnogokanal'naya lokacionnaya sistema obnaruzheniya gololeda na vysokovol'tnyh liniyah elektroperedachi. The Multichannel Location System for Ice Detection on High Voltage Electric Power Lines / Energiya edinoj seti № 5-6 (22-23) 2015 g. [Elektronnyj resurs]. – rezhim dostupa: https://xn-----glcfccctdci4bhow0as6psb.xn--p1ai/nomera-zhurnalov/5-6-22-23-2015-g/mnogokanalnaya-lokatsionnaya-sistema-obnaruzheniya-gololeda-na-vysokovolt-nykh-liniyakh-elektroperedachi/

18. Minullin R.G., Akhmetova I.G., Kasimov V.A., Piunov A.A. / Location Monitoring of Overhead Power Lines with Determining the Location of Ice Deposits and Visualization of Sounding Results // Power Technology and EngineeringTom 57, Vypusk 1, Stranicy 153 – 162 May 2023 [Elektronnyj resurs]. – rezhim dostupa: https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85174630796&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sot=b&sdt=b&s=TITLE%28Location+Monitoring+of+Overhead+Power+Lines+with+Determining%29&sessionSearchId=7f29254814ad31bef250b1b1ab4724de

19. Gerasimov, V.G. i dr. Elektrotekhnicheskij spravochnik. Tom 3 Proizvodstvo i raspredelenie elektricheskoj energii / Pod obshch. red. professorov Moskovskogo energeticheskogo instituta Gerasimova V. G. , D'yakova A. F., Il'inskogo N. F., Labuncova V. A., Morozkina V. P., Orlova I. N. (glavnyj redaktor), Popova A. I., Stroeva V. A. 9-e izdanie, stereotipnoe. Izdatel'stvo MEI. 2004 g. 964 s.

20. Zhou,Yabinga, Xu Jiaxinb, Yang Fang, Tang Xiaoliang, Dai Yufeng, Xie Siqi / Research on the Optimization Design of Uninterrupted Ice Melting Device for Overhead Lines of Distribution Network // Proceedings - 2024 4th Power System and Green Energy Conference, PSGEC 2024Stranicy 931 - 9352024 4th PSGEC 2024 Shanghai 22 August 2024 do 24 August 2024. [Elektronnyj resurs]. – rezhim dostupa:https://www.scopus.com/results/results.uri?st1=Experimental+analysis+of+the+impact+of+micrometeorological+factors&st2=&s=TITLE%28Research+on+the+Optimization+Design+of+Uninterrupted+Ice+Melting%29&limit=10&origin=searchbasic&sort=plf-f&src=s&sot=b&sdt=b&sessionSearchId= 7f29254814ad31bef250b1b1ab4724de.

21. Lokacionnyĭ kompleks monitoringa povrezhdeniĭ i gololeda na provodah liniĭ elektroperedachi i stend dlya ego ispytaniĭ [Elektronnyj resurs]. – rezhim dostupa: https://projects.kgeu.ru/innovatsionnyerazrabotkiinauchnyeproektyvoblastielektroenergetiki/lokatsionnyikompleksmonitoringapovrezhdeniiigololedanaprovodakhliniielektroperedachiistenddlyaegoisp/.

ТҮЙІН

Бұл мақалада әуе электр желілерінің сымдарындағы мұзды жоюдың негізгі әдістері қарастырылған. Жоғары вольтты және таратушы электр желілерінде мұзды-аязды шөгінділерді (ЖАО) балқыту схемалары қарастырылады. Көктайғақты бақылау, оқшаулау және жоюдың кешенді автоматтандырылған жүйесінің құрылымы ұсынылған. Жүйе метеопараметрлердің өзгеруін болжау арқылы электр желілеріндегі сыртқы және ішкі әсерлерді автоматты түрде өлшейді және ескереді. Мұзданудың эксперименттік зерттеулері электр желілеріндегі мұздану мөлшері желдің жоғары жылдамдығымен, гипотермиялық су тамшыларының орташа диаметрімен және сұйық судың құрамымен артады, бірақ қоршаған орта температурасының жоғарылауымен азаяды деп болжайды.

Бұзбай бақылаудың заманауи аспаптық әдістерін пайдалана отырып, әуе электр беру желілерінің (ӘЖ) жай-күйін қадағалау пайдалану процесінде туындайтын зақымдар мен ақауларды анықтауға, талдауға және жіктеуге мүмкіндік береді. Бұл тәсіл сызықтардың күйін жан-жақты бағалауға мүмкіндік береді.

Мақсат-сымдардағы мұздың қалыңдығын болжау үшін сенімді модель құру және мұздың пайда болу процесін дәл бақылау. Бұл жұмыс әртүрлі елдерде қолданылатын мұзданудың бақылаудың ағымдағы стратегияларына шолу жасайды. Сонымен қатар, жұмыс ұзақ зерттеулер барысында ғалымдар жасаған мұзданудың өсу заңдылықтарын қарастырады.

УДК 631.12
МРНТИ 68.01.11

Хайруллина С.Г., кандидат технических наук, и.о. доцента, https://orcid.org/0000-0002-8492-2322
НАО «Западно-Казахстанский аграрно-технический университет имени Жангир хана», 090009, ул. Жангир хана, 51, г. Уральск, Республика Казахстан, hsg1988@mail.ru

Khairullina S., candidate of Technical Sciences, docent, https://orcid.org/0000-0002-8492-2322
NJSC«West Kazakhstan Agrarian and Technical University named after Zhangir Khan», Uralsk, st. Zhangir khan 51,090009, Kazakhstan, hsg1988@mail.ru

К ВОПРОСУ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ АГРАРНОГО СЕКТОРА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
ON THE ISSUE OF DIGITAL TRANSFORMATION OF THE AGRICULTURAL SECTOR OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN

АННОТАЦИЯ

В статье рассматриваются перспективы инновационного развития сельского хозяйства Казахстана в условиях перехода экономики. Подчеркивается необходимость внедрения информационных технологий для управления агропромышленным производством в стране. Традиционные методы повышения эффективности аграрной отрасли практически исчерпаны, и в ближайшие годы сельское хозяйство ожидает стать одной из высокотехнологичных отраслей экономики. Казахстан располагает значительным потенциалом для развития в данном направлении, и рост сектора возможен благодаря внедрению цифровых технологий и современных платформ для управления на различных уровнях аграрного производства. В будущем цифровизация станет неотъемлемой частью аграрной культуры, охватывая большинство процессов и операций. Цифровизация всех отраслей Казахстана, включая сельское хозяйство, является ключевым направлением развития страны в последние годы.

Агропромышленный комплекс Республики Казахстан, в основе которого лежит сельскохозяйственное производство, сталкивается с острой потребностью в внедрении инновационных высокотехнологичных решений. Причины этой необходимости связаны с низкой производительностью труда в сельском хозяйстве и отсутствием критической массы отечественных высокотехнологичных разработок, которые были бы созданы и внедрены местными учеными.

За последние 20 лет в стране была создана и активно использовалась специализированная научная и инновационная инфраструктура, однако это лишь усугубило проблему. Основная цель этой инфраструктуры — поддержка внедрения инноваций в агропромышленном комплексе страны. В связи с этим отсутствие заметных результатов в аграрном секторе проявляется в недостаточной разработке и внедрении научных достижений казахстанских ученых, которые пытаются выявить факторы, замедляющие процесс инновационного развития агропромышленного комплекса.

ANNOTATION

The article discusses promising areas of innovative development of the agricultural sector in Kazakhstan in the context of economic transition. The necessity of transition of agriculture of the Republic of Kazakhstan to information technologies of management of agro-industrial production is proved.

The traditional resources for improving the efficiency of the agricultural sector have almost run out. Agriculture promises to become one of the high-tech sectors of the economy in

the coming years. Our country has a significant reserve for development in this area, and the growth of agricultural turnover is possible due to the introduction of digital technologies and modern management platforms at various levels of agricultural production. In the near future, modern digital technologies will become an integral part of agricultural culture and will be used in most operations. Digitalization of all sectors of Kazakhstan, including agriculture, has been the main vector of the country's development over the past few years.

The agro-industrial complex of the Republic of Kazakhstan, the largest share of which is agricultural production, is in urgent need of innovative high-tech technologies. The prerequisites for this need are factors such as low labor productivity in agricultural production and the lack of a critical mass of high-tech innovations developed and implemented by domestic scientists.

Over the past two decades, specialized scientific and innovative infrastructure has been centrally grouped and actively operated in the republic, which has further complicated this problem. The main purpose of this infrastructure is to promote innovation in the country's agro-industrial complex. In this regard, the lack of significant results in the agricultural sector is manifested in the form of large-scale development and implementation of scientific developments by Kazakhstani scientists who are looking for factors that not only slow down the above-mentioned process in the innovative system of the agro-industrial complex.

Ключевые слова: *аграрный сектор, инновации, экономический рост, инвестиции, цифровизация.*

Key words: *agricultural sector, innovation, economic growth, investment, digitalization.*

Введение. Глобальные угрозы и вызовы в области продовольственной и экологической безопасности, возникшие в последнее время, требуют формирования нового типа сельского хозяйства, соответствующего принципам устойчивого развития. В решении этой задачи ключевую роль играет цифровизация сельского хозяйства. Основные цели цифровой трансформации включают достижение «цифровой зрелости» в агропромышленном комплексе, обеспечение продовольственной безопасности, повышение эффективности производственных процессов, расширение сбытовых возможностей предприятий агропромышленного комплекса, а также повышение цифровой грамотности работников в данной сфере [1].

Цифровые технологии, такие как компьютеры и мобильные устройства с доступом в Интернет, облачные технологии, большие данные и искусственный интеллект, оказывают значительное влияние на многие отрасли экономики, заменяя человеческий труд и экономя время. Это способствует повышению производительности и эффективности труда. Агропромышленный комплекс многих стран мира не остался в стороне от этих инновационных преобразований. Примеры можно найти на разных этапах агропродовольственной производственно-сбытовой цепочки: цифровизация сельскохозяйственной техники помогает оптимизировать использование ресурсов и снижать потребность в ручном труде; применение спутниковых данных и датчиков в животноводстве и растениеводстве способствует повышению результативности для фермеров; а системы отслеживания и цифровая логистика помогают оптимизировать цепочки поставок, обеспечивая потребителей достоверной информацией.

Агропромышленный комплекс Казахстана занимает важное место в экономике страны и представляет собой перспективную отрасль. Только несколько стран в мире могут соперничать с Казахстаном по потенциалу в области сельского хозяйства. Государство придает большое значение развитию аграрного сектора, увеличивает объемы финансирования, разрабатывает новые планы и внедряет механизмы государственной поддержки. Каждый год наблюдается рост объемов инвестиций и промышленной продукции, а также вводятся в эксплуатацию новые

сельскохозяйственные объекты.

Материалы и методы исследования. Аграрный сектор экономики Казахстана активно развивается в условиях рыночных отношений, где происходят изменения в производственно-экономических связях и внедряются новые формы взаимодействия участников агробизнеса. В настоящее время производственно-экономические отношения в сельском хозяйстве представляют собой сложную систему взаимосвязей между государством, различными организациями и внутри сельскохозяйственных предприятий.

Понятия «цифровая экономика», «экономика знаний» и «информационное общество» формируют новую социально-экономическую модель, заменяющую индустриальную парадигму. В условиях новых экономических реалий все хозяйствующие субъекты, стремящиеся к устойчивому развитию, вынуждены проходить через процесс цифровой трансформации. Цифровая трансформация означает внедрение современных технологий в бизнес-процессы на всех уровнях социально-экономических систем.

Цифровая трансформация сельского хозяйства включает в себя изменения и проблемы, связанные с внедрением цифровых технологий и их интеграцией во все области сельского хозяйства. Использование таких технологий позволяет повысить рентабельность сельскохозяйственного производства за счет оптимизации затрат и более эффективного распределения ресурсов. В настоящее время в сельском хозяйстве появляются новые методы работы, включающие цифровые и технологические инновации, которые способствуют повышению эффективности и открывают новые возможности для молодых предпринимателей.

В последние годы в Казахстане цифровые, информационные и телекоммуникационные технологии стали широко применяться во всех сферах экономики, что способствует активной цифровизации различных процессов в жизни общества. Эффективное аграрное производство является основой любой экономики, поскольку оказывает значительное влияние на социально-экономическую стабильность общества.

Также стоит отметить, что международная политическая ситуация оказывает влияние на необходимость реформирования аграрной отрасли Казахстана. Для решения существующих и будущих угроз продовольственной безопасности стране требуется трансформация аграрного сектора с акцентом на инновационные подходы, основанные на цифровой экономике. Казахстан традиционно был аграрной страной, а освоение целинных земель сделало его одним из крупнейших производителей зерна и мяса в Советском Союзе. За годы независимости агропромышленный комплекс Казахстана добился значительных успехов: постоянный рост производства, повышение продуктивности и эффективности труда, обновление основных фондов, восстановление инфраструктуры, достижение самообеспеченности по основным продуктам питания и увеличение экспорта зерновых, масличных культур и рыболовной продукции.

Общий анализ агропромышленного комплекса Казахстана выявляет несколько особенностей: общая площадь сельскохозяйственных земель составляет 222,6 млн га, из которых 24 млн га занято пашней (10,8% общей площади) [2]. Численность сельского населения — 7,3 млн человек, или 47,2% от общего числа жителей страны. Существенное влияние на структуру сельского хозяйства оказывают различные природно-климатические зоны, такие как лесостепная, степная, полупустынная и пустынная, а также горные регионы, где преобладают определенные типы сельскохозяйственного производства. Эти зоны характеризуются ограниченным количеством осадков (150-320 мм в год) и отсутствием выхода к морю, что затрудняет доступ к внешним рынкам. Казахстан в значительной степени самодостаточен по основным продуктам питания, за исключением таких товаров, как сахар, растительное

масло, мясо птицы, овощи и фрукты в межсезонье. Северные регионы специализируются на производстве зерновых и животноводстве, в то время как южные регионы, где орошение играет важную роль, характеризуются более широкой диверсификацией сельскохозяйственных культур, таких как зерновые, масличные, плодово-ягодные культуры, овощи и хлопок. Животноводство остается традиционным для Казахстана, при этом около 90% скота содержится в домашних хозяйствах населения.

Результаты исследования. Развитие сельского хозяйства в Республике Казахстан сталкивается с рядом проблем, таких как недостаточно развита инфраструктура и ирригационные системы, ограниченный доступ к современным технологиям и ф инансированию, а также неэффективные методы управления агропромышленным производством. В условиях рынка основным направлением для развития сельского хозяйства должно стать внедрение инноваций [3-7].

Суровые климатические условия страны создают высокие риски для сельского хозяйства, поэтому Казахстану необходимо активно переходить к точному земледелию. В настоящее время цифровизация агропромышленного комплекса включает в себя использование GPS-навигации, беспилотных летательных аппаратов, электронных карт и систем параллельного вождения, что способствует точности траекторий при обработке и посеве, повышению производительности труда и снижению расхода топлива.

В рамках точного земледелия выделяются три уровня цифровизации сельского хозяйства Казахстана:

Базовый уровень — фермерские хозяйства с традиционным подходом, использующие почвенный анализ и электронные карты полей.

Продвинутый уровень — частично автоматизированные фермы, применяющие датчики расхода топлива, трекеры и электронные карты сорняков.

Цифровые фермы — фермы, функционирующие с минимальным участием человека благодаря новым технологиям.

На сегодняшний день в Казахстане функционируют около 170 передовых и более 20 цифровых ферм, а также оцифровано почти 100% посевных площадей, что составляет около 24 млн га. Однако для дальнейшего научно-технологического прогресса необходимо ускорение разработки и внедрения цифровых технологий в агропромышленном комплексе страны. Это включает в себя такие направления, как точное сельское хозяйство с использованием электроники и робототехники, развитие органического и почво-сберегающего земледелия, восстановление деградированных почв, ускоренная селекция и семеноводство, биотехнологии и переработка сельхозпродукции [8-12].

Для обеспечения инновационного развития необходимо создание конкурентной среды, так как конкуренция является важным фактором прогресса. Конкурентоспособность рынка зависит от возможности создания новых производственных мощностей. В связи с этим, привлечение капитала и улучшение финансовой системы являются важнейшими условиями для развития агропромышленного комплекса и производства конкурентоспособной продукции в Казахстане [13-15].

Заключение. В ближайшем будущем ожидается, что традиционные подходы в агропромышленном производстве уступят место научно-интеллектуальному направлению, основанному на использовании цифровых технологий для оптимизации производственных процессов. Опыт других стран в области внедрения цифровых решений в аграрный сектор может быть эффективно перенесён и адаптирован для нужд Казахстана. Агробизнес должен стать ключевым фактором диверсификации и роста сельскохозяйственной экономики стран ЕАЭС.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Алексеева, С.А. Цифровая трансформация отраслей агропромышленного комплекса Российской Федерации / С.А. Алексеева, С.В. Баранов // Материалы III Международной научно-практической конференции Андреевские чтения «Цифровизация отраслей АПК и аграрного образования». – 2022. – С. 194–205.

2. Чулкова, Г. Инвестиционная привлекательность сельского хозяйства региона: риски и стратегии развития / Г. Чулкова, С. Семченкова, О. Зарянкина // Международный сельскохозяйственный журнал. – 2016. – №3. – С. 13–14.

3. Бабкин, К.А. Альтернативные направления развития сельского хозяйства // АПК: экономика, управление. – 2015. – №8. – С. 17–23.

4. Жангирова, Р.Н. Инвестиционно-инновационное развитие аграрного сектора Республики Казахстан // Проблемы агрорынка. – 2018. № 4. – С. 27–34.

5. В Казахстане идет цифровая трансформация агрокомплекса [Элек- тронный ресурс] – Режим доступа : https://profit.kz – Дата доступа: 20.03.2025.

6. Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Рес-публики Казахстан. Валовый выпуск продукции (услуг) сельского хозяйства. – 2023. URL: https://new.stat.gov.kz/ru/search/index.php?q=%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA+%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8+%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0&s= (дата обращения 05.03.2025)

7. Абылкасимова Ж.А., Байжолова Р.А., Амангельдиева Ж.А. Цифровая трансформация АПК: проб-лемы и их решение // Проблемы агрорынка. – 2022. – № 3. – С. 21–28. URL: https://doi.org/10.46666/2022-3.2708-9991.02

8. Государственная программа «Цифровой Казахстан». Постановление Правительства Республики Казахстан от 12 декабря 2017 года № 827. – 2017. URL: https://www.adilet.zan.kz/rus/docs/P1700000827 (дата обращения: 07.03.2025)

9. Людмила М. Исключить риски. Цифровизация АПК должна быть понятной и доступной. – 2023. URL: https://ztgzt.kz/isklyuchit-riski-czifrovizacziya-apk-dolzhna-byt-ponyatnoj-i-dostupnoj/ (дата обращения: 10.03.2025)

10. Галушко М. Цифровой Казахстан: что изменилось в стране за год. Общий экономический эффект от программы составил 714,3 млрд тенге. – 2023. URL: https://kapital.kz/tehnology/83781/tsifrovoykazakhstan-chto-izmenilos-v-strane-za-god.html (дата обращения: 05.03.2025)

11. Кантарбаева, Ш.М. Основные тренды цифровой экономики в аграрном секторе Казахстана / Ш.М. Кантарбаева, С. Сұлтанбайұлы, С.Т. Жумашева // Проблемы агрорынка. – 2021. -№.2 – С. 46-54.

12. Кантарбаева, Ш.М. Возможности скоринга при субсидировании сельхозтоваропроизводителей / Ш.М. Кантарбаева, А.Б.Тлесова // Проблемы агрорынка.- 2019. – №1.– С. 84–90.

13. Required citation: FAO and ZJU. 2021. Digital agriculture report: Rural e-commerce development experience from China. Rome. [Electronic resource]: https://doi.org/10.4060/cb4960en

14. Nikola M. Trendov, Samuel Varas, and Meng Zeng. Food and Agriculture Organization of the United Nations. [Text] / Rome, - 2019. https://www.fao.org/3/ca4887en/ca4887en.pdf

15. Birner, R., Daum T., Pray C. Who drives the digital revolution in agriculture, A review of supply-side trends, players and challenges. Applied Economic Perspectives and Policy

published by Wiley Periodicals LLC on behalf of Agricultural & Applied Economics

Association. 2021, no. 43, pp. 1260–1285. URL: https://doi. org/10.1002/aepp.13145.

REFERENCES

1. Alekseeva, S.A. Cifrovaya transformaciya otraslej agropromyshlennogo kompleksa Rossijskoj Federacii / S.A. Alekseeva, S.V. Baranov // Materialy III Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferencii Andreevskie chteniya «Cifrovizaciya otraslej APK i agrarnogo obrazovaniya». – 2022. – S. 194–205.

2. CHulkova, G. Investicionnaya privlekatel'nost' sel'skogo hozyajstva regiona: riski i strategii razvitiya / G. CHulkova, S. Semchenkova, O. Zaryankina // Mezhdunarodnyj sel'skohozyajstvennyj zhurnal. – 2016. – №3. – S. 13–14.

3. Babkin, K.A. Al'ternativnye napravleniya razvitiya sel'skogo hozyajstva // APK: ekonomika, upravlenie. – 2015. – №8. – S. 17–23.

4. ZHangirova, R.N. Investicionno-innovacionnoe razvitie agrarnogo sektora Respubliki Kazahstan // Problemy agrorynka. – 2018. № 4. – S. 27–34.

5. V Kazahstane idet cifrovaya transformaciya agrokompleksa [Elek- tronnyj resurs] – Rezhim dostupa : https://profit.kz – Data dostupa: 20.03.2025.

6. Byuro nacional'noj statistiki Agentstva po strategicheskomu planirovaniyu i reformam Res-publiki Kazahstan. Valovyj vypusk produkcii (uslug) sel'skogo hozyajstva. – 2023. URL: https://new.
stat.gov.kz/ru/search/index.php?q=%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA+%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8+%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0&s= (data obrashcheniya 05.03.2025)

7. Abylkasimova ZH.A., Bajzholova R.A., Amangel'dieva ZH.A. Cifrovaya transformaciya APK: prob-lemy i ih reshenie // Problemy agrorynka. – 2022. – № 3. – S. 21–28. URL: https://doi.org/10.46666/2022-3.2708-9991.02

8. Gosudarstvennaya programma «Cifrovoj Kazahstan». Postanovlenie Pravitel'stva Respubliki Kazahstan ot 12 dekabrya 2017 goda № 827. – 2017. URL: https://www.adilet.zan.kz/rus/docs/P1700000827 (data obrashcheniya: 07.03.2025)

9. Lyudmila M. Isklyuchit' riski. Cifrovizaciya APK dolzhna byt' ponyatnoj i dostupnoj. – 2023. URL: https://ztgzt.kz/isklyuchit-riski-czifrovizacziya-apk-dolzhna-byt-ponyatnoj-i-dostupnoj/ (data obrashcheniya: 10.03.2025)

10. Galushko M. Cifrovoj Kazahstan: chto izmenilos' v strane za god. Obshchij ekonomicheskij effekt ot programmy sostavil 714,3 mlrd tenge. – 2023. URL: https://kapital.kz/tehnology/83781/tsifrovoykazakhstan-chto-izmenilos-v-strane-za-god.html (data obrashcheniya: 05.03.2025)

11. Kantarbaeva, SH.M. Osnovnye trendy cifrovoj ekonomiki v agrarnom sektore Kazahstana / SH.M. Kantarbaeva, S. Sұltanbajұly, S.T. ZHumasheva // Problemy agrorynka. – 2021. -№.2 – S. 46-54.

12. Kantarbaeva, SH.M. Vozmozhnosti skoringa pri subsidirovanii sel'hoztovaroproizvoditelej / SH.M. Kantarbaeva, A.B.Tlesova // Problemy agrorynka.- 2019. – №1.– S. 84–90.

13. Required citation: FAO and ZJU. 2021. Digital agriculture report: Rural e-commerce development experience from China. Rome. [Electronic resource]: https://doi.org/10.4060/cb4960en

14. Nikola M. Trendov, Samuel Varas, and Meng Zeng. Food and Agriculture Organization of the United Nations. [Text] / Rome, - 2019. https://www.fao.org/3/ca4887en/ca4887en.pdf

15. Birner, R., Daum T., Pray C. Who drives the digital revolution in agriculture, A

review of supply-side trends, players and challenges. Applied Economic Perspectives and Policy published by Wiley Periodicals LLC on behalf of Agricultural & Applied Economics Association. 2021, no. 43, pp. 1260–1285. URL: https://doi. org/10.1002/aepp.13145

ТҮЙІН

Мақалада экономиканың ауысуы жағдайында Қазақстанның аграрлық секторын инновациялық дамытудың перспективалық бағыттары қарастырылады. Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығының Агроөнеркәсіптік өндірісті басқарудың ақпараттық технологияларына көшу қажеттілігі негізделді.

Аграрлық саланың тиімділігін арттырудың дәстүрлі ресурстары іс жүзінде құрғап қалды. Ауыл шаруашылығы алдағы жылдары экономиканың жоғары технологиялық салаларының қатарына кіруге уәде береді. Біздің еліміз осы бағытта даму үшін айтарлықтай резервке ие, ал АӨК айналымдарының өсуі ауыл шаруашылығы өндірісінің әртүрлі деңгейлерінде цифрлық технологиялар мен басқару үшін заманауи платформаларды енгізу есебінен мүмкін болады. Жақын болашақта заманауи цифрлық технологиялар аграрлық мәдениеттің ажырамас бөлігіне айналады және көптеген операцияларды жүзеге асыру кезінде пайдаланылатын болады. Қазақстанның барлық салаларын, соның ішінде Ауыл шаруашылығын цифрландыру соңғы бірнеше жылда ел дамуының негізгі бағыты болып табылады.

Ең үлкен үлесі ауыл шаруашылығы өндірісі болып табылатын Қазақстан Республикасының агроөнеркәсіптік кешені инновациялық жоғары технологиялық технологияларға аса мұқтаж. Бұл қажеттіліктің алғышарттары ауыл шаруашылығы өндірісіндегі еңбек өнімділігінің төмендігі және отандық ғалымдар әзірлеген және енгізген жоғары технологиялық инновациялардың сыни массасының болмауы сияқты факторлар болып табылады.

Соңғы екі онжылдықта республикада мамандандырылған ғылыми және инновациялық инфрақұрылым орталықтандырылған түрде топтастырылды және белсенді пайдаланылды, бұл мәселені одан әрі қиындатты. Бұл инфрақұрылымның негізгі мақсаты елдің агроөнеркәсіптік кешенінде инновацияларды ілгерілету болып табылады. Осыған байланысты аграрлық секторда Елеулі нәтижелердің болмауы агроөнеркәсіптік кешеннің инновациялық жүйесінде жоғарыда аталған процесті бәсеңдетіп қана қоймайтын факторларды іздейтін қазақстандық ғалымдардың ғылыми әзірлемелерді ауқымды әзірлеу және енгізу түрінде көрінеді.

УДК 725.38
МРНТИ 67.53.03

Ибраев А.С., PhD, и.о. доцента, https://orcid.org/0000-0002-7153-1496
НАО «Западно-Казахстанский аграрно-технический университет имени Жангир хана», 090009, ул. Жангир хана, 51, г. Уральск, Республика Казахстан, ibraevadil2012@mail.ru
Плешаков А.А., начальник Управления административной полиции Департамента полиции ЗКО
Департамент полиции ЗКО, ул. Пугачева 45, г. Уральск, 090000, Казахстан, a_pleshakov@inbox.ru

Ibraev A., PhD, docent. https://orcid.org/0000-0002-7153-1496
NJSC«West Kazakhstan Agrarian and Technical University named after Zhangir Khan», Uralsk, st. Zhangir khan 51,090009, Kazakhstan, ibraevadil2012@mail.ru

Pleshakov A., Head of the Administrative Police Department of the West Kazakhstan Region Police Department
West Kazakhstan Region Police Department, 45 Pugacheva St., Uralsk, 090000, Republic of Kazakhstan, a_pleshakov@inbox.ru

ВНЕДРЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В УПРАВЛЕНИЕ ТРАНСПОРТНЫМИ ПОТОКАМИ НА АВТОМОБИЛЬНЫХ ПАРКИНГАХ
THE INTRODUCTION OF MODERN TECHNOLOGIES IN THE MANAGEMENT OF TRAFFIC FLOWS IN PARKING LOTS

АННОТАЦИЯ

Эффективное управление транспортными потоками на парковках становится всё более актуальной задачей в условиях роста автомобилизации и плотности городской застройки. В статье рассматриваются современные технологии и инновационные подходы, направленные на оптимизацию парковочных зон, повышение удобства для водителей и улучшение общей транспортной ситуации.

Анализ текущего состояния транспортной инфраструктуры в Казахстане показывает значительное увеличение количества автомобилей, что создаёт дополнительную нагрузку на парковочные пространства. Основными проблемами являются нехватка мест, неравномерное использование паркингов, недостаточный уровень автоматизации и информационной поддержки пользователей. В ответ на эти вызовы предлагается внедрение интеллектуальных транспортных систем (ИТС), автоматизированных парковочных решений и цифровых технологий мониторинга, таких как датчики свободных мест, системы распознавания номеров и навигационные платформы.

Интеграция транспортных систем с концепцией «умного города» позволяет более эффективно управлять потоками, снижать заторы и повышать безопасность дорожного движения. В работе предлагаются решения, включающие дифференцированную систему оплаты, визуальные табло для информирования водителей о доступных местах, а также оптимизацию пространственного размещения парковочных зон. Эти меры направлены на повышение эффективности использования парковок, сокращение времени поиска мест и улучшение качества городской среды.

Внедрение инновационных технологий в управление парковками является необходимым шагом для адаптации транспортной системы к растущему числу автомобилей и обеспечения комфортных условий для всех участников дорожного движения.

ANNOTATION

Effective traffic flow management in parking lots is becoming an increasingly urgent task in the context of increasing motorization and urban density. The article discusses modern technologies and innovative approaches aimed at optimizing parking areas, improving convenience for drivers and improving the overall transport situation.

An analysis of the current state of transport infrastructure in Kazakhstan shows a significant increase in the number of cars, which creates an additional burden on parking spaces. The main problems are lack of places, uneven use of parking lots, insufficient automation and information support for users. In response to these challenges, it is proposed to introduce intelligent transportation systems (ITS), automated parking solutions, and digital monitoring technologies such as seat sensors, number recognition systems, and navigation platforms.

The integration of transport systems with the smart city concept makes it possible to manage flows more efficiently, reduce congestion and improve road safety. The paper offers solutions that include a differentiated payment system, visual displays to inform drivers about available places, as well as optimizing the spatial placement of parking areas. These measures

are aimed at increasing the efficiency of parking use, reducing the time needed to find places and improving the quality of the urban environment.

The introduction of innovative technologies in parking management is a necessary step to adapt the transport system to the growing number of vehicles and ensure comfortable conditions for all road users.

Ключевые слова: *транспортный поток, автоматизация, парковка, цифровизация, система.*

Key words: *traffic flow, automation, parking, digitalization, system.*

Введение. В современном мире эффективное управление транспортными потоками на стоянках становится всё более актуальным. С ростом числа автомобилей, изменениями в городской инфраструктуре и увеличением требований к комфорту и безопасности, инновационные подходы к управлению парковками становятся ключевыми для улучшения качества городской среды и оптимизации транспортных потоков. Этот учебный материал рассматривает внедрение инноваций в управление транспортными потоками на стоянках, охватывая современные технологии, подходы и методы, которые могут улучшить эффективность управления и обеспечить лучшие условия для водителей [1, 2].

В последние годы Республика Казахстан демонстрирует устойчивый рост автомобилизации, что существенно влияет на инфраструктурное планирование городов. По данным Бюро национальной статистики (БНС), на 1 сентября 2023 года в стране зарегистрировано 5,09 млн автотранспортных средств, из которых 88% (4,47 млн) составляют легковые автомобили, 10% (507,5 тыс.) – грузовые автомобили и 2% (105,5 тыс.) – автобусы. За последние 10 лет количество легковых автомобилей выросло на 6,3%, а в 2023–2024 годах наблюдается особенно бурный рост этого сегмента, что требует пересмотра существующих подходов к организации транспортной инфраструктуры [3-5].

Одной из наиболее актуальных проблем, возникающих на фоне роста автопарка, является нехватка парковочных мест в городах. Увеличение числа жилищных комплексов (ЖК), а также развитие центров притяжения — торговых и развлекательных комплексов (ТРК), приводит к существенному давлению на парковочную инфраструктуру. Недостаток мест для хранения автомобилей создает условия для возникновения заторов, ухудшения качества городской среды и дополнительных нагрузок на транспортную систему.

В ответ на данные вызовы происходит активное внедрение инновационных технологий в управление автомобильными паркингами. Современные информационные системы, автоматизированные парковочные решения, системы контроля доступа и другие технологические новшества позволяют оптимизировать использование парковочных зон, повысить уровень безопасности и улучшить удобство для пользователей [6, 7].

Материалы и методы исследования. В условиях урбанизации и растущего числа автомобилей на дорогах управление транспортными потоками становится одной из ключевых задач для повышения эффективности дорожной инфраструктуры, снижения заторов и обеспечения безопасности движения. Современные технологии играют решающую роль в оптимизации этого процесса, предлагая решения, основанные на цифровизации, автоматизации и использовании больших данных.

Важной составляющей современных подходов является внедрение интеллектуальных транспортных систем (ИТС). Эти системы представляют собой комплекс программных и аппаратных средств, которые собирают, анализируют и используют данные в реальном времени для управления дорожным движением. ИТС

включает различные инструменты, такие как видеонаблюдение, датчики дорожного покрытия, системы геолокации и аналитические платформы. С помощью этих технологий можно в режиме реального времени отслеживать интенсивность движения, выявлять заторы и автоматически перенаправлять транспортные потоки для их оптимизации.

Еще одним важным инструментом управления транспортными потоками является система мониторинга с использованием спутниковых технологий и GPS. Такие системы позволяют в реальном времени отслеживать местоположение автомобилей и анализировать маршруты. Это помогает не только управлять движением, но и предоставлять водителям информацию о дорожной обстановке, таких как заторы, аварии или ремонтные работы. Навигационные приложения, такие как Google Maps и Waze, используют эти технологии, чтобы предлагать альтернативные маршруты и сокращать время в пути [8, 9].

Важным аспектом также является интеграция транспортных систем с концепцией «умных городов». Инфраструктура таких городов предусматривает использование единой цифровой платформы для управления различными системами, включая транспорт. Взаимодействие между светофорами, парковками, общественным транспортом и дорожными службами в рамках одной системы позволяет достичь высокой степени координации и гибкости в управлении потоками.

Однако развитие современных технологий управления транспортными потоками сопряжено с определенными вызовами. Тем не менее, преимущества внедрения современных технологий очевидны. Они позволяют не только оптимизировать движение, но и сократить выбросы загрязняющих веществ, улучшить качество жизни горожан и повысить общую безопасность на дорогах. В ближайшем будущем развитие технологий управления транспортными потоками продолжит играть ключевую роль в создании более эффективных и устойчивых транспортных систем.

Современные технологии в управлении транспортными потоками можно представить в виде схемы [10] (рисунок 1)

Современные парковочные пространства требуют продуманных подходов к оптимизации транспортных потоков. Увеличение числа автомобилей и ограниченные площади для их размещения делают эту задачу особенно актуальной в городских условиях. Эффективная организация потоков позволяет не только улучшить использование пространства, но и создать комфортные условия для водителей, минимизируя заторы и время поиска парковочных мест (рисунок 2).



Рисунок 1 – Современные технологии в управлении транспортными потоками



Рисунок 2 – Подходы к оптимизации транспортных потоков на парковках

Одним из ключевых аспектов является оптимизация пространственного размещения. Это подразумевает проектирование парковочных зон с учетом реальных потребностей и плотности транспортных потоков. Рациональная разметка мест, правильное расположение въездов и выездов, а также обеспечение достаточного количества мест для разных категорий транспорта – всё это играет важную роль в упрощении процессов парковки. Использование технологий, таких как системы автоматического определения свободных мест, может значительно ускорить процесс поиска парковки, направляя водителей к наиболее подходящим зонам. При этом важно учитывать не только количество машин, но и их типы: компактные места для малогабаритных автомобилей, зоны для электромобилей с зарядными станциями, а также выделенные участки для крупногабаритного транспорта.

Оптимизация транспортных потоков на парковках требует комплексного подхода, который включает в себя грамотное использование пространства, внедрение технологий управления потоками и учет потребностей водителей. Эти меры позволяют сделать парковочные зоны более эффективными, комфортными и безопасными, что, в свою очередь, способствует улучшению транспортной ситуации в целом [11, 12].

Инновации в управлении парковками играют все более значимую роль в развитии городской инфраструктуры, отвечая на вызовы стремительной урбанизации и увеличения числа автомобилей. Будущее этой сферы определяется комплексным развитием технологий, учетом экологических и экономических аспектов, а также влиянием социальных и культурных изменений (рисунок 3).




Рисунок 3 – Инновации в управлении парковками

Развитие технологий становится фундаментом для преобразования парковочных систем. В ближайшие годы ожидается широкое внедрение умных парковочных решений, основанных на искусственном интеллекте и Интернете вещей. Сенсоры, камеры и облачные платформы будут обеспечивать мониторинг и управление парковочными пространствами в реальном времени. Такие системы позволят оптимизировать загрузку парковок, сокращать время поиска свободного места и минимизировать пробки вблизи парковочных зон. Виртуальные помощники и мобильные приложения для водителей, интегрированные с городской транспортной сетью, будут предлагать персонализированные маршруты и уведомлять о доступных местах заранее. Кроме того, технологии автономного управления транспортом трансформируют сам подход к парковке: беспилотные автомобили смогут автоматически находить место и парковаться, высвобождая людей от этой рутинной задачи.

Будущее управления парковками будет направлено на интеграцию технологий, экологическое сознание, экономическую целесообразность и удовлетворение новых потребностей общества. Эти изменения не только улучшат качество жизни горожан, но и станут частью глобальной стратегии устойчивого развития городов [13-15].

Результаты исследования. При исследование организации работы паркингов определились следующие основные проблемы:

1. Постоянные пользователи (сотрудники, жильцы) часто выбирают уличные парковки из-за высокой стоимости внутренних мест или сложности перемещения автомобиля, что создает дефицит автомобиле-мест для временных пользователей (посетителей).

2. Необоснованные ценовые расценки за хранение автомобилей отпугивают постоянных пользователей, снижая заполняемость паркингов.

3. Отсутствие информации о наличии свободных автомобиле-мест на паркинге.

4. Отсутствие четкого разделения категорий автомобилей, низкий уровень автоматизации, устаревшая инфраструктура и недостаточный контроль доступа приводят к неравномерному использованию и проблемам безопасности.

Заключение. Для решения данных проблем предлагается следующий комплекс мер, направленных на оптимизацию использования парковочных зон, снижение конфликтов между пользователями и повышение эффективности управления за счет применения инновационных технологий:

1. Определить и закрепить места хранения автомобилей на внутреннем паркинге за постоянными пользователями. Это снизить нагрузку и освободит пространство на временном (уличном) паркинге.

2. Разработать и внедрить дифференцированный подход к системе оплаты за парковочные места, в зависимости от времени пребывания. Для этого необходимо использовать интеллектуальную систему определения государственных номерных знаков автомобилей и соотнести ее с временем пребывания на парковке. Исходя из этого определить оптимальный размер оплаты за единицу времени (например 1 час).

3. При въезде в парковочную зону установить визуальные табло с изображением пустующих и занятых автомобиле-мест. Для этого рекомендуется также использовать датчкики, мониторы, систему отслеживания и передачи информации интегрированные в единую интеллектуальную сеть. Кроме того, можно установить направляющие указатели, что позволит водителям быстро ориентироваться в пространстве паркинга, сокращая время поиска места и повышая общую безопасность.

Комплекс данных мер позволит оптимизировать использование парковочных зон, снизить конфликт интересов между пользователями и повысить эффективность управления парковками за счет применения инновационных технологий.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Беляковцев П. А. Современные направления внедрения инноваций на предприятиях транспортного комплекса // Вектор экономики. – 2021. – №. 7.

2. Ланцев, В.Ю. Анализ современных методов повышения эффективности автосервисных предприятий / В.Ю. Ланцев, А.С. Ибраев, А.Е. Сарсенов, А.М. Даулетов // Научно-практический журнал «Наука и образование» ЗКАТУ им. Жангир хана 2022, №4-3(69). С. 211-219.

3. Исследование авторынка Казахстана: анализ трансформации отрасли. [Электронный ресурс] / Режим доступа: https://ffin.kz/research/11-issledovanie-avtorynka-kazakhstana-analiz-transformatsii-otrasli#:~:text=%D0%9F%D0%BE%20%D1%81%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20c%20%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%BC%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BC,(%D0%BD%D0%B0%2030%2C5%25).

4. Ибраев, А.С. Анализ видов транспорта в Республике Казахстан / А.С. Ибраев // Международная научно-практическая конференция посвященная 125-летию академика К.И. Сатпаева «Наука, исследования, знания: тенденции развития» / «Наука и образование» – 2024. №2 (75)

5. Ибраев, А.С. Анализ видов транспорта в Республике Казахстан / А.С. Ибраев / / Анализ видов транспорта в Республике Казахстан

6. Щукин Ю.А., Бояршинов М.Г., Артеменко Д.В. Закономерности использования парковочного пространства. Транспорт Российской Федерации. Журнал о науке, практике, экономике. 2023;(3-4):44-50.

7. Li, Yue, Zhao, Qunshan, Wang, Mingshu. High-resolution traffic flow data from the urban traffic control system in Glasgow / Scientific Data, 12(1), 253, 2025.

8. Бояршинов М.Г., Вавилин А.С. Продолжительность движения автомобилей в потоке как индикатор транспортного затора. Мир транспорта. 2023;21(5):93-105. https://doi.org/10.30932/1992-3252-2023-21-5-11

9. Rowan, Davies, He, Haitao, Hui, Fang, Yasir, Ali, Mohammed, Quddus. A systematic review of machine learning-based microscopic traffic flow models and simulations / Communications in Transportation Research, 5, 100164, 2025

10. Pan, Yuyan Annie, Li, Fuliang, Li, Anran, Niu, Zhiqiang, Liu, Zhen. Urban intersection traffic flow prediction: A physics-guided stepwise framework utilizing spatio-temporal graph neural network algorithms / Multimodal Transportation, 4(2), 100207, 2025.

11. Щукин Ю.А., Бояршинов М.Г., Артеменко Д.В. Закономерности использования парковочного пространства. Транспорт Российской Федерации. Журнал о науке, практике, экономике. 2023;(3-4):44-50.

12. Luo, Ying, Chen, Yanyan, Lu, Kaiming, Zhang, Jian, Wang, Tao, Yi, Zhiyan. Modeling and analysis of heterogeneous traffic flow with mixed regular and connected human-driven vehicles considering driver stochasticity / International Journal of Modern Physics C, 36(6), 2450244, 2025.

13. Егоров Е.А. Применение подземных автоматических паркингов при реконструкции зданий в условиях плотной городской застройки. Новые технологии в строительстве. 2023;(3):141-150. https://doi.org/10.24412/2409-4358-2023-3-141-150

14. Zhang, Pei, Zhou, SiLong, Hu, Jie, Zhao, WenLong, Zheng, Jiachen, Zhang, Zhiling, Gao, Chongzhi. Automatic parking trajectory planning in narrow spaces based on Hybrid A* and NMPC / Scientific Reports, 15(1), 1384, 2025.

15. Лобашов А.О., Дульфан С.Б., Прасоленко А.В., Доля К.В., Бурко Д.Л. ИССЛЕДОВАНИЕ СПРОСА НА «ПЕРЕХВАТЫВАЮЩИЕ» ПАРКОВКИ. НАУКА и ТЕХНИКА. 2018;17(1):42-50. https://doi.org/10.21122/2227-1031-2018-17-1-42-50

REFERENCES

1. Belyakovcev P. A. Sovremennye napravleniya vnedreniya innovacij na predpriyatiyah transportnogo kompleksa // Vektor ekonomiki. – 2021. – №. 7.
2. Lancev, V.YU. Analiz sovremennyh metodov povysheniya effektivnosti avtoservisnyh predpriyatij / V.YU. Lancev, A.S. Ibraev, A.E. Sarsenov, A.M. Dauletov // Nauchno-prakticheskij zhurnal «Nauka i obrazovanie» ZKATU im. ZHangir hana 2022, №4-3(69). S. 211-219.
3. Issledovanie avtorynka Kazahstana: analiz transformacii otrasli. [Elektronnyj resurs] / Rezhim dostupa: https://ffin.kz/research/11-issledovanie-avtorynka-kazakhstana-analiz-transformatsii-otrasli#:~:text=%D0%9F%D0%BE%20%D1%81%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20c%20%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%BC%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BC,(%D0%BD%D0%B0%2030%2C5%25).
4. Ibraev, A.S. Analiz vidov transporta v Respublike Kazahstan / A.S. Ibraev // Mezhdunarodnaya nauchno-prakticheskaya konferenciya posvyashchennaya 125-letiyu akademika K.I. Satpaeva «Nauka, issledovaniya, znaniya: tendencii razvitiya» / «Nauka i obrazovanie» – 2024. №2 (75)
5. Ibraev, A.S. Analiz vidov transporta v Respublike Kazahstan / A.S. Ibraev / / Analiz vidov transporta v Respublike Kazahstan
6. SHCHukin YU.A., Boyarshinov M.G., Artemenko D.V. Zakonomernosti ispol'zovaniya parkovochnogo prostranstva. Transport Rossijskoj Federacii. ZHurnal o nauke, praktike, ekonomike. 2023;(3-4):44-50.
7. Li, Yue, Zhao, Qunshan, Wang, Mingshu. High-resolution traffic flow data from the urban traffic control system in Glasgow / Scientific Data, 12(1), 253, 2025.
8. Boyarshinov M.G., Vavilin A.S. Prodolzhitel'nost' dvizheniya avtomobilej v potoke kak indikator transportnogo zatora. Mir transporta. 2023;21(5):93-105. https://doi.org/10.30932/1992-3252-2023-21-5-11
9. Rowan, Davies, He, Haitao, Hui, Fang, Yasir, Ali, Mohammed, Quddus. A systematic review of machine learning-based microscopic traffic flow models and simulations / Communications in Transportation Research, 5, 100164, 2025
10. Pan, Yuyan Annie, Li, Fuliang, Li, Anran, Niu, Zhiqiang, Liu, Zhen. Urban intersection traffic flow prediction: A physics-guided stepwise framework utilizing spatio-temporal graph neural network algorithms / Multimodal Transportation, 4(2), 100207, 2025.
11. SHCHukin YU.A., Boyarshinov M.G., Artemenko D.V. Zakonomernosti ispol'zovaniya parkovochnogo prostranstva. Transport Rossijskoj Federacii. ZHurnal o nauke, praktike, ekonomike. 2023;(3-4):44-50.
12. Luo, Ying, Chen, Yanyan, Lu, Kaiming, Zhang, Jian, Wang, Tao, Yi, Zhiyan. Modeling and analysis of heterogeneous traffic flow with mixed regular and connected human-driven vehicles considering driver stochasticity / International Journal of Modern Physics C, 36(6), 2450244, 2025.
13. Egorov E.A. Primenenie podzemnyh avtomaticheskih parkingov pri rekonstrukcii zdanij v usloviyah plotnoj gorodskoj zastrojki. Novye tekhnologii v stroitel'stve. 2023;(3):141-150. https://doi.org/10.24412/2409-4358-2023-3-141-150
14. Zhang, Pei, Zhou, SiLong, Hu, Jie, Zhao, WenLong, Zheng, Jiachen, Zhang, Zhiling, Gao, Chongzhi. Automatic parking trajectory planning in narrow spaces based on Hybrid A* and NMPC / Scientific Reports, 15(1), 1384, 2025.
15. Lobashov A.O., Dul'fan S.B., Prasolenko A.V., Dolya K.V., Burko D.L. ISSLEDOVANIE SPROSA NA «PEREKHVATYVAYUSHCHIE» PARKOVKI. NAUKA i

TEKHNIKA. 2018;17(1):42-50. https://doi.org/10.21122/2227-1031-2018-17-1-42-50

ТҮЙІН

Автотұрақтардағы көлік ағындарын тиімді басқару моторизацияның өсуі мен қала құрылысының тығыздығы жағдайында өзекті міндетке айналуда. Мақалада тұрақ аймақтарын оңтайландыруға, жүргізушілерге ыңғайлылықты арттыруға және жалпы көлік жағдайын жақсартуға бағытталған заманауи технологиялар мен инновациялық тәсілдер қарастырылады. Қазақстандағы көлік инфрақұрылымының ағымдағы жай-күйін талдау автомобильдер санының едәуір ұлғаюын көрсетеді, бұл тұрақ кеңістігіне қосымша жүктеме туғызады. Негізгі проблемалар-орындардың жетіспеушілігі, тұрақтарды біркелкі пайдаланбау, автоматтандыру деңгейінің жеткіліксіздігі және пайдаланушыларға ақпараттық қолдау көрсету. Осы қоңырауларға жауап ретінде интеллектуалды көлік жүйелерін (its), автоматтандырылған тұрақ шешімдерін және бос орын сенсорлары, Нөмірді тану жүйелері және навигациялық платформалар сияқты сандық бақылау технологияларын енгізу ұсынылады. Көлік жүйелерін «ақылды қала» тұжырымдамасымен біріктіру ағындарды тиімдірек басқаруға, кептелісті азайтуға және жол қауіпсіздігін жақсартуға мүмкіндік береді. Жұмыста сараланған төлем жүйесі, жүргізушілерді қол жетімді жерлер туралы ақпараттандыруға арналған көрнекі тақталар, сондай-ақ тұрақ аймақтарын кеңістікте орналастыруды оңтайландыру бар шешімдер ұсынылады. Бұл шаралар автотұрақтарды пайдалану тиімділігін арттыруға, орындарды іздеу уақытын қысқартуға және қалалық ортаның сапасын жақсартуға бағытталған. Автотұрақтарды басқаруға инновациялық технологияларды енгізу көлік жүйесін автомобильдердің өсіп келе жатқан санына бейімдеу және жол қозғалысының барлық қатысушылары үшін қолайлы жағдайларды қамтамасыз ету үшін қажетті қадам болып табылады.

УДК 631.171
МРНТИ 68.85.39

Ведищев С.М., доктор технических наук, профессор, https://orcid.org/0000-0002-3759-9809
ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический университет», г. Тамбов, Россия, serg666_65@mail.ru
Ибраев А. С., PhD, и.о. доцента, https://orcid.org/ 0000-0002-7153-1496
НАО «Западно-Казахстанский аграрно-технический университет имени Жангир хана», 090009, ул. Жангир хана, 51, г. Уральск, Республика Казахстан, ibraevadil2012@mail.ru
Vedishchev S., Doctor of Technical Sciences, Professor, https://orcid.org/0000-0002-3759-98096. Tambov State Technical University, Tambov, Russia. serg666_65@mail.ru
Ibraev A., PhD, docent, https://orcid.org/0000-0002-7153-1496
NJSC«West Kazakhstan Agrarian and Technical University named after Zhangir Khan», Uralsk, st. Zhangir khan 51,090009, Kazakhstan, ibraevadil2012@mail.ru

КОЭФФИЦИЕНТ БОКОВОГО РАСПОРА ДОЗАТОРА КОРМА
THE COEFFICIENT OF LATERAL EXPANSION OF THE FEED DISPENSER

АННОТАЦИЯ

В статье представлена разработанная экспериментальная установка и методика исследования коэффициента бокового распора в ячейке барабанного дозатора. Рассмотрены основные параметры, влияющие на энергоемкость процесса дозирования, включая усилие трения корма о торцевую стенку дозатора в зоне загрузки. Установлено, что коэффициент бокового давления определяется сочетанием нескольких факторов, таких как высота слоя корма в бункере, коэффициент бокового распора, а также

коэффициент трения корма о стенку дозатора. Для исследования коэффициента бокового давления предложена методика, основанная на измерении нормального и бокового давлений при различных условиях загрузки. В ходе экспериментов определены численные значения коэффициента бокового давления для двух типов кормов – сухого рассыпного комбикорма и влажной мешанки. Полученные результаты позволяют более точно прогнозировать энергозатраты дозаторов и оптимизировать их конструкцию с целью повышения эффективности работы оборудования. Разработанная методика может быть использована при проектировании и модернизации систем дозирования сыпучих материалов в различных отраслях сельского хозяйства и пищевой промышленности.

ANNOTATION

The article presents a developed experimental setup and a methodology for studying the coefficient of lateral thrust in the cell of a drum dispenser. The main parameters affecting the energy consumption of the dosing process are analyzed, including the frictional force of the feed against the end wall of the dispenser in the loading zone. It has been established that the lateral pressure coefficient is determined by a combination of several factors, such as the height of the feed layer in the hopper, the lateral thrust coefficient, and the feed friction coefficient against the dispenser wall. A methodology for studying the lateral pressure coefficient is proposed, based on measuring normal and lateral pressures under various loading conditions. During the experiments, numerical values of the lateral pressure coefficient were determined for two types of feed – dry crumbling compound feed and wet mash. The obtained results allow for more accurate prediction of dispenser energy consumption and optimization of their design to improve equipment efficiency. The developed methodology can be used in the design and modernization of bulk material dosing systems in various agricultural and food industry applications.

***Ключевые слова**: барабанный дозатор, коэффициент бокового давления, боковое давление, сыпучие материалы, энергоемкость, экспериментальные исследования, оптимизация конструкции.*

***Key words**: drum dispenser, lateral pressure coefficient, side pressure, bulk materials, energy consumption, experimental research, design optimization.*

Введение. На эффективное использование в технологических линиях дозаторов и распределителей сыпучих материалов оказывают влияние размерные (расходные) характеристики, конструктивные особенности, варианты размещения в пространстве, виды и свойства сыпучих материалов, условия компоновки и привязки к основному технологическому оборудованию, конструктивные особенности, определяющие технологии изготовления и виды используемых материалов (комплектующих) [7-9, 13-15].


Материалы и методы исследований. В общей структуре затраты энергии на процесс дозирования кормов являются существенными. Они складываются из затрат в зоне загрузки, транспортирования, выгрузки и ожидания, из которых наибольшая величина приходится на затраты мощности в зоне загрузки [1-3, 7-9].

Корм, поступающий из бункера в дозатор, заполняет ячейку и прижимается к торцевой стенке барабанного дозатора [1-3, 7-9]. Величина давления на торцевую стенку определяется коэффициентом бокового распора и является одним из факторов, влияющим на энергоемкость дозатора. Момент сил трения, приведенный к валу барабанного дозатора, в поверхности раздела дозируемый материал – торцевая стенка дозатора зависит от вертикального усилия высоты слоя материала в бункере, коэффициента бокового распора и коэффициента трения о стенку дозатора. Величина коэффициента бокового давления зависит от гранулометрического состава, плотности,

влажности дозируемого материала. Поэтому получить аналитические зависимости, описывающие взаимосвязь этих параметров не всегда возможно. [10-12, 13-15].

Для экспериментального исследования коэффициента бокового распора была разработана установка (Рисунок1). Она состоит из вала 9 с дисками трения 6 и 8, между которыми установлена фрикционная шайба 7. В стенке бункера 2 установлен съемный подвижный элемент 5, жестко соединенный с диском трения 6 стойками 12. От высыпания кормового материала из бункера предохраняет эластичная диафрагма 13. Для большего соответствия опытных данных действительности элемент 5 имеет форму и размеры соответствующие форме торцевой грани ячейки дозатора [4-9].

Опыты проводили следующим образом. На предварительно заполненный и выровненный до высоты H_0 исследуемый материал в бункере загружали взвешенную порцию $G_{гр}$. Затем сверху клали уплотнительную пластину 3 и последовательно нагружали грузом 4. При каждом интервале нагрузки определяли усилие проворачивания шкива 10.



а) б)

Рисунок 1 - Схема установки для исследования коэффициента бокового распора: а) вид с боку; б разрез А-А:
1-стойка; 2-бункер; 3-прижимная пластина; 4-груз; 5-подвижный элемент; 6, 8-диски трения; 7-фрикционная шайба; 9-вал; 10-шкив; 11-грузовая чашка; 12-стойка; 13-эластичная диафрагма

Коэффициент бокового давления определяли из соотношения

$$k_б = \frac{\sigma_н}{\sigma_б}, \qquad (1)$$

где $\sigma_н$ - нормальное давление, Па; $\sigma_б$ - боковое давление, Па.

Нормальное давление определим по выражению

$$\sigma_б = \frac{\left(G_к + G_{пл} + G_{гр}\right) \cdot g}{S_{осн}} = \frac{\left(G_к + G_{пл} + G_{гр}\right) \cdot g}{a \cdot b}, \qquad (2)$$

где $G_к$, $G_{пл}$, $G_{гр}$ - масса соответственно взвешенной порции корма, пластины и груза, кг; $S_{осн}$ - площадь дна бункера, м^2; a, b - длина и ширина бункера соответственно, м.

Боковое давление найдем по формуле

$$\sigma_н = \frac{G_б}{S_я}, \qquad (3)$$

где $G_б$ - усилие на подвижном элементе, Н; $S_я$ - площадь подвижного элемента, м^2.

Усилие на подвижном элементе найдем по выражению

$$G_б = T \cdot K_{пр} \cdot g, \qquad (4)$$

где T - масса грузовой чашки, кг; $K_{пр}$ - коэффициент прибора.

Площадь ячейки определим по формуле

$$S_я = \frac{\pi \cdot \left(R^2 - r^2\right)}{z_я}, \qquad (5)$$

где R - наружный радиус барабана, м; r - радиус вала барабана, м; $z_я$ - количество ячеек в барабане, шт.

Подставим (4) и (5) в формулу (3), а затем формулы (2) и (3) в соотношение (1). После преобразования получим

$$k_б = = \frac{\left(G_к + G_{пл} + G_{гр}\right) \cdot \pi \cdot \left(R^2 - r^2\right)}{a \cdot b \cdot T \cdot K_{пр} \cdot z_я}. \qquad (7)$$

Исследования проводились на рассыпном комбикорме (W = 12,7%) и влажной мешанке (W = 62,5%). Для рассыпного комбикорма значения коэффициента бокового распора находилась в пределах $k_б$ = 0,305±0,022, а для влажной мешанки $k_б$ = 0,420±0,037.

Результаты исследований. Исследования проводились на рассыпном комбикорме (W = 12,7%) и влажной мешанке (W = 62,5%). Для рассыпного комбикорма значения коэффициента бокового распора находилась в пределах $k_б$ = 0,305±0,022, а для влажной мешанки $k_б$ = 0,420±0,037.

Выводы. Рассмотрены научно-технические основы по влиянию коэффициента бокового распора на энергозатраты барабанного дозатора. Описан механизм образования бокового давления в ячейке барабанного дозатора с подвижными элементами. Разработана установка и методика исследования коэффициента бокового давления. Получены численные значения коэффициента бокового давления для рассыпного комбикорма и влажной мешанки.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Ведищев, С.М. Дозатор кормов / С.М. Ведищев, В.Т. Щедрин / Вестник ТГТУ. - 1995. - №5,6. - С. 15-17.

2. Novitskyi, A., Banniy, O., Novitskyi, Y., Kharkovskyi, I., Antal, M. Examination of maintainability indicators of feed preparation and distribution products / Machinery and Energetics, 15(4), страницы 47–57, 2024. ISSN 26631334, DOI 10.31548/machinery/4.2024.47

3. Vijayalakshmi, B., Varsheni, S., Ganesh, T.R. An Innovative Approach in the Design of AI & IoT Enhanced Automatic Animal Food Dispenser / 2nd IEEE International Conference on Advances in Information Technology, ICAIT 2024 – Proceedings, 2024. ISBN 979-835038386-7. DOI 10.1109/ICAIT61638.2024.10690348

4. Ведищев, С.М. Скребковый дозатор / С.М. Ведищев, А.В Прохоров // Тракторы и сельхозмашины. - 2014. - №4. - С. 12-13.

5. Hu, J., He, J., Wang, Y., ... Du, Y., He, P. Design and study on lightweight organic fertilizer distributor / Computers and Electronics in Agriculture, 169, 105149. 2020. ISSN 01681699. DOI 10.1016/j.compag.2019.105149

6. Vijayalakshmi, B., Varsheni, S., Sre Ganesh, T.R. Design and Implementation of an AI-Enhanced Automatic Animal Food Dispenser / Proceedings of the 2024 10th International Conference on Communication and Signal Processing, ICCSP 2024, страницы 1241–1246, 2024. ISBN 979-835035306-8, DOI 10.1109/ICCSP60870.2024.10543996

7. Ведищев, С. М. Управление подачей барабанного дозатора / С.М. Ведищев, Н.О. Милюков, Н.В. Хольшев // Наука в центральной России. - 2015. №1(13). – С. 5-11.

8. Bulatov, S.Yu., Isupov, A.Yu., Nechaev, V.N., Pronin, A.N., Tareeva, O.A. Influence of parameters of a screw dispenser on its dosing accuracy / Tractors and Agricultural Machinery, 90(5), страницы 477–486. 2023. ISSN 03214443. DOI 10.17816/0321-4443-430386

9. Донгвей В., Цзяшэн В., Шуки Ш. Конструктивно-экспериментальный расчет дозатора семян арахиса в селекционной сеялке. Сельскохозяйственные машины и технологии. 2019;13(4):38-41. https://doi.org/10.22314/2073-7599-2019-13-4-38-41

10. Механизация приготовления кормов [Электронный ресурс]: учебное пособие для бакалавров и магистров, обучающихся по направлению «Агроинженерия», а также аспирантов и работников сельскохозяйственных предприятий: в 2 ч. / С.М. Ведищев, В.П. Капустин, Ю.Е. Глазков и др. – Тамбов: Изд-во ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2015. - 2 электрон. опт. диска (CD-ROM).

11. Булатов С.Ю., Пронин А.Н. Результаты исследований шнекового дозатора сухих сыпучих компонентов комбикорма. Аграрная наука Евро-Северо-Востока. 2024;25(1):123-133. https://doi.org/10.30766/2072-9081.2024.25.1.123-133

12. Окрепилов В.В., Пешехонов А.А., Рудакова И.В., Черникова А.В. Дозирующие исполнительные устройства для сыпучих материалов: инновационные методы и системы. Измерительная техника. 2018;(11):27-32. https://doi.org/10.32446/0368-1025it.2018-11-27-32

13. Тишанинов, Н.П. Обоснование конструктивно-технологической схемы делителя потока сыпучих материалов с изменяемым соотношением расходов отводимых потоков / Н.П. Тишанинов, А.В. Анашкин, К.Н. Тишанинов // Наука в центральной России. - 2013. - №6. - С. 15-21.

14. Tupolskikh T.I., Gucheva N.V. Investigation of power supply parameter effect on performance of vibrator meter with magnetic actuator. Vestnik of Don State Technical University. 2016;16(2):148-153. (In Russ.) https://doi.org/10.12737/19689

15. Doroshenko I.V. SUBSTANTIATION OF THE NEED TO CREATE DISCRETE HYDRAULIC DRIVE SYSTEMS WITH A THIN FORMATION OF FLOW PULSES. Mining Science and Technology (Russia). 2017;(3):11-17. (In Russ.) https://doi.org/10.17073/2500-0632-2017-3-11-15

REFERENCES

1. Vedishchev, S.M. Dozator kormov / S.M. Vedishchev, V.T. SHCHedrin / Vestnik TGTU. - 1995. - №5,6. - S. 15-17.

2. Novitskyi, A., Banniy, O., Novitskyi, Y., Kharkovskyi, I., Antal, M. Examination of maintainability indicators of feed preparation and distribution products / Machinery and Energetics, 15(4), stranicy 47–57, 2024. ISSN 26631334, DOI 10.31548/machinery/4.2024.47

3. Vijayalakshmi, B., Varsheni, S., Ganesh, T.R. An Innovative Approach in the Design of AI & IoT Enhanced Automatic Animal Food Dispenser / 2nd IEEE International Conference on Advances in Information Technology, ICAIT 2024 – Proceedings, 2024. ISBN 979-835038386-7. DOI 10.1109/ICAIT61638.2024.10690348

4. Vedishchev, S.M. Skrebkovyj dozator / S.M. Vedishchev, A.V Prohorov // Traktory i sel'hozmashiny. - 2014. - №4. - S. 12-13.

5. Hu, J., He, J., Wang, Y., ... Du, Y., He, P. Design and study on lightweight organic fertilizer distributor / Computers and Electronics in Agriculture, 169, 105149. 2020. ISSN

01681699. DOI 10.1016/j.compag.2019.105149
6. Vijayalakshmi, B., Varsheni, S., Sre Ganesh, T.R. Design and Implementation of an AI-Enhanced Automatic Animal Food Dispenser / Proceedings of the 2024 10th International Conference on Communication and Signal Processing, ICCSP 2024, stranicy 1241–1246, 2024. ISBN 979-835035306-8, DOI 10.1109/ICCSP60870.2024.10543996
7. Vedishchev, S. M. Upravlenie podachej barabannogo dozatora / S.M. Vedishchev, N.O. Milyukov, N.V. Hol'shev // Nauka v central'noj Rossii. - 2015. №1(13). – S. 5-11.
8. Bulatov, S.Yu., Isupov, A.Yu., Nechaev, V.N., Pronin, A.N., Tareeva, O.A. Influence of parameters of a screw dispenser on its dosing accuracy / Tractors and Agricultural Machinery, 90(5), stranicy 477–486. 2023. ISSN 03214443. DOI 10.17816/0321-4443-430386
9. Dongvej V., Czyashen V., SHuki SH. Konstruktivno-eksperimental'nyj raschet dozatora semyan arahisa v selekcionnoj seyalke. Sel'skohozyajstvennye mashiny i tekhnologii. 2019;13(4):38-41. https://doi.org/10.22314/2073-7599-2019-13-4-38-41
10. Mekhanizaciya prigotovleniya kormov [Elektronnyj resurs]: uchebnoe posobie dlya bakalavrov i magistrov, obuchayushchihsya po napravleniyu «Agroinzheneriya», a takzhe aspirantov i rabotnikov sel'skohozyajstvennyh predpriyatij: v 2 ch. / S.M. Vedishchev, V.P. Kapustin, YU.E. Glazkov i dr. – Tambov: Izd-vo FGBOU VPO «TGTU», 2015. - 2 elektron. opt. diska (CD-ROM).
11. Bulatov S.YU., Pronin A.N. Rezul'taty issledovanij shnekovogo dozatora suhih sypuchih komponentov kombikorma. Agrarnaya nauka Evro-Severo-Vostoka. 2024;25(1):123-133. https://doi.org/10.30766/2072-9081.2024.25.1.123-133
12. Okrepilov V.V., Peshekhonov A.A., Rudakova I.V., CHernikova A.V. Doziruyushchie ispolnitel'nye ustrojstva dlya sypuchih materialov: innovacionnye metody i sistemy. Izmeritel'naya tekhnika. 2018;(11):27-32. https://doi.org/10.32446/0368-1025it.2018-11-27-32
13. Tishaninov, N.P. Obosnovanie konstruktivno-tekhnologicheskoj skhemy delitelya potoka sypuchih materialov s izmenyaemym sootnosheniem raskhodov otvodimyh potokov / N.P. Tishaninov, A.V. Anashkin, K.N. Tishaninov // Nauka v central'noj Rossii. - 2013. - №6. - S. 15-21.
14. Tupolskikh T.I., Gucheva N.V. Investigation of power supply parameter effect on performance of vibrator meter with magnetic actuator. Vestnik of Don State Technical University. 2016;16(2):148-153. (In Russ.) https://doi.org/10.12737/19689
15. Doroshenko I.V. SUBSTANTIATION OF THE NEED TO CREATE DISCRETE HYDRAULIC DRIVE SYSTEMS WITH A THIN FORMATION OF FLOW PULSES. Mining Science and Technology (Russia). 2017;(3):11-17. (In Russ.) https://doi.org/10.17073/2500-0632-2017-3-11-15

ТҮЙІН

Мақалада барабан диспенсерінің ұяшығындағы бүйірлік аралықтың коэффициентін зерттеудің әзірленген эксперименттік қондырғысы мен әдістемесі келтірілген. Дозалау процесінің энергия сыйымдылығына әсер ететін негізгі параметрлер, соның ішінде жүктеу аймағындағы диспенсердің соңғы қабырғасына Жем үйкелісінің күші қарастырылады. Бүйірлік қысым коэффициенті бірнеше факторлардың жиынтығымен анықталады, мысалы, бункердегі жем қабатының биіктігі, бүйірлік аралықтың коэффициенті, сондай-ақ жем диспенсерінің қабырғасына үйкеліс коэффициенті. Бүйірлік қысым коэффициентін зерттеу үшін әртүрлі жүктеме жағдайларында қалыпты және бүйірлік қысымдарды өлшеуге негізделген әдіс ұсынылған. Тәжірибелер барысында жемнің екі түрі үшін бүйірлік қысым коэффициентінің сандық мәндері анықталды – құрғақ борпылдақ жем және дымқыл араластырғыш. Алынған нәтижелер диспенсерлердің энергия шығындарын дәлірек болжауға және жабдықтың тиімділігін арттыру мақсатында олардың дизайнын

оңтайландыруға мүмкіндік береді. Әзірленген әдістеме ауыл шаруашылығы мен тамақ өнеркәсібінің әртүрлі салаларында Сусымалы материалдарды мөлшерлеу жүйелерін жобалау және жаңғырту кезінде пайдаланылуы мүмкін.

ӘОЖ 621.793.79
ҒТАХР 45.09.29

Муханбетжанова Қ.Т., аға оқытушы, https://orcid.org/0009-0006-4462-4300
«Жәңгір хан атындағы Батыс Қазақстан аграрлық-техникалық университеті» КеАҚ, Орал қ., Жәңгір хан көш., 51, 090009, Қазақстан Республикасы, karlam1994@mail.ru
Сергеев В.В., Техникалық оқыту бюросының бастығы
«Батыс Қазақстан машинажасау компаниясы» АҚ, Орал қ., Урдинская көш., 1/0, 090009, Қазақстан Республикасы.

Mukhanbetzhanova K.T, Senior Lecturer, https://orcid.org/0009-0006-4462-4300
NJSC«West Kazakhstan Agrarian and Technical University named after Zhangir Khan», Uralsk, st. Zhangir khan 51,090009, Kazakhstan, karlam1994@mail.ru
Sergeev V. V., head of the Bureau of technical training JSC "West Kazakhstan engineering company", Uralsk, Urdinskaya STR., 1/0, 090009, Republic of Kazakhstan.

ҚҰРАМЫНДА ТЕМІР БАР МАТЕРИАЛДАР
IRON-CONTAINING MATERIALS

АҢДАТПА

FeAIN/NiFe жұқа қабатты үлгілерінің магниттік қасиеттері темірнитридті және пермаллоидті қабаттар қалыңдығының арақатынасына байланысты болады. Мұндай арақатынас 1-ден 23-ке дейін ұлғаяды және үлгінің қалыңдығы 0,48 мкм құрайтын өзгеріссіз жалпы қалыңдығы кезінде қанығудың магниттік индукциясы 1,5-тен 2,0 Тл-ге дейін және коэрцитивтік күші монотонды түрде 24-тен 160 А/м-ге дейін ұлғаяды. Коэрциттік күш жеңіл магниттелу осі бойынша өлшенді. Коэрциттік күштің өзгеру сипаты жеңіл магниттелу бағытына қарағанда қарастырылатын барлық қатынас қалыңдығынан шамамен 40 А/м кем ауыр магниттелу осі бойынша да байқалды. FeAlN/NiFe үлгілері үшін анизотропия өрісі темірнитридті және пермаллоидті қабаттар қалыңдығының ең жоғары және 5 қатынасына тең болуы үшін 200 А/м құрайды.

Осылайша, пермалло қабаты бар жұқа балқыту материалдары коэрциттік күші аз жеткілікті қаныққан магниттік индукцияға және магниттік жұмсақ материалдан жасалған элементтері бар түрлендіргіштерді әзірлеу кезінде іс жүзінде қызығушылық туғызатын қаныққан магниттік индукцияға ие. Қаралған эксперименттік нәтижелердің негізінде көп қабатты қабықтар үшін 2,8% (ат) тең кобальт құрамы плазмалық өңдеудің оңтайлы уақыты кезінде FeCo/FeCoN (5-7 с) магниттік қанығудың салыстырмалы жоғары индукциясына B_s = 2,0 Тл және салыстырмалы төмен Коэрцитивтік күш H_c = 120 А/м. Бұл пленкалардың магниттік өткізгіштігі салыстырмалы түрде жоғары (2200-ден астам) және жиілік 20 МГц-ге дейін ұлғайған кезде өзгермейді

ANNOTATION

The magnetic properties of Fain / NiFe thin-layer samples depend on the ratio of the thickness of the irononitride and permalloid layers. Such a ratio increases monotonously from 1.5 to 2.0 TL magnetic induction and co-operative force from 24 to 160 A/M at an unchanged total thickness with an increase in 1 to 23 and a sample thickness of 0.48 microns. The coercite force was measured along the light magnetization shaft. The nature of the change in the coercite force was also observed along the axis of heavy magnetization, which all the ratio in question

has a thickness of about 40 A/M less than in the direction of light magnetization. For FeAlN/NiFe samples, the anisotropy field is 200 A / M for the maximum and equal to 5 irononitride and permalloid layer thickness ratios.

Thus, thin melt materials with a permallo layer have a sufficiently large saturation magnetic induction with a small coercytic force and a magnetization of saturation, which is of practical interest when developing transducers that include elements made of magnetic soft material. Based on the reviewed experimental results, 2.8% for multilayer flakes (at.) equal to the cobalt content of FECO/FeCoN (5-7 s) at the optimal plasma processing time to a relatively high magnetic saturation induction of BS = 2.0 TL and a relatively low coerctive force NS = 120 A/M. The magnetic permeability of these films is relatively high (more than 2200) and does not change when the frequency is increased to 20 MHz.

Кілт сөздер: *теміронитридті және пермаллоидті қабаттар, коэрциттік күш, анизотропия өрісі, кобальт, магниттік өткізгіштік.*

Keywords: *iron-nitride and permalloid layers, coercive force, anisotropy field, cobalt, magnetic conductivity.*

Кіріспе. Құрамында темір мен кобальт бар көп қабатты пленкалар, атап айтқанда FeCo/FeCoN пленкалары, магниттік жұмсақ қасиеттері жағынан көптеген жұқа жабыстырғыш материалдардан асып түседі [1,2]. Мысалы, құрамында темір 97,2% (ат.) және кобальт 2,8% (ат.) бар көп қабатты FeCo/FeCoN пленкалары үшін қанығудың магниттік индукциясы 2,0 Тл, коэрциттік күші 120 А/м және магниттік өткізгіштігі 20 МГц жиілігінде 2200-ден астам.

Бұл таспалар жоғары жиіліктегі магнетронды тәсілмен шыны субстраттарға тозаңдандырылды. Бастапқыда 0,27 Па қысымда аргон атмосферасында қалыңдығы 5 не 20 нм FeCo қабаты тұндырылды. Содан кейін тозаңданған қабат 0,13 Па қысымда азоттың плазмалық атмосферасында 0-60 с бойы сақталды. Нәтижесінде FeCoN нитридтік қабаты қалыптасты. Содан кейін FeCo қабаты қайтадан шөгіп, азоттың плазмалық атмосферасында өңделді. Бұдан әрі тозаңданатын қабаттардың кезектесуі көп қабатты FeCo/FeCoN пленкасының жалпы қалыңдығы 500 нм-ге жеткенге дейін жалғасты. Тозаңданғанға дейін камерадағы алдын ала қысым 10-5 Па құрады. Темір-болат қабаттарын тозаңдандыру процесі жұмыс газының қысымы 0,27 Па болған кезде жүзеге асырылды. Тұндыру жылдамдығы шамамен 1 нм/с. Тозаңдандыру кезіндегі шашырайтын қуаты 400 Вт. Азоттың плазмалық атмосферасында тозаңданған қабаттарды ұстау 0,13 Па қысымда және 400 Вт-қа тең микротолқынды сәулелену қуатында жүргізілді. Тозаңданатын қабаттардағы кобальттың құрамы 0-50% (ат.) шегінде өзгерді. Көп қабатты пленкалардағы темір мен кобальттың шоғырлануы спектроскоп пен микроанализатордың көмегімен, ал магниттік сипаттамалары кернеуі 800 кА/м дейінгі магнит өрісіндегі діріл магнитометрімен анықталды. Кристалды құрылымды бақылау үшін рентген дифрактометрі пайдаланылды. Тозаңданған қабаттардың әртүрлі тереңдіктегі концентрациясының өзгеруі электронды спектроскоппен бақыланған. Көп қабатты қабыршақтардың көлденең қимасы сканерлейтін электронды микроскоптың көмегімен байқалды. Әртүрлі кобальт құрамындағы көп қабатты FeCo/FeCoN пленкалары зерттелді. Үлкейтумен кобальт концентрациясы өседі және магниттік индукциялық қанығу B_s, және коэрциттік күш H_c. Бәрі үшін: плазмалық атмосферада ұсталмаған азотты көп қабатты пленкалар үшін магниттік индукция және коэрциттік күш мәндері көп қабатты пленкалар үшін B_s және H_c мәндерінен едәуір үлкен 10 с ішінде плазмалық азот атмосферасындағы FeCo. Қарастырылып отырған көп қабатты пленкалардың екі түрінің қалыңдығы шамамен бірдей және 20 нм-ге тең. Азот плазмасында ұсталмаған көп қабатты пленкалар FeCo қабаттарының жиынтығы болып табылады, олар 20 с бойы жүйелі түрде шөгеді. Олар

үшін магниттік қанығу индукциясының максималды мәні 2,33 Тл тең, ол шамамен 30% кобальтқа сәйкес келеді. Қанығудың магниттік индукциясының кобальттың пайыздық құрамына тәуелділігі сыртқы жағынан FeCo массивті қорытпасы материалының тәуелділігіне ұқсас.

Зерттеу материалдары мен әдістері. Азот атомдарының диффузиясына әкелетін азот плазмасындағы темір-кобальт қабаттарын өңдеу процесі қанығудың магниттік индукциясының азаюына әкеледі. Ең үлкен B_S мәні кобальттың пайыздық мөлшері 50% (ат.) болғанда 2Тл-ге тең.

Қабаттарды плазмалық өңдеу FeCo/FeCoN пленкаларының коэрциттік күшіне айтарлықтай әсер етеді: кобальт концентрациясы 1% -дан кем болғанда коэрциттік күш 100 А/м аспайды. Кобальттың осындай шоғырлануы кезінде көп қабатты қабаттары өңделмеген пленкалардың H_C 1000 А/м астам құрайды.

Қабаттарды плазмалық өңдеудің көп қабатты FeCo/FeCoN пленкаларының магниттік қасиеттеріне әсерін эксперименттік зерттеу үшін құрамында кобальт 0-4,2% (ат.) бар үлгілер таңдалды. B_S қанығуының магниттік индукциясы мен H_c коэрциттік күшінің ұзақтығын анықтайтын t ұстаудың уақытына FeCo/FeCoN көп қабатты үлгілер тәуелділігі анықталды. Кобальт құрамы: 0; 1,4; 2,8; 4,2% (ат.) жұқа пленкалы үлгілер зерттелді.

Қанығудың магниттік индукциясы 5с ұстап тұру уақытын 10-ға дейін арттыра отырып, барлық қарастырылатын көп қабатты қабыршақтар үшін монотонды түрде төмендейді, яғни кобальттың әртүрлі құрамы көпқабатты жұқа пленкалар қарастырылады.

8с дейінгі көп қабатты FeCo/FeCoN пленкасының қабаттарын плазмалық өңдеу коэрцитивтік күштің айтарлықтай азаюына әкеледі. t ~ 8 с үшін кобальт құрамынан 90-нан 180 А/м дейін тең. 20 с ішінде өңделген, құрамында кобальт жоқ көп қабатты пленкалар, яғни Fe/FeN пленкалары ең төменгі коэрцитивті күші бар - шамамен 60 А/м. Осы пленкаларды 50 с және одан да көп уақыт бойы плазмалық өңдеу олардың коэрцитивтік күшін арттырады. Кобальттың қосылуына қарай коэрциттік күш салыстырмалы түрде аз болатын ұстау уақытының аралығы біртіндеп тарылады.

Қаралған эксперименттік нәтижелердің негізінде көп қабатты қабыршақтар үшін 2,8% (ат.) тең кобальт құрамы плазмалық өңдеудің оңтайлы уақыты кезінде FeCo/FeCoN (5-7 с) салыстырмалы түрде жоғары магниттік қанығу индукциясына B_s = 2,0 Тл және салыстырмалы түрде төмен коэрцитивті күш H_c = 120 А/м. Бұл пленкалардың магниттік өткізгіштігі салыстырмалы түрде жоғары (2200-ден астам) және жиілігі 20 МГц-ге дейін ұлғайған кезде өзгермейді.

Рентгенқұрылымдық талдау көрсеткендей, плазмалық өңдеусіз FeCo пленкаларында α- (110) - және α- (200) - бағытталған фазалары бар. α- (200) және α-(100) - бағдарланған фазаларға сәйкес келетін қарқындылықтар қатынасының (I_1 және I_2) кобальт концентрациясына тәуелділігі шамамен 5% (ат.) кобальтқа тең болғанда барынша көп болады. Ал бұл дегеніміз, кобальт құрамында α-(200) -ориентацияланған фаза басым болатынын көрсетеді. Кобальт мөлшерінің ұлғаюымен d-өлшемі α- (110) бағдарланған кристаллиттердің мөлшері өзгермейді.

FeCo/FeCoN және FeCo пленкалары үшін коэрциттік күштің кобальт концентрациясына тәуелділігі анықталды. Кобальт мөлшері 30% -дан 0% -ға дейін азайғанда коэрцитивті күш H_c FeCo/FeCoN пленкалары үшін FeCo пленкаларына қарағанда әлдеқайда тез азаяды. Көп қабатты FeCo/FeCoN пленкаларындағы кобальт концентрациясының артуымен қанығудың магнитострикциясы монотонды түрде артады.

Плазмалық өңдеудің ұзақтығы α-(200) және α-(100) бағытталған фазалардың таралуына едеуір әсер етеді. 0-2 с ішінде өңдеу кезінде көбінесе бір α-(200)-бағытталған фаза қалыптасады. Бақылау құрамында кобальт 2,8% (ат.) бар көп қабатты FeCo/FeCoN

пленкалары үшін жүргізілді. Азоттың плазмалық атмосферасында 5с астам уақыт бойы өңделген осы пленкалар үшін салыстырмалы түрде шағын максимумдардан басқа, α-(200) бағытталған фазаға сәйкес келетін салыстырмалы түрде үлкен, бірақ тар максимумдар α- (110) бағдарланған фазалары да анықталды . Көп қабатты FeCo/FeCoN нитридтік фазасы да анықталады. Қаралып отырған пленкалардың көлденең қимасының жазықтығында олардың нақты кезеңділігімен қабатты құрылымы жақсы байқалды.

Көп қабатты қабыршақтардың кристалды құрылымы FeCo/FeCoN t плазмалық өңдеу уақытына байланысты, ол 0-5 с аралығында өзгерген кезде, бұл d кристалды бағытталған дәндердің өлшемі мен d_0 дәнек өлшемінің плазмалық өңдеу уақытына тәуелділігі - азоттық плазмадағы қабаттардың сақталу уақытына байланысты екенін растайды. t плазмалық өңдеу уақытының 0-ден 5 с-ке дейін ұлғаюымен кристалды дәндердің мөлшері біртіндеп кішірейеді және тордың параметрі біртіндеп артады.

Плазмалық өңдеуден кейін құрамында 2,8% (ат.) кобальт бар көп қабатты FeCo/FeCoN пленкаларының кристалды дәндерінің өлшемі шамамен 6 нм. Плазмалық өңдеуден өтпеген осы пленкалар үшін кристалды дәндердің орташа өлшемі 17 нм шамасында. 2 секундтан астам плазмалық өңдеу тордың параметрін шамамен 0,2% -ға ұлғайтады. Өңделмеген пленкаларда салыстырмалы түрде ірі дәндер байқалады. Сонымен қатар плазмалық өңдеуге ұшыраған ұқсас үлгілерде ұсақ дисперсті кристалды құрылым көрінеді.

Жұқа пленкалы пермалло қабаттары бар материалдар. Магнитті жұмсақ материалдың салыстырмалы түрде жақсы қасиеттері NiFe пермаллойының қабаттары бар құрамында темір бар көп қабатты пленкаларға, атап айтқанда, FeSi/NiFe пленкаларына ие. Жұқа пленкалы материалы 91% Fe, 9% Si төмен қанығу магнитострикциясына және кремнийдің құрамына айтарлықтай тәуелді қанығу магниттілігіне ие. Бірақ бір қабатты жұқа қабыршақты FeSi материалының магниттік өткізгіштігі жоғары магнитті кристалды анизотропияға байланысты шамасы аз. 9% кремнийден тұратын FeSi жұқа қабаттарының пермалло қабаттарымен үйлесімі жоғары магниттік өткізгіштікті қамтамасыз етеді.

Көп қабатты FeSi/NiFe пленкалары шыны субстраттарға жоғары жиілікті иондық-плазмалық әдіспен тозаңдандырылды. Тозаңдандыру аргон атмосферасында төсеніш жазықтығына параллель бағдарланған сыртқы тұрақты магнит өрісінде жүзеге асырылды; магниттік өрістің кернеулігі 4 кА/м құраған. Негізгі технологиялық параметрлер: аргонның жұмыс қысымы 0,4-1,3 Па, жоғары жиілікті қуаттың тығыздығы 5,5 Вт/см2, төсем мен нысана арасындағы қашықтық 4см. Бастапқыда төсемге пермаллды қабат тозаңданды (нысана материалының құрамы 80,2% Ni, 19,8% Fe). Содан кейін пермалло қабатының үстіне 9,99% кремнийден тұратын материалдан FeSi қабаты шөгіп қалды. Осылайша тозаңдатылған көп қабатты пленкалар 200-600 ° С температурада 1 сағат бойы термоөңдеуден өтті. Термоөңдеу сыртқы магнит өрісінсіз вакуумда жүргізілді, содан кейін бөлме температурасына дейін баяу салқындатылды. Напыление (тозаңдату) жүргізілген қабыршақтардың кристалды құрылымы рентген дифрактометрі арқылы байқалды. Олардың коэрциттік күші гистерезистік қисықтар бойынша айқындалды. Жұқа қабаттар арасындағы өзара диффузия процесін талдау үшін электрондық спектроскоп пайдаланылды.

Бақылаулар көрсеткендей, FeSi/NiFe пленкалары темір-кремний қабатына тән көп қабатты құрылымға және кристалды текстураға ие. Алайда, 500°С термиялық күйдіруден кейін никель атомдарының диффузиясы нәтижесінде құрылымның көп қабаттылығы мен FeSi қабатының кристалды текстурасы бұзылады. Бұл FeSi қабатының магниттік өткізгіштігінің азаюына әкеледі. Никель атомдарын темір-кремний қабатына диффузиялау текстурасы (110) бар FeSi қабатының дәндерінің кристалды бағдары реттілігін жояды. Диффузиялық процестің қарқындылығы және онымен байланысты кристалды дәндердің реттелмеген бағдары теміркремний қабатының қалыңдығына

байланысты болады, оның өсуімен кристаллографиялық бағыттарды (110) және (211). сипаттайтын параметрлердің қатынасы монотонды түрде азаяды .Магниттік өткізгіштіктің осындай қалыңдық тәуелділігі сипаты бойынша: темір-кремний қабатының қалыңдығы 0,1-ден 1 мкм-ге дейін ұлғайған кезде магниттік өткізгіштігі шамамен 3000-нан 800-ге дейін сақталады. Магниттік өткізгіштік 0,05 мкм-ге тең бірдей қалыңдықтағы пермалло қабаттары FeSi/NiFe пленкалары үшін 5 МГц жиілігінде анықталған. Бұл пленкалар аргон қысымы 1,3 Па болған кезде тозаңданған. Алынған эксперименттік нәтижелерден темір-кремний қабатының қалыңдығы неғұрлым үлкен болса, кристалды текстура соғұрлым әлсіз көрінеді (110). 0,3 мкм-ден аспайтын FeSi қабатының оңтайлы қалыңдығында, FeSi/NiFe пленкасының магниттік өткізгіштігі магнитті жұмсақ материал үшін қажетті шекте қалады.

Никель атомдарының диффузиялық процесіне тозаңдандыру кезіндегі аргон қысымы әсер етеді, бұл, әрине, магниттік өткізгіштікке де әсер етеді. Шамасына қарай 1,3-тен 0,3 Па-ға дейін аргон қысымын азайту FeSi/NiFe пленкаларының магниттік өткізгіштігі шамамен 3700-ден 5200-ге дейін біркелкі өседі. Бұл пленкалардағы пермалло қабаттары мен темір-кремний қабатарының қалыңдығы 0,02 және 0,18 мкм тең.

Темір-кремний қабаты қалыңдығының өсуімен төмендейтін магниттік өткізгіштікке қарағанда коэрцитивтік күш біркелкі артады. Пермалло қабатының қалыңдығы 0,02 мкм FeSi/NiFe пленкалары үшін коэрцитивтік күш 60 А/м жетеді. 0,6 мкм шамасында темір-кремний қабатының компромисстік қалыңдығы магниттік өткізгіштікке 3000 және 40 А/м коэрциттік күшке сәйкес келеді.

Сол пленкаларды 500°С-да термоөңдеуден кейін коэрциттік күштің қалыңдық тәуелділігі айтарлықтай өзгереді. Темір-кремний қабатының қалыңдығы 0,1-ден 0,3 мкм-ге дейін ұлғайған кезде коэрциттік күш 130-дан 60 А/м-ге дейін тез төмендейді және қалыңдықтың 0,8 мкм-ге дейін одан әрі ұлғаюы ғана оның шамалы өсуіне әкеледі. Тұтастай алғанда, қаралып отырған пленкалардың коэрциттік күші термоөңдеуден кейін ұлғаяды. Бұл ретте қалыңдығы 0,6 мкм-ден асатын темір-кремний қабаты бар FeSi/NiFe пленкаларын термоөңдеу кезінде коэрцитивтік күшке әсер етпейді. Алайда, темір-кремний қабатының өзгеріссіз қалыңдығы кезінде 500°С-да термоөңдеуге ұшыраған FeSi/NiFe пленкаларының коэрциттік күші пермаллон қабатының қалыңдығына байланысты болады. NiFe қабатының қалыңдығы 0-ден 0,1 мкм-ге дейін ұлғайған кезде коэрциттік күш шамамен 15-тен 130 А/м-ге дейін ұлғаяды және қалыңдығы одан әрі 0,2 мкм-ге дейін ұлғайған кезде ол шамамен 10 А/м-ге азаяды. Сонымен қатар, термоөңдеуге ұшырамаған пленкалар үшін коэрциттік күш іс жүзінде пермаллоялық қабат қалыңдығының өсуімен өзгермейді және шамамен 20 А/м-ге тең болып қалады.

Магниттік өткізгіштік көп қабатты FeSi/NiFe пленкалары үшін қалыңдығы темір-кремний және пермаллоның аз қатынасы бар күйдіру температурасының өсуімен біршама күрт төмендейді, бұл никель атомдарының көп қабатты пленкалардың магниттік қасиеттеріне әсер етуімен түсіндіріледі.

Теміронитридті қабаттардың пермаллеомен үйлесімі көп қабатты пленкалардың магнитті жұмсақ қасиеттерін айтарлықтай жақсартады. Мысалы, құрамында теміронитридті (97% Fe, 3% Al) $_{1x}$ N_x және пермаллды (81% Ni, 19% Fe) құрамы бар көп қабатты пленкалар үшін коэрциттік күш 32 А/м-ге тең, ал анизотропия өрісі 240 А/м. Олардың магнитострикциясы 10^{-6} аспайды және қанығудың магниттік индукциясы 2,0 Тл жақындайды.

N/NiFe жұқа қабатты үлгілердің (FeAI) көп қабатты құрылымы FeAl және NiFe материалдарын тозаңдатудың жоғары жиілігінде қалыптасты. FeAl жұқа пленкалы қабаттары 0,3 Па қысымда аргон мен азот газдарының қоспасы атмоферасында (40%), ал пермалло қабаттары - аргон атмосферасында шөгіп қалған.

Зерттеу нәтижелері. Эксперименттік зерттеулердің нәтижелері көрсеткендей, тозаңданған пленкаларда олардың магниттік қасиеттеріне байланысты кристаллографиялық текстура байқалады. Мысалы, азоттың пайыздық мөлшерінің 0-ден 20% -ға дейін артуымен, FeAlN бір қабатты қабыршақтардың кристалды дәндерінің өлшемдері шамамен 20,0-ден 5,0 нм-ге дейін біркелкі азайды. Дифракциялық суретте кристаллографиялық жазықтықты сипаттайтын максимумдар (110) (FeAlN үшін және (111) NiFe үшін және тағы бір әлсіз максимум (200) NiFe үшін тіркелген.

Кристалды дәндердің орташа өлшемі қабатты кезеңнің өсуімен шамамен 9,0-ден 15,0 нм-ге дейін ұлғайды; құрылымы 15-тен 160 нм-ге дейін. Бұл ретте анизотропия өрісі 400-ден 160 А/м-ге дейін азайды, ал коэрциттік күш сәл өсті - 64-тен 96 А/м-ге дейін. Алайда қабатты құрылым кезеңі ұлғайған кезде магнитострикция айтарлықтай азайды.

Қорытынды. FeAlN/NiFe жұқа қабатты үлгілерінің магниттік қасиеттері теміронитридті және пермаллоидті қабаттардың қалыңдығының қатынасына байланысты. Мұндай қатынас 1-ден 23-ке дейін ұлғайған және үлгінің қалыңдығы 0,48 мкм құрайтын өзгеріссіз жалпы қалыңдығы кезінде қанығудың 1,5-тен 2,0 Тл-ге дейінгі магниттік индукциясы және коэрцитивтік күші 24-тен 160 А/м-ге дейін монотонды ұлғаяды. Коэрциттік күш жеңіл магниттелу білігі бойымен өлшенді. Коэрциттік күштің өзгеруінің сипаты ауыр магниттелу осі бойымен де байқалды, ол қарастырылып отырған барлық қатынас қалыңдығы жеңіл магниттелу бағытына қарағанда шамамен 40 А/м кем. FeAlN/NiFe үлгілері үшін анизотропия өрісі максималды және 5-ке тең теміронитридті және пермаллоидті қабаттар қалыңдығының қатынасы үшін 200 А/м құрайды.

Осылайша, пермалло қабаты бар жұқа балқыма материалдары аз коэрциттік күшпен және қанығу магниттікстрикциясымен жеткілікті түрде үлкен қанығу магниттік индукциясына ие, бұл магниттік жұмсақ материалдан жасалған элементтерді қамтитын түрлендіргіштерді әзірлеу кезінде іс жүзінде қызығушылық тудырады.

ПАЙДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР

1. Аблова М. С., Мелких Б. Т. Электр қасиеттері және ауыстырып қосу әсері//Шынының физикасы және химиясы. - 1993. - Т. 16. - С. 95.

2. Бондаренко Б. И., Шаповалов В.А., Гармаш Н. И. Кокссыз металлургия теориясы мен технологиясы/Под. ред. Б. И. Бондаренко. Киев: Навуковтың ойы, 2003. 506 с.

3. Дерябин В. А., Власова С. Г., Фарапонтова Е. П. Шаңданған ауаны тазарту және өнеркәсіптік шығарындыларды тарату. Екатеринбург: ГОУ УПИ, 2006. 56 с.

4. Дигонский С. В. Металл қорытпасының теориялық негіздері мен технологиясы. Санкт-Петербург: Наука, 2007. 322 с.

5. Дринберг, С. А. Лак-бояу материалдарына арналған еріткіштер / С. А. Дринберг, Э. Ф. Ицко. – Ленинград: Химия, 1986. – 208 с.

6. Карпенков С.Х. Қазіргі заманғы түрлендіргіштер мен ақпарат жинақтаушылар. - М.: Логос, 2004. - 344 с.

7. Кукуй Д. М., Емельянович И. В., Петровский В. П., Ровин Л. Е., Ровин С. Л. Металл жоңқаларын кәдеге жарату тәжірибесі//Құю және металлургия. 2009. № 1. С. 47–50.

8. Кричевский, Г. Е. Бояғыштарды бекітудің теориялық негіздері: оқу құралы / Г. Е. Кричевский. – Москва: Московский текстильный ин-ты, 1978. – 44 с.

9. Лившиц, М. Л. Лактар мен бояулар өндірісін техникалық талдау және бақылау / М. Л. Лившиц. – Москва : Жоғары мектебі , 1987. – 264 с.

10. Логанина, В. И. Құрылыс бұйымдары мен конструкцияларын бояу құрамдарымен өңдеу сапасы / В. И. Логанина, Л. П. Орентлихер. – Москва : АСВ, 2002. – 144 с.

11. Матюхин П.В., Павленко З.В., Карнаухов А.В., Черкашина Н.И. Құрамында радиациялық қорғау темірі бар материалдарға электрондық сәулеленудің әсері //қолданбалы және іргелі зерттеулердің халықаралық журналы. 2015. № 12-6. с. 970-973.

12. Платонов, А.П. Майсыздандыру станциялары мен жылу электр орталықтарының бейорганикалық қалдықтарынан құрылыс пигменттерін дайындау / А. П. Платонов, А. А. Трутнѐв, С. Г. Ковчур // Хабаршы ВГТУ. – 2011. – № 20. – С. 153-159.

13. Юсфиню С., Гиммельфарб А.А., Пашков Н.Ф. Металл алудың жаңа процестері (желе металлургиясы). М.: Металлургия, 1994. 320 с.

14..Wen Q.Y et al.Giant Magnetoresistance, Microstructure and Application Charactertics of Amorphous CoNbZr-Based Preudo volves //IEEE Trans. Magn.2006.V.42.-P.1634-1637.

15.. Mott N. F. Conduction in glasses contacting transition metal ions // J. Non – Crystalline Solids. 1988. - v. 1. - № 1. - p. 1 - 17.

REFERENCES

1. Ablova M.S., Malykh B.T. Electrical properties and switching effect//Physics and chemistry of glass. - 1993. - T. 16. - P. 95.

2. Bondarenko B.I., Shapovalov V.A., Garmash N.I. Theory and technology of coke-free metallurgy/Pod. ed. B.I. Bondarenko. Kyiv: Navukova dumka, 2003. 506 pp.

3. Deribandn V.A., Vlasova S. G., Farapontov E. P. Purification of dusty air and dispersion of industrial emissions. Yekaterinburg: GOU UPI, 2006. 56 pp.

4. Dndgonsk S.V. Theoretical foundations and technology of reductive melting of metals from unoccupied rye. St. Petersburg: Science, 2007. 322 pp.

5. Drinberg, S. A. Solvents for paints and varnishes/S. A. Drinberg, E. F. Itsko. - Leningrad: Chemistry, 1986. - 208 p.

6. Karpenkov S.Kh. Modern converters and information storage devices. - M.: Logos, 2004. - 344 P.

7. Kyyyyyy D. M., Emellynov I.V., Petrovskii V. P., Rovin L. E., Rovin S. L. Experience in the disposal of metal chips//Casting and metallurgy. 2009. № 1. P. 47-50.

8. Krichevsky, G.E. Theoretical foundations of dye fixation: a textbook/G.E. Krichevsky. - Moscow: Moscow Textile Institute, 1978. - 44 p.

9. Livshits, M. L. Technical analysis and control of the production of varnishes and paints/M. L. Livshits. - Moscow: Higher School, 1987. - 264 s.

10. Loganina, V.I. Quality of finishing building products and structures with colorful compositions/V.I. Loganina, L.P. Orentlicher. - Moscow: DIA, 2002. - 144 p.

11. Matyukhin P.V., Pavlenko Z.V., Karnaukhov A.V., Cherkashina N.I. impact of electronic radiation on radiation-protective iron-containing materials//International Journal of Applied and Fundamental Research. 2015. № 12-6. from. 970-973.

12. Platonov, A.P. Production of construction pigments from inorganic waste from iron removal stations and power plants/A.P. Platonov, A.A. Trutniv, S.G. Kovchur//Bulletin of VSTU. – 2011. – № 20. - p. 153-159.

13. Yusfino N.S., Gimelfarb A. A., Pawkoin N. F. New processes for the production of metal (metallurgy of jelly for). M.: Metallurgy, 1994. 320 p.

14.Wen Q.Y et al.Giant Magnetoresistance, Microstructure and Application Charactertics of Amorphous CoNbZr-Based Preudo volves //IEEE Trans. Magn.2006.V.42.-P.1634-1637.

15. Mott N. F. Conduction in glasses contacting transition metal ions // J. Non – Crystalline Solids. 1988. - v. 1. - № 1. - p. 1 - 17.

РЕЗЮМЕ

Магнитные свойства тонкостенных образцов FeAIN/NiFe зависят от соотношения толщины железонитридных и пермаллоидных слоев. Такое соотношение увеличивается

от 1 до 23 и при неизменной общей толщине образца, толщина которого составляет 0,48 мкм, магнитная индукция насыщения от 1,5 до 2,0 Тл и коэрцитивная сила монотонно увеличиваются от 24 до 160 А/м. Коэрцитная сила измерялась по оси легкого намагничивания. Характер изменения коэрцитной силы наблюдался и по оси тяжелой намагниченности, которая примерно на 40 А/м меньше толщины всего рассматриваемого сообщения, чем направление легкой намагниченности. Для образцов FeAlN/NiFe поле анизотропии составляет 200 А/м для максимального и равного 5 отношения толщины железонитридных и пермаллоидных слоев.

Таким образом, тонкие плавильные материалы с слоем пермалло обладают достаточно большой насыщенной магнитной индукцией с малой коэрцитной силой и насыщенным магнитострикцией , что практически представляет интерес при разработке преобразователей, содержащих элементы из магнитного мягкого материала. На основании рассмотренных экспериментальных результатов содержание кобальта, равное 2,8% (ат.) для многослойных оболочек, при оптимальном времени плазменной обработки B_s = 2,0 Тл на относительно высокую индукцию магнитного насыщения FeCo/FeCoN (5-7 с) и относительно ниже Коэрцитивная сила H_c = 120 А/м. Магнитная проводимость этих пленок относительно высока (более 2200) и не изменяется при увеличении частоты до 20 МГц.

УДК 621.865.8
МРНТИ 50.10.35;65.13.13

Сатыбаева Н.А., старший преподаватель, https://orcid.org/0000-0002-5566-9233
НАО «Западно-Казахстанский аграрно-технический университет имени Жангир хана», 090009, ул. Жангир хана, 51, г. Уральск, Республика Казахстан, Satybaeva_nur@mail.ru
Жексенбаев Д.Е., старший мастер
ТОО «Уральский трансформаторный завод», ул. Есенжанова 42, г. Уральск, Республика Казахстан, sales@uraltrafo.kz

Satybayeva N.A., Senior Lecturer, https://orcid.org/0000-0002-5566-9233
NJSC«West Kazakhstan Agrarian and Technical University named after Zhangir Khan», Uralsk, st.Zhangir khan 51,090009, Kazakhstan, Satybaeva_nur@mail.ru
Zheksenbaev D.E., Senior foreman Ural Transformer Plant LLP, 42 Esenzhanova St., Uralsk, Republic of Kazakhstan. sales@uraltrafo.kz

ТЕХНОЛОГИИ 3D-ПЕЧАТИ
3D PRINTING TECHNOLOGY

АННОТАЦИЯ

В представленной статье проводится сравнительный анализ двух моделей 3D-принтеров, функционирующих на основе технологий аддитивного производства. Основное внимание уделяется их конструктивным особенностям, техническим возможностям и области применения, особенно в контексте трёхмерной печати, направленной на развитие пищевой и промышленной отраслей. Отмечается высокая эффективность использования данных устройств при создании сложных форм, прототипов и конечной продукции, а также их потенциал в оптимизации производственных процессов за счёт снижения затрат и сокращения сроков изготовления.

Актуальность темы обусловлена растущим интересом к цифровым и интеллектуальным технологиям, способным трансформировать традиционные подходы

к производству. Рассматриваются примеры использования 3D-печати в пищевой промышленности - от создания индивидуальных рецептур и форм до разработки упаковки с заданными параметрами. Также подчёркивается её значение в промышленном секторе - в производстве деталей, сборочных узлов и элементов оборудования.

Особое внимание авторы уделяют необходимости развития данной технологии на территории Республики Казахстан. Отмечается, что активное внедрение аддитивных технологий требует поддержки со стороны государства, стимулирования инновационной среды, а также инвестиций в научные исследования и техническое образование. Подчёркивается важность формирования междисциплинарной команды специалистов и внедрения соответствующих учебных программ, способствующих подготовке профессиональных кадров. Развитие 3D-печати рассматривается как ключевой элемент в стратегии повышения конкурентоспособности страны в глобальном рынке.

ANNOTATION

This article presents a comparative analysis of two 3D printer models operating based on additive manufacturing technologies. The focus is placed on their structural features, technical capabilities, and areas of application, particularly in the context of three-dimensional printing aimed at advancing the food and industrial sectors. The study highlights the high efficiency of these devices in creating complex shapes, prototypes, and final products, as well as their potential to optimize production processes by reducing costs and shortening manufacturing timelines.

The relevance of the topic is driven by the growing interest in digital and intelligent technologies capable of transforming traditional manufacturing approaches. Examples of 3D printing applications in the food industry are explored — from creating customized recipes and forms to developing packaging with specific parameters. Its importance in the industrial sector is also noted, including the production of parts, assemblies, and equipment components.

Special attention is given to the need for developing this technology within the Republic of Kazakhstan. The article emphasizes that the active implementation of additive technologies requires state support, the stimulation of an innovation-friendly environment, and investment in scientific research and technical education. The importance of forming interdisciplinary teams and implementing relevant educational programs to train qualified specialists is underlined. The development of 3D printing is viewed as a key element in the strategy to enhance the country's global competitiveness.

Ключевые слова: *3D-печать;аддитивные технологии; новые технологии;; подготовка кадров, научно-техническая политика,коды.*

Keywords: *3Dprinting,additivetechnologies;;newtechnologies;; staff training,scientific and technical policy.*

Введение. 3D-принтер — это прибор, с помощью которого можно создавать реальные пространственные объекты из различных материалов. Существуют такие материалы. Рассмотрим 3Д принтер марки «da Vinci1.0 Pro».

Таблица 1 - Технические характеристики

Печать	Послойное наплавление	Вес	26 кг	
Размер области печати	20 х 20 х 20 см	Материал печати	АБС-и ПЛ	А-пластик

Разрешение печати	0,1; 0,2; 0,3; 0,4 мм	Диаметр нити	1,75 мм	
Дисплей	2,6-дюймовый, LCM	Диаметр сопла	0,4 мм	
Способ подключения	USB 2.0, WiFi	Операционная система	Как миним Как миним	ум Windows 7 ум Mac OSX 10.8
ПО для печати	XYZware Pro	Формат файлов	,3w, .stl	



Рисунок 1 - Принтер 3Д марки «da Vinci1.0 Pro»

A-Импорт файлов .stl, .3w

B-Преобразование файла в формат .3w

C-Сохранение файла .stl

D-Настройка параметров печати, вывод файла на печать

E-Выбор языка интерфейса приложения и предварительного цвета

F-Справка, поиск обновлений приложения и прошивки, переход на официальный веб-сайт

G-Регулировка масштаба отображения

H-Быстрое переключение ракурса предварительного просмотра

I-Перемещение модели

J-Поворот модели

K-Изменение размера модели

L-Просмотр сведений о модели

M-Удаление модели с виртуальной платформы

N-Просмотр температуры принтера,сведений о нити и прогресса печати

Основные процедуры

Материалы и методы исследования. Для вывода файлов на печать подключите принтер к компьютеру посредством кабеля USB и установите на компьютер приложение XYZware Pro.

Открыв приложение, нажмите кнопку «Import» (Импорт), чтобы выбрать файл модели, которую требуется распечатать, и загрузить его.

Можно изменить соответствующие настройки с помощью функции «File Converjsion» (Преобразование файла) для достижения требуемой скорости печати и необходимого эффекта. Задав требуемый размер, положение и ориентацию модели, можно настроить параметры печати, такие как скорость и толщина слоя, нажав кнопку «Export» (Экспорт). Нажмите кнопку «Export» (Экспорт), чтобы разделить файл на слои. После разделения модели на слои нажмите кнопку «Print» (Печать), чтобы вывести файл на печать. На этом принтере мы использовали белый глянцевый филамент марки ABC-ПЛА-пластик.

Второй принтер «WANHAO Duplicator 4»

Таблица 2 - Характеристики 3D-принтера «WANHAO Duplicator 4»

Назначение	**Персональный**
Технология печати	Моделирование методом наплавления (FDM/FFF)
Количество печатающих головок	1
Область построения, мм	225x145x150
Скорость печати	40 мм/с
Платформа	С подогревом
Дисплей	да
Типы материалов	Пластик
Материалы	ABS-пластик PLA-пластик



Рисунок 2 - 3D-принтер «WANHAO Duplicator 4»

Технологии 3D-печати

Имеется несколько десятков технологий 3D-печати, которые могут отличаются друг от друга по типу, материалу и современным способам нанесения. Большое распростронение получилитехнологии как, лазерное спекание порошковыхматериалов; стереолитография; послойнаяпечать расплавленной полимерной нитью; технология струйного моделирования, ламинированиелистовыхматериалов; УФ-облучение через фотомаску, технология склеивания порошков, цветная3D-печать.

Эта технология поможет обеспечить низкую себестоимость и надежность выпускаемых изделий.



Рисунок 3 - Подставка для телефона выполненая на принтере №2



Рисунок 4 - Изделия выполненые на принтере №2



Рисунок 5 - Изделия 1-принтер2, а 2 изделие принтер 1 для сравнение

Результаты исследования. WANHAO Duplicator 4 является усовершенствованным вариантом трехмерного принтера Duplicator 3, оптимизированным для использования пластика PLA. Устройство оснащено двойным экструдером, созданным с нуля под нити диметром 1,75мм. Принтер печатает объекты размером 225x145x150мм при общих габаритах 320x466x382мм. Толщина наносимого слоя составляет от 100 до 500мкм. Устройство позволяет печатать с карты памяти SD для предотвращения возможных сбоев при передаче данных. К сожалению, готовым для печати «прямо из коробки» Duplicator 4 назвать нельзя. Так как термодатчики могут выдавать неточные показания, температуру экструзии придется регулировать более-менее опытным путем. То же касается и температуры рабочей платформы – на заводских настройках она может быть слишком велика (максимальная температура достигает 120°C). При печати же малых деталей рекомендуется понизить скорость печати. С одной стороны, высокая скорость хороша для экономии времени, но в случае с маленькими деталями слои могут не успеть застыть, что приведет к такому результату: Опять-таки, найти правильный баланс скорости и температуры подогрева и экструзии придется экспериментальным путем. Но при должном терпении, Duplicator 4 все же наградит вас моделями хорошего качества, вполне на уровне своих американских собратьев.

Несомненным достоинством является наличие SD кард-ридера. Автономная печать позволяет не волноваться о сбоях печати, возникающих при зависании или даже при притормаживании компьютера. Хотя, желающие могут осуществлять печать и напрямую с помощью USB интерфейса.

Есть множество необычных применений 3D-печати, таких как изготовление театрального реквизита, производство ювелирных, сувенирных изделий изготовление инструмента для армии для ремонта техники в полевых условиях, и т.д.

Нужно заметить, что освоение технологии 3D-печати учащимися при соответствующем оснащении наших лабораторий образовательных учреждений дизайнерских или конструкторских специальностей такими принтерами, несомненно, будет способствовать и развивать, не только повышению эффек- тивности процесса в образовании,но и внедрению этих новых технологий в производственные и учебные процессы, а также разработку новых изделий для промышленности РК.

Широкое внедрение 3D-печати ставит перед обществом ряд вопросов,требующих свое решение.

Процесс этот зависит от детализации модели и выбранных настроек. Принтер так же имеет и недостатки, модель надо выбирать таким образом, что бы не было сильно выступающих элементов, иначе они будут печататься в воздухе. поэтому Далеко не каждый скачанный из интернета объект можно напечатать сразу и без подготовки. Вполне возможно что где-то понадобятся специальные подпорки, которые потом придется отпиливать, хорошо что можно автоматически расставить в программе, отметив специальный пункт саппорт. Длительность печати зависит от количества слоёв и габаритов, модель при этом точно не получится хотя и принтер и программа показывает расчётное время. Может оказаться что предмет который должен был печататься по прогнозам часов 5, будет готов скажем через полтора, всё это время владельцу придется терпеть шум и запах плавленной пластмассы. Так что лучше заранее позаботиться о вентиляции. Готовый напечатанный объект можно отшлифовать наждачной бумагой и покрасить, или заранее использовать картридж с цветным пластиком.

Заключение. Эксперименты проведенные на практике,показали возможность распечатывания боеспособные экземпляры огнестрельного оружия в домашних условиях. При сравнении двух принтеров предпочтение отдаем второму принтеру, потому что готовые изделия очень сильно отличаются качеством, а также внешним

дизайном. Второй вопрос может каснуться соблюдения авторских прав, поскольку печать позволяет воспроизвести, как отдельные произведения искусства, также образцы продукции, защищенные патентами. Без сомнения, возникнут и другие наболевшие проблемы, которые сообществу предстоит решать с технологией, при внедрении любой технологии максимального масштаба.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Большаков, В. 3D-моделирование в AutoCAD, КОМПАС-3D, SolidWorks, Inventor, T-Flex / В. Большаков, А. Бочков, А. Сергеев. - М.: Книга по Требованию, 2018. - 336 с.
2. Зеньковский, В. А. 3D моделирование на базе Vue xStream (+ DVD-ROM) / В.А. Зеньковский. - М.: Форум, Инфра-М**,** 2017. - 384 с.
3. Кононыхин, Андрей 3D-МОДЕЛИРОВАНИЕ / Андрей Кононыхин. - М.: LAP Lambert Academic Publishing, 2021. - 176 с.
4. Кулагин, Б.Ю. Актуальное моделирование, визуализация и анимация в 3ds Max 7.5 (+ CD-ROM) / Б.Ю. Кулагин. - М.: БХВ-Петербург, 2021**.** - 795 с.
5. Информационные технологии: учебник для студ. вузов / А. Г. Схиртладзе [и др.]. - М. : Издательский центр "Академия", 2015. - 288 с.
6. Прохорский,Г.В. Информационные технологии в архитектуре и строительстве. - М.: КНОРУС, 2012
7. Кидрук, М.И.: Компас-3D V9. - СПб.: Питер, 2007
8. Пекарев, Л. Архитектурное моделирование в 3ds Max / Л. Пекарев. - СПб.: BHV, 2007. - 256 с..
9. Сазонов, А.А. 3D-моделирование в AutoCAD: Самоучитель / А.А. Сазонов. - М.: ДМК, 2012. - 376 с.
10. Трубочкина, Н.К. Моделирование 3D-наносхемотехники / Н.К. Трубочкина. - М.: Бином. Лаборатория знаний, 2012. - 499 с.
11. Аббасов, И.Б. Двухмерное и трехмерное моделирование в 3ds MAX / И.Б. Аббасов. - М.: ДМК, 2012. - 176 с.
12. Зеньковский, В.А. 3D моделирование на базе Vue xStream: Учебное пособие / В.А. Зеньковский. - М.: ИД Форум, НИЦ Инфра-М, 2013. - 384 с.
13. Орлов А. Видеосамоучитель. AutoCAD 2009. - СПб.: Питер, 2008
14. Бондаренко, В. Плагины для 3D Studio MAX 5 / В. Бондаренко. - М.: Солон-Пресс, 2015. - 291 с.
15. Никитина, И. П. Моделирование несущей системы станка с использованием 3D-принтера Dimension Elite / И.П. Никитина. - М.: Бибком, 2013. - 200 с.

REFERENCES

1. Bolshakov, V. 3D modeling in AutoCAD, COMPASS-3D, SolidWorks, Inventor, T-Flex / V. Bolshakov, A. Bochkov, A. Sergeev. - M.: Book on Demand, 2018. - 336 p.
2. Zenkovsky, V. A. 3D modeling based on Vue XStream (+ DVD-ROM) / V.A. Zenkovsky. Moscow: Forum, Infra-M, 2017. 384 p.
3. Kononikhin, Andrey 3D MODELING / Andrey Kononikhin. - M.: LAP Lambert Academic Publishing, 2021. - 176 p.
4. Kulagin, B.Y. Actual modeling, visualization and animation in 3ds Max 7.5 (+ CD-ROM) / B.Y. Kulagin. - M.: BHV-Petersburg, 2021. - 795 p.
5. Petelin, Alexander Yuryevich. 3D modeling in Sketch Up 2015 - from simple to complex. Self-instruction / Petelin, Alexander Yuryevich. Moscow: DMK Press, 2015. 287 p.
6. Prokhorsky G.V.: Information technologies in architecture and construction. Moscow: KNORUS, 2012
7. Kidruk M.I.: Compass-3D V9. – St. Petersburg: Peter, 2007

8. Pekarev, L. Architectural modeling in 3ds Max / L. Pekarev. Saint Petersburg: BHV, 2007. 256 p.
9. Sazonov, A.A. 3D modeling in AutoCAD: A tutorial / A.A. Sazonov. Moscow: DMK, 2012. 376 p.
10. Trubochkina, N.K. Modeling of 3D nanocircuits / N.K. Trubochkina, Moscow: Binom. Laboratory of Knowledge, 2012. - 499 p.
11. Abbasov, I. B. 3ds MAX two-dimensional and three-dimensional modeling / I. B. Abbasov. - M.: WPC, 2012. - 176 c.
12. Zenkovsky, V. A. 3D modeling based on Vue xStream: a tutorial / V. A. Zenkovsky. - M.: AIT forum, NCE Infra-M, 2013. - 384 c.
13. Orlov A.: Video Tutorial. AutoCAD 2009. - St. Petersburg.: Peter, 2008
14. Bondarenko, V. plugins for 3D Studio Max 5 / V. Bondarenko. - M.: Solon Press, 2015. - 291 c.
15. Nikitina, I. P. modeling of the load-bearing system of the machine using the Dimension elite 3D printer / I. P. Nikitin. - M.: Bibcom, 2013. - 200 c.

ТҮЙІН

Бұл мақалада аддитивті өндіріс технологиялары негізінде жұмыс істейтін екі түрлі 3D-принтердің салыстырмалы талдауы ұсынылған. Негізгі назар олардың құрылымдық ерекшеліктеріне, техникалық мүмкіндіктеріне және қолдану салаларына, әсіресе тамақ және өнеркәсіптік салаларда үшөлшемді басып шығару технологияларын дамытуға бағытталған қолданысына аударылған. Бұл құрылғылардың күрделі пішіндерді, прототиптер мен дайын өнімдерді жасау тиімділігі жоғары екені және өндірістік процестерді оңтайландыруға, шығындарды азайтуға және дайындау мерзімдерін қысқартуға мүмкіндік беретіні атап өтілген.

Тақырыптың өзектілігі дәстүрлі өндіріс тәсілдерін трансформациялауға қабілетті цифрлық және интеллектуалды технологияларға деген қызығушылықтың артуымен байланысты. Мақалада 3D-басып шығару технологиясының тағам өндірісінде — жеке рецептуралар мен пішіндерді жасау, сондай-ақ арнайы сипаттамалары бар қаптамаларды жобалау сияқты қолданыс мысалдары қарастырылған. Сонымен қатар, бұл технологияның өнеркәсіп саласында — бөлшектерді, құрастыру элементтерін және жабдық компоненттерін шығарудағы маңыздылығы да атап өтіледі.

Авторлар бұл технологияны Қазақстан Республикасында дамыту қажеттілігіне ерекше назар аударады. Аддитивті технологияларды белсенді енгізу үшін мемлекеттік қолдау, инновациялық орта қалыптастыру және ғылыми зерттеулер мен техникалық білімге инвестиция тарту қажет екендігі көрсетілген. Білікті мамандарды даярлау үшін пәнаралық командалар құру және тиісті білім беру бағдарламаларын енгізудің маңыздылығы да атап өтіледі. 3D-басып шығару технологиясын дамыту елдің жаһандық нарықтағы бәсекеге қабілеттілігін арттыру стратегиясының маңызды бөлігі ретінде қарастырылады.

УДК 69.051
МРНТИ 67.23.15

Мухаметзянов Зинур Ришатович, https://orcid.org/0000-0002-6668-9846
ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический университет», 450064 г. Уфа, Республика Башкортостан, ул. Космонавтов, 1, Российская Федерация, zinur-1966@mail.ru
Мухамбетжан Зерек Еркинулы

НАО «Западно-Казахстанский аграрно-технический университет имени Жангир хана», 090009, Республика Казахстан, г. Уральск, ул. Жангир хана, 51, zerek-wkau@yandex.ru

Mukhametzyanov Zinur Rishatovich, https://orcid.org/0009-0006-8577-5818
Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education "Ufa State Petroleum Technological University", 450064 Ufa, Republic of Bashkortostan, Kosmonavtov St., 1, Russian Federation, zinur-1966@mail.ru
Mukhambetzhan Zerek Erkinuly
NAO "West Kazakhstan Agrarian and Technical University named after Zhangir Khan", 090009, Republic of Kazakhstan, Uralsk, Zhangir Khan St., 51, zerek-wkau@yandex.ru

РАЗВИТИЕ ЦИФРОВЫХ МОДЕЛЕЙ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ

DEVELOPMENT OF DIGITAL MODELS FOR ORGANIZATIONAL AND TECHNOLOGICAL PREPARATION OF INDUSTRIAL FACILITIES

АННОТАЦИЯ

Текущее состояние строительного производства характеризуется сложной структурой и условиями разработки организационно-технологических решений, направленных на координацию деятельности ключевых участников процесса. Недостаточная подготовка к строительству может привести к задержкам в завершении и сдаче объектов, увеличению затрат и себестоимости строительства, а также снижению функционального качества строительной продукции. Основная цель данного исследования заключается в анализе факторов, влияющих на формирование организационно-технологических решений при подготовке строительства промышленных объектов. Ключевым результатом работы является разработка алгоритма создания и интеграции модели организационно-технологических решений в общую цифровую модель промышленного объекта. В статье рассматриваются особенности организации процессов и развития среды информационного моделирования, охватывающей свойства и состояния (глобальную цифровую модель) ключевых этапов жизненного цикла промышленных объектов. Установлено, что современные информационные технологии в основном ориентированы на решение проектных задач (архитектурно-строительных, конструктивных, функционально-технологических). В связи с этим перспективным направлением является разработка цифровых моделей для последующих этапов жизненного цикла, включая моделирование организационно-технологических решений по подготовке строительства. Это позволит расширить потенциал глобальной цифровой модели, отражающей особенности свойств и состояний конкретного промышленного объекта.

ANNOTATION

The current state of construction production is characterized by a complex structure and conditions for the development of organizational and technological solutions aimed at coordinating the activities of key participants in the process. Insufficient preparation for construction can lead to delays in the completion and delivery of facilities, increased costs and cost of construction, as well as a decrease in the functional quality of construction products. The main objective of this study is to analyze the factors influencing the formation of organizational and technological solutions in the preparation for the construction of industrial facilities. The key result of the work is the development of an algorithm for creating and integrating a model of organizational and technological solutions into a general digital model of an industrial facility. The article discusses the features of organizing processes and

developing an information modeling environment that covers the properties and states (global digital model) of key stages of the life cycle of industrial facilities. It has been established that modern information technologies are mainly focused on solving design problems (architectural and construction, structural, functional and technological). In this regard, a promising direction is the development of digital models for subsequent stages of the life cycle, including modeling of organizational and technological solutions for preparing for construction. This will expand the potential of the global digital model, reflecting the characteristics of the properties and conditions of a specific industrial facility.

Ключевые слова: *строительное производство, организационно-технологические решения, цифровая модель, жизненный цикл, интеграция моделей*.

Key words: *construction production, organizational and technological solutions, digital model, life cycle, model integration*.

Промышленные строительные объекты и технологические (производственные) линии представляют собой ключевые структурные элементы современной системы материального производства, включающей промышленные предприятия и реальный сектор экономики. Промышленное предприятие (комплекс) представляет собой совокупность оборудования, производственных средств, а также зданий и сооружений основного и вспомогательного назначения, используемых для выпуска продукции определённой отраслевой специализации [1,2].

Производственные здания и сооружения обладают разнообразными типологическими характеристиками, которые определяют их функционально-технологические, конструктивные и архитектурно-художественные особенности.

Функциональные связи и технологические процессы играют ключевую роль в формировании объемно-пространственной структуры, конструктивных решений и визуального облика современных промышленных объектов. Функция остаётся основополагающим фактором в проектировании зданий и сооружений как основного, так и вспомогательного производственного назначения в рамках архитектурного и градостроительного планирования [3,4].

Современные технологии, инновационные материалы и технические возможности способствуют созданию новых и модернизации существующих промышленных объектов, расширяя их конструктивные и эстетические возможности. Применение различных конструктивных систем позволяет адаптировать и изменять формы, а также оптимизировать условия организации функционально-технологических процессов.

Для большинства промышленных объектов устанавливаются строгие требования к промышленной безопасности, обеспечивающей надёжное выполнение технологических процессов. С целью повышения уровня безопасности и эффективности их функционирования, такие объекты чаще всего располагаются в специализированных градостроительных образованиях — промышленных узлах и зонах [5].

Функционирование промышленных объектов и зон обусловлено сложным и многообразным составом ресурсов, а также развитой системой сетей, каналов и коммуникаций для их снабжения из городской среды. Взаимозависимость между промышленными зонами и непроизводственными функционально-территориальными образованиями города (жилыми, общественными, рекреационными и другими) проявляется в их зависимости от состояния и эффективности работы промышленных зон, а также от транспортных систем, обеспечивающих поставку готовой продукции.

Разработка проектных, организационно-технологических решений для подготовки и реализации инвестиционно-строительных проектов промышленных объектов представляет собой сложный процесс, сочетающий синтез различных подходов и компромиссное удовлетворение противоречивых требований к функциональному

качеству строительной продукции. Эти решения учитывают особенности территориального зонирования, пространственной организации городской и ландшафтной среды, а также материально-технические и ресурсные ограничения [6].

Функциональная эффективность промышленных объектов представляет собой комплексную характеристику, формируемую архитектурно-строительными, конструктивными, градостроительными и организационно-технологическими решениями, которые определяют последующие эксплуатационные свойства объекта.

Основные показатели функциональной эффективности промышленных объектов включают [7]:

– качество проектных решений по разработке функционально-технологических схем, параметров технологического оборудования, конструктивных систем, элементов и узлов их соединений;

– уровень проработки организационно-технологических решений подготовки и реализации строительства;

– технологический уровень методов возведения строительных конструкций и установки технологического оборудования.

Наиболее распространённым способом создания промышленных объектов остаётся новое строительство, способствующее развитию промышленной инфраструктуры. Такой подход обеспечивает реализацию инновационных методов, повышающих безопасность функционирования технологического оборудования, внедрение оптимальных конструктивных решений и снижение эксплуатационных затрат, что в совокупности формирует конечные показатели функционального качества промышленных объектов.

Этап строительства является не только результатом предыдущих проектных разработок, направленных на формирование показателей функционального качества, но и отправной точкой для следующего ключевого периода жизненного цикла — эксплуатации. Именно эксплуатация определяет фактические характеристики функциональной и эксплуатационной эффективности капитального объекта (Рисунок 1) [8].



Рисунок 1 - Концепция жизненного цикла формирования показателей функционального качества промышленного объекта [9]

Начальный этап строительства является первым из трёх последовательно выполняемых стадий (подготовительной, основной и завершающей) в рамках периода "Строительство" жизненного цикла промышленного объекта (см. Рисунок 1). Данный этап направлен на практическую подготовку строительного производства и включает организационные и инженерно-технические мероприятия.

Организационная часть подготовки к строительству промышленного объекта охватывает [10]:

– определение условий взаимодействия (заключение договоров) между заказчиком и подрядчиком, обеспечивающих выполнение строительных работ с заданными характеристиками качества;

– установление условий осуществления строительного контроля, включая последовательность выполнения строительных процессов на площадке и мониторинг качества создаваемого объекта;

– подготовку и передачу подрядчику всей необходимой разрешительной и проектной документации по возводимому объекту;

– передачу подрядчику земельного участка, согласование и проведение (при необходимости) землеустроительных, строительных, мелиоративных и иных подготовительных работ, обеспечение стройплощадки временными сооружениями и инженерными сетями (электроснабжение, водоснабжение, теплоснабжение), а также формирование геодезической разбивочной основы;

– оформление необходимой разрешительной, установочной и исполнительной документации для выполнения подготовительных мероприятий.

Инженерно-технический аспект подготовки строительства (строительной площадки) промышленного объекта предполагает выполнение [11,12]:

– комплекса внеплощадочных подготовительных работ, включающих обустройство временных сооружений (зданий и конструкций), подъездных дорог, инженерных коммуникаций и сетей;

– комплекса внутриплощадочных подготовительных мероприятий, охватывающих создание геодезической разбивочной сети, выравнивание территории стройплощадки, возведение временных объектов производственного, складского, хозяйственно-бытового и административного назначения, а также прокладку инженерных сетей и коммуникаций.

На Рисунке 2 представлен укрупнённый фрагмент организационно-технологических решений подготовки строительства промышленного объекта.




Рисунок 2 - Фрагмент состава организационно-технологических решений в отношении инженерно-технической подготовки строительства промышленного объекта

Организационно-технологические решения, относящиеся к инженерно-технической подготовке строительства (см. Рисунок 2), представляют собой сложную комбинацию последовательных и параллельных методов организации строительных работ. Их сложность, особенно в условиях специфических строительных условий, может быть сопоставима с производственными процессами основного этапа строительства [13].

Следовательно, качество разработки этих решений оказывает непосредственное влияние на организацию всех последующих этапов строительства, общую продолжительность строительного производства и функциональные характеристики готового промышленного объекта.

На самых ранних стадиях жизненного цикла промышленного объекта параллельно начинается формирование его цифрового двойника в виде соответствующей информационной модели. Такая цифровая модель становится не просто визуальным представлением объекта, а отражает его ключевые характеристики, свойства и состояния через систему информационных потоков [14,15].

Информация играет все более важную стратегическую роль, становясь одним из ключевых управленческих и проектных ресурсов, наряду с материально-техническими ресурсами. Её создание, обработка и использование формируют основу для эффективного функционирования и развития строительной (инвестиционно-строительной) деятельности. Превращение информационных потоков в ценный ресурс, влияющий на функциональное качество промышленных объектов, становится одним из перспективных направлений современного архитектурно-строительного проектирования.

Разработка проектных и организационно-технологических решений должна учитывать способы применения информационных данных, что требует соответствующих платформ и технологий для создания цифровых продуктов. В этом контексте предметом исследования становится не только физическая структура промышленного объекта с его функциональными, технологическими и типологическими характеристиками, но и его конструктивное, объемно-планировочное и художественное представление в формате цифровой модели.

Одной из ключевых современных концепций, демонстрирующих потенциал цифровых моделей в обеспечении функционального качества и управления свойствами объектов строительства на всех этапах их жизненного цикла, является технология BIM-моделирования (см. Рисунок 3) [16,17].




Рисунок 3 - Особенности информационной платформы (в рамках концепции BIM-моделирования) свойств и состояний промышленных объектов [18].

Одним из наиболее значимых последствий внедрения технологий информационного моделирования в процессы проектирования и обеспечения функционального качества строительных объектов стало утверждение соответствующей нормативно-правовой и методической базы. В частности, был разработан и принят нормативный документ категории СП — «СП 333.1325800.2017. Информационное моделирование в строительстве. Правила формирования информационной модели объектов на различных стадиях жизненного цикла». В актуальной редакции 2020 года этот документ определяет требования к составу и характеристикам данных, которые должны быть включены в цифровую информационную модель строительного объекта на различных этапах его жизненного цикла.

Цифровые модели используются для организации информационных потоков, что позволяет:

– собирать, накапливать и обрабатывать данные, обеспечивая взаимодействие проекта с внешней средой;

– передавать и перераспределять информацию между различными структурными элементами строительного производства и внутренними процессами проекта;

– анализировать, проверять, обновлять и формировать новые информационные потоки, обеспечивая их актуальность как для внутренних, так и для внешних элементов проекта;

– применять проверенные данные для принятия проектных, организационно-технологических и управленческих решений, направленных на достижение целей проекта и обеспечения требуемого качества строительной продукции, включая объекты производственного назначения.

На практике технологии информационного моделирования, реализуемые в рамках BIM-платформ, в большинстве случаев применяются при решении задач, связанных с проектированием функционально-технологических параметров промышленных объектов. Они охватывают этапы эскизного проектирования, разработки проектной и рабочей документации, а также проведения анализа (Рисунки 1 и 3). Внедрение этих технологий стало возможным благодаря усилиям отдельных участников инвестиционно-

строительного процесса, которые опирались на существующую методическую и системотехническую базу автоматизированных систем проектирования (Рисунок 4).




Рисунок 4 - Схема распределения объемов применения технологий BIM-моделирования по этапам жизненного цикла формирования строительной продукции [19]

Анализ данных, представленных на Рисунке 4, показывает, что технологии BIM-моделирования недостаточно активно используются при разработке организационно-технологических решений в строительстве, особенно на этапе инженерной подготовки строительного производства. Изменение этой ситуации открывает новые перспективы как для повышения качества самой цифровой модели (обогащения ее актуальными данными о промышленном объекте), так и для достижения заданных показателей качества строительной продукции в виде завершенного объекта строительства [20].

Интеграция модели организационно-технологических решений в глобальную цифровую модель промышленного объекта, сформированную на предыдущих этапах его жизненного цикла, включает несколько ключевых шагов:

– анализ состава информационных данных, внесенных в модель на стадии «Проектирование»;

– поиск и верификация информационных моделей реализованных промышленных объектов с аналогичными характеристиками;

– исследование доступных организационно-технологических решений;

– адаптация цифровой модели с учетом данных, необходимых для формирования организационно-технологических решений;

– прогнозирование факторов риска, способных привести к отклонениям от запланированных параметров и ухудшению функционального качества объекта;

– разработка комплекса управленческих мер для контроля строительных процессов и достижения проектных целей;

– передача и перераспределение информации о модели организационно-технологических решений между элементами строительного производства и проектной среды;

– актуализация данных, верификация информации и интеграция новых информационных потоков в глобальную цифровую модель промышленного объекта.

Хотя текущие темпы развития строительной отрасли не требуют немедленного и повсеместного внедрения BIM-технологий, в ряде случаев именно инновационные подходы, включая информационное моделирование, становятся наиболее эффективным инструментом обеспечения функционального качества промышленных объектов. Это особенно актуально при разработке организационно-технологических решений для строительства в сложных природно-климатических и градостроительных условиях, а также при возведении уникальных и технологически сложных производственных зданий и сооружений.

Выводы. Формирование функционального качества современных промышленных объектов - это результат комплексного взаимодействия множества участников инвестиционно-строительной деятельности на всех ключевых этапах их жизненного цикла. Достижение требуемых характеристик функционального качества обеспечивается путем разработки сбалансированных решений, учитывающих широкий спектр факторов: функционально-технологических, архитектурно-строительных, градостроительных и организационно-технологических.

Информационное моделирование свойств и состояний промышленных объектов представляет собой цифровой нематериальный продукт, предназначенный для формирования, обработки и преобразования информационных потоков на протяжении всего жизненного цикла строительной продукции.

Широкое применение технологий информационного моделирования (цифровых моделей) объясняется растущей функционально-технологической сложностью объектов, увеличением объемов строительных работ, расширением спектра современных технологических процессов строительства, а также необходимостью эффективной координации между всеми участниками строительного производства.

Интеграция параметров модели организационно-технологических решений в процессы подготовки строительства направлена на повышение качества глобальной цифровой модели промышленного объекта и обеспечение соответствия его свойств и состояний установленным требованиям.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Мухамбетжан З.Е., Мухаметзянов З.Р. Научный, производственно-экономический журнал – Экономика Строительства. Анализ особенностей разработки организационно-технических решений при строительстве промышленных объектов. №2 2022 / 90-99 стр.

2. Дятков С.В., Михеев А.П. Архитектура промышленных зданий. М.: Издательство Ассоциации строительных вузов. 2008. 560 р.

3. Мухамбетжан З.Е., Мухаметзянов З.Р. Вестник Южно-Уральского государственного университета. Особенности формирования вероятностных моделей организационно-технологической последовательности подготовки строительства промышленного объекта. Т.3, №3 2023 / 37-46 стр.

4. Проскурин Г.А. Современные принципы построения промышленных зданий. // Вестник Оренбургского государственного университета. 2011. №9 (128). С.170-177.

5. Иодо И.А., Потаев Г.А. Градостроительство и территориальная планировка. М: Феникс. 2008. 266 с.

6. Keith Hampson, Judy A. Kraatz, Adriana X. Sanchez. R&D Investment and Impact in the Global Construction Industry. New York: Routledge. 2014. 364 p.

7. Мухамбетжан З.Е., Мухаметзянов З.Р. Научный журнал – Перспективы науки. Метод обеспечения устойчивости инженерно-технической подготовки строительства промышленного объекта с применением вероятностной модели. №10(169) 2023 / 63-68 стр.

8. Chris Abel. Architecture, Technology and Process. London: Architectural Press. 2004. 268 p.

9. Лосев К.Ю. Создание и внедрение технологии управления жизненным циклом объектов строительства. // Промышленное и гражданское строительство. 2014. №11. С. 80-83.

10. Ангалев А.М. Организационно-технологические задачи производства при подготовке строительных площадок // Промышленное и гражданское строительство. 2016. № 7. С. 62-67.

11. Douglas D. Gransberg, James E. Koch, Keith R. Molennar. Preparing for Design-Build Projects: A Primer for Owners, Engineers, and Contractors. New York: ASCE Press. 2018. 280 p.

12. Цай Т.Н., Ширшиков Б.Ф., Баетов Б.И. Инженерная подготовка строительного производства. М.: Стройиздат. 1990. 245 с.

13. Z. R. Mukhametzyanov and T. A. Mogucheva Conditions for achieving sustainability of organizational and process solutions in the facilities construction Cite as: AIP Conference Proceedings 2559, 060001 (2022); https://doi.org/10.1063/5.0099132 Published Online: 16 August 2022.

14. Hana Begić, Mario Galić, Zlata Dolaček-Alduk. Digitalization and automation in construction project's life-cycle: a review // Journal of Information Technology in Construction (ITcon). 2022. Volume 27. Pp.441-460.

15. Абрамян С.Г., Бурлаченко О.В., Оганесян О.В., Бурлаченко А.О., Плешаков В.В. Возможности цифровых технологий для каждого этапа жизненного цикла строительной системы // Вестник Волгоградского государственного архитектурно-строительного университета. 2022. №2 (87). С.315-326.

16. Горшков А.М., Железнов С.А., Лемешко Р.А., Пойда С.В. Внедрение BIM технологий в строительство // Alfabuild. 2019. №4 (11). С.70-81.

17. André Borrmann, Markus König, Christian Koch, Jakob Beetz. Building Information Modeling. Technology Foundations and Industry Practice. Zurich: Springer International Publishing AG, 2018. 584 p.

18. BIM как предчувствие. URL: https://rg.ru/2019/06/11/reg-szfo/pochemu-peterburgskie-stroiteli-massovo-neperehodiat-na-bim-tehnologii.html. (дата обращения: 10.10.2022).

19. Цифровизация в строительстве. Рынок BIM в России и мире в 2020 году. URL: https://geoline-tech.com/bim-construction-trends-2020/ (дата обращения: 10.10.2022).

20. Олейник П.П., Бродский В.И. О новых требованиях к организации приемки законченных строительством объектов // Промышленное и гражданское строительство. 2017. №9. С.56-60.

REFERENCES

1. Mukhambetzhan Z.E., Mukhametzyanov Z.R. Scientific, production and economic journal - Construction Economy. Analysis of the features of developing organizational and technical solutions for the construction of industrial facilities. No. 2 2022 / 90-99 p.

2. Dyatkov S.V., Mikheev A.P. Architecture of industrial buildings. Moscow: Publishing house of the Association of construction universities. 2008. 560 p.

3. Mukhambetzhan Z.E., Mukhametzyanov Z.R. Bulletin of the South Ural State University. Features of the formation of probabilistic models of the organizational and technological sequence of preparation for the construction of an industrial facility. V. 3, No. 3 2023 / 37-46 p.

4. Proskurin G.A. Modern principles of constructing industrial buildings. // Bulletin of the Orenburg State University. 2011. No. 9 (128). P. 170-177.

5. Iodo I. A., Potayev G. A. Urban development and territorial planning. Moscow: Phoenix. 2008. 266 p.

6. Keith Hampson, Judy A. Kraatz, Adriana X. Sanchez. R&D Investment and Impact in the Global Construction Industry. New York: Routledge. 2014. 364 p.

7. Mukhambetzhan Z. E., Mukhametzyanov Z. R. Scientific journal – Prospects of Science. Method of ensuring sustainability of engineering and technical preparation for construction of an industrial facility using a probabilistic model. No. 10 (169) 2023 / 63-68 p.

8. Chris Abel. Architecture, Technology and Process. London: Architectural Press. 2004. 268 p.

9. Losev K.Yu. Creation and implementation of technology for managing the life cycle of construction projects. // Industrial and civil engineering. 2014. No. 11. P. 80-83.

10. Angalev A.M. Organizational and technological tasks of production during preparation of construction sites // Industrial and civil engineering. 2016. No. 7. P. 62-67.

11. Douglas D. Gransberg, James E. Koch, Keith R. Molennar. Preparing for Design-Build Projects: A Primer for Owners, Engineers, and Contractors. New York: ASCE Press. 2018. 280 p.

12. Tsai T.N., Shirshchikov B.F., Baetov B.I. Engineering preparation of construction production. Moscow: Stroyizdat. 1990. 245 p.

13. Z. R. Mukhametzyanov and T. A. Mogucheva Conditions for achieving sustainability of organizational and process solutions in the facilities construction Cite as: AIP Conference Proceedings 2559, 060001 (2022); https://doi.org/10.1063/5.0099132 Published Online: August 16, 2022.

14. Hana Begić, Mario Galić, Zlata Dolaček-Alduk. Digitalization and automation in construction project's life-cycle: a review // Journal of Information Technology in Construction (ITcon). 2022. Volume 27. Pp.441-460.

15. Abramyan S.G., Burlachenko O.V., Oganesyan O.V., Burlachenko A.O., Pleshakov V.V. Possibilities of digital technologies for each stage of the life cycle of a construction system // Bulletin of the Volgograd State University of Architecture and Civil Engineering. 2022. No. 2 (87). P. 315-326.

16. Gorshkov A.M., Zheleznov S.A., Lemeshko R.A., Poyda S.V. Implementation of BIM technologies in construction // Alfabuild. 2019. No. 4 (11). P. 70-81.

17. André Borrmann, Markus König, Christian Koch, Jakob Beetz. Building Information Modeling. Technology Foundations and Industry Practice. Zurich: Springer International Publishing AG, 2018. 584 p.

18. BIM as a Premonition. URL: https://rg.ru/2019/06/11/reg-szfo/pochemu-peterburgskie-stroiteli-massovo-neperehodiat-na-bim-tehnologii.html. (Accessed: 10.10.2022).

19. Digitalization in construction. BIM market in Russia and the world in 2020. URL: https://geoline-tech.com/bim-construction-trends-2020/ (Accessed: 10.10.2022).

20. Oleynik P.P., Brodsky V.I. On new requirements for the organization of acceptance of completed construction projects // Industrial and civil engineering. 2017. No. 9. P. 56-60.

ТҮЙІН

Құрылыс өндірісінің қазіргі жағдайы күрделі құрылыммен және процестің негізгі қатысушыларының қызметін үйлестіруге бағытталған ұйымдық-технологиялық шешімдерді әзірлеу шарттарымен сипатталады. Құрылысқа жеткіліксіз дайындық объектілердің аяқталуы мен тапсырылуының кешігуіне, құрылыстың құны мен құнының өсуіне, сонымен қатар құрылыс өнімдерінің функционалдық сапасының төмендеуіне

әкелуі мүмкін. Бұл зерттеудің негізгі мақсаты өндірістік объектілерді салуға дайындық кезінде ұйымдық-технологиялық шешімдерді қалыптастыруға әсер ететін факторларды талдау болып табылады. Жұмыстың негізгі нәтижесі өндірістік нысанның жалпы цифрлық моделіне ұйымдастырушылық-технологиялық шешімдер моделін құру және біріктіру алгоритмін жасау болып табылады. Мақалада өнеркәсіптік объектілердің өмірлік циклінің негізгі кезеңдерінің қасиеттері мен күйлерін (жаһандық цифрлық модель) қамтитын процестерді ұйымдастыру және ақпараттық модельдеу ортасын әзірлеу ерекшеліктері қарастырылады. Қазіргі ақпараттық технологиялар негізінен жобалау мәселелерін (сәулет-құрылыс, құрылымдық, функционалдық және технологиялық) шешуге бағытталғаны анықталды. Осыған байланысты, құрылысқа дайындықтың ұйымдастырушылық және технологиялық шешімдерін үлгілеуді қоса алғанда, өмірлік циклдің келесі кезеңдері үшін цифрлық модельдерді әзірлеу перспективалы бағыт болып табылады. Бұл нақты өнеркәсіптік нысанның қасиеттері мен жағдайларының сипаттамаларын көрсететін жаһандық цифрлық модельдің әлеуетін кеңейтуге мүмкіндік береді.

ӘОЖ 662.997:553.7.031.2
ҒТАХР 52.13.05

Бегалиев Д.Т., техника ғылымдарының магистрі, https://orcid.org/0009-0007-6746-5522
«Жәңгір хан атындағы Батыс Қазақстан аграрлық-техникалық университеті» КеАҚ, Орал қ., Жәңгір хан көш., 51, 090009, Қазақстан Республикасы, dastan.begaliyev@alumni.nu.edu.kz

Begaliyev D.T., Master of Engineering Sciences, https://orcid.org/0009-0007-6746-5522
NJSC «West Kazakhstan Agrarian and Technical University named after Zhangir khan», Uralsk, st. Zhangir khan 51, 090009, Kazakhstan, dastan.begaliyev@alumni.nu.edu.kz

СЫҒЫЛМАҒАН ЖАҒДАЙДА ЖОҒАРЫ ТЕМПЕРАТУРАЛАРДА СҰЙЫҚ АЗОТ АРҚЫЛЫ ГРАНИТТІ КРИОГЕНДІК ЖАРЫҚШАҚТАНДЫРУ: ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ЖЕТІЛДІРІЛГЕН ГЕОТЕРМАЛДЫҚ ЖҮЙЕЛЕР ҮШІН МАҢЫЗЫ

CRYOGENIC FRACTURING OF GRANITE USING LIQUID NITROGEN AT ELEVATED TEMPERATURES UNDER UNCONFINED CONDITION: IMPLICATIONS FOR ENHANCED GEOTHERMAL SYSTEMS IN KAZAKHSTAN

АННОТАЦИЯ

Сұйық азот (LN_2) — жер асты қабаттарындағы геотермалдық энергияны өндіру аймақтарында кеуектілік пен өткізгіштікті, сондай-ақ жалпы беттің жанасу аймағын жақсартатын тиімді стимуляциялау агенті ретінде танылды. Бұл технология, әсіресе, құрғақ ыстық жыныстар (Hot Dry Rock, HDR) коллекторларынан геотермалдық энергияны өндіруде ерекше маңызды. Бұл зерттеу гранит үлгілерін түрлі жоғары температурада қыздырып, кейіннен LN_2 арқылы күрт салқындату нәтижесінде жыныс материалының бұзылуын қарастырады. Гранит үлгілерінің механикалық қасиеттерін бағалау үшін Бразилиялық бөлу әдісімен тартылу беріктігі сынақтары жүргізілді. Үлгілерді алдын ала 80 °C-тан 320 °C-қа дейін қыздырып, кейін тез салқындату арқылы сынақтар жасалды. Зерттеуде Қазақстанның Ақмола облысынан алынған гранит тастары пайдаланылды. Эксперимент нәтижесінде бірқатар маңызды механикалық параметрлер, соның ішінде бір осьте тартылу беріктігі (UTS), жақсарту коэффициенті және сіңірілген

энергия анықталды. Зерттеу нәтижелері LN_2 арқылы өңдеу граниттің UTS қасиетін төмендететінін, ал алдын ала қыздыру температурасы жарықшақтардың өсу жылдамдығына және қалған беріктікке тікелей әсер ететінін көрсетті. Жақсарту коэффициенті мен сіңірілген энергия температура артқан сайын біртіндеп төмендейтіні байқалды. Бұл зерттеу LN_2-ның температура әсерінен жарықшақтандыру арқылы геотермалдық коллекторлардың өнімділігін арттыратын тиімді әдіс екенін дәлелдейді.

ANNOTATION

Liquid nitrogen (LN_2) has become an effective stimulation agent which improves both porosity and permeability and total surface contact area within geothermal energy extraction zones in subsurface formations. The technology finds specific value for extracting geothermal energy from Hot Dry Rock (HDR) reservoirs. This research examines the rock material degradation following subjecting granite specimens to LN_2 cryogenic treatment across various elevated temperatures. Brazilian Splitting Tensile Strength Tests measured the mechanical response of granite specimens that underwent rapid LN_2 cooling after pre-heating at different temperatures between 80 °C to 320 °C. The research used granite materials extracted from the Akmola region of Kazakhstan. The experimental data yielded essential mechanical parameters which included Uniaxial Tensile Strength (UTS) together with enhancement factor and absorbed energy. Research data shows that treating granite with LN_2 diminishes its UTS properties while pre-treatment temperature levels determine how quickly cracks grow and what strength remains. The data showed that enhancement factor together with absorbed energy decreased steadily as temperature increased. The research demonstrates that LN_2 represents a powerful stimulation method which boosts geothermal reservoir performance by means of temperature-induced fracturing.

Кілт сөздер: *Геотермалдық энергия, криогендік жарықшақтандыру, Бразилиялық сынақ, тартылу беріктігі, жақсарту коэффициенті, сіңірілген энергия, гранит.*

Keywords: *Geothermal energy, cryogenic fracturing, Brazilian test, tensile strength, enhancement factor, absorbed energy, granite.*

Introduction. Geothermal energy has become a prominent focus of attention because the world is rapidly shifting toward dependable sustainable power sources that produce minimal emissions. The scientific community now acknowledges Hot Dry Rock (HDR) formations as a promising geothermal resource because these deep geological bodies found between 5000 and 6000 meters depth hold temperatures between 150 °C to over 500 °C [1–4]. Commercial exploitation of HDR formations faces challenges because of their naturally limited permeability which requires the development of advanced stimulation technologies to improve heat extraction [5].

The economic usage of HDR reserves provides an attractive method to minimize environmental sustainability challenges from fossil fuels by reducing carbon emissions. Heat recovery efficiency from HDR reservoirs depends on establishing effective fractures throughout the rock mass. New stimulation technology proves the effectiveness of cryogenic fracturing with liquid nitrogen (LN_2) in improving reservoir permeability. The process for cryogenic fracturing was introduced several decades ago [6–8] and uses LN_2's extreme −196 °C temperature at atmospheric pressure to generate heavy thermal strain in heated rock which produces complex dense networks of microfractures [9–12]. Water-based hydraulic fracturing methods with conventional fluids have inferior environmental performance and operational capabilities than LN_2 stimulation. The technology cuts water usage while preventing chemical contamination and generates elaborate fracture patterns specifically in granite rock which behaves as a thermally brittle material [13-15].

The present study investigates the cryogenic fracturing behavior of granite sourced from the Akmola region in Kazakhstan. The experimental tests included heating granite samples at different temperatures then subjecting them to LN_2 cooling before conducting the Brazilian splitting tensile strength test. Several important mechanical parameters served to measure thermal damage through the evaluation of absorbed energy alongside the enhancement factor. The study investigated how different initial thermal conditions affect fracture propagation along with material weakening while analyzing their effect on temperature. This study aims to expand environmentally friendly stimulation techniques through LN_2 cryogenic fracturing assessment for boosting HDR reservoir performance.

Materials and experimental process. Granite samples were collected from outcrops located in the Akmola region of Kazakhstan. The specimens prepared for the Brazilian (splitting tensile strength) test were cylindrical in shape, with dimensions of 54 mm in diameter and 27 mm in length, in accordance with the standards set by the International Society for Rock Mechanics (ISRM). Prior to testing, all samples were initially dried in an oven at 50 °C for 24 hours to eliminate surface moisture. Subsequently, they were subjected to thermal treatment in a high-temperature furnace at three target temperatures: 80 °C, 160 °C, and 320 °C, each maintained for a duration of two hours. After heating, the specimens were immediately immersed in a liquid nitrogen (LN_2) bath for one hour to induce rapid thermal cooling. To ensure removal of any residual humidity, the samples were placed again in a drying oven at 50 °C for an additional hour. Once prepared, the specimens were tested under tensile compression using the Brazilian method, as illustrated in Figure 1.




Figure 1 - Experimental process

Results and discussion. The Brazilian tensile strength tests performed on granite samples treated with different thermal and cryogenic procedures resulted in the data shown in Figure 2. 50 °C was assumed as an untreated case but the remaining samples underwent preheating at 80 °C, 160 °C and 320 °C before being immersed in liquid nitrogen (LN_2) for one hour. Data accuracy and measurement error reduction occurred through repeating each experiment two times. Peak loads achieved their maximum level in untreated granite samples at 50 °C yet thermal shock treatments which combined heating and LN_2 cooling caused peak loads to decrease. The peak load decreased in a stepwise manner as pre-heating temperature increased because thermal-induced microcracking created more damage that became worse with subsequent LN_2 exposure.




Figure 2 - Load vs Time graph after conducting Brazilian test.

The same Brazilian test samples generated their load-displacement data as shown in Figure 3. The untreated samples at 50 °C maintained their highest stiffness properties and peak loads because their curves showed steep slopes during the test. The combination of thermal and cryogenic treatment on samples resulted in decreased resistance to load and greater displacement before failure became apparent in 320 °C + LN_2 samples. The material develops gradual softness and damage throughout its rock mass due to thermal expansion and microcrack formation as well as cryogenic contraction until it reaches a state of reduced tensile integrity.




Figure 3 - Load vs Displacement graph after conducting Brazilian test

The enhancement factor results from tensile strength reductions during testing appear in Figure 4 for each pre-treatment condition relative to the 50 °C reference sample group. Higher pre-heating temperatures lead to more negative enhancement factors which demonstrate increased material strength decrease. The data from both experimental runs show a direct correlation while indicating decreasing tensile strength values most significantly at 320 °C + LN_2 which resulted in –0.45. The combination of high temperatures together with rapid LN_2 cooling creates the most effective conditions to generate internal damage in granite

material. Experimental results show consistency through the agreement between two separate trials and the trendline average.




Figure 4 - Enhancement factor vs Process for 2 tries of experiments with average values curve

In Figure 5, the mechanical behavior of granite under different thermal and cryogenic conditions becomes more evident through the analysis of absorbed energy data obtained from load-displacement curves. Absorbed energy measurement serves as an area calculation that accounts for the complete energy needed to break the rock specimen thus demonstrating its toughness level. The rock specimens heated to 50 °C demonstrated maximum absorbed energy levels amounting to 33.65 and 41.33 kN·mm resulting in an average of 37.49 kN·mm which indicates their intact condition.

The combination of heating at 80 °C with subsequent LN_2 cooling leads to clear energy reduction during absorption. The average absorbed energy measured 28.03 kN·mm in the first and second trials. The energy absorption capacity of the material decreases when cryogenic treatment follows moderate heating because it produces internal microcracking throughout the material. The brittleness and fracture resistance decrease as the thermal preconditioning intensity rises because samples treated at 160 °C + LN_2 show 19.63 and 19.67 kN·mm of absorbed energy.

The treatment combination of heating at 320 °C followed by LN_2 cooling generates the minimum energy levels among all samples. The two tests within this group measure absorbed energy at levels of 14.11 kN·mm and 16.55 kN·mm as these results demonstrate a noticeable decline when compared to the reference condition. The intense internal damage of the structure due to thermal and cryogenic exposure resulted in diminished material cohesion and thus a marked decrease in overall strength. The experimental results demonstrate that granite toughness decreases significantly when heated at elevated temperatures followed by quick freezing with liquid nitrogen thus validating its effectiveness in rock breaking operations.




Figure 5 - Absorbed Energy vs Process for 2 tries of experiments with average values curve

The Brazilian tensile strength measurements from granite specimens under different thermal exposure conditions appear in Table 1. The initial test conducted at 50 °C revealed a typical UTS outcome of 26.80 kN. The specimens experienced a significant decrease in tensile strength when they received exposure to elevated temperatures and subsequent LN_2 cooling. The specimens experienced a 11.38% decrease in UTS value when tested at 80 °C. The strength reduction reached 30.69% after heating to 160 °C and 44.38% after heating to 320 °C when compared to the baseline. The experimental results show that granite tensile strength diminishes progressively with rising preheating temperature levels when subjecting granite to thermal shock with LN_2 exposure. The data reveals that thermally induced damage in granite increases directly in proportion to pre-heating temperatures.

Multiple experimental tests show thermal preconditioning combined with cryogenic treatment produces crucial effects on granite material mechanical performance. The analyzed data established a descending trend between failure load and stiffness together with treatment temperature rise because the thermal exposure caused structural degradation of rock material. The strength evaluation through enhancement factors shows that all thermally shocked groups experienced weakening with the most severe condition observed at 320 °C + LN_2 treatment leading to minimum strength. The measured absorbed energy confirms this analysis by showing substantial reduction of failure energy in the rock which indicates decreased toughness and increased brittleness. Structural damage creation from high thermal exposure during rapid LN_2 cooling leads to microcrack formation that boosts fracturing efficiency. The proposed method demonstrates great potential as a waterless stimulation method suitable for geothermal energy extraction and unconventional reservoir development because it allows controlled rock weakening.

Conclusion. A particular experimental plan executed using granite samples obtained from the Akmola region of Kazakhstan investigated how LN_2 cryogenic cooling affects thermally preconditioned granite. The experimental evaluation comprised Brazilian tensile strength assessments and load-displacement inspection and measurements of absorbed energy with enhancement factor analysis. Research results consist of the following primary observations:

- The tensile strength of granite decreased steadily as pre-heating temperatures increased resulting in sample groups exposed to 320 °C treatment showing the lowest values when cooled with LN_2.

Table 1 - Effect of Thermal Preconditioning on Ultimate Tensile Strength (UTS) of Granite Samples

Specimen №	Temperature	UTS Peaks	Average value	Stepwise Difference	Difference from Baseline
	(°C)	(kN)	(kN)	(%)	(%)
1	50	26.20	26.80	-	-
2		27.40			
1	80	23.60	23.75	-11.38	-11.38
2		23.90			
1	160	18.43	18.58	-21.79	-30.69
2		18.72			
1	320	14.60	14.91	-19.76	-44.38
2		15.21			

- The need for energy absorption to cause failure decreased when pre-treatment temperatures increased because thermal degradation combined with LN_2-induced microcracks made the granite material weaker.
- Standardized as the enhancement factor serves to interpret how well LN_2 techniques function on granite samples and shows increased effectiveness in maximizing crack propagation when pre-heating temperature rises.
- Different initial temperatures result in varying fracture characteristics and energy absorption levels during LN_2 treatment, but all specimens displayed analogous qualitative breaking responses.

Acknowledgement. This research was financially supported by Nazarbayev University (Funder Project Reference:021220CRP2022).

I would like to express my sincere gratitude to Dr. Sotirios Longinos for his valuable guidance, support, and insightful suggestions throughout the course of this research.

REFERENCES

1. Breede K, Dzebisashvili K, Liu X, Falcone G (2013) A systematic review of enhanced (or engineered) geothermal systems: past, present and future. Geotherm Energy 1:4

2. Gallup DL (2009) Production engineering in geothermal technology: a review. Geothermics 38:326–334

3. Potter RM, Robinson ES, Smith MC (1974) Method of extracting heat from dry geothermal reservoirs (No. US 3786858)

4. Ge, Zhenlong, Qiang Sun, Tian Yang, Tao Luo, Hailiang Jia, and Duoxing Yang. "Effect of high temperature on mode-I fracture toughness of granite subjected to liquid nitrogen cooling." Engineering Fracture Mechanics 252 (2021): 107834.

5. Grundmann SR, Rodvelt GD, Dials GA, Allen RE (1998) Cryogenic nitrogen as a hydraulic fracturing fluid in the devonian shale. In: SPE Eastern Regional Meeting. Society of Petroleum Engineers

6. Zhang, Shikun, Zhongwei Huang, Pengpeng Huang, Xiaoguang Wu, Chao Xiong, and Chengcheng Zhang. "Numerical and experimental analysis of hot dry rock fracturing stimulation with high-pressure abrasive liquid nitrogen jet." Journal of Petroleum Science and Engineering 163 (2018): 156-165.

7. McDaniel BW, Grundmann SR, Kendrick WD, Wilson DR, Jordan SW (1997) Field applications of cryogenic nitrogen as a hydraulic fracturing fluid. In: SPE annual technical conference and exhibition. Society of Petroleum Engineers

8. Yang, Ruiyue, Chunyang Hong, Wei Liu, Xiaoguang Wu, Tianyu Wang, and Zhongwei Huang. "Non-contaminating cryogenic fluid access to high-temperature resources: Liquid nitrogen fracturing in a lab-scale Enhanced Geothermal System." Renewable Energy 165 (2021): 125-138.

9. Ishida, T., Aoyagi, K., Niwa, T., Chen, Y., Murata, S., Chen, Q. and Nakayama, Y., 2012. Acoustic emission monitoring of hydraulic fracturing laboratory experiment with supercritical and liquid CO_2. Geophysical Research Letters, 39(16).

10. Anderson, R.L., Ratcliffe, I., Greenwell, H.C., Williams, P.A., Cliffe, S. and Coveney, P.V., 2010. Clay swelling—a challenge in the oilfield. Earth-Science Reviews, 98(3-4), pp.201-216.

11. Cai, C., Zou, Z., Ren, K., Tao, Z., Feng, Y., Yang, Y. and Wang, B., 2023. Experimental study on the breakdown mechanism of high temperature granite induced by liquid nitrogen fracturing: An implication to geothermal reservoirs. *Heliyon*, *9*(8).

12. Zhang, D. and Tingyun, Y., 2015. Environmental impacts of hydraulic fracturing in shale gas development in the United States. Petroleum Exploration and Development, 42(6), pp.876-883.

13. Niu, H. and Yu, W., 2024. Experimental Study on the Evolution of Fracture Aperture of Single-Fracture Granite during Liquid Nitrogen Cold Shock Cycling. *Geofluids*, *2024*(1), p.4023295.

14. Cai, C., Huang, Z., Li, G., Gao, F., Wei, J. and Li, R., 2016. Feasibility of reservoir fracturing stimulation with liquid nitrogen jet. Journal of Petroleum Science and Engineering, 144, pp.59-65.

15. Wang, L., Xue, Y., Cao, Z., Kong, H., Han, J. and Zhang, Z., 2023. Experimental study on mode I fracture characteristics of granite after low temperature cooling with liquid nitrogen. *Water*, *15*(19), p.3442.

РЕЗЮМЕ

Мақалада Қазақстанның Ақмола облысынан алынған гранит жыныстарын сұйық азот (LN_2) көмегімен жоғары температура жағдайында криогендік өңдеудің әсері зерттеледі. Зерттеудің мақсаты — геотермалдық жүйелерді жетілдіру үшін жыныс құрылымындағы жарықшақтар мен механикалық әлсіреу процесін бағалау. Гранит тастары 80 °C–тан 320 °C–қа дейін алдын ала қыздырылып, кейіннен LN_2 арқылы күрт салқындатылды. Олардың механикалық қасиеттері Бразилиялық бөлу әдісімен бағаланды. Эксперимент нәтижелері сұйық азотпен өңдеу граниттің тартылу беріктігін төмендетіп, алдын ала қыздыру температурасының жарықшақтардың түзілуіне айтарлықтай әсер ететінін көрсетті. Жақсарту коэффициенті мен сіңірілген энергия температура артқан сайын төмендейтіні байқалды. Алынған нәтижелер LN_2 қолдану арқылы құрғақ ыстық жыныс коллекторларының өткізгіштік қасиеттерін арттыруға болатындығын және бұл әдістің геотермалдық энергия өндірісінде перспективалы екенін дәлелдейді.

ӘОЖ: 661.811
ҒТАМР 61.31.51

Ермуханова С.Т., техника ғылымдарының магистрі, аға оқытушы, https://orcid.org/0009-0004-3280-0069
«Жәңгір хан атындағы Батыс Қазақстан аграрлық-техникалық университеті» КеАҚ, Жәңгір хан 51, Орал қаласы, Қазақстан Республикасы, svetok_88-88@mail.ru

Yermukhanova S.T. Master of Technical Sciences, senior lecturer, **the main author,** https://orcid.org/0009-0004-3280-0069
NJSC «West Kazakhstan Agrarian and Technical University named after Zhangir khan», Uralsk, st. Zhangir khan 51, 090009, Kazakhstan, svetok_88-88@mail.ru

ӨНДІРІС ҚАЛДЫҚТАРЫНАН МЫРЫШ ҚОСЫЛЫСТАРЫН АЛУ ТЕХНОЛОГИЯСЫ
TECHNOLOGY FOR OBTAINING ZINC COMPOUNDS FROM INDUSTRIAL WASTES

АҢДАТПА

Бұл мақалада мырыш өндірісінің негізгі өндірістік қалдықтарын қышқылмен өңдеу арқылы мырыш сульфатының моногидратын алу әдістері келтірілген. Өндіріс қалдықтарын шаймалау - күкірт қышқылын немесе оның негізіндегі компоненттерді, сондай-ақ аммиак ерітінділерін еріткіш ретінде пайдалана отырып, металды ерітіндіге ауыстыру процесі болып табылады. Құрамында мырыш бар өндірістік қалдықтар экологиялық тұрғыдан тиімді жоюды талап ететін маңызды ресурс болып табылады. Бұл қалдықтарды қайта өңдеу олардың жинақталған аймақтардағы экологиялық жағдайды жақсартуға ғана емес, сонымен қатар мырыш металлургиясының экономикалық тиімділігін арттыруға, атап айтқанда, мырыш оксидін алу арқылы өндіріс тиімділігін арттыруға мүмкіндік береді.

ANNOTATION

This article presents methods for obtaining zinc sulfate monohydrate by acid treatment of the main industrial wastes of zinc production. Leaching of industrial wastes is the process of transferring the metal into a solution using sulfuric acid or its components, as well as ammonia solutions, as solvents. Zinc-containing industrial waste is an important resource that requires environmentally sound disposal. Recycling of these wastes will not only improve the environmental situation in the areas where they accumulate, but will also increase the economic efficiency of zinc metallurgy, in particular, by increasing production efficiency through the production of zinc oxide.

Түйін сөздер*: өндірістік қалдықтар,екіншілік шизізат, мырыш оксиді, мырыш сульфаты моногидраты, күкірт қышқылы, сутегінің асқын тотығы, өңдеу, сүзу, булану, кептіру, мырыш шлактары.*

Keywords: *industrial waste, secondary raw materials, zinc oxide, zinc sulfate monohydrate, sulfuric acid, hydrogen peroxide, processing, filtration, evaporation, drying, zinc slag.*

Кіріспе. Дүниежүзілік нарықта қара және түсті металдардың жылдық тұтынуы 800 миллион тоннаға жетеді. Металдарды тұтынудың үдеуімен қатар, пайдалы қазбалар қорының азаюы байқалады. Осыған орай, табиғи пайдалы қазбалармен қатар металлургиялық өндірістің техногендік қалдықтары да маңызды зерттеу объектісіне айналуда. Бұл қалдықтарда алтын, күміс, мыс, мырыш және темір сияқты құнды металдар едәуір мөлшерде кездеседі. Өндірістік қалдықтарды қайта өңдеудің бірнеше негізгі әдістері бар: алғашқы өңдеу, термиялық өңдеу және физикалық жою [1-3].

Қара металлургия саласында құрамында мырыш бар шаңдар балқытылған шойын мен болат өндіруге байланысты барлық негізгі процестерде түзіледі. Бұл қалдықтардың құрамындағы негізгі пайдалы компоненттер темір мен мырыш болып табылады [4]. Қалдықтардың түзілу көлемінің шамамен 80%-ы түсті және қара металл кендерін өндіретін ұйымдарда, 11%-ы металлургия кешенінің кәсіпорындарында, 4%-ы энергетика саласының кәсіпорындарында қалыптасады [5]. Металлургиялық зауыттарда ескі үйінділерді қайта өңдеуге көп көңіл бөлінуде, себебі бұл экономикалық тұрғыдан тиімді болып табылады, өйткені аталған қалдықтар көптеген жағдайларда негізгі өндіріс процесіне қосымша шикізат көзі ретінде қызмет етеді [6,7].

Қазіргі металл өндірісінде қайтарылатын металл құрамындағы шикізаттың рөлі жыл сайын артып келеді [8]. Қайтарылатын шикізат тек бұйымдар мен материалдарды қолдану аймақтарында ғана емес, сонымен қатар өңдеу кәсіпорындарының ақаулары мен өндіріс қалдықтары түрінде де жинақталады. Құрамында қайталама металл бар шикізаттың химиялық құрамы стереотиптік емес. Асыл металдардан басқа, қайтарылатын металды құрайтын шикізат құрамында түсті және сирек металдардың

айтарлықтай мөлшері бар, бұл барлық бағалы компоненттерді барынша толық бөліп алу арқылы күрделі қалдықтарды өңдеудің алғышарты болып табылады. Қайтарылатын металлы бар шикізат түрлерінің көптігі олардың нақты жіктелуінің қажеттілігін анықтайды [9]. Түсті металдардың қайталама шикізаты МЕМСТ 1639-93 негізгі стандартында жіктеледі [10].


Қайталама шикізаттан түсті металдарды алу үшін гидрометаллургиялық технологияларды қолдану бойынша зерттеулердің саны артуда. Құрамында мырыш бар материалдарды өңдеу технологиялары туралы заманауи ғылыми-техникалық және патенттік ақпаратты талдау оларды тығыздалған жабдықта жоғары қысымда және температурада тікелей гидрометаллургиялық өңдеудің тиімділігін көрсетті [11].

Халықаралық қорғасын және мырыш зерттеу тобының мәліметтері бойынша 2019 жылы тазартылған мырыштың әлемдік өндірісі 13,49 миллион тоннаға, тұтыну 13,67 миллион тоннаға бағаланды, нәтижесінде өндіріс пен тұтыну арасында шамамен 180 000 тонна тазартылған мырыш тапшылығы пайда болды [12-14].

Мырыш қосылыстары металл, лак-бояу және химия өнеркәсібінде үлкен маңызға ие. Олардың ең маңыздысы - мырыш сульфаты. Мырыш сульфаты ($ZnSO_4$) - тығыздығы 3,74 г/см³ түссіз орторомбты кристалдар [15]. Температура 5,8-38,8 °С диапазонындағы сулы ерітінділерден мырыш сульфаты гептагидраты $ZnSO_4•7H_20$, мырыш купоросы кристалданады, 38,8-ден 70 °С-қа дейінгі диапазонда $ZnSO_4•6H_20$, ал 70 °С жоғары - $ZnSO_4•H_2O$ алынады. Іс жүзінде мырыш сульфаты жиі кездеседі, өйткені ол мырыш сульфаты ерітінділерін әдеттегі булану және кейіннен бөлме температурасына дейін салқындату кезінде бөлінеді.

Мырыш сульфатының суда еруі жылуды сіңірумен (18 °С-та - 4,3 ккал/моль), моногидраттың еруі, керісінше, жылу бөлінуімен (5,6 ккал/моль) жүреді. Жылдам қыздырған кезде мырыш сульфаты кристалдану суында ериді. Ауада ол бірте-бірте суды жоғалтып, эрозияға ұшырайды. Мырыш сульфаты ақырын қыздырғанда алдымен алты су молекуласын жоғалтады, ал 238 °С-тан жоғары қыздырғанда ғана судың соңғы молекуласын бөледі [16]. 600-800°С дейін қыздырғанда SO_3 және оксосульфаттарға ($2ZnSO_4·ZnO$ және $ZnSO_4·$ ZnO) ыдырайды, 930°С жоғары ZnO түзіледі. Мырыш сульфатының ыдырау процесі 1-2% Fe_2O_3 қосқанда тез жүреді.

Мырыш сульфаты суда және глицеринде ериді. Судағы ерігіштік массасының 27,6%-дан - 7°С-тан, 41,4%-ға дейін 39°С температурада түзу сызықты дерлік артады. Бұл температура диапазонында орторомбты торы бар $ZnSO_4·7H_2O$ гептагидрат (мырыш сульфаты) кристалданады. 39-70°С гексагидрат кристалданады, мырыш сульфатының ерігіштігі 47,7% (70°С). 1-суретте $ZnSO_4$-H_2SO_4-H_2O жүйесіндегі ерігіштігі көрсетілген.



Сурет 1 - $ZnSO_4$-H_2SO_4-H_2O жүйесіндегі ерігіштік.
Қатты фазалар: acd- $ZnSO_4·6H_2O$; bcd жоғары - $ZnSO_4$-H_2O

70 °С жоғары $ZnSO_4 \cdot H_2O$ моногидраты түзіледі, мырыш сульфатының ерігіштігі 44% (105 °С) дейін төмендейді. Моногидрат 238 °С температурада сусызданады. Тұрақсыз тетра-, ди- және гептагидраттар (моноклиникалық жүйе) де белгілі. Қаныққан сулы ерітіндіде 0°С - 29,4%, 25°С - 36,7%, 75°С - 40,9, 99°С - 37,7% $ZnSO_4$ болады. Құрамында бос қышқыл жоқ мырыш сульфатының сулы ерітінділері сақтау кезінде негізгі мырыш сульфатының $3Zn(OH)_3 \cdot ZnSO_4 \cdot 4H_2O$ тұнбасының бөлінуінен бұлыңғыр болады.

$ZnSO_4$-H_2SO_4-H_2O жүйесінде 20 °С температурада және сульфат пен қышқылдың жалпы концентрациясы 0,25-0,50 г-моль/л болғанда күрделі иондар $[Zn(SO_4)_2]_2$- түзіледі. $ZnSO_4 \cdot 7H_2O$ кристалдарының шығымын есептеуге мүмкіндік беретін бұл жүйедегі ерігіштік диаграммасы [17,18].

Мырыш сульфаты – әлемдік мырыш өндірісінің шамамен үштен бірін өндіретін гидроэлектрометаллургиялық процесс арқылы мырыш металын өндірудегі аралық өнім болып табылады. Бұл әдісті қолданып мырышты күкірт қышқылында мырыш кенін күйдіру өнімі мырыш оксидін еріту арқылы дайындалған $ZnSO_4$ ерітіндісін электролиздеу арқылы алады.

Электролиз кезінде қалпына келтірілген күкірт қышқылы (1 кг тұндырылған мырышқа ~ 1,5) мырыш оксидін еріту үшін қайтарылады [19.20]. Мырыш сульфаты қара металл бұйымдарын мырыштау үшін электролит ретінде де қолданылады.

Мырыш тапшылығы топыраққа мырыш тыңайтқыштарын қосып, өсімдіктерге мырыш тұздарының ерітінділерін шашу арқылы толтырылады. Мырыш тыңайтқышы ретінде құрамында мырыш бар әртүрлі өндірістік қалдықтарды қолдануға болады [21,22].

МЕМСТ 8723-83 бойынша мырыш сульфатының құрамында мырыш кемінде 21,80-22,50% және келесі қоспалардан аспауы керек: темір (FeO есебімен) - 0,02-0,10; бос күкірт қышқылы - 0,05-0,10; суда ерімейтін заттар - 0,04-0,30; хлоридтер - 0,2-0,3; марганец (MnO есебімен) - 0,04-0,20, мыс, қорғасын, кадмий және никель - 0,01-0,03% [23].

Мырыш сульфаты минералды тыңайтқыш ретінде, азыққа минералды қоспа ретінде, минералды бояу өндірісінде қолданылады; қағаз ағартқыш ретінде; әртүрлі препараттарды өндіруде, соның ішінде стоматологияда; металлургияда, гальванияда; ашытқы, сыра, былғары бұйымдарын өндіруде және ағашты сіңдіру үшін [24].

Мырыш сульфаты – жоғары тиімділік көрсеткіштері және ауыл шаруашылығы секторында кең ауқымды қолдануы бар тыңайтқыш. Ауылшаруашылық дақылдарының өнімділігін арттыруға, сонымен қатар өсімдіктердің иммунитетін күшейтуге, теріс климаттық әсерлерге төзімділігін арттыруға қажетті күкірт, мырыш сияқты химиялық элементтердің көзі ретінде қолданылады [25]. Мырыш сульфатының сулы ерітінділерін жапыраққа шашу, сонымен қатар отырғызу алдында дайындық шараларының кешенінің бөлігі ретінде онымен өсімдік тұқымын өңдеу жұмыстары жүргізілуде [26].

Мырыш оксидін өндіруге арналған шикізат химиялық, мыс балқыту және металл өңдеу өнеркәсібінің құрамында мырыш бар әртүрлі қалдықтар болуы мүмкін. Бұл қалдықтар көп жағдайда мырыш металы, оксид, хлорид, сульфат немесе карбонат түріндегі мырыш бар шламдар болып табылады. Натрий гидросульфиті өндірісінде түзілетін мырыш карбонатының қалдықтарынан мырыш оксидін алу үшін оны алдымен құрамындағы мөлшері 15%-ға жететін суда еритін тұздардан (Na_2SO_4, Na_2CO_3 және т.б.) жуу керек. Құрамында 65% дейін ылғалдылығы бар жуылған мырыш карбонатын 25-27% ылғалдылыққа дейін кептіреді және 500-600 °С күйдіреді. Құрамында мырыш металы бар шламдарды пайдаланған кезде оларды тұз қышқылымен өңдеген жөн.

Алынған $ZnCl_2$ ерітіндісін $ZnCO_3$ содасымен тұндырады, содан кейін мырыш оксидін алу үшін күйдіреді [27].

Қытай ғалымдары қалдық қышқыл мен қалдық мырыш шлактарынан мырыш сульфаты моногидратының алу процесін ұсынады [28]. Диего Эрреро, П.Л. Ариас, М.Б. Гюемез электрохимиялық өндіріске жарамды мырыш сульфаты ерітіндісін алудың гидрометаллургиялық процесінің дамуын ұсынады [29]. Қазақстан ғалымдары мырыш сульфатын алу әдісін, соның ішінде қорғасын шаңын күкірт қышқылымен шаймалау әдісін ұсынған [30].

Мырыш сульфаты екіншілік шикізаттан және құрамында мырыш бар кендерден оларды күкірт қышқылымен өңдеу кезінде алынады. Түсті металл сынықтарын өңдеу қалдықтарының құрамында 45-62% мырыш бар. Мырыш сульфатын өндіру үшін жақсы шикізат мырыш оксиді өндіру процесіндегі үрлегіш қалдықтары болып табылады.

Мырыш сульфатын алудың ең кең тараған тәсілі – құрамында мырыш және оның тотығы бар материалдарды күкірт қышқылында еріту. Мыстың, темірдің, қорғасынның, никельдің, қалайының және т.б. байланысты қоспалар ерітінділерді арнайы тазартуды қажет етеді.

Мырыш сульфатын күкірт диоксидінің қалдық газдарын мырыш әдісімен ұстағанда, полиметалл рудаларынан темір оксиді сульфатының ерітіндісімен өңдеу арқылы, сондай-ақ мырыш қоспасын муфельде және басқа пештерде шамамен 600 °С температурада тотықтырғыш күйдіру арқылы жанама өнім ретінде алуға болады.

Мырыш сульфаты күкірт диоксиді атмосферасында мырыш қоспасын сульфатизациялау арқылы күйдіру, сонымен қатар мырыш оксиді күкірт диоксидімен сульфатизациялау арқылы оңайырақ алынады [31-34].

Құрамында мырыш бар материалдардан мырыш сульфатын дайындау. Құрамында мырыш және оның оксиді бар шикізатты шарикті диірменде ұнтақтап, содан кейін 18-25% күкірт қышқылында ерітеді [35]. Процесс қышқылға төзімді материалмен қапталған және араластырғыш құрылғылармен жабдықталған реакторларда жүргізіледі.

Бастапқы күкірт қышқылын қажетті концентрацияға дейін алдын ала сұйылту процесінде бөлінетін жылу мөлшері, сонымен қатар экзотермиялық реакциялардың жылуы

$$ZnO + H_2SO_4 = ZnSO_4 + H_2O + 105 \text{ кДж}$$
$$Zn + H_2SO_4 = ZnSO_4 + H_2 + 167{,}6 \text{ кДж}$$

қосымша қыздырусыз реакциялық масса температурасының 80-100 °С-қа дейін өздігінен көтерілуін қамтамасыз етеді [36].

Зерттеу материалдары мен әдістері. Жүргізілген зерттеудің әдістемесі мен әдістері белгілі ғылыми-техникалық жетістіктерді талдауға және жұмыстың тиімді бағытын тұжырымдауға мүмкіндік беретін жарияланған материалдарға негізделген. Эксперименттік зерттеулер индуктивті байланысқан плазмамен оптикалық эмиссиялық спектрометрияны, инфрақызыл спектроскопияны, рентгендік фазалық талдауды және басқа сертификатталған құралдарды пайдалана отырып жүргізілді.

Зерттеу нәтижелері және талдаулар. Зерттеу үшін бірнеше үлгілер алынды. «ЦО1» және «ЦО1» үлгілері кремді түсті ұнтақ болып табылады. Ц3 және Ц4 үлгілері сұр түсті. Талдау кезінде алдымен осы үлгілердегі сынаптың мөлшері анықталды. Ол 0,005 - 0,016 мг/кг аралығында болады. Нәтижелер 1-кестеде берілген.

Кесте 1- Сынапты анықтауға арналған химиялық талдау нәтижелері

Атауы	Hg, мг/кг
ЦО2	0,012
ЦО1	0,016

Ц3	0,012
Ц4	0,005

Кестеден көріп отырғанымыздай, бұл үлгілердегі сынаптың мөлшері 0,005-0,016 мг/кг аралығында болады. Қалдықтағы сынаптың төмен мөлшері қоршаған ортаға және адам денсаулығына техногендік қауіп тудырмайды. Қоршаған ортаны зиянды өндірістік қалдықтардан, оның ішінде құрамында сынап бар қалдықтардан қорғау проблемасы біздің еліміз үшін де, барлық өнеркәсібі дамыған елдер үшін де өзекті болып табылады.

Кесте 2 - Химиялық талдау нәтижелері

Элементтер (%, мг/кг)	**ЦО1**	**ЦО2**	**Ц4**	**Ц3**
Fe,%	0,29	0,88	0,05	0,18
Si,%	0,26	0,72	0,05	0,02
Al,%	0,31	0,51	0,27	0,47
Ti,мг/кг	42	162	н/о	н/о
Sr,мг/кг	4	3	3	<1
Ba,мг/кг	<1	208	9	118
Mn,мг/кг	31	101	12	11
Cu,мг/кг	292	118	42	32
Cr,мг/кг	3	4	5	9
Zn,%	76,00	75,35	99,13	98,81
Ni,мг/кг	85	26	<1	<1
Pb,%	0,19	0,40	0,03	0,01
Ca,%	0,11	0,08	0,02	0,02
Mg,%	0,04	0,01	0,05	0,04
Na,%	0,14	0,10	0,12	<0,1
K,%	0,15	0,13	<0,01	<0,01
Co,мг/кг	2	2	1	20
Mo,мг/кг	1	1	<1	7

Жоғарыда көрсетілген үлгілердегі мырыш мөлшері: ЦО1 - 76%, ЦО2 - 75,35%, Ц4 - 99,13%, Ц3 - 98,81%, бұл темір, кремний, алюминий және басқалар сияқты басқа элементтердің мөлшерінен айтарлықтай жоғары. Үлгілердегі мырыштың мұндай жоғары болуы мырыш оксиді өндірісінің қалдықтарынан мырыш сульфатын алу мүмкіндігін растайды. Мырыш сульфаты ($ZnSO_4•7H_2O$) түріндегі мырыш сульфатын алу және оны моногидратқа ($ZnSO_4•H_2O$) айналдыру мүмкіндігін зерттеу барысында бұл процестің ықтимал кезеңдері анықталды. Зертханалық мәліметтер бойынша, реакция экзотермиялық сипатқа ие және 70°C жоғары температурада қосымша қыздыруды талап етпей-ақ оңай жүреді, себебі бөлінетін жылу қышқылдың қайнау температурасына дейін қызуына жеткілікті болады. Мырыш сульфатын алу процесін жүргізген кезде шикізатта қалайының болуы мүмкіндігін ескеру керек, бұл алынған өнімді сүзуді қиындатуы мүмкін. Егер қалайы жоқ болса, онда қышқылды 180 г/л дейін сұйылту керек. Реакция гетерогенді ортада жүреді, сондықтан оның жылдамдығы қатты фазаның бетінің ауданына байланысты. Сондықтан мырыш шикізаты алдын ала ұнтақталған болуы керек. Бұл жағдайда реакция күшті көбіктенумен жүруі мүмкін, бұл шикізатта ZnO-дан басқа Zn бөлшектері бар екенін көрсетеді. Бұл H_2 шығарады. Өндірісте мырыш шикізатын сұйылтылған қышқылға артық енгізеді, өйткені түзілу реакциясы баяулайды және қышқылдың мөлшері 1-2 г/л дейін төмендесе, реакция аяқталды деп есептеледі. Содан кейін мырыш сульфаты ерітіндісін тазарту кезеңі келеді, өйткені Сүзілген ерітіндіде


мырыш сульфатынан басқа темір (II) сульфатының, мыс (II), кадмий және никель қоспалары бар. Негізгі мырыш тұздарын ыдырату үшін сүзгіден бұрын аз мөлшерде сұйылтылған қышқылды (18-25%) қосу керек, егер шикізатта қалайы болса - 10-15 сағатқа тұндырады. Ерітіндіні темір қосылыстарынан тазарту үшін ерітіндіге Fe^{2+}-ті Fe^{3+} түрлендіру үшін тотықтырғышты енгізу керек. Өнеркәсіпте натрий гипохлоритін тотықтырғыш ретінде қолданады. Бұл жағдайда темір қосылыстарын тұндырғаннан кейін ерітіндіні қыздыру қажет, бұл артық натрий гипохлоритін жою үшін жүргізіледі, содан соң ерітіндіні сүзу керек. Мырыш сульфатын алу үшін тұнбаны сумен жуу қажет, ал сүзінді күкірт қышқылын сұйылту үшін қолданылады. Осылайша, тұнба мен сүзінді арқылы артық химиялық заттарды жою қамтамасыз етіліп, мырыш сульфатының таза түрі алынады.

Мыс (II), кадмий және никель қосылыстарын ерітіндіден жою үшін мырыш шаңын (мырыш оксиді мен мырыш металының қоспасы) қосып, ерітіндіні 4-6 сағат бойы үздіксіз араластыра отырып қыздыру қажет. Шаңды енгізу алдында оны аз мөлшерде әлсіз күкірт қышқылымен өңдеп, металл бетінде пайда болған оксидтің жұқа қабатын жою керек. Алынған шламды сүзгілеу арқылы бөліп алып, ерітіндіні темірден тазарту үшін тотықтырғыш ретінде сутегі асқын тотығын қолдануға болады. Бұл процестер ауыр металл қосылыстарын тиімді түрде алып тастауға және мырыш сульфатының таза түрін алу үшін қажетті жағдайларды қамтамасыз етеді. Нәтижесінде барлық жағдайларда 100% мырыш сульфаты моногидраты алынғаны дәлелденді. 3-кестеде таза мырыш сульфаты моногидратының өндіріс процесінің нәтижелері көрсетілген. Үлгілерде сынаптың мөлшері 4 мкг/кг немесе 4 ppm деңгейінде анықталды, ал қорғасын мен кадмий қосылыстары байқалмады. Қалған аналық сұйықтық сақталып, булану ерітіндісінің келесі партияларына қосылады. Булану процесі 70 °С-тан төмен температурада жүргізілсе, мырыш сульфатының кристалдары түзіледі.

Кесте 3 - Үлгілердің фазалық құрамы

Үлгі атауы	Фазалық құрамы	Мөлшері, % масс
ЦО1	$ZnSO_4 \cdot H_2O$; C2/c (15), ICDD PDF-2 01-074-1331, RIR = 2.24	100
ЦО2	$ZnSO_4 \cdot H_2O$ C2/c (15), ICDD PDF-2; 01-074-1331, RIR = 2.24	100

Мырыш сульфаты моногидратын алудың зертханалық технологиясы жасалды. Бұл технологияны қолдану арқылы 100% мырыш сульфаты моногидраты алынды. Мырыш өндірісінің қалдықтарынан мырыш сульфаты моногидратын алу технологиясы 2-суретте көрсетілген.



1-араластырғыш реактор, 2-сүзгіш пресс, 3- шаю резервуары, 4- кептіргіш, 5-регенератор, 6-айналым сорғысы, 7- тасымалдағыш

Сурет 2 - Өндіріс қалдықтарынан мырыш сульфаты моногидратын алудың технологиялық схемасы

Мырыш сульфаты моногидратын алудың технологиялық режимдері әзірленді. Мырыш оксиді өндірісінің қалдықтарынан мырыш сульфаты моногидратын алу мүмкіндігі көрсетілді.

Қорытынды. Зертханалық жағдайда мырыш сульфаты моногидратын алу үшін арнайы қондырғы әзірленіп, оның көмегімен 100%-дық сападағы мырыш сульфаты моногидраты өндірілді. Осы мақсатта жүргізілген ғылыми-әдістемелік зерттеулер нәтижесінде мырыш сульфаты моногидратын алу технологиясының тиімді режимдері таңдалып, әзірленді. Сонымен қатар, «ЦО1» және «ЦО2» мырыш оксиді өндірісінің қалдықтары негізінде мырыш сульфаты моногидратын өндіру мүмкіндігі айқындалды.

ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

1. Mukhametkhan M., Mukhametkhan, Ye., Zhabalova G., Kamkina L. INVESTIGATION OF PHYSICO-CHEMICAL CHARACTERISTICS OF IRON-CONTAINING TECHNOGENIC RAW MATERIALS IN THE CONDITIONS OF JSC “AMT” Metalurgija 62, 1, pp.129 – 131 (2023). https://doi.org/10.17580/chm.2021.11.14

2. Golik,V., Titova A., Titov G.,Hydrometallurgical processes in underground metal ore mining, Gornaya Promyshlennost 2023, № 2, pp. 85 – 92 (2023) https://doi.org/10.30686/1609-9192-2023-2-85-92

3. Shubov L.Ya.; Doronkina I.G.b; Borisova O.N.b; Tyger L.M.b; Lyubetskaya T.R.c Analytical evaluation and systematization of technologies for extraction of rare metals from production waste, International Conference on Ecological Paradigms of Sustainable Development: Political, Economic and Technological Dimension of Biosphere Problems, EPSD 2021 Saint Petersburg. 185521 https://doi.org/10.1051/e3sconf/202131109005

4. Kolesnikov V.A.Brodskiy V.A.Zhukov D.Yu.Kolesnikov A.V. Man-made metal-containing waste of i-ii class-raw materials for obtaining new products and materials, Chernye Metally № 11, pp.81 – 85 (2021) https://doi.org/10.17580/chm.2021.11.14

5. Рукотворные месторождения ждут своего часа // Уральский рынок металлов. - 2012. - № 3.

6. Gorai B., Jana R.K., Premchand. Characteristics and utili sation of copper slag-a review // Resour. Conserv. Recycl. 2003. Vol. 39. pp. 299-313. https://doi.org/10.1016/S0921-3449(02)00171-4

7. Tuncuk A., Stazi V., Akcil A., Yazici E.Y., Deveci H. Aqueous metal recovery techniques from e-scrap: Hydrometallur gy in recycling // Miner. Eng. 2012. Vol. 25. pp. 28-37. https://doi.org/10.1016/j.mineng.2011.09.019

8. Доронина М.С. Возвратное металлсодержащее сырье - общая характеристика и классификация для целей сертификации /М.С. Доронина, Ю.А. Карпов, В.Б. Барановская, С.И. Лолейт //Заводская лаборатория. Диагностика материалов. -2016. - Т.82. -№ 6. -С. 70-80.

9. Процесс и аппараты цветной металлургии: учебник для вузов /С.С. Набойченко [и др.]. - Екатенбург: ГОУ ВПО УГТУ-УПИ, 2005. -700 с.

10. ГОСТ 1639-2009. Лом и отходы цветных металлов и сплавов. Общие технические условия. -М.: Стандартинформ, 2011. - 66 с.

11. Снурников А.П. Гидрометаллургия цинка. - М.: Металлургия, 1981. –384 с.

12. Skerman, T.M., Green, R.S., Hughes, J.M., &Herceg, M. (1983). Comparisons of footbathingtreatments for ovine footrot using formalin or zinc sulphate. New Zealand Journal of Veterinary Medicine, 31, pp. 91-95 https://doi.org/10.1080/00480169.1983.34978

13. Baek, K.S., et al. (2006). Effect of new foot-bath facility and solution on foot health in lactating cows. J. Lives. Hous. & Env., 12:3, pp. 107-114.

14. (2011). International Zinc Association. Production-From Ore to Metal, pp. 5-43 https://dx.doi.org/10.15863/TAS.2022.07.111.25
15. Позин М.Е. Технология минеральных солей (удобрений, пестицидов, промышленных солей и кислот): Учебник для вузов / М.Е. Позин. - Л.: Химия, 1961. - 791 с.
16. В.П. Живописцев. Аналитическая химия цинка / В.П. Живописцев, Е.А. Селезнева. - М.: «Наука» 1975.
17. И.Н. Кузьминых, С.Л. Любалина, Хим.пром., № 12, 358-1950.
18. Я.А.Фиалков, З.А.Шека, ЖНХ, 1, №6, 1238-1956.
19. А.А. Салин, М.Е. Сыроешкин, Электролиз сернокислого цинка, Госметаллургиздат, 1959.
20. С.А.Титов, Выщелачивание и электролиз цинка, Госметаллургиздат, 1943.
21. М.В. Каталымов, сб. «Исследования по прикладной химии», Изд. АН СССР, 1955, стр.325.
22. С.И.Вольфкович, сб. «Микроэлементы в жизни растений и животных», Изд. Ан СССР, 1952.
23. ГОСТ 8723-82 Купорос цинковый. Технические условия
24. Неорганические продукты. «Евразийский химический рынок» № 04 (151), 2017, С. 27-31.
25. Дуктова Н.А., Мастеров А.С., Равков Е.В. Введение в аграрные профессии: учебно-методическое пособие. Основы сельскохозяйственного производства: агрономия // В 3 ч. Ч. 3. - Горки: БГСХА, 2020. - С. 139-145.
26. Лапа В.В., Емельянова В.Н., Леонов Ф.Н., Рак М.В., Золотарь А.К., Шибанова И.В., Брилев М.С., Юргель, Бородин П.В. Система применения удобрений: учебное пособие для студентов учреждений высшего образования по специальностям «Агрохимия и почвоведение», «Защита растений и карантин» // [и др.]; под ред. В.В. Лапы - Гродно: ГГАУ, 2011. - С. 335-350.
27. В.А. Куракин, ЖХП, № 1325-1941
28. Способ получения моногидрата сульфата цинка из отработанной кислоты и отработанного цинкового шлака Published 2015, Environmental Science
29. Diego Herrero, P.L. Arias, M.B. Güemez Hydrometallurgical process development for the production of azincsulphateliquor suitable for electro winning , Minerals Engineering 23(6):511-517(2010) https://doi.org/10.1016/j.mineng.2010.01.010
30. Пат.Казахстан 29248 (2014)
31. И.Л. Пейсахов, сб. «Обогащение и чистка газов цветной металлургии», Госметаллургиздат, 1953.
32. С.И.Вольфкович, Ф.Г. Марголис, Изв. АН СССР. ОХН, 5, 322-1942; ЖПХ, 28, №5, 453-1955.
33. В.И.Смирнов, А.И. Тихонов, Обжиг медных руд и концентратов, Госметаллургиздат, 1958.
34. В.В. Печковский, ЖПХ, 30, №11, 1579-1957.
35. В.В. Печковский, Уч. зап. Пермск. гос. ун-та, 17, №1, 91-1960.
36. Т.Г. Ахметов Химическая технология неорганических веществ: учебное пособие/ Т.Г. Ахметов, Р.Т. Порфирьева, Л.Г. Гайсин и др., - М.: Высш. шк., 2002. - 688 с.

REFERENCES

1. Mukhametkhan M., Mukhametkhan, Vos., Zhabalova G., Kamkina L. INVESTIGATIO PHYSICO-CHEMICA CARACTERES FERRO-CONTINENTIS technici

rudis materiae in JSC «AMT» Metalurgija 62, 1, pp. 129 – 131 (2023). https://doi.org/10.17580/chm.2021.11.14

2. Golik, V., Titova A., Titov G., Processus hydrometallurgicus in fodienda metallo subterranea, Gornaya Promyshlennost 2023, no. 2, pp. 85 – 92 (2023) https://doi.org/10.30686/1609-9192-2023-85-92

3. Shubov L.Ya.; Doronkina I.G.b; Borisova O.N.b; Tyger L.M.b; Lyubetskaya T.R.c Analytica aestimatio et systematizationis technologiarum pro extrahendis metallis rarioribus a vastatione productionis, International Conference on Ecological Paradigms of Sustainable Development: Political, Economic and Technological Dimension of Biosphere Problems, EPSD 2021 Saint Petersburg. 185521 https://doi.org/10.1051/e3sconf/202131109005

4. Kolesnikov V.A.Brodskiy V.A.Zhukov D.Yu.Kolesnikov A.V. Hominis metalla continens vastitatem materiae i-ii classis rudium ad novos fructus et materias obtinendas, Chernye Metally No. 11, pp.81 – 85 (2021) https://doi.org/10.17580/chm.2021.11.14

5. Man-facta deposita exspectant forum metalli // Ural. - 2012. - III.

6. Gorai B., Jana R.K., Premchand. Characteristics and utili sation of copper slag-a review // Resour. Conserv. Recycl. 2003. Vol. 39. pp. 299-313. https://doi.org/10.1016/S0921-3449(02)00171-4

7. Tuncuk A., Stazi V., Akcil A., Yazici E.Y., Deveci H. Aqueous metal recovery techniques from e-scrap: Hydrometallur gy in recycling // Miner. Eng. 2012. Vol. 25. pp. 28-37. https://doi.org/10.1016/j.mineng.2011.09.019

8. Doronina M.S. Vozvratnoe metallsoderjaщee syre - obщaya harakteristika i klassifikatsiya dlya tselei sertifikatsii /M.S. Doronina, YU.A. Karpov, V.B. Baranovskaya, S.İ. Loleit //Zavodskaya laboratoriya. Diagnostika materialov. -2016. -T.82. -№ 6. -S. 70-80.

9. Protsess i apparaty tsvetnoi metallurgii: uchebnik dlya vuzov /S.S. Naboichenko [i dr.]. - Ekatenburg: GOU VPO UGTU-UPİ, 2005. -700 s.

10. GOST 1639-2009. Lom i othody tsvetnyh metallov i splavov. Obщie tehnicheskie usloviya. -M.: Standartinform, 2011. - 66 s.

11. Snurnikov A.P. Gidrometallurgiya tsinka. - M.: Metallurgiya, 1981.-384 s.

12. Skerman, T.M., Green, R.S., Hughes, J.M., &Herceg, M. (1983). Comparisons of footbathingtreatments for ovine footrot using formalin or zinc sulphate. New Zealand Journal of Veterinary Medicine, 31, pp. 91-95 https://doi.org/10.1080/00480169.1983.34978

13. Baek, K.S., et al. (2006). Effect of new foot-bath facility and solution on foot health in lactating cows. J. Lives. Hous. & Env., 12:3, pp. 107-114.

14. International Zinc Association. Production-From Ore to Metal, (2011). pp. 5-43 https://dx.doi.org/10.15863/TAS.2022.07.111.25

15. Pozin M.E. Tehnologiya mineralnyh solei (udobrenii, pestitsidov, promyşlennyh solei i kislot): Uchebnik dlya vuzov / M.E. Pozin. - L.: Himiya, 1961. - 791 s.

16. V.P. Jivopistsev. Analiticheskaya himiya tsinka / V.P. Jivopistsev, E.A. Selezneva. - M.: «Nauka» 1975.

17. İ.N. Kuzminyh, S.L. Lyubalina, Him.prom., № 12, 358-1950.

18. YA.A.Fialkov, Z.A.Şeka, JNH, 1, №6, 1238-1956.

19. A.A. Salin, M.E. Syroeşkin, Elektroliz sernokislogo tsinka, Gosmetallurgizdat, 1959.

20. S.A.Titov, Vущelachivanie i elektroliz tsinka, Gosmetallurgizdat, 1943.

21. M.V. Katalymov, sb. «İssledovaniya po prikladnoi himii», İzd. AN SSSR, 1955, str.325.

22. S.İ.Volfkovich, sb. «Mikroelementy v jizni rastenii i jivotnyh», İzd. An SSSR, 1952.

23. GOST 8723-82 Kuporos tsinkovyi. Tehnicheskie usloviya

24. Neorganicheskie produkty. «Evraziiskii himicheskii rynok» № 04 (151), 2017, S. 27-31.
25. Duktova N.A., Masterov A.S., Ravkov E.V. Vvedenie v agrarnye professii: uchebno-metodicheskoe posobie. Osnovy selskohozyaistvennogo proizvodstva: agronomiya // V 3 ch. Ch. 3. - Gorki: BGSHA, 2020. - C. 139-145.
26. Lapa V.V., Emelyanova V.N., Leonov F.N., Rak M.V., Zolotar A.K., Şibanova İ.V., Brilev M.S., Yurgel, Borodin P.V. Sistema primeneniya udobrenii: uchebnoe posobie dlya studentov uchrejdenii vysşego obrazovaniya po spetsialnostyam «Agrohimiya i pochvovedenie», «Zaщita rastenii i karantin» // [i dr.]; pod red. V.V. Lapy - Grodno: GGAU, 2011. - S. 335-350.
27. V.A. Kurakin, JHP, № 1325-1941
28. Sposob polucheniya monogidrata sulfata tsinka iz otrabotannoi kisloty i otrabotannogo tsinkovogo şlaka Published 2015, Environmental Science
29. Diego Herrero, P.L. Arias, M.B. Güemez Hydrometallurgical process development for the production of azincsulphateliquor suitable for electro winning , Minerals Engineering 23(6):511-517(2010) https://doi.org/10.1016/j.mineng.2010.01.010
30. Pat.Kazahstan 29248 (2014)
31. İ.L. Peisahov, sb. «Obogaщenie i chistka gazov tsvetnoi metallurgii», Gosmetallurgizdat, 1953.
32. S.İ.Volfkovich, F.G. Margolis, İzv. AN SSSR. OHN, 5, 322-1942; JPH, 28, №5, 453-1955.
33. V.İ.Smirnov, A.İ. Tihonov, Objig mednyh rud i kontsentratov, Gosmetallurgizdat, 1958.
34. V.V. Pechkovskii, JPH, 30, №11, 1579-1957.
35. V.V. Pechkovskii, Uch. zap. Permsk. gos. un-ta, 17, №1, 91-1960.
36. T.G. Ahmetov Himicheskaya tehnologiya neorganicheskih veщestv: uchebnoe posobie/ T.G. Ahmetov, R.T. Porfireva, L.G. Gaisin i dr., - M.: Vysş. şk., 2002. - 688 s.

РЕЗЮМЕ

Мировое истощение запасов первичного сырья требует перевода технологий на использование вторичного сырья, создания малоотходных технологий, основой которых является рациональное использование всех компонентов сырья в замкнутом цикле. Эта задача может быть решена при применении технологий комплексного использования и глубокой переработки минерального и техногенного сырья, а также технологий утилизаций техногенных промпродуктов и отходов различных производств, в том числе металлургического производства. В данной статье рассмотрены методы получения моногидрата сульфата цинка путем кислотной переработки основных промышленных отходов цинкового производства. Выщелачивание отходов представляет собой процесс извлечения металлов из твердых веществ в раствор с применением серной кислоты или её производных, а также растворов аммиака в качестве растворителей.

ӘОЖ: 62.21474
ҒТАМР: 52.47.19

Мурзагалиева А.А., техника ғылымдарының магистрі, аға оқытушы, https://orcid.org/0000-0001-8339-0590
«Жәңгір хан атындағы Батыс Қазақстан аграрлық-техникалық университеті» КеАҚ, Жәңгір хан 51, Орал қаласы, Қазақстан Республикасы, alma_7121972@mail.ru

Murzagalieva A.A., Master of Technical Sciences, senior lecturer, **the main author**, https://orcid.org/0000-0001-8339-0590,
NJSC «West Kazakhstan Agrarian and Technical University named after Zhangir khan», Uralsk, st. Zhangir khan 51, 090009, Kazakhstan, alma_7121972@mail.ru

МҰНАЙ-ГАЗ САЛАСЫНДА СҮЗУ ЖҮЙЕСІНДЕГІ ҮЙКЕЛІС КОЭФФИЦИЕНТІН ТӨМЕНДЕТУ

REDUCING THE COEFFICIENT OF FRICTION IN THE FILTRATION SYSTEM IN THE OIL AND GAS INDUSTRY

АННОТАЦИЯ

Үйкеліс-бұл мұнай-газ жабдығының жұмысы мен тиімділігіне әсер ететін маңызды құбылыстардың бірі. Мұнай және газ кен орындарына тән экстремалды температура, қысым және агрессивті химиялық орта жағдайында үйкеліс жабдықтың жұмыс процесінде шешуші рөл атқарады, жұмыс тиімділігін төмендетеді, бөлшектердің тозуын және пайдалану шығындарын арттырады. Үйкеліске байланысты проблемалар әр түрлі жабдықтарға, соның ішінде сорғыларға, бұрғылау қондырғыларына, клапандарға, компрессорларға және көлік жүйелеріне қатысты болуы мүмкін. Бұл процестердің жабдықтың беріктігі мен өнімділігіне қалай әсер ететінін және осы мәселелерді шешуге қандай әдістер мен материалдар көмектесетінін түсіну маңызды.

Үйкеліс мұнай-газ жабдықтарының барлық негізгі компоненттеріне тікелей әсер етеді. Мұнай-газ саласында сүзу процесі бұрғылау сұйықтықтары мен өндірістік суларды бөлшектерден тазартуда маңызды рөл атқарады, бұл жұмыс күшінің тиімділігі мен қауіпсіздігіне айтарлықтай әсер етеді. Сүзу процесі бұрғылау сұйықтықтары мен өндірістік суларды бөлшектерден тазартуда маңызды рөл атқарады, бұл ұңғымалар мен жабдықтардың тиімділігі мен қауіпсіздігіне айтарлықтай әсер етеді. Негізгі мәселелердің бірі-сүзу жүйелеріндегі үйкелістен туындаған жоғары ағынға төзімділік, бұл қысымның жоғалуына және жабдықтың өнімділігінің төмендеуіне әкеледі. Мақалада эксперименттік зерттеулерді қолдана отырып, мұнай-газ өнеркәсібінде қолданылатын сүзу жүйелеріндегі үйкеліс коэффициентін төмендету әдістері қарастырылады. Сүзгі материалдарының өнімділігін жақсарту, химиялық қоспаларды қолдану және сүзгі геометриясын оңтайландыру сияқты әртүрлі әдістер қарастырылады.

ANNOTATION

Friction is one of the most significant phenomena affecting the operation and efficiency of oil and gas equipment. In the extreme temperatures, pressures, and aggressive chemical environments typical of oil and gas fields, friction plays a key role in the operation of equipment, increasing wear on parts, reducing work efficiency, and increasing operating costs. Friction-related problems can affect various types of equipment, including pumps, drilling rigs, valves, compressors, and transportation systems. It is important to understand how these processes affect the durability and performance of equipment, as well as what methods and materials can help solve these problems.

Friction has a direct impact on all key components of oil and gas equipment. In the oil and gas industry, the filtration process plays an important role in cleaning drilling fluids and industrial waters from solid particles, which significantly affects the efficiency and safety of wells and equipment. One of the key problems is the high flow resistance caused by friction in filtration systems, which leads to increased pressure losses and reduced equipment performance. The article discusses methods for reducing the coefficient of friction in filtration systems used in the oil and gas industry using experimental research. Various methods are being

considered, such as improving the characteristics of filter materials, using chemical additives, and optimizing filter geometry.

Түйін сөздер*: үйкеліс коэффициенті, сүзу, мұнай-газ сферасы, бұрғылау сұйықтықтары, сүзгі материалдары, майлау қоспалары, қысымның жоғалуы.*

Keywords: *coefficient of friction, filtration, oil and gas industry, drilling fluids, filtration materials, lubricants, pressure loss.*

Кіріспе. Мұнай-газ өнеркәсібі ең күрделі және жоғары технологиялық салалардың бірі болып табылады, мұнда жабдықтың тиімділігі көптеген факторларға, соның ішінде тозуға төзімділікке, үйкеліске және коррозияға байланысты. Төтенше температура, қысым және қатты химиялық заттар жағдайында маңызды аспект осындай қатаң пайдалану жағдайларына төтеп бере алатын материалдарды таңдау болып табылады. Соңғы онжылдықтарда графен, көміртекті нанотүтікшелер және көміртекті нанобөлшектер сияқты көміртекті наноматериалдарға ерекше назар аударылды, олар өздерінің ерекше трибологиялық қасиеттерімен танымал болды. Бұл материалдар мұнай-газ жабдықтарының өнімділігін едәуір жақсарта алатын жаңа технологиялардың негізіне айналады. Мұнай-газ саласында қолданылатын жабдық үнемі жоғары механикалық жүктемелерге, химиялық агрессивті заттарға және экстремалды температураға ұшырайды. Трибология мәселелері (үйкеліс, тозу және майлау) негізгі көздер болып табылады. Шамадан тыс тозу мен үйкеліс жиі бұзылуларға, техникалық қызмет көрсету шығындарының өсуіне және өнімділіктің айтарлықтай жоғалуына әкеледі.

Мұнай-газ жабдығының сенімділігі мен беріктігін жақсарту үшін осы мәселелермен тиімді күресетін және тозуға төзімділікті арттыратын, үйкелісті азайтатын және химиялық әсерлерге төзімділікті жақсартатын материалдарды пайдалану қажет.

Мұнай-газ саласында бұрғылау сұйықтықтары мен суды бөлшектерден сүзу сорғы жабдықтарының үздіксіз жұмыс істеуін қамтамасыз ету, ұңғымалардың бітелуін болдырмау және құбырлардағы қысымның жоғалуын азайту үшін маңызды рөл атқарады. Дегенмен, сүзу жүйелерінің тиімділігіне әсер ететін негізгі факторлардың бірі-үйкеліс коэффициенті, ол қысымның айтарлықтай жоғалуын тудырады және сүзу процесіне энергия шығынын арттырады [1].

Үйкеліс коэффициентін төмендетудің тиімді әдістерін қолдану сүзу жүйелерінің өнімділігін арттыруға, сорғылар мен фильтрация өнімділігін жақсартуға мүмкіндік береді

Бұл зерттеудің мақсаты-мұнай-газ саласындағы сүзу жүйелеріндегі үйкеліс коэффициентіне әртүрлі факторлардың әсерін анықтау және оны эксперименттік зерттеулер арқылы азайту әдістерін ұсыну.

Мұнай-газ жабдығында трибологиялық сипаттамаларды жақсартуда көміртекті наноматериалдарды қолдану технологиясы: мұнай-газ өнеркәсібі көптеген техникалық қиындықтарға тап болады, олардың ішіндегі ең маңыздыларының бірі-жұмыс беттері арасындағы үйкелістен туындаған жабдықтың тозуы. Жабдықты пайдалану кезінде кездесетін жоғары температура, қысым және химиялық әсерлер жағдайында трибологиялық мәселелерді шешу техниканың беріктігі мен сенімділігін арттыру үшін өте маңызды болады. Соңғы жылдары графен, көміртекті нанотүтікшелер (CNT) және көміртекті нанобөлшектер сияқты көміртекті наноматериалдарға ерекше назар аударылды, олар мұнай-газ жабдықтарының трибологиялық сипаттамаларын едәуір жақсарта алатын ерекше қасиеттерге ие.

Мұнай-газ жабдықтарындағы трибологиялық проблемалар: мұнай-газ саласындағы жабдық жоғары жүктемелер, жоғары температура және агрессивті химиялық заттар жағдайында пайдаланылады, бұл жұмыс беттерінің айтарлықтай тозуына әкеледі.

Бөлшектер арасындағы шамадан тыс үйкеліс оларды зақымдауы мүмкін, бұл жабдықтың қызмет ету мерзімін қысқартады және техникалық қызмет көрсету шығындарын арттырады. Дәстүрлі майлау және жабу материалдары көбінесе мұндай төтенше жағдайларды жеңе алмайтынын ескеру маңызды, бұл трибология мәселесін ерекше өзекті етеді.

Бұл мәселелерді шешу үшін жабдықтың осы агрессивті жағдайларға төзімділігі мен тұрақтылығын қамтамасыз ететін жаңа тәсілдер мен материалдар қажет.

Көміртекті наноматериалдардың артықшылықтары: графен және көміртекті нанотүтікшелер сияқты көміртекті наноматериалдардың бірқатар ерекше қасиеттері бар, бұл оларды мұнай-газ саласында қолдануға өте ыңғайлы етеді:

Төмен үйкеліс коэффициенті: графен және көміртекті нанотүтікшелер үйкеліске қарсы тамаша өнімділікке ие. Мысалы, графен әдеттегі майлағыштармен салыстырғанда үйкеліс коэффициентін 50-70% төмендетуі мүмкін [2-3].

Жоғары тозуға төзімділік: көміртекті наноматериалдар материалдардың тозуға төзімділігін едәуір арттыра алады, бұл сорғылар, мойынтіректер, клапандар және құбырлар сияқты жоғары механикалық әсер ететін бөлшектер үшін маңызды.

Ыстыққа төзімділік және химиялық инерттілік: графен және көміртекті нанотүтікшелер жоғары температура мен химиялық әсерлерге төзімді, бұл әсіресе жоғары температура, қатты сұйықтықтар мен газдар жағдайында жұмыс істейтін жабдық үшін өте маңызды.

Төмен тығыздық және жоғары беріктік: бұл материалдар төмен беріктігі бар жоғары беріктікке ие.

Мұнай-газ жабдығында көміртекті наноматериалдарды қолдану технологиясы: 1. майлау сұйықтықтарына көміртекті наноматериалдарды қосу.

Көміртекті наноматериалдарды қолданудың ең тиімді әдістерінің бірі-оларды майлау сұйықтықтарының құрамына қосу. Графен және көміртекті нанотүтікшелер сияқты көміртекті материалдардың нанобөлшектері үйкеліс пен тозуды азайта отырып, бөлшектердің бетінде қорғаныс қабығын құруға мүмкіндік беретін ерекше қасиеттерге ие.

Жұмыс жасау принципі: көміртекті материалдардың нанобөлшектері бетінде үйкелісті азайта отырып, қатты және жұмсақ бет арасындағы жанасуды азайтатын қорғаныс пленкасын жасайды. Олар сондай-ақ майлау молекулаларымен әрекеттесіп, оның үйкеліске қарсы қасиеттерін жақсартады және майлаудың қызмет ету мерзімін арттырады.

Артықшылықтары: көміртекті наноматериалдар қосылған майлар үйкеліс коэффициентін айтарлықтай төмендетеді, бұл тозудың төмендеуіне, температураның төмендеуіне және жабдықтың жалпы тиімділігінің жоғарылауына әкеледі.

Бөлшектерді жабу үшін көміртекті наноматериалдарды пайдалану: тағы бір бағыт-көміртекті наноматериалдарды жабдық бөліктерінің бетінде қорғаныс жабындарын жасау үшін пайдалану. Бұл жабындар жұмыс бөліктерін тозудан, коррозиядан және термиялық бұзылудан қорғау үшін пайдаланылуы мүмкін.

Жұмыс принципі: көміртекті наноматериалдарға негізделген жабындар бетті механикалық тозудан қорғайтын, коррозияны болдырмайтын және жоғары температура мен қатты химиялық заттардың әсерінен де материалдың беріктігін сақтайтын берік және тұрақты қабат құрайды [3-4].

Артықшылықтары: мұндай жабындар жабдық бөлшектерінің ұзақ қызмет ету мерзімін қамтамасыз етеді, техникалық қызмет көрсету қажеттілігін азайтады және экстремалды жұмыс жағдайында тұрақты жұмысты қамтамасыз етеді.

Көміртекті нанотүтікшелерге негізделген композициялық материалдар. Композициялық материалдарға (металл, полимер немесе керамика) көміртекті

нанотүтікшелерді қосу олардың беріктігі мен тозуға төзімділігін едәуір арттыруға мүмкіндік береді. Мұндай композиттерді мойынтіректер, тығыздағыштар, втулкалар, жіптер және құбырлар сияқты мұнай-газ жабдықтарының әртүрлі бөліктерін жасау үшін пайдалануға болады.

Наноматериалдары бар интеллектуалды жабындар.Көміртекті наноматериалдарды қамтитын "интеллектуалды жабындар" технологиялары өзгермелі жұмыс жағдайларына бейімделетін жабындарды жасауға мүмкіндік береді. Мысалы, температура көтерілгенде немесе механикалық әсер еткенде, мұндай жабындар үйкеліс пен тозуды оңтайландыру үшін қасиеттерін өзгерте алады [4-5].

Жұмыс принципі: бұл жабындар сыртқы жағдайлар өзгерген кезде тұтқырлығын, құрылымын немесе тығыздығын өзгерте алады, жұмыс жағдайында ең жақсы трибологиялық сипаттамаларды қамтамасыз етеді. Артықшылықтары: көміртекті наноматериалдары бар интеллектуалды жабындар жабдықтың қызмет ету мерзімін ұзартады, энергия шығынын азайтады және жалпы жұмыс тиімділігін жақсартады.

Мұнай-газ жабдығында көміртекті наноматериалдарды қолданудың артықшылықтары: үйкеліс коэффициентін төмендету: бұл көміртекті наноматериалдарды пайдаланудың ең айқын артықшылықтарының бірі және үйкеліс шығындарын азайтуға және жабдықтың жалпы тиімділігін арттыруға көмектеседі.

Қызмет ету мерзімін ұзарту: тозуды азайту және қатты химиялық әсерлерге төзімділікті жақсарту жабдықтың қызмет ету мерзімін ұзартады, бұл бөлшектерді жөндеу және ауыстыру қажеттілігін азайтады.

Ыстыққа төзімділікті арттыру: көміртекті наноматериалдар жоғары температураға төзімді, бұл әсіресе мұнай-газ саласында жоғары температурада жұмыс істейтін компоненттер үшін өте маңызды.

Техникалық қызмет көрсету шығындарын азайту: тозуды азайту және Жабдықтың сенімділігін арттыру техникалық қызмет көрсету мен бөлшектерді ауыстыру шығындарын азайтуға мүмкіндік береді.

Мұнай-газ жабдығында көміртекті наноматериалдарды пайдалану трибологиялық өнімділікті жақсартудың озық және тиімді әдісін ұсынады. Бұл материалдар майлау қасиеттерін едәуір жақсартуға, тозуға төзімділікті арттыруға, үйкеліс коэффициентін төмендетуге және жабдықтың қызмет ету мерзімін ұзартуға қабілетті. Көміртекті наноматериалдарды пайдаланатын технологиялар мұнай-газ қондырғыларының тиімділігі мен сенімділігін арттыру үшін жаңа мүмкіндіктер ашады, бұл пайдалану шығындарын азайтуға және өндірістің жалпы қауіпсіздігін жақсартуға ықпал етеді [4-5].

Зерттеу материалдары мен әдістері. Сүзу жүйелеріндегі үйкеліс коэффициенті сүзгі элементі арқылы сұйықтықтың немесе газдың қозғалысына қарсылық күшінің сүзгі бетіне әсер ететін қалыпты күшке қатынасы ретінде анықталады. Бұл коэффициент бірнеше факторларға байланысты:

1.Сүзгі материалының түрі: сүзгі беті, кеуектілігі, тегістігі.

2.Сүзілетін сұйықтықтың физикалық-химиялық қасиеттері: тұтқырлығы, тығыздығы, бөлшектердің болуы.

3.Ағын режимі: турбулентті немесе ламинарлы.

4.Температура және қысым шарттары.

Үйкеліс коэффициентінің жоғары мәні қысымның айтарлықтай жоғалуына әкелуі мүмкін, бұл сүзу жүйесінің тиімділігін нашарлатады. Бұл шығындарды азайту және сүзу жүйесінің жұмысын жақсарту үшін әртүрлі әдістер қолданылады, мысалы, үйкеліс коэффициентін төмендететін материалдарды таңдау, майлау қоспаларын қолдану және сүзгі дизайнын оңтайландыру [6-7].

Эксперименттік зерттеулер мұнай-газ жабдықтарының зертханасында бұрғылау процестерінің нақты жағдайларын имитациялайтын сүзу жүйелерін қолдана отырып жүргізілді. Зерттеулер келесі кезеңдерді қамтыды:

1. Сүзгі қондырғысының құрылысы: қондырғы әр түрлі сүзгі материалдары бар сүзгіден, сұйықтықты тұрақты жылдамдықпен беретін сорғы станциясынан, қысымды өлшеу жүйесінен және шығын өлшегіштерден тұрады.
2. Сүзгі материалдарын таңдау: әртүрлі материалдары бар сүзгілер қолданылды, мысалы:

- әр түрлі беткі құрылымы бар полиэтилен сүзгілері.
- тот баспайтын болаттан жасалған сүзгілер әр түрлі беттік кедір-бұдырлармен.
- белсендірілген көмір сүзгілері.

3. Майлау қоспаларын қолдану: сүзілетін сұйықтыққа сұйықтықтың тұтқырлығын өзгертетін және үйкелісті азайтатын полимерлі эмульсиялар сияқты әртүрлі химиялық қоспалар қосылды.
4. Қысымның жоғалуын өлшеу: қысым датчиктерінің көмегімен эксперименттің әртүрлі кезеңдерінде сүзгіге дейінгі және кейінгі қысымның жоғалуы өлшенді.
5. Үйкеліс коэффициентін өлшеу: үйкеліс коэффициенті Дарси-Вайсбахтың стандартты формуласымен, сондай-ақ сүзгі жүйелеріндегі қысымның жоғалуын өлшеу арқылы есептелді [8-9].

Зерттеу нәтижелері және талдаулар. 1-тәжірибе: сүзгі материалының түрінің үйкеліс коэффициентіне әсері:

Бірінші эксперимент бойынша әр түрлі өрескел және беткі құрылымы бар әр түрлі сүзгі материалдары қолданылды. Сұйықтықтың тұтқырлығы бұрғылау сұйықтығының жұмыс жағдайларын имитациялай отырып, 10 сП деңгейінде орнатылды.

Қысым жоғалту сүзгі материалы (Па) үйкеліс коэффициенті

Тот баспайтын болат (тегіс беті) 190 0.28

Полиэтилен (тегіс беті) 150 0.22

Белсендірілген көмір сүзгісі 120 0.18

Нәтижелер тегіс бетті сүзгілер (полиэтилен және белсендірілген көмір) қысымның аз шығынын қамтамасыз ететінін және тот баспайтын болатпен салыстырғанда үйкеліс коэффициенті төмен екенін көрсетті[10-12].

2-тәжірибе: майлау қоспаларының үйкеліс коэффициентіне әсері:

Бұл эксперимент сүзу жүйесіндегі үйкеліс коэффициентіне әсерін бағалау үшін полимерлі эмульсиялар мен графит қоспалары сияқты әртүрлі майлау қоспаларын қолданды.

Кесте 1 - Майлау қоспаларының үйкеліс коэффициентіне әсері

Қоспа түрі	**Қысымның жоғалуы (Па)**	**Үйкеліс коэффициенті**
Қоспасыз	200	0.30
Полимерлі эмульсия	130	0.19
Графитті қоспа	140	0.20

Нәтижелер полимерлі эмульсияны қосу қысымның жоғалуын және үйкеліс коэффициентін айтарлықтай төмендететінін көрсетті, ал графит қоспасы да жақсарғанын көрсетеді, бірақ аз дәрежеде.

3-тәжірибе: Температура мен ағын жылдамдығының әсері

Температура мен ағын жылдамдығы үйкеліс коэффициентіне де әсер етті. Температура жоғарылаған сайын сұйықтықтың тұтқырлығы төмендейді, бұл үйкелісті

азайтуға көмектеседі. Ағын жылдамдығының әсері турбулентті ток кезінде анағұрлым маңызды болды.

Кесте 2 - Температура мен ағын жылдамдығының әсері

Температура (°C)	Қысым жоғалуы (Па)	Үйкеліс коэффициенті
20	180	0.28
40	150	0.23
60	130	0.20

4-тәжірибе: Сүзгі материалдары мен қоспалардың аралас әсері

Сүзгі материалдары мен майлау қоспаларының аралас әсерін тексеру үшін полимерлі эмульсия қосылған полиэтилен сүзгілерін қолданатын қосымша тәжірибелер жүргізілді.

Кесте 3 - Сүзгі материалдары мен қоспалардың аралас әсері

Фильтр + Қоспа	Қысым жоғалуы (Па)	Үйкеліс коэффициенті
Полиэтилен + қоспасыз	150	0.22
Полиэтилен + полимерлі эмульсия	100	0.14

Полимерлі эмульсиялы полиэтилен сүзгілерін біріктіріп қолдану қысымның ең аз жоғалуын және үйкеліс коэффициентінің төмендеуін қамтамасыз ету арқылы жақсы нәтиже берді[10-14].

Қорытынды. Мұнай-газ жабдықтарында көміртекті наноматериалдарды қолдану технологиясы тозу, үйкеліс және коррозия сияқты трибологиялық мәселелерді шешуде маңызды қадам болып табылады. Графенді, көміртекті нанотүтікшелерді және басқа наноматериалдарды пайдалану жабдықтың қызмет ету мерзімін ұзарту, техникалық қызмет көрсету шығындарын азайту және жұмыс тиімділігін арттыру арқылы өнімділігін айтарлықтай жақсартуға мүмкіндік береді. Осы технологияларды енгізу мұнай-газ саласының дамуына ықпал етеді және күрделі пайдалану жағдайлары үшін неғұрлым сенімді және берік материалдар жасау үшін жаңа мүмкіндіктер ашады.

Эксперименттердің нәтижелері мұнай-газ саласындағы сүзу жүйесіндегі үйкеліс коэффициентін төмендету үшін полиэтилен және белсендірілген көмір сияқты төмен үйкеліс сүзгі материалдарын таңдау маңызды аспект екенін көрсетті. Полимерлі эмульсиялар сияқты майлау қоспаларын қосу қысымның жоғалуын және үйкеліс коэффициентін айтарлықтай төмендетеді. Бұл сүзу жүйесінің жалпы тиімділігін арттыруға, энергия шығынын азайтуға және жабдықтың қызмет ету мерзімін ұзартуға әкелуі мүмкін.

Зерттеу нәтижесінде мұнай-газ саласы үшін сүзу жүйелеріндегі үйкеліс коэффициентін төмендетудің тиімді әдістері ұсынылды. Төмен үйкелісті сүзгі материалдарын пайдалану және сүзілетін сұйықтыққа майлау қоспаларын қолдану қысымның жоғалуын азайтуға көмектеседі, бұл сүзу жүйелерінің жұмысын жақсартады және пайдалану шығындарын азайтады. Зерттеу нәтижелерін сүзгі конструкцияларын оңтайландыру және олардың мұнай-газ өнеркәсібіндегі тиімділігін арттыру үшін пайдалануға болады [10-12].

ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

1. Әбділманов Қ. Б. Мұнай-газ өндірісінің технологиясы / Қ. Б. Әбділманов. – Алматы : Қазақ ұлттық техникалық университеті, 2011. – [10-25].

2. Аманжолов Ә. Б., Абдуллин Б. М., Садуақасов Ж. Н. Сүзу жүйелері: теория және практика / Ә. Б. Аманжолов. – Алматы : Қазақ университеті, 2010. – [10-20].

3. Федоров А. А. Механикалық инженериядағы үйкеліс / А. А. Федоров. – Москва: Машиностроение, 1981. – [32-50].

4. Darcy H. Les fontaines publiques de la ville de Dijon. – Paris: Dalmont, 1856. – [10-17].

5. Batchelor G. K. An introduction to fluid dynamics. – Cambridge: Cambridge University Press, 2000. – [5-12].

6. Schlichting H. Boundary-layer theory. – Berlin : Springer, 2000. – [4-10].

7. Сорокин А. П. Физико-химические основы процессов фильтрации в нефтегазовой отрасли. – Москва: Изд-во МГУ, 2014. – [12-25].

8. Гусев И. И. Инженерные методы снижения сопротивления в трубопроводах нефтегазовых систем. – Санкт-Петербург: Нефтегазовая книга, 2016. – [14-27].

9. Лебедев В. К. Наноматериалы для повышения эффективности фильтрации и снижения коэффициента трения // Нефтегазовая отрасль. – 2013. – № 5. – С. 42–47.

10. Khademi M., et al. Friction reduction techniques in oil and gas filtration systems // Journal of Petroleum Science and Engineering. – 2018. – Vol. 169. – P. 115–126.

11. Петров Н. А. Проблемы и решения по повышению эффективности фильтрации в нефтегазовых скважинах // Нефтегазовый вестник. – 2015. – № 8. – С. 32–38.

12. Chen X., Wang L. Influence of flow dynamics on friction in filtration systems // Energy & Fuels. – 2020. – Vol. 34, № 4. – P. 2359–2368.

13. Кузнецов В. В. Технологии снижения сопротивления потоку в трубопроводах и фильтрационных системах. – Новосибирск: СибНТУ, 2017. – [14-26.].

14. Михайлов О. В. Влияние состава фильтрующих материалов на коэффициент трения в нефтегазовых фильтрационных системах // Нефтяная промышленность. – 2019. – № 11. – С. 85–90.

REFERENCES

1. Әbdilmanov Қ. B. Mұnaj-gaz өndirisiniң tehnologijasy / Қ. B. Әbdilmanov. – Almaty : Қazaқ ұlttyқ tehnikalyқ universiteti, 2011. – [10-25].

2. Amanzholov Ә. B., Abdullin B. M., Saduaқasov Zh. N. Sүzu zhүjeleri: teorija zhәne praktika / Ә. B. Amanzholov. – Almaty : Қazaқ universiteti, 2010. – [10-20].

3. Fedorov A. A. Mehanikalyқ inzhenerijadaғy үjkelis / A. A. Fedorov. – Moskva : Mashinostroenie, 1981. – [32-50].

4. Darcy H. Les fontaines publiques de la ville de Dijon. – Paris : Dalmont, 1856. – [10-17].

5. Batchelor G. K. An introduction to fluid dynamics. – Cambridge : Cambridge University Press, 2000. – [5-12].

6. Schlichting H. Boundary-layer theory. – Berlin : Springer, 2000. – [4-10].

7. Sorokin A. P. Fiziko-himicheskie osnovy processov fil'tracii v neftegazovoj otrasli. – Moskva: Izd-vo MGU, 2014. – [12-25].

8. Gusev I. I. Inzhenernye metody snizhenija soprotivlenija v truboprovodah neftegazovyh sistem. – Sankt-Peterburg: Neftegazovaja kniga, 2016. – [14-27].

9. Lebedev V. K. Nanomaterialy dlja povyshenija jeffektivnosti fil'tracii i snizhenija kojefficienta trenija // Neftegazovaja otrasl'. – 2013. – № 5. – S. 42–47.

10. Khademi M., et al. Friction reduction techniques in oil and gas filtration systems // Journal of Petroleum Science and Engineering. – 2018. – Vol. 169. – P. 115–126.

11. Petrov N. A. Problemy i reshenija po povysheniju jeffektivnosti fil'tracii v neftegazovyh skvazhinah // Neftegazovyj vestnik. – 2015. – № 8. – S. 32–38.

12. Chen X., Wang L. Influence of flow dynamics on friction in filtration systems // Energy & Fuels. – 2020. – Vol. 34, № 4. – P. 2359–2368.
13. Kuznecov V. V. Tehnologii snizhenija soprotivlenija potoku v truboprovodah i fil'tracionnyh sistemah. – Novosibirsk : SibNTU, 2017. – [14-26.].
14. Mihajlov O. V. Vlijanie sostava fil'trujushhih materialov na kojefficient trenija v neftegazovyh fil'tracionnyh sistemah // Neftjanaja promyshlennost'. – 2019. – № 11. – S. 85–90.

РЕЗЮМЕ

Трение - это одно из самых значительных явлений, влияющих на эксплуатацию и эффективность работы нефтегазового оборудования. В условиях экстремальных температур, давлений и агрессивных химических сред, характерных для нефтяных и газовых месторождений, трение играет ключевую роль в процессе работы оборудования, повышая износ деталей, снижая эффективность работы и увеличивая эксплуатационные расходы. Проблемы, связанные с трением, могут касаться различных типов оборудования, включая насосы, буровые установки, клапаны, компрессоры и транспортные системы. Важно понимать, как эти процессы влияют на долговечность и производительность оборудования, а также какие методы и материалы могут помочь в решении этих проблем.

Трение оказывает непосредственное влияние на все ключевые компоненты нефтегазового оборудования. В нефтегазовой сфере процесс фильтрации играет важную роль в очистке буровых жидкостей и промышленных вод от твердых частиц, что значительно влияет на эффективность и безопасность работы скважин и оборудования. Одной из ключевых проблем является высокое сопротивление потоку, вызванное трением в фильтрационных системах, что ведет к увеличению потерь давления и снижению производительности оборудования. В статье рассматриваются методы снижения коэффициента трения в системах фильтрации, используемых в нефтегазовой промышленности, с применением экспериментальных исследований. Рассматриваются различные методы, такие как улучшение характеристик фильтрующих материалов, использование химических добавок и оптимизация геометрии фильтров.

УДК 55.3179
МРНТИ 38.21.17

Купешова А.С., ст. преподаватель, https://orcid.org/0000-0002-6888-7619
НАО «Западно-Казахстанский аграрно-технический университет имени Жангир хана», г. Уральск, Республика Казахстан, г. Уральск, ул. Жангир хана 51, e-mail kupeshova.altynay@mail.ru

КОНЦЕПЦИЯ ТЕРРЕЙНОВ - КАК МЕТОД РЕГИОНАЛЬНОГО ТЕКТОНИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ОРОГЕННЫХ ПОЯСОВ С ПОЗИЦИИ ТЕКТОНИКИ ПЛИТ

THE CONCEPT OF TERRANES IS USED AS A METHOD OF REGIONAL TECTONIC ANALYSIS OF OROGENIC BELTS FROM THE PERSPECTIVE OF PLATE TECTONICS

АННОТАЦИЯ

Обобщение геологических данных при построении различных карт и моделей, таких как геологические, тектонические, палеогеографические или геодинамические, а также при создании стратиграфических колонок и структурных разрезов, предполагает

использование теоретических подходов, основанных на геосинклинальных или плитотектонических учениях. Эти теории служат основой для интерпретации процессов и взаимодействий в земной коре.

Важнейшим аспектом понимания геологического строения регионов и их эволюции является взгляд и подход исследователя, что может существенно влиять на трактовку данных. Особенно это касается таких ключевых объектов, как офиолиты и метаморфические породы, где необходимо учитывать тип и характер взаимодействия этих геологических тел. Важными аспектами являются интерпретация их геологического возраста, структуры и происхождения, что требует знаний не только о тектонических процессах, но и о более глубокого понимании процессов формирования и трансформации горных пород.

Такой подход помогает создать более точные и полные модели геологических процессов, а также учитывать разнообразие факторов, влияющих на развитие земной коры, что в свою очередь содействует более глубокому пониманию исторического и тектонического контекста рассматриваемых объектов.

Следовательно, тщательный и аргументированный анализ этих и ряда других вопросов может либо подтвердить, либо полностью опровергнуть представления определённой концепции. Безусловно, развитие технической базы исследований, учет мирового опыта и, особенно, изучение современных геологических процессов играют ключевую роль в расшифровке геологического строения, тектоники и геодинамики древних складчатых областей. Наиболее сложными среди них являются регионы мозаично-блокового типа (тиррейны), классическим примером которых служат горные сооружения Центральной Азии, включая Алтае-Саянскую складчатую область и Восточный Казахстан.

ANNOTATION

Generalization of geological data in the construction of various maps and models, such as geological, tectonic, paleogeographic or geodynamic, as well as in the creation of stratigraphic columns and structural sections, involves the use of theoretical approaches based on geosynclinal or plitotectonic studies. These theories serve as the basis for interpreting processes and interactions in the Earth's crust.

The most important aspect of understanding the geological structure of regions and their evolution is the researcher's view and approach, which can significantly influence the interpretation of data. This is especially true for such key objects as ophiolites and metamorphic rocks, where it is necessary to take into account the type and nature of the interaction of these geological bodies. Important aspects are the interpretation of their geological age, structure and origin, which requires knowledge not only about tectonic processes, but also about a deeper understanding of the processes of formation and transformation of rocks.

This approach helps to create more accurate and complete models of geological processes, as well as to take into account the variety of factors influencing the development of the Earth's crust, which in turn contributes to a deeper understanding of the historical and tectonic context of the objects under consideration.

Therefore, a thorough and reasoned analysis of these and a number of other issues can either confirm or completely refute the ideas of a certain concept. Of course, the development of the technical base of research, taking into account world experience and, especially, the study of modern geological processes plays a key role in deciphering the geological structure, tectonics and geodynamics of ancient folded regions. The most complex among them are the mosaic-block type regions (tyrranes), a classic example of which are the mountain structures of Central Asia, including the Altai-Sayan folded region and Eastern Kazakhstan.

Ключевые слова: *офиолиты, тектоника, террейны, геодинамика, геология, рифтинг, коллизия, субдукция, мозаично-блоковый тип.*

Key words: *ophiolites, tectonics, terranes, geodynamics, geology, rifting, collision, subduction, mosaic-block type.*

Введение. Историзм – один из важнейших принципов естественнонаучных представлений. Пожалуй, наиболее важным в понятии историзма в континентальной геологии является историко-геологический принцип, лежащий в основе процессов картографирования – составления геологической карты, которая в графическом образе последовательно и систематически объединяет сведения о стратиграфии, биостратиграфии, литологии, тектонике (пликативной и дизъюнктивной), магматизме, метаморфизме, полезных ископаемых.

В разные годы и в разных странах учеными создавались и ныне создаются разные версии общегеологических – для Земли в целом – концепций [15]. И тем не менее из числа появлявшихся в разные годы концепций проверку временем выдержали только две – фиксизм (геосинклинально-платформенная) и мобилизм (тектоника литосферных плит). Важно отметить, что первая из них и более ранняя – геосинклинально-платформенная – создана в процессе изучения континентов, а вторая – тектоника плит – сформирована на основании изучения современных океанов, и эти концепции могут представлять собой по существу: первая – геологию континентов, а вторая – геологию океанов. Следует подчеркнуть, что сторонники геосинклинально-платформенной концепции не предпринимали попыток использовать ее для интерпретации истории развития современных океанов.

В последние десятилетия получили широкое признание концепции об определяющем значении горизонтальных тектонических движений в формировании структур, особенно линейных складчатых областей (Альпы, Карпаты, Аппалачи, Урал и др.). Относительно мозаично-блоковых областей эти прогрессивные идеи пробивают себе дорогу медленно и трудно.

А.Б. Дергуновым, А.А. Моссаковским, Н.Л. Добрецовым, Н.А. Берзиным и другими складчатые сооружения рассматривались как результат взаимодействия Палеоазиатской океанической плиты с Сибирским континентом.

В последнее время в Восточном Казахстане и Алтае - Саянской области получено много новых геологических данных (структурных, геохимических, геохронологических, палеонтологических и палеомагнитных), которые не только не укладываются в представления геосинклинального учения, но существенно дополняют и существующие плитотектонические построения для территории Центральной Азии. Горизонтальные движения оказались более сложными и многоэтапными, чем предполагали ранее исследователи исходя из представлений тектоники плит. Мозаично-блоковая структура рассматриваемых регионов может быть наиболее корректно и полно охарактеризована в рамках террейновой концепции плитной тектоники на основе геодинамического анализа.

Использование идей мобилизма при исследовании и анализе структуры Алтае-Саянского и Восточно-Казахстанского регионов привело к раскрытию важнейших особенностей их строения. Установлено, что офиолитовые и метаморфические пояса регионов участвуют в строении каледонских покровно-чешуйчатых и сдвиговых структур, а тектонические и петрологические процессы имеют закономерные пространственно-временные связи. Это привело к пересмотру тектонических и стратиграфических схем, представлений об эволюции складчатых областей.

Материалы и методы исследования. Концепция террейнов и, собственно, террейнология как метод регионального тектонического анализа орогенных поясов были разработаны в конце 70-годов американскими геологами, в основном Д.Л. Джонсом, П.

Кони и Дж. В. Монгером [Jones et al., 1983a, 1983b]. На основе данных по палеомагнетизму и распространению фауны ими впервые было отмечено, что значительная часть Аляски и Канадских Кордильер является «чужеродной» для Северо-Американского кратона и могла быть транспортирована на тысячи километров с юга. Позже появились палеомагнитные данные, свидетельствующие о кайнозойском крупномасштабном перемещении и быстром вращении больших участков земной коры внешней океанической окраины Кордильер. Американские геологи собрали, обобщили и проанализировали огромное количество данных по стратиграфии и палеонтологии, в частности по радиоляриям, и показали, что большая часть Кордильер, особенно их внешняя западная окраина, сложена тектоническими блоками размерами от десятков метров до десятков километров и что их исходное положение по отношению друг к другу и к Североамериканскому кратону трудно интерпретировать.

Касаемо территории Казахстана и Центральной Азии крупноамплитудные надвиговые структуры были поставлены в основу доминанты плитно-тектонической концепции. Большинство работ конца 70-х-80-х годов были посвящены этой проблеме. Древние надвиговые и покровные структуры в каледонидах Центральной Азии подверглись деформации, образуя складки, и их картирование оказалось затруднительным, поскольку они не соответствовали общепринятым признакам, характерным для молодых складчатых областей. Однако, несмотря на эти сложности, во многих районах региона были выявлены другие свидетельства горизонтальных движений, такие как олистостромы и меланжи. Структурно-вещественные комплексы, выделенные в рамках геосинклинальной концепции, были сопоставлены с геодинамическими единицами современных активных окраин Тихоокеанского региона. Этот актуалистический подход позволил рассматривать каледониды Центральной Азии как покровно-складчатые структуры, сформированные в результате преобразования венд-палеозойской океанической коры Палеоазиатского океана в аккреционно-коллизионные пояса, присоединившиеся к Сибирскому континенту.

Результаты исследования. На примере структур Горного Алтая и Восточного Казахстана этих регионов В.А. Кузнецовым (1954, 1958, 1963, 1966) и позже многими другими исследователями внедрено в практику тектонического районирования территории Центральной Азии выделение структурно-формационных зон и глубинных разломов, как основных структурно-вещественных элементов. Горный Алтай оставался единственным "бастионом", где традиционно сохранялись геосинклинальные представления, тогда как в соседних регионах (Западный и Восточный Саяны, Тува) уже во многом определился переход к мобилистским построениям.

Предлагается классифицировать террейны на три группы в зависимости от типа геодинамической обстановки их формирования:

- рифтинговые, возникающие при расколе континентов;
- коллизионные, образующиеся в результате разрушения окраинно-континентальных структур;
- субдукционные, формирующиеся при поглощении океанической литосферы.

Рифтинговые террейны

Эти террейны формируются в процессе рифтинга, когда участки земной коры откалываются от крупных континентов или являются результатом полного разделения континентальной массы. Первоначально их границы определяются сбросами, а впоследствии они, наряду с морфоструктурами океанической литосферы, интегрируются в складчатые зоны.

Современными примерами рифтинговых террейнов являются Ломоносовский хребет, Мадагаскар, Сейшельские острова, поднятие Лорд Хау, хребет Норфолк и побережье Ямато. В Альпийско-Гималайском складчатом поясе такие террейны

представлены от обширного Кимерийского континента, охватывающего значительную часть орогена, до небольших фрагментов Бриансонне в Альпах.

В каледонидах Центральной Азии к рифтинговым террейнам относятся Иссык-Кульский, Каратауский, Улутауский, Кокчетавский, Актау-Моинтинский, Тарбагатайский, Центрально-Тяньшаньский, Алтае-Монгольский, Тувино-Монгольский и другие. В дальнейшем рифтинговые террейны, наряду с океанической литосферой, вовлекаются в аккреционные зоны, а после закрытия океанов становятся частью внутриконтинентальных орогенных структур.

В результате детального геологического картирования были составлены тектонические схемы для ключевых участков, где широко распространены офиолиты и метаморфические породы, а также четко выражены крупнейшие разломы Алтая. К их числу относятся Чарский и Рудно-Алтайский (Восточный Казахстан), Чарышско-Инской (Северо-Западный Алтай), Уймонский и Катунский (Центральный Алтай), Телецкий и Курайский (Восточный Алтай).

Формирование каледонской структуры происходило в три этапа покровно-складчатых деформаций, приведших к образованию аккреционно-коллизионных зон: в конце раннего — начале среднего кембрия, в конце кембрия — начале ордовика и на границе силура и девона. В составе этих зон выделены фрагменты островных дуг, офиолитов, океанических поднятий и островов, которые представляли активную окраину Сибирского континента и литосферу Палеоазиатского океана.

Установлено, что так называемые «структурно-формационные зоны» соответствуют деформированным аккреционно-коллизионным структурам, а «глубинные разломы» представляют собой наиболее выраженные позднепалеозойско-мезозойские шовные сдвиговые структуры. В их состав входят породы каледонской аккреционно-коллизионной структуры и герцинского неоавтохтона, представленные в виде террейнов различного размера и меланжей.

Детальное картирование показало, что плоскости раннепалеозойских надвигов и разломов подверглись деформации, образуя складки, и, как правило, не были распознаны предыдущими исследователями. Это привело к ошибочным представлениям о тектонике, стратиграфии и палеогеографии региона. Большинство деформированных разломных плоскостей изначально представляли собой надвиги, по которым происходило совмещение толщ различных палеотектонических зон.

Среди них выделены террейны островных дуг, офиолитов, океанических поднятий и островов, представляющих окраино-континентальные комплексы Сибирского и Казахстанского континентов, а также литосферу Палеоазиатского океана, а также террейны, отколовшиеся от Гондванского суперконтинента. Палеомагнитные, структурные и геохронологические данные позволили оценить амплитуды, направленность и время проявления горизонтальных перемещений террейнов и построить геодинамические реконструкции.

Террейны, сформированные в результате коллизии

Сдвиговые процессы наиболее интенсивно проявляются в ходе столкновения крупных континентальных масс. В этот период террейны обычно образуют тектонические чешуи, которые возникают в результате регионального сдвига и впоследствии разрушаются под воздействием поперечных разломов или путем разделения (изоляции) сдвиговых дуплексов. При этом происходит реактивация более древних, параллельных и субпараллельных сегментов разломов. Сдвиги в зонах коллизий континентальных массивов более сложные из-за того, что они воздействуют на большие площади континентальной литосферы. Можно выделить два основных класса сдвигов, генерируемых процессами коллизии континентов: 1) сдвиги вдоль

структур и 2) сдвиги поперек коллидирующих масс, которые также могут пересекать структуры.

Сдвиги первого класса могут развиваться в результате наклонной («косой») коллизии (например, вдоль юго-восточной окраины Азии). Правосторонняя «косая» субдукция Индо-Австралийской плиты под Евразийский континент в палеоцене–эоцене привела к коллизии Индийского континента с Евразией с формированием сдвиговых структур в ее окраинной части и перемещению террейнов с амплитудой более 1000 км [Dobretsov et al., 1996].

Сдвиги второго класса образуют внутриконтинентальные трансформные разломы или их менее глубокие внутрилитосферные аналоги. В результате олигоцен-голоценовой «фронтальной» коллизии Индостана с Евразией сдвиговые деформации и сопутствующие им надвиги и зоны растяжения сформировали современную горную систему Центральной Азии [Buslov et al., 2008; Dobretsov et al., 1996; De Grave et al., 2007].

По масштабности проявления сдвигов в коллизионных орогенах можно выделить также два класса: 1) сдвиги, образующиеся в результате закрытия небольших океанов или там, где коллизии предшествует конвергенция под крутым углом к ранее существовавшим континентальным окраинам; 2) сдвиги коллизионных орогенов, образованных при столкновении континентальных масс в результате закрытия крупных океанов типа океанов Палеотетис и Палеоазиатского, где субдукция до коллизии была ориентирована по-разному к коллидирующим континентальным окраинам. Сдвиги первого класса вызывают меньшее разрушение, чем сдвиги второго. Оба класса структур представлены в орогенах и охарактеризованы в том числе в Альпах, каледонидах и герценидах Центральной Азии.

В результате образуются покровно-складчатые сооружения, в которых принимают участие террейны, принадлежащие различным окраинам континентальных массивов. По мере утолщения коры сопряженное сдвигообразование начинает играть более важную роль и может вызывать значительное разрушение ранее существовавших структур с формированием локальных зон растяжения.

Палеомагнитные, структурные и геохронологические данные позволили оценить амплитуды, направленность и время проявления горизонтальных перемещений террейнов и построить геодинамические реконструкции. Полученные результаты послужили основой для выделения тектонических рубежей в эволюции структуры Центральной Азии.

Решение проблем тектонического районирования и построение модели эволюции мозаично-блоковой структуры Алтае-Саянской области и Восточного Казахстана на новой методической основе с применением геодинамического анализа и террейновой концепции плитной тектоники. Для достижения этой цели решались следующие задачи:

- динамика и кинематика крупнейших разломов Алтае-Саянской области и Восточного Казахстана;
- обоснование выделения террейнов, образующихся в субдукционных и коллизионных обстановках;
- реконструкция на актуалистической основе последовательности геологических событий в формировании структуры областей мозаично-блокового типа;

Выводы. Главными структурными элементами Алтае-Саянского и Восточно-Казахстанского регионов являются: позднепалеозойские крупноамплитудные сдвиги, разделяющие террейны, представленные фрагментами каледонских и герцинских аккреционно-коллизионных зон Сибирского и Казахстанского континентов, и террейнами гондванской группы (Алтае-Монгольский и Чулышманский).

Сдвиговые деформации формируют коллаж террейнов, образованный в позднем девоне-раннем карбоне при столкновении Алтае-Монгольского и Чулышманского террейнов с Сибирским континентом и затем в позднем карбоне-перми при столкновении Казахстанского и Сибирского континентов. В результате коллизий аккреционно-коллизионные окраины континентов разделились сдвигами и сопряженными надвигами на множество тектоно-стратиграфических единиц, которые тектонически перемешались друг с другом, нарушив первичную палеогеографическую зональность.

Коллизия Казахстанского и Сибирского континентов в позднем карбоне-перми сопровождалась левосторонними перемещениями вдоль Чарской офиолитовой зоны, Иртышской и Северо-Восточной зон смятий. Возраст деформаций для каждого коллизионного этапа закономерно омолаживается в сторону внутренних частей Сибирского континента, амплитуда движений по сдвигам уменьшается в этом же направлении от первых тысяч до первых сотен километров. Общая ширина зоны деформаций составляет 1000-1500 км.

Горно-Алтайская островная дуга сформирована по аналогии с западно-тихоокеанской активной окраиной. В ней выделены поздневендско-раннекембрийская аккреционная призма, состоящая из субдукционного коллажа террейнов: офиолитов, океанических островов и поднятий; поздневендская примитивная островная дуга; кембрийская нормальная островная дуга и преддуговый прогиб. Коллизия океанических островов с островной дугой играла определяющую роль в выводе к поверхности высокобарических пород.

На основе корреляции структурных, геохимических, палеомагнитных, геохронологических и биостратиграфических данных выявлено:

- определяющую роль в формировании структуры мозаично-блоковых областей Восточного Казахстана и Алтае-Саянской области играли крупноамплитудные сдвиги (до нескольких тысяч км), проявившехся в два этапа: D3-C, и C2-P в результате коллизии, соответственно, Алтае-Монгольско-Чулышманского террейна с Сибирским континентом, Казахстанского и Сибирского континентов;
- широкое развитие каледонских покровно-чешуйчатых структур, деформированных сдвигами.
- возраст «выступов древнего основания» составляет в 400-380 млн. лет для Курайского зонального метаморфического комплекса востока Горного Алтая и в 370-340 млн лет для нарушающих его сдвиговых зон. Период проявления сдвиговых деформаций для Телецко-Башкаусской зоны смятия выявлены в 350-318 млн. лет. Возраст голубых сланцев Уймонской зоны определен как 455-400 млн. лет, метаморфических пород, связанных с Горно-Алтайской островной дугой – 630-520 млн. лет;
- офиолиты Горного Алтая разделяются на: 1) позднерифейско-раннекембрийские океанические в составе аккреционных призм в форме тектонических пластин и блоков, заключенных в серпентинитовые меланжи в ассоциации с высокобарическими породами, 2) венд-кембрийские островодужные в фундаменте развитых островных дуг с сохранением полных разрезов офиолитовой ассоциации, и 3) позднекембрийско-раннеордовикские океанические (засурьинская свита) в составе купноамплитудной Чарышско-Теректинской зоны сдвигов;

Таким бразом, новые данные позволяют утверждать, что структура Алтае-Саянского и Восточно-Казахстанского регионов создана в результате проявления разновозрастных крупноамплитудных горизонтальных движений. В связи с этим при изучении их геологического строения нужно использовать комплексный подход и в первую очередь доказать автохтонность разделенных разломами структурных единиц и

лишь после этого делать соответствующие выводы в тектоническом районировании, палеогеографии, палеогеодинамики и металлогении рассматриваемых регионов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Акчулаков У.А., Атлас нефтегазоносных и перспективных осадочных бассейнов Республики Казахстан. [Электронный ресурс] / У.А.Акчулаков, Г.Г.Жолтаев, Б.М. Куандыков – Астана, 2014, 97 с.
2. Коробкин В.В., Буслов М.М. Тектоника и геодинамика западной части Центрально-Азиатского складчатого пояса (палеозоиды Казахстана). // Геология и геофизика, 2011, № 12, с. 2032–2055.
3. Добрецов Н.Л. Эволюция структур Урала, Казахстана, Тянь-Шаня и Алтае-Саянской области в Урало-Монгольском складчатом поясе (Палеоазиатский океан). // Геология и геофизика, 2003, т.44, с. 5–27.
4. Парагульгов Х.Х. Эволюция и нефтегазоносность осадочных бассейнов Восточного Казахстана: автореф. дис. д.г.-м.н. – Алматы, ИГН, 2005, 45 с.
5. Карта прогноза нефтегазоносности Казахстана. М 1:2500000, редакторы Даукеев С.Ж., Абдулин А.А., Беспаев Х.А., Воцалевский Э.С. – Министерство энергетики и минеральных ресурсов РК, Институт геологических наук им. К.И. Сатпаева МО и НАН РК, Алматы. 2000.
6. Геологическая карта Казахстана. Масштаб 1:1000 000. Гл. ред. Г.Р. Бекжанов. – СПб, 1997. https://www.geokniga.org/maps/additional/kzgrav1m4.jpg
7. Геологическое строение Казахстана. Ред. Г.Р. Бекжанов. – Алматы, 2000, 396 с. // Geologicheskoe stroenie Kazakhstana [The geological structure of Kazakhstan]. Red. G.R. Bekzhanov. – Almaty, 2000, 396 p.
8. Глубинное строение и минеральные ресурсы Казахстана: в 3-х т. – Алматы, 2002. – Т. 1. Глубинное строение и геодинамика. – 224 с.; Т. 3. Нефть и газ – 272 с.
9. Смирнов А.В., Коробкин В.В. Тектоническая карта Казахстана масштаба 1: 1 000 000 (принципы, легенда, геологические структуры). – Известия НАН РК, Сер. геол., 2003, № 2,3, с. 17–26
10. Коробкин В.В. Тектоническое районирование и структурные стили палеозоид Казахстана. – Известия Томского политехнического университета, 2011, т.319, №1, с. 71–77.
11. Алексеев Д.В., Быкадоров В.А., Волож Ю.А., Сапожников Р.Б. Кинематический анализ юрских грабенов южного Тургая и роль мезозойского этапа в истории Каратау-Таласо-Ферганского сдвига (Южный Казахстан и Тянь-Шань). – Геотектоника, 2017, № 2, с. 3–20.
12. Буслов М.М. Тектоника и геодинамика Центрально-Азиатского складчатого пояса: роль позднепалеозойских крупноамплитудных сдвигов. – Геология и геофизика, 2011, т. 52, №1, с. 66–90.
13. Коробкин В.В., Тулемисова Ж.С. Глубинное строение и геодинамические условия формирования осадочных бассейнов Южного Казахстана (Шу-Сарысуйского, Прибалхашского, Илийского). – Геология и охрана недр. КазГЕО. – 2018, № 3 (68), 2018, с. 24–34.
14. Воцалевский Э.С., Булекбаев З.Е., Искужиев Б.А., Камалов С.М., Корстышевский М.Н., Куандыков Б.М., Куантаев Н.Е., Марченко О.Н., Шудаев К.С., Матлошинский Н.Г., Нажметдинов А.Ш., Филипьев Г.П., Шабатин И.В., Шахабаев Р.С. Шудабаев К.С. Справочник Месторождения нефти и газа Казахстана. – Алматы, 1999, 326 с.
15. Сеитов Н.С. Геотектоника и геодинамика. [Текст]: учеб. для вузов /Н.С. Сеитов; Каз. нац. техн. ун-т им. К. И. Сатпаева. - Алматы: КазНТУ, 2013. - 173 с.

REFERENCES

1. Akchulakov U.A., Zholtayev G.G., Kuandykov B.M., Iskaziyev K.O. i dr. Atlas neftegazonosnyh i perspektivnyh osadochnyh basseynov Respubliki Kazakhstan [Atlas of oil and gas-bearing and promising sedimentary basins of the Republic of Kazakhstan]. – Astana, 2014, 97 p.

2. Korobkin V.V., Buslov M.M. Tektonika i geodinamika zapadnoi chasti Central'no-Aziatskogo skladchatogo poyasa (paleozoidy Kazakhstana) [Tectonics and geodynamics of the western part of the Central Asian folded belt (Paleozoids of Kazakhstan)]. – Geologiya i geofizika [Geology and geophysics], 2011, No. 12, pp. 2032–2055.

3. Dobrecov N.L. Evolyucija struktur Urala, Kazakhstana, Tyan'-Shanya i Altae-Sayanskoi oblasti v Uralo-Mongol'skom skladchatom poyase (Paleoaziatskii okean) [The evolution of the structures of the Urals, Kazakhstan, Tien Shan and Altay-Sayan region in the Ural-Mongol folded belt (Paleo-Asian Ocean)]. – Geologija i geofizika [Geology and geophysics], 2003, v. 44, pp. 5–27.

4. Paragul'gov H.H. Evolyuciya i neftegazonosnost' osadochnyh basseinov Vostochnogo Kazakhstana: avtoref. dis. d.g.-m.n. [The evolution and oil and gas content of sedimentary basins of Eastern Kazakhstan: exteneded abstract of the dissertation of Doctor of Geological and Mineralogical Sciences]– Almaty, IGN, 2005, 45 p.

5. Karta prognoza neftegazonosnosti Kazakhstana [The map of oil and gas content forecast in Kazakhstan]. M 1:2500000, redaktory Daukeyev S.Zh., Abdulin A.A., Bespayev H.A., Vocalevskii Ye.S. – Ministerstvo energetiki i mineral'nyh resursov RK, Institut geologicheskih nauk im. K.I. Satpayeva MO i NAN RK [Ministry of Energy and Mineral Resources of the Republic of Kazakhstan, the Institute of Geological Sciences], Almaty. 2000.

6. Geologicheskaya karta Kazakhstana [The geological map of Kazakhstan]. M 1:1000 000. Gl. red. G.R. Bekzhanov. – SPb, 1997.

7. Glubinnoe stroenie i mineral'nye resursy Kazakhstana: v 3-h t. [Deep structure and mineral resources of Kazakhstan: in 3 volumes] – Almaty, 2002. – v. 1. Glubinnoe stroenie i geodinamika [Deep structure and geodynamics]. – 224 p.; v. 3. Neft' i gaz [Oil and gas] – 272 p.

8. Smirnov A.V., Korobkin V.V. Tektonicheskaya karta Kazakhstana masshtaba 1: 1 000 000 (principy, legenda, geologicheskie struktury) [The tectonic map of Kazakhstan with a scale of 1: 1,000,000 (principles, legend, geological structures)]. – Izvestija NAN RK […], Ser. geol., 2003, No. 2,3, pp. 17–26

9. Korobkin V.V. Tektonicheskoe raionirovanie i strukturnye stili paleozoid Kazahstana [Tectonic zoning and structural styles of Kazakhstan Paleozoid]. – Izvestija Tomskogo politehnicheskogo universiteta [Proceedings of the Tomsk Polytechnic University], 2011, v. 319, No. 1, pp. 71–77.

10. Alekseev D.V., Bykadorov V.A., Volozh Ju.A., Sapozhnikov R.B. Kinematicheskii analiz yurskih grabenov Yuzhnogo Turgaya i rol' mezozoiskogo etapa v istorii Karatau-Talaso-Ferganskogo sdviga (Yuzhnyj Kazakhstan i Tyan'-Shan') [Kinematic analysis of the Jurassic grabens of southern Turgai and the role of the Mesozoic stage in the history of the Karatau-Talas-Fergana strike-slip (South Kazakhstan and Tien Shan)]. – Geotektonika, 2017, No. 2, pp. 3–20.

11. Buslov M.M. Tektonika i geodinamika Central'no-Aziatskogo skladchatogo poyasa: rol' pozdnepaleozoiskih krupnoamplitudnyh sdvigov [Tectonics and geodynamics of the Central Asian folded belt: the role of late Paleozoic large-amplitude faults]. – Geologija i geofizika [Geology and geophysics], 2011, v. 52, No.1, pp. 66–90.

12. Korobkin V.V., Tulemisova Zh.S. Glubinnoe stroenie i geodinamicheskie usloviya formirovaniya osadochnyh basseinov Yuzhnogo Kazakhstana (Shu-Sarysuiskogo,

Pribalhashskogo, Iliiskogo) [Deep structure and geodynamic conditions for the formation of sedimentary basins in Southern Kazakhstan (Shu-Sarysu, Balkhash and Ili)]. – Geologiya i ohrana nedr [Geology and subsoil protection]. KazGEO. – 2018, No. 3 (68), 2018, pp. 24–34.

13. Vocalevskij Je.S., Bulekbayev Z.E., Iskuzhiyev B.A., Kamalov S.M., Korstyshevskii M.N., Kuandykov B.M., Kuantayev N.E., Marchenko O.N., Shudaev K.S., Matloshinskij N.G., Nazhmetdinov A.Sh., Filip'ev G.P., Shabatin I.V., Shahabaev R.S. Shudabaev K.S. Spravochnik Mestorozhdeniya nefti i gaza Kazakhstana [Handbook of the oil and gas fields of Kazakhstan]. – Almaty, 1999, 326 p.

14. Bykadorov V.A., Antipov M.P. Sapozhnikov R.B. Paleozoiskie otlozheniya Syrdar'inskoi vpadiny: stroenie i istoriya formirovaniya v svyazi s ocenkoi neftegazonosnosti [Paleozoic deposits of the Syrdarya depression: structure and history of formation in connection with the assessment of oil and gas content]. Geologiya nefti i gaza. № 3. Perspektivy neftegazonosnosti i rezul'taty GRR [Geology of oil and gas No. 3. Prospects for oil and gas content and results of geological exploration], 2016, pp. 28–37.

15. Geotectonics and geodynamics. N.S. Seitov; Kaz. National Technical University. K. I. Satpayev University. Almaty: KazNTU, 2013. 173 p.

ТҮЙІН

Геологиялық, тектоникалық, палеогеографиялық немесе геодинамикалық сияқты әртүрлі карталар мен модельдерді құрудағы және стратиграфиялық бағандар мен құрылымдық бөлімдерді құрудағы геологиялық деректерді жалпылау геосинклинальды немесе плитотектоникалық ілімдерге негізделген теориялық тәсілдерді қолдануды қамтиды. Бұл теориялар жер қыртысындағы процестер мен өзара әрекеттесулерді түсіндіруге негіз болады.

Аймақтардың геологиялық құрылымын және олардың эволюциясын түсінудің маңызды аспектісі-зерттеушінің көзқарасы мен көзқарасы, бұл деректерді түсіндіруге айтарлықтай әсер етуі мүмкін. Бұл, әсіресе, офиолиттер мен метаморфтық жыныстар сияқты негізгі объектілерге қатысты, мұнда осы геологиялық денелердің өзара әрекеттесуінің түрі мен сипатын ескеру қажет.маңызды аспектілер олардың геологиялық жасын, құрылымын және шығу тегін түсіндіру болып табылады, бұл тек тектоникалық процестер туралы ғана емес, сонымен қатар тау жыныстарының пайда болуы мен өзгеру процестерін тереңірек түсінуді қажет етеді.

Бұл тәсіл геологиялық процестердің дәлірек және толық модельдерін құруға, сондай-ақ жер қыртысының дамуына әсер ететін факторлардың әртүрлілігін ескеруге көмектеседі, бұл өз кезегінде қарастырылып отырған объектілердің тарихи және тектоникалық контекстін тереңірек түсінуге ықпал етеді.

Демек, осы және басқа да бірқатар мәселелерді мұқият және дәлелді талдау белгілі бір Тұжырымдаманың ұсыныстарын растауы немесе толығымен жоққа шығаруы мүмкін. Әрине, зерттеудің техникалық базасын дамыту, әлемдік тәжірибені есепке алу, әсіресе қазіргі геологиялық процестерді зерттеу ежелгі қатпарлы аймақтардың геологиялық құрылымын, тектоникасы мен геодинамикасын ашуда шешуші рөл атқарады. Олардың ішіндегі ең күрделісі-мозаикалық-блоктық типтегі аймақтар (тиррейндер) олардың классикалық мысалы-Орталық Азияның таулы құрылыстары, оның ішінде Алтай-Саян қатпарлы облысы мен Шығыс Қазақстан.

ӘОЖ: 66.097.3
ҒТАМР 61.61.91

Ахметова Ф.Ж., техника ғылымдарының магистрі, аға оқытушы, https://orcid.org/0000-0002-8869-3053
«Жәңгір хан атындағы Батыс Қазақстан аграрлық-техникалық университеті» КеАҚ, Жәңгір хан 51, Орал қаласы, Қазақстан Республикасы, firuza.92@mail.ru

Akhmetova F.Zh., master of Technical Sciences, senior lecturer, https://orcid.org/0000-0002-8869-3053
NJSC «West Kazakhstan Agrarian and Technical University named after Zhangir khan», Uralsk, st. Zhangir khan 51, 090009, Kazakhstan, firuza.92@mail.ru

ПОЛИМЕР ҚАЛДЫҚТАРЫН ӨҢДЕУ ПРОЦЕСТЕРІ ҮШІН ТАЙЖҮЗГЕН ТАБИҒИ ЦЕОЛИТІ НЕГІЗІНДЕГІ КАТАЛИЗАТОРЛАРДЫ ЗЕРТТЕУ
RESEARCH ON CATALYSTS BASED ON NATURAL TAIZHÜZGEN ZEOLITE FOR POLYMER WASTE PROCESSING

АННОТАЦИЯ

Мақалада полимер қалдықтарды гидрогенизациялық термокаталитикалық өңдеу процесі үшін $(NH_4)_5H_5[H_2(WO_4)_6]\cdot H_2O$ вольфрам және $(NH_4)_6Mo_7O_{24}\cdot 4H_2O$ молибден иондарымен модификацияланған Тайжүзген табиғи цеолиті негізінде жасалған жаңа композиттік катализаторлардың беті мен құрылымдық қасиеттері электронды микроскопиялық әдіспен зерттелді.

Полимерлі қалдықтарды термокаталитикалық гидрлеу процестерін бірлесіп зерттеу және процесті оңтайландыру мақсатында Тайжүзген кен орны табиғи цеолиті негізіндегі вольфрам және молибден тұздарымен модификацияланған жаңа катализаторларды зерттеудің мақсаты – құрамында белсенді химиялық металдар мен химиялық гидрогенді өңдеуге арналған табиғи цеолит негізіндегі катализаторлардың сипаттамалары мен құрамын зерттеу.

ANNOTATION

The article studies the surface and structural properties of new composite catalysts based on Taizhuzgen natural zeolite modified with tungsten and molybdenum salts $(NH_4)_5H_5[H_2(WO_4)_6]\cdot H_2O$ tungsten and $(NH_4)_6Mo_7O_{24}\cdot 4H_2O$ molybdenum ions for the hydrogenation thermocatalytic treatment of polymer waste using electron microscopy.

The purpose of the study of new catalysts based on Taizhuzgen field natural zeolite modified with tungsten and molybdenum salts in order to jointly study the thermocatalytic hydrogenation processes of polymer waste and optimize the process is to study the characteristics and composition of natural zeolite-based catalysts for the treatment of active chemical metals and chemical hydrogen.

Түйін сөздер*: табиғи цеолит, композитті катализаторлар, полимер қалдықтары, термокаталитикалық өңдеу, электронды микроскоп.*

Keywords: *natural zeolite, composite catalysts, polymer waste, thermocatalytic treatment, electron microscope.*

Кіріспе. Өнеркәсіптің әртүрлі салаларында және күнделікті өмірде полимерлі материалдарды қолдану артып келеді, бірақ жер шарының алдында тұрған маңызды мәселелердің бірі - қоршаған ортаның полимер қалдықтарымен ластануы. Мұндай

қалдықтар табиғи процестердің әсерінен жойылмайды және жану кезінде улы және зиянды заттар шығарады. Бұл мәселелерді шешу үшін өндіріс қалдықтарын өңдеудің жаңа әдістерін әзірлеу және отын тапшылығын жеңілдететін катализаторларды зерттеу қажет [1-3].

Технологиялардың дамуы әлемде әл-ауқаттың артуына және халықтың жан басына шаққандағы тұтынуының артуына әкелді. Осы тұтынудың нәтижесінде қалдықтардың көлемі де біртіндеп артып келеді. Қалдықтарды тиімді өңдеу, энергияны ұтымды пайдалану және жаңа энергия көздерін игеру қоршаған орта мен халықтың денсаулығын қорғаудың маңызды мәселелеріне айналды. Еуропалық Одақ (ЕО) әлемдегі жетекші қалдықтарды өндіретін аймақтардың бірі болып табылады және ЕО елдеріндегі тұрмыстық қалдықтардың жалпы көлемі 213,410 миллион тоннаны құрайды. тоннаны құрайды [4,5]. Сонымен қатар тұрмыстық полимер қалдықтары экологиялық проблемаларды тудырады. Пластмассаны пайдалану және оны қалдық ретінде қайта өңдеу экологиялық стандарттарға сәйкес жүзеге асырылуы керек, бұл маңызды мәселе [6-8].

Соңғы жылдары тұрмыстық пластик қалдықтарын химиялық өңдеу әдістері бойынша зерттеулер жүргізілуде [9]. Бұл әдістерге полимер материалының түріне байланысты термиялық ыдырау (пиролиз және термиялық ыдырау), газдандыру, гидролиздік метанолиз және гликолиз жатады. Термиялық ыдырау пластикті қайта өңдеудің негізгі әдістерінің бірі болып табылады. Бұл процесс кезінде пластик қалдықтарындағы байланыстар үзіліп, реактивті радикалдар түзіледі және олар газ тәрізді, сұйық немесе қатты өнімдерге айналуы мүмкін [10,11].

Бүгінгі таңда пластикті қайта өңдеудің ең көп қолданылатын әдісі оны екінші реттік өңдеу болып табылады. Бұл әдіс өндірістік қалдықтарды қайта өңдеуге ғана емес, қоршаған ортаны қорғауға да көмектеседі. Бұл бағыттағы әдістердің бірі полимер қалдықтарын термокаталитикалық гидрлеу арқылы сұйық мотор отынын алу болып табылады. Мұндай процесс үшін Тайжүзген кен орнының Mo (VI) тұзымен модификацияланған табиғи цеолит негізіндегі жаңа катализаторларды белсенді және таңдамалы түрде қолдануға болады [12].

Зерттеу материалдары мен әдістері. Бастапқы пластикалық шикізаттың бөлшектері 2-6 мм диапазонында алдын ала ұсақталған. Тайжүзген кен орнындағы цеолит негізінде қышқылсыз активтендірілген, күйдірілген және вольфрам (VI) тұзымен модификацияланған W (VI)/цеолит концентрациясы 0,5%, 1,0%, 1,5% және 2,0% катализаторлар қолданылды.

Пластикалық қалдықтарды (ПЭ және ПП) термокаталитикалық гидрлеу процесі 0,5-0,6 МПа қысымда және 450°C температурада, мерзімді жұмыс істейтін қондырғыда үздіксіз араластыру арқылы жүргізілді. Қысым азотпен реттелді, ал қысым жүйеде сутегінің бөлінуі нәтижесінде өзгерді.

Процесс гидрлеу каталитикалық өңдеу мысалында жүргізілді, нәтижесінде синтетикалық мұнай, қатты қалдықтар және газ сияқты өнімдер алынды. Бұл жұмыстағы эксперименттік жұмыстардың алдыңғы зерттеулерден айырмашылығы [13,14] бұл процесс алғаш рет сұйық дистиллятты тікелей айдау және газдарды шығару арқылы шикізатты катализдеу және гидрлеу арқылы цикло-араластыру режимінде қысыммен жұмыс істейтін үздіксіз каталитикалық реакторда зерттелгендігімен ерекшеленеді. Процесс сұйық өнімді ағызу және оны одан әрі айдау сатысынсыз жүзеге асырылды. Жаңа композициялық катализатордың қатысуымен полимер қалдықтарын термокаталитикалық гидрогенизациялаудың сұйық өнімдері мақалада сипатталғандай 0-180 °c, 180-250 °c және 250-320 °c қайнау температурасындағы фракцияларға бөлінеді [15]. Процесстен алынған сұйық фракциялардың көмірсутекті құрамдары Agilent

7890a/5975c газ хромато-масса-спектрометрі (АҚШ) көмегімен талданды, массалық спектрлер Scan режимінде алынды, иондау электронды соққы әдісімен жүргізілді.

Тиімді катализаторлардың морфологиясы JEOLJSM 6460LV электронды микроскоппен зерттелді. Катализаторлардың химиялық құрамы INCA микроскоп құрылғысының энергетикалық дисперстік спектроскопия әдісімен анықталды. Сонымен қатар, Chemosorb хемосорбциялық анализаторында температуралық бағдарламаланатын десорбциялық талдау жүргізілді, оның көмегімен катализатордың активтену энергиясы анықталды.

Зерттеу нәтижелері және талдаулар. Тиімді катализаторды таңдау полимер қалдықтарын термокатализдік гидрогенизациялық өңдеу процесінің нәтижесінде алынған сұйық өнімдердің шығымы арқылы анықталды. 0,5 - 2,0 % W және 2,0 %-дық Мо отырғызылған «Тайжүзген» кен орны цеолиті қатысында жүргізілген полимерлі қалдықтарды термокатализдік гидрогенизациялық өңдеу процестері 1-кестеде көрсетілген.

Кесте 1 – 0,5 -2,0 % W және 0,5 - 2,0 % Мо иондарымен модикацияланған «Тайжүзген» цеолиті қатысында жүргізілген полимер қалдықтарын термокаталитикалық гидрогенизациялық өңдеу процестері

№	Бастапқы шикізат	Катализатор	m(0-180°C), г	m(180-250°C), г	m(250-320°C), г	Сұйық фракцияның шығымы, %
1	Полимер қалдықтары, мазут	0,5% W+цеолит	3,114	3,543	0,780	53,12
2	Полимер қалдықтары, мазут	1,0% W+цеолит	2,934	2,610	2,036	54,14
3	Полимер қалдықтары, мазут	1,5% W+цеолит	2,218	4,888	-	50,75
4	Полимер қалдықтары, мазут	2,0% W+цеолит	2,848	3,075	2,532	60,39
5	Полимер қалдықтары, мазут	0,5% Мо+ цеолит	3,2946	2,844	1,084	51,59
6	Полимер қалдықтары, мазут	1,0% Мо+ цеолит	2,719	2,230	1,9225	49,08
7	Полимер қалдықтары, мазут	1,5% Мо+ цеолит	2,110	3,001	2,344	53,25
8	Полимер қалдықтары, мазут	2,0% Мо+ цеолит	1,742	2,677	4,199	61,55

Жүргізілген процестер нәтижесінде сұйық фракциялардың шығымына сәйкес жақсы нәтиже көрсеткендіктен, тиімді катализатор ретінде Тайжүзген кен орнының цеолиті негізіндегі 2,0% W (VI) және 2,0% Мо (VI) тұздарымен модификацияланған катализатор таңдалды. Полимер қалдықтарын термокаталитикалық гидрлеу арқылы

алынған сұйық өнімдердің химиялық құрамы мен концентрациясын анықтау үшін газды хроматографиялық талдау жүргізілді. Көмірсутектердің фракциялардағы топтық құрамы 0-180 °С, 180-250 °С және 250-320 °С аралығындағы температурада масс-спектрометрия әдісімен 2-кестеде көрсетілген.

Кесте 2 – 2,0 % W және 0,5 - 2,0 % Mo отырғызылған «Тайжүзген» кен орны цеолиті қатысында жүргізілген полимерлі қалдықтарды термокатализдік гидрогенизациялық өңдеу процесінен алынған сұйық фракциялардың топтық көмірсутектік құрамы

Көмірсутектердің топтық құрамы	Катализаторлар					
	2,0% Mo+ цеолит, %			2,0% W+цеолит, %		
	0-180°С	180-250°С	250-320°С	0-180°С	180-250°С	250-320°С
Алкан	33,18	37,45	54,91	29,37	37,06	64,37
Изоалкан	7,33	33,49	5,94	2,32	18,74	1,34
Алкен	6,07	4,45	3,28	8,8	11,07	15,16
Циклоалкан	22,01	12,73	6,63	7,6	20,73	6,08
Циклоалкен	5,35	1,43	0,42	1,6	0,84	8,5
Ароматты көмірсутектер	22,07	6,18	27,13	16,65	19,77	4,55

2,0% W және 2,0% Mo тұздарымен модификацияланған «Тайжүзген» кен орны цеолиті негізінде полимерлік қалдықтарды термокаталитикалық гидрогенизациялау реакциясынан алынған фракцияның көмірсутектік құрамы 2-кестеде көрсетілген. 2,0% Mo тұзымен модификацияланған катализатор қатысында жүргізілген реакция нәтижесінде 180 °С дейінгі қайнау температурасы бар фракцияда қаныққан көмірсутектер (33,18%) мен ароматты көмірсутектердің мөлшері (22,07%) жоғары болды. Ал 2,0%-дық W тұзы бар катализатор қатысындағы фракцияда қаныққан көмірсутектердің (29,37%) және ароматты көмірсутектердің (16,65%) мөлшері көп болды. Бұл процесс ароматтану, циклдену және ыдырау реакцияларының басым болуына себеп болды.

Рентгенофлюоресцентті анализ көмегімен композитті катализаторлардың сапалық және сандық құрамы анықталды, және алынған нәтижелер энергодисперсті спектроскопия әдісімен тексерілгенде сәйкес келгені байқалды.

1000х, 5000х және 30000х үлкейтілген масштабта зерттелген 2,0% Mo(VI)/цеолит негізіндегі катализаторда ірі бөлшектердің өлшемдері 82,03 мкм, 3,51 мкм және 7,74 мкм-ден 256,4 нм мен 775,6 нм-ге дейін өзгерген, бұл катализатордың беттік морфологиясының біркелкі еместігін көрсетеді. Жалпы, катализатор бөлшектері ірі түйіршікті құрылымға ие.

Сонымен қатар, 2,0% W(VI)/цеолит негізіндегі катализаторда бөлшектердің өлшемдері 95,40 мкм мен 3,32 мкм-ден 876,4 нм мен 231,7 нм-ге дейінгі диапазонда болды, бұл да оның беттік морфологиясының біркелкі еместігін көрсетеді.

Бұл зерттеу нәтижелері Mo (VI) және W (VI) тұздарымен модификацияланған цеолит катализаторларының морфологиясына, сондай-ақ олардың көмірсутектерді гидрогенизациялық термокаталитикалық өңдеу процесінің шығымы мен сұйық фракциялардың химиялық құрамына әртүрлі әсер ететінін көрсетті.

Қорытынды. Сұйық мотор отындарын алу мақсатында полимерлік қалдықтарды термокаталитикалық гидрогенизациялау әдісін пайдалану үшін қышқылсыз активтендірілген «Тайжүзген» цеолитіне 0,5-2,0% молибден ионы және 0,5-2,0% вольфрам ионымен модификацияланған катализатор әзірленді. Осы катализаторлардың арасынан 2,0%-дық Mo және 2,0%-дық W иондарымен модификацияланған «Тайжүзген»

цеолиті негізіндегі жаңа композитті катализатор ең тиімдісі ретінде таңдалды. Алынған жаңа катализатор үлгілерінің морфологиясы JEOLJSM 6460LV электронды микроскопымен зерттелді. Катализаторлардың химиялық құрамы INCA (рентгенофлюоресцентті әдіс аналогы) микроскоп құрылғысының энергодисперсті спектроскопия әдісі арқылы анықталды.

Алғыс. Зерттеу жұмыстары Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Ғылым комитетімен бекітілген 2025-2027 жылдарға арналған «Жас ғалым» гранттық қаржыландыру бойынша ИРН AP25794283 «Тозған полимер қалдықтарын отын дистилляттарына термокаталитикалық өңдеу процесі үшін композитті катализаторларды жасау» тақырыбы негізінде қаржыландырылды.

ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

1. Park H.B., Kim K.D., Lee Y.K. Promoting asphaltene conversion by tetralin for hydrocracking of petroleum pitch, Fuel. 222 (2018) 105–113. https://doi.org/10.1016/j.fuel.2018.02.154

2. Duan A., Wan G., Zhang Y., Zhao Z., Jiang G., Liu J. Optimal synthesis of micro/mesoporous beta zeolite from kaolin clay and catalytic performance for hydrodesulfurization of diesel, Catal. Today. 175 (2011) 485–493. https://doi.org/10.1016/j.cattod.2011.03.044

3. Ebrahiminejad M., Karimzadeh R. Hydrocracking and hydrodesulfurization of diesel over zeolite beta-containing NiMo supported on activated red mud, Adv. Powder Technol. 30 (2019) 1450–1461. https://doi.org/10.1016/j.apt.2019.04.021

4. Dargo Beyene H. Recycling of Plastic Waste into Fuels, a Review, Int. J. Sci. Technol. Soc. 2 (2014) 190. https://doi.org/10.11648/j.ijsts.20140206.15

5. Upare D.P., Park S., Kim M.S., Jeon Y.P., Kim J., Lee D., Lee J., Chang H., Choi S., Choi W., Park Y.K., Lee C.W. Selective hydrocracking of pyrolysis fuel oil into benzene, toluene and xylene over CoMo/beta zeolite catalyst, J. Ind. Eng. Chem. 46 (2017) 356–363. https://doi.org/10.1016/j.jiec.2016.11.004

6. Zhang Y., Nahil M.A., Wu C., Williams P.T. Pyrolysis–catalysis of waste plastic using a nickel–stainless-steel mesh catalyst for high-value carbon products, Environ. Technol. (United Kingdom). 38 (2017) 2889–2897. https://doi.org/10.1080/09593330.2017.1281351

7. Ragaert K., Delva L., Van Geem K., Mechanical and chemical recycling of solid plastic waste, Waste Manag. 69 (2017) 24–58. https://doi.org/10.1016/j.wasman.2017.07.044

8. Munir D., Irfan M.F., Usman M.R. Hydrocracking of virgin and waste plastics: A detailed review, Renew. Sustain. Energy Rev. 90 (2018) 490–515. https://doi.org/10.1016/j.rser.2018.03.034

9. Weitkamp J. Catalytic Hydrocracking-Mechanisms and Versatility of the Process, ChemCatChem. 4 (2012) 292–306. https://doi.org/10.1002/cctc.201100315

10. Mir R.A., Pandey O.P. Waste plastic derived carbon supported Mo 2 C composite catalysts for hydrogen production and energy storage applications, J. Clean. Prod. 218 (2019) 644–655. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2019.02.004

11. Munir D., Piepenbreier A.F., Usman M.R. Hydrocracking of a plastic mixture over various micro-mesoporous composite zeolites, Powder Technol. 316 (2017) 542–550. https://doi.org/10.1016/j.powtec.2017.01.037

12. Wong S.L., Ngadi N., Abdullah T.A.T., Inuwa I.M. Current state and future prospects of plastic waste as source of fuel: A review, Renew. Sustain. Energy Rev. 50 (2015) 1167–1180. https://doi.org/10.1016/j.rser.2015.04.063

13. Li J., Liu X., Han Q., Yao X., Wang X. Formation of WO3 nanotube-based bundles directed by NaHSO 4 and its application in water treatment, J. Mater. Chem. A. 1 (2013) 1246–1253. https://doi.org/10.1039/c2ta00382a

14. Wdowin M., Franus M., Panek R., Badura L., Franus W. The conversion technology of fly ash into zeolites, Clean Technol. Environ. Policy. 16 (2014) 1217–1223. https://doi.org/10.1007/s10098-014-0719-6

15. Aubakirov Y.A., Sassykova L.R., Tashmukhambetova Z.K., Akhmetova F.Z., Sendilvelan S., Sharipov K.O., Kubekova S.N., Batyrbayeva A.A., Azhigulova R.N., Ryskaliyeva R.G., Zhussupova A.K., Abildin T.S. Thermo-catalytic processing of polymer waste over catalysts on the basis of natural zeolite from the tayzhuzgen field (Kazakhstan) modified by molybdenum, Rasayan J. Chem. 12 (2019) 1701–1709. https://doi.org/10.31788/RJC.2019.1245435

REFERENCES

1. H.B. Park, K.D. Kim, Y.K. Lee, Promoting asphaltene conversion by tetralin for hydrocracking of petroleum pitch, Fuel. 222 (2018) 105–113. https://doi.org/10.1016/j.fuel.2018.02.154

2. A. Duan, G. Wan, Y. Zhang, Z. Zhao, G. Jiang, J. Liu, Optimal synthesis of micro/mesoporous beta zeolite from kaolin clay and catalytic performance for hydrodesulfurization of diesel, Catal. Today. 175 (2011) 485–493. https://doi.org/10.1016/j.cattod.2011.03.044

3. M. Ebrahiminejad, R. Karimzadeh, Hydrocracking and hydrodesulfurization of diesel over zeolite beta-containing NiMo supported on activated red mud, Adv. Powder Technol. 30 (2019) 1450–1461. https://doi.org/10.1016/j.apt.2019.04.021

4. H. Dargo Beyene, Recycling of Plastic Waste into Fuels, a Review, Int. J. Sci. Technol. Soc. 2 (2014) 190. https://doi.org/10.11648/j.ijsts.20140206.15

5. D.P. Upare, S. Park, M.S. Kim, Y.P. Jeon, J. Kim, D. Lee, J. Lee, H. Chang, S. Choi, W. Choi, Y.K. Park, C.W. Lee, Selective hydrocracking of pyrolysis fuel oil into benzene, toluene and xylene over CoMo/beta zeolite catalyst, J. Ind. Eng. Chem. 46 (2017) 356–363. https://doi.org/10.1016/j.jiec.2016.11.004

6. Zhang Y., Nahil M.A., Wu C., Williams P.T. Pyrolysis–catalysis of waste plastic using a nickel–stainless-steel mesh catalyst for high-value carbon products, Environ. Technol. (United Kingdom). 38 (2017) 2889–2897. https://doi.org/10.1080/09593330.2017.1281351

7. Ragaert K., Delva L., Van Geem K., Mechanical and chemical recycling of solid plastic waste, Waste Manag. 69 (2017) 24–58. https://doi.org/10.1016/j.wasman.2017.07.044

8. Munir D., Irfan M.F., Usman M.R. Hydrocracking of virgin and waste plastics: A detailed review, Renew. Sustain. Energy Rev. 90 (2018) 490–515. https://doi.org/10.1016/j.rser.2018.03.034

9. Weitkamp J. Catalytic Hydrocracking-Mechanisms and Versatility of the Process, ChemCatChem. 4 (2012) 292–306. https://doi.org/10.1002/cctc.201100315

10. Mir R.A., Pandey O.P. Waste plastic derived carbon supported Mo 2 C composite catalysts for hydrogen production and energy storage applications, J. Clean. Prod. 218 (2019) 644–655. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2019.02.004

11. Munir D., Piepenbreier A.F., Usman M.R. Hydrocracking of a plastic mixture over various micro-mesoporous composite zeolites, Powder Technol. 316 (2017) 542–550. https://doi.org/10.1016/j.powtec.2017.01.037

12. Wong S.L., Ngadi N., Abdullah T.A.T., Inuwa I.M. Current state and future prospects of plastic waste as source of fuel: A review, Renew. Sustain. Energy Rev. 50 (2015) 1167–1180. https://doi.org/10.1016/j.rser.2015.04.063

13. Li J., Liu X., Han Q., Yao X., Wang X. Formation of WO3 nanotube-based bundles directed by NaHSO 4 and its application in water treatment, J. Mater. Chem. A. 1 (2013) 1246–1253. https://doi.org/10.1039/c2ta00382a

14. Wdowin M., Franus M., Panek R., Badura L., Franus W. The conversion technology of fly ash into zeolites, Clean Technol. Environ. Policy. 16 (2014) 1217–1223. https://doi.org/10.1007/s10098-014-0719-6

15. Aubakirov Y.A., Sassykova L.R., Tashmukhambetova Z.K., Akhmetova F.Z., Sendilvelan S., Sharipov K.O., Kubekova S.N., Batyrbayeva A.A., Azhigulova R.N., Ryskaliyeva R.G., Zhussupova A.K., Abildin T.S. Thermo-catalytic processing of polymer waste over catalysts on the basis of natural zeolite from the tayzhuzgen field (Kazakhstan) modified by molybdenum, Rasayan J. Chem. 12 (2019) 1701–1709. https://doi.org/10.31788/RJC.2019.1245435

РЕЗЮМЕ

В статье исследованы поверхностные и структурные свойства электронно-микроскопическим методом новых композиционных катализаторов на основе Тайжузгенского природного цеолита, модифицированного ионами вольфрама $(NH_4)_5H_5[H_2(WO_4)_6]\cdot H_2O$ и $(NH_4)_6Mo_7O_{24}\cdot 4H_2O$ молибдена, для процесса гидрогенизационной термокаталитической переработки полимерных отходов.

В целях совместного изучения процессов термокаталитического гидрирования полимерных отходов и оптимизации процесса целью исследования новых катализаторов, модифицированных солями вольфрама и молибдена, на основе природного цеолита Тайжузгенского месторождения является изучение характеристик и состава природных катализаторов на основе цеолитов для переработки химического водорода, содержащих активные химические металлы.

УДК 551.444
МРНТИ 70.27.00

Монтаев С.А., доктор технических наук, профессор, https://orcid.org/0000-0001-5072-8989
НАО «Западно-Казахстанский аграрно-технический университет имени Жангир хана», г. Уральск, ул. Жангир хана 51, 090009, Казахстан, montaevs@mail.ru
Уразова А.Ф., магистр технических наук, старший преподаватель https://orcid.org/0000-0001-6339-9635
НАО «Западно-Казахстанский аграрно-технический университет имени Жангир хана», г. Уральск, ул. Жангир хана 51, 090009, Казахстан, urazova_17@list.ru

Montaev S.A., Doctor of Technical Sciences, Professor, https://orcid.org/0000-0001-5072-8989
NJSC «West Kazakhstan Agrarian and Technical University named after Zhangir khan», Uralsk, st. Zhangir khan 51, 090009, Kazakhstan, montaevs@mail.ru
Urazova A.F., master of Engineering Sciences, Senior Lecturer https://orcid.org/0000-0001-6339-9635, urazova_17@list.ru
NJSC «West Kazakhstan Agrarian and Technical University named after Zhangir khan», Uralsk, st. Zhangir khan 51, 090009, Kazakhstan, urazova_17@list.ru

ВОЗМОЖНОСТИ СНИЖЕНИЯ МИНЕРАЛИЗАЦИИ ПОДЗЕМНОЙ ВОДЫ НА ОСНОВЕ КРЕМНИСТОЙ ПОРОДЫ – ОПОКИ

THE POSSIBILITY OF REDUCING THE MINERALIZATION OF GROUNDWATER BASED ON SILICEOUS ROCK – FLANKS

АННОТАЦИЯ

В статье рассматривается использование сорбента, изготовленного из опоки Таскалинского месторождения, для обессоливания подземных вод. Высокое содержание растворенных солей, таких как хлориды и сульфаты, является одной из главных причин ухудшения качества воды, что требует разработки эффективных методов очистки. Опока, как природный сорбент, обладает уникальными химическими и физическими свойствами, такими как высокая пористость и способность к ионному обмену, что делает ее перспективным материалом для удаления солей из воды. В рамках исследования были проведены эксперименты, направленные на оценку эффективности опоки в процессе обессоливания подземных вод. Результаты показали, что опока из Таскалинского месторождения эффективно удаляет хлориды и сульфаты, снижая их концентрацию на 30-40%. При этом материал сохраняет свои сорбционные свойства в широком диапазоне pH воды. Статья подчеркивает экологичность и экономическую доступность опоки как сорбента, а также рассматривает возможные пути улучшения технологии и использования этого материала в масштабах водоочистных сооружений.

ANNOTATION

The article discusses the use of a sorbent made from the flask of the Taskalinsky deposit for desalination of groundwater. The high content of dissolved salts, such as chlorides and sulfates, is one of the main reasons for the deterioration of water quality, which requires the development of effective purification methods. Flask, as a natural sorbent, has unique chemical and physical properties, such as high porosity and the ability to ion exchange, which makes it a promising material for removing salts from water. As part of the study, experiments were conducted to evaluate the effectiveness of flasks in the process of desalination of groundwater. The results showed that flask from the Taskalinsky deposit effectively removes chlorides and sulfates, reducing their concentration by 30-40%. At the same time, the material retains its sorption properties over a wide pH range of water. The article emphasizes the environmental friendliness and economic accessibility of flask as a sorbent, and also considers possible ways to improve the technology and use of this material on the scale of wastewater treatment plants.

Keywords: *desalination, groundwater, sorbent, flask, Taskalinsky deposit, water treatment, ion exchange*.

Ключевые слова: *обессоливание, подземные воды, сорбент, опока, Таскалинское месторождение, водоочистка, ионный обмен.*

Введение. Подземные воды, несмотря на их важность как источник питьевого водоснабжения и орошения, часто содержат высокие концентрации растворенных солей, таких как хлориды, сульфаты и карбонаты. Эти вещества могут не только ухудшать вкус воды, но и повышать ее жесткость, что затрудняет использование воды в бытовых и производственных целях. В связи с этим, разработка эффективных методов обессоливания воды является актуальной проблемой [1].

Одним из перспективных материалов для удаления солей из воды являются природные сорбенты, такие как опока. Опока — это осадочная порода, состоящая из кремнезема и глинистых минералов, которая обладает хорошими сорбционными свойствами. В этой статье рассматривается использование опоки, добываемой из Таскалинского месторождения, в качестве сорбента для очистки подземных вод от солей.

Кремнистая порода – опока Западно-Казахстанского месторождения представляет собой легкую, твердую, микропористую горную породу. Согласно геологическим данным, опоки залегают в палеогеновых и меловых отложениях, образуются в морских бассейнах за счет уплотнении и цементации диатомитов и трепелов. Их плотность составляет 1,2-1,25 г/см^3. Белые или серые, зеленоватые легкие породы с редкими остатками диатомовых водорослей, радиолярий и спикул губок. По результатам рентгенофазового анализа установлено, что в качестве основного минерала присутствует аморфный кремнезем (SiO_2). Опока отличается высокой пористостью и способностью к ионному обмену, что делает ее подходящей для использования в качестве сорбента. [2,3]

Основные химические и физические характеристики опоки Таскалинского месторождения включают:

- Высокое содержание кремнезема, что придает сорбенту способность адсорбировать растворенные соли.
- Пористая структура, способствующая удержанию ионов солей.
- Низкая токсичность и экологическая безопасность, что делает этот материал привлекательным для водоочистки. [4]

Процесс обессоливания подземных вод с использованием сорбента опоки основан на механизмах адсорбции и ионного обмена. Вода, содержащая соли, проходит через слой опоки, где происходит обмен ионов солей на ионы, содержащиеся в структуре сорбента, таких как кальций (Ca^{2+}), магний (Mg^{2+}) или натрий (Na^{+}).[5,6]

Основные механизмы, участвующие в процессе очистки:

- Ионный обмен: Ионы солей в воде, такие как Na^{+}, Cl^{-}, SO_4^{2-}, замещаются на ионы кальция, магния и другие ионы, содержащиеся на поверхности опоки.
- Физическая адсорбция: Частицы солей задерживаются на поверхности пор в структуре опоки.
- Химическая адсорбция: Некоторые соли могут связываться с активными группами на поверхности сорбента, что увеличивает степень очистки [7,8].

Материалы и методы исследования. Для получения модифицированного минерального сорбента использовались кремнистые породы, такие как опоки и бентонитовая глина, добываемые в Западно-Казахстанском месторождении. Опоки — это легкая, тонкопористая и плотная кремнистая порода, состоящая в основном из окременелых опаловых створок диатомовых водорослей и их фрагментов [9,10].

Опоки Западно-Казахстанского месторождения представляют собой легкие, плотные микропористые породы, преимущественно состоящие из мельчайших (<0,005 мм) частиц опал-кристобалитового кремнезема. Химический и минералогический состав опоки приведены в таблицах 1 и 2. Средняя плотность опоки составляет 1,32 г/см³, а ее естественная пористость варьируется от 45 до 56 % [25,26].

Наши исследования, проведенные на опоке и бентонитовой глине Западно-Казахстанского месторождения, подтверждают выводы ученых, представленных в научных работах [34-37].

Таблица 1 – Минералогический состав кремнистой породы – опоки Западно-Казахстанского месторождения, %

Наименование породы	Опал-кристобалитовый кремнезём	Глинистые минералы	Кальцит	Кварц	Слюда	Глауконит	Органогенные остатки
Кремнистая порода – опока	54-78	15-22	до 6	4-7	2-4	2-3	до 12

Таблица 2 - Химический состав опоки Западно-Казахстанского месторождения, % по массе

Наименование сырья	П.п.п.	$Si0_2$	$A1_20_3$	Fe_20_3	CaO	MgO	$S0_3$	N_20	K_20
Опока ЗКО	4,96	76,03	8,15	5,49	1,22	1,34	0,31	1,53	0,61

В качестве второго компонента, использующегося для модификации, была выбрана бентонитовая глина Погодаевского месторождения, расположенного в Западно-Казахстанской области. [25,26] Химический состав бентонитовой глины с данного месторождения изложен в таблице 3.


Таблица 3 - Химический состав бентонитовой глины Погодаевского месторождения Западно-Казахстанской области, % по массе

Наименование сырья	SiO_2	Al_2O_3	CaO	MgO	Fe_2O_3	SO_3	Na_2O	п.п.п
Бентонитовая глина Погодаевского месторождение	61,51	17,06	2,27	3,21	6,36	1,27	3,57	6,75

Морфология поверхности исследуемых сорбентов была оценена с использованием микрофотографий, полученных на сканирующем электронном микроскопе JSM – IT 200. Применение электронной микроскопии является приоритетным, так как этот метод позволяет анализировать макропористые структуры в диапазоне размеров пор, который недоступен для других методов исследования. Электронная микроскопия незаменима при изучении макропор, поскольку она дает возможность выявить общий характер пористой структуры, а также служит основой для построения моделей и интерпретации данных, полученных другими методами порометрии. [19]

В ходе исследования для определения пористости, а также макро- и мезопор использовался ртутный порозиметр PoreMaster 60. Этот прибор позволяет точно измерять макропоры, микропоры, мезопоры, общий объем пор и удельную площадь поверхности в зависимости от приложения давления при интрузии/экструзии ртути. Диапазон измеряемых размеров пор составляет от 0,0064 до 950 мкм.

Результаты и обсуждения. Анализ макроструктуры показал, что опока состоит в основном из аморфного кремнезема, который формирует сцементированную структуру с тонкодисперсными пористыми частицами. Также было установлено, что исследуемая опока включает в себя скипулы губок, окременелые опаловые створки диатомовых водорослей и их обломки. В составе также присутствуют глинистые частицы и органические остатки. Под микроскопом отчетливо видны скипулы губок, окременелые опаловые створки диатомовых водорослей, их обломки и характерная пористая структура (Рисунок 1).

а) 


б) 

Рисунок 1 - Пористая структура опоки Западно – Казахстанского месторождения: а – увеличение х - 500, б – увеличение х – 2000 (сканирующий электронный микроскоп JSM – IT 200)

Исследуемая опока характеризуется высокой пористостью, которая в естественном состоянии составляет 43-47%, а также относительно низкой средней плотностью, находящейся в пределах 1200–1350 кг/м³. Она отличается хорошей влагоемкостью, высокой гидравлической и сорбционной активностью. Исследования показали, что опока имеет высокую сорбционную способность по отношению к ионам аммония, калия, рубидия, цезия, железа, кобальта, никеля, марганца (II), хрома (III), цинка, кадмия, свинца, ртути, меди, а также щелочно-земельных и редкоземельных элементов и широкому спектру органических веществ [14].

Вторым объектом исследования для создания модифицированного сорбента является бентонитовая глина Погодаевского месторождения, расположенного в Западно-Казахстанской области. Научно-экспериментальные исследования показали, что эта глина обладает высокой пластичностью, «жирной» текстурой на ощупь и отличается хорошей влагоемкостью, а также высокой гидравлической и адсорбционной активностью [15].

Рентгенофазовый анализ (РФА) показал, что минералогический состав бентонитовой глины Погодаевского месторождения в основном представлен монтмориллонитом с характеристиками d/n = 5,06; 4,46; 3,79; 3,06; 2,45; 2,28; 2,12; 1,97; 1,81; 1,67 Å (Рисунок 2).

Кроме того, в составе глины были обнаружены кварц (SiO_2) с параметрами d/n = 4,24; 3,34; 2,45; 2,28; 2,12; 1,98; 1,81; 1,66; 1,33 Å, гематит (Fe_2O_3) с характеристиками d/n = 2,69; 1,83; 1,68; 1,59 Å, а также гидрослюда с параметрами d/n = 3,21; 2,57; 2,12; 1,49 Å.




Рисунок 2 – Микроскопический снимок минерала монтмориллонита в структуре бентонитовой глины Погодаевского месторождения (увеличение х 5000)

Выбор данной глины оправдан её физико-химическими свойствами, такими как высокая адсорбционная способность, значительная концентрация обменных катионов, обволакивающая способность, высокая пластичность, гидрофильность и щелочность. Эти характеристики обусловлены особенностями структуры кристаллической решетки монтмориллонита, большой удельной поверхностью его частиц и электрокинетическим потенциалом. Монтмориллонит относится к слоистым наносиликатам структурного типа 2:1 с разбухающей кристаллической решеткой, где каждый элементарный пакет имеет толщину, равную 0,94 нм [17,18]. Следующим этапом исследования является изучение композиции в системе опока – бентонит для создания модифицированного сорбента. Составы исследуемых композиций представлены в таблице 4.

Таблица 4 - Исследуемые составы модифицированных сорбентов

№ составов	Опока, масс%	Бентонит, масс.%
1	80	20
2	85	15
3	90	10
4	95	5

Для приготовления модифицированного сорбента пробы опоки и бентонитовой глины сначала сушились в сушильном шкафу при температуре 80-95°С до остаточной влажности 5-7%. Затем они подвергались помолу в фарфоровой шаровой мельнице до полного прохождения через сито с размером ячеек 0,14 мм. Полученные порошки опоки и бентонитовой глины подвергались очистке дистиллированной водой методом отмучивания до полного удаления растворяемых солей.

Очищенные порошки подвергались повторной сушке при температуре 80-95°С до остаточной влажности 5-7% и затем термомодификации при температуре 500°С. Эти технологические решения, используемые для модификации, соответствуют исследованиям ученых, занимающихся разработкой сорбентов для очистки воды [48,49].

Одной из ключевых задач является повышение водостойкости модифицированных гранул сорбентов в процессе фильтрации воды. Для достижения этой цели был применен метод создания полимерной матрицы с использованием поливинилового спирта (ПВС). На основе поливинилового спирта был приготовлен гидрогель методом кипячения в дистиллированной воде. Поливиниловый спирт, являющийся водорастворимым синтетическим полимером, образует стабильный и кристаллизующийся гидрогель.

Гидрогель на основе ПВС обладает высокой механической прочностью, биосовместимостью, вязкоупругими свойствами, нетоксичен и экономичен. Из термомодифицированных порошков приготовлены четыре состава (табл. 4) гранулированного модифицированного сорбента с фракциями 1-2 мм и 3-5 мм с применением гидрогели на основе поливинилового спирта (ПВС). Общий вид гранулятора марки DELTA ME 300 и рабочие процессы приготовления гранул сорбента представлены на Рисунок 3 и 4.



Рисунок 3 - Общий вид гранулятора марки DELTA ME 300

Полученный таким образом модифицированный сорбент обладает 100% водостойкостью, что обеспечивает его способность фильтровать воду без разрушения (Рисунок 4).



Рисунок 4 – Общий вид полученных модифицированных сорбентов в композиции опока – бентонит

На основе разработанной схемы была создана экспериментальная установка для опреснения и очистки воды, предназначенная для исследования степени очистки воды с различным химическим составом и уровнем загрязнения. На данной установке были проведены научно-экспериментальные работы по исследованию воды различного химического состава с целью её очистки с использованием разработанных составов. Следующим этапом исследования стало изучение степени солесодержания и общего солесодержания высокоминерализованной подземной воды, взятой из колодца месторождения «Аккурай» Жангалинского района Западно-Казахстанской области, до и после её очистки.

Определение исследуемых параметров проводилось с использованием кондуктометра марки «Марк 603». Этот прибор предназначен для измерения удельной электрической проводимости (УЭП), массовой концентрации соли в водных растворах, пересчитанной на NaCl (солесодержания), а также температуры воды и водных растворов. Кондуктометр позволяет измерять как абсолютную УЭП, так и УЭП, приведенную к температуре 25°C (УЭП 25), что важно для оценки эффективности модифицированных сорбентов на основе кремнистой породы опоки.

Диапазон измерения кондуктометра для солесодержания (С) воды, в пересчете на хлористый натрий (NaCl), составляет от 0 до 1000 мг/дм³, а для общего солесодержания (TDS) — от 0 до 20 000 мг/дм³. Процесс фильтрации воды осуществлялся с использованием разработанной экспериментальной модульной установки. Все измерения исследуемых вод с помощью кондуктометра марки «Марк 603» проводились как до, так и после фильтрации через мобильную установку.

После фильтрации воды на первой и второй стадии очистки наблюдается снижение показателей солесодержания (С) воды, пересчитанных на хлористый натрий (NaCl), а также по общему солесодержанию (TDS). На первой стадии очистки снижение солесодержания (С) составило 8,12%, а по общему солесодержанию (TDS) — 17,45%. На второй стадии очистки снижение для солесодержания (С) составило 79,07%, а для общего солесодержания (TDS) — 76,17%, что является значительным достижением в уменьшении показателей солесодержания высокоминерализованных подземных вод.

Эти результаты подтверждают, что первая стадия фильтрации приводит к некоторому снижению концентрации солей в воде, однако для сильно минерализованных вод этот процесс пока недостаточно эффективен. Вторая стадия очистки продемонстрировала гораздо лучшие результаты, что свидетельствует о высокой эффективности этого этапа фильтрации. Данные показатели указывают на значительное снижение содержания растворённых солей в воде, что критически важно для обработки высокоминерализованных подземных вод.

Заключение. На основе проведенных исследований можно сделать следующие выводы: разработанные сорбенты на основе композиции опока и бентонитовой глины обладают высокими сорбционными свойствами и эффективны в процессе очистки воды от растворенных солей. Установленные закономерности зависимости эффективности очистки от фракционного состава и температуры воды открывают перспективы для оптимизации процесса опреснения, особенно в условиях высокоминерализованных вод. Исследования показали, что меньшие фракции сорбентов (1–2 мм) значительно эффективнее, чем более крупные (3–5 мм), и что температура воды также оказывает влияние на степень очистки, увеличивая её при понижении температуры. Результаты фильтрации на двух стадиях очистки подтвердили, что процесс эффективно снижает содержание солей, что может быть использовано для улучшения качества воды в регионах с высокоминерализованными подземными водами. Эти данные свидетельствуют о высоком потенциале предложенной технологии и её применимости в реальных водоочистных системах, что является важным шагом к улучшению качества питьевой воды и решению проблемы водоснабжения в таких регионах.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Никифоров И.А., Кузьмина Р.И. Дисперсный кремнезѐм: сорбент и катализатор // Катализ в нефтехимии и экологии - Саратов: СГАП, 1999. – С. 135-143.
2. Тарасевич Ю.И. Природные сорбенты в процессах очистки сточных вод.- Киев: Наук. думка, 1981. – С.208 .
3. Кондрашова А.В., Кузьмина Р.И. Физико-химические и адсорбционные свойства опоки и применение еѐ в очистке сточных вод // Международный научно-исследовательский журнал. – 2017. – № 6. – С. 94.
4. Кондрашова А.В., Кузьмина Р.И. Адсорбционные исследования дисперсного кремнезѐма – опоки // Успехи современной науки и образования. – 2016, – № 7-1
5. Кондрашова А.В., Кузьмина Р.И. Определение термической устойчивости дисперсного кремнезѐма // Успехи современной науки. – 2017. – Т. 2., № 8. – С. 41-47.
6. Кузьмина, Р.И. Физико-химические свойства природного кремнезѐма – опоки / Р.И. Кузьмина, А.В. Кондрашова // Известия Саратовского университета. Серия Химия. Биология. Экология. – 2012. – № 3. – С. 37-40.
7. Никифоров И.А., Кузьмина Р.И. Дисперсный кремнезѐм: сорбент и катализатор // Катализ в нефтехимии и экологии - Саратов: СГАП, 1999. – С. 135-143.

Кондрашова А.В. Природная опока в адсорбционной очистке //Инновационный центр образования и науки – 2015.

8. Дистанов У.Г., Конюхов Т.П. Минеральное сырье. Сорбенты природные. - М.:

ЗАО «Геоинформмарк», – 1999. – С.42.

9. Кондрашова А.В. Химическая активация дисперсного кремнезема – колбы // Инженерный вестник Дона. – 2019. – № 1. – С. 52.

10. Кондрашова, А.В. Сорбция катионов металлов на опоке / А.В. Кондрашова // Международная научно-практическая конференция «Вавиловские чтения-2009», часть 1, Саратов: ООО Издательство «КУБиК», 2009. – С. 33-35.

11. Куртукова Л.В. Сомин В.А. Комарова Л.Ф. Исследования по удалению из воды солей жесткости с применением сорбентов на основе минеральных волокон и бентонитовых глин // Успехи современного естествознания. – 2011. – № 12. – С. 29.

12. Кондрашова А.В. Химическая активация дисперсного кремнезѐма – опоки // Инженерный вестник Дона. – 2019. – № 1. – С. 52.

13. Першин В.Ф., Бураков А.Е., Воробьев А.М., Першина С.В., Монтаев С.А., Таскалиев А.Т., Монтаева Н.С., Монтаева А.С. Перспективы производства сорбентов и фильтров на основе опок месторождений Казахстана, модифицированных углеродными наноматериалами // Современные проблемы науки и образования. – 2014. – № 2. – С. 52.

14. С.А. Монтаев, А.С. Монтаева, А.Т. Таскалиев, Н.Б. Адилова, Н.С. Монтаева Исследования керамической композиции в системе опока – монтмориллонитовая глина – углерод для создания природного сорбента для фильтрации и очистки воды / С.А. Монтаев, А.С. Монтаева, А.Т. Таскалиев, Н.Б. Адилова, Н.С. Монтаева // С-П.: Научный журнал «Globus», 2016. – С. 73–78.

15. Калюкова Е Н., Бузаева М.В., Кахановская Ю.С., Пустынникова Е.А., Климов Е.С. Сорбционная свойства природных сорбентов – опоки и магнезита по отношению к сульфат- ионам //Башкирский химический журнал. - 2010. – Т. 17, № 2 – С. 126-128.

16. S.A. Montayev, A.S. Montayeva, N.B. Adilova, A.B. Shinguzhiyeva, N.S. Montayeva, A.T. Taskaliyev. Prospects of creating the technology of composite adsorbent for water purification based on the composition of siliceous and clay rocks of Kazakhstan // International Journal of Mechanical Engineering and Technology (IJMET) Volume 9, Issue 1, January 2018, P. 805–813, Article ID: IJMET_09_01_088

17. СанПиН 2.1.4.1074–01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Введен 26.09.2001. – М.: Изд–во стандартов, 2001 – С.62.

18. М. Г. Иванов, О. Б. Лихарева, А. И. Матерн, Х. М. Ярошевская, Модифицирование опал-кристобалита – опоки красногвардейского месторождения свердловской области // Вестник Казанского технологического университета – 2014. – Т. 17, № 7 – С. 54-59.

19. Михайлова О.А. Технологии химической активации природных минеральных сорбентов / Диссер. канд. техн. наук. – Казань. – 2007. – 148 с.

20. Сейед Мохаммад Джавад Сейед Сабур, Бахман Гораши. Всесторонний обзор основных методов опреснения воды и извлечения минералов из соленой воды // Технология разделения и очистки Том 349, 3 декабря 2024 г., 127913 https://doi.org/10.1016/j.seppur.2024.127913

21. Чонхо Рю , Сунхен Ким, Хе Чжин Хонг, Чон Сик Хонг, Минсун Ким , Тэгонг Рю , Ин Су Пак, Кан Соп Чон, Чум Сок Чан, Ен Гю Ким. Выделение ионов стронция (Sr^{2+}) из морской воды с помощью гидротермально структурированных титанатных нанотрубок: удаление или восстановление / / Журнал химической инженерии, том 304, 15 ноября 2016 г., с. 503-510 https://doi.org/10.1016/j.cej.2016.06.13115.

22. Н. Манкосу, Л.Р. Снайдер, Г. Кириакакис, Д. Спано, Дефицит воды и будущие вызовы для производства продуктов питания // Вода, 2015, с. 975-992. https://doi.org/10.3390/w7030975

23. Липин Ян, Юйсян Ли, Лу Гу, Пин Ма, Чжи И Леонг, Цзин Ван, Хуэйин Ян. Экономичная очистка солоноватой воды с помощью интегрированной емкостной системы опреснения и адсорбции бора // Том 572 об опреснении, 1 марта 2024 г., DOI:10.1016/j.desal.2023.117152

24. Шри Мартини, Шармин Афроз, Киагус Ахмад Рони, Мира Сетиавати, Диан Харизма Деви. Обзор сорбентов, полученных из фруктовых отходов, для удаления красителей и металлов из загрязненной воды и сточных вод // Опреснение и очистка воды, том 235, сентябрь 2021 г., С.300-323 https://doi.org/10.5004/dwt.2021.27658

25. Д. Рама Деви, Г. Шринивасан, С. Котандараман, С. Ашок Кумар, Обзор современных методов удаления хрома из воды и сточных вод, устойчивые практики и инновации в гражданском строительстве, Springer, Сингапур, 2020, С. 37-51. DOI10.1007/978-981-15-5101-7_4

26. С.С. Бьюла, К. Мутукумаран, Методологии удаления красителей из сточных вод: обзор, в т.ч. J. Pure Appl. Химия, 21 (2020) 68-78. **DOI:**10.9734/irjpac/2020/v21i1130225

27. С.Мартини, М. Сетиавати, Технология очистки нефтесодержащих сточных вод различных отраслей промышленности: обзорная статья, Химия: Журнал "Текник Кимия", 7 (2021) С.106-116 DOI:10.26555/chemica.v7i2.18541

REFERENCES

1. Nikiforov I.A., Kuzmina R.I. Dispersnyy kremnezom: sorbent i katalizator // Kataliz v neftekhimii i ekologii - Saratov: SGAP, – 1999. – S. 135-143

2. Tarasevich YU.I. Prirodnyye sorbenty v protsessakh ochistki stochnykh vod.- Kiyev: Nauk. dumka, – 1981. – S. 208 .

3. Kondrashova A.V., Kuzmina R.I. Fiziko-khimicheskiye i adsorbtsionnyye svoystva opoki i primeneniye yeyo v ochistke stochnykh vod // Mezhdunarodnyy nauchno-issledovatel'skiy zhurnal. – 2017. – № 6. – S. 94.

4. Kondrashova A.V., Kuzmina R.I. Adsorbtsionnyye issledovaniya dispersnogo kremnezoma – opoki // Uspekhi sovremennoy nauki i obrazovaniya. – 2016, – № 7

5. Kondrashova A.V., Kuzmina R.I. Opredeleniye termicheskoy ustoychivosti dispersnogo kremnezoma // Uspekhi sovremennoy nauki. – 2017. – T. 2., № 8. – S. 41-47.

6. Kuz'mina, R.I. Fiziko-khimicheskiye svoystva prirodnogo kremnezoma – opoki /

7. R.I. Kuz'mina, A.V. Kondrashova // Izvestiya Saratovskogo universiteta. Seriya Khimiya. Biologiya. Ekologiya. – 2012. – № 3. – S. 37-40.

8. Nikiforov I.A., Kuz'mina R.I. Dispersnyy kremnezom: sorbent i katalizator // Kataliz v neftekhimii i ekologii - Saratov: SGAP, – 1999. – S. 135-143.

9. Kondrashova A.V. Prirodnaya opoka v adsorbtsionnoy ochistke // Innovatsionnyy tsentr obrazovaniya i nauki – 2015.

10. Distanov U.G., Konyukhov T.P. Mineral'noye syr'ye. Sorbenty prirodnyye. - M.: ZAO «Geoinformmark», – 1999. – S.42 .

11. Kondrashova A.V. Khimicheskaya aktivatsiya dispersnogo kremnezema – kolby // Inzhenernyy vestnik Dona. – 2019. – № 1. – S. 52.

12. Kondrashova A.V. Sorbtsiya kationov metallov na opoke / A.V. Kondrashova // Mezhdunarodnaya nauchno-prakticheskaya konferentsiya «Vavilovskiye chteniya-2009», chast' 1, Saratov: OOO Izdatelstvo «KUBiK». – 2009. – S. 33-35.

13. Kurtukova L.V. Somin V.A. Komarova L.F. Issledovaniya po udaleniyu iz vody soley zhestkosti s primeneniyem sorbentov na osnove mineral'nykh volokon i bentonitovykh glin // Uspekhi sovremennogo yestestvoznaniya. – 2011. - № 12. – S. 29.13 Kondrashova A.V. Chemical activation of dispersed silica – flask // Engineering Bulletin of the Don. – 2019. – №.

1. – P. 52.

14. Pershin V.F., Burakov A.Ye., Vorobyev A.M., Pershina S.V., Montayev S.A., Taskaliyev A.T., Montayeva N.S., Montayeva A.S. Perspektivy proizvodstva sorbentov i fil'trov na osnove opok mestorozhdeniy Kazakhstana, modifitsirovannykh uglerodnymi nanomaterialami // Sovremennyye problemy nauki i obrazovaniya. – 2014. – № 2. – S. 52.

15. Montayev S.A., Montayeva A.S., Taskaliyev A.T., Adilova N.B., Montayeva N.S. Issledovaniya keramicheskoy kompozitsii v sisteme opoka – montmorillonitovaya glina – uglerod dlya sozdaniya prirodnogo sorbenta dlya fil'tratsii i ochistki vody / S.A. Montayev, A.S. Montayeva, A.T. Taskaliyev, N.B. Adilova, N.S. Montayeva // S-P.: Nauchnyy zhurnal «Globus», 2016. – S. 73–78.

16. Kalyukova Ye N., Buzayeva M.V., Kakhanovskaya YU.S., Pustynnikova Ye.A., Klimov Ye.S. Sorbtsionnaya svoystva prirodnykh sorbentov – opoki i magnezita po otnosheniyu k sul'fat- ionam //Bashkirskiy khimicheskiy zhurnal. - 2010. – T. 17., № 2 – S. 126-128.

17. S.A. Montayev, A.S. Montayeva, N.B. Adilova, A.B. Shinguzhiyeva, N.S. Montayeva,

SanPiN 2.1.4.1074–01 Pityevaya voda. Gigiyenicheskiye trebovaniya k kachestvu vody tsentralizovannykh sistem pit'yevogo vodosnabzheniya. Vveden 26.09.2001. – M.: Izd–vo standartov, 2001 – S.62 .

18. M. G. Ivanov, O. B. Likhareva, A. I. Matern, KH. M. Yaroshevskaya, Modifitsirovaniye opal-kristobalita – opoki krasnogvardeyskogo mestorozhdeniya sverdlovskoy oblasti // Vestnik Kazanskogo tekhnologicheskogo universiteta – 2014. – T. 17, № 7 – S. 54-59.

19. Mikhaylova O.A. Tekhnologii khimicheskoy aktivatsii prirodnykh mineral'nykh sorbentov / Disser. kand. tekhn. nauk. – Kazan'. – 2007. – S.148.

20. Seyed Mohammad Javad Seyed Sabour , Bahman Ghorashi. A comprehensive review of major water desalination techniques and mineral extraction from saline water // Separation and Purification Technology Volume 349, 3 December 2024, 127913 https://doi.org/10.1016/j.seppur.2024.127913

21. Jungho Ryu , Soonhyun Kim , Hye-Jin Hong , Jeongsik Hong , Minsun Kim , Taegong Ryu , In-Su Park , Kang-Sup Chung , Jum Suk Jang , Byoung-Gyu Kim. Strontium ion (Sr2+) separation from seawater by hydrothermally structured titanate nanotubes: Removal vs. Recovery // Chemical Engineering Journal Volume 304, 15 November 2016, Pages 503-510 https://doi.org/10.1016/j.cej.2016.06.131

22. N. Mancosu, L.R. Snyder, G. Kyriakakis, D. Spano, Water Scarcity and Future Challenges for Food Production // Water, 2015, pp. 975–992. https://doi.org/10.3390/w7030975

23. Liping Yang , Yixiang Li, Lu Gu , Pin Ma, Zhi Yi Leong, Jing Wang, Hui Ying Yang. Economical-effective purification of brackish water through an integrated capacitive desalination & boron adsorption system // Desalination Volume 572, 1 March 2024, 117152 DOI:10.1016/j.desal.2023.117152

24. Sri Martini, Sharmeen Afroze, Kiagus Ahmad Roni, Mira Setiawati, Dian Kharismadewi. A review of fruit waste-derived sorbents for dyes and metals removal from contaminated water and wastewater // Desalination and Water Treatment Volume 235, September 2021, Pages 300-323 https://doi.org/10.5004/dwt.2021.27658

25. D. Rama Devi, G. Srinivasan, S. Kothandaraman, S. Ashok Kumar, State-of-the-Art Review—Methods of Chromium Removal from Water and Wastewater, Sustainable Practices and Innovations in Civil Engineering, Springer, Singapore, 2020, pp. 37–51. DOI10.1007/978-981-15-5101-7_4

26. S.S. Beulah, K. Muthukumaran, Methodologies of removal of dyes from wastewater: a review, Int. Res. J. Pure Appl. Chem., 21 (2020) 68–78. DOI: 10.9734/irjpac/2020/v21i1130225

27. S.Martini, M. Setiawati, Technology for treating oily wastewater derived from various industries: a review paper, Chemica: Jurnal Teknik Kimia, 7 (2021) 106–116. DOI:10.26555/chemica.v7i2.18541

РЕЗЮМЕ

Мақалада Тасқала кен орнының опокасынан жасалған сорбентті жер асты суларын тұзсыздандыру үшін пайдалану қарастырылады. Хлоридтер мен сульфаттар сияқты еріген тұздардың көп мөлшері судың сапасының төмендеуінің негізгі себептерінің бірі болып табылады, бұл тиімді тазарту әдістерін әзірлеуді қажет етеді. Опока, табиғи сорбент ретінде, жоғары кеуектілік және ион алмасу қабілеті сияқты бірегей химиялық және физикалық қасиеттерге ие, бұл оны Судан тұздарды кетіру үшін перспективалы материал етеді. Зерттеу барысында жер асты суларын тұзсыздандыру процесінде опоканың тиімділігін бағалауға бағытталған эксперименттер жүргізілді. Нәтижелер Тасқала кен орнынан опока хлоридтер мен сульфаттарды тиімді түрде алып тастап, олардың концентрациясын 30-40% - ға төмендететінін көрсетті. Бұл жағдайда материал өзінің сорбциялық қасиеттерін судың pH кең диапазонында сақтайды. Мақала опоканың сорбент ретіндегі экологиялық таза және экономикалық қол жетімділігіне баса назар аударады, сонымен қатар технологияны жақсартудың және осы материалды су тазарту қондырғыларында қолданудың мүмкін жолдарын қарастырады.

UDC (338.43.02)
MRNTI: 68.39.35

Zhambylova G.Zh., magıstr of Economics, Senior Lecturer, https://orcid.org/0009-0006-8776-6827
Kh. Dosmukhamedov Atyrau University, Atyrau, Republic of Kazakhstan, Atyrau City, student Avenue, g.zhambylova@asu.edu.kz
Daulieva G.R., c.e.s., acting professor, https://orcid.org/0000-0001-8233-9830
Al-Farabi Kazakh National University Al-Farabi Avenue 71, Almaty 050040, Kazakhstan, galiya.daulieva@kaznu.edu.kz

MODERNIZATION OF THE AGRICULTURAL SECTOR OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN AS THE MAIN FACTOR IN ENSURING THE COMPETITIVENESS OF THE COUNTRY

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫ СЕКТОРЫН ЖАҢҒЫРТУ ЕЛ БӘСЕКЕГЕ ҚАБІЛЕТТІЛІГІН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУДІҢ БАСТЫ ФАКТОРЫ РЕТІНДЕ

ANNOTATION

The article explores the modernization of the agricultural sector in Kazakhstan as a crucial driver of national competitiveness and sustainable growth. It undertakes a comprehensive examination of the agro-industrial complex, highlighting structural issues such as the predominance of raw materials exports, low productivity, outdated technologies, and ineffective subsidy systems.

The article places a particular focus on the significance of innovation in bolstering sector resilience and economic performance, encompassing digital transformation and intelligent agriculture. The study underscores the importance of policy reforms to enhance land administration, enhance investment appeal, foster infrastructure development, and secure access to long-term financing.

Furthermore, the study examines the potential of natural and geographical resources, such as fertile land and a strategic location near major markets, to enhance export capabilities. The development of human capital, the revitalization of rural areas, and the integration of small-scale farmers into value chains are key elements of a sustainable agricultural transformation. The article highlights the significance of a comprehensive modernization strategy that adheres to global standards and is backed by strong institutional frameworks. This strategy aims to transform Kazakhstan's agricultural sector into a globally competitive and environmentally sustainable industry.

АҢДАТПА

Мақалада Қазақстанның ауыл шаруашылығы секторын жаңғырту ұлттық бәсекеге қабілеттілік пен орнықты өсудің маңызды факторы ретінде қарастырылады. Мақалада агроөнеркәсіптік кешенге жан-жақты талдау жүргізіледі, шикізат экспортының басым болуы, өнімділіктің төмендігі, ескірген технологиялар және субсидиялаудың тиімсіз жүйелері сияқты құрылымдық проблемалар баяндалады.

Мақалада цифрлық трансформация мен Интеллектуалды Ауыл шаруашылығын қоса алғанда, сектордың тұрақтылығы мен экономикалық көрсеткіштерін арттыру үшін инновациялардың маңыздылығына баса назар аударылады. Зерттеу жер ресурстарын

басқаруды жақсарту, инвестициялық тартымдылықты арттыру, инфрақұрылымды ілгерілету және ұзақ мерзімді қаржыландыруға қол жеткізуді қамтамасыз ету үшін саяси реформалардың маңыздылығын көрсетеді.

Сонымен қатар, зерттеу экспорттық мүмкіндіктерді кеңейту үшін құнарлы жерлер және негізгі нарықтарға жақын стратегиялық орналасу сияқты табиғи және географиялық ресурстардың әлеуетін қарастырады. Адами капиталды дамыту, ауылдық жерлерді жандандыру және шағын фермерлерді өндіріс пен сату тізбегіне біріктіру Ауыл шаруашылығын тұрақты трансформациялаудың негізгі элементтері болып табылады. Мақалада әлемдік стандарттарға сәйкес келетін және берік институционалдық шеңберге сүйенетін кешенді модернизация стратегиясының маңыздылығы көрсетілген. Бұл стратегия Қазақстанның ауыл шаруашылығы секторын әлемдік деңгейде бәсекеге қабілетті және экологиялық тұрақты салаға айналдыруға бағытталған.

Keywords: *modernization, agricultural policy, food security, digital transformation, competitiveness, innovation, land governance, rural development, Kazakhstan*

Түйінді сөздер: *жаңғырту, аграрлық саясат, азық-түлік қауіпсіздігі, цифрландыру, бәсекеге қабілеттілік, инновациялар, жер қатынастары, ауылды дамыту, Қазақстан*

Introduction. World economic practice, as well as the advanced experience of domestic agricultural producers, testifies to the decisive importance of scientific and technological progress and innovative processes in the development of the agricultural sector of the economy.Continuous renewal of production on the basis of mastering the achievements of science and technology is becoming a key factor in the growth and increase in the efficiency of agricultural production. To achieve significant results in the development of agriculture and to take a worthy place in the agricultural sector is possible only with the transition of agricultural producers to an innovative model of management, which is an expanded reproduction on a renewed basis.

The agricultural sector is one of the important sectors of the economy, which, through the formation of the country's food security, participates in ensuring the national security of the country. The agricultural sector of the Republic of Kazakhstan has prospects for further development: there are sales markets, arable land, prospects for the development of irrigated agriculture, the export positions of the oilseed and meat sectors are being strengthened, and in grain and flour Kazakhstan became one of the largest exporting countries in the world in the shortest possible time.

Kazakhstan's membership in the Eurasian Economic Union and the World Trade Organization creates opportunities and at the same time places high demands on competitiveness in both domestic and foreign markets. In this regard, the role of modernization of the agricultural sector of the country is extremely important [1].

In addition, in the context of geopolitical problems, the Republic of Kazakhstan faces a particularly acute threat to global food security, the provision of which is based on the modernization of the country's agriculture. President of the Republic of Kazakhstan K. K. Tokayev in his Speech noted that the events in Ukraine led to a sharp jump in food prices, which requires a modernized approach to the development of agriculture and rural areas of the Republic of Kazakhstan. The Head of State also noted that 2023 will be held under the auspices of improving the well-being and quality of life of the villagers [2].

The purpose of this study is to identify the main factors of modernization of the agricultural sector of the Republic of Kazakhstan. To achieve this goal, we first need to identify the features of modernization in the agricultural sector, justify the importance of modernization of the agricultural sector of the Republic of Kazakhstan, analyze the current state of the industry

in the country, highlight current problems in the development of agriculture in the country and suggest ways to solve them.

Materials and methods of research. The study and discussion of the subject of research, which is the process of modernization of the agricultural sector in Kazakhstan, is based on an analysis of domestic and international scientific sources in the field of agriculture. In addition, government documents and legislation, as well as state programs for the development of agriculture in Kazakhstan, were used in the study. Statistical data in this work were obtained from the official website of the National Statistics Bureau of the Agency for Strategic Planning and Reforms in Kazakhstan.

The research methodology is based on universal methods and principles used in scientific research. This includes: analysis of information to identify the essence of the modernization of the agricultural sector and the current state of the sector in Kazakhstan, as well as analysis and synthesis to highlight the main challenges in the development of agriculture in Kazakhstan and possible solutions. Additionally, when working with statistical data, descriptive statistics were applied. These methods helped ensure the reliability and accuracy of the conclusions and the development of key points, as well as the relevance of the findings to current economic practices.

The ongoing geopolitical and geo-economic changes in recent decades have made it clear that there is a need for the modernization of developing countries' economies, including the Republic of Kazakhstan. Due to historical factors, the agricultural sector plays a crucial role in supporting Kazakh society. Therefore, it requires a special approach to ensure its importance in the national economy.

Today, Kazakhstan's agricultural sector operates in a global market where competition is increasing, digitalization is transforming the economy, and globalization is creating asymmetrical challenges. The country's agro-industrial complex must adapt to these changes while leveraging its advantage of having a large amount of arable land, ranking second in the world in this regard. Additionally, Kazakhstan exports strategic products such as grain and flour, making it a significant player in the global market.

The directions of the agro-industrial complex that can be used to assess the level of modernization in the sector include crop and livestock production, rural development, land resources, and innovations and technologies. Comprehensive modernization of the agricultural sector is essential to ensure food security in the Republic of Kazakhstan. This modernization is guided by agrarian policies aligned with the United Nations' Sustainable Development Goals and the strategic objectives of the Food and Agriculture Organization. The goal is for Kazakhstan to enter the world market with agricultural products that meet international quality standards, which requires large-scale modernization and a transition to an innovative model of domestic agro-industrial development and smart economy.

The aim of modernizing the agrarian economy in Kazakhstan is to achieve sustainable development through the creation of an innovative agricultural system that can adapt to ongoing changes. This system should provide a multiplier effect on the development of other industries and help the country integrate into the global market as a competitive player. Additionally, it should focus on greening production and reducing its environmental impact [3].

To achieve these goals, an effective economic mechanism is needed that will contribute to the following strategic objectives:

- Transitioning from a raw materials-based to an innovative agrarian model.
- Promoting high-tech accumulation and replication.
- Creating a new quality of investment demand.
- Establishing ecological agriculture.
- Integrating farmers into the global agri-food system, focusing on products with higher added value.

- Achieving the appropriate level of food safety standards
- Reduction of food imports
- Saving of foreign exchange reserves
- Growth of the economy as a whole
- Increase in employment and improvement of the quality of life for rural residents
- Ensuring the profitable operation of agricultural enterprises in the long term

Agriculture is a crucial industry in Kazakhstan's economy, accounting for less than 5-6% of GDP but employing 11% of the able-bodied population and providing employment for 7.6 million people (38% of the population) living in rural areas.

Results and their discussion. In Kazakhstan, agriculture is based on two main sectors: crop and livestock production. The majority of farms are dedicated to raising sheep and cattle, as well as selling dairy products, leather, meat, and wool. When it comes to crop production, wheat, barley, cotton, and rice are the most common crops. Wheat exports are a major source of foreign currency for the country. Kazakhstan is among the top ten grain exporters globally. According to data from the Ministry of Agriculture of Kazakhstan, between 2013 and 2019, an average of 19.1 million tons of grain were produced each year, with over 8 million tons exported annually to over 70 countries worldwide.

In agriculture, according to the Statistics Committee of the Ministry of National Economy of the Republic of Kazakhstan, the average salary as of January 1 of this year was the lowest in the sectors of the economy and amounted to 135.6 thousand tenge [4]. It is important to note that this is 26% more than a year earlier, however, despite the overall increase in income, the standard and quality of life in rural areas of the country remain low. Therefore, the agricultural sector of the Republic of Kazakhstan as the most important branch of the national economy to this day remains a sector with a huge unrealized potential.

One of the most significant factors for the growth of Kazakhstan's agriculture and industry is its land. Thanks to its favorable geographical location, natural and climatic conditions, as well as a vast reserve of arable land (74% of the total area suitable for agricultural purposes), the country has the potential to increase agricultural production and expand exports to neighboring nations.

Each region's weather and geography determine which crops can thrive there. Great attention is paid to livestock development as well. For instance, agriculture in southern Kazakhstan flourishes in warm foothills. With proper irrigation systems, tobacco, sugar beet, rice, and cotton can be cultivated, and viticulture is a profitable activity in that area.

In Western Kazakhstan, agriculture is primarily based on livestock due to the availability of large meadows and pastures. Camels, sheep, and horses are among the most commonly raised animals. Approximately 70% of the arable land is used to grow wheat, while rye, millet, and barley are grown on the rest of the land.

In Northern Kazakhstan, there have been excellent results in the development of meat and dairy cattle, as well as poultry. However, sheep farming remains the main industry in this region. Crop production mainly consists of grains and cotton in Northern Kazakhstan.

Eastern Kazakhstan takes a different approach to agriculture with non-irrigated farming as the main focus. Most of the land is dedicated to sunflower production, with peas, oats, wheat, and vegetables also being cultivated near rivers. Meat and milk production are also rapidly growing in this area.

Overall, Kazakhstan has several natural advantages, including:

– Availability of natural pastureland - 180 million hectares (5th in the world behind China, Australia, USA, Brazil). This space is suitable for raising up to 30 million traditional livestock heads. Currently, only 12 million livestock are on these pastures.

– Arable land available - 35.4 million hectares, including 10.6 million hectares fallow. The average annual surplus of grain production is 7 million tons, with exports without access to the sea.

– Irrigation water resources - 4 million hectare land.

– Proximity to major markets like China, Iran, Russia, Gulf countries, Uzbekistan, Afghanistan.

According to statistics, the agricultural sector has seen a relatively stable situation over the past decade. There has been a general positive trend, with the volume of agricultural production increasing significantly since 2015. In 2021, the volume reached 7.515 billion tenge, an increase of 3.208 billion tenge from 2015 alone.

Crop production accounts for approximately 58% of the total agricultural output, while livestock production makes up the remaining 42%, as shown in Figures 1 and 2.




Figure 1 - Gross output of agricultural products (services) (million tenge)

Sustainable growth of agricultural output has primarily been driven by inflation and a shift towards cultivating more profitable crops, such as oilseeds and legumes. Analyzing data from 2000-2010 shows that agricultural production steadily increased, almost doubling in size. This trend continued into 2020 with a nearly three-fold increase. While growth slowed in 2021-2024, it remains positive. Overall, production increased almost tenfold from 2000 to 2024, demonstrating the effectiveness of transformations and government support for the agricultural sector.

The number of livestock has also increased, with cattle numbers growing from 6.03 million heads in 2014 to 8.19 million in 2021. Small livestock, including sheep and goats, numbered 20.9 million at the end of 2021, while horses numbered 3.5 million and birds numbered 47.9 million.

In addition, the agricultural sector's overall performance has not shown significant growth, and it significantly lags behind global standards. There is a significant imbalance in foreign trade, with a negative trade balance ranging from 500 million to 1 billion USD annually. This means that more agricultural products are imported into our country than exported.

Furthermore, about 80% of agricultural products produced in Kazakhstan are sold as raw materials, without any processing. This results in low added value for these products, as they are not processed further. This situation is common across all sectors of the agro-industry, where most livestock exports consist of live cattle, which have low profit margins. These cattle are then used as raw materials for further processing.

At the same time, the average price of Kazakhstan's exports is $200 per ton, while the price of imported food products is over $1,000. This is due to the increased import of cattle, vegetables, dairy products, and other agricultural goods, which has led to a rise in imports.

Employment in the agriculture sector has also seen a negative trend over the past eight years. Employment in the agriculture, forestry, and fishing sectors decreased from 2.3418 million people in 2014 to 1.8138 million in 2022. This decrease is due to various factors, including the lack of comprehensive government solutions for accessing key resources such as land and finance, as well as the current process for providing agricultural land being non-transparent and allowing local executive bodies to make decisions based on subjective arguments and opinions. This creates a fertile environment for corruption and does not ensure the preservation of land rights due to the instability of land laws.

The 1-table clearly demonstrates the structural changes in agricultural production in Kazakhstan over the period 2015-2024. These data not only reflect the dynamics of development of the agricultural sector in the country but also identify the most significant trends in its modernization.

Table 1-Structure of Agricultural Output in Kazakhstan (2015–2024)

Year	Crop Production (%)	Livestock Production (%)	Total agricultural production (billion pounds)
2015	55.2	44.8	4307
2018	56.1	43.9	5050
2021	58.0	42.0	7515
2024	59.5	40.5	8240

Specifically, the share of crop production has increased annually, rising to 59.5% in 2024 from 55.2% in 2015. This indicates an increase in production of oilseeds, grains, and export-oriented crops. Conversely, the proportion of animal husbandry has been relatively declining. This may be due to a lack of animal feed, inadequate processing infrastructure, and an imbalance in government support.

The volume of gross agricultural output has increased from 4,307 billion tenge in 2015 to 8,240 billion tenge in 2024. This growth can be attributed to the gradual implementation of state programs, subsidies, investment activities, and digitalization. However, it's also possible that a significant portion of this increase is due to inflationary effects and rising product prices.

These statistics show a structural shift in the agricultural sector, with a focus on crop production. While these changes are a positive step, they are not sufficient for long-term sustainable development. The industry requires deep modernization and a transition to an innovative model that focuses on producing high-value added products.

There is a lack of access to information about vacant land, such as its location, size, composition, and quality, which creates fertile ground for corruption in the agricultural sector. The lack of transparency in land circulation leads to a sense of injustice and social unrest in society.

To address this issue, it is essential for the industry to adopt principles of honesty and transparency through transparent procedures. Digital technologies can play a crucial role in this process by providing access to accurate and up-to-date information.

Government support for digitalization in agriculture, along with appropriate government regulation and internet access in rural areas, are essential to ensure fair and transparent land circulation.

It is important to remember that a new phase in technology has begun - the introduction of digital technologies. This has created new opportunities for increased productivity, improved product quality, reduced losses, and decreased energy intensity.

Digital collection of data on crops and livestock, allowing for detailed information to be collected on specific fields and animals in real-time, enables the calculation of fertilizers and plant protection products. The introduction of artificial intelligence is also possible.

Digitalization will provide answers to key questions for farmers, such as how to achieve higher yields and productivity per hectare while using fewer resources, including human and material resources. However, there are some challenges, such as unprepared infrastructure, outdated agronomist education programs, and financial obstacles. Avoiding digital transformation could lead to losing competitiveness.

In this regard, it is important for the state to implement a set of incentives and regulatory measures that will determine the adoption of digital technologies in agriculture. These measures include:

1. Developing digital infrastructure (e.g., internet access);
2. Upgrading the educational system and creating new advanced training programs;
3. Streamlining financing for innovations;
4. Government regulation.
5. Digitalization of the Processes of Providing State Support for Agriculture

State support for the agricultural industry is provided through the adoption of legislative acts and the development of government programs. Within these programs, vectors for industry development and instruments of government assistance are determined.

Since independence, 11 program documents have been developed that have guided government policy in the agricultural sector. These include:

1. The Auyl Social and Economic Development Program for 1991-95 and 2000;
2. Conceptual Program for Agro-Industrial Development for 1993-95 to 2000;
3. Agricultural Production Development Program for 2000-2;
4. State Agro-food Program for 2003-5;
5. State Rural Development Program for 2004-10;
6. Concept of Sustainable Agro-industrial Development for 2006-2010.
7. A Program of Priority Measures for Implementing the Concept of Sustainable Development in the Agro-Industry of Kazakhstan for 2006-2010.
8. Agro-Industrial Development Program 2010-2014.
9. Program for the Development of Agro-industry "Agribusiness 2017".
10. State Program for Development of the Agro-industrial Complex of the Republic of Kazakhstan 2017-2021.
11. Concept for the Development of Agriculture and Industry 2021-2030.

During this period, more than two trillion tenge were spent on subsidizing the agricultural sector alone. In addition, through the implementation of national and sectoral programs, significant investment activity has been stimulated and promising sectors of agriculture have been developed.

Overall, the main driver of the development of Kazakhstan's agro-industry is government subsidies for agricultural production and financing for the agro-sector. Lack of affordable and long-term credit seriously hampers the growth of agro-businesses [8].

In recent years, Kazakhstan has seen a reduction in lending to the agriculture and food industry by second-tier banks, with a rather high interest rate of 6%. Over the past five years, the share of funding provided by these banks to these sectors has decreased by an average of 40%.

With all raw materials being imported and listed on international exchanges, any changes in the tenge exchange rate directly affect the amount of working capital needed by farmers,

increasing the credit burden on the industry. As a result, mechanisms for subsidizing the sector must be radically reviewed.

Kazakhstan annually increases the amount of state financial support for its agro-industrial complex. On average, more than 300 billion tenge are allocated directly from the republican budget each year to subsidize the agricultural sectors. The most common types of subsidies include financial instruments such as investment subsidies, interest rate subsidies, etc [9].

Despite this support, the agricultural sector's share in the country's gross domestic product (GDP) remains relatively low. The subsidy mechanisms also regularly face criticism from agricultural producers and are accompanied by corruption scandals. This has led to a recognition of the inefficiency of the current subsidy system and a lack of economic rationale.

It should also be noted that the country does not evaluate the effectiveness of subsidizing the agro-industrial complex. The purpose of subsidies in the agricultural sector is to cover costs, and once a person receives them, the effect takes place in accordance with the law. The subsidy is used to cover these costs. Therefore, it would be beneficial to provide subsidies in advance during the winter months, when farmers need resources to prepare for the upcoming season.

To establish an effective mechanism for subsidizing agriculture in Kazakhstan, we can look to the experience of developed countries around the world. Most countries use subsidies to support agricultural production, but leading agricultural exporters such as Australia, New Zealand, Argentina, and Brazil do not directly subsidize producers.

In the subsidy systems used by developed countries, there are several main forms of state regulation for the agricultural sector. These include price support (in the USA), income support through payments per hectare and per livestock (in EU countries), income support based on historical income levels (in Canada), and preferential lending regimes (in Brazil). From an administrative point of view, the simplest form of subsidy is payment per hectare or per livestock [10].

In this regard, the government of our country needs to develop a long-term, stable state program with clearly defined priorities and mechanisms for state support, providing the necessary financial resources. This document should have the status of law, listing all programs funded by the government. This will make the process of subsidy allocation as transparent as possible.

For example, in the United States, such laws are passed by Congress every five years. Development programs should take into account regional specifics and specializations.

To ensure the success of this law, it is essential to establish close cooperation between the agricultural sector and state-funded researchers, as well as the introduction of new technologies. Supporting science and introducing new technologies should be a top priority for the government.

Another important task for the government is to provide access to finance and long-term cheap credit for entrepreneurs in the agriculture sector.

Preferential lending should be primarily focused on technical modernization, improving soil fertility, implementing modern irrigation systems, producing advanced agrotechnical equipment and agricultural machinery, automating and computerizing the industry, developing logistics, creating infrastructure for collecting, storing, and marketing products, promoting domestic production of vaccines and medications, and constructing biological facilities. The procurement system for biological products needs new approaches.

Both loans and subsidies should encourage the full use of modern processors. They should be available only to farms and businesses that have adopted digitalization in their production, provided that they have access to the internet. However, small farmers in rural areas without internet or other infrastructure should also be considered. In this context, the government needs to expand internet coverage in rural areas. Germany is developing support measures to create

local networks tailored to farmers' needs, using high-performance frequencies and at a relatively low cost.

There is an acute shortage of skilled personnel in Kazakhstan, particularly in the agro-industrial sector. To address this issue, it is essential to attract educated and trained young people to work in rural areas in order to improve the quality of life for villagers. This requires raising the prestige of agricultural professions, such as agronomists, zootechnicians, veterinaries, machinists, and electricians. Without these professionals, the development of agriculture would be impossible.

To attract young people to these professions, regular advanced training courses should be offered for rural specialists and farmers on the basis of specialized institutes and colleges. The training system should be improved by providing support for learning and skill acquisition. In Poland, for example, financial assistance is provided to competent organizations that carry out educational and consulting activities in the field of vocational training.

It is important to support the development of new farmers who will use innovative approaches in their farming activities through grants, training, and mentoring. For instance, in the United States, the Beginning Farmer and Rancher Development Program (BFRDP) supports organizations that help new farmers meet their needs for education, technical skills, and information.

Providing subsidies linked to farmers' level of expertise, involving specialists, and providing ongoing training will lead to a qualitative improvement in personnel training in this field.

The difficult geopolitical situation in the world has significantly worsened the problem of rising prices for agricultural products. Considering the small-scale commercialization of agriculture in Kazakhstan, it is essential to invest in creating a warehouse infrastructure that allows for long-term storage of products. This will help farmers avoid overproduction, as buyers can then lower prices and gradually increase production. Additionally, measures should be taken to reduce the number of intermediaries between producers and consumers.

Almost all countries use various mechanisms to restrict the import of agricultural products in order to protect their domestic producers. The Republic of Kazakhstan, too, must use all available mechanisms that do not conflict with WTO rules, including tariff and non-tariff measures. Special attention should be paid to barriers related to the quality of goods, as these help to discipline domestic producers and prevent low-quality products from entering the domestic market.

Agriculture is generally considered a major driver of economic growth for a country, but in the context of the Republic of Kazakhstan, this industry is currently not a high-tech sector. It has not shown a significant increase in profitability or productivity, which is why modernizing the agricultural sector remains a crucial direction. As a result of this modernization, not only the agriculture sector but also the overall economy of the country will benefit.

Conclusion. Agriculture in the Republic of Kazakhstan has received increased attention from the government. This is mainly due to the fact that the industry plays a crucial role in ensuring the economic and food security of the country. Additionally, the agricultural sector relies heavily on natural factors, such as land and various resources, which are limited and diverse.

During the years of independence in the agro-industrial complex of Kazakhstan, a number of significant transformations occurred, leading to the formation of a diverse agricultural economy. However, along with these positive developments, several challenges emerged that hindered the effective development of the Kazakh agricultural sector. More than one-third of the country's population is engaged in agriculture, despite only accounting for 5-6% of the gross

domestic product (GDP), which is considered critically low for a sector so vital to the country's economy and food security, particularly in challenging geopolitical circumstances.

Although the government provides significant funding for the agricultural sector, the majority of this money is spent on subsidies for production and output. A large portion of these subsidies goes to a small number of companies and agricultural holdings, with the lion's share going to just a few enterprises. The data presented in this paper suggests that these subsidy recipients are less efficient and productive than family farms, which contribute the majority of agricultural value added in Kazakhstan. Investing in public services and implementing institutional reforms could provide a long-term foundation for productivity growth in the sector rather than relying on fiscal transfers that support inefficient production practices.

To ensure that agriculture contributes more to export earnings and economic diversification, it is important to ensure that all producers have access to essential public services. Key areas that need improvement include water and road infrastructure, among others.

Public support for agricultural finance could shift from direct funding towards the provision of public risk assessment services. This would create more opportunities for innovation and knowledge sharing, including public investment in agricultural research and a more coherent and effective dissemination system.

Additionally, a more efficient service system would require strong local institutions. Collective action at the local level could be a tool for improving access to services, finance, and human capital for small producers. However, this would require an enabling environment that does not encourage subsidy absorption.

REFERENCES

1. State Program for the Development of the Agro-Industrial Complex of the Republic of Kazakhstan for 2017–2021. https://adilet.zan.kz/rus/docs/P1800000423
2. Address by the President of the Republic of Kazakhstan, Kassym-Jomart Tokayev, to the People of Kazakhstan "New Kazakhstan: the path of renewal and modernization" dated March 16, 2022. https://www.akorda.kz/ru/poslanie-glavy-gosudarstva-kasym-zhomarta-tokaeva-narodu-kazahstana-1623953
3. Grigoruk V.V., Klimov E.V. (2016). Development of Organic Farming in the World and Kazakhstan. FAO, Ankara.
4. Official website of the Bureau of National Statistics Agency for Strategic Planning and Reforms of the Republic of Kazakhstan. https://stat.gov.kz/
5. Official website of The World Bank. https://www.worldbank.org/
6. International Experience in the Development of Digitalization in the Agro-Industrial Complex: State Support, Regulation, Practice. https://eec.eaeunion.org/upload/medialibrary/d62/Mezhdunarodnyy-opyt-razvitiya-tsifrovizatsii-v-APK-gosudarstvennaya-podderzhka_-regulirovanie.pdf
7. Concept for the Development of the Agro-Industrial Complex of the Republic of Kazakhstan for 2021-2030. https://adilet.zan.kz/rus/docs/P2100000960#z59
8. Bank Lending of AIC of Kazakhstan. Problems of AgriMarket. 2019; p. 98-104. file:///C:/Users/Dambaldor/Downloads/239-295-1-PB.pdf
9. Order of the Minister of Agriculture of the Republic of Kazakhstan dated November 16, 2021, No. 332. "On Amendments and Additions to the Order of the Acting Minister of Agriculture of the Republic of Kazakhstan dated July 23, 2018, No. 317 'On Approval of the Rules for Subsidizing the Reimbursement of Costs Incurred by Entities of the Agro-Industrial Complex, in Case of Investment." https://adilet.zan.kz/rus/docs/V2100025174
10. Program for the Development of the Agro-Industrial Complex in the Republic of Kazakhstan "Agrobusiness-2017." https://adilet.zan.kz/rus/docs/P1300000151

РЕЗЮМЕ

В статье рассматривается модернизация сельскохозяйственного сектора Казахстана как важнейший фактор национальной конкурентоспособности и устойчивого роста. В статье проводится всесторонний анализ агропромышленного комплекса, освещаются такие структурные проблемы, как преобладание экспорта сырья, низкая производительность, устаревшие технологии и неэффективные системы субсидирования. В статье особое внимание уделяется значению инноваций для повышения устойчивости сектора и экономических показателей, включая цифровую трансформацию и интеллектуальное сельское хозяйство. В исследовании подчеркивается важность политических реформ для улучшения управления земельными ресурсами, повышения инвестиционной привлекательности, содействия развитию инфраструктуры и обеспечения доступа к долгосрочному финансированию. Кроме того, в исследовании рассматривается потенциал природных и географических ресурсов, таких как плодородные земли и стратегическое расположение вблизи основных рынков, для расширения экспортных возможностей. Развитие человеческого капитала, возрождение сельских районов и интеграция мелких фермеров в производственно-сбытовые цепочки являются ключевыми элементами устойчивой трансформации сельского хозяйства. В статье подчеркивается важность комплексной стратегии модернизации, которая соответствует мировым стандартам и опирается на прочные институциональные рамки. Данная стратегия направлена на преобразование сельскохозяйственного сектора Казахстана в конкурентоспособную на мировом уровне и экологически устойчивую отрасль.

УДК 639.1
МРНТИ 68.35.07, 68.41.27

Казамбаева А.М., кандидат экномических наук, доцент, https://orcid.org/0000-0002-9947-4227
НАО «Западно-Казахстанский аграрно-технический университет имени Жангир хана», г. Уральск, ул. Жангир хана 51, 090009, Казахстан, aigul_km@bk.ru
Сисенгалиев Р.А., руководитель КХ «Сисенгалиев Р.А.»
Западно-Казахстанская область, Бокейординский район, с.о.им.Темира Масина, с.Борли

Kazambayeva A.M., Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, https://orcid.org/0000-0002-9947-4227
West Kazakhstan Agrarian and Technical University named after Zhangir Khan, 51 Zhangir Khan Street, Uralsk, 090009, Kazakhstan: aigul_km@bk.ru
Sisengaliyev R.A., head of farm “Sisengaliyev R.A.”
West-Kazakhstan region, Bokeyordinsky district, Temir Masin village, Borli village.

УПРАВЛЕНИЕ ПОПУЛЯЦИЯМИ САЙГАКОВ В КАЗАХСТАНЕ: ОТ КРИЗИСА К УСТОЙЧИВОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
SAIGA POPULATION MANAGEMENT IN KAZAKHSTAN: FROM CRISIS TO SUSTAINABLE USE

АННОТАЦИЯ

Особое внимание в исследовании уделено трем основным популяциям сайгака: Уральской, Бетпакдалинской и Устюртской. Анализ динамики численности и индекса роста показал, что наиболее успешным примером восстановления является Уральская

популяция, численность которой к 2023 году превысила исторические показатели, достигнув более 1,9 миллиона голов. В то же время Бетпакдалинская популяция демонстрирует уверенный рост после резкого снижения в 2015 году, а восстановление Устюртской популяции остаётся медленным, что обусловлено высоким уровнем антропогенного воздействия и ограниченностью ареала.

Автор статьи подчёркивают необходимость выработки комплексной национальной стратегии устойчивого промысла сайгака, включающей участие местных сообществ и охотничьих хозяйств, а также создание специализированной инфраструктуры для контроля, переработки и сбыта продукции из сайгака. Отдельное внимание уделено необходимости гармонизации нормативно-правовой базы с международными требованиями, включая соблюдение положений Конвенции СИТЕС.

В работе сформулированы конкретные рекомендации по подготовке к возобновлению регулируемого промысла: усовершенствование моделей популяционной динамики, проведение комплексного мониторинга, развитие систем маркировки и учёта продукции, а также усиление международного сотрудничества. Реализация предложенных мер позволит не только сохранить стабильность популяций сайгака, но и создать устойчивую экономическую модель использования этого уникального ресурса в Казахстане.

ABSTRACT

The study focuses on the three main populations of the saiga antelope in Kazakhstan: the Ural, Betpakdala, and Ustyurt populations. Analysis of population dynamics and growth indices revealed that the Ural population represents the most successful example of recovery, surpassing historical numbers by 2023 with a population exceeding 1.9 million individuals. At the same time, the Betpakdala population is showing steady growth after a sharp decline in 2015, while the recovery of the Ustyurt population remains slow due to intense anthropogenic pressures and habitat limitations.

The author emphasizes the need to develop a comprehensive national strategy for the sustainable use of saiga, which should include active involvement of local communities and hunting enterprises, as well as the establishment of specialized infrastructure for monitoring, processing, and marketing saiga-derived products. Special attention is given to aligning national regulations with international standards, including the requirements of the CITES Convention.

The paper presents specific recommendations for preparing to resume regulated harvesting: improving population dynamics models, implementing comprehensive monitoring systems, developing effective tracking and marking systems for products, and strengthening international cooperation. The implementation of these measures will not only help to maintain the stability of saiga populations but will also support the creation of a sustainable economic model for the use of this unique resource in Kazakhstan.

Ключевые слова: *сайгак, Бетпакдала, популяция, природа, Казахстан, мониторинг, экосистема.*

Keywords: *saiga, Betpakdala, population, nature, Kazakhstan, monitoring, ecosystem*.

Введение. Сайгак (*Saiga tatarica*) — один из самых узнаваемых представителей степной фауны Казахстана, играющий ключевую роль в поддержании экологического баланса степных и полупустынных экосистем [1, с. 23] Однако за последние десятилетия его численность претерпела резкие колебания под влиянием комплекса неблагоприятных факторов: масштабного браконьерства, изменений климата, деградации естественных ландшафтов и последствий строительства линейной инфраструктуры [2, с. 664]. Эти вызовы поставили под угрозу устойчивость популяций

сайгака, особенно Устюртской и Бетпакдалинской, тогда как Уральская популяция демонстрирует успешную тенденцию восстановления.

Учитывая возрастающую необходимость в разработке сбалансированного подхода к сохранению и рациональному использованию природных ресурсов, актуальность исследования возможностей устойчивого промысла сайгака становится очевидной. С одной стороны, восстановление численности популяции открывает перспективы для её хозяйственного использования. С другой стороны, без продуманной стратегии такие действия могут спровоцировать новые угрозы для сохранения вида [3, с. 110].

Целью данного исследования является обоснование подходов к формированию системы устойчивого промысла сайгака в Казахстане, основанной на научных данных о динамике популяций и индексе их роста, а также с учётом необходимости соблюдения международных природоохранных обязательств. Исследование направлено на определение возможных сценариев рационального использования этого уникального ресурса с обязательным включением механизмов защиты и контроля, а также вовлечением местных сообществ и охотничьих хозяйств в процесс управления.

Значимость данного исследования обусловлена как экологической, так и экономической составляющей. Разработка эффективной модели устойчивого промысла позволит не только обеспечить охрану популяций сайгака, но и создать дополнительные источники дохода для региональных сообществ, укрепить природоохранную инфраструктуру и способствовать выполнению международных обязательств Казахстана в области сохранения биоразнообразия.

Материалы и методы исследования. Для проведения исследования были использованы как собственные данные, так и данные официальных источников, отражающие динамику численности трёх основных популяций сайгака в Казахстане: Уральской, Бетпакдалинской и Устюртской. Основной массив данных включал статистику по численности животных за период с 1981 по 2023 годы, индекс роста популяций, а также материалы мониторинга состояния ареалов, предоставленные Комитетом лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан, а также Государственным предприятием «Охотзоопром» [4, с.35; 5, с. 11].

Анализ данных проводился с использованием методов сравнительного анализа динамических рядов, позволяющих отследить изменения численности и темпов роста популяций по многолетнему периоду. Для расчёта индекса роста использовалась формула прироста популяции в процентах по отношению к предыдущему году. Дополнительно применялись методы графической визуализации динамики, что позволило более наглядно отразить тенденции изменений в численности сайгака по каждой популяции.

При анализе факторов, влияющих на состояние популяций, были использованы методы экспертной оценки, включая анализ законодательной базы, регулирующей охрану и использование сайгака, международных норм (в том числе требований Конвенции CITES), а также аналитические материалы, подготовленные научными организациями и природоохранными НПО.

Отдельное внимание было уделено изучению организационных и институциональных механизмов регулирования устойчивого промысла сайгака. В рамках исследования рассмотрены существующие модели управления биологическими ресурсами, применяемые в Казахстане, и международный опыт ведения устойчивого промысла для сопоставимых видов дикой фауны.

Результаты исследования. В последние годы Уральская популяция демонстрирует устойчивую тенденцию к росту, и, по всей видимости, положительная динамика сохранится как минимум в ближайшей перспективе. Численность этой

популяции сейчас превышает показатели советского периода, а оптимальное соотношение самцов и самок способствует высокому уровню воспроизводства. Активные меры по борьбе с браконьерством, включая усиленное патрулирование, позволяют эффективно сдерживать нелегальную добычу [6, с. 56]. При таком благоприятном положении дел можно рассматривать возможность изъятия до 10% поголовья, преимущественно за счёт отстрела самцов и молодняка, организуя промысел преимущественно в осенний период, например, в октябре.

Однако перед тем как приступить к промыслу, потребуется разработать и принять соответствующие законодательные и нормативные документы, а также внедрить процедуры устойчивого использования и механизмы контроля, включая систему маркировки рогов. [7, с. 70]. На реализацию этих мероприятий потребуется определённое время, поэтому немедленное начало добычи невозможно, но такая перспектива вполне реальна в ближайшем будущем. Для выхода на международный рынок с продукцией из сайгака потребуется также предварительно устранить риски недобросовестного использования и только затем подать заявку в СИТЕС (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora/ Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения) на разрешение экспорта в соответствии с установленными правилами [8, с. 70; 9, с. 349].

Рисунок 1 наглядно демонстрирует долгосрочную динамику численности Уральской популяции сайгака за период с 1981 по 2023 год и изменение индекса её роста. В 1980-х годах численность популяции оставалась на относительно высоком уровне, однако уже к середине 1990-х годов наблюдается резкий спад. Основными причинами этого стали последствия социально-экономического кризиса начала 1990-х годов, включая усиление браконьерства и ослабление контроля над использованием природных ресурсов.

Минимальные значения численности популяции приходятся на конец 1990-х годов. Индекс роста в этот период также показывает крайне низкие значения, что свидетельствует о критическом состоянии популяции.

С начала 2000-х годов наблюдается постепенное восстановление численности сайгака. Этот позитивный тренд был обусловлен мерами по усилению охраны, созданием региональных подразделений «Охотзоопрома», а также международной поддержкой природоохранных инициатив. Индекс роста в это время демонстрирует устойчивое повышение, подтверждая эффективность предпринимаемых мероприятий.

Особенно заметный рост численности произошёл в период с 2015 по 2023 год. Если в 2015 году популяция только начала восстанавливаться, то к 2023 году численность превысила 1,9 миллиона голов. При этом индекс роста также достиг высоких показателей, превышая отметку в 200%, что указывает на активное воспроизводство и успешное восстановление популяции.

Таким образом, по состоянию на 2023 год Уральская популяция сайгака демонстрирует устойчивый рост как в абсолютных числах, так и по индексу динамики. Это создаёт предпосылки для обсуждения вопроса о переходе к устойчивому управлению популяцией, включая регулируемый промысел, при условии сохранения эффективных мер охраны и мониторинга.




Рисунок 1 - Динамика численности и индекс роста Уральской популяции сайгака в 1981–2023 гг [10, с. 15].

С 2015 года в Бетпакдалинской наблюдается выраженный рост численности сайгака, что особенно примечательно после массовой гибели, в ходе которой популяция сократилась примерно на 88%. Благодаря сбалансированной структуре популяции обеспечивается высокая воспроизводительная способность, создавая условия для ускоренного восстановления численности. В настоящее время реализуется целый комплекс природоохранных мероприятий, включая работу многочисленных инспекторских групп, функционирование охраняемых территорий, а также активную деятельность неправительственных организаций. Эти меры вселяют уверенность в дальнейшем сохранении положительной динамики, однако сохраняется риск новых массовых падежей, что представляет собой серьёзную угрозу для данной популяции.

В связи с этим рекомендуется не спешить с переходом к устойчивому промыслу и дождаться восстановления численности до уровня свыше 300 000 особей. Пока следует сосредоточиться на подготовительных действиях. Как только будет достигнут необходимый уровень популяции для устойчивой добычи, потребуется включить в систему промысла широкий круг заинтересованных сторон и обеспечить их участие в распределении выгод от охоты, уделяя особое внимание вовлечению местных сообществ и охотничьих хозяйств. Это станет важным условием для получения их поддержки в деле сохранения сайгака.

Рисунок 2 иллюстрирует долгосрочные изменения численности Бетпакдалинской популяции сайгака и динамику её индекса роста за период с 1981 по 2023 год. В начале рассматриваемого периода численность популяции оставалась на стабильно высоком уровне, превышая 400 тысяч голов. Однако уже в середине 1990-х годов наметился спад, связанный с общими социально-экономическими трудностями и ростом браконьерства после распада Советского Союза.

Самый критический период пришёлся на 2015 год, когда в результате массовой гибели было утеряно порядка 88% популяции. На графике это отчётливо отражено резким снижением численности и падением индекса роста. Этот эпизод стал следствием комплекса неблагоприятных факторов, включая вспышки заболеваний и неблагоприятные климатические условия.

После 2015 года началось заметное восстановление популяции. Индекс роста в этот период демонстрирует выраженный подъём, достигая пиковых значений в 2021 году, что свидетельствует о высокой репродуктивной способности и эффективности принятых

природоохранных мер. К 2023 году численность Бетпакдалинской популяции приблизилась к отметке в 850 тысяч голов, демонстрируя устойчивую положительную динамику.

Несмотря на позитивные тенденции, индекс роста в последние два года несколько снижается, что может свидетельствовать о естественном замедлении темпов воспроизводства по мере восстановления численности. Этот факт указывает на необходимость сохранения текущих охранных мер и осторожности в принятии решений о начале промысла.




Рисунок 2 - Численность и индекс роста Бетпакдалинской популяции сайгака в Казахстане (1981–2023 гг.), [10, с. 15]

За последние годы Устюртская популяция сайгака начала восстанавливаться после рекордного спада, зафиксированного в 2015 году. Падение численности, скорее всего, было связано с возведением новой линейной инфраструктуры, которая усугубила проблему браконьерства. Темпы восстановления остаются низкими, и основная часть популяции сосредоточена в северной зоне относительно новой железнодорожной линии, что привело к существенному сокращению ареала обитания. Из-за высокой степени хозяйственного освоения территории и других форм антропогенного давления перспективы этой популяции остаются неопределёнными. Однако благодаря активным мерам охраны численность постепенно увеличивается, а структура популяции демонстрирует позитивные изменения.

На данный момент численность Устюртской популяции далека от тех уровней, которые наблюдались 25–30 лет назад, поэтому говорить о начале её устойчивого использования пока преждевременно. Для выхода на такой уровень потребуется ещё несколько лет стабильного роста. Чтобы ускорить восстановление, необходимо продолжить активные меры по охране, уделяя особое внимание борьбе с браконьерством, а также снижению негативного воздействия инфраструктурных проектов и промышленной деятельности на местах обитания сайгака.

В рисунке 3 прослеживается продолжительный и сложный путь изменения численности Устюртской популяции сайгака и её индекса роста за период с 1981 по 2023 год. В начале рассматриваемого периода, в 1980-х и первой половине 1990-х годов, численность популяции оставалась на относительно стабильном уровне, достигая пиковых значений около 250 тысяч голов. Однако начиная с конца 1990-х годов,

численность резко снизилась, практически до нуля, что видно на графике как критический спад.

Основными причинами такого снижения стали ухудшение охраны после распада Советского Союза, рост браконьерства и негативное влияние антропогенных факторов, включая строительство линейной инфраструктуры, которая ограничила миграционные пути животных.




Рисунок 3 - Динамика численности и индекс роста Устюртской популяции сайгака в 1981–2023 гг., [10, с. 15]

В начале 2000-х годов популяция находилась в крайне уязвимом состоянии, но с усилением охранных мероприятий численность начала медленно восстанавливаться. Индекс роста в этот период демонстрировал колебания, отражая нестабильный характер восстановления популяции. Существенный положительный сдвиг в динамике отмечается с 2017 года, когда индекс роста достигает высоких значений, что указывает на эффективные меры охраны и улучшение условий среды обитания.

Несмотря на это, по состоянию на 2023 год численность Устюртской популяции по-прежнему остаётся на низком уровне по сравнению с историческими значениями. Индекс роста стабилизировался, но абсолютное число особей ещё далеко от оптимальных показателей для обсуждения перспектив устойчивого промысла

Таким образом, динамика Устюртской популяции свидетельствует о медленном, но поступательном восстановлении. Однако для закрепления положительного тренда необходимо продолжать комплексные охранные мероприятия, уделяя особое внимание борьбе с браконьерством и минимизации негативного влияния инфраструктурных проектов. Начинать устойчивый промысел в текущих условиях преждевременно — потребуется ещё несколько лет стабильного роста численности популяции.

Для успешной реализации устойчивого промысла сайгака в Казахстане необходимо стремиться к достижению целого комплекса целей: это получение прибыли, обеспечение достаточного объёма продукции, предоставление социальных выгод и достижение природоохранных результатов. При этом ключевыми задачами станут: создание условий для распределения доходов от добычи сайгака среди различных заинтересованных сторон; налаживание производства широкого ассортимента продукции из ресурсов сайгака; активное вовлечение местных жителей, проживающих в ареале обитания популяций, в процесс охоты с целью предотвращения конфликтов между человеком и дикой природой. Особенно важно одновременно с этим обеспечить

сохранение популяции сайгака и других видов, обитающих в той же экосистеме, для поддержания баланса и здоровья природных комплексов.

Такой многоцелевой подход требует участия широкого круга заинтересованных организаций и местных сообществ в построении устойчивой модели промысла сайгака.

Поскольку продукция, получаемая в результате промысла сайгака, представляет интерес не только для внутреннего потребления в Казахстане, рекомендуется создать специализированное агентство, которое будет централизованно заниматься реализацией продукции сайгака на международных рынках. Такое агентство должно обеспечить полное соответствие экспортных операций требованиям Конвенции СИТЕС, а также организовать централизованный сбор рогов и управление ими с применением современных методов маркировки [11. с.25]. Контроль за деятельностью агентства будет осуществляться компетентным государственным органом — Комитетом лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан [4, с.35].

Альтернативным вариантом является передача этих функций уже существующей структуре. Однако в обоих случаях возникает вопрос о возможной монополизации деятельности, что традиционно вызывает споры, особенно когда речь идёт о новых объектах коммерциализации. Это обстоятельство требует отдельного и всестороннего обсуждения с учётом всех аспектов и последствий [12, с.17].

Среди заинтересованных в промысле сайгака сторон можно выделить охотничьи хозяйства, которых в Казахстане насчитывается несколько сотен, причём некоторые из них расположены в пределах ареала обитания этого вида. Одна из ключевых функций этих хозяйств — обеспечение охраны дикой фауны, включая сайгака, от браконьерского давления. Соответственно, арендаторы таких угодий будут заинтересованы в получении экономических выгод от устойчивого использования популяции сайгака. Это можно реализовать двумя основными способами: выдачей охотничьим хозяйствам лицензий на проведение любительской охоты, в том числе трофейной; либо предоставлением им доли доходов, получаемых от реализации продукции сайгака. Также возможна комбинация этих подходов. Поскольку подобная схема будет способствовать экономической заинтересованности хозяйств в сохранении популяции сайгака, это создаст дополнительные стимулы для эффективной охраны вида [13, с. 28].

Привлечение местных жителей к участию в охоте на сайгака является возможным, однако представляет определённые сложности с точки зрения контроля. Одним из решений может стать предоставление местному населению лицензий по льготной стоимости в рамках местных охотничьих хозяйств, что позволит им получать доступ к мясу сайгака как источнику пропитания [14, с. 37]. Альтернативным вариантом является выдача бесплатных разрешений при условии, что добытые рога и шкуры будут передаваться охотничьему хозяйству для последующей реализации через специализированное агентство по торговле продукцией сайгака в Казахстане.

Важно, чтобы вся охота, осуществляемая местным населением, проводилась строго в рамках установленных сроков — преимущественно в начале осени — и соответствовала установленным нормам для коммерческого промысла. Кроме того, необходимо, чтобы все процессы сопровождались функционированием системы обработки и маркировки рогов с применением современных технологий отслеживания, что позволит эффективно контролировать цепочку поставок и предотвращать нелегальную торговлю [15, с. 14].

Вырученные от промысла сайгака средства в основном будут поступать в государственный бюджет, за исключением доходов от любительской охоты, проводимой охотничьими хозяйствами на арендуемых участках. Крайне важно, чтобы полученные таким образом финансовые средства эффективно направлялись на поддержание

устойчивой модели охоты на сайгака и не становились причиной намеренного либо случайного вреда для его популяции.

Для достижения природоохранных целей в рамках устойчивого промысла сайгака значительную часть доходов целесообразно направлять на финансирование мероприятий по охране природы. В случае с Уральской популяцией основное внимание будет уделено поддержке деятельности «Охотзоопрома» по противодействию браконьерству. Средства, полученные от реализации продукции сайгака, могут быть использованы для покрытия расходов на оплату труда инспекторов, приобретение оборудования и обеспечение патрулирования.

Кроме того, часть этих финансовых ресурсов желательно направить на поддержку информационно-просветительских и образовательных инициатив на местах. Это позволит общественным организациям и неправительственным структурам получить финансирование для проведения разъяснительной работы среди местного населения.

Распределение прибыли от устойчивого промысла сайгака может способствовать достижению поставленных целей. В частности, часть полученных средств можно направлять в пользу сообществ, находящихся в пределах ареала обитания сайгака, чтобы поддержать развитие местной инфраструктуры или коллективных инициатив. При этом не обязательно применять единый подход ко всем населённым пунктам — распределение средств может осуществляться через простую систему грантов, где заявки будут оцениваться по заранее согласованным критериям, разработанным совместно с представителями местных сообществ. Таким образом, доля доходов от охоты будет направляться наиболее подходящим кандидатам по результатам конкурсного отбора. Однако следует учитывать, что прямые денежные выплаты местным жителям в виде пособий нецелесообразны, так как это вызовет вопрос, почему аналогичные меры не применяются в отношении других видов дичи.

Как уже отмечалось ранее, охотничьи хозяйства следует рассматривать в числе потенциальных получателей выгоды от промысла сайгака, поскольку они также играют важную роль в охране этого вида от браконьерства. Соответственно, им необходимо предоставить возможность организовывать любительскую охоту в пределах, описанных выше, а также получить доступ к охотничьим лицензиям, выдаваемым государственными органами. Кроме того, часть доходов от промысла может быть направлена государством на поддержку деятельности охотничьих хозяйств по охране дикой природы. Однако для реализации таких механизмов потребуется провести консультации с основными заинтересованными сторонами, выполнить подробные экономические расчёты и тщательно оценить все потенциальные последствия принимаемых решений.

Заключение. На данный момент эти предварительные условия касаются исключительно Уральской популяции сайгака, поскольку только она находится в состоянии, позволяющем рассматривать возможность промысла. Тем не менее, необходимо разработать систему охоты, которая будет действовать на уровне всей страны.

Перед тем как приступить к использованию ресурсов сайгака, требуется провести комплекс подготовительных мероприятий, так как в настоящее время отсутствует необходимая нормативная база и логистическая инфраструктура для организации промысла. Среди ключевых шагов:

1. Осуществить всесторонний анализ заинтересованных сторон, включая оценку затрат, выгод и возможных рисков, связанных с участием различных групп, что станет основой для формирования устойчивой системы промысла и переработки продукции. Широкое и постоянное вовлечение всех заинтересованных сторон необходимо с самого

начала, чтобы обеспечить стабильность системы и предотвратить риски для популяций сайгака.

2. Разработать детализированные процедуры, внедрить необходимые механизмы и создать соответствующую инфраструктуру для рационального использования сайгака, а также его частей и производных продуктов. Это должно включать стандарты приёмки и обработки материалов, регламент сбора останков сайгака при естественной гибели, а также надлежащие методы обращения с продукцией природного происхождения. Вся продукция из сайгака должна подлежать обязательной регистрации в национальной базе данных под контролем профильной организации, отвечающей за охрану дикой природы. Дополнительно следует внедрить процедуры, основанные на международной практике, включая стандарты по маркировке и отслеживанию продукции в цепочке хранения и реализации.

3. Ввести жёсткий контроль за рынком и цепочками поставок в качестве надёжной меры противодействия браконьерству и нелегальной торговле. Это предусматривает разработку Стандартных операционных процедур для регистрации складских запасов, использование защищённой, уникальной системы маркировки продукции, а также обязательную юридическую регистрацию производителей и продавцов. Помимо этого, необходимо усилить взаимодействие между государственными органами, отладить процедуры передачи, хранения и сбора данных, а также наладить эффективное управление информацией.

4. Казахстанскому правительству потребуется провести консультации со всеми странами, расположенными в пределах ареала обитания сайгака, прежде чем выходить с официальной инициативой о возобновлении международной торговли продукцией из сайгака. Это даст возможность другим странам заблаговременно подготовить информационные сообщения и разработать соответствующие меры.

5. Необходимо разработать и официально утвердить критерии и стандарты, которые позволят определить оптимальную численность сайгака для обеспечения устойчивости популяции. При этом следует учитывать состояние среды обитания, доступность кормовых ресурсов, а также численность поголовья домашнего скота.

Учитывая возможные погрешности в предыдущих моделях динамики численности сайгака, рекомендуется обновить и усовершенствовать эти модели с учётом новых данных и последних научных результатов. Это позволит предоставить компетентным органам Казахстана более точную основу для разработки стратегии устойчивого промысла данного вида в будущем. Для повышения точности моделей, наряду с улучшенными методиками ежегодного весеннего авиационного мониторинга, необходимо проводить дополнительные осенние наблюдения для оценки успешности размножения популяции. Также следует продолжить регулярный наземный мониторинг участков ежегодных отелов с целью сбора данных о половом составе, частоте появления двойных приплодов, а также о выживаемости сайгаков. Кроме того, требуется фиксировать концентрации животных в период гона с применением беспилотных летательных аппаратов и наземных методов сбора информации.

Особое внимание должно уделяться индивидуальной оценке каждой популяции сайгака, с обязательным учётом экстремальных факторов, таких как массовая гибель особей или влияние неблагоприятных климатических условий. Эти параметры должны стать неотъемлемой частью новых моделей популяционной динамики.

Настоящее исследование выполнено в рамках научного проекта AP23486846 «Экономическая оценка воздействия популяций диких животных (сайгаков) на сельское хозяйство и пути уменьшения ущерба», финансируемого Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан по бюджетной программе 217 «Развитие науки,

подпрограмме 102 «Грантовое финансирование научных исследований» на 2024-2026 годы Комитета науки Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Milner-Gulland, E. J. (1994). A Population Model for the Management of the Saiga Antelope. The Journal of Applied Ecology, 31(1), *25*. doi:10.2307/2404596

2. Singh, Navinder & Grachev, I.A. & Bekenov, A.B. & Milner-Gulland, Eleanor. (2010). Tracking greenery in central Asia – the migration of the saiga antelope. Diversity and Distributions. 16. 663 - 675. 10.1111/j.1472-4642.2010.00671.x.

3. Kiselyov, Alexandr & Mayorova, Marina & Shishkina, Nadezhda & Markin, Maxim. (2021). Solving the problems of conservation and rational use of natural resources as a modern factor in the development of the world and regional economy. E3S Web of Conferences. 291. 02015. 10.1051/e3sconf/202129102015.

4. Комитет лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан. Годовой отчёт по мониторингу популяций сайгака за 2023 год. – Астана, 2024.

5. Охотзоопром. Информационный бюллетень о деятельности по охране и мониторингу популяций сайгака. – Алматы, 2023. – 27 с.

6. Каримова Т.Ю., Лущекина А.А., and Неронов В.М.. "Современное состояние и ретроспективный анализ популяций сайгака России и Казахстана" Аридные экосистемы, vol. 27, no. 2 (87), 2021, pp. 57-67.

7. Редникова Т.В. "Значение конвенции cites для охраны биологического разнообразия: полувековой опыт реализации положений" Международное право и международные организации, no. 1, 2023, pp. 67-78.

8. Госконвенция CITES. Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (Вашингтонская конвенция). – 1973. – URL: https://cites.org (дата обращения: 01.04.2025).

9. Lushchekina, A.A., Struchkov, A.V. Conservation planning for saiga antelope populations in Central Asia: Challenges and solutions // Oryx. – 2020. – Vol. 54(3). – P. 348–356.

10. Охрана окружающей среды в Республике Казахстан. Статистический сборник 1981-2023 гг. [Электронный ресурс].-2023 год.-URL: www.stat.gov.kz. (дата обращения: 01.04.2025).

11. Serikbayeva, A. & Akimzhanov, D. & Iskakova, Zhannat & Karagoishin, Zh & Akoyev, M. & Dauletaliyev, T. & Baitanayev, O.. (2023). Saiga (Saiga tatarica) conservation strategy in Kazakhstan. Brazilian Journal of Biology. 83. 10.1590/1519-6984.275397.

12. Каримова, Т.Ю., Лущекина, А.А., Неронов, В.М. Современное состояние и ретроспективный анализ популяций сайгака России и Казахстана / Т.Ю. Каримова, А.А. Лущекина, В.М. Неронов // Аридные экосистемы. - 2021. -№2 (87).- С.42-46.

13. Убушаев Б.И. Значение государственного заповедника «Черные земли» для сохранения популяции сайгака Северо-Западного Прикаспия: история и перспективы // https://www.cms.int/cami/en/news/importance-chernye-zemli-state-reserve-conservation-northwest-pre-caspian-saiga-population (дата обращения: 01.04.2025).

14. Cooke, Brian. (2019). Australia's War Against Rabbits: The Story of Rabbit Haemorrhagic Disease. 10.1071/9781486301744.

15. Craig, John & Anderson, Sandra & Clout, Mick & Creese, Bob & Mitchell, Neil & Ogden, John & Roberts, Mere & Ussher, Graham. (2000). Conservation Issues in New Zealand. Annu. Rev. Ecol. Syst. 25. 61-78. 10.1146/annurev.ecolsys.31.1.61.

REFERENCES

1. Milner-Gulland, E. J. (1994). A Population Model for the Management of the Saiga Antelope. The Journal of Applied Ecology, 31(1), 25. doi:10.2307/2404596
2. Singh, Navinder & Grachev, I.A. & Bekenov, A.B. & Milner-Gulland, Eleanor. (2010). Tracking greenery in central Asia – the migration of the saiga antelope. Diversity and Distributions. 16. 663 - 675. 10.1111/j.1472-4642.2010.00671.x.
3. Kiselyov, Alexandr & Mayorova, Marina & Shishkina, Nadezhda & Markin, Maxim. (2021). Solving the problems of conservation and rational use of natural resources as a modern factor in the development of the world and regional economy. E3S Web of Conferences. 291. 02015. 10.1051/e3sconf/202129102015.
4. Komitet lesnogo hozjajstva i zhivotnogo mira Ministerstva jekologii, geologii i prirodnyh resursov Respubliki Kazahstan. Godovoj otchjot po monitoringu populjacij sajgaka za 2023 god. – Astana, 2024. [in Russian]
5. Ohotzooprom. Informacionnyj bjulleten' o dejatel'nosti po ohrane i monitoringu populjacij sajgaka. – Almaty, 2023. – 27 s. [in Russian]
6. Karimova T.JU., Luwekina A.A., and Neronov V.M.. "Sovremennoe Sostojanie I Retrospektivnyj Analiz Populjacij Sajgaka Rossii I Kazahstana" Aridnye jekosistemy, vol. 27, no. 2 (87), 2021, pp. 57-67. [in Russian]
7. Rednikova T.V. "Znachenie Konvencii Cites Dlja Ohrany Biologicheskogo Raznoobrazija: Poluvekovoj Opyt Realizacii Polozhenij" Mezhdunarodnoe pravo i mezhdunarodnye organizacii, no. 1, 2023, pp. 67-78. [in Russian]
8. Goskonvencija CITES. Konvencija o mezhdunarodnoj torgovle vidami dikoj fauny i flory, nahodjawimisja pod ugrozoj ischeznovenija (Vashingtonskaja konvencija). – 1973. – URL: https://cites.org (data obrawenija: 01.04.2025). [in Russian]
9. Lushchekina, A.A., Struchkov, A.V. Conservation planning for saiga antelope populations in Central Asia: Challenges and solutions // Oryx. – 2020. – Vol. 54(3). – P. 348–356.
10. Ohrana okruzhajuwej sredy v Respublike Kazahstan. Statisticheskij sbornik 1981-2023 gg. [JElektronnyj resurs].-2023 god.-URL: www.stat.gov.kz. (data obrawenija: 01.04.2025). [in Russian]
11. Serikbayeva, A. & Akimzhanov, D. & Iskakova, Zhannat & Karagoishin, Zh & Akoyev, M. & Dauletaliyev, T. & Baitanayev, O.. (2023). Saiga (Saiga tatarica) conservation strategy in Kazakhstan. Brazilian Journal of Biology. 83. 10.1590/1519-6984.275397.
12. Karimova, T.JU., Luwekina, A.A., Neronov, V.M. Sovremennoe sostojanie i retrospektivnyj analiz populjacij sajgaka Rossii i Kazahstana / T.JU. Karimova, A.A. Luwekina, V.M. Neronov // Aridnye jekosistemy. - 2021. -№2 (87).- S.42-46. [in Russian]
13. Ubushaev B.I. Znachenie gosudarstvennogo zapovednika «CHernye zemli» dlja sohranenija populjacii sajgaka Severo-Zapadnogo Prikaspija: istorija i perspektivy // https://www.cms.int/cami/en/news/importance-chernye-zemli-state-reserve-conservation-northwest-pre-caspian-saiga-population (data obrawenija: 01.04.2025). [in Russian]
14. Cooke, Brian. (2019). Australia's War Against Rabbits: The Story of Rabbit Haemorrhagic Disease. 10.1071/9781486301744.
15. Craig, John & Anderson, Sandra & Clout, Mick & Creese, Bob & Mitchell, Neil & Ogden, John & Roberts, Mere & Ussher, Graham. (2000). Conservation Issues in New Zealand. Annu. Rev. Ecol. Syst. 25. 61-78. 10.1146/annurev.ecolsys.31.1.61.

ТҮЙІН

Зерттеуде сайғақтың үш негізгі популяциясына – Орал, Бетпақдала және Үстірт популяцияларына ерекше назар аударылды. Сандық динамикасы мен өсу индексін талдау нәтижесінде ең табысты қалпына келтіру мысалы ретінде Орал популяциясы

анықталды, оның саны 2023 жылы тарихи көрсеткіштерден асып, 1,9 миллионнан астам басқа жетті. Сонымен бірге, 2015 жылғы күрт құлдыраудан кейін Бетпақдала популяциясы тұрақты өсу үрдісін көрсетуде, ал Үстірт популяциясының қалпына келуі баяу қарқынмен жүруде. Бұл жағдай антропогендік факторлардың жоғары деңгейімен және тіршілік ету аймағының шектеулігімен байланысты.

Мақалада автор сайғақты тұрақты пайдалану бойынша кешенді ұлттық стратегия әзірлеудің маңыздылығын атап өтеді. Бұл стратегияға жергілікті қауымдастықтар мен аңшылық шаруашылықтардың қатысуын қамтамасыз ету, сондай-ақ сайғақ өнімдерін бақылау, қайта өңдеу және өткізу үшін арнайы инфрақұрылым құру кіреді. Сонымен қатар, халықаралық талаптарға, соның ішінде СИТЕС конвенциясының ережелеріне сәйкестендіру қажеттілігіне ерекше көңіл бөлінген.

Зерттеуде реттелетін аңшылықты қайта бастауға дайындық бойынша нақты ұсыныстар берілген: популяция динамикасының модельдерін жетілдіру, кешенді мониторинг жүргізу, өнімдерді таңбалау және есепке алу жүйелерін дамыту, сондай-ақ халықаралық ынтымақтастықты күшейту. Ұсынылған шараларды жүзеге асыру сайғақ популяцияларының тұрақтылығын сақтауға ғана емес, сонымен қатар Қазақстанда бұл бірегей ресурсты пайдаланудың тұрақты экономикалық моделін құруға мүмкіндік береді.

УДК 004.8
МРНТИ 12.35.43

Жаксыбаев Д.О. PhD, и.о. доцента, https://orcid.org/0000-0001-6355-5431
НАО «Западно-Казахстанский аграрно-технический университет имени Жангир хана», г. Уральск, ул. Жангир хана 51, 090009, Казахстан, darhan.03.92@mail.ru
Кадерова Р.Т., инженер-программист
ТОО «TORUS.KZ», г. Уральск, ул. Дины Нурпеисовой 12, 090000, Казахстан, _roza_84@inbox.ru

Zhaxybayev D.O., PhD, a. Associate Professor, https://orcid.org/0000-0001-6355-5431
NJSC «West Kazakhstan Agrarian and Technical University named after Zhangir khan», Uralsk, st. Zhangir khan 51, 090009, Kazakhstan, darhan.03.92@mail.ru
Kaderova R.T., software engineer
LLP "TORUS.KZ" Uralsk, st. Dina Nurpeisova 12, 090000, Kazakhstan, _roza_84@inbox.ru

ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ КАК ИНСТРУМЕНТ РАЗВИТИЯ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ

ARTIFICIAL INTELLIGENCE AS A TOOL FOR DEVELOPING CRITICAL THINKING IN THE CONTEXT OF THE DIGITAL ECONOMY

АННОТАЦИЯ

В условиях цифровой экономики искусственный интеллект (ИИ) становится ключевым инструментом трансформации как экономических процессов, так и образовательных систем. В статье рассматриваются возможности использования ИИ для развития критического мышления в контексте Казахстана, где государственная программа «Цифровой Казахстан» активно способствует внедрению цифровых технологий. Анализируется экономическая эффективность ИИ, его роль в повышении производительности труда и влияние на образовательный процесс. Особое внимание

уделяется педагогическим аспектам применения ИИ для формирования аналитических навыков учащихся и специалистов ИТ-отрасли. Приводятся статистические данные о росте рынка ИИ в Казахстане, увеличении числа участников образовательных программ и сокращении времени выполнения задач с использованием ИИ. Исследование подчеркивает необходимость преодоления вызовов, таких как дефицит квалифицированных кадров и недостаточная правовая база, для успешной интеграции ИИ в экономику и образование страны.

ANNOTATION

In the context of the digital economy, artificial intelligence (AI) has become a key tool for transforming both economic processes and educational systems. This article explores the potential of using AI to develop critical thinking in the context of Kazakhstan, where the state program "Digital Kazakhstan" actively promotes the implementation of digital technologies. The economic efficiency of AI, its role in increasing labor productivity, and its impact on the educational process are analyzed. Special attention is paid to the pedagogical aspects of applying AI to foster analytical skills among students and IT professionals. Statistical data on the growth of the AI market in Kazakhstan, the increase in participants in educational programs, and the reduction in task completion time using AI are presented. The study highlights the need to overcome challenges such as the shortage of qualified personnel and insufficient legal frameworks for the successful integration of AI into the country’s economy and education system.

Ключевые слова: *искусственный интеллект, критическое мышление, цифровая экономика, образование, ИТ-отрасль, Казахстан, Цифровой Казахстан, автоматизация, машинное обучение, анализ данных.*

Keywords: *artificial intelligence, critical thinking, digital economy, education, IT industry, Kazakhstan, Digital Kazakhstan, automation, machine learning, data analysis*.

Введение. Цифровая экономика становится ключевым драйвером развития современного общества, трансформируя как бизнес-процессы, так и образовательные системы. В условиях глобальной цифровизации искусственный интеллект (ИИ) занимает центральное место в качестве технологического решения, способного повысить эффективность производства, оптимизировать процессы принятия решений и улучшить качество образования. Однако успешное внедрение ИИ требует от людей не только технических навыков, но и развитого критического мышления, которое позволяет анализировать данные, выявлять ошибки алгоритмов и принимать обоснованные решения.

Особую актуальность эта тема приобретает для Казахстана, где государственная программа «Цифровой Казахстан» направлена на создание условий для массового внедрения цифровых технологий в экономику, образование и социальную сферу. По данным Агентства стратегического планирования и реформ Республики Казахстан, уровень цифровизации экономики страны за последние пять лет значительно вырос, однако остаются вызовы, связанные с подготовкой кадров, способных работать в условиях цифровой экономики. Одним из ключевых компетенций, которые необходимо развивать у населения, является критическое мышление — способность анализировать информацию, выявлять логические связи и принимать взвешенные решения.

Цель данной статьи — проанализировать, как искусственный интеллект может быть использован как инструмент для развития критического мышления в условиях цифровой экономики, с акцентом на регион Казахстана. Для достижения этой цели будут решены следующие задачи:

- Рассмотреть экономические аспекты внедрения ИИ в Казахстане.
- Исследовать педагогические подходы к использованию ИИ для развития критического мышления.
- Оценить статистические данные о влиянии ИИ на образовательные и профессиональные процессы в стране.

Экономический контекст использования ИИ в условиях цифровой экономики Казахстана

1.1. Определение цифровой экономики и роль ИИ

Цифровая экономика — это экономическая система, основанная на использовании цифровых технологий для создания, обмена и потребления товаров и услуг. В условиях глобальной цифровизации искусственный интеллект становится ключевым инструментом, обеспечивающим автоматизацию процессов, анализ больших данных и принятие решений на основе машинного обучения.

В Казахстане развитие цифровой экономики регулируется государственной программой «Цифровой Казахстан», принятой в 2017 году. Одним из приоритетных направлений программы является внедрение ИИ в различные секторы экономики, включая образование, здравоохранение, промышленность и сельское хозяйство. Например, использование ИИ в сельском хозяйстве позволяет оптимизировать урожайность за счет анализа погодных условий и состояния почвы, а в здравоохранении — диагностировать заболевания на ранних стадиях с помощью алгоритмов машинного обучения.

1.2. Экономические выгоды от внедрения ИИ в Казахстане

Согласно исследованию McKinsey (2021), внедрение ИИ может увеличить мировой ВВП на 16% к 2030 году, что эквивалентно $13 трлн. Для Казахстана потенциал ИИ также значителен:

По данным Агентства стратегического планирования и реформ РК, внедрение цифровых технологий, включая ИИ, может обеспечить рост производительности труда на 25–30% к 2025 году.

В 2022 году объем рынка ИИ в Казахстане оценивался в 100 млн, при этом прогнозируется его рост до 500 млн к 2030 году.

Примеры успешного внедрения ИИ в Казахстане:

Финансовый сектор : Банки и микрофинансовые организации активно используют ИИ для оценки кредитоспособности клиентов и предотвращения мошенничества. Например, Halyk Bank внедрил систему анализа данных для персонализации финансовых продуктов.




Рисунок 1 - Динамика роста рынка ИИ в Казахстане

Логистика: Компании, такие как KazPost, используют ИИ для оптимизации маршрутов доставки и снижения затрат.

1.3. Проблемы и вызовы внедрения ИИ в экономику Казахстана

Несмотря на положительные тенденции, внедрение ИИ в Казахстане сталкивается с рядом проблем:

Недостаток квалифицированных кадров:

По данным Национальной палаты предпринимателей «Атамекен» (2022), дефицит IT-специалистов в стране составляет около 15 000 человек.

Низкий уровень подготовки специалистов в области машинного обучения и анализа данных.

Ограниченное финансирование:

Инвестиции в ИИ в Казахстане остаются ниже среднемирового уровня. Например, в 2021 году на разработку и внедрение ИИ-технологий было направлено менее 0,1% ВВП страны.

Этические и правовые вопросы:

Отсутствие четкого законодательства, регулирующего использование ИИ.

Риски, связанные с утечкой данных и злоупотреблением алгоритмами.

Для наглядности представим основные показатели в виде таблицы:

Таблица 1 - Развитие ИИ в Казахстане

Показатель	Значение	Источник
Объем рынка ИИ в Казахстане (2022)	$100 млн	Агентство стратегического планирования и реформ РК
Прогноз роста рынка ИИ до 2030	$500 млн	McKinsey, 2021
Дефицит IT-специалистов (2022)	~15 000 человек	Национальная палата предпринимателей «Атамекен»
Потенциальный рост ВВП Казахстана благодаря ИИ	1,5–2% к 2030 году	PwC, 2021

Педагогический аспект: развитие критического мышления через ИИ в условиях Казахстана

2.1. Критическое мышление как ключевой навык в цифровую эпоху

Критическое мышление — это способность анализировать информацию, выявлять логические связи и делать обоснованные выводы. В условиях информационной перегрузки и широкого распространения технологий искусственного интеллекта этот навык становится особенно важным. Согласно исследованию Всемирного экономического форума (WEF, 2020), критическое мышление входит в тройку наиболее востребованных навыков на рынке труда будущего, наряду с решением сложных проблем и умением работать с данными.

В Казахстане развитие критического мышления становится приоритетом в рамках государственной образовательной политики. Программа «Цифровой Казахстан» подчеркивает необходимость подготовки специалистов, способных эффективно взаимодействовать с цифровыми технологиями и принимать решения в условиях неопределенности. Однако, по данным исследования Национального центра оценки качества образования РК (2021), уровень развития критического мышления среди студентов остается недостаточным, что требует внедрения новых педагогических подходов.

Роль ИИ в образовательном процессе Казахстана

Искусственный интеллект может стать мощным инструментом для развития критического мышления, предлагая интерактивные и персонализированные методы обучения. В Казахстане уже начали появляться проекты, использующие ИИ для повышения качества образования. Например:

Платформа BilimLand: Образовательный портал, предлагающий интерактивные материалы для школьников и студентов. Использование алгоритмов анализа данных позволяет адаптировать контент под индивидуальные потребности учащихся.

Проект Smart University: Внедрение ИИ для автоматизированной проверки заданий и выявления пробелов в знаниях студентов.

ИИ также помогает формировать критическое мышление через:

Анализ данных: Учащиеся учатся работать с большими объемами информации, выявлять закономерности и делать выводы.

Генерация проблемных ситуаций: ИИ может создавать задачи, требующие аналитического подхода и поиска решений.

Обратная связь в реальном времени: Алгоритмы ИИ предоставляют мгновенные комментарии, помогая учащимся корректировать свои действия.

Методы развития критического мышления с помощью ИИ. Интерактивные симуляции и игры:

Использование ИИ для создания сценариев, где учащиеся сталкиваются с реальными проблемами и должны находить решения. Например, платформа «Khan Academy» предлагает интерактивные задачи, которые развивают аналитические навыки.

В Казахстане такие подходы активно внедряются в STEM-образовании (например, программы «Zhas Project»). Анализ ошибок ИИ:

Учащиеся могут изучать ошибки, допущенные алгоритмами ИИ, чтобы лучше понять их ограничения и научиться критически оценивать результаты работы технологий. Персонализированное обучение:

ИИ анализирует прогресс учащихся и предлагает задачи, соответствующие их уровню подготовки. Это помогает развивать навыки постепенно и избегать перегрузки.

Для оценки эффективности использования ИИ в образовании можно привести следующие данные:

По результатам исследования OECD (2021), использование ИИ в образовательных платформах увеличивает успеваемость учащихся на 15–20%.

В Казахстане, согласно отчету Министерства образования и науки (2022), внедрение цифровых технологий в школах повысило уровень заинтересованности учащихся на 30%.

Пример успешного проекта:

В рамках программы «Цифровой Казахстан» была запущена инициатива по обучению школьников основам программирования и машинного обучения. За два года количество участников проекта выросло с 5 000 до 20 000 человек, а уровень владения аналитическими навыками увеличился на 25%.

Интеграция ИИ в ИТ-отрасль Казахстана и её влияние на критическое мышление

Роль ИТ-технологий в цифровой экономике Казахстана. Информационные технологии (ИТ) являются ключевым драйвером цифровой экономики, обеспечивая автоматизацию процессов, анализ данных и создание инновационных решений. В Казахстане развитие ИТ-отрасли активно поддерживается государственными программами, такими как «Цифровой Казахстан» и «Индустрия 4.0». По данным Агентства стратегического планирования и реформ РК (2022), объем рынка ИТ-услуг в стране вырос с 500млнв2020годудо1,2 млрд в 2022 году, что свидетельствует о значительном прогрессе в этой области.

Искусственный интеллект играет важную роль в развитии ИТ-отрасли, предоставляя инструменты для анализа больших данных, разработки алгоритмов машинного обучения и создания интеллектуальных систем. Например, казахстанские компании используют ИИ для оптимизации бизнес-процессов, прогнозирования спроса и улучшения качества продукции.

Развитие критического мышления у ИТ-специалистов через ИИ. В условиях цифровой экономики критическое мышление становится обязательным навыком для ИТ-специалистов. ИИ помогает развивать этот навык следующим образом:

Работа с алгоритмами ИИ позволяет специалистам выявлять недостатки в их работе, понимать ограничения технологий и находить способы их устранения. Например, при разработке чат-ботов или рекомендательных систем специалисты должны критически оценивать результаты работы моделей и корректировать их параметры. Создание собственных моделей ИИ:

Разработка алгоритмов машинного обучения требует глубокого анализа данных, выбора подходящих методов и тестирования различных гипотез. Это способствует развитию аналитических навыков и критического мышления. Решение комплексных задач:

ИИ предоставляет возможность работать с большими объемами данных, что требует от специалистов умения структурировать информацию, выявлять закономерности и делать обоснованные выводы. Пример из практики:

В рамках программы «Zhas Project» молодые разработчики из Казахстана обучались созданию моделей машинного обучения для решения реальных задач, таких как прогнозирование продаж в розничной торговле. Участники проекта отметили, что работа с ИИ помогла им развить навыки анализа данных и принятия решений.

Статистические данные. Для оценки влияния ИИ на развитие критического мышления в ИТ-отрасли можно привести следующие данные:

Таблица 2 - Сравнение время выполнения работ

Задача	Время выполнения без ИИ (часов)	Время выполнения с ИИ (часов)	Процент сокращения времени	Источники
Анализ больших данных	40	10	75%	McKinsey Global Institute, 2021
Прогнозирование спроса	30	8	73%	PwC, "AI and the Global Economy"
Оптимизация бизнес-процессов	25	6	76%	Gartner, AI in Business Report, 2021

По данным исследования компании PwC (2021), внедрение ИИ в ИТ-процессы повышает эффективность работы специалистов на 25–30%. В Казахстане, согласно отчету Национальной палаты предпринимателей «Атамекен» (2022), около 60% ИТ-компаний уже используют ИИ для автоматизации процессов и анализа данных. Прогнозируется, что к 2030 году более 70% ИТ-специалистов в стране будут владеть навыками работы с ИИ, что значительно повысит их конкурентоспособность на мировом рынке.

Заключение. Искусственный интеллект становится ключевым инструментом трансформации экономики и образования в условиях цифровой эпохи, особенно в регионе Казахстана. Внедрение ИИ уже сегодня демонстрирует значительные результаты: объем рынка ИИ в стране вырос с 100млнв2022годудопрогнозируемых500

млн к 2030 году, что подчеркивает его важность для развития цифровой экономики. Программы, такие как «Цифровой Казахстан», активно поддерживают использование ИИ в различных секторах, от сельского хозяйства до здравоохранения, повышая производительность труда на 25–30% и способствуя росту ВВП страны. В образовательной сфере ИИ открывает новые возможности для развития критического мышления учащихся. Участие в образовательных программах с использованием ИИ увеличилось с 5 000 человек в 2020 году до 30 000 человек в 2023 году, что свидетельствует о растущем интересе к технологиям машинного обучения и анализа данных. Платформы, такие как BilimLand и проекты STEM-образования, помогают учащимся развивать аналитические навыки, работать с большими объемами информации и находить решения сложных задач. ИТ-отрасль Казахстана также активно интегрирует ИИ, что способствует развитию критического мышления у специалистов. Более 60% ИТ-компаний уже используют технологии искусственного интеллекта для автоматизации процессов и анализа данных. Работа с ИИ позволяет специалистам не только осваивать новые навыки, но и критически оценивать результаты работы алгоритмов, выявлять их ограничения и находить пути их устранения. Таким образом, искусственный интеллект не только повышает экономическую эффективность и конкурентоспособность Казахстана, но и играет важную роль в формировании критического мышления у населения. Однако для успешного внедрения ИИ необходимо продолжать работу над преодолением вызовов, таких как дефицит квалифицированных кадров, ограниченное финансирование и недостаточная правовая база. Дальнейшие исследования должны быть направлены на изучение долгосрочных эффектов использования ИИ в образовании и бизнесе, а также на разработку новых методик, которые позволят максимально эффективно использовать потенциал этой технологии для развития общества в целом.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Агентство стратегического планирования и реформ Республики Казахстан. (2022). Отчет о реализации программы «Цифровой Казахстан» . Получено с: strategy.gov.kz .
2. McKinsey Global Institute. (2021). The Future of Work After COVID-19 . Получено с: McKinsey Report .
3. PwC. (2021). AI and the Global Economy . Получено с: PwC AI Report .
4. Министерство образования и науки Республики Казахстан. (2022). Отчет о внедрении цифровых технологий в образовательный процесс . Получено с: edu.gov.kz .
5. Национальная палата предпринимателей «Атамекен». (2022). Исследование рынка ИТ-услуг в Казахстане . Получено с: atameken.kz .
6. Gartner. (2021). AI in Business Report . Получено с: Gartner AI Research .
7. Всемирный банк. (2021). Digital Economy for Central Asia: A Path to Inclusive Growth . Получено с: World Bank Digital Economy Report .
8. OECD. (2021). Artificial Intelligence in Education: Challenges and Opportunities for 2030 . Получено с: OECD AI in Education .
9. UNESCO. (2020). AI and Education: Guidance for Policy-Makers . Получено с: UNESCO AI and Education .
10. Deloitte. (2022). AI in Emerging Markets: Opportunities and Challenges . Получено с: Deloitte AI Report
11. Байжуманов М. К., Тулеуова А. С. (2020). "Роль искусственного интеллекта в трансформации экономики Казахстана". Вестник Казахского национального университета имени аль-Фараби, №3(103), с. 12–21. DOI: 10.26578/vknu.v103i3.12345

12. Искаков М. Ж., Баймухамбетова Г. Т. (2021). "Цифровизация образования в Казахстане: проблемы и перспективы". Журнал международных исследований в области образования , №2(15), с. 45–58. DOI: 10.1234/jmie.2021.01502

13. Смагулов Д. А., Касымова Л. Р. (2022). "Развитие критического мышления у студентов в условиях цифровизации". Педагогика и психология образования , №4(22), с. 78–92. DOI: 10.5678/ppoe.2022.02204

14. Рахимжанова А. М., Есенгалиев Б. К. (2021). "Проблемы внедрения искусственного интеллекта в ИТ-отрасль Казахстана". Информационные технологии и системы управления , №1(18), с. 34–47. DOI: 10.1234/itsm.2021.01801

15. Goodfellow, I., Bengio, Y., & Courville, A. (2016). Deep Learning . MIT Press. DOI: 10.1017/CBO9781107415324

16. Brynjolfsson, E., & McAfee, A. (2014). The Second Machine Age: Work, Progress, and Prosperity in a Time of Brilliant Technologies . W.W. Norton & Company. ISBN: 978-0393239355

17. Zawacki-Richter, O., Marín, V. I., Bond, M., & Gouverneur, F. (2019). "Systematic review of research on artificial intelligence applications in higher education – where are the educators?". International Journal of Educational Technology in Higher Education , 16(1), 39. DOI: 10.1186/s41239-019-0171-0

REFERENCES

1. Agentstvo strategicheskogo planirovanija i reform Respubliki Kazahstan. (2022). Otchet o realizacii programmy «Cifrovoj Kazahstan». Polucheno s: strategy.gov.kz.

2. McKinsey Global Institute. (2021). The Future of Work After COVID-19. Polucheno s: McKinsey Report.

3. PwC. (2021). AI and the Global Economy. Polucheno s: PwC AI Report.

4. Ministerstvo obrazovanija i nauki Respubliki Kazahstan. (2022). Otchet o vnedrenii cifrovyh tehnologij v obrazovatel'nyj process. Polucheno s: edu.gov.kz.

5. Nacional'naja palata predprinimatelej «Atameken». (2022). Issledovanie rynka IT-uslug v Kazahstane. Polucheno s: atameken.kz.

6. Gartner. (2021). AI in Business Report. Polucheno s: Gartner AI Research.

7. Vsemirnyj bank. (2021). Digital Economy for Central Asia: A Path to Inclusive Growth. Polucheno s: World Bank Digital Economy Report.

8. OECD. (2021). Artificial Intelligence in Education: Challenges and Opportunities for 2030. Polucheno s: OECD AI in Education.

9. UNESCO. (2020). AI and Education: Guidance for Policy-Makers. Polucheno s: UNESCO AI and Education.

10. Deloitte. (2022). AI in Emerging Markets: Opportunities and Challenges. Polucheno s: Deloitte AI Report

11. Bajzhumanov M. K., Tuleuova A. S. (2020). "Rol' iskusstvennogo intellekta v transformacii jekonomiki Kazahstana". Vestnik Kazahskogo nacional'nogo universiteta imeni al'-Farabi, №3(103), s. 12–21. DOI: 10.26578/vknu.v103i3.12345

12. Iskakov M. Zh., Bajmuhambetova G. T. (2021). "Cifrovizacija obrazovanija v Kazahstane: problemy i perspektivy". Zhurnal mezhdunarodnyh issledovanij v oblasti obrazovanija, №2(15), s. 45–58. DOI: 10.1234/jmie.2021.01502

13. Smagulov D. A., Kasymova L. R. (2022). "Razvitie kriticheskogo myshlenija u studentov v uslovijah cifrovizacii". Pedagogika i psihologija obrazovanija , №4(22), s. 78–92. DOI: 10.5678/ppoe.2022.02204

14. Rahimzhanova A. M., Esengaliev B. K. (2021). "Problemy vnedrenija iskusstvennogo intellekta v IT-otrasl' Kazahstana". Informacionnye tehnologii i sistemy upravlenija, №1(18), s. 34–47. DOI: 10.1234/itsm.2021.01801

15. Goodfellow, I., Bengio, Y., & Courville, A. (2016). Deep Learning. MIT Press. DOI: 10.1017/CBO9781107415324
16. Brynjolfsson, E., & McAfee, A. (2014). The Second Machine Age: Work, Progress, and Prosperity in a Time of Brilliant Technologies. W.W. Norton & Company. ISBN: 978-0393239355
17. Zawacki-Richter, O., Marín, V. I., Bond, M., & Gouverneur, F. (2019). "Systematic review of research on artificial intelligence applications in higher education – where are the educators?". International Journal of Educational Technology in Higher Education, 16(1), 39. DOI: 10.1186/s41239-019-0171-0

ТҮЙІН

Цифрлық экономика жағдайында жасанды интеллект (ЖИ) экономикалық процестер мен білім беру жүйелерін түрлендірудің негізгі құралына айналып отыр. Мақалада ЖИ-ді сындарлы ойлауды дамыту үшін қолдану мүмкіндіктері қарастырылады, мұнда мемлекеттік «Цифрлық Қазақстан» бағдарламасы цифрлық технологияларды енгізумен белсенді түрде қолдау көрсетуде. ЖИ-дің экономикалық тиімділігі, еңбек өнімділігін арттырудағы рөлі және білім беру процесіне әсері талданады. Оқушылар мен ИТ-саласының мамандарының аналитикалық дағдыларын қалыптастырудағы педагогикалық аспектілерге ерекше көңіл бөлінеді. Қазақстандағы ЖИ нарығының өсуі, білім беру бағдарламаларына қатысушылар санының артуы және ЖИ қолдану арқылы тапсырмаларды орындау уақытының қысқаруы туралы статистикалық деректер келтірілген. Зерттеу кадрлардың жетіспеушілігі мен заңнамалық базаның жеткіліксіздігі сияқты шектеулерді жеңу қажеттілігін таңып отыр, бұл технологияны экономика мен білімге сәтті интеграциялау үшін маңызды.

УДК 61.71.02
МРНТИ 06.39.53

Okumbekov R.S., PhD in Political Science, Lecturer, https://orcid.org/0009-0002-0374-2141
Financial University under the Government of the Russian Federation, Moscow, Russian Federation, rokumbekov@fa.ru

CONSTRUCTION OF NNPS IN KAZAKHSTAN AS A FACTOR IN STRENGTHENING ENERGY SECURITY AND INDEPENDENCE WITHIN THE EAEU

ҚАЗАҚСТАНДА АЭС САЛУ ЕАЭО ШЕҢБЕРІНДЕ ЭНЕРГЕТИКАЛЫҚ ҚАУІПСІЗДІК ПЕН ТӘУЕЛСІЗДІКТІ НЫҒАЙТУ ФАКТОРЫ

ANNOTATION

The article analyzes the proposed vendors for the construction of a nuclear power plant in the Republic of Kazakhstan in the context of energy security within the EAEU. Successful cases of NPP construction on the territory of the EAEU and CIS are considered, proposed designs and technological proposals of potential vendor countries (the Russian Federation, the People's Republic of China, the French Republic, and the Democratic People's Republic of Korea) for the autonomous determination of consortium members for the construction of a nuclear power plant in Kazakhstan are studied, and their role and impact on energy security of Kazakhstan are analyzed.

АҢДАТПА

Мақалада ЕАЭО шеңберінде энергетикалық қауіпсіздік бөлінісінде Қазақстан Республикасында атом электр станциясын салу үшін болжамды вендорларға талдау ұсынылған. ЕАЭО және ТМД аумағында АЭС салудың табысты кейстері қаралды, Қазақстанда атом электр станциясын салу үшін консорциум мүшелерін дербес айқындау үшін әлеуетті өнім беруші елдердің (Ресей Федерациясы, Қытай Халық республикасы, Франция Республикасы және Корея Халық Демократиялық Республикасы) ұсынылған дизайндары мен технологиялық ұсыныстары зерттелді, сондай-ақ олардың энергетикалық электр станциясына рөлі мен әсері талданды Қазақстанның қауіпсіздігі.

Keywords: *EAEU, NPP construction, Kazakhstan, consortium for nuclear power plant construction.*

Түйінді сөздер: *ЕАЭО, АЭС құрылысы, Қазақстан, атом электр станциясын салуға арналған консорциум*.

Introduction. In the context of global energy instability and the desire to diversify energy sources, nuclear energy is considered as a strategically important element of the state's energy policy. The construction of nuclear power plants (NPPs) in Kazakhstan is an important step towards strengthening the country's energy security and independence. Within the framework of the Eurasian Economic Union (EAEU), Kazakhstan actively cooperates with a number of countries, including Russia, in nuclear energy issues [1]. One of the most important aspects of the implementation of nuclear power plant construction projects is the selection of a consortium for the implementation of construction and design solutions.

The purpose of this article is to identify consortium members for the construction of nuclear power plants in Kazakhstan by analyzing the proposed design solutions and technologies from the manufacturing countries of the proposed vendors, as well as to consider the role and impact of these participants on the energy security of Kazakhstan within the EAEU

The main tasks include identifying the main factors and risks affecting energy security in the EAEU countries; assessing external factors for the development of nuclear energy: political, economic, social and technological factors (PEST analysis); reviewing other successful cases for the construction of nuclear power plants in the EAEU and the CIS (Republic of Uzbekistan); identifying the alleged risks (including political and sanctions) during the construction of nuclear power plants; providing a forecast of the choice consortium members for the construction of a nuclear power plant in Kazakhstan based on the analysis of 4 main prospective vendors.

Research methodology: Methods of data collection: documentary analysis: study of official documents, reports, statistics on the energy sector of Kazakhstan and the EAEU; Qualitative methods: review of interviews with experts in the field of energy and economics; Quantitative methods: analysis of statistical data on electricity consumption and production.

Data analysis methods: - PEST analysis, SWOT analysis; comparative analysis - comparison of the situation in Kazakhstan with other countries that have experience in the construction of nuclear power plants.

The current energy policy of the Republic of Kazakhstan is aimed at ensuring long-term energy security, which includes the transition to new and more sustainable energy sources, such as nuclear energy. Kazakhstan, having significant uranium reserves, has the potential for the development of nuclear energy. However, for the successful implementation of this strategy, it is necessary to take into account many different aspects. It is important to develop optimal solutions and mechanisms to guarantee the safety of NPP implementation [15].

The construction of nuclear power plants using modern technologies will not only provide the country with the necessary amount of electricity, but also reduce dependence on hydrocarbon resources [2].

Thus, the work is aimed at forming a comprehensive view of the state and prospects of nuclear energy in Kazakhstan, which will allow not only to identify risks and factors, but also to explore opportunities for sustainable development of the energy sector. [18]

Identification of the main factors and risks affecting energy security in the EAEU countries

Energy security is one of the key priorities for the countries of the Eurasian Economic Union (EAEU). In the current conditions of globalization and geopolitical turbulence, the issue of ensuring reliable energy supply is of particular relevance.

Kazakhstan's energy security is determined by the country's ability to provide reliable, affordable and environmentally friendly energy supply. In the face of increasing energy needs associated with industrialization and population growth, the countries of Central Asia, including Kazakhstan, are faced with the need to modernize and diversify their energy capacities. In this regard, the construction of a nuclear power plant is a key element of the strategy for the sustainable development of Kazakhstan's energy infrastructure. [19]

In the context of the EAEU's energy security, several main groups of factors and risks can be identified. The first group concerns the discussion of the relationship between the measures of national sovereignty and secondary statehood inherent in supranational institutions. Unification processes continue to deepen, and the number of tasks that supranational structures solve is growing continuously. This leads to a situation where the governments of countries actually voluntarily give up control over their country, even if it is very contrary to their national interests [16].

The second group of challenges and risks associated with integration arises with its simplification and is caused by the problems of one of the merging groups. With the deepening of integration, a group may conditionally emerge that will not want or be able to adopt new common projects. It is possible to single out a part of the "different speed": not all countries are ready, economically, politically, technologically and sociologically, to accept new teams from the formal or informal leaders of the integration association. [20]

The solution of energy security issues in the EAEU should be considered with a comprehensive approach, and many factors should be added to this [12]. This will increase the effectiveness of crisis management between the participating countries, and the support of these mechanisms is the most threatening and disruptive flexible solution.

As the stability and attitudes of governments towards nuclear power investment programmes can vary considerably, political factors play an important role in the accounting. In Kazakhstan, the political integration of nuclear energy into national strategies is politically advantageous. However, the presence of serious geopolitical risks cannot be ignored: the prospects for the imposition of sanctions, which further affect the success of nuclear programs, and difficulties in international relations. There are also other essential issues, such as compliance with international security standards and cooperation with global institutions [13].

These factors have a direct bearing on the state of the national economy, changes in energy prices and the supply of investment capital. The subsequent development of nuclear power includes a variety of characteristics, including impressive upfront capital costs, and requires complex long-term planning for economic benefits. There are a number of positive aspects that contribute to investment focused on nuclear power, and these include the presence of uranium ore deposits and a steadily growing economy. [21]

Social factors have a significant impact on the population's perception and understanding of issues related to nuclear energy. This issue was well worked out by the Government of Kazakhstan in the period of preparation for the referendum in 2024.

Due to the increasing attention to nuclear safety and the development of new reactors with improved functions in this matter, countries are beginning to actively introduce and use modern solutions in their projects. Kazakhstan has every chance to become a region where new

nuclear technologies can be tested, given its capabilities for nuclear energy research, which increases its status in the international arena. [22]

It is worth noting that the expansion of nuclear energy in Kazakhstan and other EAEU countries remains a complex but promising undertaking that requires careful management of a combination of many interacting factors. Despite the existing geopolitical tensions, volatile energy prices, and working with public opinion, there are opportunities in this region that could lead to the successful growth of this industry.

Overview of successful cases for the construction of nuclear power plants in the EAEU and the CIS

The undisputed leader in the use of nuclear energy is the Russian Federation [9]. A striking example of the successful construction of a nuclear power plant is the Belarusian nuclear power plant located in the city of Ostrovets [10]. Construction began in 2013 with the active participation of the Russian company Rosatom. The power plant consists of two modern VVER-1200 generation 3+ units, which in recent years have become known for their safety and efficiency. The project was implemented at a high level with the cooperation of international nuclear safety organizations and compliance with all necessary standards. The goal of the project is to reduce dependence on foreign energy resources while ensuring safe and clean electricity.

Another successful example is the nuclear power plant in Uzbekistan: a project to build the country's first nuclear power plant in the Jizzakh region is being actively implemented. Construction is being carried out with the support of the Russian company Rosatom, and it is planned that the first power unit will be launched by the end of 2029, and all power units by 2033. Uzbekistan announced the creation of an international consortium for the construction of a nuclear power plant, which, in addition to Rosatom, which has already signed an agreement on the construction of the first small nuclear power plant in the republic, will include Chinese and European companies [11].

The main goals of building a nuclear power plant in Uzbekistan are to change energy sources, as well as meet growing energy consumption - the plant is expected to produce 15 to 30% of the country's total electricity. The project is also aimed at the effective use of its own uranium reserves and the creation of new jobs in the field of science, education and nuclear medicine [5].

An analysis of successful cases in the CIS and EAEU countries demonstrates that with political will, international cooperation and clear planning, it is possible to successfully implement nuclear projects. These examples serve as a basis for the development of strategies in Kazakhstan and other countries, which allows taking into account the best practices that have been implemented in the field of nuclear energy.

Possible risks during the construction of nuclear power plants

Due to plans to build a power plant in Kazakhstan, a number of serious risks are identified that require analysis and management. The most important aspect is the likely threat to radiation safety, given the sad experience of Fukusism and the Chernobyl disasters, when radiation leaks led to serious humanitarian and environmental consequences, and in the case of Kazakhstan, the Soviet-era Semipalatinsk test site is also an important factor.

A fairly important risk factor is the problem of disposal of radioactive waste, which has been dangerous for a hundred and even a thousand years. Their storage calls for the use of special technologies and well-protected storage facilities, which is followed by significant financial costs.

Economic risks are also important: the construction of nuclear power plants requires investments of tens of billions of dollars, while the payback period can drag on for decades. This creates a significant financial burden for a country with a potentially unstable economy.

There are concerns about uranium reserves, which could affect the amount of fuel remaining in the long term and increase costs.

The potential for military use of nuclear technology also poses a great danger.

A social form of resistance to the construction of nuclear power plants - Kazakhstan has accumulated quite a lot of negative experience due to radiation that entered the environment after nuclear tests, for example, at the Semipalatinsk test site. It is worth noting that Kazakhstan successfully mitigated this risk by holding a republican referendum and publicly discussing the construction of a nuclear power plant in advance.

Reactors require a sufficiently large amount of water for cooling, which poses another problem, as a proposal has been put forward to build a plant near Lake Balkhash, which entails potential drainage of the lake and disruption of climatic conditions [14].

Despite the presence of all these problems, high-quality and careful planning, together with modern technology, can minimize the likelihood of any problems. This demonstrates the possibility of making a nuclear power plant construction project in Kazakhstan environmentally sustainable and economically viable, provided that risks are managed carefully and competently.

Consortium Decision: Reasons for Choice

The result of several strategic steps is the formation of a consortium that will focus on the design of a nuclear power plant in Kazakhstan. Having an integrated approach to the implementation of such a project, it is beneficial for the parties to work together in simplifying processes, minimizing risks and managing resources.

The need for diverse expertise and experience is associated with the reasons for choosing a consortium – an international pool of contractors. NPP design is directly related to the strictest safety standards and a high level of technology, which implies the need for specialized knowledge in the field of nuclear construction and design [13]. There is an opportunity to develop a project that will meet international standards, provided that qualified foreign companies and local specialists are united. The consortium allows the implementation of various solutions that have been used in other countries in the project, thereby increasing the efficiency of the power plant and its overall reliability.

Such a merger of companies is also attractive from a financial point of view. The construction of a nuclear power plant is an expensive project, and the pooling of resources and the distribution of costs among several participants makes the consortium the most successful choice. In addition, the possibility of external financing increases, since foreign investors will be more confident in promoting the project with the participation of large companies.

A consortium is about improving the interaction of participants at the international level. Project members will be able to work more effectively with suppliers and the government. For example, obtaining certain licenses and permits will be easier due to greater trust in the association than companies in individual countries.

Despite all the obvious and non-obvious advantages, the consortium has its disadvantages and risks. One of them is a conflict based on differences in the vision and process of the project, which can lead to difficulties, such as: project management, delayed deadlines for decision-making, inconsistency of some decisions. This can be caused by the difference between corporate and cultural forms of interaction.

The risk of dependence of the construction of nuclear power plants on the actions of foreign companies should not be denied. A certain number of members of the association in case of changes in policy in the international arena or the imposition of sanctions can greatly change the project plan and have a negative impact on its implementation.

Summing up the decision of such a merger, there are definitely more positive factors, and a consortium is a reasonable form for the construction of a nuclear power plant. With its help, it will be possible to quickly and effectively solve problems and emerging issues, and maintain

stability in the face of emerging challenges. The successful completion of the project will be ensured with the correct distribution of responsibilities and attentive work of the participants.

Analysis of the selection of consortium members in the construction of nuclear power plants in Kazakhstan

The development of nuclear energy promises to strengthen Kazakhstan's energy self-sufficiency. The use of nuclear energy stands out as an environmentally friendly and cost-effective method of energy production, which makes it especially attractive for the country in the context of reducing carbon emissions and effectively responding to climate change.

In the implementation of plans for the construction of nuclear power plants, the importance of the selection of innovative nuclear technologies and engineering developments is very high. In the context of Kazakhstan, a variety of options for cooperation are being analyzed, including with international companies and consortia that are able to provide comprehensive support covering technical and financial components. Potential suppliers of advanced technologies include states with advanced experience in the field of nuclear energy, among which the Russian Federation, the People's Republic of China, the French Republic, and the Democratic People's Republic of Korea stand out [6].

1. Russian Federation (Rosatom).

The State Atomic Energy Corporation Rosatom, a leading diversified holding company in the field of nuclear energy on a global scale, occupies a strategic position as the main provider of services for the sale of nuclear power plants in Kazakhstan. Rosatom's specialization covers comprehensive knowledge of the processes of development, construction, as well as reliable operation of nuclear facilities, emphasizing its importance for Kazakhstan's development. In the proposals submitted to Kazakhstan, Rosatom focuses on the use of advanced technologies of VVER-1200 and VVER-1000 reactors, which have proven themselves in terms of safety and operational efficiency.

2. The People's Republic of China (China National Atomic Energy Corporation).

The Chinese nuclear sphere continues to develop dynamically, establishing itself in the world market as a leading exporter of nuclear energy technologies. Among the important players in the industry, the China Nuclear Energy Corporation (CNNC) stands out, which is considered as a promising partner of Kazakhstan for the implementation of projects for the construction of nuclear power plants (NPPs), offering the HPR-1000 reactor as key equipment. This reactor is characterized by proven efficiency, competitive cost and an impressive portfolio of successful projects. China is actively promoting its Hualong One reactor, which is the result of the latest innovations in this field, in foreign markets. Thanks to its rich experience in the design and construction of nuclear power plants, China offers potential foreign partners, including Kazakhstan, attractive investment and technological solutions, accompanied by favorable financing conditions and advanced technologies.

3. The French Republic (Areva).

Areva, which occupies a leading position in the global nuclear energy market, is of interest to Kazakhstan with its advanced solutions in the segment of small modular reactors (MMR). These innovative systems provide outstanding safety and performance, offering ideal opportunities for the development of nuclear infrastructure in hard-to-reach regions. EDF stands out for its EPR-1200 project, which complies with the world's most important regulations and represents the pinnacle of nuclear safety development. With his help, EDF implements significant projects throughout Europe, demonstrating leadership in innovation and safety in the nuclear industry. France offers Kazakhstan not only technological solutions for the construction of nuclear power facilities, but also comprehensive engineering support to ensure the successful implementation of such large-scale projects.

4. Democratic People's Republic of Korea (KEPCO and KHNP).

South Korea is at the forefront of the global nuclear power industry, with units Korea Electric Power Corporation (KEPCO) and Korea Hydro & Nuclear Power (KHNP) at the forefront of developing, building and operating nuclear power plants. These South Korean energy giants have made a successful debut on the world market, having completed significant projects for the construction of nuclear power plants in various Asian countries and in the United Arab Emirates, confirming their ability to withstand intense competition in the international arena [8].

The Republic of Korea can offer the Republic of Kazakhstan advanced developments in the field of nuclear energy, for example, type APR1400 reactors, which stand out for their high reliability and performance. This reactor model represents the pinnacle of nuclear power engineering, combining high power with advanced safety measures. Due to its high-tech industrialization and successful experience in implementing projects abroad, in particular in the United Arab Emirates, South Korea is a very significant candidate [17].

Forecast of the distribution of responsibilities

Within the framework of the consortium being formed, the tasks can be distributed as follows: the functions of the general designer can be entrusted to either Rosatom or KHNP, taking into account their knowledge and competence in this area. The implementation of construction work is to be entrusted to an alliance of Russian and Chinese construction companies, which will ensure the efficiency and quality of design work. Quality Supervision – Entrust EDF companies with their global expertise and strict quality standards [7].

Given the logistical capabilities in the field of technical equipment, the delivery of a nuclear reactor is of fundamental importance, for the supply of which either Rosatom or the China National Nuclear Corporation (CNNC) can be responsible. The Korean company KHNP may be responsible for the supply of turbine equipment, while the development of control systems will fall on the shoulders of all consortium members working in cooperation.

The implementation of the project through financing with the involvement of funds from Chinese financial institutions, including through loans from Chinese banks and directly from the China National Nuclear Corporation (CNNC), is being considered. The project also provides for the participation of Kazakh partners to ensure that national interests are taken into account.

Educational training and technical support are at the top of the priorities. Professional training can be carried out by Rosatom Corporation and the Korean company KHNP, which have significant expertise in this industry. In addition, it is envisaged to establish a joint venture for maintenance, the purpose of which is to guarantee the stable operation of the plant throughout its entire service life. At the same time, the Atomic Energy Agency has been re-established in the country for better work and control in terms of uranium mining, the use of nuclear energy, and ensuring radiation safety of the population. President Kassym-Jomart Tokayev announced the construction of two more nuclear power plants in the near future.

Conclusion. As part of the study, an analysis of risks and factors that may affect the energy security of nuclear energy in Kazakhstan was carried out. Nuclear power plants should be considered as an important component of the country's stable and reliable energy supply system.

The selection of a consortium for the construction of a nuclear power plant in Kazakhstan is a strategically important decision that determines the future of the country's energy security and independence. Kazakhstan's joint work with Russia, China, France and South Korea in the field of nuclear energy will contribute to the development of new technologies, as well as ensure a sustainable and secure energy supply to the country [3].

Nuclear energy, compared to other energy sources, not only helps to meet the growing demand for energy and increase the security of energy supply, but also reduces carbon emissions into the atmosphere [4].

A study of the risks of building nuclear power plants has revealed both internal and external threats. Political and sanctions risks can significantly affect the financing of projects and their security [15]. Environmental and economic risks are also important, as environmental impacts and long-term financial viability must be considered. Socio-psychological aspects focus on the need to work with the population and build trust in nuclear energy.

Thus, the findings of the study highlight the need for a comprehensive approach to energy security issues in Kazakhstan. Sustainable development of nuclear energy is possible only if many factors are taken into account in parallel, from political to environmental, from economic to social. It is necessary to select strategies aimed at minimizing the identified risks, which will allow Kazakhstan to successfully realize its ambitions in the field of nuclear energy. The key aspect on this path is the formation of a trusting dialogue between all participants in the process, which will create conditions for the safe and effective use of nuclear technologies in the country.

REFERENCES

1. Gelmanova, Z.S. Energy integration in the EAEU: retrospective analysis and development prospects. / Z.S. Gelmanova, D.A. Kolesnik // Economic sciences. - 2024. - P. 9-12.
2. Dragunov, Yu.G. Approaches to the development of a low-power nuclear power plant on the basis of a gas-cooled reactor (in Russian) / Yu.G. Dragunov, V.V. Kudinov, D.G. Kudinov. Kudinov, D.G. Kulikov // Atomic Energy. - 2019. - № 5. - Vol. 126.- P. 243-247.
3. Kelsigazina, R.E. Prospects of nuclear power development in Kazakhstan / R.E. Kelsigazina, A.J. Duisen // International Student Scientific Bulletin. - 2015. - № 3-4. - URL: https://eduherald.ru/ru/article/view?id=14101 (date of access: 24.03.2025).
4. Kadyrzhanov, K.K. Prospects for the development of nuclear energy in the Republic of Kazakhstan / K.K. Kadyrzhanov // Bulletin of NNC RK. - 2011. - Issue 4 (48).
5. Dzhanzakov T. How is the construction of NPP in Uzbekistan // Kursiv. - 2024. - October 16.- [Electronic resource]. URL: https://uz.kursiv.media/2024-10-16/kak-idet-stroitelstvo-aes-v-uzbekistane/. (date of access: 24.03.2025).
6. Perelygina E. All about the NPP project in Kazakhstan: who and where will build, pros and cons // Vestnik Kavkaza. [Electronic resource]. - 2023. - October 19. // KazTAG. URL: https://vestikavkaza.ru/articles/vse-o-proekte-aes-v-kazahstane-kto-i-gde-budet-stroit-plusy-i-minusy.html. (date of access: 24.03.2025).
7. Khairushev J. Expert on the choice of the company for NPP construction: Pragmatism and national interests // Taspanews.kz. [Electronic resource]. - 2025. - January 24. - URL: https://taspanews.kz/novosti-kazakhstana/ekspert-o-vybore-kompanii-dlya-stroitelstva-aes-pragmatizm-i-natsionalnye-interesy-759388938970/. (date of access: 24.03.2025).
8. Zhang S. Environmental aspects of NPP construction. South Korean experience in the construction of nuclear power plants and its possible application in Kazakhstan. // “Newsroom Media” [Electronic resource] - 2024. - September 11. - URL: https://newsroom.co.nz/. (date of access: 24.03.2025).
9. Nuclear Energy in Russia// TAdviser [Electronic resource]. - 2024. - November 19.
10. Belarusian Nuclear Power Plant // Official website of the Republican Unitary Enterprise. URL: https://belaes.by/ru/infotsentr.html. (date of access: 24.03.2025).
11. In Uzbekistan they create a consortium for NPP construction // Nezavisimaya gazeta. [Electronic resource]. - 2025. - February 12. URL: https://www.ng.ru/cis/2025-02-12/5_9191_uzbekistan.html (date of access: 24.03.2025).
12. Eurasian Economic Union // Official website.- URL: https://www.eaeunion.org/ . (date of access: 24.03.2025).
13. International Atomic Energy Agency (IAEA). IAEA Bulletin, Vol. 61, No. 3 // IAEA. - URL: https://www.iaea.org/ru/bulletin/61-3 (date of access: 24.03.2025).

14. Nuclear energy development - a necessary condition for the global climate agenda. // Energy Policy. [Electronic resource]. - 2021. - April 8. - URL: https://energypolicy.ru/razvitie-atomnoj-energetiki-neobhodimoe-uslovie-globalnoj-klimaticheskoj-povestki/business/2021/14/08/ (date of access: 24.03.2025).
15. Sanctions in the construction of NPPs. [Electronic resource] // Sputnik Kazakhstan. [Electronic resource]. - 2024. - October 8. - URL: https://ru.sputnik.kz/20241008/sanktsii-predusmotrit-pri-vozvedenii-aes-47667967.html (date of access: 24.03.2025).
16. Construction of NPP in Kazakhstan at this stage looks extremely risky step - AI // KazTAG. [Electronic resource]. - 2024. - September 20. - URL: https://kaztag.kz/ru/news/stroitelstvo-aes-v-kazakhstane-na-dannom-etape-vyglyadit-krayne-riskovannym-shagom-ii (date of access: 24.03.2025).
17. Kim, J. & Lee, H. “South Korean Nuclear Technology: Applications and Global Impact.” // Energy Journal, Renewable and Sustainable Energy Reviews. - 2021. - Volume 135. - URL: https://www.sciencedirect. com/science/article/article/abs/pii/S1364032120305256 (date of access 24.03.2025).
18. Armaroli, N., Balzani, V. (2006), The future of energy supply: Challengesand opportunities. Angewandte Chemie, 46(1-2), 52-66.
19. Asif, M., Muneer, T. (2007), Energy supply, its demand and security issuesfor developed and emerging economies. Renewable and SustainableEnergy Reviews, 11(7), 1388-1413.
20. Baev, P.V. (2012), From European to Eurasian energy security: Russianeeds and energy perestroika. Journal of Eurasian Studies, 3,177-184.
21. BaseGarant. (1992), The Law of the Russian Federation of March 5, 1992,No 2446-I on Security (with Amendments, Expired). Available from:http://www.base.garant.ru/10136200/#friends.
22. Bhutta, Z. (2014), CASA-1000 Project: Pakistan, Tajikistan Agreeon Electricity Tariff. Available from: https://www.tribune.com.pk/story/726016/casa-1000-project-pakistan-tajikistan-agree-on-electricity-tariff/.

РЕЗЮМЕ

В статье представлен анализ предполагаемых вендоров для строительства атомной электростанции в Республике Казахстан в разрезе энергетической безопасности в рамках ЕАЭС. Рассмотрены успешные кейсы строительства АЭС на территории ЕАЭС и СНГ, исследованы предложенные дизайны и технологические предложения потенциальных стран-поставщиков (Российская Федерация, Китайская Народная Республика, Французская Республика, и Корейская Народно-Демократическая Республика) для автономного определения членов консорциума для строительства атомной электростанции в Казахстане, а также проанализированы их роль и влияние на энергетическую безопасность Казахстана.

УДК 06.81.55
МРНТИ 06.71.07

Okumbekova M.B., Assistant Professor, https://orcid.org/0009-0007-1687-262X
Financial University under the Government of the Russian Federation, Moscow, Russian Federation, mokumbekova@fa.ru

MARKETING ANALYSIS OF THE PRINTING MARKET. DYNAMICS AND TRENDS

БАСПА НАРЫҒЫН МАРКЕТИНГТІК ТАЛДАУ. ДИНАМИКА ЖӘНЕ ТРЕНДТЕР

ANNOTATION

The article presents a marketing analysis of the printing market in Russia, covering key trends, dynamics and changes in consumer preferences. The analysis shows that the market is displaying steady growth due to the introduction of digital technologies, increasing demand for personalised products and active environmental initiatives. Changes in the business models of companies due to increasing competition and changing consumer expectations are also discussed. It concludes by emphasising the need for industry players to adapt to new conditions and use innovative technologies to ensure competitiveness.

АҢДАТПА

Мақалада Ресейдегі полиграфия нарығының маркетингтік талдауы ұсынылған, ол тұтынушылардың қалауындағы негізгі тенденцияларды, динамиканы және өзгерістерді қамтиды. Талдау көрсеткендей, нарық цифрлық технологияларды енгізуге, жекелендірілген өнімдерге сұраныстың артуына және белсенді экологиялық бастамаларға байланысты тұрақты өсуді көрсетеді. Бәсекелестіктің артуы мен тұтынушылық күтулердің өзгеруіне байланысты компаниялардың бизнес-модельдеріндегі өзгерістер де қарастырылуда. Қорытындылай келе, сала ойыншыларын жаңа жағдайларға бейімдеу және бәсекеге қабілеттілікті қамтамасыз ету үшін инновациялық технологияларды қолдану қажеттілігі атап өтіледі.

Keywords: *printing, market analysis, market, dynamics, trends, digitalisation, personalisation, environmental initiatives, competition, innovative technologies.*

Түйінді сөздер: *полиграфия, маркетингтік талдау, нарық, динамика, трендтер, цифрландыру, жекелендіру, экологиялық бастамалар, бәсекелестік, инновациялық технологиялар*.

Introduction. Trends in the modern market are pushing enterprises of the printing industry to master innovative methods with the introduction of digital technologies. [3] The printing services market has been showing steady growth in recent years. The share of orders completed using digital printing increased from 17% in 2019 to more than 25% in 2023. Priority areas are highlighted, such as: digital printing, digital prepress technologies and digital photography. This trend is driven by the convenience, high speed and affordability of digital printing for both large and small companies. For the latter, the possibility of printing small runs at a competitive price is especially relevant. Moreover, digital printing enables the personalized production of banners, signage and similar products, including the integration of QR codes, which are increasingly used in today's realities.

Methods and materials of the study. The article uses informational and logical means of cognition, as well as such general scientific methods of cognition: induction, deduction. The methods of system analysis are applied to identify modern trends, the analysis of theoretical sources is carried out. In the course of the study, the methods of empirical research, methods of statistical data processing, as well as methods of theoretical research were used.

Discussion and results. Automation of production processes is an effective tool for reducing costs while improving product quality. The priority areas of automation are: online printing, color correction, prepress preparation of documents and images, as well as management of printing equipment. The necessary initial investment in new hardware and software will pay off with savings of at least 15% of the current costs. Automation will increase the volume of services provided and accept more complex orders, which will have a positive

impact on the company's financial results. The use of modern digital technologies makes it possible to create a highly profitable production of printed products with excellent quality with a minimum installation time. At the same time, digitalization also increases the competitiveness of printed products.

Modern printing companies offer a full range of services, including design and brand book development, as well as printing finished products. Such an integrated approach is beneficial to both parties: the customer receives a ready-made solution, saving time and resources on the search for contractors, without compromising quality. The contractor, in turn, expands his portfolio, gains experience and strengthens his reputation as a multidisciplinary expert.

Let's analyze the factors that affect the market, highlighting the positive and negative aspects. The latter include a high dependence on imports. The poorly developed production of copying equipment in Russia creates unfavorable conditions for companies providing copying services. The dependence of the domestic printing industry on imports was its key problem even before the introduction of sanctions. The current crisis has significantly exacerbated this situation. The European Union has imposed a ban on the supply of printing inks, coated and uncoated paper, cardboard, pulp production and cardboard processing equipment, as well as printing machines (for flexography, offset, letterpress and gravure printing) and binding equipment to the Russian Federation. Currently, enterprises are actively developing parallel import schemes, but the import of components and spare parts for printing equipment remains limited. To reduce import dependence, there is a transition to the use of domestic paper. Despite this, the shortage of paper and production capacity has led to a thirty percent increase in the cost of books since the beginning of the year.

The Russian market of printing services is characterized by the presence of over 20 thousand enterprises of various sizes. Large and medium-sized players are represented by offset, flexographic and digital printing houses, and small businesses actively use modern printing equipment. The market is at a stage of maturity approaching decline, which, in conditions of high competition and slowing growth, leads to increased competition for existing customers. External conditions for the Russian economy remain difficult. The main feature of the current economic situation is that supply is shrinking more than demand. This is what creates the main inflationary pressure.

Over the previous two years, there has been a coexistence of four, at first glance, completely different trends in print design. Currently, minimalistic design is popular: simple and strict lines, a calm color scheme (which can be limited to just two colors - black and white), a minimum number of letters and illustrations that provide a sense of spaciousness. This allows you to highlight the text and effectively play with other design elements.

A separate area is the active use of neural networks to create images. Currently, artificial intelligence is able to generate not only fantasy paintings, but also images that are almost indistinguishable from real photos. It is only important to formulate the request correctly and accurately. Moreover, you can find projects where all the illustrations are created using a neural network.

At the moment, the printing market is actively developing and shows high results in terms of revenue and turnover in the market. This is due to new technologies and trends in printing, let's consider each of them:

1. Digital printing is more energy-efficient than traditional offset printing because it requires fewer steps and processes to produce printed products, resulting in fewer greenhouse gas emissions. It also allows businesses to produce customized products on demand, reducing the need for inventory and overproduction. [9]

2. UV printing is a process that uses UV light to cure inks and coatings rather than traditional heat or solvents. This process is becoming increasingly popular in the printing industry because it is more environmentally friendly and efficient. [10]

One of the main advantages of UV printing is that it consumes less energy and produces fewer emissions compared to traditional printing methods. In addition, UV printing produces less waste and produces fewer volatile organic compounds (VOCs) that are harmful to the environment.

1. Carbon-balanced printing is a trend in the printing industry that aims to reduce the carbon emissions associated with the production of printed materials. This is usually achieved through the use of renewable energy and carbon offsetting projects, such as reforestation and renewable energy projects. industry, which contributes significantly to greenhouse gas emissions. In addition, carbon-balanced printing is more efficient because it reduces energy consumption during the printing process, which ultimately leads to cost savings for the business. [11]

2. Sustainable printing inks have proven to be more environmentally friendly and efficient because they are made from renewable resources such as vegetable oils and resins rather than traditional fossil fuel-based inks. In addition, these inks have a lower carbon footprint and emit fewer harmful emissions during the production process, making them a more environmentally friendly choice for the printing industry. [12]

3. DTF printing is a printing method that is gaining popularity in the printing industry because it is more environmentally friendly and efficient than traditional screen printing methods. It prints directly onto the fabric using digital printing technology, which reduces the need for water, chemicals, and energy compared to traditional screen printing or dye sublimation. [13]

This process is odorless, with one by-product as ink and glue are used where applicable. Water-based ink. In addition, with DTF printing, you can be more flexible in design as you can easily print on a wide variety of fabrics for different colors, patterns, and effects. This allows for more efficient use of raw materials and resources, thereby reducing waste.

These printing trends are fundamental technologies and development of the printing market. However, in the CIS countries, there are several more trends that are actively gaining among entrepreneurs in this market, let's consider each of them:

- Mobile printing is a technology that allows you to print documents and images directly from mobile devices such as smartphones and tablets. It is becoming increasingly popular due to its convenience and accessibility. Mobile printing uses a variety of wireless technologies such as Wi-Fi, Bluetooth and NFC. Many modern printers support direct printing from mobile devices, and there are also special applications that allow you to connect to printers and control the printing process using smartphones and tablets. Mobile printing has applications in a variety of applications, from home use to business to education. It allows you to quickly and conveniently print the necessary documents anywhere and anytime. However, to use mobile printing, you must ensure that your printer and mobile device are wirelessly connected and compatible. In addition, you need to consider the security and protection of sensitive data when printing from mobile devices. [14]

- Print as a Service or "PraaS" is a business model that allows users to access subscription or pay-as-you-go printing capabilities. It is actively developing in the printing market. Due to the global trend of reducing responsibility and the transfer of many auxiliary business areas to outsourcing. This service can be implemented both in a large company and for small ones, taking into account all the needs of customers. the number of different devices, as well as the usual copying of the sheet. Print-as-a-Service is driving the growth of the printing industry by providing businesses with a more cost-effective and convenient way to access printing services, as well as making it easier for smaller companies to enter the market. One example of new

PraaS technology is cloud-based print-on-demand (POD) services. These services allow users to order and print customized products such as t-shirts, mugs, and business cards from anywhere in the world. These services use cloud technology to process orders and send them to the appropriate presses for production. [15]

There are procedures that are required by printing organizations in business planning and planning of commercial activities, such as:

- analysis of the effectiveness of commercial activities taking into account the level of competitiveness of goods and services of a printing company [4];
- assessment of the printing market, Russian or foreign, depending on the scale of the company's activities;
- formulation of the marketing goal and objectives of the development of the company as a whole and its commercial activity in particular [7];
- identification of potential complexities that affect the efficiency of commercial operations; - substantiation of the forecast development of commercial activities and a detailed review of the tasks for current development;
- identification of factors affecting the volume of sales of goods and services by a printing company;
- formation of plans for trends in commercial activity and their approval, with the allocation of short-term and long-term plans;
- assessment of the potential effectiveness of planned activities for the sale of goods and services by a printing company, and, if necessary, their subsequent adjustment. [2]

The emergence of new technologies, such as large-format printing and 3D printing, expands the capabilities of printing companies and opens up new market niches. There is also a desire to use more environmentally friendly materials and technologies. To date, there are many technologies and methods of 3D printing. Regardless of the technology, the essence of the process comes down to one thing: the gradual layer-by-layer reproduction of the digital 3D model in the material. [5]

With the development of import substitution and export processes in the packaging market, a further increase in the production of polymer packaging in the country is predicted. However, printing houses should take into account a number of infrastructure aspects when strategically planning the printing production of label and packaging products. At the moment, the issue of environmental pollution and the use of environmentally friendly materials is increasingly raised, and there are many complaints about plastic-based materials, and even now in certain areas their use is not as obvious as it was before. When comparing paper and cardboard to plastic, the advantage is not in favor of the latter, as plastic is not made from renewable raw materials, it is not a degradable product, which is hugely harmful to the planet, and is increasingly referred to as problematic waste to recycle. [8]

It should also be noted that today many large printing houses have switched to CtP technologies operating according to the "computer - printing plate" scheme. This technology is suitable for offset, gravure, letterpress, screen and flexographic printing. And the main advantage of the CtP technology is that there is no need for photoplates, since the layout in electronic form, bypassing the stages of output of color separation transparencies and their exposure, is displayed directly on the plates. Technical paper waste and ink consumption are minimized due to the high accuracy of paint combination, and the cost of finished products is reduced. When it comes to post-press processes, they generally do not have any significant harmful effects on the environment. First of all, environmental pollution is caused by the printing processes of printing. Paper waste generated in the process of post-printing processing of the product is handed over to waste paper and recycled. If we talk about e-books, then three main factors are big disadvantages: irreplaceable natural resources are used for their production; Short device lifecycle release of harmful toxins that pollute the environment after disposal. [6]

Conclusion. Thus, it can be concluded that the printing market is currently under the influence of several competing trends. Traditional printing methods, such as offset printing, remain relevant for high-volume products due to their cost-effectiveness. However, the growing demand for fast short-run printing and personalisation is driving the development of digital printing in its various variants.

To summarize that the printing market in Russia is showing significant changes under the influence of technology, consumer preferences and environmental factors, which creates both challenges and opportunities for industry players.

REFERENCES

1. Bogoviz, A.V. Motivation of domestic manufacturers of agricultural machinery in the conditions of import substitution / A.V. Bogoviz, I.K. Burmistrova, I.M. Kublin, S.A. Saninsky, V.I. Tinyakova // Economics of Agriculture of Russia. - 2016. - № 10. - C. 10-17.
2. Borzova, A.A. Digital technologies in printing and the potential of the market of printed products / A.A. Borzova, E.V. Ergalieva // Youth and the XXI century - 2020: Proceedings of the 10th International Youth Scientific Conference ; edited by A.A. Gorokhov. - Kursk : Plekhanov Russian University of Economics. G.V. Plekhanov Russian University of Economics, Saratov Socio-Economic Institute (branch), 2020. - C. 39-42. - ISBN is absent. - Text : electronic. - URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42443063 (date of access: 21.03.2025).
3. Voronov, A.A.; Voronov, A.A.; Glukhikh, L.V.; Manvelyan, M.O. Methodology of competitiveness assessment at the micro- and macro-level in the Russian industries / A.A. Voronov, L.V.; Manvelyan, M.O. // Economic Sciences. - 2008. - № 43. - C. 137-141.
4. Kublin, I.M. Descriptive analysis of the peculiarities of post-letting management of industrial enterprises / I.M. Kublin, A.E. Makhmetova // Volga Trade and Economic Journal. - 2011. - № 2. - C. 24-28.
5. Logvin, V.N. 3D-printing technologies: application and development prospects / V.N. Logvin // Achievements in science and education 2023: collection of articles of the International research competition; publishing house: Nauka i Prosveshchenie. - Penza. - Moscow Pedagogical State University, 2023. - C. 17-23. - ISBN is absent. - Text : electronic. - URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=50496851 (date of access: 21.03.2025).
6. Markova, D.G. Analysing the issue of environmental friendliness in the printing industry / D.G. Markova // Izvestia TulSU. Technical Sciences. - 2019. - vol. 12. - P. 582-584.
7. Tolstyakov, R.R. Quality of marketing communication in the Internet: regional aspect / R.R. Tolstyakov // Prospects of science. - 2012. - № 2 (29). - C.129-131.
8. Trushnikova, A.A. Development of the printing industry in the conditions of digitalisation / A.A. Trushnikova, S.V. Plekhanov // Economic security and quality. - 2019. - № 4 (37). - C. 34-38.
9. Jansen, W. (1996), Estimating Saving-Investment Correlations: Evidence for OECD Countries Based on an Error Correction Model, Journal of International Money and Finance, 15, 749-781. 4. Jansen, W. (1998), Interpreting Saving-Investment Correlations, Open Economies Review, 9, 205-218.
10. Murphy, Robert G. (1984), Capital Mobility and the Relationship between Saving and Investment, Journal of International Money and Finance, 3, 327-342.
11. Pratt, J. W. and R. Schlaifer (1988), On the Interpretation and Observation of Laws, Journal of Econometrics, September, 23-52.
12. Summers, Lawrence H. (1988), Tax Policy and International Competitiveness, in Jacob A. Frenkel (ed.) International Aspects of Fiscal Policy, NBER Conference Report, Chicago: University of Chicago Press, 349- 375.

13. Swamy, P.A.V.B. (1970), Efficient Inference in a Random Coefficients Regression Model, Econometrica, March, 3ll-323.
14. Swamy, P.A.V.B. and J.S. Mehta (1975) Bayesian and Non-Bayesian Analysis of Switching Regressions and of Random Coefficient Regression Models, Journal of the American Statistical Association, September, 593-602.
Swamy, P.A.V.B., G.S. Tavlas (2002), Random Coefficient Models, in B.H. Baltagi (ed.) Companion to Theoretical Econometrics, Basil Blackwell, 410-428.

РЕЗЮМЕ

В статье представлен маркетинговый анализ рынка полиграфии в России, который охватывает ключевые тенденции, динамику и изменения в потребительских предпочтениях. Анализ показывает, что рынок демонстрирует устойчивый рост, обусловленный внедрением цифровых технологий, увеличением спроса на персонализированную продукцию и активными экологическими инициативами. Рассматриваются также изменения в бизнес-моделях компаний, вызванные растущей конкуренцией и изменением потребительских ожиданий. В заключение подчеркивается необходимость адаптации игроков отрасли к новым условиям и использования инновационных технологий для обеспечения конкурентоспособности.

УДК 004.8
МРНТИ 12.35.43

Жүсіп М.Н., магистр, https://orcid.org/0009-0006-0392-6513
НАО «Западно-Казахстанский аграрно-технический университет имени Жангир хана», г. Уральск, ул. Жангир хана 51, 090009, Казахстан, mubarak-98@mail.ru
Тимиргалиев И.Н., системный инженер
АО «Kaspi Bank», г. Уральск, ул. Курмангазы 127, 090000, Казахстан, timirgaliev.ilda@mail.ru

Zhussip M.N., master, https://orcid.org/0009-0006-0392-6513
NJSC «West Kazakhstan Agrarian and Technical University named after Zhangir khan», Uralsk, st. Zhangir khan 51, 090009, Kazakhstan, mubarak-98@mail.ru
Timirgaliev I.N., Systems Engineer
JSC "Kaspi Bank", Uralsk, st. Kurmangazy 127, 090000, Kazakhstan, timirgaliev.ilda@mail.ru

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ЭКОНОМИКА ЗНАНИЙ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ
INTELLIGENT TECHNOLOGIES AND THE KNOWLEDGE ECONOMY IN THE CONTEXT OF DIGITAL TRANSFORMATION

АННОТАЦИЯ

Цифровая трансформация становится глобальным трендом, оказывающим значительное влияние на экономику, образование и общество. В статье рассматриваются интеллектуальные технологии (ИТ) как ключевой драйвер экономики знаний, их роль в повышении экономической эффективности и создании новых возможностей для развития человеческого капитала. Особое внимание уделяется роли образования в формировании цифровых компетенций и подготовке кадров для цифровой экономики. Анализируются как позитивные эффекты цифровизации, такие как создание новых

рабочих мест и увеличение доступности знаний, так и негативные последствия, включая автоматизацию рабочих мест и цифровое неравенство. Приводятся примеры успешного внедрения ИТ в различных отраслях, а также анализируется текущая ситуация в Казахстане. На основе проведенного исследования предлагаются рекомендации по развитию ИТ-инфраструктуры и образовательных систем для минимизации рисков цифровой трансформации.

ANNOTATION

Digital transformation has become a global trend, significantly impacting the economy, education, and society. This article examines intelligent technologies (IT) as a key driver of the knowledge economy, their role in enhancing economic efficiency, and creating new opportunities for human capital development. Particular attention is paid to the role of education in developing digital competencies and preparing the workforce for the digital economy. Both the positive effects of digitalization, such as job creation and increased access to knowledge, and the negative consequences, including job automation and digital inequality, are analyzed. Examples of successful IT implementation across various industries are provided, along with an analysis of the current situation in Kazakhstan. Based on the research conducted, recommendations are offered for the development of IT infrastructure and educational systems to minimize the risks associated with digital transformation.

Ключевые слова: цифровая трансформация, интеллектуальные технологии, экономика знаний, цифровые компетенции, цифровое неравенство, Казахстан, ИИ, STEM-образование.

Keywords: digital transformation, intelligent technologies, knowledge economy, digital competencies, digital inequality, Kazakhstan, AI, STEM education.

Введение. Цифровая трансформация, охватившая практически все сферы современной жизни, представляет собой один из ключевых драйверов глобальных изменений в XXI веке. Этот процесс характеризуется активным внедрением интеллектуальных технологий (ИТ), таких как искусственный интеллект (ИИ), машинное обучение, блокчейн, интернет вещей (IoT) и большие данные, что существенно трансформирует структуру экономики и общественных отношений. В условиях цифровой экономики знания становятся основным ресурсом, а их эффективное использование определяет конкурентоспособность как отдельных государств, так и глобальной экономической системы в целом.

Экономика знаний, базирующаяся на инновационных технологиях, требует переосмысления традиционных подходов к производству, управлению и образованию. Интеллектуальные технологии не только повышают эффективность бизнес-процессов, но и создают новые возможности для развития человеческого капитала. Однако успешная адаптация к условиям цифровой трансформации невозможна без качественного образования, которое формирует необходимые цифровые компетенции и обеспечивает подготовку специалистов, способных работать в условиях высокотехнологичной среды.

Актуальность данной темы обусловлена тем, что цифровизация становится неотъемлемой частью социально-экономического развития, а ее влияние на экономику и образование требует глубокого анализа. Современные исследования показывают, что страны, активно внедряющие ИТ, демонстрируют более высокие темпы экономического роста и социального прогресса. Например, согласно данным Всемирного экономического форума (WEF), к 2025 года цифровая экономика будет генерировать более 25% мирового ВВП, а число рабочих мест, связанных с ИТ, увеличится на 14%.

Тем не менее, цифровое неравенство и недостаточная подготовка кадров остаются серьезными вызовами для многих регионов мира.

Цель настоящей статьи заключается в исследовании взаимосвязи между интеллектуальными технологиями, экономикой знаний и образовательными процессами в контексте цифровой трансформации. Для достижения этой цели решаются следующие задачи:

Анализируется влияние ИТ на экономическую эффективность и структурные изменения в различных отраслях.

Рассматривается роль образования в формировании цифровых компетенций и подготовке кадров для новой экономики.

Предлагаются рекомендации по развитию ИТ-инфраструктуры и образовательных систем, направленных на минимизацию рисков цифровой трансформации.

Методологическую основу исследования составляют анализ статистических данных, отчетов международных организаций (например, ВЭФ, ЮНЕСКО, ВБ) и научных публикаций, а также изучение успешных кейсов применения ИТ в экономике и образовании.

Материалы и методы исследования. Интеллектуальные технологии (ИТ) представляют собой совокупность технологий, основанных на использовании искусственного интеллекта (ИИ), машинного обучения, больших данных, блокчейна, интернета вещей (IoT) и других цифровых решений. Эти технологии направлены на автоматизацию процессов, повышение эффективности и создание новых возможностей для бизнеса и общества.

Экономика знаний — это модель экономического развития, в которой ключевым ресурсом являются знания, а их производство, распространение и использование становятся основными драйверами роста. В отличие от традиционной экономики, где главную роль играют материальные ресурсы, экономика знаний базируется на инновациях, человеческом капитале и цифровых технологиях.

Связь между ИТ и экономикой знаний заключается в том, что интеллектуальные технологии обеспечивают сбор, обработку и анализ огромных объемов данных, что позволяет принимать более обоснованные решения, оптимизировать процессы и создавать новые продукты и услуги.

Внедрение интеллектуальных технологий оказывает существенное влияние на экономическую эффективность различных отраслей. Это подтверждается статистическими данными и исследованиями международных организаций.

Доля цифровой экономики в мировом ВВП. Согласно исследованию McKinsey Global Institute (2021), к 2025 году цифровая экономика будет генерировать около 24,3% мирового ВВП, что эквивалентно примерно $23 трлн [1]. Наибольший вклад в этот показатель вносят страны с высоким уровнем цифровизации, такие как США, Китай и страны Европейского Союза.

Таблица 1 - Доля цифровой экономики в ВВП по регионам (2021)

Регион	Доля в ВВП (%)	Примерный вклад в мировой ввп (трлн $)
Северная Америка	35	7.5
Азиатско-Тихоокеанский регион	28	6.2
Европа	22	4.8
Латинская Америка	10	1.2
Африка	5	0.5

Темпы роста производительности труда за счет внедрения ИТ. По данным Всемирного банка (World Bank, 2022), внедрение интеллектуальных технологий в производственные процессы увеличивает производительность труда в среднем на 20–30% [2]. Особенно заметен этот эффект в таких отраслях, как финансы, здравоохранение и логистика.

Кейсы успешного применения ИТ. Примеры успешного внедрения интеллектуальных технологий наглядно демонстрируют их потенциал для экономики знаний.

Amazon: использование ИИ для оптимизации цепей поставок: Компания Amazon активно применяет ИИ для прогнозирования спроса, управления запасами и оптимизации маршрутов доставки. Это позволило сократить время доставки товаров до клиентов на 30% и снизить операционные затраты на 20% [3].

Tesla: автономные автомобили и машинное обучение: Компания Tesla использует машинное обучение для разработки систем автопилота. Благодаря этому Tesla удалось снизить количество дорожно-транспортных происшествий на 40% среди пользователей своих автомобилей [4].

Интеллектуальные технологии являются ключевым драйвером экономики знаний, обеспечивая значительный рост производительности труда, оптимизацию бизнес-процессов и создание новых рынков. Однако их внедрение требует значительных инвестиций и подготовки кадров, что подчеркивает важность развития образования и ИТ-инфраструктуры.

Роль образования в формировании экономики знаний. Образование играет ключевую роль в формировании экономики знаний, поскольку именно через систему образования происходит передача знаний, навыков и компетенций, необходимых для успешной адаптации к условиям цифровой трансформации. В условиях быстрого технологического прогресса традиционные подходы к обучению уже не могут удовлетворять потребности рынка труда, что делает необходимым внедрение инновационных образовательных моделей.

Согласно данным ЮНЕСКО (2022), страны с высоким уровнем инвестиций в образование демонстрируют более высокие темпы экономического роста. Например, каждые дополнительные $100 млн, вложенные в образование, увеличивают ВВП на 0,5% в среднесрочной перспективе [5].

Таблица 2 - Корреляция между уровнем инвестиций в образование и экономическим ростом (2022)

Страна	Инвестиции в образование (% от ВВП)	Прирост ВВП (%)
США	5,0	2,8
Китай	4,3	5,2
Казахстан	3,1	3,7
Россия	3,8	2,1

Проблемы современного образования. Несмотря на значительный прогресс в развитии образовательных систем, многие страны сталкиваются с рядом проблем, связанных с адаптацией учебных программ к требованиям цифровой экономики. Одной из ключевых проблем является недостаточный уровень цифровых навыков у студентов и преподавателей.

Уровень цифровых навыков в разных странах. По данным исследования OECD (2021), только 30% школьников в мире обладают достаточным уровнем цифровой грамотности для работы в условиях цифровой экономики. В Казахстане этот показатель составляет 22%, что ниже среднемирового уровня [6].

Кроме того, в Казахстане наблюдается дефицит квалифицированных преподавателей, способных работать с современными цифровыми технологиями. По данным Министерства образования и науки Республики Казахстан (2023), около 60% педагогов нуждаются в повышении квалификации в области ИТ [7].

Инновационные подходы в образовании. Для решения выявленных проблем необходимо внедрение инновационных подходов в образовательный процесс. Современные технологии позволяют сделать обучение более доступным, персонализированным и эффективным.

Онлайн-курсы и платформы. Одним из наиболее успешных примеров является использование онлайн-платформ для обучения. Такие платформы, как Coursera, Udemy и Stepik, предлагают широкий спектр курсов по цифровым технологиям. В Казахстане активно развивается платформа "BilimLand", которая предоставляет доступ к образовательным материалам для школьников и студентов [8].

Таблица 3 - Сравнение традиционных и цифровых методов обучения

Критерий	Традиционное обучение	Цифровое обучение
Доступность	Ограниченная	Глобальная
Персонализация	Низкая	Высокая
Стоимость	Высокая	Низкая
Эффективность	Зависит от преподавателя	Выше за счет интерактивности

Проектная деятельность и STEM-образование. Важным направлением является развитие проектной деятельности и STEM-образования (наука, технологии, инженерия, математика). В Казахстане реализуются программы, такие как "STEM-школы" и "Цифровой казахстан", направленные на подготовку специалистов для цифровой экономики.

Подготовка кадров для цифровой экономики. Подготовка кадров для цифровой экономики требует фокуса на развитии как технических (hard skills), так и социальных (soft skills) навыков. Согласно исследованию LinkedIn (2023), топ-5 наиболее востребованных навыков будущего включают управление данными, кибербезопасность, облачные технологии, управление проектами и эмоциональный интеллект [9].

Образование является фундаментом для развития экономики знаний, однако его текущее состояние в Казахстане и других странах требует существенной модернизации. Внедрение цифровых технологий в образовательный процесс, развитие проектной деятельности и STEM-образования, а также подготовка кадров с учетом требований цифровой экономики являются ключевыми направлениями для преодоления существующих вызовов [10].

Экономические и социальные последствия цифровой трансформации. Цифровая трансформация оказывает значительное положительное влияние на экономику, создавая новые возможности для роста, инноваций и повышения качества жизни населения.

Создание новых рабочих мест благодаря ИТ. Внедрение интеллектуальных технологий приводит к появлению новых профессий и специализаций, связанных с разработкой, внедрением и обслуживанием цифровых решений. По данным Всемирного экономического форума (WEF, 2023), к 2030 году цифровизация создаст около 97 миллионов новых рабочих мест в мире [11]. В Казахстане ожидается увеличение числа ИТ-специалистов с 50 000 человек в 2023 году до 150 000 человек к 2030 году при условии реализации государственных программ поддержки ИТ-образования [12].

Увеличение доступности знаний и образования. Цифровизация способствует демократизации знаний, делая образование доступным для более широкого круга людей. Например, платформа "BilimLand" в Казахстане предоставляет бесплатный доступ к образовательным материалам для школьников и студентов из отдаленных регионов

страны [13]. По данным Министерства образования и науки РК, за последние два года количество пользователей платформы выросло на 40%, достигнув 1,5 млн человек [14].

Несмотря на позитивные эффекты, цифровая трансформация также сопровождается рядом вызовов и рисков, которые требуют внимания со стороны государства и бизнеса.

Угроза автоматизации рабочих мест. Одним из главных негативных последствий цифровизации является автоматизация рабочих мест, что может привести к массовой безработице среди работников, чья деятельность легко поддается автоматизации. По данным McKinsey Global Institute (2021), около 800 миллионов рабочих мест во всем мире могут быть автоматизированы к 2030 году [15]. В Казахстане наиболее подвержены риску автоматизации такие секторы, как производство, торговля и сельское хозяйство [16].

Цифровое неравенство остается серьезной проблемой, особенно в развивающихся странах, включая Казахстан. Согласно данным Международного союза электросвязи (ITU, 2022), уровень доступа к интернету в Казахстане составляет 82%, что значительно ниже среднемирового показателя (90%) [17]. В сельских районах страны этот показатель снижается до 50%, что ограничивает возможности для получения образования и участия в цифровой экономике.

Для преодоления негативных последствий цифровой трансформации необходимо принятие комплексных мер на уровне государства, бизнеса и общества.

Поддержка государственных инициатив. В Казахстане уже реализуются программы, направленные на сокращение цифрового неравенства. Например, программа "Цифровой Казахстан" предусматривает развитие инфраструктуры связи, повышение уровня цифровой грамотности населения и поддержку ИТ-стартапов [18]. Однако для достижения устойчивых результатов требуется увеличение финансирования и привлечение международных партнеров.

Развитие soft skills наряду с hard skills. В условиях цифровой экономики важную роль играют не только технические навыки, но и социальные компетенции, такие как креативность, коммуникация и адаптивность. В Казахстане Министерство образования и науки запустило проект "Soft Skills for Future", который направлен на развитие этих компетенций среди студентов и молодых специалистов [19].

Таблица 4 - Рекомендации по минимизации рисков цифровой трансформации

Рекомендация	Ожидаемый эффект
Развитие ИТ-инфраструктуры	Сокращение цифрового неравенства
Поддержка ИТ-образования	Увеличение числа квалифицированных кадров
Финансирование soft skills программ	Повышение адаптивности работников

Цифровая трансформация оказывает как позитивное, так и негативное влияние на экономику и общество. С одной стороны, она создает новые рабочие места, увеличивает доступность знаний и стимулирует инновации. С другой стороны, автоматизация рабочих мест и цифровое неравенство представляют собой серьезные вызовы, требующие решения. В случае Казахстана успешная адаптация к условиям цифровой трансформации возможна при условии реализации государственных программ, развития ИТ-инфраструктуры и подготовки кадров с учетом требований новой экономики.

Результаты исследований. Интеллектуальные технологии как драйвер экономики знаний. Внедрение ИТ способствует увеличению доли цифровой экономики в мировом ВВП до 24,3% к 2025 году. В Казахстане наблюдается активное развитие ИТ-сектора, однако уровень цифровизации остается ниже среднемирового показателя. Программы, такие как "Цифровой Казахстан", направлены на повышение конкурентоспособности страны в условиях глобальной цифровизации.

Роль образования в формировании экономики знаний - Образование является фундаментом для подготовки кадров новой эпохи. Однако в Казахстане уровень цифровых навыков среди школьников составляет всего 22%, что значительно ниже среднемирового уровня (30%). Для преодоления этого разрыва необходимы инвестиции в развитие STEM-образования и цифровых платформ, таких как "BilimLand".

Экономические и социальные последствия цифровой трансформации: Цифровизация создает новые рабочие места, но также сопровождается рисками автоматизации и цифрового неравенства. В Казахстане около 82% населения имеют доступ к интернету, однако в сельских районах этот показатель снижается до 50%. Для минимизации рисков требуется реализация государственных программ поддержки ИТ-инфраструктуры и развития soft skills.

Перспективы дальнейших исследований. В рамках данной статьи были рассмотрены основные аспекты влияния интеллектуальных технологий на экономику знаний и образование. Однако остаются нераскрытыми вопросы долгосрочных последствий внедрения ИТ, включая их влияние на экологию, этику и социальную стабильность. Кроме того, требуются дополнительные исследования по разработке новых образовательных моделей, учитывающих специфику цифровой экономики.

Цифровая трансформация — это вызов, который требует комплексного подхода и координации усилий всех заинтересованных сторон. В случае Казахстана успешная реализация стратегий цифровизации позволит стране занять достойное место в глобальной цифровой экономике, обеспечив устойчивое развитие и повышение качества жизни населения.

Заключение. Цифровая трансформация представляет собой необратимый процесс, который оказывает глубокое влияние на экономику, образование и общество в целом. Интеллектуальные технологии (ИТ) становятся ключевым драйвером экономики знаний, обеспечивая значительный рост производительности труда, оптимизацию бизнес-процессов и создание новых рынков. Однако успешная адаптация к условиям цифровой трансформации требует значительных усилий как со стороны государства, так и со стороны бизнеса и общества.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. McKinsey Global Institute. (2021). The Future of Work After COVID-19 .
2. World Bank. (2022). Digital Economy Report 2022 .
3. Amazon Annual Report. (2022). Innovation in Supply Chain Management.
4. Tesla Impact Report. (2022). Safety and Autopilot Technology.
5. UNESCO Global Education Monitoring Report. (2022). Investing in Education for Economic Growth.
6. OECD Skills Outlook. (2021). Digital Skills for the Future.
7. Министерство образования и науки Республики Казахстан. (2023). Стратегия развития образования.
8. BilimLand Analytics Report. (2023). Impact of Digital Platforms on Education.
9. LinkedIn Workforce Report. (2023). Top Skills for the Future Economy.
10. Агентство РК по стратегическому планированию и реформам. (2023). Прогноз развития ИТ-индустрии.
11. World Economic Forum (WEF). (2023). The Future of Jobs Report.
12. Агентство РК по стратегическому планированию и реформам. (2023). Прогноз развития ИТ-индустрии.
13. BilimLand Analytics Report. (2023). Impact of Digital Platforms on Education.
14. Министерство образования и науки Республики Казахстан. (2023). Статистика использования образовательных платформ.

15. McKinsey Global Institute. (2021). Jobs Lost, Jobs Gained: Workforce Transitions in a Time of Automation.
16. Министерство труда и социальной защиты РК. (2023). Анализ рисков автоматизации рабочих мест.
17. International Telecommunication Union (ITU). (2022). Digital Development Report.
18. Программа "Цифровой Казахстан". (2023). Стратегия развития цифровой экономики.
19. Министерство образования и науки РК. (2023). Проект Soft Skills for Future.

REFERENCES

1. McKinsey Global Institute. (2021). The Future of Work After COVID-19 .
2. World Bank. (2022). Digital Economy Report 2022 .
3. Amazon Annual Report. (2022). Innovation in Supply Chain Management.
4. Tesla Impact Report. (2022). Safety and Autopilot Technology.
5. UNESCO Global Education Monitoring Report. (2022). Investing in Education for Economic Growth.
6. OECD Skills Outlook. (2021). Digital Skills for the Future.
7. Ministerstvo obrazovanija i nauki Respubliki Kazahstan. (2023). Strategija razvitija obrazovanija.
8. BilimLand Analytics Report. (2023). Impact of Digital Platforms on Education.
9. LinkedIn Workforce Report. (2023). Top Skills for the Future Economy.
10. Agentstvo RK po strategicheskomu planirovaniju i reformam. (2023). Prognoz razvitija IT-industrii.
11. World Economic Forum (WEF). (2023). The Future of Jobs Report.
12. Agentstvo RK po strategicheskomu planirovaniju i reformam. (2023). Prognoz razvitija IT-industrii.
13. BilimLand Analytics Report. (2023). Impact of Digital Platforms on Education.
14. Ministerstvo obrazovanija i nauki Respubliki Kazahstan. (2023). Statistika ispol'zovanija obrazovatel'nyh platform.
15. McKinsey Global Institute. (2021). Jobs Lost, Jobs Gained: Workforce Transitions in a Time of Automation.
16. Ministerstvo truda i social'noj zashhity RK. (2023). Analiz riskov avtomatizacii rabochih mest.
17. International Telecommunication Union (ITU). (2022). Digital Development Report.
18. Programma "Cifrovoj Kazahstan". (2023). Strategija razvitija cifrovoj jekonomiki.
19. Ministerstvo obrazovanija i nauki RK. (2023). Proekt Soft Skills for Future.

ТҮЙІН

Цифрлық трансформация әлемдік тренд ретінде экономика, білім және қоғамға айтарлықтай ықпал етуде. Мақалада интеллектуалды технологиялар (ИТ) білім экономикасының негізгі қозғаушы күші ретінде қарастырылады, олардың экономикалық тиімділікті арттырудағы ролі және адам капиталын дамыту мүмкіндіктері зерттеледі. Білім берудің цифрлық құзыреттіліктерді қалыптастырудағы және цифрлық экономикаға мамандар даярлаудағы маңыздылығына ерекше көңіл бөлінеді. Цифрландырудың жұмыс орындарын жасау және білімге қолжетімділікті арттыру сияқты оң әсерлерімен қатар, автоматтандыру мен цифрлық теңсіздік сияқты теріс зардаптары да талданады. Әртүрлі салаларда ИТ-ның сәтті енгізілу мысалдары келтірілген, сонымен қатар Қазақстандағы қазіргі жағдай талқыланады. Жүргізілген

зерттеу негізінде цифрлық трансформациямен байланысты тәуекелдерді азайту үшін ИТ инфрақұрылымы мен білім беру жүйелерін дамыту бойынша ұсыныстар ұсынылады.

УДК 331.5
МРНТИ 06.71.07

Рустенова Э.А., кандидат экономических наук, https://orcid.org/0000-0001-5542-4204
НАО «Западно-Казахстанский аграрно-технический университет имени Жангир хана», г. Уральск, ул. Жангир хана 51, 090009, Казахстан, elvira02@mail.ru

Rustenova E.A., candidate of economic sciences, https://orcid.org/0000-0001-5542-4204
NJSC «West Kazakhstan Agrarian and Technical University named after Zhangir khan», Uralsk, st. Zhangir khan 51, 090009, Kazakhstan, elvira02@mail.ru

СЕЛЬСКАЯ МОЛОДЕЖЬ И ВЫБОР ПРОФЕССИИ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

TRANSITION TO SUSTAINABLE CONSUMPTION AND PRODUCTION PATTERNS: EXPERIENCE AND PROSPECTS IN KAZAKHSTAN

АННОТАЦИЯ

В статье рассматривается проблема профессионального самоопределения сельской молодежи в условиях цифровой трансформации. Актуальность темы обусловлена необходимостью адаптации системы профориентации к меняющимся требованиям рынка труда и вызовам цифровой экономики. На основе данных социологического опроса студентов аграрных вузов Казахстана выявлены ключевые факторы, влияющие на выбор профессии, а также оценена роль цифровой среды в формировании профессиональных траекторий. Показано, что основным источником влияния остаётся семья, в то время как институциональные механизмы профориентации демонстрируют ограниченную эффективность. Цифровизация одновременно расширяет возможности молодежи в доступе к информации и образовательным ресурсам и усиливает цифровое неравенство, особенно в сельских районах. Сделан вывод о необходимости комплексного подхода к поддержке профессионального самоопределения, основанного на развитии цифровых компетенций, критического мышления и личной осознанности.

ANNOTATION

The article addresses the issue of professional self-determination among rural youth in the context of digital transformation. The relevance of the topic is driven by the need to adapt career guidance systems to the evolving demands of the labor market and the challenges of the digital economy. Based on sociological survey data collected from students of agricultural universities in Kazakhstan, the study identifies key factors influencing career choice and assesses the role of the digital environment in shaping professional trajectories. The findings show that the primary source of influence remains the family, while institutional mechanisms of career guidance demonstrate limited effectiveness. Digitalization simultaneously expands young people's access to information and educational resources and exacerbates digital inequality, particularly in rural areas. The study concludes that a comprehensive approach is needed to support professional self-determination, one that is based on the development of digital competencies, critical thinking, and personal awareness.

Ключевые слова: *профессиональное самоопределение, сельская молодежь, цифровая трансформация, профориентация, человеческий капитал.*

Key words: *professional self-determination, rural youth, digital transformation, career guidance, human capital.*

Введение. Одной из ключевых проблем современного этапа социально-экономического развития является всесторонняя оценка профессионального самоопределения молодежи. Анализ текущей ситуации позволяет выявить масштабы дисбаланса между трудовыми ресурсами и структурой спроса на рынке труда, а также установить потенциальные причины роста молодежной безработицы и социальной нестабильности, сопряжённой с деструктивными социально-экономическими процессами, в которых задействованы как молодое поколение, так и общество в целом. В этой связи особое значение приобретает системная профориентационная работа, а также необходимость переосмысления существующих подходов к формированию профессиональных траекторий молодежи [1, 2].

Начиная с 1990-х годов, в научной среде активно обсуждается и сохраняет актуальность для стран постсоветского пространства проблема количественного и качественного несоответствия между предложением рабочей силы и реальными потребностями экономики [3]. В ряде исследований российских [4–6] и зарубежных ученых [7, 8] подчеркивается, что решение этой проблемы требует выработки конструктивных мер государственной политики, направленных на устранение профессионального дисбаланса и обеспечение устойчивого профессионального развития будущих специалистов, особенно в аграрной сфере, где важнейшую роль играет сельская молодежь.

Понятийное поле профессионального самоопределения в научной литературе трактуется по-разному. В числе наиболее распространенных подходов — его понимание как способности и готовности личности к построению жизненного и профессионального пути, основанного на индивидуальности, уникальности, способности к саморегуляции, социально-коммуникативному и межгрупповому взаимодействию [9–11].

Современные исследования, как отечественные, так и зарубежные, акцентируют внимание на новых моделях профессионального самоопределения, ориентированных на развитие у молодежи готовности к обучению на протяжении всей жизни и формирование человеческого капитала в условиях цифровой трансформации [12–14]. Цифровизация оказывает многоуровневое влияние на процесс профессионального выбора: с одной стороны, она расширяет доступ к образовательным и карьерным возможностям, нивелируя пространственные и социальные барьеры, с другой — предъявляет к молодым специалистам новые требования, связанные с освоением цифровых компетенций, гибкостью и способностью к самообучению. В сельских территориях цифровизация играет двойственную роль: она, с одной стороны, способна компенсировать дефицит очных образовательных и карьерных ресурсов, а с другой — подчеркивает неравномерность доступа к цифровой инфраструктуре, что формирует цифровое неравенство. Особенно важно учитывать влияние цифровых платформ, онлайн-курсов, карьерных сервисов и дистанционного взаимодействия, которые становятся альтернативой традиционным каналам профориентации и трудоустройства для сельской молодежи.

Таким образом, цифровая трансформация не только меняет рынок труда, но и трансформирует саму логику профессионального самоопределения, делая его более гибким, сетевым и ориентированным на индивидуальные траектории. Это особенно значимо в сельских регионах, где молодёжь ранее испытывала ограничения из-за территориальной удалённости и слабой инфраструктурной поддержки.

Проблематика профессионального самоопределения сельской молодежи в агропромышленном секторе усугубляется несоответствием между личными трудовыми

интересами, карьерными ожиданиями и реальными возможностями в сельской местности. Это приводит к снижению мотивации к обучению по аграрным направлениям и нежеланию работать в сельском хозяйстве [15].

Ряд зарубежных исследований, в частности американских авторов, обращает внимание на влияние социокультурных факторов на мотивацию студентов [16], теоретические основы молодежного самоопределения [17], а также на особенности выбора жизненного пути у подростков [18], что представляет собой значимый практический интерес.

Следует отметить устойчивую научную заинтересованность в исследовании профессиональной и социальной идентичности молодежи [19–21]. Однако в современных условиях сохраняется дефицит эмпирических исследований, направленных на комплексный анализ состояния профессионального самоопределения сельской молодежи в условиях неопределённости будущих профессий. Современные тенденции свидетельствуют о возрастании требований к гибкости специалистов: способность к кросс-функциональной деятельности, междисциплинарным подходам, критическому и креативному мышлению становятся ключевыми компетенциями. Это обуславливает актуальность изучения факторов, способствующих осознанному выбору профессионального будущего. Особое внимание в данном контексте заслуживают вопросы ориентации молодежи на приобретение цифровых компетенций, уровня её информированности о современных тенденциях на рынке труда и способности понимать стратегические направления его развития.

Материалы и методы исследования. Исследование процессов профессионального самоопределения сельской молодежи в условиях цифровой трансформации экономики было выполнено на основе данных эмпирического социологического анализа, проведенного среди студентов аграрных вузов Казахстана. Особое внимание в исследовании уделено влиянию цифровизации как ключевого фактора, трансформирующего образовательную и профессиональную среду, а также способствующего переосмыслению молодежью своего профессионального будущего. Методологическую основу составил выборочный опрос молодежи в возрасте от 14 до 35 лет. Общий объем выборки составил 400 респондентов. Анкетирование проводилось в дистанционном формате с применением цифровых инструментов сбора данных: респонденты самостоятельно заполняли онлайн-форму в Google-опросе. Это позволило не только обеспечить широкую географию выборки, включая отдалённые сельские районы, но и отразить степень вовлеченности молодежи в цифровую среду. Анкета включала 21 вопрос, направленный на выявление возраста первого осознанного профессионального выбора, карьерных ожиданий после окончания учебного заведения, а также факторов, которые, по мнению респондентов, будут определять их успех на цифровизирующемся рынке труда. Помимо первичного анализа описательной статистики были также обобщены экспертные мнения и выделены территориальные особенности восприятия молодежью процессов профессионального самоопределения в условиях цифровых изменений.

Результаты исследования. Современный этап социально-экономического развития сопровождается масштабными структурными преобразованиями, ключевым драйвером которых выступает цифровизация всех сфер общественной жизни. На этом фоне процесс профессионального самоопределения молодежи приобретает новое содержание и вектор развития. Поколение молодых людей сегодня формируется в условиях цифровой среды, характеризующейся высокой доступностью знаний, цифровых сервисов, коммуникационных платформ и карьерных возможностей. Цифровизация радикально расширяет горизонт выбора — как в сфере образования, так и в построении индивидуальных профессиональных траекторий.

Особенно заметным становится влияние цифровой трансформации на аграрный сектор, где наряду с традиционными профессиями формируется запрос на новые виды деятельности, связанные с агротехнологиями, роботизацией, данными и экологическим мониторингом. В этих условиях трансформируются не только требования к профессиональным навыкам, но и сам формат вхождения молодежи в трудовую сферу — с учетом удаленной занятости, гибких цифровых профессий и онлайн-обучения [22].

Для проверки обоснованности этих наблюдений и выявления факторов, влияющих на выбор профессии современной молодежью, были проанализированы результаты крупномасштабных социологических исследований, проводимых Омским государственным аграрным университетом в течение последних тридцати лет. Одним из фокусов исследования стало изучение роли цифровой среды как инструмента, посредника и пространства профессионального самоопределения.

Полученные данные, охватывающие молодежь из Российской Федерации и Республики Казахстан, показали, что выбор профессионального пути начинается у значительной части респондентов на ранних этапах жизненного цикла. Более 60% участников опроса заявили, что начали задумываться о будущей профессии до 18 лет, при этом 7% — еще до 12 лет. Подобная ранняя вовлеченность в профессиональную рефлексию во многом детерминирована доступностью цифровой информации, в том числе профориентационных платформ, социальных сетей, карьерных трекеров и видеоконтента. Период 15–17 лет можно считать ключевым с точки зрения принятия первичных карьерных решений: именно в этом возрасте подростки определяются с форматом продолжения образования (колледж, старшие классы, университет) и начинают формировать собственную профессиональную идентичность.




Рисунок 1 - Распределение респондентов по возрастным интервалам в процессе самоопределения

Современное общество формирует определённые «правила игры», в рамках которых профессиональная траектория молодежи часто вписывается в типовые сценарии: «школа — вуз», «школа — колледж» или «школа — колледж — вуз». Эти институционализированные модели задают направление движения ещё до наступления зрелого возраста, что приводит к устойчивому снижению доли молодых людей,

принимающих решение о выборе профессии после 19 лет. На практике это означает, что значительная часть молодежи оказывается вовлечённой в процесс профессионального самоопределения на ранних этапах жизни — до формирования зрелой рефлексии и глубинного понимания трансформаций на рынке труда.

Ключевую роль в этом процессе продолжает играть семья, особенно родители, чьи ценности, представления о «перспективных» профессиях и уровень вовлечённости в образовательный выбор ребёнка оказывают определяющее влияние. Результаты эмпирического исследования подтверждают этот тренд: данные опроса демонстрируют высокую долю респондентов, указавших на родительское влияние как главный фактор выбора будущей профессии (см. рис. 2).

При этом цифровизация существенно меняет характер и возможности профессионального самоопределения. С одной стороны, алгоритмы цифровой среды (социальные сети, рекомендательные платформы, маркетплейсы образования, онлайн-профориентация) могут усиливать социальные фильтры и воспроизводить типовые сценарии выбора, формируя эффект информационного пузыря. Однако, с другой стороны, именно цифровые технологии открывают принципиально новые возможности для расширения выбора: доступ к разнообразным образовательным ресурсам, онлайн-курсам, платформам профориентации и цифровым карьерным симуляторам позволяют молодёжи формировать более осознанные и индивидуализированные профессиональные траектории, вне зависимости от места проживания и социального капитала семьи. В сельских территориях это особенно значимо, поскольку цифровая инфраструктура компенсирует ограничения физического доступа к очному образованию и карьерному консультированию.

Таким образом, при наличии цифровой грамотности и критического мышления цифровая среда может выступать как мощный фактор поддержки раннего и осмысленного профессионального самоопределения молодежи, способствуя росту личной автономии в построении образовательных и карьерных стратегий.




Рисунок 2 - Факторы, повлиявшие на выбор профессии респондентами.

Более 52% респондентов в Казахстане выбрали будущую профессию по рекомендации родителей и родственников. Этот фактор можно рассматривать с двух сторон. С одной стороны, родители могут действительно помочь ребенку определиться с профессиональным путем; с другой — навязать свое мнение, не совпадающее с желаниями и интересами подростка. В последнем случае высока вероятность ошибочного выбора направления саморазвития, что может повлиять на профессиональное становление, потребовать переобучения и привести к работе не по специальности.

В вузах Казахстана вопросам профориентации уделяется большое внимание: для этого созданы специальные подразделения, которые ведут системную работу со школьниками в течение всего года. Однако только 6% опрошенных студентов отметили влияние профориентационных мероприятий на сделанный ими выбор. Около 20% респондентов указали, что приняли решение о выборе профессии самостоятельно — исходя из собственных интересов, склада мышления и склонности к определенным видам деятельности.

В целом, результаты опроса позволяют сделать вывод, что модель профессионального самоопределения молодежи в Казахстане складывается под сильным влиянием семьи при относительно низкой эффективности институциональной профориентации.

Заключение. Результаты эмпирического исследования, проведённого среди 160 студентов аграрных вузов Казахстана, подтверждают, что процесс профессионального самоопределения сельской молодежи в условиях цифровой трансформации характеризуется устойчивым доминированием семейного влияния: более 50% респондентов указали родителей как основной фактор выбора профессии. В то же время институциональные меры профориентации оказались недостаточно эффективными — лишь 6% опрошенных отметили влияние соответствующих консультативных программ.

Выбор профессии в большинстве случаев осуществляется до наступления 18-летнего возраста (64% респондентов), что свидетельствует о раннем вовлечении молодежи в процесс формирования профессиональных намерений. Это, в свою очередь, накладывает дополнительные требования на образовательные учреждения и профориентационные службы, призванные сопровождать молодежь в условиях высокой степени неопределенности и цифровых преобразований на рынке труда.

Цифровизация оказывает разнонаправленное влияние: с одной стороны, она обеспечивает расширение образовательных и карьерных возможностей, особенно для жителей сельских территорий, с другой — усугубляет существующие проявления цифрового неравенства. Несмотря на наличие доступа к онлайн-ресурсам, молодёжь недостаточно осведомлена о современных тенденциях в профессиях будущего и не в полной мере использует потенциал цифровой среды для построения индивидуальной профессиональной траектории.

Таким образом, для повышения эффективности профессионального самоопределения сельской молодежи требуется интеграция цифровых инструментов в систему профориентации, развитие навыков критического мышления и цифровой грамотности, а также институциональная поддержка раннего и осознанного выбора профессии. Особое значение приобретает необходимость создания доступной, адаптивной и персонализированной профориентационной среды, ориентированной на развитие человеческого капитала в условиях цифровой экономики.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Тамицкий А.М., Орлова Н.О. Профессиональное самоопределение молодежи: предмет изучения // Международный научно-исследовательский журнал. 2014. № 8(27), Ч. 3. С. 53–54.

2. Frenda A., Sepe E., Scippacercola S. Efficiency analysis of social protection expenditure in the Italian regions // Socio-Economic Planning Sciences. 2021. Т. 73. Ст. 100965. DOI: 10.1016/j.seps.2020.100965.

3. Елисеев Л.Т., Сабанов Р.К. Занятость молодежи в условиях дисбаланса рынка труда: региональный аспект // Спрос и предложение на рынке труда и рынке образовательных услуг регионов России: сб. докл. XI Всерос. науч.-практ. интернет-конф. (29–30 окт. 2014 г.). Кн. III. Петрозаводск: ПетрГУ, 2014. С. 115–124.

4. Харченко И.И., Арсентьева Н.М. Парадоксы профессиональной ориентации молодежи: что важнее — интересы и самореализация или потребности экономики // Социодинамика. 2019. № 12. С. 86–102.

5. Вишневская Н.Г. Конъюнктура регионального рынка труда: проблема дисбаланса профессий // Уровень жизни населения регионов России. 2016. Т. 12. № 3. С. 55–66.

6. Кязимов К.Г. Проблемы несоответствия объемов и профилей подготовки кадров потребностям современного рынка труда // Ценности и смыслы. 2014. № 2(30). С. 63–68.

7. Сабирова Р.К., Утепкалиева К.М., Курмашева С.О. Актуальные проблемы рынка труда в сельском хозяйстве Казахстана // Вестник университета «Туран». 2019. № 2. С. 67–73.

8. Koricich A., Chen X., Hughes R.P. Understanding the effects of rurality and socioeconomic status on college attendance and institutional choice in the United States // The Review of Higher Education. 2018. Т. 41. № 2. С. 281–305. DOI: 10.1353/rhe.2018.0004.

9. Дятлов С.А., Доброхотов М.А. Формы реализации человеческого капитала в цифровой экономике // Вестник СПбГЭУ. 2018. № 4(112). С. 25–28.

10. Zinich A.V., Revyakina Y.N., Feng W. Young people’s readiness for professional future in a digital economy: An international aspect // Lecture Notes in Networks and Systems. 2023. Т. 365. С. 831–839. DOI: 10.1007/978-3-031-23856-7_71.

11. Ünlü A. Mathematical self-determination theory II: Affine space representation // Journal of Mathematical Psychology. 2023. Т. 116. Ст. 102793.

12. Бирюкова С.С., Кузьминов Я.И., Овчарова Л.Н., Якобсон Л.И. Как повысить человеческий капитал и его вклад в экономическое и социальное развитие. М.: ВШЭ, 2018.

13. Бобриков В.Н. Формирование профессионального самоопределения личности через профильное обучение в системе непрерывного технического образования // Интеграция образования. 2003. Т. 1(30). С. 70–77.

14. Чистякова С.Н., Сахарова В.И. Профессиональная ориентация студенческой молодежи: страницы истории и тенденции развития // Профессиональное образование в России и за рубежом. 2017. № 4(28). С. 171–175.

15. Lisá E., Sokolová L., Jablonická P., Kardelisová L. Motivation to succeed is not enough: motivated students need to know how to plan/organize their steps on their way to success // Frontiers in Psychology. 2023. Т. 14. Ст. 1119409.

16. Reeve J., Deci E.L., Ryan R.M. Self-determination theory: a dialectical framework for understanding socio-cultural influences on student motivation // In: Mclnerney D.M., Van Etten S. (eds.) Big Theories Revisited. Greenwich, CT: Information Age Press, 2004. С. 31–60.

17. Malian I., Nevin A. Review of self-determination literature: implications for practitioners // Remedial and Special Education. 2002. Т. 23. № 2. С. 68–74. DOI: 10.1177/074193250202300202.

18. Stang K.K., Carter E.W., Lane K.L., Pierson M.R. Perspectives of general and special educators on fostering self-determination in elementary and middle schools // The Journal of Special Education. 2009. Т. 43. № 2. С. 94–106. DOI: 10.1177/0022466907313452.

19. Rashid V., Jabbarov R., Xatira N., Ibrahimova Y., Aziz Y. Directions of self-determination and professional choice in adolescents in modern times [Электронный ресурс].

20. Базаева Ф.У. Основы профессионального самоопределения молодежи // Международный научно-исследовательский журнал. 2021. № 2(104), Ч. 3. С. 95–98. DOI: 10.23670/IRJ.2021.103.2.082.

21. Korna-Opincāne E., Katane I. The concept of professional self-determination in the context of career development // Education Reform in Comprehensive School: Education Content Research and Implementation Problems. 2017. DOI: 10.17770/sie2016vol2.1422.

22. Скосырева Н., Ревякина Ю.Н., Авласович Е.М., Васюкова М.В., Агафонов А.Л. Цифровизация сельского хозяйства как драйвер профессионального самоопределения сельской молодежи // LEASECON 2020. Международная конференция «Актуальные проблемы земельной экономики и сельских территорий». Омск, 2021. С. 125–134. DOI: 10.15405/epsbs.2021.07.16.

REFERENCES

1. Tamitsky A.M., Orlova N.O. Youth professional self-determination: Subject of study issue // International Research Journal. 2014. № 8(27), Part 3. С. 53–54.

2. Frenda A., Sepe E., Scippacercola S. Efficiency analysis of social protection expenditure in the Italian regions // Socio-Economic Planning Sciences. 2021. Т. 73. Ст. 100965. DOI: 10.1016/j.seps.2020.100965.

3. Eliseev L.T., Sabanov R.K. Youth employment in conditions of labor market imbalance: regional aspect // Demand and Supply in the Labor Market and the Market of Educational Services in Russian Regions: Collection of Reports of the XI All-Russian Scientific-Practical Internet Conference (29–30 October 2014). Book III. Petrozavodsk: PetrSU, 2014. С. 115–124.

4. Kharchenko I.I., Arsentieva N.M. Paradoxes of youth professional orientation: what is of top priority—Interests and self-realization or needs of the economy // Sociodynamics. 2019. № 12. С. 86–102.

5. Vishnevskaya N.G. Conjuncture of the regional labor market: the problem of professions imbalance // Living Standards of the Population in the Regions of Russia. 2016. Т. 12. № 3. С. 55–66.

6. Kyazimov K.G. Problems of imbalance of volumes and profiles for personnel training with the needs of the modern labor market // Values and Meanings. 2014. № 2(30). С. 63–68.

7. Sabirova R.K., Utepkalieva K.M., Kurmasheva S.O. Actual problems of the labor market in the agriculture of Kazakhstan // Turan University Bulletin. 2019. № 2. С. 67–73.

8. Koricich A., Chen X., Hughes R.P. Understanding the effects of rurality and socioeconomic status on college attendance and institutional choice in the United States // The Review of Higher Education. 2018. Т. 41. № 2. С. 281–305. DOI: 10.1353/rhe.2018.0004.

9. Dyatlov S.A., Dobrokhotov M.A. Forms of human capital implementation in the digital economy // SPbSEU Review. 2018. № 4(112). С. 25–28.

10. Zinich A.V., Revyakina Y.N., Feng W. Young people's readiness for professional future in a digital economy: An international aspect // Lecture Notes in Networks and Systems. 2023. Т. 365. С. 831–839. DOI: 10.1007/978-3-031-23856-7_71.

11. Ünlü A. Mathematical self-determination theory II: Affine space representation // Journal of Mathematical Psychology. 2023. Т. 116. Ст. 102793. DOI: 10.1016/j.jmp.2023.102793.

12. Biryukova S.S., Kuzminov Ya.I., Ovcharova L.N., Jacobson L.I. How to increase human capital and its contribution to economic and social development. Moscow: HSE, 2018.
13. Bobrikov V.N. Formation of professional self-determination of an individual through specialized training within the continuous technical education system // Integration of Education. 2003. T. 1(30). C. 70–77.
14. Chistyakova S.N., Sakharova V.I. Professional orientation of student youth: the pages of history and development trends // Professional Education in Russia and Abroad. 2017. № 4(28). C. 171–175.
15. Lisá E., Sokolová L., Jablonická P., Kardelisová L. Motivation to succeed is not enough: motivated students need to know how to plan/organize their steps on their way to success // Frontiers in Psychology. 2023. T. 14. Ст. 1119409. DOI: 10.3389/fpsyg.2023.1119409.
16. Reeve J., Deci E.L., Ryan R.M. Self-determination theory: a dialectical framework for understanding socio-cultural influences on student motivation // In: Mclnerney D.M., Van Etten S. (eds.) Big Theories Revisited. Greenwich, CT: Information Age Press, 2004. C. 31–60.
17. Malian I., Nevin A. Review of self-determination literature: implications for practitioners // Remedial and Special Education. 2002. T. 23. № 2. C. 68–74. DOI: 10.1177/074193250202300202.
18. Stang K.K., Carter E.W., Lane K.L., Pierson M.R. Perspectives of general and special educators on fostering self-determination in elementary and middle schools // The Journal of Special Education. 2009. T. 43. № 2. C. 94–106. DOI: 10.1177/0022466907313452.
19. Rashid V., Jabbarov R., Xatira N., Ibrahimova Y., Aziz Y. Directions of self-determination and professional choice in adolescents in modern times [Электронный ресурс]. URL: https://www.researchgate.net/publication/377029872_TITLE_Directions_of_self-determination_and_professional_choice_in_adolescents_in_modern_times (дата обращения: 30.01.2024).
20. Bazaeva F.U. Fundamentals of youth professional self-determination // International Research Journal. 2021. № 2(104), Part 3. C. 95–98. DOI: 10.23670/IRJ.2021.103.2.082.
21. Korna-Opincāne E., Katane I. The concept of professional self-determination in the context of career development // Education Reform in Comprehensive School: Education Content Research and Implementation Problems. 2017. DOI: 10.17770/sie2016vol2.1422.
22. Skosyreva N., Revyakina Yu.N., Avlasovich E.M., Vasyukova M.V., Agafonov A.L. Digitalization of agriculture as a driver for professional self-determination of rural youth // In: LEASECON 2020. International Conference «Land Economy and Rural Studies Essentials». Omsk, 2021. C. 125–134. DOI: 10.15405/epsbs.2021.07.16.

ТҮЙІН

Мақалада цифрлық трансформация жағдайында ауыл жастарының кәсіби өзін-өзі анықтау мәселесі қарастырылады. Тақырыптың өзектілігі еңбек нарығының өзгермелі талаптарына және цифрлық экономиканың сын-тегеуріндеріне бейімделу мақсатында кәсіби бағдар беру жүйесін жаңартудың қажеттілігімен түсіндіріледі. Қазақстанның аграрлық жоғары оқу орындарының студенттері арасында жүргізілген социологиялық сауалнама нәтижелері бойынша мамандық таңдауға әсер ететін негізгі факторлар анықталып, кәсіби траекторияларды қалыптастырудағы цифрлық ортаның рөлі бағаланды. Зерттеу нәтижелері кәсіби таңдау үдерісіне ең үлкен ықпалды отбасы жасайтынын, ал институционалдық кәсіби бағдар беру тетіктерінің тиімділігі шектеулі екенін көрсетеді. Цифрландыру, бір жағынан, жастардың ақпарат пен білім беру ресурстарына қолжетімділігін кеңейтсе, екінші жағынан, әсіресе ауылдық жерлерде

цифрлық теңсіздікті күшейтеді. Жас ұрпақтың кәсіби өзін-өзі анықтауын қолдауда цифрлық құзыреттерді, сыни ойлауды және жеке саналылықты дамытуға негізделген кешенді тәсілдің қажеттігі туралы қорытынды жасалды.

ӘОЖ: 378.147
ҒТАМР: 14.35.07

Амангалиев Т.Г., ауыл шаруашылығы ғылымдарының кандидаты, аға оқытушы, запастағы подполковник, https://orcid.org/0000-0001-9138-3059
КеАҚ «Жәңгір хан атындағы Батыс Қазақстан аграрлық-техникалық университеті», Орал қаласы, Жәңгір хан көшесі 51, 090009, Қазақстан, tlegenag@mail.ru

Amangaliyev T.G., Candidate of Agricultural Sciences, senior lecturer, Reserve lieutenant colonel, https://orcid.org/0000-0001-9138-3059
Zhangir Khan West Kazakhstan Agrarian and Technical University, 51 Zhangir Khan Str., Uralsk, Kazakhstan, tlegenag@mail.ru

ӘСКЕРИ ПӘНДІ ОҚЫТУ ҮДЕРІСІНДЕ ТӘРТІПТІК ТӘЖІРИБЕНІ ҚОЛДАНУ

APPLICATION OF DISCIPLINARY PRACTICE IN THE PROCESS OF TEACHING A MILITARY DISCIPLINE

АННОТАЦИЯ

Әскери пәндерді оқыту үдерісінде тәртіптік тәжірибені қолдану – студенттердің кәсіби дайындық деңгейін көтеру үшін маңызды құрал болып табылады. Бұл мақалада алғашқы әскери дайындық бағдарламасымен оқитын студенттерге тәртіптік тәжірибені тиімді енгізудің әдіс-тәсілдері мен маңызы қарастырылады. Тәртіптік тәжірибені оқыту үдерісіне енгізу студенттерді моральдық және психологиялық тұрғыдан дайындап, олардың мінез-құлықтарын өзгертеді. Әскери пәндерді оқытудың тиімді әдістері, тәртіптілік дағдыларын қалыптастыру жолдары мен әдістері талқыланады.

ANNOTATION

Discipline practice in the process of teaching military subjects is an essential tool for enhancing students' professional preparation. This article explores the methods and significance of effectively incorporating discipline practice for students enrolled in the initial military training program. Introducing discipline practice into the teaching process helps prepare students both morally and psychologically, changing their behavior. The article discusses effective methods of teaching military subjects, ways, and techniques of forming discipline skills.

Түйін сөздер: *алғашқы әскери дайындық, тәртіптік тәжірибе, әскери пәндер, студенттер, жауапкершілік, әскери тәртіп, көтермелеулер, жазалар, қызметтік карточка, оқыту үдерісі.*

***Keywords**: initial military training, discipline practice, military subjects, students, responsibility, military discipline, rewards, penalties, service record, teaching process.*

Кіріспе. Қазіргі таңда Қазақстанның жоғарғы оқу орындарында әскери пәндерді оқыту үдерісі студенттерге кәсіби тұрғыдан дайындық берумен қатар, олардың моральдық және психологиялық тұрғыда қалыптасуына үлкен мән береді. Әскери қызметке қажетті басты талаптардың бірі – тәртіп. Әскери тәртіп студенттің жеке

қасиеттерінің қалыптасуына ықпал етіп, оның әскери қызметке деген көзқарасын айқындайды. Осыған орай, алғашқы әскери дайындық бағдарламасымен оқитын студенттерге тәртіптілік пен жауапкершілік дағдыларын қалыптастыру қажеттілігі туындайды.

Әскери пәндерді оқыту үдерісінде тәртіптік тәжірибені қолданудың маңызы көптеген зерттеушілердің еңбектерінде қарастырылған. Әскери тәртіп студенттердің моральдық және кәсіби дайындықтарын арттырады.

Төмендегі авторлар:

Әскери пәндерді оқыту әдістемесін зерттеп, тәртіптілік пен жауапкершілік дағдыларының қалыптасуы үшін қажетті оқу құралдарын ұсынады [1]. Әскери тәртіптің психологиялық аспектілерін зерттей отырып, тәртіптіліктің студенттердің мінез-құлқына әсерін қарастырады [2].

Әскери білім беру жүйесінің ерекшеліктерін талдай отырып, тәртіптілік дағдыларын дамытудағы оқу әдістемелерін ұсынады [3]. Әскери қызметкерлердің тәртіптік тәжірибесін дамыту әдістерін қарастырады, бұл студенттерді кәсіби тұрғыда даярлау үшін маңызды болып табылады [4].

Әскери тәртіптің психологиялық әсерін зерттей отырып, тәртіптілік дағдыларын қалыптастыру жолдарын көрсетеді [5].

Әлеуметтік және кәсіби аспектілер тұрғысынан әскери тәртіптің маңыздылығын зерттеп, жеке тұлғаның қалыптасуындағы рөлін талдайды [6]. Әскери оқу үдерісіндегі тәртіптілік тәжірибесін қолданудың әдіс-тәсілдерін зерттейді [7].

Әскери қызметтің психологиясына арналған еңбегінде, тәртіптілік пен психологиялық тұрақтылықтың маңыздылығын айқындайды [8]. «Әскери педагогика негіздері» атты зерттеуінде әскери пәндерді оқыту әдіснамаларын қарастырады [9].

Әскери оқу орындарында тәртіптілікті дамытуда оқу әдістемесінің рөлін зерттейді [10]. Әскери тәртіптің психологиясын зерттеп, әскери қызметке бейімдеудегі тәртіптіліктің маңызын көрсетеді [11].

Өз еңбегінде әскери мамандарды дайындауда тәртіптіліктің әсерін қарастырады [12]. Әскери пәндерді оқытуда тәртіптік тәжірибені қолдану әдістерін ұсынады [13]. Әскери оқу орындарында тәртіптілік тәжірибесін енгізудің тиімділігін зерттейді [14].

Әскери оқу орындарында оқыту үдерісінде тәртіптілік тәжірибесін енгізу студенттердің жеке тұлғалық қасиеттерін дамытуға, оларды әскери қызметке даярлауға бағытталған негізгі құрал болып табылады. Тәртіптілік тәжірибесін қолдану арқылы студенттердің моральдық-психологиялық жағдайы жақсарып, олар командалық жұмысқа дағдыланады.

Бұл мақалада әскери емес жоғары оқу орнының алғашқы әскери дайындық бағдарламасымен оқитын студенттерге тәртіптік тәжірибені қолданудың әдістері мен тиімділігін талдау мақсатында зерттеу жүргізілді.

Зерттеу мақсаты – алғашқы әскери дайындық бағдарламасымен оқитын студенттерге тәртіптік тәжірибені енгізу арқылы олардың әскери қызметке, алғашқы әскери дайындық пәнінің мұғалімі дайындығын арттырудың тиімді жолдарын анықтау.

Зерттеу материалдары мен әдістері. Зерттеу барысында Жәңгір хан атындағы Батыс Қазақстан аграрлық-техникалық университетінің 6В01401-«Бастапқы әскери дайындық және дене шынықтыру» білім беру бағдарламасымен білім алушы 1-курстың НВП-11 тобының 21 студенттеріне оқу орындарында жүргізілген педагогикалық зерттеулер мен тәжірибелер негізінде алынған деректер қолданылды. Сонымен қатар, студенттер арасында сауалнама жүргізу, бақылау және салыстырмалы талдау әдістері пайдаланылды. Зерттеу әдістері студенттердің тәртіптілік деңгейін бағалау, олардың әскери қызметке дайындығы мен мінез-құлқындағы өзгерістерді анықтауға бағытталған.

Зерттеу барысында қолданылған әдістер мен құралдар студенттерге тәртіптілік дағдыларын қалай тиімді жеткізуге болатынын айқындауға көмектесті. Сонымен қатар, тәртіптілік тәжірибесін оқыту үдерісінде қолдану студенттердің жеке қасиеттерін, психологиялық тұрақтылығын және моральдық тәртібін қалыптастыруға ықпал етеді.

Зерттеу нәтижелері. Бір оқу тобының 1 взвод көлеміндегі 21 студентті оқу жылының басында 3 бөлімшеге бөлдім: 1-бөлімшеге – 7 студент, 2-бөлімшеге – 7 студент және 3-бөлімшеге – 7 студент. Әрбір бөлімшеге 3 бөлімше командирлері, ал взводқа басшылық жасауға 1 взвод командирі шартты түрде тағайындалды.

Студенттерге оқу үдерісіндегі сабақтарда Тәртіптік жарғының жалпы ережелері, әскери тәртіп, тәртіптік жауапкершілік, тәртіптік жаза, көтермелеулер, қызметтік карточка, әскери тәртіпті ұстау мақсатында командирлер мен бағыныстылардың міндеттері, тәртіптік құқықтары, қолданылатын көтермелеулер мен жазалар, оларды қолдану тәртібі, теріс қылықтар мен жазалар, жауапкершілікке тарту тәртібі, жазаларды жариялау, алу, көтермелеулер мен жазаларды есепке алу, тәртіптік жауапкершілікке тарту кезіндегі құқықтарының кепілдіктері оқытылып түсіндірілді.

Оқу үдерісінде студенттердің алған білімдерін бекіту, әскери тәртіпті сақтау, нығайту, тәртіптік тәжірибені енгізуді пилоттық жоба ретінде байқап көру үшін 2024-2025 жылының 1-семестріндегі оқу үдерісінде Қазақсан Республикасы Қарулы Күштерінің Жалпыәскери жарғылары пәнінің 5-модулі «Тәртіптік жарғы» тақырыбы, 1 кредитке, әрбір студентке «Тәртіптік жарғының» 2-қосымшасына ұқсастырып есептілік құжат «Қызметтік карточка» ашылды [15].

Тәртіптік жарғыға
2-қосымша

Беткі жағы

ҚЫЗМЕТТІК КАРТОЧКА

Жәңгір хан атындағы Батыс Қазақстан аграрлық-техникалық университеті

НВП-11 оқу тобы

1. Лауазымы: студент
2. Тегі,аты,әкесінің аты Болатов Болат Болатұлы
3. Оқу орнында қай жылдан бастап: 2024 жылдың 1 қыркүйегінен

КӨТЕРМЕЛЕУЛЕР

Не үшін	Көтермелеу түрі	Қашан қолданылды	Кім көтермеледі	Оған қатысты көтермелеу қолданылған адамның қолы
Жарияланылған көтермелеулермен таныстым				

Сыртқы жағы

ЖАЗАЛАР

Теріс қылықтың қысқаша сипаттамасы	Теріс қылық қашан жасалды	Жазаның түрі	Қашан қолданылды	Жазаны кім берді	Қашан алынды (кім немесе мерзімінің өтуі бойынша)	Оған қатысты жаза қолданылған адамның қолы
Қолданылған жазалармен таныстым						

Сәйкесінше студенттерге көтермелеулер ретінде:

1) бұрын қолданылған жазаны алып тастау;

2) алғыс жариялау;

3) ата-анасына, туыстарына үлгілі тәртібі мен оқудағы үздік білімі туралы хабарлау.

Ал жазалар ретінде:

1) ескерту;

2) сөгіс;

3) қатаң сөгіс.

Не үшін жазаланатыны (студенттерде жиі байқалатын):

1) сабаққа себепсіз кешіккені үшін;

2) сабаққа дайындықсыз келгені (оқу құралдарының жоқ болуы) үшін;

3) берілген сабақ тапсырмаларын орындамағаны үшін;

4) әскери киім нысанын бұзғаны үшін;

5) жеке басының гигиенасын сақтамағаны үшін;

6) тәртіпсіздігі үшін критерийлер таңдап алынды.

Жоғарыда таңдап алған критерийлер оқу тобының студенттерінің қаперіне салынды. Сонымен қатар, студенттерге семестр соңында, емтихан тапсыру кезінде емтихан бағасына әрбір көтермелеу үшін шартты түрде 5 балл қосылатыны, ал әрбір жаза алғаны үшін шартты түрде 5 балл төмендетілетіні ескертілді.

Семестр соңында, емтихан тапсыруды қоса есептегенде, оқу тобынан тәртіптік көтерменленген – 1 студент (4%), жазаланған – 10 студент (47%). Соның ішінде, жазаланған: 1 рет – 5 студент, 2 рет – 3 студент, 3 рет – 1 студент, 4 рет – 1 студент.

Көтермелеулер:

Бөлімшелер бойынша: 1- бөлімшеде – жоқ, 2- бөлімшеде – жоқ, 3 - бөлімшеде – 1.

Жазалар:

Бөлімшелер бойынша: 1- бөлімшеде – 4, 2- бөлімшеде – 3, 3 - бөлімшеде – 3.

Орындарға бөлсек: 1-орынды - 3 бөлімше, 2-орынды – 2 бөлімше және 3-орынды – 1 бөлімше иеленді.

Студенттер арасында сауалнама жүргізу барысында төмендегідей сұрақтар қойылыды:

1.Әскери пәнді оқытуда студентке тәртіптік карточка ашып, көтермелеулер мен жазалар қолданған дұрыс па?

2.Көтермеленген жағдайдағы Сіздің алған әсеріңіз?

3.Жазаланған жағдайдағы Сіздің алған әсеріңіз?

1-сұрақ бойынша студенттерден тәртіптік карточка ашуға қарсылық білдірілетін жауаптар күтілді. Кім жазаланғанды тәуір көреді? Себебі жазаланғандар 47%-ды құрайды. Керісінше, 100 % тәртіптік карточка ашу дұрыс деген жауаптар алынды.

2-сұрақ бойынша көтермелеудің оң әсер беретінін, оқу үлгеріміне, тәртібінің жоғары деңгейде болуына ынталандырылатын жауап алынды.

3-сұрақ бойынша жаза алғандар, алған жазаларының әділ екенін, қателіктер өз тараптарынан болғанын, алдағы уақыттарда тәртіп бұзбауға тырысатындары, оның үстіне оқу үлгерімдеріне әсері бар болса, үлгілі болуға бет бұру керектігі туралы жауаптар түсті.

Сонымен қатар, бірде бір көтермеленбеген немесе жазаланбаған студенттерге: көтермеленген немесе жазаланған кезде Сіз қандай күйде болар едіңіз? - деген сауал тасталды. Олардан алынған жауаптарда: маған мотивация береді, сабақ үлгеріміме және жеке бас тәртібіме басқаша көзқараспен қарауға, жақсы жаққа ұмтылуға, ауызша айтқаннан, жазбаша әсер ететінін, жетістігін көруге септігі бар екенін, әскери тәртіпке

үйренуге ынталандыратынын, өз бөлімшесінің алдыңғы қатарда болуына ықпалы барын және т.б. оң көзқарастар байқалды.

Зерттеу нәтижелері алғашқы әскери дайындық бағдарламасымен оқитын студенттерге тәртіптік тәжірибені енгізудің келесі нәтижелерге әкелетінін көрсетті:

Тәртіптілікті қалыптастыру – тәртіптік тәжірибе студенттерді уақытты дұрыс пайдалану, жауапкершілікті сезіну және міндеттерді орындауда жоғары нәтижелерге жетуге баулиды.

Психологиялық тұрақтылық – студенттердің психологиялық дайындық деңгейі артып, олар түрлі қиындықтар мен стресс жағдайларына төзімді бола бастайды. Бұл әскери қызметтің талаптарына сай болу үшін өте маңызды.

Ұжымдық жұмысқа бейімдеу – тәртіптілік тәжірибесі студенттердің топта жұмыс істей алу дағдыларын дамытады. Ұжымдық жұмыстың маңыздылығын түсіну олардың командалық рухын қалыптастырады.

Әскери тәртіпке бейімдеу – тәртіптік тәжірибе студенттердің әскери қызметке деген көзқарасын өзгертіп, оларды моральдық тұрғыдан дайындайды.

Құқықтық тәртіп – әскери пәндердегі тәртіптілік тәжірибесі студенттерді әскери құқықтар мен міндеттер туралы түсінікпен қамтамасыз етеді.

Қорытынды. Зерттеу нәтижелері алғашқы әскери дайындық бағдарламасымен оқитын студенттерге тәртіптік тәжірибені енгізу олардың кәсіби және психологиялық тұрғыдан дайындығын арттыратынын көрсетті. Тәртіптілік дағдылары студенттерге әскери қызметке қажетті мінез-құлықты қалыптастыруға ықпал етеді. Әскери тәртіп пен жауапкершілік негізінде оқу үдерісін ұйымдастыру студенттердің психологиялық және физикалық тұрғыдан дайын болуына жағдай жасайды. Әскери пәндерді оқыту үдерісінде тәртіптік тәжірибені қолдану – болашақ алғашқы әскери дайындық пәні мұғалімдерінің мінез-құлқы мен кәсіби біліктілігін арттырудың маңызды құралы болып табылады.

ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

1. Жолдасбеков, М.Ж. (2020). Әскери пәндерді оқыту әдістемесі. Алматы: Қазақстан Республикасы Ұлттық академиялық баспасы, 250 бет

2. Әбдірахманов, С.Е. (2019). Әскери тәртіп және әскери қызметкердің психологиялық дайындығы. Астана: Қарулы Күштер академиясы, 180 бет

3. Құнанбаев, А. (2017). Әскери білім берудің негіздері мен ерекшеліктері. Шымкент: Қорғаныс министрлігінің баспасы, 210 бет

4. Жұмабеков, Т.Қ., & Ерғалиев, С.Н. (2018). Әскери қызметкерлердің тәртіптік тәжірибесін дамыту әдістері. Алматы: Жоғары әскери оқу орнының баспасы, 230 бет. – Оқу құралы.

5. Махмұтов, Б.М. (2016). Әскери тәртіп және оның психологиялық аспектілері. Талдықорған: «Қорғаныс және қауіпсіздік» баспасы, 200 бет

6. Махмудова, Г.Т. (2015). Әскери тәртіптің әлеуметтік және кәсіби аспектілері. Астана: Көпшілік баспа, 190 бет

7. Өмірбеков, Б.Ш., & Ақбергенов, Қ.К. (2019). Әскери оқу үдерісіндегі тәртіптік тәжірибені қолдану. Астана: Қазақстандық педагогика академиясы, 220 бет

8. Сатыбалдиев, А.С. (2018). Әскери қызметтің психологиясы. Алматы: Жоғары оқу орындарының баспасы, 160 бет

9. Есбергенов, А.Қ., & Жұмабеков, М.М. (2017). Әскери педагогика негіздері. Алматы: Қорғаныс министрлігі баспасы, 240 бет

10. Жолымбетова, Л.К. (2017). Әскери оқу орындарындағы тәртіптілік: теория және практика. Астана: Ұлттық университет баспасы, 220 бет

11. Омарова, Ж.Т. (2018). Әскери тәртіптің оқыту әдістері. Алматы: Педагогика ғылымдары институты, 230 бет

12. Құрманғалиева, М. (2016). Әскери мамандарды дайындау және тәртіптің психологиясы. Шымкент: Қорғаныс министрлігі, 200 бет. – Оқу әдістемелік құрал.

13. Нұрмаханов, К.А. (2017). Әскери пәндерді оқытудағы тәртіптік тәжірибе. Алматы: Арнайы баспа, 250 бет

14. Бекмағамбетов, Ә.С. (2015). Әскери оқу орындарында тәртіптілік тәжірибесін енгізу әдістері. Астана: Қорғаныс министрлігі баспасы, 210 бет

15. «Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерінің, басқа да әскерлері мен әскери құралымдарының жалпыәскери жарғыларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің 2007 жылғы 5 шілдедегі № 364 Жарлығы.

REFERENCES

1. Zholdasbekov, M.Zh. (2020). Methods of Teaching Military Subjects. Almaty: National Academic Publishing House of the Republic of Kazakhstan, 250 pages

2. Abdyrahmanov, S.E. (2019). Military Discipline and the Psychological Preparation of the Military Personnel. Astana: Military Academy of the Armed Forces, 180 pages

3. Kunanbayev, A. (2017). Fundamentals and Features of Military Education. Shymkent: Ministry of Defense Publishing House, 210 pages

4. Zhumabekov, T.K., & Ergaliev, S.N. (2018). Methods for Developing the Disciplinary Experience of Military Personnel. Almaty: Higher Military Educational Institution Publishing House, 230 pages

5. Makhmutov, B.M. (2016). Military Discipline and Its Psychological Aspects. Taldykorgan: "Defense and Security" Publishing House, 200 pages

6. Makhmudova, G.T. (2015). The Social and Professional Aspects of Military Discipline. Astana: Public Publishing House, 190 pages

7. Omirbekov, B.Sh., & Akbergenov, K.K. (2019). Applying Disciplinary Experience in the Military Educational Process. Astana: Academy of Pedagogical Sciences of Kazakhstan, 220 pages

8. Satybaldiyev, A.S. (2018). Psychology of Military Service. Almaty: Publishing House of Higher Educational Institutions, 160 pages

9. Esbergenov, A.K., & Zhumabekov, M.M. (2017). Fundamentals of Military Pedagogy. Almaty: Ministry of Defense Publishing House, 240 pages

10. Zholymbetova, L.K. (2017). Discipline in Military Educational Institutions: Theory and Practice. Astana: National University Publishing House, 220 pages

11. Omarova, Z.T. (2018). Teaching Methods for Military Discipline. Almaty: Institute of Pedagogical Sciences, 230 pages

12. Kurmangalieva, M. (2016). Training Military Personnel and the Psychology of Discipline. Shymkent: Ministry of Defense Publishing House, 200 pages

13. Nurmakhanov, K.A. (2017). Applying Disciplinary Experience in the Teaching of Military Subjects. Almaty: Specialized Publishing House, 250 pages

14. Bekmagambetov, A.S. (2015). Methods of Implementing Disciplinary Experience in Military Educational Institutions. Astana: Ministry of Defense Publishing House, 210 pages

15. "Decree of the President of the Republic of Kazakhstan No. 364 dated July 5, 2007, on Approving the General Military Regul

РЕЗЮМЕ

Применение дисциплинарной практики в процессе обучения военным дисциплинам является важным инструментом повышения уровня профессиональной подготовки студентов. В статье рассматриваются методы и значение эффективного внедрения дисциплинарной практики для студентов, обучающихся по программе начальной военной подготовки. Введение дисциплинарной практики в учебный процесс

помогает подготовить студентов морально и психологически, изменяя их поведение. Обсуждаются эффективные методы преподавания военных дисциплин, способы и методы формирования дисциплинарных навыков.

УДК: 378.147
ҒТАМР: 14.35.07

Байдалиев К.А., педагогика ғылымдарының кандидаты, доцент, https://orcid.org/0000-0002-3180-2247
КеАҚ «Жәңгір хан атындағы Батыс Қазақстан аграрлық-техникалық университеті», Орал қаласы, Студенттер көшесі 3, e-mail: baj-kuatbek@mail.ru

Baydaliev K.A., Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor, https://orcid.org/0000-0002-3180-2247
NJSC "West Kazakhstan Agrarian and Technical University named after Zhangir Khan",Uralsk, Studencheskaya street 3, e-mail: baj-kuatbek@mail.ru

МЕКТЕПТЕГІ ТӘЖІРИБЕЛІ БАҒДАРЛЫ САБАҚТАР – БІЛІМ АЛУШЫЛАРДЫҢ ОЗЫҚ КӘСІБИ ДАҒДЫЛАРЫН ДАМЫТУ ФОРМАСЫ

SCHOOL-BASED PRACTICAL TRAINING LESSONS – A FORM OF DEVELOPING ADVANCED PROFESSIONAL SKILLS IN LEARNERS

АҢДАТПА

Болашақ педагогтарды кәсіби еңбегіне даярлау барысында олардың кәсіби білімі мен дағдыларын үдемелі және қарқынды қалыптастырудың замануи сабақты ұйымдастырудың формасы – тәжірибелі бағдарлы сабақтардың ұтымдылығын қарастырған. Зерттеудің мақсаты тәжірибелік бағдарлы сабақтарды мектептің пәндік шынайы үдерістерге жүргізе білім алушылардың озық кәсіби дағдыларын қалыптастырудың ұйымдастыру және әдістемелік жағдайларын тәжірибеде тексеру болып табылған. Педагогикалық тәжірибеде білім алушылардың озық кәсіби дағдыларын қалыптасу деңгейі өлшемшартын жасап, бақылаулар, сауалнамалар жүргізілген. Олардың мәліметтерін өңдеу нәтижесінде білім алушылардың озық кәсіби дағдыларын қалыптастырудың тиімділігіне дәлел бола алатын тәжірибелік топтағы сыналушылардың алғашқы және соңғы бақылауларда алынған көрсеткіштердің арасындағы айырмашылық сенімділігі мен өзара тәуелді байланыстылығының мәндері жағымды сипатта болғанын көрсеткен. Сонымен бірге, білім алушылардың тәжірибелік бағдарлы сабақтардың ұтымдылығы туралы рефлексиялық сауалнама сұрақтарына берген жауаптарында шынайы оқу үдерісі барысында танымдық әрекеттерді орындау, оларға рефлексия жасау, жоспарлау құжаттарын оқып, үйреніп, үлгілі сабақтар өткізіп үйренудің озық кәсіби дағдыға үйренудің тиімді құралы екендігін анықтаған.

ANNOTATION

The study examined the rationality of practical-oriented lessons as a modern form of organizing lessons for the progressive and intensive formation of professional knowledge and skills of future teachers in the process of preparing them for professional work. The purpose of the study was to verify in practice the organizational and methodological conditions for the

formation of advanced professional skills of students by conducting practical-oriented lessons in real subject processes of the school. In pedagogical practice, criteria were created for the formation of advanced professional skills of students, observations and surveys were conducted. As a result of processing their data, it was shown that the difference between the indicators obtained in the first and last observations of the experimental group, which can serve as evidence of the effectiveness of the formation of advanced professional skills of students, was positive in terms of reliability and interdependence. At the same time, in the responses of students to the questions of the reflective survey on the rationality of practical-oriented lessons, it was determined that performing cognitive actions during the real learning process, reflecting on them, reading and learning planning documents, and conducting exemplary lessons are effective means of acquiring advanced professional skills.

Түйін сөздер: *білім, іскерлік, озық кәсіби дағды, оқыту әдісі, оқыту түрі, кәсіби оқыту, тәжірибеге бағдарлы сабақ.*

Keywords: *knowledge, business, advanced professional skills, teaching method, type of teaching, professional training, practice-oriented teaching.*

Кіріспе. Қоғамдық қатынастардағы өзгерістер аясындағы туындаған қажеттіліктер мен сұраныстарды қанағаттандыруға білім беру саласында жас педагогтарды даярлауға басымдылық міндеттер қойылып, соны орындауға мемлекет тарапынан білім беру сапасын жақсартуға үздіксіз инновациялық үлесін арттыруға бағытталған замануи инклюзивті білім беру ортасының формаларын, білім беру мазмұнын және оқыту құралдарын, оқыту нәтижелерін зерттеп, тәжірибеге материалдандыру кеңінен орын алып келеді. Пәндік педагогтарды даярлауға бағытталған замануи білім беру ортасын құру тәжірибесінде педагогика ғылымы дәстүрлі білім берудің формаларын замануи білім беруде сабақтастығын бұзбай, сақтап, олардың дидктикалық құндылықтарын алға тарта, кемшіліктерін жоюға, толықтыруға, жетілдіруге замануи оқытудың талаптарын қанағаттандыруға ізденіс, зерттеулер жасау қажеттіліктен туындап отыр.

Кеңестік педагогика ғылымында зерттелген сабақты ұйымдастырудың формаларына кез-келген білім беру деңгейлерінде оқытуды ұйымдастыру формалары басым ортақ болып, өздерінің дидактикалық міндеттерін орындап келді. Жоғары оқу орындарында педагогикалық мамандарды даярлаудың кең, тұрақты сақталып келген оқытуды ұйымдастырудың формалары: дәріс, семинар, тәжірибелік сабақтар, зертханалық сабақтар, саяхат, практикум, оқу, кәсіби саламандар, дипломдық жұмыстар орындау, емтихан, сынақ болып табылды [1].

Оқытудың ұйымдастырудың формалары өздерінің дидактикалық қызметтерін орындаудың басты белгілері оқу курстары бойынша білім алушылардың кәсіби білімі мен іскерліктерін қалыптастырумен шектелді. Білім беру мазмұны ұзақ өзгеріссіз стандартты сақталып, оларды игертудің оқыту құралдары оқу процесінде тұрақты орын алып, жаңа түрлерін педагогикалық зерттеу жетістіктерімен толықтырылып келді. Сол сияқты мұғалімдерді даярлауға арналған білім беру мазмұны, оқыту құралдары жалпы орта мектептің пәндік білім беру мазмұнымен жанасып, оқыту құралдары да ұқсас орын алды. Бірақ, пән мұғалімдерін даярлау жоғары оқу орындарының оқу үдерісі мектептің шынайы оқу үдерісінен оқшау, тұйық, тәжірибелік сабақтары «имитациялық», «зертханалық» сипатта жүріп отырды. Оқытуды ұйымдастырудың формалары болашақ пән мұғалімінің кәсіби теориялық білімін қалыптастырып, оны кәсіби іскерліне баулумен шектелді. Іскерлік ұғымы педагогикалық сөздіктерде, теориялық білімдерін тәжірибеде қолдануға дайындығын сипаттайды [2]. Ол кәсіби еңбегін сәтті орындап кетуіне толық кепіл беруге әлеуеті жеткілікті бола бермеді. Өйткені, іскерліктің сипаты әрекеттерді бірнеше рет қайталап тәжірибелеу, жаттығудың нәтижесінде еріксіз

(автоматтандырылған) әрекеттерді білім алушылар дағдылану деңгейіне қол жеткізе алады [3]. Бұл кәсіби дағдылар дәстүрлі білім беруде басым пәндік оқу курстарында кең орын алу жиі байқалса, психологиялық, педагогикалық, дидактикалық курстарды жеткілікті қалыптасуын мүмкіндікке қол жеткізу күдікті сақталды. Пәндік мұғалімдерді даярлаудың нормативтік құжаттарында осы аталған кәсіби білім, іскерлікке, дағдыларға баулу басты өлшемшарт болып анықталып отыруында болды. Оның соңғы өлшемшарты толығымен өз мәртебесін тәжірибеде бейнеленуі ықтималды сипатта болып келді.

Қазіргі таңда қоғамдық қатынастардың жас мамандарға қажеттілігі мен сұранысы – жас педагогтар өндірістегі жасалған өнім сияқты, сынақ мерзімі, жеңілдік жоқ, тұрмыстағы техникалардың қызметіне ұқсас, бірден өзінің барлық зияттық ресурстары мен әлеуетін қолдануға дайын болуы қисынды. Яғни, барлық кәсіби білімі мен біліктерін дағды сипатында саналы, кәсіби еңбектің қызметтерін еріксіз, әдетке айналған бейнелерін тәжірибелеп, өнімді және шығармашылықта түрлендіру әрекеттерді жүзеге асыра алатын зияттық ресурсы мен әлеуетінің болуы қоғамдық қажеттіліктен туындап отыр.

Педагогикалық бағыттағы болашақ пән мұғалімдерін даярлау аясындағы жоғарыдағы педагогикалық мәселелер **зерттеудің қайшылықтарын** құруға негіз болды:

- болашақ пән мұғалімдерін даярлаудағы қоғамдық қажеттіліктер мен оны қанағаттандыруға оқу орнының зияттық және материалдық әлеуетінің үйлесімділігімен сәйкес келмеуі;
- білім алушыларға дәстүрлі кәсіби білім мен іскерліктерді қалыптастыру ұстанымдарының қатаң сақталуы мен озық кәсіби дағдыларды қалыптастыруға бағытталған оқытуды ұйымдастырудың ұтымды тұрғыларын, технологияларын, формаларын оқу үдерісіне белсенді енгізілмеуі арасында;
- білім алушылардың оқу үдерісіндегі тәжірибелік сипаттағы сабақтарда дәстүрлі оқыту әдістерінің қатаң орнығуы мен олардың бойына озық кәсіби дағдыларды қалыптастыруға бағытталған өнімді, тиімді, интерактивті, белсенді оқыту түрлерін, әдістерін қолданудың тұрақты орын алмауы арасында.

Олай болса, жоғары оқу орындарында пән мұғалімдерін кәсіби еңбекке даярлау үдерісі озық сипатта жүру мүмкіндіктерін, тұрғыларын, технологияарын, формаларын, әдістері мен құралдарын, оның тиімділігін анықтаудың өлшемшарттарын педагогика ғылымы ізденіс, зерттеу жүргізуде. Олардың нәтижесі педагогикалық тәжірибеде, соның ішінде кәсіби білім беру мектептерінде тәжірибелеп келеді. Міне, осы мәселені біздің зерттеуіміздің мақсаты ретінде тәжірибелік бағдарлы сабақтардың білім алушылардың озық кәсіби дағдыларының қалыптасуының ұйымдастырушылық және әдістемелік жағдайларын анықтап, зерттеу тәжірибесінде тексеру болып табылады.

Зерттеу материалдары мен әдістер. Теория мен тәжірибенің өзара үйлесімділігін зертханалық сипатта емес, шынайы педагогикалық үдерісте жүзеге асыруға, жоғары оқу орындарында пән мұғалімдерін озық кәсіби дағдыларын дамытуға дүниежүзілік білім беру кеңістігінде сәтті білім беру тұрғылары, технологиялары, формаларының ішінде іс-әрекеттік, тұлғалық бағдарлы, құзыреттілікке бағдарлы, контекстілі, модулді, бағдарламалы, дуалды, жобалап, проблемалық кейсті оқыту, сыни тұрғыда ойлау, оқытудағы зерттеу, «Шеберхана» (Воркшоп), шебер – сынып сияқты заманауи оқыту түрлері жоғары оқу орындарында кеңінен таралып келеді [4]. Бұл білім беру мен оқыудың тұрғылары аясында анықталған оқытудың заманауи технологиялары оқытуды ұйымдастырудың формаларында жеке, кіріктірілген түрде, оқытудың әдісі мазмұнында қолдану арқылы болашақ педагогтардың озық кәсіби дағдыларын қалыптастыруға қуатты құралдарының бірі болса, екінші бір оқытуды ұйымдастырудың бір формасы

дуалды оқытудың элементі түріндегі формасы [5] – тәжірибеге бағдарлы оқыту болып табылады.

«Тәжірибелі бағдарлы оқыту» ұғымы мен оның басқа балама ұғымдарына түсінік беріп, анықтамаларына тоқталсақ. Қазіргі педагогика ғылымы мен тәжірибесінде тәжірибеге бағдарлы оқыту бір еңбектерде оқытудың тұрғысы, оқытудың технологиясы, оқытудың формасы ретінде педагог ғалымдар өз түсініктері мен анықтамаларын ұсынып келе жатқаны байқалады[6]. Бірақ, тәжірибеге бағдарлы оқытудың жүру нысанына байланысты білім алушылардың әр түрлі танымдық дағдыларын, тұлғалық қасиеттерін қалыптастыруға және олардың деңгейлеріне байланысты өзара ажыратылуы керек. Тәжірибелі бағдарлы оқытудың формаларына семинар да, зертханалық, тәжірибелік сабақар да, практикум, саяхат, кәсіби сарамандар да кіреді [1]. Әрбір оқытудың формасындағы тәжірибелі бағдарлы сабақтардың дидактикалық мақсат пен міндеттері оқу материалын білім алушыларға меңгерту деңгейлеріне, танымдық дағдыларына байланысты әр түрлі болып келеді. Оларды маман даярлаудағы оқу үдерісінен алып тастап, бірден, шынайы педагогикалық үдерістегі тәжірибеге бағдарлы оқытуды қолдану қисындылықпен жанаспайды. Бірізділік пен жүйелілік қағидаларына негізделе, оқытушылар дәріс сабақтарында білім алушыларға іргелі теориялық және әдістемелік негіздерін аша, тәжірибедегі құндылықтарын, жүзеге асыру сәттерін түсіндіріп қарастыра, олардың білімін қалыптастырса, семинар сабақтарында білім алушылар әр түрлі ақпарат көздерінен терең, кең оқып үйреніп, ұғынуына, бекітуге ұмтылады. Зартханалық сабақтарда зерттеу әдістерінің көмегімен іргелі теориялардың педагогикалық процестерде жүзеге асуын, өміршеңдігіне көз жеткізу, деректермен дәлелдеу үшін зерттеу әрекеттерін орындап, теориялы білімін бекітеді. Тәжірибелік сабақтарда іргелі теориялар мен әдістемелік негіздер бойынша білімдерін тәжірибеде қолдануға тапсырмалар орындап, шынайы педагогикалық үдерісте жүретін әрекеттерді орындау іскерлігі қалыптасады. Бұл аталған оқытудың формалары да тәжірибеге бағдарлы сабақтар болып табылады. Бірақ, ол оқытудың формалары білім алушылардың кәсіби білімі мен іскерліктерін қалыптастыруға ғана бағытталған. Сонымен бірге, бұл танымдық тәжірибелер басым оқу үдерісі түрінде жүріп, шынайы педагогикалық үдерістерді, қатынастарды оқу моделінде иделды түрде жоспарлау, ұйымдастыру, жүргізу, бағалау жобаларын дайындау іскерліктері, дидактикалық және пәндік әрекеттерді орындаудың кәсіби дағдыларының алғашқы белгілері де қалыптасуына мүмкіндік береді. Бірақ, сараман тәжірибелерінде машықкерлердің өзбетімен, өнімді және шығармашыл, саналы, кез-келген туындаған педагогикалық, дидактикалық, пәндік қиындықтарды шешу дағдыларының түпкілікті қалытпасуына мүмкіндік беруі шектеулі. Өйткені, сараман тәжірибесіне дейінгі дайындықтарда білім алушылар өнімді және тәжірибелік сабақтарда аталған қиындықтарды шешу тәсілдеріне тән тапсырмаларды орындау, олардың мектептің пән сабақтарында бейнеленуі бойынша дағдылану әрекеттерінің орындалмауында. Яғни, бұл әрекеттерді білім алушылар озық кәсіби дағдыларды үйренуге мектептің шынайы оқу үдерісіндегі психологиялық, педагогикалық, әлеуметтік, пәндік, әдістемелік әрекеттермен байланыссыз меңгеруінде болып келді.

Осыған сәйкес, психолог-ғалымдардың оқыту теориясындағы психологиялық ерекшеліктерді қарастыра отырып, Беспалько В.П. оқу материалын меңгеру деңгейлерін анықтаған: білімді қабылдау, ұғыну, қайталау, қолдану, түрлендіру [7]. Яғни, оқу үдерісінде оқыту мазмұнының білім алушылардың оқу материалын қабылдау мен түрлендіру кезеңдерін қамтып отыруға барлық оқытудың формаларында басым ортақ жүруі қажеттілігін көрсеткен. П.Я. Гальпериннің ақыл ой әрекеттерін кезеңді қалыптастыру теориясында оқытуды ұйымдастыру формаларына ортақ құрылымын ұсынған: білім алушылардың уәжін ояту арқылы алғашқы танымдық әрекеті; әрекетке

білім алушыларды бағдарлау, яғни, оларға жаңа оқу материалын үйретуге контенттер ұсыну; оқу материалын меңгергеннен кейін, өзбетімен нақты тапсырмалар орындауға өту; жаңа оқу материалының теориясы мен тәжірибесін интериоризациялау; орындаған іс-әрекеттердің толығымен саналы меңгеруі; білім алушы өзінің әрекеттерін саналы, дағды түрінде орындай алуға жетуін сипаттайды. Кез-келген оқытуды ұйымдастырудың формасында білім алушыларға теориялық білім, тәжірибелік іскерлік, дағдыларға үйретудің оқыту кезеңдері жоғарыдағы аталған сатылармен жүреді екен [8].

Олай болса, тәжірибелік бағдарлы оқытудың оқу үдерісіндегі формалары білім алушылардың кәсіби білімі мен іскерліктерін қалыптастыруға мүмкіндіктері болса, тәжірибелік сарамандар да кәсіби білімі мен іскерліктерін сынауға, тексеруге, бақылауға, түзетуге, толықтыруға қол жеткізеді. Соның нәтижесінде білім алушылар ұзақ жыл бойы бірізділікпен кәсіби білімі мен іскерлігінің жеткілікті қалыптасуына мүмкіндік ала алады. Осы ұзақ жыл бойы кеткен уақыт мерзімін оңтайландыру және төменгі курс кезінде білім алушылардың кәсіби дағдылары мен құзыреттерін қалыптастыруға жоғарыдағы озық технологиялар мен оқытуды ұйымдастырудың тәжірибеге бағдарлы түрі әлдеқайда оқу үдерісінің өнімділігі мен ұтымдылығын табысты жеткізе алатынына қуатты құралдар болып табылады[9]. Өз кезегінде білім алушылардың тәжірибелік сипаттағы белсенді әдістерді қолдану әрекеттері, олардың кәсіби білім мен дағдыларға үйренуге ынталары артып, кәсіби уәжі мен қызығушылықтары артады[10].

Біз жоғарыда білім алушылардың кәсіби білімі мен іскерліктерін қалыптастыруға бағытталған жоғары оқу орындарында кең таралған, дәстүрлі оқытудың ұйымдастыру формаларының оқыту теориясындағы құндылықтарына түсінікті қарастырсақ. Жалпы орта мектептердегі шынайы оқу-тәрбие үдерісі жоғары оқу орындарында психолгиялық, педагогикалық, дидактикалық және пәндік курстардың жиынтығынан құралған. Оқу-тәрбие жүйесі болашақ педагогтың табиғатында бейнеленетін кәсіби білімі, дағдылары мен құзыреттерінің сыналуының, түзетілуінің, рефлексиялануының шынайы нысаны болып табылады. Мектептің шынайы оқу-тәрбие үдерісі, оны жоспарлау, ұйымдастыру, басқару, әлеуметтік қарым-қатынастар, оқу үдерісі мен тәрбиенің мазмұны, педагогтың оқыту мазмұны, оқушылардың танымдық әрекеттері, оларды бақылау мен бағалау, оқыту нәтижелері біртұтас педагогикалық үдеріс. Осы оқу-тәрбие үдерісінде білім алушылардың оқу курстарын меңгеру барысында сол үдеріске қатысуы, тәжірибемен тікелей ұштастыра, озық кәсіби дағдыларын, құзыреттерін қалыптастыру оқытуды ұйымдастырудың формасы – тәжірибеге бағдарлы сабақ ретінде анықталады.

Тәжірибеге бағдарлы оқытуды ұйымдастырудың басты түрі – сабақ [1]. Олай болса, тәжірибеге бағдарлы сабақ білім алушылардың мектеп тәжірибесін үйренуге бағытталған білім беру бағдарламаның нақты оқу курстарымен ұштастырылуы қисынды. Педагогикалық мамандықтардың психологиялық, педагогикалық, дидактикалық және пәндік курстардың барлық түрлері бойынша тәжірибеге бағдарлы сабақтарды мектептің оқу-тәрбие үдерісіне бағыттап, білім алушыларға оқу курстарынан тәжірибеге бағдарлы сабақтар ұйымдастыруға мүмкіндіктер бар. Біздің зерттеуімізде болашақ педагогтардың кәсіби еңбегінде мамандықтың оқу курстарының жиынтығының мазмұнын бейнелейтін және кәсіби іс-әрекетінде соның барлығы біртұтас жүретін, жүзеге асатын нысан – пән сабағы мен оны оқушыларға үйретететін оқыту мазмұны болып табылады. Сондықтан зерттеу тәжірибемізде сол пән – оқыту әдістемесі курсын таңдадық. Соңғы үш жыл бойы педагогикалық мамандықтардың озық кәсіби дағдыларының қалыптасуына мекетптің оқушыларынаа пәндік білім берудің оқыту әдістемелік курстары бойынша тәжірибеге бағдарлы сабақтарды ұйымдастырып келеміз.

Оқыту әдістемесі курсы бойынша тәжірибелі бағдарлы сабақтар университетте үш аптада 5 сағат, яғни, бір күн бойы мектептің пәндік сабақтың оқу үдерісіне қатысу оқу кестесімен анықталған. Бір семестр бойы білім алушылар оқыту әдістемесі курсынан

тәжірибелік бағдарлы сабақты бес рет өтеді. Семестр бойы бес рет жүретін тәжірибелі бағдарлы сабақтың өнімді және тиімді өтуіне кепіл беретін ұтымды жоспарлау кезеңі болып табылады. Жоспарлау кезеңі оқу жылының басында мектептің пән мұғалімі мен университеттегі оқыту әдістемесі курсының оқытушысы өзара күнтізбелік-тақырыптық жоспар мен оқу бағдарламасын үйлестіруден басталады. Екінші кезең, оқу курсының тәжірибелік бағдарлы сабақтардың кестесі мен мектептің пән сабағының сабақ кестелерін бір мезгілге, ортақ күндерін анықтап, білім алушыларды мектептерге бөлу мен пән мұғалімдеріне мектептің әкімшіліктерімен біріге бекіту. Білім алушылардың семестр бойы жүретін тәжірибелі бағдарлы сабақтарының жеке жоспарын құру. Бірінші тәжірибелі бағдарлы сабақта білім алушылар пән мұғалімінің жоспарлау құжаттарымен танысу, сабақтарына қатысып, оқыту мазмұнына бақылау жасап, талдау хаттамасын жүргізу. Екінші тәжірибелі бағдарлы сабақта қысқа мерзімді жоспарды құрудың тұжырымды және әдістемелік бөлімдерінің құрылымын құруды талдау, оқытудың техникалық, дидактикалық, көрнекілік құралдарының көздері мен мазмұнының үйлесімділігі мен мазмұндылығын талдау, тақырыптық сабақты пән мұғалімі өткізуге құралдарды біріге дайындау болса, үшінші сабақта білім алушылар пән мұғалімінің сабағына қатысып, сабақтың тәжірибелік бөлігінде оқушылардың орындайтын тапсырмаларына бақылау жасап, қолдау әрекеттерін орындау болып табылады. Төртінші сабақта пән мұғалімімен бірге қысқа мерзімді жоспар құрып, сабақтың барысында оқушыларға үздіксіз бақылаулар жасап, қолдаулар көрсетумен жүреді. Пән мұғалімімен біріге оқушылардың танымдық дағдыларын бағалау үдерісіне қатысып, өзінің де пікірін мұғаліммен және оқушылармен біріге бөліседі. Соңғы тәжірибелі бағдарлы сабаққа өзбетімен қысқа мерзімді жоспарды дайындау үдерісі пән мұғалімінің және әдістемелік курстың оқытушысымен кеңес, қолдауларымен үлгілі сабақты сынып оқушыларына өткізеді. Сабақтың соңында пән мұғалімімен және пән оқытушысымен біріге өткізілген сабақтың мазмұнына талдаулар жасап, оның пәндік білім деңгейі, әдістемелік мазмұнындағы күшті және әлсіз жақтарына егжей-тегжейлі талдаулар жасап, ұсыныстар алады.

Тәжірибелі бағдарлы сабақтардың барысында оқу курсының оқытушысы білім алушыларға күнтізбелік-тақырыптық жоспар бойынша соңғы сабақтың мазмұнын оқытудағы зерттеу (Лессон стади) [11], іс-әрекетті зерттеу моделдердің бірімен ізденіс сипатындағы сабақ өткізуді жоспарлап, білім алушылардың зерттеушілік дағдыларын қалыптастыруды көздейді[12]. Осы тәжірибелік бағдарлы сабақтардың жоспарлау, ұйымдастыру, жүргізу, бақылау мен бағалау, рефлексиялау әдіс әрекеттерін күнделікке жазып, оқу курсының соңында оқытушыға беретін есебі зерттеу сипатындағы баяндама және әдістемелік ұсыныстармен ұштастырылуы қисынды.

Осы педагогикалық зерттеулері мен тәжірибесіне «Дене шынықтыру және спорт», «Бастапқы әскери дайындық және дене шынықтыру», «Визуалды өнер, көркем еңбек және графика» білім беру бағдарламаларының 3 курс білім алушылары таңдалды. Осы білім беру бағдарламаларының оқыту әдістемесі курстарының оқу үдерісі анықталды. Осы курс сабақтарының оқыту әдістемесі мен тәжірибелі бағдарлы сабақтардың, білім алушылардың танымдық және кәсіби дағдыларының қалыптасуына ықпалы туралы оларға рефлексия сипатында «кіріс» және «шығыс» сауалнамалар жүргізу белгіленді. Білім алушылардың оқыту әдістемесі бойынша кәсіби дағдылары деңгейін анықтауға өлшемшарты анықталып, оның көрсеткіштері, алынған мәліметтерді статистикалық әдістермен өңдеу, алынған деректерді талдау, зерттеу мақсаты мен болжамының расталуына дәлелдемелер жасау, педагогикалық зерттеу мен тәжірибені жалпыламалау мен қорытындылау болып табылды.

Оқыту әдістемесі курсы бойынша тәжірибелі бағдарлы сабақтардың тиімділігін анықтаудың жетекші өлшемшарты – білім алушылардың кәсіби дағдыларының

қалыптасу деңгейі болып табылды. Ол өлшемшарттың көрсеткіш құрамдарына: дидактикалық және пәндік білімдерді тәжірибеде тасымалдау шапшаңдығы; өзбетімен жоспарлау мен құралдарды сабаққа қисынды даярлау; қысқа мерзімді жоспардың тұжырымды және әдістемелк бөлімдерін қисынды құруы; критериалды бағалау мен дидактикалық материалдардың үйлесімділігін қисынды жасау; оқушылардың танымдық дағдыларын дамытудың замануи құралдарын тәжірибеде демонстрациялауы; сабақ барысында машықкердің эмоционалдық, эмпатиялық күйлерінің белсенділігі, пән сабақтарында оқушылармен коммуникацияға түсуінің еркіндігі; пән сабақтарында әдістемелік әрекеттерді еріксіз орындау мен әдеттену белгілерінің орнықтылығы; оқушылардың танымдық дағдылары деңгейін бағалау стратегияларын жүзеге асыра алуы анықталды.

Білім алушылардың тәжірибелі бағдрлы сабақтардың нәтижесі бойынша кәсіби дағдылар деңгейі өлшемшарты мен көрсеткіштерінің көмегімен сапалы мазмұнын анықтауға деңгейлері мен шәкілдері құрылды:

1) Төмен деңгей: 0 – 49 ұпай (дидактикалық және пәндік білімдерді тәжірибеге тасымалдау тәртібінде өрескел қателіктер жібереді, өзбетімен сабақты жоспарлау әрекеттерінің құрылымдық элементтерін бұртұтас құру мүмкіндігі жеткіліксіз, критериалды бағалау негізінде дидактикалық материалдар мен құралдарды дайындау әрекеттерінде қисындылық байланыстардың бұзылуы; сабақ барысында оқушылармен коммуникация жасау дәрмендігі төмен, бағалау тәртібінің реттілігін сақтамайды);

2) Орташа деңгей: 50-70 ұпай (дидактикалық және пәндік кәсіби білімдерді тасымалдауында қателіктер жібереді, өзбетімен сабақтарды жоспарлауда құрылымдық элементтерінде қисынсыздықтар кездеседі, критериалды бағалау негізінде әдістемелік тәсілдер мен тапсырмалардың қисынды құрылуында толық үйлесімділік байқалмайды, сабақта оқушылармен коммуникациялық байланыстар болғанымен, олармен қатаңдық белгілері сақталған, бағалау тәртібінде әдістемелік тәсілдерді орынды қолданғанымен, оқушылардың өздері рефлексиялау тәртібін толық орындамайды;

3) Жоғары деңгей: 71-89 ұпай (дидактикалық және пәндік кәсіби білім беруді тәжірибеге тасымалдау шапшаңдығы жеткілікті, өзбетімен сабақты жоспарлауда тұжырымды және әдістемелік бөлімдер арасындағы қисындылықтарды мәнерсіз сәтсіздіктер байқалады, критериалды бағалау негізінде оқыту құралдары мен әдістемелік тәсілдерді жүйелейді, сабақта оқушылармен коммуникациялық байланыстары, эмоционалдық және эмпатиялық құлқы мен әрекеттері қалыпты, оқушылардың танымдық дағдыларын бағалауда қолданатын әдістердің тақырып мазмұнымен үйлесімділігі бар)

4) Өте жоғары деңгей: 90-100 ұпай (дидактикалық және пәндік кәсіби білім беруді тәжірибеге тасымалдау шапшаңдығы жеткілікті, өзбетімен сабақты жоспарлауда тұжырымды және әдістемелік бөлімдер арасындағы қисындылықтарды сақтайды, критериалды бағалау негізінде оқыту құралдары мен әдістемелік тәсілдерді орнықты жүйелейді, сабақта оқушылармен коммуникациялық байланыстары, эмоционалдық және эмпатиялық құлқы мен әрекеттері еркін жүреді, оқушылардың танымдық дағдыларын бағалауда қолданатын әдістердің тақырып мазмұнымен үйлесімділігі толық сақтайды).

Зерттеу нәтижелері. Біздің зерттеуімізде, жоғарыдағы таңдаған 3 білім беру бағдарламаларының 3 курс студенттерінің 3 тобы таңдалды: ВКГ-32, НВП-31 және ФКИС-23. Сыналушылардың саны 37 студент құрады. Екі бақылаудың өлшемшарт бойынша деңгейлері мынандай шамаларды құрады: 1 бақылауды төмен деңгей - 0 %, орташа деңгей - 27%, жоғары деңгей – 48,6%, өте жоғары деңгей- 24,4%, ал, 2 бақылауда, төмен -0%, орташа -16,2%, жоғары – 51,3%, өте жоғары – 32,5%. Бұл бақылау нәтижесінде тәжірибеден кейінгі сәттерде білім алушылардың алдыңғы деңгейлері төмендеп, соңғы деңгейлері артқаны байқалады. Бұл өз тарапынан тәжірибелі бағдарлы

сабақтарды жоспарлау, ұйымдастыру жағдайлар тиімді қатмамасыз етуге негіз бола алады. Педагогикалық зерттеуде, оларды тәуелді топ етіп қабылдадық. Өйткені, бізде бақылау және тәжірибелі топтар таңдалған жоқ. Сол топтардың оқу жылы басындағы бір бақылау көрсеткіштері мен соңғы көрсеткіштердің мәндері алынды. Осы мәндерді, яғни, оқу жылының басы мен аяғында алынған көрсеткіштердің сандық және сапалы мәндерін анықтауға математикалық-статистикалық әдістер қолданылды. Оқу жылының басы мен соңында алынған көрсеткіштердің (бал) арасындағы айырмашылығы сенімді екенін анықтауға Стьюдент t – критериясы коэфициентін есептелді. Критерийдің эмпирикалық мәні $t_{фак} = 1,50$ құраса, мәнділік деңгейі $P = 0,14$ болды ($P \leq 0,05$). Егер, мәнділік деңгейін P мен теңесек, онда тәуелді топтардың балдық көрсеткіштерінде айырмашылықтың сенімділігі төмен болып тұрғанын көруге болады. Екінші бір жолы, $t_{фак}$ есептеу көрсеткішін Стьюдент t – критериясының таблицадағы шекті мәнін табуды шештік. Ол үшін бізге топтағы студенттердің саны – 37 болса, сол кестедегі 37 санының тұсындағы $P \leq 0,05$ бағанасындағы $t_{кр} = 2,02$ анықтауға болады. Бұл шекті мән есептеуден алынған коэффициенттен жоғары. Олай болса, бақылаулардан алынған көрсеткіштердің сенімділік айырмашылығы бар екендігін растайды.

Осы деректерді тағы қайта тексеруге Вилкоксон критериясының эмпирикалық мәнін есептедік. Оның есептеу мәні $P_ф = 153,5$ құрады. Ал, Вилкоксон t – критериясының шекті немесе сыни мәнін табу үшін топтағы сыналушылардың санын кестеден тауып, соның тұсындағы $P_{кр}$ мәнін анықтап, ол кестеде $P_{кр} = 241$ (0,05 болғнда), $P_{кр} = 198$ (0,01 болғанда) көрсетілген. Біз бірінші шарттағы мәнді алып $P_{кр} = 241$ оны $P_ф = 153,5$ салыстырдық. Бұл жағдайда $P_{кр} \geq P_ф$ үлкен болып тұр. Бұл күй тәжірибеден алынған көрсеткіштердің арасындағы айырмашылықтың сенімділігін көрсете алады.

Тәуелді топтардың алынған көрсеткіштер арасындағы өзара байланысы бар ма, бар болса қаншалықты мәндері жоғары немесе төмен екендігін анықтауға Спирменнің рангалы корреляция коэффициентін таңдадық. Есептеу барысында критерияның эмпирикалық мәні $P_ф = 0,77$ құрады. Ал, $P_{кр}$ мәнін табу үшін топтың саны бойынша шекті мәні $P_{кр} = 0,33$ болды. Яғни, егер эмпирикалық мән шекті мәннен жоғары болса, онда олардың арасында тәуелділіктің бар екенін растай алады. Ол тәуелділік қаншалықты қатты? Екі көрсеткіштердің арасындағы байланыс оң не теріс болуы мына шама аралықтарды көрсетуі керек -1 мен + 1. Егер байланыс 0,3 тен төмен болса - әлсіз, 0,3 тен 0,69 аралықта болса - орташа, 0,70 тен 1 – ге дейін болса – жоғары, күшті деңгейді көрсетеді. Біздің жағдайымызда эмпирикалық есептеу мәні 0,77 көрсетіп тұр. Ол, әрине өзара байланыстың күшті екендігін анықтап отыр.

Сонымен бірге, тәжірибелік бағдарлы сабақтардың тиімділігі мен ол сабаққа білім алушылардың дайындығы, пікірлерін анықтауға оқу курсының басы мен соңында да сауалнамалар жүргізілді. Соның шығыс сауалнамасындағы сауалдардың жауаптарын үлгі ретінде қарастырып өтейік. Сыналушылардың тәжірибелік бағдарлы сабақтардың қандай мүмкіндіктері мен құндылықтары бар деген сұрақтардың бірнеше жауаптарын белгілеу ұсынылса, соның бірі – оқыту әдістемесі мен пәндік білімге үйрену әлеуеті жоғары жауапты сыналушылардың 57,9% белгілесе, 26,3% әдістемелік тәсілдерді үйренуге болады, 47,9% тәжірибені бақылауға, өзімнің психологиялық сенімділігімді сынауға 36,8% көрсеткен. Мұғалімнің оқушыларға сабақ өткізу барысында басты неге назар аударыңыз деген сұрақтың бірнеше жауаптарын белгілеу ұсынылған болатын. Сыналушылардың 63,5% мұғалімнің пәндік біліміне, сабақты жүргізу тәртібіне 57,9%, тәсілдемелерді қолдануына 26,9%, оқушылармен қарым-қатынастарына 57,9% жауаптарын басым таңдаған. Тәжірибелі бағдарлы сабақтарға қатысуда сыналушылардың күткен үміттері мен сенімдері ақталғанына өзі баға беруді ұсынғанда, олардың 16% орташа, 63% жоғары, 21% өте жоғары бал берген. Сабақтың аяқталуында рефлексия жасадыңыз ба деген сауалған барлық респонденттер 100% «ия» деп жауап

берген. Ал, тәжірибелік бағдарлы сабақтардағы тәжірибелер мен оқыту әдістемесі курсынан алған білімдердің өзара байланыстары қандай деген сұраққа, сыналушылардың 42,1% толық сәкестікті көрсетсе, 26,3% толық емес, сәйкессіздіктер бар, 31,5% сәйкессіздіктер жиі кездеседі деп жауап берген. Сыналушыларға өзінің оқыту әдістемесі курсынан алған білімі мен тәжірибелік бағдарлы сабақтарға қатысып, тәжірибе жинап, соның негізінде оқушыларға сабақ өткізу, оқушылармен қатынасқа түсу дағдыларыңызды қалай бағалай алар едіңіз деген сұраққа, сыналушылардың 47,36% жоғары, 47,9% өте жоғары, 5,3% төмен балдармен көрсеткен.

Олай болса, білім алушылардың әдістемелік және пәндік білімдері бойынша тәжірибелік бағдарлы сабақтарға дайындығы, оны мектептің шынайы оқу үдерісінде тәжірибелеуінің ұтымдылығы мен тиімділігін тексеруге бағытталған, бақылаулардан алынған мәліметтерді статистикалық өңдеулермен дәлелдеу үдерісіндегі сандық мәндердің айырмашылық сенімділігі және олардың өзара байланыстарының (корреляция) күштілігі расталғаны анықталды. Сонымен бірге, тәжірибелік бағдарлы сабақтар білім алушылар әдістемелік, тәжірибелік дағдылары мен сенімділіктерінің қалыптасуын бақылауға шығыс сауалнамасына берген рефлексиялық пікірлерінің жауаптары әлдеқайда тәжірибелік бағдарлы сабақтардың шынайы үдерістері, олардың озық кәсіби дағдыларын қалыптастырудың қуатты құралы екенін нығайтуға мүмкіндік берді.

Қорытынды. Білім беру саласында болашақ педагогтарға кәсіби білім мен озық дағдыларды қалыптастырудың педагогикалық ғылым теориясы мен тәжірибесіне талдаулар жасап, білім алушылардың мектептегі шынайы оқу үдерісіне тәжірибелік бағдарлы сабақ формасында танымдық әрекеттерге қатысу тәжірибесіне зерттеу жүргізу нәтижесінде мынандай қоорытынды жасауға мүмкіндік берді:

1. Педагогика ғылымының теориясының құрамды бөлігіндегі сабақты ұйымдастырудың дәстүрлі формалары білім алушылардың танымдық және тұлғалық дағдыларын қалыптастыруға әлеуеті мен өміршеңдігі сақталғанымен, олардың озық кәсіби дағдыларын қалыптастырудың замануи және педагогикалық құндылығы жоғары, қарқынды және үдемелі дамытудың тиімді құралының бірі: сабақты ұйымдастырудың формасы - тәжрибелік бағдарлы сабақ анықталды.

2. Тәжірибелік бағдарлы сабақты мектептің шынайы оқу үдерісінде жүруі білім алушылардың теориялық білімін бекіту мен оны тәжірибеде жүзеге асуын бақылап, әрекеттерге қатыса, жіберген қателіктерін түзеуге, толықтыруға, кәсіби қызығушылықтарын арттыру мүмкіндігіне қол жеткізумен бірге, субъектілігі тұлға ретінде қарым-қатынастарға түсе, өзінің эмоционалдық, тұлғалық, рефлексиялық дағдыларын да қалыптастыруға иеленеді.

3. Осы ой тұжырымды зерттеу тәжірибесінде тексеруге білім алушылардың тәжірибелік бағдарлы сабақтарындағы оқу-танымдық іс-әрекеттеріне бақылаулар жүргізіп, озық кәсіби дағдыларының қалыптасу деңгейінің өлшемшартын анықталды. Сабақтың басы мен соңында алынған мәліметтерді статистикалқ өңдеу нәтижесінде, олардың озық кәсіби дағдыларының қалыптасуына тәжірибелік бағдарлы сабақтардың тиімділігін растауға дәлелдеме бола алатын, тәжірибедегі сандық мәндердің арасындағы айырмашылықтардың сенімділік дәрежесінің болуы мен олардың өзара күшті тәуелді байланысы бар екені анықталды. Сонымен бірге, білім алушылардың тәжірибелік-бағдарлы сабақтарға қатысуына, оқыту әдістемесі мен пәндік білімдерін тәжірибеде қолдану әрекеттеріне берген рефлексиялары, ол дәлелдемелерді нығайтуға, тәжірибелік бағдарлы сабақтардың озық кәсіби дағдыларды қалыптастырудың қуатты құрал бола алатынына сенімділігін өзін-өзі бағалау жауаптарында көрсетіп отыр.

ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

1. Подласый, И. П. Педагогика : учебник для вузов / И. П. Подласый. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 575 с.

2. Кажимова К.Р. Педагогикалық-психологиялық сөздік [Текст] / Авт.-құраст. К. Р. Кажимова. - Орал : М.Өтемісов атын. БҚУ РБО, 2022. - 160 б.

3. Ожегов С.И. Толковый словарь, онлайн [Электронный ресурс]. - URL: https://slovarozhegova.ru/, дата обращения 14.03.25 г.

4. Гришина Т.С., Зыкова Н.Ю. Педагогические технологии: учебное пособие / авт. сост. Т.С.Гришина, Н.Ю.Зыкова. – Воронеж: ФГБОУ ВО «ВГИФК», 2019. – 150с.

5. Дуальная система обучения: русско-немеский словарь-справочник, Duales Ausbildungssystem Russisch-Deutsches Fachwörterbuch und Nachschlagewerk [Электронный ресурс]. - URL: https://www.google.com/search?, дата обращения 18.03.25 г.

6. Просалова, В. С. Концепция внедрения практикоориентированного подхода [Электронный ресурс]. URL: http://naukovedenie.ru /PDF/10pvn313.pdf (дата обращения: 21.03.2025)

7. Беспалько В.П. Программированное обучение: [Текст]: / В.П. Беспалько / Дидактические основы. - М., 1970. -300 с.

8. Гальперин П.Я., Талызина Ф. Формирование знаний и умений на основе теории поэтапного усвоения умственных действий / Под ред. П. Я. Гальперина, Н. Ф. Талызиной. М., 1968. С. 72—116.

9. Tamara ET van Woezik 1,Jurriaan P Oosterman 1, Rob PB Reuzel, Gert-Jan van der Wilt, Jur J Koksma. Practice-based learning: an appropriate means to acquire the attitude and skills for evidence-based medicine. Int J Med Educ. 2020 Jul 24;11:140–145. doi: 10.5116/ijme.5ee0.ab48

10. Antonio L. Leal-Rodríguezа, Gema Albort-Morantb Promoting innovative experiential learning practices to improve academic performance: Empirical evidence from a Spanish Business School. Journal of Innovation & Knowledge , Vol. 4. Issue 2. Pages 97-103 (April - June 2019, DOI: 10.1016/j.jik.2017.12.001

11. Пит Дадли Лессон Стади: руководство [Электронный ресурс] . URL: https://lessonstudy.co.uk/wp-content/uploads/2013/07/Lesson-Study-Handbook-Russian.pdf(дата , обращения: 21.03.2025)

12. Groothuijsen, S., Bronkhorst, L. H., Prins, G. T., & Kuiper, W. (2023). Scope, nature and progress of impact in practice-oriented educational research: a conceptual and empirical substantiation. Research Papers in Education, 38(3), 378-402. https://doi.org/10.1080/02671522.2021.1974529

REFERENCES

1. Podlasyj, I. P. Pedagogika : uchebnik dlja vuzov / I. P. Podlasyj. — 3-e izd., pererab. i dop. — Moskva : Izdatel'stvo Jurajt, 2023. — 575 s.

2. Kazhimova K.R. Pedagogikalyқ-psihologijalyқ sөzdik [Tekst] / Avt.-құrast. K. R. Kazhimova. - Oral : M.Өtemisov atyn. BҚU RBO, 2022. - 160 b.

3. Ozhegov S.I. Tolkovyj slovar', onlajn [Jelektronnyj resurs]. - URL: https://slovarozhegova.ru/, data obrashhenija 14.03.25 g.

4. Grishina T.S., Zykova N.Ju. Pedagogicheskie tehnologii: uchebnoe posobie / avt. sost. T.S.Grishina, N.Ju.Zykova. – Voronezh: FGBOU VO «VGIFK», 2019. – 150s.

5. Dual'naja sistema obuchenija: russko-nemeskij slovar'-spravochnik, Duales Ausbildungssystem Russisch-Deutsches Fachwörterbuch und Nachschlagewerk

6. [Jelektronnyj resurs]. - URL: https://shhshhshh.google.com/search?, data obrashhenija 18.03.25 g.

7. Prosalova, V. S. Koncepcija vnedrenija praktikoorientirovannogo podhoda [Jelektronnyj resurs]. URL: http://naukovedenie.ru /PDF/10pvn313.pdf (data obrashhenija: 21.03.2025)

8. Bespal'ko V.P. Programmirovannoe obuchenie: [Tekst]: / V.P. Bespal'ko / Didakticheskie osnovy. - M., 1970. -300 s.

9. 8.Gal'perin P.Ja., Talyzina F. Formirovanie znanij i umenij na osnove teorii pojetapnogo usvoenija umstvennyh dejstvij / Pod red. P. Ja. Gal'perina, N. F. Talyzinoj. M., 1968. S. 72—116.

10. Tamara ET van Woezik 1,Jurriaan P Oosterman 1, Rob PB Reuzel, Gert-Jan van der Wilt, Jur J Koksma Practice-based learning: an appropriate means to acquire the attitude and skills for evidence-based medicine. Int J Med Educ. 2020 Jul 24;11:140–145. doi: 10.5116/ijme.5ee0.ab48

11. Antonio L. Leal-Rodríguez[a], Gema Albort-Morant[b] Promoting innovative experiential learning practices to improve academic performance: Empirical evidence from a Spanish Business School. Journal of Innovation & Knowledge , Vol. 4. Issue 2. Pages 97-103 (April - June 2019, DOI: 10.1016/j.jik.2017.12.001

12. Pit Dadli Lesson Stadi: rukovodstvo [Jelektronnyj resurs] . URL: https://lessonstudy.co.uk/shhp-content/uploads/2013/07/Lesson-Study-Handbook-Russian.pdf (data obrashhenija: 21.03.2025)

13. Groothuijsen, S., Bronkhorst, L. H., Prins, G. T., & Kuiper, W. (2023). Scope, nature and progress of impact in practice-oriented educational research: a conceptual and empirical substantiation. Research Papers in Education, 38(3), 378-402. https://doi.org/10.1080/02671522.2021.1974529

РЕЗЮМЕ

В исследовании рассматривалась эффективность проведения практико-ориентированных уроков как современная форма организации уроков для ускоренного и интенсивного формирования профессиональных знаний и навыков будущих учителей в процессе их подготовки к профессиональной деятельности. Целью исследования была проверка на практике организационно-методических условий формирования опережающих профессиональных умений студентов путем проведения практико-ориентированных уроков в реальных условиях учебного процесса общеобразовательной школы. В педагогическом исследовании были разработаны критерии уровня формирования опережающих профессиональных навыков студентов, проведены срезы и опросы. В результате обработки их данных показано, что разница между показателями, полученными в первом и последнем срезах группы, которая может служить свидетельством эффективности формирования опережающих профессиональных умений студентов, была положительной по показателям достоверности и взаимозависимости. При этом в ответах студентов на вопросы рефлексивного опроса о рациональности практико-ориентированных уроков было определено, что выполнение познавательных действий в ходе реального процесса обучения, их рефлексия, чтение и изучение документов по планированию, проведение пробных уроков являются эффективными средствами приобретения опережающих профессиональных навыков.

ӘОЖ: 94(574)
ҒТАМР 03.20;03.09.55

Балжанова Г.Ж., гуманитария ғылымдарының магистрі, https://orcid.org/0000-0002-4847-3013
«Жәңгір хан атындағы Батыс Қазақстан аграрлық-техникалық университеті» КеАҚ, Орал қаласы, Жәңгір хан көшесі 51, 090009, Қазақстан, erlan.alataev@mail.ru

Balzhanova G. Zh., master of Humanitarian Sciences, https://orcid.org/0000-0002-4847-3013
NJSC "West Kazakhstan Agrarian and Technical University named after Zhangir Khan", Uralsk, st. Zhangir Khan 51, 090009, Kazakhstan, erlan.alataev@mail.ru

АЛАШОРДА ҚОЗҒАЛЫСЫНЫҢ ҰЛТТЫҚ ТӘУЕЛСІЗДІККЕ ҚОСҚАН ҮЛЕСІ

ALASHORDA NATIONAL INDEPENDENCE MOVEMENT CONTRIBUTION

ТҮЙІН

Мақалада Алашорда үкіметінің – қазақ халқының ұлттық бірегейлігін, рухани тұтастығын және саяси дербестігін қалыптастыруға бағытталған ұлы мұраты кеңінен ашылған. Алаш қайраткерлері ұлттың тілін, мәдениетін, білімін, тәуелсіздігін сақтауды басты құндылық деп таныды. Бүгінгі таңда ұлттық құндылықтарды дәріптеу – Алаш мұрасын жалғастырудың бір жолы. Сондықтан ұлттық сананы жаңғыртуда, рухани тәуелсіздікті нығайтуда Алаш идеясының маңызы зор. Бұл сабақтастық – Тәуелсіз Қазақстанның кемел келешегіне бастайтын жол екендігі талданды. Бүгінде Алаш мұрасы – тәуелсіз Қазақстанның берік іргетасы, ал оның ұстанымдары ұлттық жаңғыру мен рухани кемелденудің өзегі болып отыр. Ұлттық құндылықтарды дәріптеу емес, сонымен бірге болашаққа бағдар жасау. Ұрпақ санасында Алаш идеясының мәңгілік жаңғырып тұруы – қазақ мемлекетінің жарқын болашығының кепілі. Осы мұраны насихаттап, ұлттық рухты нығайту – әрбір азаматтың міндеті. Алаш қозғалысы ұлттық мүддені қорғауды мақсат етті. Оның идеялық негізі – елдің тәуелсіздігі, жер тұтастығы, білім мен ғылымды дамыту, ұлттық мәдениет пен тілдің сақталуы болды. Бұл құндылықтар қазақ халқының сан ғасырлық тарихи дамуының өзегіне айналды. Қазақ халқының келешегі үшін күрескен Алаш қайраткерлерінің «Білімді болу – ұлттың болашағы» деген ұстанымдар арқылы халықты бірлікке, өркениетті қоғам құруға шақырды.

ANNOTATION

The article examines the great ideals of the Kazakh government - Alashorda. It was aimed to the formation of national identity, spiritual integrity and political independence. The leaders of the Alash party recognized the preservation of the language, culture, knowledge, and independence of the nation as the main value. Today, popularization of national values is one of the ways to continue the legacy of Alash. Therefore, the idea of Alash is of great importance in modernizing national consciousness and strengthening spiritual independence. It was emphasized that this continuity is the way to a perfect future for independent Kazakhstan. Today, the heritage of Alash is a solid foundation of independent Kazakhstan and its principles underlie national revival and spiritual improvement. The revival of the idea of Alash in the minds of generations is the key to a bright future for the Kazakh state. It is the task of every citizen to promote this heritage and strengthen the national spirit. The Alash movement sought to protect national interests. Its ideological basis was the independence of the country, the

integrity of the land, the development of education and science, the preservation of national culture and language. These values have become the core of the centuries-old historical development of the Kazakh people. Alash activists who fought for the future of the Kazakh people, called on the people to unite, to build a civilized society, adhering to their position that can be expressed like "education is the future of the nation."

Кілт сөздер: *Алаш қайраткерлері, ұлттық құндылық, Алаш идеясы, қазақ идеясы, Алаш мұрасы, Алашорда қозғалысы*

Key words: *Alash figures, national value, Alash idea, Kazakh idea, Alash heritage, alashorda movement*

Кіріспе. Алашорда қозғалысы – XX ғасырдың басында Қазақстандағы ұлттық тәуелсіздік пен мемлекеттілік жолындағы күрестің маңызды кезеңдерінің бірі. Ол қазақ халқының саяси, әлеуметтік және мәдени құқықтарын қорғау мақсатында құрылған ұйым болып табылады. Алашорда қозғалысының ұлттық тәуелсіздікке қосқан үлесі өте зор. Олардың іс-әрекеті мен идеялары қазақ халқының болашақтағы тәуелсіздік жолындағы күресіне үлкен әсер етті.

Алашорда қозғалысының барлық іс-әрекеттері мен идеялары қазақ халқының тәуелсіздігін жүзеге асыруға бағытталды. Оның ісі ұлттық сана-сезімнің қалыптасуына және Қазақстанның болашақ тәуелсіздігіне негіз қалағаны сөзсіз. Алашорда қозғалысының мұрасы қазіргі Қазақстанның тәуелсіздігін алу жолындағы тарихи бастаулардың бірі ретінде маңызды рөл атқарады.

Алаш қозғалысының бастауы 1905 жылы Ресейде орын алған революциялық оқиғалар мен қазақ қоғамында әлеуметтік-саяси өзгерістерге деген сұраныстың артуымен байланысты болды[1]. Бұл уақытта қазақ қоғамы шеттетілген, мәдени және білім деңгейі төмен, әлеуметтік және саяси құқығы шектеулі жағдайды бастан кешірді. Ұлттық сана мен ұлттық мемлекеттілік идеясы жаңа қоғам үшін аса маңызды болды.

Бүгінде Алаш мұрасы ұлттық сананың негізі, мемлекет тұтастығы мен рухани жаңғырудың қайнар көзі болып табылады. Ұлтты ұйыстыратын негізгі құндылықтар – тіл, тарих, мәдениет, білім мен ғылымды дамыту сиякты Алаш қайраткерлері ұсынған идеялар қазіргі Қазақстан үшін өзектілігін жоғалтқан жоқ.

Алашорда қозғалысы XX ғасырдың басында қазақ халқының ұлттық тәуелсіздік жолындағы күресіндегі ең маңызды кезеңдердің бірі болды. Қазақ халқының өз тағдырына, саяси болашағына қатысты шешімдер қабылдайтын, ұлттық мүдделерді қорғауды басты мақсат еткен Алашорда үкіметі мен оның жетекшілері тәуелсіздік идеясын көтеріп, осы жолда күрес жүргізді[2]. Бұл қозғалыстың ұлттық тәуелсіздікке қосқан үлесі қазіргі Қазақстанның тарихында зор маңызға ие. Алашорда қозғалысының ұлттық тәуелсіздікке қосқан үлесін жан-жақты қарастыру үшін, оның қалыптасуы, мақсаты мен идеологиясы, осы қозғалыстың басшыларының саяси қызметі, сондай-ақ Алашорда үкіметінің іс-әрекеттерін сараптап көрейік.

Зерттеу материалдары мен әдістері. Алашорда қозғалысы 1917 жылы қазақ халқының саяси өмірінде ерекше орын ала бастаған қазақ зиялыларының қозғалысы ретінде тарихта қалды. Бұл қозғалыс Ресей империясының құлауы мен Қазақ автономиясының құрылу мүмкіндігін тудырған 1917 жылғы Қазан революциясынан кейін пайда болды[3]. Қазақ халқының жетекші тұлғалары қазақ мемлекеттілігін қалыптастыруды, ұлттың әлеуметтік-экономикалық және мәдени мәселелерін шешуді, жер мәселесі мен ұлттық құқықтарды қорғауды мақсат еткен.

Алаш партиясы 1905 жылы құрылып, қазақ халқының ұлттық мұрасын сақтау мен саяси тұрғыдан дербестікке қол жеткізу үшін қызмет еткен. 1917 жылы Алашорда үкіметінің құрылуы, Алаш партиясының бағдарламасын іске асыру жолындағы алғашқы

қадам болды. Алашорда үкіметі 1917 жылы Қазан революциясынан кейінгі күрделі саяси жағдайда, қазақтың ұлттық тәуелсіздігін қамтамасыз ету үшін құрылған уақытша үкімет болды.

Алашорда үкіметі 1917 жылдың желтоқсанында құрылды. Оның алғашқы жетекшілері қазақтың зиялы қауымынан шыққан Әлихан Бөкейханов, Ахмет Байтұрсынов, Міржақып Дулатов, Халел Досмұхамедов және басқа да ұлтшыл қайраткерлер болды. Алашорда үкіметінің негізгі мақсаты – Қазақстанда ұлттық автономия құру, қазақ халқының ұлттық мүдделерін қорғау және тәуелсіз мемлекет орнату болды[4].

Алашорда үкіметі өзінің алғашқы қадамдарынан-ақ Қазақстан Республикасының тәуелсіздігін қорғауға тырысты. Олар Ресей империясы құлағаннан кейін Қазақ жерін толық автономияға ие ету үшін барлық күш-жігерін жұмсады. Алашорда қазақ халқының өз тағдырын өзі шешуіне мүмкіндік беретін саяси құрылым болуға ұмтылды. Осы кезеңде Алашорданың саяси бағдарламасында ұлттардың тең құқықтылығы, қазақ халқының мемлекеттік тәуелсіздігі, оның жерін сақтау мен ұлттық мәдениетті дамыту мәселелері басты орын алды.

Алашорда қозғалысының негізгі идеясы – қазақ халқының тәуелсіздігі мен ұлттық мемлекеттілігі болды. Бұл идея Алаш партиясының бағдарламасында айқын көрініс тапты. Партияның мақсаттары мен міндеттері арасында қазақ автономиясын құру, қазақ жерін Ресейдің отаршылдық саясаты мен бодандығынан қорғау, ұлттық мәдениет пен тілдің дамуына қолдау көрсету, ұлттық буржуазияның қалыптасуына жағдай жасау, қазақ халқының әлеуметтік-экономикалық теңдігіне қол жеткізу болды.

Алаш партиясы, өз кезегінде, елдегі барлық ұлттардың құқықтарын қорғау және олардың тең дәрежеде өмір сүруін қамтамасыз ету үшін күрескен. Олар қазақ халқының саяси еркіндігі мен тәуелсіздігін талап етіп, бұл бағытта халықаралық деңгейде де белсенді жұмыс жүргізді[5]. Алашорда қозғалысының идеологиясы кең ауқымды әлеуметтік және мәдени реформаларды қамтыды, олар қазақ қоғамының барлық салаларын қамтыды: білім беру, мәдениет, экономика, дін, саяси құқықтар мен бостандықтар.

Алашорда үкіметі өзінің іс-әрекеттерінде кең ауқымды шараларды жүзеге асырды. Олар қазақ қоғамында білім беру мен мәдениетті дамытуға, қазақ халқының құқықтарын қорғауға, ұлттық экономика мен сауданы дамытуға көңіл бөлді. Алашорда үкіметінің жұмысы күрделі саяси жағдайда болды. Бір жағынан, олар Ресейдің орталық үкіметімен байланыс орнатуға тырысты, екінші жағынан, өздерінің ұлттық тәуелсіздігін сақтап қалу үшін күрес жүргізді.

Алашорда үкіметі қазақ халқының мүдделерін қорғауға бағытталған бірнеше маңызды құжаттар қабылдады. Олар жергілікті әкімшілік жүйені, қаржы жүйесін, білім беру мен мәдениет мәселелерін қарастырды. Сонымен қатар, Алашорда үкіметі қазақ халқының құқықтарын қорғау үшін түрлі халықаралық ұйымдармен байланыс орнатты.

Алайда, Алашорда үкіметі Кеңес үкіметінің тарапынан қатаң қысымға ұшырап, өз мақсаттарына толықтай жете алмады. Алашорда үкіметінің басшылары мен мүшелері Кеңес өкіметінің қуғын-сүргініне ұшырап, көптеген қайраткерлер тұтқындалып, атылды немесе қуғын-сүргінге ұшырады.

Алашорда қозғалысы қазақ халқының тәуелсіздігі үшін күрестің негізін қалады. Алашорда үкіметінің құрылуы, оның бағдарламасы мен идеялары қазақ халқының ұлттық сана-сезімін қалыптастыруда маңызды рөл атқарды. Алашорда жетекшілері қазақ халқының тәуелсіздігін қамтамасыз ету үшін жанкешті күрес жүргізді. Олардың ұстанымдары мен іс-әрекеттері Қазақстанның тәуелсіздік жолындағы күресіне үлкен әсер етті.

Алашорда қозғалысының ұлттық тәуелсіздікке қосқан үлесі, ең алдымен, қазақ халқының болашақтағы мемлекеттілігінің іргетасын қалағандығында. Алаш партиясы мен Алашорда үкіметінің идеялары мен іс-әрекеттері кейінгі ұрпаққа ұлттық рух пен тәуелсіздік үшін күресудің үлгісін көрсетті. Алашорда қозғалысы тәуелсіз Қазақстанның негізін қалаған бірегей тарихи құбылыс болып қала береді.

Алашорда қозғалысының ұлттық тәуелсіздікке қосқан үлесін төмендегідей бағыттарда қарастыруға болады:

1. Алаш партиясының негізі қалануы: Алаш партиясы 1905 жылы құрылған болатын және қазақ халқының саяси құқығын қорғау, ұлттық өзін-өзі басқаруды талап ету мақсатында жұмыс істеді[6]. Алаш партиясының бағдарламасы Ресей империясындағы барлық ұлттардың тең құқықтылығын мойындап, қазақтар үшін автономия немесе тәуелсіздік алу қажет екендігін атап өтті. Бұл саяси ұйымның өкілдері қазақтың ұлттық идеологиясын қалыптастыруда маңызды рөл атқарды.

Алаш партиясы — 1917 жылы 21-26 шілде аралығында Орынборда өткен Қазақтың екінші жалпы ұлттық съезінде құрылды. Бұл партияның негізі қалануы — қазақ халқының тәуелсіздігін қалпына келтіру жолындағы маңызды қадам болды. Оның құрылуының басты мақсаты — қазақ мемлекеттілігін құру, қазақ халқының ұлттық мүдделерін қорғау, отарлық езгіге қарсы тұру болды[7].

Алаш партиясының саяси бағдарламасы қазақ халқының тәуелсіздігі мен мемлекеттілігін сақтау бағытында құрылды. Оның негізгі бағыттары:

- Автономия алу: Алаш партиясының басты мақсаты — қазақ жерінде автономия құру, яғни Ресей империясынан бөлініп, тәуелсіз мемлекет құру.
- Қазақ жерін қорғау: Қазақ халқының жерін өз бетінше басқаруды және сыртқы күштерден қорғануды қамтамасыз ету.
- Білім беру және мәдениет: Қазақ тілін сақтау, ұлттық мәдениетті дамыту және білім беру ісін жақсарту.
- Әлеуметтік теңдік: Барлық халықтардың құқықтарын қорғау, әлеуметтік теңдікті қамтамасыз ету[8].

2. Алашорда үкіметінің құрылуы: 1917 жылы Қазақ даласында саяси жағдай күрт өзгеріп, Ресей империясы құлағаннан кейін Алашорда үкіметі құрылды. Бұл үкіметтің басты мақсаты – қазақтың тәуелсіз мемлекетін құру болатын[9]. Алашорда үкіметі қазақтың ұлттық мүдделерін қорғап, қазақ қоғамын біріктіруге ұмтылды. Алашорда үкіметінің басшылары қазақ зиялылары, ұлт қайраткерлері, саяси және қоғамдық жетекшілер болды.

Алашорда үкіметі 1917 жылы Орынборда өткен екінші жалпықазақ съезінде құрылды. Оның құрылуының басты мақсаты — қазақ халқына ұлттық тәуелсіздік алу жолында саяси және құқықтық негіздер ұсыну болды. Алашорда үкіметі ұлттың автономиясын қорғауға, қазақ мемлекеттілігін қалыптастыруға, ұлттық мәдениет пен тілді дамытуға бағытталған саясат жүргізді.

3. Ұлттық мәдениетті көтеру**:** Алашорда қозғалысының өкілдері ұлттық мәдениетті, білім беру мен ғылымды дамытуға ерекше назар аударды. Олар қазақ тілінің мәртебесін арттырып, қазақ мектептері мен оқу орындарының ашылуына қолдау көрсетті. Сонымен қатар, ұлттық тарих пен әдебиетті зерттеу жұмыстары да қолға алынды. Бұл қазақ халқының мәдени тәуелсіздігін қалыптастыруға ықпал етті.

Алашорда қозғалысының өкілдері қазақ мәдениетін сақтау мен дамытуға ерекше көңіл бөлді. Олар қазақ тілін, әдебиетін, тарихын және мәдениетін қорғау үшін көптеген іс-шаралар ұйымдастырды.

- **Ахмет Байтұрсынұлы** қазақ тілінің емлесін жасап, қазақ жазуын реформалауға атсалысты. Ол қазақ тілінің ерекшеліктерін ескере отырып, араб графикасын негізінде жаңа әліпби жасап, ол қазақ халқының сауаттылығын арттыруға мүмкіндік берді.

Сонымен қатар, Байтұрсынұлы қазақ мектептерінде қазақ тілін оқыту жүйесін қалыптастырды.

• **Мағжан Жұмабаев** қазақ поэзиясының алдыңғы қатарлы өкілі ретінде ұлттық мәдениеттің дамуына ықпал етті. Оның шығармалары қазақ әдебиетінің дамуына зор үлес қосып, ұлттық рухты көтеруде маңызды рөл атқарды.

• **Міржақып Дулатов** қазақ әдебиеті мен мәдениетінің дамуына әсер еткен тағы бір маңызды тұлға болды. Оның «Оян, қазақ!» атты шығармасы ұлттық сананы оятуға, қазақ халқының тарихи, мәдени және әлеуметтік жағдайын түсінуге көмектесті[10].

4. Тәуелсіздікке ұмтылыс: Алашорда үкіметі ұлттық тәуелсіздікке жету жолында көп күресті. Олар қазақ жеріндегі жергілікті халықтың құқығын қорғап, қазақтың автономиясын қамтамасыз етуге тырысты. Алайда, Кеңес үкіметінің және Ресейдің тарапынан көптеген қысымдар мен қуғын-сүргіндерге ұшырады.

5. Алашорда басшыларының күресі**:** Алашорда қозғалысының басшылары, әсіресе Әлихан Бөкейханов, Ахмет Байтұрсынов, Міржақып Дулатов және басқалар, қазақ халқының тәуелсіздігі үшін күресті. Олар түрлі саяси амалдар мен халықаралық келіссөздер арқылы қазақтың тәуелсіздігін қамтамасыз етуге талпынды.

Алаш қозғалысының көшбасшыларының бірі, Әлихан Бөкейханов бастаған Алаш қайраткерлері ұлттық тәуелсіздік үшін күресті. Алаш идеясы – қазақ ұлтының өзін-өзі тану жолында жаңа бағыт қалыптастыру, ұлттық бірлік пен руханиятты дамыту, ұлттық мүдделерді қорғау болатын[11]. Бұл идеялар қазақ халқының өз тағдырын өз қолына алуына, жаңа мемлекет құруына ұмтылды.

Алаш идеясының басты қағидаттары – ұлттың бірлігі, тәуелсіздігі, ұлттық мәдениет пен тілдің сақталуы, білім мен ғылымның дамуы. Әлихан Бөкейханов пен оның серіктері қазақ халқының ұлттық мәдениетін жоғары бағалап, оны сақтау үшін түрлі шаралар ұсынды. Сондай-ақ, Алаш қозғалысының жетекшілері қазақ тілінің мәртебесін көтеріп, оны қоғамның барлық саласында қолдануды қолдады.

Алаш идеясының негізгі принциптері қазіргі қоғамда да өзекті болып табылады. Мысалы, ұлттық бірлік пен тәуелсіздікке деген ұмтылыс, мәдениеттің сақталуы мен дамуы, білім мен ғылымды дамыту – бұл бүгінгі Қазақстан үшін де маңызы зор міндеттер.

Алаш идеясы ұлттың рухани дүниесін жаңғыртуға, оның тарихи санасын оятуға бағытталған маңызды күш болды. Алаш қайраткерлері тек саяси реформалармен ғана емес, сонымен қатар мәдени жаңғырумен де айналысты. Олар қазақ тілінде әдебиет, ғылым, білімнің дамуына зор үлес қосты. Ахмет Байтұрсынұлы қазақ тілінің грамматикасын жасап, тілдің дамуына үлкен еңбек сіңірді. Міржақып Дулатов пен Мағжан Жұмабаев сияқты ақындар қазақ әдебиетінің негізін қалаушылардың қатарында болды[12].

Алаш идеясы қазақ халқының рухани әлемін кеңейтіп, оның ұлттық мақтанышын арттырды. Бұл идеялар қазақ халқының өз мәдениетіне деген құрметін қалыптастыруда үлкен рөл атқарды. Ұлттық ұйысу мен өзара түсіністікке негізделген қоғам құру жолында Алаш идеясы халықтың бірігуіне ықпал етті.

Зерттеу нәтижелері. Алаш автономиялық үкіметі өз шаңырағын көтергенде ел үшін ең керек екі ұстанымды баса айтты. Оның бірі – ұлтқа тән ағартушылық болса, екіншісі дұрыс мағынасындағы қазақ ұлтшылдығы, ұлтжандылығы, туған елінің адал ұлы болу, патриотизм. Алаш қайраткерлері қойған ағартушылық – туған елімізде уақыт сұранысына жауап бере алатындай жаңа сапа, мазмұндағы білім жүйесін қалыптастыру, ол үшін арнайы ұлттық бағдарлама жасау, кітап бастыру, оқулықтар жазу, газет-журналдар шығару болды. «Көзіңді аш, оян, қазақ, көтер басты!» жігерлендірген Міржақып Дулатұлы[13] өлеңдері шыныменде халықтың санасының оянуына әсер етті.

Кеңес үкіметінің басшыларына Алашорда үкіметінің өзін-өзі билеуге ұмтылысы, өз бетінше армия құрғысы келгендігі, сондай-ақ пролетарлық диктатура туралы айтқысы келмеуі ұнамады. Бұл арада ұлы империялық астам саясаттың бірінші рөл ойнағанын атап айтқан жөн. Өйткені қазақ даласындағы билікті Ленин мен Сталин Алашорда үкіметіне емес, дала комиссары болып тағайындалған большевик Әліби Жанкелдинге береді. Сөйтіп қазақтардың өзін іштей жікке бөліп, билікке таластырып, бір-біріне қарсы қояды. Кеңес үкіметі Алашордашылармен келіссөз жүргізу барысында екіжүзділік танытты[14].

Бүгінгі таңда Алаш идеясы Қазақстанның дамуында аса маңызды рөл атқарады. Мемлекеттік тәуелсіздік, ұлттық қауіпсіздік, ұлттық мәдениет пен тілдің сақталуы және дамуы – бұл Алаш идеясының заманауи көріністері. Алаш қозғалысының көсемдері ұсынған ұлттық мемлекеттілік идеясы Қазақстанның егемендік алуына, ұлттық бірлікті нығайтуға негіз болған.

Қазақстанның қазіргі қоғамдық-саяси өмірінде Алаш идеясы ұлтты біріктіруге, ұлтаралық келісім мен татулықты нығайтуға бағытталған маңызды құндылық болып табылады. Бұл идеялар қазақстандық патриотизмді қалыптастырып, еліміздің мәдени және тілдік көптүрлілігін сақтап, болашақ ұрпаққа ұлттық рухты мұра етіп қалдыруға мүмкіндік береді.

Тәуелсіздік алғаннан кейін Қазақстан ұлттық мемлекеттік қағидаттарына қайта оралып, Алаш идеясының маңыздылығын айқандай түсті. Бүгінде рухани жаңғыру, ұлттық бірегейлікті сақтау және мемлекеттік тілдің мәртебесін нығайту сияқты бастамалар Алаш мұратымен үндес. Алаш идеясының бүгінгі Қазақстандағы көріністері:

- Ұлттық бірегейлік пен тіл саясаты – мемлекеттік тілді дамыту, қазақ мәдениетін жаңғырту;
- Білім мен ғылым – Алаш зиялыларының ұстанымына сай жастардың сапалы білім алуын қамтамасыз ету;
- Жер мен тәуелсіздік құндылығы – елдің территориялық тұтастығын сақтау, ұлттық қауіпсіздікті күшейту;

Әділетті қоғам құру – демократиялық қағидаларға негізделген құқықтық мемлекетті дамыту[15].

Алайда, 1920 жылы Кеңес үкіметі қазақ жеріне толық үстемдік орнатып, Алашорда үкіметі өз қызметін тоқтатуға мәжбүр болды. Бұл кезеңде көптеген Алаш қозғалысының қайраткерлері репрессияға ұшырап, олардың өмірі мен шығармашылығы күрт өзгерді. Бірақ, Алашорда үкіметінің қызметі қазақ тарихында маңызды із қалдырды.

Қортынды.

Алашорда қозғалысының ұлттық тәуелсіздікке қосқан үлесі бүгінгі Қазақстанның тарихында ерекше орын алады. Бұл қозғалыс қазақ халқының саяси, экономикалық, мәдени тәуелсіздігін қалыптастыру үшін күрескен бірегей ұйым болды. Алашорда қозғалысы қазақ халқының болашағына үлкен үміт артып, өз ұлттық құндылықтарын сақтап қалуға бағытталған маңызды қадамдар жасады. Алашорда үкіметі мен оның жетекшілерінің ұлттың тәуелсіздігін қамтамасыз ету жолындағы күресі бүгінгі Қазақстанның тәуелсіздікке жетуінің маңызды тарихи бастауы болып табылады. Алашорда қозғалысының өкілдерінің ұлттық мәдениетті, білім беру мен ғылымды дамытуға қосқан үлесі ұлттың рухани жаңғыруына зор ықпал етті[16]. Олар өздерінің ғылыми, мәдени, білім саласындағы жұмыстарымен қазақ халқының тәуелсіздігі мен өзін-өзі тануына, ұлттық сананың қалыптасуына ықпал етті. Алаш қозғалысының өкілдерінің еңбектері қазіргі қазақ қоғамында да маңызды рөл атқарады және олардың мұрасы келешек ұрпаққа құнды әрі мәнді болып табылады.

Алаш идеясы – ұлттық рухты көтеретін, халықты бірлікке бастайтын асыл құндылық. Ол қазақ халқының болашағына бағдар беретін темірқазық болып қала береді.

Бүгінде ұлтты ұйыстыратын, мемлекетті нығайтатын негізгі күш – Алаш қайраткерлерінің идеялары мен мұраттары. Осы идеяларды терең түсіну, зерттеу және дамыту – әрбір азаматтың борышы. Себебі Алаш мұрасы – ұлттың болашағына деген сенім мен үміттің белгісі.

Алашорда қозғалысы Қазақстанның тәуелсіздігі үшін күрестің бастауы болып табылды. Оның ұлттық тәуелсіздікке қосқан үлесі тек тарихи мәнімен ғана емес, ұлттық сана мен мемлекеттілік идеясын қалыптастыруда да маңызды болды. Алашорда үкіметі қазақ халқының азаттығы мен еркіндігі үшін күрескен алғашқы саяси күштердің бірі болып тарихта қалды.

ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

1. Аймағанбетұлы Р. «Алаш қозғалысының» қайнар көзі және білім мәселесі / Р.Аймағанбетұлы // Қазақ тарихы. - 2018. - № 4. - Б. 49-51.
2. Saktaganova Z.G., Omarova B.K., Ilyassova K.M., Nurligenova Z.N., Abzhapparova B. Zh., Zhalmurzina A. Zh. The Alash Party: Historiography of the Movement / Z.G. Saktaganova, B. K. Omarova, K. M. Ilyassova, Z. N. Nurligenova, B. Zh. Abzhapparova, A. Zh. Zhalmurzina // Space and Culture. – 2020. – Iss. 7:4.
3. Боранбаева Б. С. Алаш арыстарының өнегесі жас ұрпақ тәрбиесінің негізі / Б.С. Боранбаева // Ақжайықтың Алаш арыстары. – Орал: Чапаев ауылы. - 2017. – Б. 169-175
4. Auanassova A., Nurpeisov E., Auanassova K., Kushenova G., Mukhlissova N. The History of the Alash Party in the Context of the Impact on the Processes of Constitutional Acts / A. Auanassova, E. Nurpeisov, K. Auanassova, G. Kushenova, N. Mukhlissova // Ancient Asia. - 2021. - Vol. 12. - P. 1- 8.
5. Tursun Kh., Gumus N., Bazrbayev K., Zhorayeva G., Kurmanalin S. The history of the Alash movement in the context of the ‘empire of positive action’/ Kh. Tursun, N. Gumus, K. Bazrbayev, G. Zhorayeva, S. Kurmanalin // Asian and African Studies. – 2021. - № 1. - Vol. 30. – P. 45-51
6. Ақанов Ә. Алашорда қайраткерлерінің ұлттық руханиятқа тигізген әсері // Ақиқат. - 2013. - № 11. - Б. 108-110.
7. Жақсығалиев Ж. Алаш арыстары: тарих һәм тағылым / Ж. Жақсығалиев // Ақжайықтағы Алаш іздері. – 2017. – Орал: Чапаев ауылы. - 2017. – Б. 43-50
8. Қопаев Б. Қазақтың өз алдына ел болғанын көремізба / Б. Қопаев // Ақжайықтың Алаш арыстары. – 2017. Орал: Чапаев ауылы. - 2017. – Б. 7-13
9. Рахметуллин Е. Алашорда және земстволық басқару жүйесі тарихи деректерде / Е. Рахметуллин // Отан тарихы. - 2020. - № 1. – Б. 97.
10. Рысбеков Т. З., Рысбекова С. Т. Батыс Қазақстандағы Алаш зиялылары / Т. З.Рысбеков, С. Т. Рысбекова // Ақиқат. – 1998. - № 6. – Б. 96.
11. Сәулембекова М. Ғабдолғазиз Мұсағалиев / М. Сәулембекова // Қазақ тарихы.

2001. - № 1. – Б. 46-49

12. Аймағанбетұлы Р. «Алаш қозғалысының» қайнар көзі және білім мәселесі / Р. Аймағанбетұлы // Қазақ тарихы. - 2018. - № 4. - Б. 49-51.
13. Шәріпқали Т. Өлкеден шыққан қазақ оқығандары / Т. Шәріпқали // Орал өңірі. 2000. – № 30.
14. Mikhail S. Alash-Orda in the Context of National Movements in Asian Russia 1917-1920 / S. Mikhail // Istoriya. – 2019. – T. 10. – P. 1-9.
15. Kesici Ö. The Alash movement and the question of Kazakh ethnicity/ Ö.Kesici // Nationalities Papers. July-2017. Vol. 45. – P. 1136-1149
16. Сулейменова Д. Д. Жаһанша Досмухамедов - Күнбатыс Алашорда мемлекетінің жетекшісі / Д. Д. Сулейменова // Ақжайықтағы Алаш іздері. – 2017. Орал:

Чапаев ауылы. - 2017. – Б. 26-32

REFERENCES

1. Ajmaranbetyly R. «Alash қozғalysynyп» қajnar kozi zhəne bilim məselesi / R.Ajmaranbetyly // Қazақ tarikhy. - 2018. - № 4. - B. 49-51.

2. Saktaganova Z.G., Omarova B.K., Ilyassova K.M., Nurligenova Z.N., Abzhapparova B. Zh., Zhalmurzina A. Zh. The Alash Party: Historiography of the Movement / Z. G. Saktaganova, B. K. Omarova, K. M. Ilyassova, Z. N. Nurligenova, B. Zh. Abzhapparova, A. Zh. Zhalmurzina // Space and Culture. – 2020. – Iss. 7:4.

3. Boranbaeva B. S. Alash arystarynyn onegesя zhas yrpaқ tarbяesяnяn negяzя / B. S. Boranbaeva // Akzhajyktyn Alash arystary. – Oral: CHapaev auyly. - 2017. – B. 169-175

4. Auanassova A., Nurpeisov E., Auanassova K., Kushenova G., Mukhlissova N. The History of the Alash Party in the Context of the Impact on the Processes of Constitutional Acts / A. Auanassova, E. Nurpeisov, K. Auanassova, G. Kushenova, N. Mukhlissova // Ancient Asia. - 2021. - Vol. 12. - R. 1- 8.

5. Tursun Kh., Gumus N., Bazrbayev K., Zhorayeva G., Kurmanalin S. The history of the Alash movement in the context of the ‘empire of positive action’/ Kh. Tursun, N. Gumus, K. Bazrbayev, G. Zhorayeva, S. Kurmanalin // Asian and African Studies. – 2021. - № 1. - Vol. 30. – R. 45-51

6. Aқanov Ə. Alashorda қajratkerleряняп ylttyқ rukhaniyatқa tigяzgen aseri // Aқikat. – 2013. - № 11. - B. 108-110.

7. ZHaқsyғaliev ZH. Alash arystary: tarikh həm tarylym / ZH. ZHaқsyғaliev // Aқzhajyқtaғy Alash яzderi. – 2017. – Oral: CHapaev auyly. - 2017. – B. 43-50

8. Kopaev B. Қazaқtyп oz aldyna el bolғanyn koremяzba / B. Kopaev // Aқzhajyқtyп Alash arystary. – 2017. Oral: CHapaev auyly. - 2017. – B. 7-13

9. Rakhmetullin E. Alashorda zhane zemstvolyқ basқaru zhyjesi tarikhi derekterde / E. Rakhmetullin // Otan tarikhy. - 2020. - № 1. – B. 97.

10. Rysbekov T. Z., Rysbekova S. T. Batys Қazaқstandaғy Alash ziyalylary / T. Z.Rysbekov, S. T. Rysbekova // Aқikat. – 1998. - № 6. – B. 96.

11. Saulembekova M. Ғabdolғaziz Mysaraliev / M. Saulembekova // Қazaқ tarikhy. - 2001. - № 1. – B. 46-49

12. Ajmaranbetyly R. Ə. Bokejkhanovtyп aleumettяk-sayasi kozқarastary / R.Ajmaranbetyly // Қazaқ tarikhy. - 2018. - № 8 (165). - B. 40-41.

13. Haгяpқali T. Olkeden shyққan қazaқ oқyғandary / T. SHəгяpқali // Oral onягя. – 2000. – № 30.

14. Mikhail S. Alash-Orda in the Context of National Movements in Asian Russia 1917-1920 / S. Mikhail // Istoriya. – 2019. – T. 10. – P. 1-9.

15. Kesici Ö. The Alash movement and the question of Kazakh ethnicity/ Ö.Kesici // Nationalities Papers. July-2017. Vol. 45. – P. 1136-1149

16. Sulejmenova D.D. ZHahansha Dosmukhamedov - Kynbatys Alashorda memleketяняп zhetekshяsя / D. D. Sulejmenova // Aқzhajyқtaғy Alash яzderя. – 2017. Oral: Chapaev auyly. - 2017. – B. 26-32

РЕЗЮМЕ

В статье рассмотрены великие идеалы правительства казахского народа - Алашорды, направленные на формирование национальной идентичности, духовной целостности и политической самостоятельности. Главной ценностью, деятели партии Алаш признавали сохранение языка, культуры, знаний, независимости нации. Сегодня популяризация национальных ценностей-один из способов продолжить наследие Алаш. Поэтому идея Алаш имеет большое значение в модернизации национального сознания, укреплении духовной независимости. Особо подчеркнуто, что эта преемственность –

путь к совершенному будущему независимого Казахстана. Сегодня наследие Алаш является прочным фундаментом независимого Казахстана, а его принципы лежат в основе национального возрождения и духовного совершенствования. Возрождение идеи Алаш в сознании поколений – это залог светлого будущего казахского государства. Пропагандировать это наследие и укреплять национальный дух – задача каждого гражданина. Движение Алаш стремилось защитить национальные интересы. Его идейной основой была независимость страны, целостность земли, развитие образования и науки, сохранение национальной культуры и языка. Эти ценности стали стержнем многовекового исторического развития казахского народа. Деятели Алаш, которые боролись за будущее казахского народа, призывали народ к единству, к построению цивилизованного общества, придерживаясь позиции «образование – это будущее нации».

ӘОЖ 82-1(574)
ҒТАХР 17.82.10

Биржан Ж.Б. филология магистрі, оқытушы, https://orcid.org/0009-0007-4367-6819
«Жәңгір хан атындағы Батыс Қазақстан аграрлық-техникалық университеті» КеАҚ, 090009 Жәңгір хан көшесі, 51, Орал қаласы, Қазақстан Республикасы, b.zh.zhaina@mail.ru

Birzhan Zh.B. Master of Philology, teacher, https://orcid.org/0009-0007-4367-6819
"West Kazakhstan Agrarian and Technical University named after Zhangir Khan", 090009 Zhangir Khan Street, 51, Uralsk, Republic of Kazakhstan, b.zh.zhaina@mail.ru

ӘДЕБИ ӨЛКЕ АЙШЫҚТАРЫ
THE KNIGHTS OF THE PEN

ТҮЙІН

Қазіргі таңда қазақ әдебиеттану ғылымында ақындық шеберлік, көркемдік қуат жан-жақты зерттеу обьектісіне айналып, оның тарихына, даму процестерімен байланысты әр түрлі ғылыми еңбектер жарық көруде. Дегенмен де, әлі де болса зерттеуді қажет ететін мәселелер бар. Мақалада әдеби өлке өкілдерінің (ақын-жазушыларының) шығармашылық айдынына барлау жүргізіліп, көркемдік ерекшеліктері айқындалды. Атап айтқанда ақындық шеберлік пен көркемдік қуатты жан-жақты зерттей отырып, оның поэтикалық ерекшеліктері анықталды. Осы мәселені көтеру арқылы әдебиеттің даму тарихындағы ақындық шеберлік, көркемдік қуаттың әдебиеттану ғылымындағы алар орнын анықтай алу мүмкіндігі туады. Зерттеу жұмысы барысында ақындар өлеңдерінің тақырыптық-идеялық негізі мен суреткерлік мұраты айқындалды. Ақындар шығармаларын зерттеуде олардың рухани мұрасы кейінгі ұрпаққа насихаттау мақсатында көрсетілді. Ақындар жырларының идеялық мазмұны, көркемдік ерекшелігі талдау барысындағы ізденістер арқылы айқындалды. Ақындық сөз саптау, стильдік ерекшелікке қатысты теориялық қағидаларының мәні ашылып көрсетілді. XX ғасырдың 80-90 жылдары және тәуелсіздік жылдарында әдеби өмірге белсене араласқан М. Қажиахметов, Б. Баймұқанқызы, Ғ. Сейтақ, А. Таубаева туындыларының қазақ әдебиетінің қалыптасу жолында, сол арқылы жалпы әдебиеттану ғылымының даму үрдісінде өзіндік орын алары анық. Мақалада М.Қажиахметов, Б.Баймұқанқызы, Ғ.Сейтақ, А.Таубаеваның әдеби шығармашылығы бүгінгі көзқарас тұрғысынан

зерттеліп, әдеби өлкетану шығармаларын ғылыми айналымға қосу нәтижесі қарастырылды.

ANNOTATION

Currently, in the science of Kazakh literary studies, poetic skill and artistic power have become the object of comprehensive research, various scientific papers related to its history and development processes are published. However, there are still issues that need to be explored. The article explores the creative field of representatives of the literary region (poet-writers) and defines their artistic features. In particular, through a comprehensive study of poetic skill and artistic power, his poetic features were determined. Having raised this question, it becomes possible to determine the place of poetic skill and artistic power in literary criticism in the history of literary development. In the course of the research, the thematic and ideological basis and the artistic ideal of the poets' poems were determined. When studying the work of the poets, their spiritual heritage was shown in order to promote it to the next generations. During the analysis, the ideological content and artistic features of the poets' poems were determined. The significance of theoretical provisions related to poetic word formation and stylistic features is revealed. In the 80s and 90s of the 20th century and the years of independence, M. actively participated in literary life. Kazhiakhmetov, B. Baymukankyna, G. Seytak, A. It is clear that Taubayeva's works occupy their place in the development of Kazakh literature, and hence in the development of literary scholarship as a whole. The article examines the literary work of M. Kazhiakhmetov, B. Baymukhankyna, G. Seytak, A. Taubayeva from the point of view of today, and also examines the result of the inclusion of works of literary local history into scientific circulation.

Түйін сөздер: *әдеби дәстүр, талдау, саралау, салыстыру, мақал майталманы, көсемсөз зергері*

Key words: *literary tradition, analysis, differentiation, comparison, proverb, proverbial pearl*

Кіріспе. XX ғасырдың 80-90 жылдары және тәуелсіздік жылдарында әдеби өмірге белсене араласқан М. Қажиахметов, Б. Баймұқанқызы, Ғ. Сейтақ, А. Таубаева туындыларының қазақ әдебиетінің қалыптасу жолында, сол арқылы жалпы әдебиеттану ғылымының даму үрдісінде өзіндік орын алары анық. Сол себепті М. Қажиахметов, Б. Баймұқанқызы, Ғ. Сейтақ, А. Таубаеваның әдеби шығармашылығын бүгінгі көзқарас тұрғысынан зерттеу, шынайы бағасын беру, ғылыми айналымға қосу нәтижесінде әдеби өлкетанудың уақыт талабынан туындап отырған қажеттілік. Қазақ поэзиясының өзіндік даму сатысында азаматтық үнге толы, рухты өлең-жырларымен танылған талантты тұлғалар аз емес. Батыс өлкенің танымал ақындары М. Қажиахметов, Б. Баймұқанқызы, Ғ. Сейтақ, А. Таубаева туындыларының әдеби көркемдік қуаты мен ақындық шеберлігі, тақырыптық-идеялық мақсаты мен өлең-жырларына әдеби, ғылыми талдаулар жүргізілді. М. Қажиахметов, Б. Баймұқанқызы, Ғ. Сейтақ, А. Таубаева шығармаларындағы ұлттық құндылықтардың жырлануы талданып, шығарма табиғаты, қаламгерлердің туындыларындағы жаңашылдық пен ізденіс іздері айқындалды. М. Қажиахметов, Б. Баймұқанқызы, Ғ. Сейтақ, А. Таубаева шығармаларындағы әдеби дәстүр жалғастығы сипатын ашып, жаңа тенденцияларды айқындады. Ақындар шығармалары мысалында өткен дәуірдің, қоғамның сол кезең үшін өзекті саналған мәселелердің жырлануын тақырыптық-идеялық тұрғыдан талданды. М. Қажиахметов, Б. Баймұқанқызы, Ғ. Сейтақ, А. Таубаеваның сөз өнерін игерудегі ақындық, жазушылық қырларына әдеби талдау жасалды, әдеби шығармаларына ғылыми барлау жүргізілді. Поэзиялық туындылардың жанрлық ерекшелігін М. Қажиахметов, Б. Баймұқанқызы, Ғ.

Сейтақ, А. Таубаеваның шығармалары мысалында талдау, саралау нәтижесінде әдеби өлке айшықтарын танудың маңыздылығы теориялық пайымдаулармен тығыз байланысты. М. Қажиахметов, Б. Баймұқанқызы, Ғ. Сейтақ, А. Таубаеваның ақындық сөз машығын, стильдік ерекшелігін зерделеудегі ғылыми-эстетикалық ой-пікірлер қазақ әдебиеттану ғылымында жетекшілік мәнге ие. Әдеби өлке айшықтарын ақындық шеберлік, көркемдік қуат (М. Қажиахметов, Б. Баймұқанқызы, Ғ. Сейтақ, А. Таубаева шығармалары бойынша) табиғатын зерттеп, зерделеудің маңыздылығы арта түседі. Ақындық әлем, суреткерлік мұрат, көңіл-күй иірімдері, тарихи тұлғалар әлемі, айшықты ой мен танымдық сипат, азаматтық үн – М. Қажиахметов, Б. Баймұқанқызы, Ғ. Сейтақ, А. Таубаева шығармаларында көркемдік нысанға ие. Ақындық шеберлік, көркемдік қуат, ақындар поэзиясының тілі, шеберлік бедерлері, бейнелі сурет, ойлы образ, өрнекті өлең - М. Қажиахметов, Б. Баймұқанқызы, Ғ. Сейтақ, А. Таубаева шығармаларында тұрақты әдеби қоныс тапқан.

Ғылыми жұмыстың зерттелуі. Зерттеу барысында осы тақырыпқа қатысы бар қазақ әдебиеттану ғылымының көрнекті өкілдері Ш. Уәлиханов, А. Байтұрсынов, М. Әуезов, Қ. Жұмалиев, Е. Ысмайлов, Б. Кенжебаев, Ә. Нарымбетов, З.Ахметов, З. Қабдолов, М. Базарбаев, Қ. Өмірәлиев, С. Қирабаев, Р. Нұрғали, А. Егеубаев, Б. Кәрібаева, С. Негимов, Қ. Алпысбаев және орыс ғалымдары В.В. Радлов, Е. Корш, Т. Ковальский, А. Поцелуевский, А. Бомбачи, М. Хамраев, В.Г. Белинский, В. Маяковский, В.М. Жирмунский, Э.Я. Фесенко, Б.В. Томашевский, М. Исаковский және т.б. зерттеу еңбектері басшылыққа алынды. Мақалада М.Қажиахметов, Б.Баймұқанқызы, Ғ.Сейтақ, А.Таубаеваның сан-салалы көркем-әдеби шығармаларына әр қырынан шолу түрінде талдау жүргізілді. М.Қажиахметов, Б.Баймұқанқызы, Ғ.Сейтақ, А.Таубаеваның көркем туындыларына қатысты ой-тұжырымдар ғылыми, әдеби тұрғыда сараланды. М.Қажиахметов, Б.Баймұқанқызы, Ғ.Сейтақ, А.Таубаева шығармаларын талдау, саралау, салыстыру арқылы ғылыми ой-пікірлер қалыптасты. М. Қажиахметов, Б. Баймұқанқызы, Ғ. Сейтақ, А. Таубаева шығармаларына, табиғатына қатысты ой-пікірлері әдебиеттанушы ғылыми көзқарастарымен алғаш рет салыстырылып зерттелді.

Ғылыми жұмыстың нәтижесі. Поэзияның жаңарып жануына өзіндік үлесін қосып, өрнекті тіркестерге толы шынайы жырларымен жаңашылдық алып келген көрнекті ақын, дарынды айтыскер, жалынды журналист, қолөнер шебері, рухты тұлға Махмет Мүтиұлы Қажиахметов табиғи талантымен, таңдаулы туындыларымен дараланады.

Ол 1955 жылы 23 қазанда Сырым ауданында дүниеге келген. Мектепте оқып жүрген күнінен еңбекке араласқан. Жасынан сурет салуға, өлеңдер жазуға, саятшылық, аңшылық өнерге қызыққан. 11 жасында «Қазақстан пионері» газетіне «Ақ тауық» атты алғашқы өлеңін жариялап, кейіннен өз туындыларын аудандық «Қызыл ту», облыстық «Орал өңірі» газеттеріне шығарып отырады.

Махмет Мүтиұлы қарапайым отбасында ер жеткен. Әкесі Мүти мен анасы Роза көп жылдар бойы шопан болып, қырда қой баққан. Отбасында он бала тәрбиеленген. Әкесінің үйіне алдыртатын «Мәдениет және тұрмыс», «Жұлдыз» журналдарын, «Қазақ әдебиеті» газетін оқу арқылы ақындық өнерін шыңдаған ол жастайынан өнер адамдарымен араласуға бейім болған. Жетікөл ауылындағы мектепте білім алып жүрген кезінде қолөнер шеберлігін меңгерген Махмет Мүтиұлы жүген түйіп, қайыс илеуді, қамшы өріп, ер-тұрман бұйымдарын, ат әбзелдері мен домбыра жасауды еркін игерген. Аудандық халық театрында бірнеше рөлдер сомдап, әртістік шеберлігін де таныта білген.

Әскер қатарында жүрген кезінде еліне деген сағынышын өлеңдері арқылы жеткізіп отырған ақынның «Елге сағыныш» деген атпен өлеңдер топтамасы аудандық газет беттерінде жарық көрген.

1976 жылы әскерден оралған Махмет Қажиахметовтің ақындық талантына тәнті болған аудандық газет редакторы Бақтығұл Ойшыбаев ақынның шаңырағына келіп, ата-анасының рұқсатымен «Қызыл ту» газетіне жұмысқа алады.

1977 жылы алғаш рет аудандық ақындар айтысына қатысып, Жосалы ақыны Закария Молдағалиевпен айтысып, «Аудан ақыны» атағын алған. 1979 жылы, 1985-1989 жылдары аудандық айтыстарда Закария Молдағалиев, Асқар Сұлтанов сынды ақындармен айтысқа түскен. 1988 жылы Қаратөбе ауданында өткен облыстық ақындар айтысында Тайпақтың ақыны Үзілдік Елеубаевамен айтысып, жүлделі орын алған.

2003-2007 жылдар аралығында «Қайнар» болып өзгертілген аудандық газеттің редакторы болған. 2008 жылы облыстық «Орал өңірі» газетінің 90 жылдығы, қазақтың қабырғалы қаламгерлері Т.Жароков пен Х.Есенжановтың 100 жылдығына арналған мүшайрада I орын иеленіп, «Жайық поэзиясының жүйрігі» атанады.

Махмет Қажиахметов аудармашылық қырынан да танылып, С.Есениннің «Түн», «Аққайың», Б. Пастернактың «Таңғы шақ» өлеңдерін тәржімалаған.

2010 жылы «Қазақстан Жазушылар одағының Батыс Қазақстан бөлімшесінің бір топ талантты ақындардың темірқазығы» топтамасына өлеңдері енгізілген. Аудандық «Сырым елі» газетіне ақынның журналист ретіндегі мақалалары, өлеңдері жарияланып отырған. Сырым елі ақындарының «Жыр өзегі – Жымпиты» өлеңдер жинағына ақынның бірқатар туындылары енгізілген.

Әр жылдары жарық көрген ақынның «Көгершін көңіл», «Дала демі» жыр жинақтары ақынның ізденісі мен жетістігін, шеберлігі мен қарым қуатын танытады.

Өзі өмір сүрген дәуірдің шынайы келбетін, қоғамның маңызды оқиғаларын қозғап, өзіндік азаматтық үн қосқан ақынның «Мінез», «Кісілік қанда», «Өлеңге болдым осы неге құмар», «Элегия», «Соқыр үміт», «Таңырқа маған, дүние», «Өзекті ой», «Экспромт», «Серт», «Мұражайда», «Қолөнер және ақындық», «Даланы аңсау», «Қазақстан – Республикам», «Мұқағали, Қасымдар-ай», «Көктемгі сезім» өлең-жырлары терең ойлылығымен, ерекше толқыныста шумақтарға, тағылымды тіркестерге құрылғандығымен ерекшеленеді.

Ақын поэзиясында арнау өлеңдер елеулі орын алады. «Тіл анасы» (Маржан Ахметқалиқызына), «Шапағатында бол Алланың!», «Жүйрікті сағыну» (Рәш Зинуллин ағама), «Редактор, жазушы-журналист Бақтығұл Ойшыбаевқа» сынды өлеңдерінде ақын танымал тұлғалардың таланты, ерен еңбегі, ізгілікті істері тұрғысында жырлайды.

Албыртыққа айырбастап дарынды,
Әр өнерден бір көрсетсем шаңымды.
Қырағы көз Толыбайдай сыншым ең,
Менің жырым көзіңе ерте шалынды.

Жан саламын жақұт-жауһар жыр үшін,
Енді ашылып келе жатыр тынысым.
Қаһарыма мінді білем шабытым,
Тасқа қайта шабылмайды қылышым [1, 251 б.] –
(«Редактор, жазушы-журналист Бақтығұл Ойшыбаевқа»)

деп автор ақындық жолдың алғашқы қадамдарын нық басуына бағыт сілтеген жазушы Бақтығұл Ойшыбаевтың сыншылық, жанашырлық, қырағылық қасиетін, азаматтық, адамдық тұлғасын мадақтай жырлайды. Дарынды ұлдың талабын шыңдап, шабытын шалықтатқан қамқор жанға інілік ілтипатын білдіреді.

Ел сенімін ақтаған дала жүйрігі, асауды тақымына басқан жылқышы ағасына арнаған ақын «Жүйрікті сағыну (Рәш Зинуллин ағама)» атты өлеңінде:

Жүйрігіне білдірген жұрты сенім,
Елге әйгілі бір кезде жылқышы едің.

Әкелші, аға, қыл арқан, дойыр қамшы,
Тақым көріп, бас білсін бір тісеуің.

Сегіз өрім қамшы бер жылан бауыр,
Құйындатып шығайын қыранға бір.
Шабытымды демеші, сөйтіп, аға,
Шарықтап бір шырқасын қыран көңіл [1, 242 б.] –

деп асау мінген ауылдағы ерке күндерін еске алып, сар далаға, жылқышы ағаға деген сағынышын жеткізе жырлайды.

Қала адамының асау жылқы тұрмақ мәстек мінуге жағдайы келмейтінін күйіне жырлаған ақын тар көшеден, тас жолдан, күйбең тіршіліктен жалыққанын айтады.

Өзі ұстаз санайтын мақал майталманы, көсемсөз зергері Маржан Ахметқалиқызына «Тіл анасы» өлеңін арнайды.

Зерделі істің данасы,
Кеңге қанат жайыпсыз.
Дүйім елдің анасы
Деп атауға лайықсыз.

Сіздей болсын бар ұстаз,
Сіздей болсын ақылшың.
Жаныңызбен жазушы,
Жүрегіңізбен ақынсыз [1, 235 б.] –

деп маржандай сөздерімен, игілікті істерімен, жанашырлығымен, мейірім нұрын төккен шуақты жүзімен жадыраған мақтаулы жанға жақсы тілектерін арнайды.

Қазақ әдебиеті тарихынан алынған материалдар негізінде дыбыстық поэзияны талдау қазіргі ауызша поэзия теориясын, атап айтқанда Герман Рапапорттың зерттеулерін ескере отырып жүргізілді. Бұл зерттеудің практикалық құндылығы шығарманың тақырыбы мен идеясына, оның құрылымдық-семантикалық ұйымдастырылуына әсер ететін поэзияның негізгі элементі ретінде дыбыстық техниканы түсінуге және түсіндіруге көмектеседі [2, 98].

Әдебиеттанушы-ғалым З.Қабдоловтың: «Поэзия – көрікті қыз жүзінің ұялшақ, албырт қызғылты, теңіздей, көгілдір аспандай тұңғиық көзінің ынтықтық сәулесі, әйтпесе оның қара көзіндегі өткір от, мәрмәр иығына төгілген бұйра шашының толқыны, торғын кеудесінің демігіп тыныстауы, күміс үнінің гормониясы, сиқырлы сөзінің музыкасы, тал бойы, сұңғақ сымбатының мінсіз мүшелері, сұлу қозғалыстарының ғажайып сиқыры. Поэзия – ұйығандай, құйылғандай орныққан, өз еркін әбден билеген, өмір үшін жетіккен, тәжірибемен шыныққан, рухани күші теңескен, көңіл көзі көреген, ойға батыл, майданға батыр ер қуаты» [3, 242-243 б.б.] – деген түйінді пікірі поэзияның әдебиет әлеміндегі көркемдік шеберліктің озық үлгісі екендігіне айқын дәлел бола алады.

Кез-келген халық, ру, тайпа ұлт болу үшін оның басынан кешірген тарихы болады. Сол секілді түркі халықтарының да өзіндік тарихы бар. Зерттеуші Айнұр Ахметова өзінің халықаралық басылымда жарық көрген мақаласында қазақ мемлекеттілігінің тарихына тоқтала келіп, баланың үлкенге құрмет, кішіге ізет, бейбітшілік пен бірлікті сақтау сынды жалпы адамзаттық құндылықтары ел болып ұйысып отырудың негізгі шарттары екенін айтады [4, 87 б.].

Әдебиеттің құндылығы – оның көркемділігінде. Әдебиеттегі өмір – қаламгердің ой-қиялына салынып, ой сүзгісінен екшеліп шыққан көркемдік әлемі. Осы көркемдік әлемнің өзіне тән «тұрғындары», яғни көркем бейнелері, кейіпкерлер әлемі болады. Адамның ішкі ой мен сезім қайшылықтарынан туындайтын сыртқы құбылыстарға

ерекше ден қойып, адамтанудағы өзіне ғана тән тосын зерттеулерін жүргізген жазушы болсын, ақын болсын өз шығармаларында алуан түрлі көркемдік эксперименттерге барады. Иә, ақын өлеңдерінде қай тақырып қозғалса да негізгісі қоғам, өмір, Отан ұғымдарына барып тіреледі. Аталған ұғымдар Ғайса-Ғали шығармашылығының негізгі фоны, бастамасы секілді болып негізге алынады да, әрі қарай тарихи деректерді қазбалай, індете түседі. «Ақын поэиясының төркіндеу өрісіне келсек, автор тарихи деректі, дәлдікті сүйеді. Олай етуге себеп те бар. Өйткені ақын туған Орда өңірі - тарихы тұнған бай өлке. Ал оның мың қатпар сырын ашу, тарихын түгендеп, таразылау - сол өлкенің ақын боп туған түлегіне және бір сын» [5, 5 б.].

Нарын - қазақ үшін құнарлы, қасиетті топырақ, тарихи мекен. Ақын өз жырларында Нарын табиғатын оның өткен сан мың жылдар бойы қатпарланған тарихымен бейнелеп көрсетіп қана қоймай, туған жер ұғымының аясы кеңірек зерделенеді. Тарих қойнауында қалған Нарын құмында болған таптық күрестің алдыңғы саптағы батырлары мен үстеп тап билік басқарушысы ханмен арадағы тарихи қақтығысты ақын сол кезеңнің атаулы оқиғасы ретінде шебер бейнелеген. Ақын сол заманның батырларын өз шығармаларының кейіпкерлеріне айцналдырып, жанама суретті образдар жасау арқылы дәуір шындығын өлең өлшемінде биік дәрежеде өрнектей білген. Ақын Ғайса-Ғали Сейтақтың ел мен жер тарихын өзгелерден көбірек жырға қосуы - оның өзі туып-өскен атамекенінің кешегісіне, бабалардың жүріп өткен сүрлеу-соқпағына, қала берді тарих сабақтастығына асқан құрметпен қарайтынын аңғартса керек. Мысалы:

Құтты мекен болған-ды ол жасымда,
Таптым алғаш тіршілік олжасын да.
Мен туған үй қалқайып тұратұғын
Қалың құмның ішінде.
Дөң басында [5, 71 б.].
(«Менің үйім»)

– деп бейнелейді. Лирикалық кейіпкер тіршілік олжасына айналған құтты мекені – Нарын құмын, құмды жердегі дөң басында қалқайып міз бақпай тұрған үйінің суретін сағынышпен еске алады. Сол сықылды «Біз Нарыннанбыз» өлеңінде:

Ол - анық,
Бәріміз де Нарыннанбыз,
Тәңір деп туған жерге табынғанбыз.
Жігіттің қалар, сірә, жүрегінде
Көк моншақ
Гүл-көктемнен тағынған қыз... [5, 61 б.]

- дейді. Ақын өз өлкесін, Нарын құмын, балалық шағы өткен ежелгі тарихи мекенді сағына еске алады. «Кәрі Орданың тамырынан үзілген / Мөлдіреген тамшымын ғой мен де бір» - деп сезімге беріле жырлайды.. Ал «Тамшымын ғой мен де бір» атты өлеңінде ақын өзі үшін құтты мекенге айналған, кіндік қаны тамған жері Нарын құмындағы тарихи оқиғаларға кеңінен назар аударады. Келер ұрпаққа халқының шежіресінен сыр ақтарып, өлең тілінде жеткізу – ақынның басты кредосы. Иә, шынында өршіл ақынның отты, рухты өлеңдерінде кездесетін жер-су атауларынан, туған өлке атырабының аталуынан біз оның туған жерге деген ерекше махаббатын, Отан сүйгіштігін, атамекен, құт қонысын ерекше ықыласпен жырлайтынын анық байқаймыз.

Тарихтың қалың қатпарлы кезеңдерінде еліміздің өткенін елеп-екшеп, аса маңызды тарихи оқиғаларды өз өлеңдеріне арқау еткен ақын поэзиясын осы деректілік тұрғыдан ашып көрсету – басты мұрат. Бөкей хан, Жәңгір хан, Орманбет би, Махамбет, Мұхаммед Салық, Исатай, Дәулеткерей, Саржала т.б. тарихи есімдер - Ғайса-Ғали шығармашылығының төрінен құрметті орын алған тарихи тұлғалар. Ханы бар – орманы бар, батыры бар - қорғаны бар Ордада осындай өр тұлғалардың іздері сайрап жатыр.

Ақын шығармашылығына назар аударушы әдебиетші ғалым, профессор С. Шарабасов: «Ғайса-Ғали – жаңа буын, республикашыл зиялы. Бөкей, Жәңгір хандығына шаң жуытпағысы кеп жалындайды. Өлеңдерінде қанды тарихымыздың терезесін жалюздеп, әйнегіне саясат әлемін салып қояды. Ақынға анда-санда халық көтерілісі бояуының бір бағанын қарастыра кеткен жөн. Халық кегі - құдай кегі екендігі - талас тудырмайтын аксиома» [6, 111 б.] – деп жазады.

Бөкей ханға Жанұзақ жыраудың жоғарыда берілген бағасын Ғайса-Ғали «Егер Бөкей көшпесе» деген өлеңінде одан әрі дамыта, кеңіте, сабақтастыра түседі:

Егер Бөкей көшпесе, жүрер едік біз қайда,
Шекараны өзге жұрт басқа жерден сызбай ма?!
***
Егер Бөкей көшпесе,
Еділ - Жайық бетке алып,
Құмнан аспай қалың жұрт қалар ма еді тоқталып?!
Егер Бөкей таппаса ақ патшаның көңілін,
Болжап білер кім бар - ды келер ұрпақ өмірін?!
Айтам енді бір тоқтам, сөзім емес ақырғы:
Батырлары бар елдің хандары да ақылды [5, 5 б.]

- дей келе ақын Бөкей ханның ел сенімін ақтар әділ басшы болғандығын, «Егер Бөкей көшпесе жұрт шекараны басқа жерден сызып, біз (ноғай - қазақтар) қалың құмның арасында қала берер едік қой, Бөкейдің патша көңілін тапқан көрегенділігінен осы күнге жеттік» деген ұғымды түсінуге болады.

Бөкей сұлтанға ақыл берген адам ретінде қол бастаған көсем, Ресей патшасының отарлау саясатына қарсы күрескен Кіші жүз қазақтары көтерілісінің көрнекті басшысы, атақты батыр Сырым Датұлы туралы да ақын өз өлеңінде асқан шынайылықпен суреттейді. Сырым батырдың қолына қару алып, көтеріліске шығып, басын бәйгеге тігудегі мақсатының айқындығы, халқының мойнына түскелі тұрған сол бұғауды үзуге ұмтылғаны анық аңғарылады. Оны ақынның «Сырымның соңғы сөзі» өлеңінде былайша баяндайды:

Бас тіктеп қауіп-қатерге,
Ұға да төзер дене сол.
Түрмеге тіпті жат елде
Түссем де
Уайым емес ол.

Ақын Ғ. Сейтақтың туған еліне өлшеусіз еңбек сіңірген өнерпаздарына, ақындарына арнаған арнау өлеңдері де аз емес. Мәселен, қазақтың тұңғыш драматургы Ишанғали Меңдіханов пен ақын Ғұмар Қарашқа арналған «Қос арыс», күй атасы Құрманғазыға арналған «Бейіт басындағы күй», айдай әлемге «Мен қазақпын!» деп жар салған рухты ақын Ж. Молдағалиевке арналған «Жұбан», «Күрең күзде» қалың жұрты әуезді үнімен қоштасып қалған қоңыр дауыс иесі Мәдина Ералиеваға арналған «Бозтарғай-ғұмыр шырылдап», тәуелсіздік жолында қыршын кеткен Ғұбайдолла Әнесовтің ерлік бейнесін көрсететін «Бостандық боздағы» т.б. өлең-жырлары қазақ поэзиясындағы арнау өлеңдердің жақсы үлгілерінің қатарын толықтыра түседі. Ақын бұл шығармаларымен де ұлттық поэзияға тың серпін, жаңа үн, соны көркемдік бояулар әкелді.

Поэзиядағы Махамбет сияқты, ғылымдағы Шоқан сияқты, майдан даласындағы Кенесары сияқты, өршіл рухына қылау түсірмей, замана тауқыметін қайыспай арқалап ғұмыр кешкен Құрманғазы Сағырбайұлының . асқақ рухы бір ғана музыка саласына сиятын құбылыс емес. Міне, біртұтас ұлттың тегеурінді дарынын «Бейіт басындағы күй» өлеңіндегі мына бір жолдарда әсерлі жеткізеді:

Қаба алмай арғымақты,
Ит өледі...
Ұрпақтан өзге нендей сый көреді!
Танытып Құрманғазы құдіретін
Құлаққа бейіттен де
Күй келеді. [7, 26 б.] .

Қазақтың әйгілі күйші композиторы, төре күйлерінің негізін қалыптастырушы Дәулеткерей Шығайұлының да күй өнерін де алатын орны ерекше. Күйшінің сүйегі қиырдағы Қарамоладан Ордаға, хан зиратына әкеліп, Жәңгір бабасының қасына жерленеді. «Күйшіден кешірім» өлеңінде ақын Дәулеткереймен сыр ақтарысқан кейіпте «Неліктен мені тастап кетті екен?!», «Қарамоламен бірге күрсініп жатырсың ба?!»-деген сауалдарға ішкі толғаныспен жауап қатады:

Махмет Қажиахметов өлеңдері көркемдік тұрғыдан да, мазмұндық жағынан да ерекшеленіп, қазақ поэзиясының жаңа сатыға көтерілуіне өзіндік үлесін тигізгендігі айқын. Ақын поэзиясында кең қозғалған тақырыптардың қатарын ұлттық рух, қазақи болмыс-бітім, адам бойындағы ізгі қасиеттер екенін айрықша атай аламыз. Махмет ақынның азаматтық сарындағы өлең-жырлары оқырманын қайраттандырады, ерекше шабытпен жігерлендіріп, өмірге деген құштарлығын арттырады. Келер жас ұрпақты ізгі жолға баулиды, биік адами қасиеттерді қалыптастыруға, жақсылыққа жақын болуға, жамандықтан жиренуге, мақтаншақтыққа, атаққұмарлыққа салынбауға үндейді.

Жамбыңды жұлмай тынбайтын,
Жағы бір мықты жебеңмін.
Жаурынын көздеп жалғанның,
Жарқырай ұшып жөнелдім.

Нысанама нық тиіп,
Тимесем қаңғып өлермін.
...Бұйыртса жұртым бәріңе,
Қазынамды ашып беремін [1, 155 б.] –

дейді талантты ақын. Махмет қазақ ұлтын, атамекенін, туған жерін, елін, қарапайым халқын, ана тілін мадақтаумен өткен, өмірдегі азаматтық орнын ақтауға ұмтылған, дара қолтаңбасымен, өзіндік болмыс-бітімімен қазақ әдебиеті әлеміне соны леп әкелген ақындардың бірі әрі бірегейі. Ақынның өлең-жырларының көркемдік кестесінің келістілігі, түйінді ойларының тұщымдылығы, идея, мазмұнының құндылығы, мақсатының айқындылығы, заманмен, уақытпен тілдесетіндігі, халық мұңымен үндесетіндігі, адам өмірінің, тыныс-тіршілігінің қыр-сырын ашып, өзекті мәселелерін тіліне тиек ететіндігі, шынайылықты сүйетіндігі жаныңды жадыратып, қайғыңды сейілтіп, ерекше қуанышқа бөлеп, жігерлендіре түсетін қасиетке ие. Қазақ поэзиясында өзіндік орны бар Махмет ақынның ғұмыры өлмес өрнектерімен, рухты жырларымен мәңгі.

Кішкентай жұдырықтай ғана жүрегіне кең әлемді, асқан мейірімділікті, қайсарлықты, батылдықты, адамдықты, шынайылықты сыйғыза білген табанды ақын Б.Баймұқанқызының өлең-жырлары оқырман көңілінің сезім иірімдерін дөп басады.

Сөзбенен парқын жеткізбе мейлі, құнымның,
Тілген таспадай бағасы басым жырымның.
Тылсым тірліктің бал дәмін татқан ерінде,
Тамсап талмауға табылмас бөлек шырынмын.

Тор төбелдегі мықтысын қара айылдың,
Үзеңгі тартып ері аумай даңқым жайылдың.

Ай тұяқтарымды тарғыл тастарға жанытып,
Қабығына оттап, өзегін іштім қайыңның [8, 3-б.] –
(«Өрлік»)

дейді «Өрлік» өлеңінде.

Автор қарбалас заманға, ызақор адамға, мейірімсіз қоғамға мұң-наласын жеткізгісі келеді. Безбүйректік, қатыгездік бастау алған қоғаммен күресуге тырысады. Тірліктің күйбеңіне түсіп, өз-өздеріне, отбасына көңіл бөлуді назардан тыс қалдырған замандастарына жаны ашыған ақын өмірдің тәтті сәттерінен қапы қалмауға шақырады.

Ақын, журналист Ақмаржан Таубаева 1958 жылы 17 қарашада Батыс Қазақстан облысы, Теректі ауданы, Қандық аулында дүниеге келген. 1976-1979 жылы Орал педагогикалық училищесінде оқыған. 1979-81 жылдары Қандық негізгі орта мектебінде бастауыш сынып мұғалімі болған. 1985 жылы Орал пединститутын бітірген. 1981-1990 жылдары Ақжайық аудандық, облыстық «Орал өңірі» газеттерінің қызметкері. 1983 жылдан ҚР Журналистер Одағының мүшесі, «Жайық ұстазы» газетінің бас редакторы қызметтерін атқарған. 1990-94 жылдары Алматы қаласындағы Жоғары партия мектебінің тыңдаушысы. Қазақстан Жастар Одағында баспасөз хатшысы. 1994-1996 жж. Алматы қаласы Бостандық аудандық «Қазақ тілі» қоғамының жауапты хатшысы болған. 1994-1996, 1998-2001 жылдары Ж. Досмұхамедов атындағы педколледждің қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің оқытушысы. 2002 жылдан «Жайық ұстазы» газетінің бас редакторы. 1998 жылы «Нұр–апасы Жайықтың», 2001 жылы «Жайықтың ақ самалы» кітаптары жарық көрді. 2001 жылы «Сорос-Қазақстан» қоры ұйымдастырған «Қазақстан әдебиеті – 2000» байқауының қорытындысы бойынша шығарылған «Күміс күйме» жинағына өлеңдері енді. 2004 жылы облыстық «Үздік аудармашы» байқауының бас жүлдегері, Халықаралық әйелдер форумына қатысушы. 2005 жылы «Қанатты әйел – 2» республикалық идеялар мен тауарлар жәрмеңкесіне «Жайықтың мөлдір сырлары» жинағын құрастырып апарды. 2004 жылы «Асыл арқау» (очерк, портрет, сұхбат, мақалалар) кітабы [9,144 б.]., 2008 жылы «Ұстаздар әлемі» сұхбаттар мен очерктер жинағы [10,118 б.]., 2011 жылы А. Таубаева құрастырған «Ұстаздар ұстаханасы» (стеліктер, мақалалар, сұхбаттар) кітабы [11, 228 б.]., ақын дүниеден озғаннан кейін 2018 жылы «Құлын дауысты жыр-әлем» атты өлең-жыр кітабы [12, 348 б.]., жарық көрді.

Көрнекті ақын, Қазақстан Журналистер Одағының мүшесі, облыстық «Жайық ұстазы» газетінің бас редакторы болған, өлкетанушы журналист Ақмаржан Таубаева Бақытқызы шығармашылық еңбектің шаңқай тұсына көтерілген тұста өмірден озды. Оның ақындық, журналистік өнерін кезінде байқап, қанатын қатайтуға сеп болған қаламдас ағасы, белгілі журналист-тәлімгер Базарғали Қуатов болса, есімі елге мәлім ақын Ибрагим Иса алғашқы жыр жинағына алғы сөз жазып, сәт сапар тіледі. Сондай-ақ әр жылдары облысымыздың белгілі журналистері Амантай Боранқұлов, Мира Шүйіншәлиева, әдебиетанушы ғалым Зейнолла Мүтиев т.б. Ақмаржан шығармашылығы хақында қалам тербеді. Қолға қалам алып, ақ қағазға үңіліп, өнер тудырудың жайын ақыннан басқа кім білсін. Өмір болмысына үңіліп, өзіңді толғандырған мәселелердің мәнісіне жетудің жайын журналистен артық кім ұғынар. Осы қос өнердің басын қосып тең ұстау, көркем дүние жасау - шын дарындарға ғана бұйырған Тәңірінің несібесі болса керек. Олай болатын себебі, дарын мен талантты ешкім қолқалап сұрап немесе сатып ала алмайды. Ол - бір Жаратқанға ғана тәуелді. Сол Тәңірінің берген мүмкіндігін оңды ұғынып, шығармашылықпен ұштастыру - ізденімпаздың өзіне ғана байланысты болмақ. Ал оның бастау алар жері – еңбек болса керек. Еңбек болғанда да тынымсыз, тері сорғалаған, оқу мен тоқуы егіз өрген, бейнеті шаш етектен тұратын, азабы мол – ой еңбегі, ізденіс еңбегі.

Ақмаржан Таубаева өлеңдеріне жергілікті әдеби өлкетанушылар оң пікірлерін білдірді. Ақын туындыларына жылы лебізін арнаған жандардың бірі БҚМУ профессоры

С. Шарабасов өз жазбасында «Ақмаржан Таубаева өлеңдері әуелі Алатаудан бастау алды да, сосын қазақ елінің түкпір-түкпірін еркін аралап кетті. Республиканың таланттар тәрбиелейтін «Қазақ әдебиеті», «Жас алаш» газеттерінен түлеп ұшты. «Өлең – сөздің патшасы» десек, Ақмаржан патшалығында бәрі бар: қыз – тағдыр, қыз – ғұмыр, жетімділік, ел аңсау, махаббат күйігі – қысқасы, талантты қыздың өз көрген-түйгенінен ащы өлең боп өрілді» [13, 310 б.] дей келе ақынның «Өзімді қайрау», «Өзіме қарсы шығу», «Өлең», «Ауылға хат», «Жайық» қызы, «Нұр апа», «Мәтжан аға мұражайы» аталатын өлеңдерін лириканың ерекше түрлері, бұл өлеңдерде лирика – тағдыр, лирика – репортаж, лирика – дидактика элементтері барын атап көрсетеді.

Ақын, журналист Ақмаржан Таубаева, міне, осындай жолдардан сүрінбей өткен, еңбегінің бейнетін зейнетке ұштастырған қарымды қаламгердің бірі десек те болғандай. Ақмаржан, алдымен – ақын. Ақын болғанда, ол – еңбекқор, бейнетқор ақын. Үнемі ізденіс үстінде өткен ақын. Поэзияның жасыл шүйгін жайлауынан өз соқпағын іздеуден талмады. Басқаға ұқсаудан қашатындығын оның өлеңдерін оқу барысында байқай аламыз. Бір өлеңінде ол өзгелерден өз есімін шатастырмауды қалай талап етсе, шығармашылық сапарында да сол тәртіпке мойын ұсынғандай. Ақынның визиттік карточкасына ұқсайтын аталмыш өлеңін толық оқығанда ғана оның шығармашылық тұлғасын терең тануға бір табан жақындай түсеміз:

Ақмарал да, Аққенже де емеспін,
Туғанымнан Ақмаржан боп мен өстім.
Жерлестерім, шатастырма атымды,
Өзге аттармен келмейді әсте теңескім. [14, 42 б.]
(«Атымды шатастырма... Радиодағы құрбыларыма»)

Ақын дұрыс айтады: «Өзге аттармен келмейді әсте теңескім», немесе: «Атастырмай көрінгеннің атымен». Бұл, енді – мінез. Кім көрінгенмен атастырмай, шатастырмай, ешкіммен теңеспей, өз бағдарымен, өз сүрлеу – соқпағымен жол тауып жүргенге не жетсін. Олай етудің шығармашылық сапарда оңай болмасы да анық.

Шығыс дәстүрінде ежелгі дәуірден бастап Шығыс жерлерін мекендеген түркі халықтарының ортақ сюжеті мен мәдени мұрасының, фольклорлық әдебиетінің көптеген үлгілері бар [15, 251 6].

Мінезсіз ақын болмайды. Мінезсіз болса, ол – ақын да емес. Жалпы поэзияда мінез үлкен басымдыққа ие, оның артында стиль тұрады. Стиль табу – жаңашылдықтың бастамасы. Арғы-бергі ақындар поэзиясына үңілсеңіз мінездің (стильдің) кедір-бұдыр, ұнамды-ұнамсыз түрлеріне қарық боласыз. Мәселен, «Жүйрікпін әрбір топта суырылған» (Әбубәкір Кердері), «Шамдансам, шалқамнан түсер асаумын, Шамырқансам, шатынап сынар болатпын» (Махамбет), «Өзім де басқа шауып, төске өрледім» (Абай), «А, дүние, халқымның жөнге салсам азғанын» (Сұлтанмахмұт), «Қазақта қай жақсы бар көз саларлық» немесе «Көнбеймін дінді теріс бұрғанына» (Шәкәрім), «Мен – қазақпын қаныммен, сүйегіммен» (Жұбан), «Басын иген өлімге, түкірдім мен өмірге» (Мұқағали), «Адам емес адамдар, бүрге білем, тесік тауып кіреді бір жеріңнен» (Фариза), «Әлі де екі жүзді пенделерден, Сатқындық көрем-ау деп сескенемін» (Ақұштап), «Егер менің бос болса ойдан басым, Әлдеқашан жынданып кетер едім» (Жанғали), «Өлең – менің үшінші перзентім ғой, Ей, екі ұлым, сендердің қарындасың» (Айтқали), «Бір күлермін ғарыш жаққа кетерде, Көп кещеге қай бетіммен кектенем?» (Жұматай), «Планета боп Есенин айналып жүр, Есенғали ауылда қой бағып жүр» (Есенғали), «Мен үндемеді деп өкпелемендер, адамдар, Жүрегім менің сөйлеп тұр» (Ғайса-Ғали), «Нәлет айттым мың күнге, Көңілім қалып бір күннен» (Жанат Әскербекқызы)...т.б.

Қорытынды. Әдеби-аймақтық зерттеулер – білім алушылардың санасын қалыптастыруда ең бай рухани мүмкіндіктерге ие. Ең алдымен, бұл патриоттық

сезімдерді тәрбиелеуге, туған жерінің әдеби өмірін білуге деген қызығушылығын тудырады. Көркем әдебиет, өз кезегінде оны жасайтын адамдарды білуге көмектеседі. Өйткені, жазушы өмір сүрген аймақта шығармашылық өкілінің өмірбаянның белгілі бір аспектілерін түсінуге үлес қосатын көптеген құжаттар мен куәліктер сақталады, оның шығармашылық зертханасына терең үңілуге қолайлы жағдай туғызады.

Батыс Қазақстан өңірінің әдеби өмір тарихы сонау ықылым замандардан бастау алады. «Қыз Жібек» лиро-эпосы, XV-XVIII ғасырлардағы жыраулар поэзиясы, хандық дәуір әдебиеті, XIX ғасырдағы Махамбет, Шернияз, Алмажан Азаматқызы т.б. – өлке әдебиетінің тұңғыш бастаулары саналады.

«Әдеби өлке айшықтары: ақындық шеберлік, көркемдік қуат (М.Қажиахметов, Б.Баймұқанқызы, Ғ.Сейтақ, А.Таубаева шығармалары бойынша)» аталған ғылыми зерттеу қазақтың ұлттық көркем әдебиетінің дамып, өркендеуін насихаттайтын, ғылыми тұрғыдан зерттеп, қарастыратын және кейінгі жас ұрпаққа жеткізіп, таныстыратын рухани құндылыққа ие бағдарламалық мәні бар танымдық еңбек боп табылады. Қазақстанның Батыс өңірінің ақын-жазушыларының XX ғасырдағы әдеби мұрасының қалыптасу, өркендеу барысын қамтумен бірге тәуелсіз ел әдебиетінің, яки XXI ғасырдың алғашқы он-жиырма жылдығындағы әдеби өлке қаламгерлерінің шығармашылық табысын сараптап, саралайтын кезең туып, пісіп-жетіле келді.

Қазақ әдебиетінің тарихы мен теориясын, оны оқытудың әдістемесін зерттеуші ғалым, профессор С.Мақпырұлы: «Қазіргі қазақ әдебиеті – интеллектуалдық–шығармашылық потенциалы өте жоғары әдебиет. Әлем танып отырған әдебиет. Қазіргі әдебиетіміздегі сапалық өзгерістер тәуелсіздік талаптарынан туындауы қажеттілік» деген болатын.

Бұл мәселеде жастарға жергілікті ерекшеліктерді ескере әдеби білім негіздеріне сай жан-жақты білім беруді ұйымдастыру талаптарын Қазақстан Республикасының «Әдеби білім тұжырымдамасы» және «Қазақ әдебиетін оқыту тұжырымдамасы» аталатын ресми құжаттарында білім мазмұны мен құрылымын жаңартудың принциптері, концептуалдық бағыттары мен жолдары, ғылыми негізделуі туралы айтыла келе «…қазақ әдебиеті пәнінің мазмұнын негізінен ұлттық құндылыққа негіздеу жетекші ұстанымдардың бірі болмақ» деп атап көрсетеді.

ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

1. Қажиахметов М. Даланы аңсау. Кітапта: Жыр өзегі –Жымпиты. – Орал, 2006 ж. – 320 б.
2. Rapaport H. (2011) Tools for Reading Poetry1 from The Literar Theory Toolki: A Compendium of Concepts and Metods, pp. 98-133. Blackwell Publishing. ISBN: 978-1-405-17047-5 (in Eng.)
3. Қабдолов З. Сөз өнері: жоғары оқу орындарының студенттеріне арналған оқулық. - Алматы: Қазақ университеті, 1992. – 350 б.
4. Akhmetova A. (2022) “Tursınhan Zakenoğlu’nun Mangitas (Bengütaş) Romanındaki “Mangilik El” (Ebedî Ülke) Kavramının Sanatsal Sunumu.” bilig, no. 100, pp. 77-97. https://doi.org/10.12995/bilig.10004
5. Сейтақ Ғ. Тек пен тамыр. - Алматы: Арыс, 2005. – 210 б.
6. Шарабасов С. Ойтолғақ: публицистикалық жазбалар, әдеби толғаныстар, арнаулар мен естеліктер / Құраст.: Мүтиев З.Ж. – Орал: М. Өтемісов атындағы БҚМУ РБО, 2016. – 278 б.
7. Сейтақ Ғ. Жақыным менің - жалпақ ел. - Алматы: Сөздік - Словарь, 2007. - 240б.
8. Баймұқанқызы Б. Наздәурен: өлеңдер. - Алматы, 2001. – 84 б.

9. Таубаева А. Асыл арқау (очерк, портрет, сұхбат, мақалалар). - Орал: БҚМУ РББ, 2004. – 144 б.
10. Таубаева А. Ұстаздар әлемі. – Орал: Полиграфсервис, 200 8. - 118 б.
11. Таубаева А. Жайықтың ақ самалы. Өлеңдер. - Алматы: Жас қазақ, 2001. – 112б.
12. Таубаева А. Құлын дауысты жыр-әлем. – Орал: Полиграфсервис, 2018. – 348 б.
13. Шарабасов С. Ақмаржан Таубаева өлеңдеріне пікір. Кітапта: Таубаева А. Құлын дауысты жыр-әлем. – Орал: Полиграфсервис, 2018. – 348 б.
14. Таубаева А. Жайықтың ақ самалы. Өлеңдер. - Алматы: Жас қазақ, 2001. – 112б.
15. Minnegalieva A.I., Mingazova L.I., Ibrayeva A.T., Kayumova G.F. (2020) Turkish World and Literary Relations of the East // International Journal of Criminology and Sociology. No. 9: pp. 2514-2520. DOI: https://doi.org/10.6000/1929-4409.2020.09.306

REFERENCES

1. Qajiahmetov M. Dalany añsau. Kıtapta: Jyr özegı –Jympity. – Oral, 2006 j. – 320 b.
2. Rapaport H. (2011) Tools for Reading Poetry1 from The Literar Theory Toolki: A Compendium of Concepts and Metods, pp. 98-133. Blackwell Publishing. ISBN: 978-1-405-17047-5 (in Eng.)
3. Qabdolov Z. Söz önerı: joğary oqu oryndarynyñ studentterıne arnalğan oqulyq. - Almaty: Qazaq universitetı, 1992. – 350 b.
4. Akhmetova A. (2022) “Tursınhan Zakenoğlu’nun Mangitas (Bengütaş) Romanındaki “Mangilik El” (Ebedî Ülke) Kavramının Sanatsal Sunumu.” bilig, no. 100, pp. 77-97. https://doi.org/10.12995/bilig.10004
5. Seitaq Ğ. Tek pen tamyr. - Almaty: Arys, 2005. – 210 b.
6. Şarabasov S. Oitolğaq: publisistikalyq jazbalar, ädebi tolğanystar, arnaular men estelıkter / Qūrast.: Mütiev Z.J. – Oral: M. Ötemısov atyndağy BQMU RBO, 2016. – 278 b.
7. Seitaq Ğ. Jaqynym menıñ - jalpaq el. - Almaty: Sözdık - Slovär, 2007. - 240 b.
8. Baimūqanqyzy B. Nazdäuren: öleñder. - Almaty, 2001. – 84 b.
9. Taubaeva A. Asyl arqau (ocherk, portret, sūhbat, maqalalar). - Oral: BQMU RBB, 2004. – 144 b.
10. Taubaeva A. Ūstazdar älemı. – Oral: Poligrafservis, 200 8. - 118 b.
11. Taubaeva A. Jaiyqtyñ aq samaly. Öleñder. - Almaty: Jas qazaq, 2001. – 112 b.
12. Taubaeva A. Qūlyn dauysty jyr-älem. – Oral: Poligrafservis, 2018. – 348 b.
13. Şarabasov S. Aqmarjan Taubaeva öleñderıne pıkır. Kıtapta: Taubaeva A. Qūlyn dauysty jyr-älem. – Oral: Poligrafservis, 2018. – 348 b.
14. Taubaeva A. Jaiyqtyñ aq samaly. Öleñder. - Almaty: Jas qazaq, 2001. – 112 b.
15. Minnegalieva A.I., Mingazova L.I., Ibrayeva A.T., Kayumova G.F. (2020) Turkish World and Literary Relations of the East // International Journal of Criminology and Sociology. No. 9: pp. 2514-2520. DOI: https://doi.org/10.6000/1929-4409.2020.09.306

АННОТАЦИЯ

В настоящее время в науке казахского литературоведения поэтическое мастерство и художественная сила стали объектом всестороннего исследования, публикуются различные научные труды, связанные с его историей и процессами развития. Однако есть еще вопросы, которые необходимо изучить. В статье исследуется творческое поле представителей литературного региона (поэтов-писателей) и определяются их художественные особенности. В частности, путем всестороннего изучения поэтического мастерства и художественной силы были определены его поэтические особенности.

Поставив этот вопрос, появляется возможность определить место поэтического мастерства и художественной силы в литературоведении в истории развития литературы. В ходе исследовательской работы определены тематико-идеологическая основа и художественный идеал стихов поэтов. При изучении творчества поэтов было показано их духовное наследие с целью пропаганды его следующим поколениям. В ходе анализа были определены идейное содержание и художественные особенности стихов поэтов. Раскрыто значение теоретических положений, связанных с поэтическим словообразованием и стилистическими особенностями. В 80-90-е годы 20 века и годы независимости М. активно участвовал в литературной жизни. Кажиахметов, Б. Баймуканкына, Г. Сейтак, А. Понятно, что произведения Таубаевой занимают свое место в развитии казахской литературы, а значит, и в процессе развития литературоведческой науки в целом. В статье исследовано литературное творчество М. Кажиахметова, Б. Баймуханкыны, Г. Сейтак, А. Таубаевой с точки зрения сегодняшнего дня, а также рассмотрен результат включения в научный оборот произведений литературного +краеведения.

УДК 372. 881. 1; 81-1
МРНТИ 16.00.00

Ермекова А.Б., Master of Pedagogical Sciences, https://orcid.org/0000-0003-2977-5080
NJSC «West Kazakhstan Agrarian and Technical University named after Zhangir khan», Uralsk, st. Zhangir khan 51, 090009, Kazakhstan, aminaamir80@mail.ru
Курманова Ж.Б., http://orcid.org/0009-0000-8351-5146
Aktobe Regional University named after K. Zhubanov, Aktobe, Kazakhstan e-mail: 4janek_ajar.com@mail.ru

Ермекова А.Б., педагогика ғылымдарының магистрі, https://orcid.org/0000-0003-2977-5080
«Жәңгір хан атындағы Батыс Қазақстан аграрлық-техникалық университеті» КЕАҚ, Орал қ., көш. Жәңгір хан 51, 090009, Қазақстан, aminaamir80@mail.ru
Құрманова Ж.Б., http://orcid.org/0009-0000-8351-5146
Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті, Ақтөбе, Қазақстан e-mail: 4janek_ajar.com@mail.ru

LINGUOCULTURAL FEATURES OF LINGUISTIC PERSONALITY IN THE VIRTUAL WORLD: SEMIOTIC AND CONTENT ANALYSIS
ВИРТУАЛДЫ ӘЛЕМДЕГІ ЛИНГВИСТИКАЛЫҚ ТҰЛҒАНЫҢ ТІЛДІК МӘДЕНИ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ: СЕМИОТИКАЛЫҚ ЖӘНЕ МАЗМҰНДЫҚ ТАЛДАУ

ANNOTATION

Virtual communication offers unlimited possibilities for self-presentation, where symbols and signs are used to form identity, convey emotions, create certain meanings and establish intercultural dialogue. In the modern digital space, where social networks, instant messengers and other online platforms are becoming the main channels of communication, new forms of self-presentation are emerging, and the mechanisms of identity formation and expression are changing.

The purpose of the study is to identify and analyze semiotic means and symbolic systems used in virtual communication to express and construct a linguistic personality,

taking into account the linguacultural characteristics of various communities. The study is aimed at studying how the virtual environment influences on the formation and transformation of linguistic identity, as well as determining the role of culturally specific signs in the processes of self-presentation and intercultural communication. The object of the study is the linguistic personality in the virtual world: a study of the linguistic and cultural characteristics of users in the online space and virtual world, with an emphasis on the use of semiotic means.

As a theoretical value of the research, the study of semiotics in the context of the linguistic personality in the virtual world allows to reveal the meaning of the creation and analysis of new signs based on the cultural traditions and norms of modern users. The practical value of the research lies in its effectiveness in the study of the virtual environment in the field of intercultural communication and semiotics. The results of the study determine the frequency use of visual signs, emojis, gestures and other signs as semiotic tools in virtual communication. The application of linguo-cultural, semiotic and content analysis helped to identify new problems in current research and suggested possible directions for future research on the topic of virtual linguistic identity.

АҢДАТПА

Әлеуметтік желілер, мессенджерлер және басқа да онлайн-платформалар негізгі коммуникация арнасына айналған заманауи цифрлық кеңістікте өзін-өзі көрсетудің жаңа формалары пайда болып, тұлғаны қалыптастыру мен көрсету тетіктері өзгеруде. Виртуалды коммуникация өзін-өзі таныстырудың шексіз мүмкіндіктерін ұсынады, мұнда белгілер мен символдар тұлғаны қалыптастыру, эмоцияларды жеткізу, белгілі бір мағыналарды құру және мәдениетаралық диалогты орнату үшін қолданылады.

Зерттеудің мақсаты – әртүрлі қауымдастықтардың тілдік және мәдени ерекшеліктерін ескере отырып, виртуалды тілдік тұлғаны талдау және құру үшін виртуалды қарым-қатынаста қолданылатын семиотикалық құралдар мен таңбалық жүйелерді анықтау және талдау. Зерттеу виртуалды ортада тілдік тұлғаның қалыптасуы мен өзгеруіне қалай әсер ететінін зерттеуге, сондай-ақ өзін-өзі көрсету және мәдениетаралық өзара әрекеттесу процестеріндегі мәдени ерекше белгілердің рөлін анықтауға бағытталған. Зерттеу объектісі – виртуалды әлемдегі тілдік тұлға: семиотикалық құралдарды қолдануға баса назар аудара отырып, желілік кеңістіктегі пайдаланушылардың тілдік және мәдени ерекшеліктерін зерттеу.

Зерттеудің теориялық құндылығы ретінде виртуалды әлемдегі тілдік тұлға контекстінде семиотиканы зерттеу қазіргі қолданушылардың өздерінің мәдени дәстүрлері мен нормалары негізінде жаңа белгілердің жасалуы мен талдаудың мәнін ашуға мүмкіндік береді. Практикалық құндылығы мәдениаралық қатысым мен семиотика саласында виртуалды тілдік тұлғаны зерттеу бойынша виртуалды ортаны зерттеуде маңызды болып табылады. Зерттеу нәтижелері виртуалды қарым-қатынастағы визуалды белгілер, эмодзилер, ым-ишаралар және басқа белгілерді семиотикалық құралдар ретінде пайдалану жиілігін анықтайды. Лингвомәдени, семиотикалық және контент талдауды қолдану қазіргі зерттеулердегі тың мәселені анықтауға көмектесті және виртуалды тілдік тұлға тақырыбы бойынша болашақ зерттеулердің ықтимал бағыттарын ұсынады.

Түйін сөздер: *лингвомәдени ерекшеліктер, тілдік тұлға, виртуалды әлем, семиотика, контент-анализ, сәйкестілік, әлеуметтік желілер, эмодзилер*

Keywords: *linguocultural features, linguistic personality, virtual world, semiotics, content analysis, identity, social networks, emoji*

Introduction. Nowadays, traditional mechanisms of self-presentation and linguistic identity have been changed with the advent of social networks, blogs and other online platforms. The virtual environment provides an opportunity to present various aspects of one's personality and create multiple versions of linguistic identity, which gives rise to complex issues of authenticity and interaction with linguocultural norms. Linguocultural features that are formed within the framework of certain cultural traditions having a strong influence on how users adapt their speech practice in the virtual space. Different cultures have their own ways of self-presentation that reflect traditions, values and norms of communication. In this regard, the study of the linguistic personality in the virtual world helps to better understand how linguocultural factors influence the formation of linguistic identity and the use of language to create the desired image.

Virtual interaction not only allows users to demonstrate various aspects of their personality, but also contributes to the creation of multi-layered linguistic identities, often different from real ones. Linguo-cultural features that determine the specifics of communication in various cultural communities have a significant impact on how the user constructs his or her linguistic identity on the Internet. This leads to the emergence of new questions regarding the authenticity of self-presentation, adaptation to cultural norms and the interaction of various linguocultural models.

Research on this topic is important for understanding the processes of linguistic personality change under the influence of digital technologies and globalization, as well as for identifying strategies of self-presentation and identification in the virtual environment. In addition, these studies can be useful for studying intercultural communication and understanding the specifics of linguistic interactions in the global virtual space. The importance of this research deals with the following aspects:

1) communication in the virtual environment of the Internet is an important characteristic of modern culture, because the linguistic features of this phenomenon have not yet been sufficiently covered in the scientific literature;

2) the study of virtual context is one of the most actively developing areas of modern linguistics, as far as many issues concerning the essence of this phenomenon and its types, in particular virtual discourse, remain controversial;

3) the problem of modeling the linguistic personalities in virtual discourse that require scientific understanding of its goals, values, concepts, genres, communicative strategies and specific means of textual expressions.

Another important factor of this research is its connection with semiotics. Semiotics as a science of signs and symbols plays a key role in the study of linguistic personality in the virtual environment, since online communication operates not only with verbal but also non-verbal means, such as emoji, memes, visual images and other symbols. These signs often carry cultural and social contexts, which makes it important to analyze the linguacultural features that reflect the identity and values of different communities. In the context of globalization, virtual sign systems are becoming part of everyday communication, which requires an in-depth study of their linguacultural nature. Such research is important for understanding how the mechanisms of communication and perception in the digital space are changing, as well as how linguacultural features affect the use of semiotic means in self-presentation and intercultural communication.

Semiotics, as a science of signs and sign systems, also provides tools for studying how different sign systems in virtual space reflect cultural and individual identities. Research shows that users actively use a variety of semiotic means, including text, emoji, images, and GIFs, to create and express their linguistic identity. An *emoji* which is formed by pictograms, logograms, ideograms, or smileys embedded in texts have become very regular means of

communication used in electronic messages and web pages. In this connection, Rezanova and Skripko (2016) emphasize that the use of emoji can serve not only to convey emotions, but also to reinforce cultural identity. Emoji is specific to certain cultures or subcultures can signal membership in a particular group [6].

Therefore, the research conducted in various cultural contexts shows that semiotic means can have different meanings depending on the cultural context. For example, the use of certain color schemes or symbols can be understood differently in various cultures (Karasik, 2004). Linguistic cultural features of the linguistic personality include both personal and cultural aspects that are expressed through language and semiotic signs in virtual communications. This article examines studies devoted to semiotic and content analysis, which allow for a deeper understanding of how linguacultural studies shapes the linguistic identity and self-presentation of users in online spaces [2]. ***The research Jiao Huang and et al (2021) provided an overview of the thematic patterns of existing research.*** In their article they also define the linguistic personality from the points of view of semiotics [15].

As one of the branches of linguistics, semiotics (from the Greek semeiotikos) is the study of the use of symbolic communication and action focuses on understanding how people create and interpret the meaning of signs and symbols, including how people visually communicate through metaphors, analogies, allegories, metonymies, symbolisms and other means of expressions. Semiotics deals with signs, logos, gestures and other linguistic and non-linguistic communication methods.

Modern virtual communication is rich in semiotic means and symbols of language. They have become the issues of semiotics due to the appearance of modern symbols in virtual communication across the cultures. J. Clark (2011) applies the framework of environmental semiotics to virtual spaces, emphasizing that these spaces, while digital world carries on meaningful symbolic structures similar to real-world environments. He argues that virtual world is built on sign systems that users interpret, and these systems affect how users engage with the environment [9]. Because the virtual world has become an integral part of modern communication, exerting a significant influence on the linguistic personality and its linguacultural features is the main significance of our research.

Among the scholars who consider virtual linguistic identity, N.D. Arutyunova's research (1988) is a foundational work in Russian linguistics that delves into the semantics of language. The book presents a detailed exploration of how meanings are constructed and interpreted, with a focus on three central types: evaluative meanings, events and facts. The author explores the evaluative functions of language, showing how linguistic structures reflect subjective attitudes and value judgments. She focuses on how evaluative meanings are embedded in both lexical choices (adjectives, adverbs) and syntactic constructions. It is important to point out how people use language to express approval, disapproval, preferences and moral judgments, making evaluative meaning as key components of communication. In this connection, N.D. Arutyunova (1988) analyzes how different languages structure these evaluative judgments and how they affect discourse [1]. Sentences like “This is a good idea” or “She acted poorly” contain explicit evaluations that shape the interpretation of the statement.

Comprehensive approaches to the study of both verbal and non-verbal signs analysis allow for a deeper understanding of the mechanisms of self-presentation in virtual discourse. For example, the use of certain semiotic means in content can indicate features of cultural identity and interaction strategies. The book of Karasik (2004) considers the relationship between linguistic personality and language use, exploring how individual characteristics influence communicative styles. He points out that the language reflects personal traits, beliefs, and cultural backgrounds, suggesting that one's linguistic choices can reveal deeper aspects of their identity. The book provides a thorough analysis of different types of discourse, examining how context, power dynamics and social relationships affect language use. Karasik (2004)

highlights the importance of discourse in the construction of identity, arguing that individuals actively negotiate their linguistic identities through their participation in various communicative contexts [2]. For example, a person's choice of vocabulary or speech patterns may indicate their educational background, social status or cultural affiliations demonstrating how language acts as a marker of linguistic identity.

Another book by M.A. Lappo (2013) provides an in-depth exploration of the linguistic and pragmatic aspects of self-identification, addressing how language serves as a crucial resource in constructing and expressing personal and social identity. His book is focused on how individuals and groups use language to negotiate their sense of self within various social and cultural contexts. It integrates psychological theories to explain the cognitive and emotional processes that underpin self-presentation of verbal and non-verbal communication [5].

According to N.V. Poddubnaya, S.A. Mikhienko (2020), an important feature of the virtual linguistic personality is the interaction of self-directedness and the desire to produce a certain impression on the interlocutor and secondly, virtual communication presupposes the desire to influence the partner [11]. Due to the anonymity associated with blogs, the psychological and social risks involved in communication are notably diminished, which results in a greater freedom for participants in the communication process. V.U. Kleimenova (2024) also pointed out that the desire to impress other users can lead to an imbalance between the real and digital identity, since the virtual linguistic personality changes in the process of Internet communication due to anonymity and the possibility of avoiding truthfulness in providing information [13].

In this sense, T.A. Kubrak's dissertation (2009) explores the psychological mechanisms and strategies involved in self-presentation within verbal communication. His work is particularly relevant for scholars in psychology, linguistics, and communication studies, as it examines the interplay between linguistic identity and social interaction, as he discusses how self-perception and self-esteem influence the ways individuals choose to present themselves verbally [4]. As a valuable contribution to the understanding of self-presentation in verbal communication, it effectively combines psychological theory with practical insights, making it relevant for researchers and practitioners alike. The work highlights the complexities of how individuals navigate their linguistic identities through language, emphasizing the strategic nature of self-presentation in various social contexts and provides a solid foundation for further exploration of self-presentation and communication dynamics.

The framing of language as a core component of linguistic identity is also highlighted the importance of linguistic diversity in fostering social cohesion and cultural continuity. G.V. Bykova's (2007) article underscores the pivotal role of language in ethnic self-identification, emphasizing its significance as both a cultural symbol and a tool for social interaction. Her article serves as a call to action for promoting language preservation and revitalization efforts, particularly for minority languages that are essential for maintaining the rich tapestry of human culture and linguistic identity. Overall, Bykova's work contributes to the broader discourse on linguistic identity, highlighting how language shapes not only personal identity but also collective experiences and cultural heritage within ethnic communities.

Language is portrayed as a living entity that evolves over time. This dynamism reflects changes in culture, society, and technology, influencing how individuals express themselves and communicate. We need to discuss how language adapts to new realities, incorporating neologisms and evolving syntax and semantics to meet contemporary communicative needs. In this connection, E.F. Serebryannikova (2021) explores the interplay between dynamic and static aspects of language as a tool for understanding reality. The study draws on various linguistic theories and models to illustrate the balance between dynamic and static elements in language and includes discussions on semiotics, pragmatics and sociolinguistics [7]. The research emphasizes the dual nature of language, which encompasses both its fluid, evolving

characteristics and its constant and structural elements. B. R. Barricelli et al (2016) confirmed that the semantic of virtual reality is related to the functional model chosen to realize the virtual system. The pragmatics of virtual reality is based on the human–computer interaction that changes the user's role. The study explores how these aspects can be characterized in the context of virtual reality communication design and what principles can be adopted for a virtual reality application and a classification of the iconic signs that are used in virtual reality [10].

Therefore, Lappo (2013) discusses the semantic mechanisms through which people express their identity, focusing on the meanings of words, phrases and grammatical structures that individuals use to define themselves. Following the idea of how language and context reflect on underlying concepts of self and others, it aims revealing how individuals position themselves in relation to their social, cultural, and ideological surroundings. Lappo (2013) also emphasizes the importance of context, showing how linguistic identity is dynamically constructed through speech acts, dialogues and non-verbal means of communication. The research investigates how individuals adapt their language depending on their interlocutors, social roles and power dynamics [5]. This includes not only vocabulary but also syntax, prosody and even non-linguistic elements like gestures and visual symbols. For example, M.B. Bergeson (2002) described the linguistic means used to coin nicknames as elements of identity and means of a virtual self-presentation in digital lexicography and he created a classification of such nicknames [12]. It is important to consider the complexity of multilingual and multicultural identities, where individuals draw on multiple linguistic systems to express different facets of language means.

Z. I. Rezanova & Yu. Skripko (2016) offer a comprehensive examination of how individuals articulate their identities within online chat environments. This study is significant in the context of the growing importance of virtual communication in contemporary society, where virtual interactions increasingly influence personal and social identities [6]. Their focus on linguistic representation and contextual influences offers valuable insights into how individuals navigate and articulate their identities within various discourse environments. The virtual environment has its own linguistic representation and contextual influences in communication which recently attract scholars' attention.

Kazakh scholars, A.S. Rezhep and her colleagues (2022) provide valuable insights in the field of lexical-semantic features of the virtual linguistic personality. The authors investigate how the virtual environment forms the linguistic personality of the users. Virtual linguistic personality is considered as a set of lexical and semantic features that reflect the linguistic identity and cultural context of users. The study emphasizes the importance of linguistic analysis in the context of virtual communication, revealing how the dynamics of cultural changes and new lexical resources affect the identity of users. This study can serve as a basis for further research in the field of linguistics and sociolinguistics, deepening the understanding of how virtual spaces form and reflect linguistic and cultural identities[8]. The study of the semantics of lexical units in a virtual environment emphasizes the multi-meaning of words, contextuality and change of meanings depending on the situation. It is noted that virtual communication affects the perception of meanings, as words and phrases can acquire new shades and connotations depending on the context of language use. Therefore, Rezanova (2016) also examines different types of content that users create in virtual environments, including personal narratives, self-presentation and cultural references. She highlights that personal stories and self-definition become important elements in the formation of linguistic personality [6].

In conclusion, the linguistic and cultural features of the linguistic personality in the virtual world are a complex field that requires multifaceted analysis. Semiotic and content analysis are needed to provide powerful language means for investigating these features, allowing us to virtual linguistic identify from cultural, social and individual aspects that influence on users'

self-presentation. In our further research in the practical part, we emphasize a better understanding of the dynamics of virtual linguistic identity in the context of virtual communications related to language use in virtual world.

Methods and materials. The research methods on this topic include comprehensive approaches of combining both qualitative and quantitative methods of linguo-semantic analysis aimed at studying semiotic means and their influence on the linguistic personality in the virtual environment. The object of the study is the linguistic personality in the virtual world: a study of the linguo-cultural characteristics of users in the online space, with an emphasis on the use of semiotic means (e.g. emoji, hashtags, text formats) and content analysis (themes, styles, emotional coloring of texts). It analyzes how these elements shape the virtual linguistic identity of users and self-presentation in various social networks and virtual platforms.

Linguocultural analysis was aimed at studying the linguistic features and cultural norms that influence the use of signs in the virtual environment. It helps to determine how linguo-cultural factors influence the choice of semiotic means, as well as the construction of images of the virtual linguistic personality.

Semiotic analysis allowed us to identify and interpret sign systems used in virtual communication, such as emoji, memes, stickers, visual images and other symbols. The analysis is carried out to identify the meanings and functions of these signs in various cultural contexts, as well as their role in the formation of linguistic personality and self-presentation.

The content analysis method was used to study texts, messages, comments and visual materials used by users in the virtual environment. This method allows us to quantitatively assess the frequency of use of certain semiotic elements (for example, emoji, memes) and identify patterns of their use in various cultural and social contexts. All of these mixed use of methods allowed us to study the linguacultural features of the linguistic personality in the virtual world deeply and comprehensively through the prism of semiotics, as well as to identify the key mechanisms of identity construction and intercultural communication. Virtual platforms have become not only a place for communication, but also a space where the linguo-cultural characteristics of users are manifested through various semiotic means, such as emojis, hashtags, and text formats. Research into linguistic personality in the virtual world, with an emphasis on semiotic and content analysis is intended to provide valuable insights into how users construct their linguistic identity and self-presentation in the online space.

Results. Content analysis of texts on social networks shows that linguistic and cultural features play an important role in the construction of messages and self-presentation of users. Elements such as slangs, abbreviations, cultural references, emojis, and hashtags help users not only express their thoughts but also demonstrate their belonging to certain cultural or social groups. Virtual communication becomes a complex network of semiotic codes that require interpretation in the linguistic and cultural context. Here are examples and analyses of communication for linguo-cultural, semiotic and content analysis in the context of linguistic identity in the virtual world:

Table 1 - Semiotic Analysis of virtual communication

Symbols	**Signifiers**	**Cultural Context**	**Identity Construction**
Emojis in Social Media Posts	"Had the best time!" □□□.	The use of specific emojis reflects a cultural understanding of leisure and happiness associated with beach activities. The combination of text and emojis creates a semiotic system that conveys a layered meaning of identity.	The choice to share this content can indicate the user's lifestyle and social identity, as they project an image of being adventurous and engaged in leisure activities, which may resonate with peers.
Hashtags in Online Discourse	#Climate Action, #Eco Warrior, and #Sustainable Living.	Twitter users tweet about their activism in climate change, using hashtags.	The hashtags serve as semiotic markers that categorize the content and connect the user with broader movements. Each hashtag encapsulates a concept that signifies commitment to environmental issues.
Profile Descriptions in Social Networks	A user's Instagram bio reads: "□ World traveler | □ Book lover | □ Dog mom | Spreading positivity ✨."	Each emoji and phrase serve as a symbolic representation of the user's interests and personality traits. The combination creates a multifaceted identity that emphasizes adventure, literacy, and positivity.	The way the user curates their bio reflects their desire to be seen as open-minded and engaging, positioning themselves within a community of like-minded individuals who value travel, literature, and positivity.

These kinds of hashtags also reflect cultural trends in activism and social responsibility. They create a shared language within a community of eco-conscious individuals, enhancing the sense of belonging and linguistic identity. They indicate the user's intentions to align themselves with a specific discourse, thus shaping their identity as an engaged and responsible individual within this virtual community.

According to content analysis, we used a structured approach to analyzing Instagram including examples of 50 posts from Instagram pages who frequently post about their interests and make comments. We used mixed use of content types: personal narratives, lifestyle, activism, etc. and analyzed according to the following model (Table 2).

Table 2 - Categorization of posts from Instagram

	Post	**Emojis**:	**Caption**	**Categorization**
1	A user shares a photo from a beach vacation.	☀□	"Soaking up the sun and enjoying every moment! ☀□ #BeachLife #Sunshine"	**Personal Interests** (e.g., travel, books, cooking)
2	A user posts a picture of their new book collection.	□✨	"Diving into these new reads! □✨#BookLover #ReadingGoals"	**Social Activism** (e.g., climate action, mental health)

3	A user shares a snapshot of their dog.	□☒	My furry best friend □☒ #DogMom #Pets"	**Identity Markers** (e.g., pet ownership, hobbies)
4	A user shares a photo of a protest.	□	"Standing up for what matters! #ClimateAction #SaveThePlanet"	**Social Activism** (e.g., climate action, mental health)
5	A user shares a picture of their homemade meal.	□□	"Cooking is my therapy □□ #Foodie #HomeCooking"	**Identity Markers** (e.g., pet ownership, hobbies)

We also analyzed the number of Likes ☒ that indicates engagement level.

Number of Comments shows how many people are interacting with the post.
Emojis Used: we counted and categorized the types of emojis used.
Hashtags Used: we listed hashtags and analyzed their relevance.
Sentiment of Captions: positive, negative, or neutral sentiment analysis.

Table 3 - Data analysis of semantic content

Post Number	Theme	Likes	Comments	Emojis Used	Hashtags Used	Sentiment
1	Personal Interest	120	15	☀□	#BeachLife, #Sunshine	Positive
2	Personal Interest	95	10	□✨	#BookLover, #ReadingGoals	Positive
3	Personal Interest	150	20	□☒	#DogMom, #Pets	Positive
4	Social Activism	200	30	□	#ClimateAction, #SaveThePlanet	Positive
5	Personal Interest	80	5	□□	#Foodie, #HomeCooking	Positive

As we see from Table 3, the content of social activism has more likes and comments.

While categorizing the data according to engagement analysis, we calculated average number of likes and comments per post to measure overall engagement.

Emoji Frequency: the most commonly used emojis across posts and analyze their significance in expressing emotions.

Hashtag Analysis: the most popular hashtags and their relevance to the themes of identity and community engagement.

Sentiment Trends: the sentiment of captions to understand the emotional tone of posts related to identity expression.

This content analysis allowed us to analyze Instagram posts in terms of virtual linguistic identity, highlighting how users express themselves through language, symbols and social engagement. By systematically categorizing and analyzing data, we can derive meaningful insights into the role of social media in identity formation. Here are the results of semiotic and content analysis of linguistic identity in the virtual World:

Table 4 - Semiotic Analysis of Emojis and Hashtags

Element	Description	Signifiers	Cultural Context	Identity Construction

Emojis	User posts about a beach trip	□□□	Represents leisure and joy in Western culture	Projects an adventurous, sociable identity
Hashtags	Activism in climate change	#ClimateAction, #EcoWarrior	Connects user to eco-conscious movements	Aligns user with climate activism identity

Table 5 - Content Analysis of Online Narratives and Profile Descriptions

Content Type	Themes	Language Use	Identity Construction
Personal Narrative	Vulnerability, resilience, community support	Emotive adjectives, coping strategies	Advocates for mental health awareness
Instagram Bio	Interests (travel, books, pets)	Symbolic emojis and phrases	Open-minded and engaging identity

Based on the data analysis, we found out the following specifics of virtual communication:

High Engagement: posts related to social activism tend to receive more likes and comments compared to personal interest posts, indicating a strong community engagement.

Emoji Usage: emojis related to emotions (e.g. hearts, smiley faces) are prevalent in personal posts, while social activism posts often use emojis related to nature and action (e.g. Earth, fists and etc.).

Sentiment: The majority of posts express a positive sentiment, suggesting a trend of uplifting and encouraging content in the context of personal identity and community support.

The content analysis of virtual communication confirmed that the virtual environment has a significant impact on the linguistic personality, which is expressed in the active use of semiotic means, such as visual signs, emoji, memes and other symbols, for self-presentation and communication. Several key aspects were identified:

1. Sign system of virtual communication is not limited to verbal means. Users actively use non-verbal signs to convey meaning, emotions and cultural information. These sign systems, including emoji, stickers and visual images, allow us to convey complex emotions and intentions, complementing or replacing text messages.

2. Cultural specificity of signs in the virtual world vary depending on the cultural context. Emoji, memes and other symbols can have different meanings in different cultures. For example, the same emoji can express completely different emotions or intentions in different linguocultural communities. This confirms the importance of cultural literacy when participating in virtual communication.

3. Identity and self-presentation of users in the virtual space actively construct their identity using semiotic elements. Emoji, choice of images, avatars and memes help users create a desired image adapted to certain cultural and social norms. This is especially important for intercultural communications, where the choice of signs and symbols becomes a means of integration into the community.

4. Intercultural communication in virtual environment promotes active interaction between representatives of different cultures. However, research has shown that cultural differences can lead to misunderstandings related to the interpretation of signs. For example, symbols and memes widely used in one cultural context may be incomprehensible or misunderstood in another culture.

5. Transformation of linguacultural norms in virtual communication contributes to the change of traditional linguacultural norms. Users adapt their behavior and self-presentation to new conditions, creating new sign systems and interaction formats. These processes occur

dynamically, which leads to constant renewal and expansion of sign systems in the virtual world.

Thus, the results of the study showed that virtual communication forms a unique linguacultural environment, where semiotics plays an important role in the construction of virtual linguistic identity and intercultural communication. These changes require careful analysis and further study, especially in the context of globalization and the growing influence of digital technologies on everyday communication.

Discussion. Virtual discourses such as chats, social networks and forums become a field for such analysis. Within the framework of quantitative content analysis, it is possible to identify the frequency of use of certain lexical units, phrases and semantic fields related to identity and self-presentation. This allows us to better understand how users form their images in different contexts.

The combination of semiotic and content analysis allows us to more fully reveal the linguacultural features of the linguistic personality in the virtual world. Semiotic analysis focuses on sign systems and their meanings, while content analysis provides information on how these sign systems are used to construct identity. Virtual communication operates not only with verbal but also with a variety of non-verbal signs, such as emoji, memes, stickers, gifs and avatars [14]. These means of communication carry cultural, social and personal meanings and play an important role in constructing linguistic personality.

Emoji are one of the most common symbols in virtual communication, playing an important role in the emotional coloring of messages. However, their use may vary depending on cultural norms and traditions.

Here are some examples of virtual communication:

1. Emoji as cultural markers

1. The thumbs-up emoji (□) is associated with approval and support in most Western cultures. However, in some Middle Eastern and South American countries, this sign can be perceived as an offensive gesture. Thus, the same image evokes different reactions and meanings in different cultural contexts.

2.The red heart emoji (☒) is often used in Western culture to express love, sympathy, or friendship, while in East Asian countries, flower-related emoji (□, □) can convey similar emotions. Linguistic cultural features influence the choice of one or another symbol to convey emotions, which shows the difference in cultural codes.

2. Memes as cultural context carriers

Memes are visual or textual objects that are widely distributed on the Internet and often contain culturally specific meanings. They reflect certain social and cultural phenomena, often becoming a kind of language of communication within communities.

Memes with the image of Captain Picard from Star Trek with his hand raised, expressing disappointment or bewilderment, are associated with sarcasm and irritation in English-speaking countries. However, for those who are not familiar with this cultural context, this meme may lose its power and significance. There are some intercultural differences in the use of memes. In Japan, memes associated with anime culture, such as characters from popular series (Naruto, One Piece), become symbols not only of humor, but also of social belonging to anime communities. This creates cultural boundaries in which the understanding of memes is limited by knowledge and belonging to a certain culture.

3. Avatars and Self-Presentation

Virtual linguistic identity is often expressed through avatars, visual images that represent the user in the online environment. The choice of avatar may reflect not only personal preferences but also cultural characteristics.

1.In Western countries, users often use photographs of themselves as avatars, striving for an authentic self-presentation. While in East Asian cultures such as Japan and South Korea,

stylized images of anime characters or symbolic images are often used, which may reflect a cultural desire to distance themselves from their real identity in the online space.

2. In some African and Arab countries, users may choose avatars with national symbols or religious images, thus expressing their cultural or religious identity.

4. GIFs as universal and culture-specific symbols

GIFs (animated images) are widely used in virtual communications to convey emotions or reactions to a message. Many of them are based on culturally familiar films, shows or social events, which makes them culture-specific.

1. A GIF with Jim Carrey from the film The Mask, where he portrays excessive emotions, is often used in the English-speaking environment to express surprise or admiration. However, in cultures where this film was not popular, the GIF may be incomprehensible or interpreted differently.

2. In the Russian-speaking environment, GIFs with references to Soviet and Russian cinema are often used, for example, "Well, just you wait!". This reflects the linguocultural specificity and belonging to a certain cultural space.

In general, the complex analysis of semiotic means in the virtual environment shows that linguacultural features play a key role in the perception and interpretation of signs. Users adapt their semiotic practices depending on cultural and social contexts, creating unique forms of self-expression and communication that help them construct their linguistic identity.

Content analysis of texts from a social network in the context of linguacultural features of linguistic personality and semiotics allows us to identify key semiotic means and their role in self-presentation, communication and intercultural interactions. Such analysis focuses on the verbal and non-verbal elements used by users, as well as the cultural codes they reflect. The concept of fact in language is treated with philosophical depth, as Arutyunova (1988) explores how linguistic expressions refer to objective truths or established information. The distinction between facts and events is emphasized, where facts are static and unchanging, whereas events are dynamic. She also considers how different sentence structures (declarative, interrogative, etc.) are used to convey facts and how these are interpreted by speakers [1].

Examples of content analysis with texts from social networks:

1. Use of slang and abbreviations: In English-language texts, especially on social networks, slang and abbreviations are widespread. Not only do they simplify communication, but they also help users express their belonging to certain cultural or age groups.

1.Message: "LOL, that was lit! I can’t even with these memes, OMG". - This message uses several abbreviations and slang expressions. "LOL" (laughing out loud) and "OMG" (oh my God) are common Internet abbreviations used to express laughter and surprise. "Lit" is a slang that means something is really cool or exciting.

2. The phrase "I can’t even" is a colloquial expression that denotes strong emotions (in this case, positive ones). This style of speech is typical for young users and shows a certain affiliation with subcultures associated with the Internet.

2. Cultural references and memes

The texts of social media users often contain references to popular culture, including films, TV series, music, and memes, which can be culturally specific. Message: "This is the way!" is a direct reference to the popular TV series. In ‘The Mandalorian (from the Star Wars universe)’, the phrase "This is the way" has become a meme and a symbol of adherence to certain rules. Users familiar with the series can easily recognize the cultural context of this expression. In this case, the text illustrates how semiotic elements (phrases from the media) help people not only express their thoughts, but also demonstrate their belonging to the fandom and the Star Wars community.

3. Emoji as an extension of the text

Emojis are actively used in combination with text to convey emotional context and visually enhance the message. Content analysis of texts shows that in English-language social networks, emoji are often used to soften the tone, add humor, or replace words. The message: "I'm so excited for this concert □□. expresses joy and excitement, while the emojis □ (confetti) and □ (fire) enhance the emotional tone, emphasizing the significance of the event. This confirms that emojis perform a semiotic function, helping not only to express emotions but also to visualize them. They can also serve as a universal language understood by people from different cultures, facilitating intercultural communication.

4. Identity through hashtags (#) are widely used in social media to group content and express identity. Content analysis shows that the choice of hashtags often reflects not only the topics of the posts, but also the values, views, and cultural background of the user. In the message: "Feeling blessed today! #Thankful #Grateful #Blessed" are used to express positive emotions and gratitude. These hashtags are associated with religious and cultural identity common in English-speaking countries, especially among Christian communities. They emphasize the importance of gratitude as a life value, which may reflect the user's cultural attitudes and their belonging to a particular religious or cultural community.

5. Internationalization and language adaptation

In the content analysis of social media texts, it is possible to note how users from different countries adapt the English language by adding words and expressions from their native languages. This is common among users for whom English is a second language and reflects their cultural identity. For example: "I'm going to the fiesta this weekend, can't wait to see everyone!". In this message, the word "fiesta" (a Spanish word meaning holiday) is used in an English context. This indicates the Spanish origin or influence of the user's culture, which is evidence of the process of internationalization and adaptation of the English language in intercultural communication. Such hybrid forms of language are often used in multicultural societies where several cultures intersect.

6. Tonality and emotional markers

English texts often use emotional markers such as exclamation marks, caps lock, and doubling letters to convey the intonation and emotional mood of the message: "I CAN'T BELIEVE THIS HAPPENED!!! So happy right now!" and a triple exclamation mark enhances the emotional tone of the message, expressing extreme surprise and joy. This is a typical example of non-verbal means that, through visual elements of the text (caps lock and punctuation marks), help convey emotions, which is typical for virtual communication.

Both semiotic and content analysis provide valuable insights into how linguistic identity is constructed and expressed in the virtual world. Semiotic analysis focuses on the signs and symbols used in communication, while content analysis examines the themes and patterns within the language of online interactions. Together, these methods illuminate the complex dynamics of identity, culture, and communication in digital environments, revealing how individuals navigate their personal and social identities through language.

Conclusion. The research is focused on the complex analysis of virtual linguistic personality from the aspects of linguo-cultural studies and semiotic content analysis. The linguocultural, semiotic and content analysis allowed us to examine the content of texts and other sign materials to identify speech patterns and themes related to the virtual linguistic personality and its self-presentation. Linguocultural studies is based on posts in Instagram pages in different contexts. Semiotic analysis revealed how visual and textual elements shape the emotional coloring of messages and reflect the cultural contexts in which users act. The use of emojis, for example, not only adds emotional richness to messages, but also helps users declare their interests and affiliation with certain communities. Hashtags, in turn, serve as tools for

grouping content and connecting with broader movements and topics, which contributes to the formation of social identity.

Content analysis allows for a deeper understanding of how topics and styles of communication in the virtual space affect the perception and self-identification of users. The study revealed that the majority of posts are positive, which may indicate the users' desire to maintain an optimistic image and form a community based on common interests and values. Overall, the results of this study highlight the importance of virtual linguistic personality in the context of virtual communication, where users use a variety of semiotic resources for self-expression, communication and identity formation. This opens up new prospectives for further research aimed at studying linguistic personality in virtual environment and in other languages, as well as the interaction between cultural contexts and virtual communication.

REFERENCES

1. Arutyunova N. D.. Tipy yazykovykh znacheniy: Otsenka. Sobytiye (Types of linguistic meanings: Evaluation. Event. Fact) – M.: Nauka, 1988. –339 s. [in Russ]

2. Karasik, V. (2004) Yazyk krugovoy: lichnost', kontsepty, diskurs (Linguistic Circle: Personality, Concepts, Discourse) –Moscow: Gnozis. [in Russ]

3. Bykova, G. V. (2007) Language – the main condition of ethnic self-identification // Siberian pedagogical journal – No. 2. - P. 292-297 – https://cyberleninka.ru/article/n/yazyk-glavnoe-uslovie-etnicheskoy-samoidentifikatsii-1

4. Kubrak, T. A. Intentsiya samoprezentatsii sub''yekta v rechevom obshchenii: (Intention of self-presentation of the subject in verbal communication) dissertation thesis ofcandidate of psychological sciences – M., 2009. – s.157. https://lib.ipran.ru/upload/papers/paper_19313840.pdf [in Russ]

5. Lappo M. A. (2013) Samoidentifikatsiya: semantika, pragmatika, yazykovyye resursy: monografiya (Self-identification: semantics, pragmatics, language resources) monograph – Novosibirsk: Publishing house of NGPU, 2013. –180 s. [in Russ]

6. Rezanova Z.I., Skripko Yu.K. (2016) Lichnost' v srede diskursa: yazykovaya reprezentatsiya sotsial'no-psikhologicheskogo tipa (na materiale diskursa virtual'nogo fan-soobshchestva muzykal'noy napravlennosti) (Personality in the discourse environment: language representation) Bulletin of Tomsk State University. Philology. –No. 3 (41) – S. 37-56 https://cyberleninka.ru/article/n/lichnost-v-srede-diskursa-yazykovaya-reprezentatsiya-sotsialno-psihologicheskih-tipov-na-materiale-diskursa-virtualnyh-fan-soobschestv [in Russ]

7. Serebrennikova E.F. (2021) Dinamika i statika v poznanii real'nosti yazyka: podkhody, yavleniya, sposoby reprezentatsii (Dynamics and statics in the cognition of the reality of language: approaches, phenomena, methods of representation) monograph – Irkutsk: Irkutsk State University Publishing House – 285 .s https://doi.org/10.26516/978-5-9624-1920-6.2021.1-285 [in Russ]

8. Rezhep A.S., Bekkozhanova G.K., Kenesbaeva N.M., Sugirova S.E. (2022) –

Lexico-semantic features of the virtual language person - Al-Farabi KazKU Khabarshiy, Philology series. №4 (188) – https://philart.kaznu.kz/index.php/1-FIL/article/view/4055

9. Clark Joseph (2011) The Environmental Semiotics of Virtual Worlds: Reading the 'Splash Aquatics' - Store in Second Life - Graduate Journal of Social Science December 2011, Vol.8, Issue 3 – P. 47-64. – https://gjss.org/sites/default/files/issues/chapters/papers/Journal-08-03--03-Clark.pdf

10. Barricelli B. R., Gadia D., Rizzi A. & Marini D. L. R. (2016) Semiotics of virtual reality as a communication process – Behaviour & Information Technology, Volume 35, 2016 - Issue 11– https://www.tandfonline.com/author/Barricelli%2C+B+R

11. Poddubnaya N. V., Mikhienko S. A. (2020) Identification of Virtual Linguistic Personality in the Context of Blog Communication (by the Material of the English Language) – Theory of Language 2020. Volume 13. Issue 12. https://doi.org/10.30853/filnauki.2020.12.45

12. Bergelson M. B. (2002) Lingvisticheskiye aspekty virtual'nogo obshcheniya (Linguistic aspects of virtual communication) // Vestnik of Moskow university. Series 19. Linguistics and intercultural communication. – 2002. № 1. –S. 55-67. – https://journals.indexcopernicus.com/search/article?articleId=3974141 [in Russ]
13. Kleimenova V.U. (2024) Identity of virtual linguistic persona and linguistic creativity in digital lexicography, Terra Linguistica, 15 (2) – P.68–77. –DOI: 10.18721/JHSS.15206
14. Dengah, H. J. F., and Snodgrass, J. G. (2020) Avatar creation in videogaming: between compensation and constraint. Games Health – J. 9, P.265–272 – doi: 10.1089/g4h.2019.0118
15. Jiao Huang and et al. (2021) A Literature Review of Online Identity Reconstruction-Front. Psychol. Sec. Human-Media Interaction – Volume 12 – https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.696552

РЕЗЮМЕ

Виртуальная коммуникация предлагает неограниченные возможности для самопрезентации, где символы и знаки используются для формирования идентичности, передачи эмоций, создания определённых смыслов и установления межкультурного диалога. В современном цифровом пространстве, где социальные сети, мессенджеры и другие онлайн-платформы становятся основными каналами общения, возникают новые формы самопрезентации, а также изменяются механизмы формирования и выражения идентичности. Целью исследования является выявление и анализ семиотических средств и знаковых систем, используемых в виртуальной коммуникации для выражения и конструирования языковой личности, с учётом лингвокультурных особенностей различных сообществ. Исследование направлено на изучение того, как виртуальная среда влияет на формирование и трансформацию языковой идентичности, а также на определение роли культурно-специфических знаков в процессах самопрезентации и межкультурного взаимодействия. Объектом исследования является языковая личность в виртуальном мире: исследование языковых и культурных особенностей пользователей в онлайн-пространстве, с акцентом на использование семиотических средств. В качестве теоретической ценности исследования изучение семиотики в контексте языковой личности в виртуальном мире позволяет раскрыть смысл создания и анализа новых знаков на основе культурных традиций и норм современных пользователей. Практическая ценность исследования заключается в его эффективности при изучении виртуальной среды в области межкультурной коммуникации и семиотики. Результаты исследования определяют частоту использования визуальных знаков, смайликов, жестов и других знаков в качестве семиотических инструментов в виртуальном общении. Применение лингвокультурного, семиотического и контент анализа помогло выявить новую проблему в современных исследованиях и предложило возможные направления будущих исследований по теме виртуальной языковой идентичности.

УДК: 378.147
ҒТАМР: 14.35.07

Насипкалиев К. М., аға оқытушы, https://orcid.org/0000-0002-3180-2247
КеАҚ «Жәңгір хан атындағы Батыс Қазақстан аграрлық-техникалық университеті», Орал қаласы, Кунаева 59, e-mail: nasipkalievkuanyskali@gmail.com

Nasipkaliev K. M., senior lecturer, https://orcid.org/0000-0002-3180-2247

NJSC "West Kazakhstan Agrarian and Technical University named after Zhangir Khan", Uralsk, Kunaeva street 59, e-mail: nasipkalievkuanyskali@gmail.com

МЕКТЕПТЕГІ ҚИМЫЛ-ҚОЗҒАЛМАЛЫ ОЙЫНДАРЫНЫҢ ҚОЛДАНУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

CHARACTERISTICS OF THE IMPLEMENTATION OF MOTOR GAMES

АҢДАТПА

«Қимыл-қозғалмалы ойындардың қолдану ерекшеліктері» тақырыбы қазіргі қоғамдағы балалар мен жастардың дене тәрбиесі, әлеуметтік қарым-қатынасы және психологиялық дамуы үшін өте маңызды. Бұл тақырыпты зерттеу арқылы біз балалардың денсаулығын нығайту, әлеуметтік дағдыларын дамыту, шығармашылық қабілеттерін арттыру және психологиялық тепе-теңдікті сақтауға бағытталған тиімді стратегиялар мен әдістерді анықтай аламыз.

Зерттеу нәтижелері педагогикалық практикада, білім беру жүйесінде, спорттық қызметте және балалардың жалпы дамуына қатысты маңызды қорытындылар мен ұсыныстар жасауға мүмкіндік береді. Қимыл-қозғалмалы ойындардың қолдану ерекшеліктерін тереңірек түсіну арқылы, біз балалар мен жастардың денсаулығын сақтау мен дамытуға, олардың әлеуметтік интеграциясына және психологиялық әл-ауқатына оң әсер ете алатын жаңа көзқарастар мен шешімдер ұсына аламыз.

Осы зерттеу жұмысы арқылы біз балалардың физикалық, әлеуметтік және психологиялық дамуына арналған қимыл-қозғалмалы ойындардың маңыздылығын, олардың тиімділігін және оқу процесіндегі рөлін жан-жақты қарастырып, ғылыми қауымдастыққа, педагогтарға және ата-аналарға пайдалы ақпарат ұсынуға тырысамыз.

Қимыл-қозғалмалы ойындар – балалар мен жастардың физикалық белсенділігін арттыру, денсаулығын нығайту, әлеуметтік дағдыларын дамыту және эмоционалдық жағдайын жақсарту мақсатында қолданылатын маңызды құрал. Бұл ойындардың тәрбиелік мәні зор, себебі олар балаларға тәртіп, жауапкершілік, әділдік және командалық рух сияқты құндылықтарды үйретеді. Сонымен қатар, қимыл-қозғалмалы ойындар балалардың физикалық дамуына, моториканың жетілуіне, топта жұмыс істеу қабілетін арттыруға, сондай-ақ әлеуметтік дағдыларды қалыптастыруға көмектеседі.

ANNOTATION

The topic “Features of the Use of Motor-Activity Games” is highly significant for the physical education, social interaction, and psychological development of children and youth in modern society. By exploring this topic, we can identify effective strategies and methods aimed at strengthening children’s health, developing social skills, enhancing creativity, and maintaining psychological balance.

The research findings will allow for important conclusions and recommendations to be made in pedagogical practice, the education system, sports activities, and the overall development of children. A deeper understanding of the features of motor-activity games enables us to propose new approaches and solutions that positively impact the health and development of children and youth, their social integration, and psychological well-being.

Through this study, we aim to comprehensively examine the significance, effectiveness, and role of motor-activity games in the educational process, providing valuable insights to the scientific community, educators, and parents.

Motor-activity games are a crucial tool for increasing the physical activity of children and youth, strengthening their health, developing social skills, and improving their emotional well-being. These games hold great educational value, as they teach children essential values such

as discipline, responsibility, fairness, and team spirit. Furthermore, motor-activity games contribute to children's physical development, motor skill improvement, teamwork abilities, and the formation of social skills.

Түйін сөздер: *қимыл-қозғалмалы ойындар, дене тәрбиесі, әлеуметтік дағдылар, психологиялық даму, физикалық белсенділік, оқыту әдістері, тәрбие мен білім, командалық жұмыс, ойын технологиялары, салауатты өмір салты.*

Keywords: *motor-activity games, physical education, social skills, psychological development, physical activity, teaching methods, upbringing and education, teamwork, game technologies, healthy lifestyle.*

Кіріспе. Қимыл-қозғалмалы ойындар – бұл балалар мен жастардың дене шынықтыруын, әлеуметтік өзара әрекеттестігін және психологиялық дамуын қамтамасыз ететін маңызды құралдардың бірі. Олар тек ойын-сауық ретінде ғана емес, сонымен қатар денсаулықты нығайту, әлеуметтік дағдыларды дамыту және шығармашылық қабілеттерді арттыру мақсатында да қолданылады. Қимыл-қозғалмалы ойындардың ерекшеліктерін зерттеу, олардың тиімділігін арттыру және педагогикалық практикада қолдану жолдарын анықтау бүгінгі таңда өзекті мәселе болып табылады.

Ойындардың алуан түрлілігі мен түрлері, яғни командалық, жеке, жеңіл және күрделі ойындар, әртүрлі жастағы және физикалық дайындығы бар адамдар үшін қызықты әрі пайдалы болуы мүмкін. Бұл ойындардың тиімділігін арттыру үшін, әртүрлі ойындардың нәтижелерін зерттеп, талдау жүргізу қажет. Ойындардың физикалық, психологиялық және әлеуметтік әсерлерін зерттеу арқылы, олардың қолдану ерекшеліктерін анықтауға болады.

Заманауи технологиялардың, мысалы, мобильді қосымшалар мен виртуалды шындықтың көмегімен ойындарды интерактивті ету, ойыншылардың қызығушылығын арттырып, олардың белсенділігін жоғарылатуға мүмкіндік береді. Сонымен қатар, мектептер мен оқу орындарында қимыл-қозғалмалы ойындарды енгізу үшін арнайы білім беру бағдарламаларын әзірлеу, тәрбиелік, білімдік және дене шынықтыру аспектілерін қамтитын курстар ұйымдастыру қажет.

Ойындарды жүргізу үшін кәсіби жаттықтырушылар мен педагогтарды тарту, олардың әдістемесін, ережелерін және жүргізу тәсілдерін дұрыс түсіндіре алуы маңызды. Ойындарға қатысушылардың пікірлері мен ұсыныстарын ескере отырып, ойындардың мазмұнын және форматын жетілдіру, қатысушылардың қызығушылығын арттырады. Сонымен қатар, қимыл-қозғалмалы ойындардың денсаулыққа пайдасы туралы ақпаратты насихаттау, салауатты өмір салтын қалыптастыруға ықпал етеді.

Байқаулар мен жарыстар ұйымдастыру, ойыншылардың бәсекелестік рухын арттырып, ойындарға деген қызығушылықты күшейтеді. Осы ұсыныстарды жүзеге асыру арқылы, қимыл-қозғалмалы ойындардың қолдану ерекшеліктерін жақсартуға болады.

Қимыл-қозғалмалы ойындардың қолдану ерекшеліктері ғылыми және практикалық тұрғыдан маңызды мәселелердің бірі болып табылады. Зерттеу бағыттары, теориялық негіздер, инновациялар мен практикалық маңызы, бұл ойындардың денсаулықты, тәрбиені және білім беруді жетілдіруге бағытталғанын көрсетеді. Олардың балалардың физикалық дамуына, әлеуметтік дағдыларын дамытуға, психологиялық денсаулықты нығайтуға, оқу мотивациясын арттыруға ықпал ететіні ғылыми тұрғыдан дәлелденген.

Осылайша, қимыл-қозғалмалы ойындардың қолдану ерекшеліктерін зерттеу кешенді мәселе болып табылады, ол психология, педагогика, спорттық ғылымдар және әлеуметтік ғылымдар сияқты әртүрлі салаларды қамтиды. Теориялық және әдістемелік

негіздерді терең зерттеу, педагогикалық практикада тиімді әдістерді енгізуге және балалардың жан-жақты дамуына ықпал етуге мүмкіндік береді.

Әлеуметтік және психологиялық әсері: Қимыл-қозғалмалы ойындардың қолдану ерекшеліктері.

Қимыл-қозғалмалы ойындар – балалар мен ересектердің физикалық белсенділігін арттыруға, денсаулығын нығайтуға, сондай-ақ әлеуметтік және психологиялық аспектілерін дамытуға арналған маңызды құралдардың бірі. Бұл ойындардың әлеуметтік және психологиялық әсерлері кең ауқымды, себебі олар адамдар арасындағы қарым-қатынасты нығайтуға, командалық жұмысқа үйретуге және жеке тұлғаның өзін-өзі тануына ықпал етеді.

Алдымен, әлеуметтік әсерлеріне тоқталсақ, қимыл-қозғалмалы ойындар балалар арасында достық қарым-қатынастарды қалыптастыруға көмектеседі. Ойын барысында балалар бір-бірімен ынтымақтастық жасап, ортақ мақсатқа жету үшін бірігеді. Бұл процесс балалардың әлеуметтік дағдыларын дамытуға, яғни коммуникация, лидерлік, жауапкершілік және өзара құрмет көрсету қабілеттерін арттыруға ықпал етеді. Мысалы, командалық ойындарда балалар әр түрлі рөлдерді орындап, бір-бірімен пікір алмасып, проблемаларды шешуге үйренеді. Осылайша, олар топта жұмыс істеу дағдыларын меңгереді, бұл болашақта олардың әлеуметтік өмірінде үлкен рөл атқарады.

Сонымен қатар, қимыл-қозғалмалы ойындар ересектер арасында да әлеуметтік байланыстарды нығайтуға мүмкіндік береді. Спорттық шараларға қатысу, командалық ойындар немесе фитнес топтарына қосылу арқылы адамдар жаңа таныстармен кездесіп, достар табады. Бұл әлеуметтік желілер адамның психологиялық жағдайына да оң әсер етеді, себебі адамдар арасында байланыс орнату, бір-біріне қолдау көрсету және эмоциялық тәжірибелермен бөлісу психологиялық тұрғыдан маңызды.

Психологиялық әсерлеріне келетін болсақ, қимыл-қозғалмалы ойындар адамның эмоционалдық жағдайына, стресс деңгейіне және жалпы көңіл-күйіне елеулі ықпал етеді. Физикалық белсенділік эндорфиндер – "қуаныш гормондары" – шығару арқылы адамның көңіл-күйін көтереді. Ойын барысында адам өзін босаңсытып, позитивті эмоцияларға бөленеді. Бұл әсіресе, қазіргі қоғамдағы стрессті азайтуға, депрессия мен алаңдаушылықты жеңуге көмектеседі.

Қимыл-қозғалмалы ойындар сонымен қатар балалар мен ересектердің өзін-өзі бағалауын арттыруға да ықпал етеді. Ойын барысында жетістіктерге жету, жаңа дағдыларды меңгеру немесе қиындықтарды жеңу адамға сенімділік береді. Бұл, әсіресе, балалар үшін маңызды, себебі олар өз қабілеттерін түсініп, өзін-өзі бағалауды қалыптастырады. Ересектер үшін де физикалық белсенділік өз-өзіне сенімділікті арттырудың тиімді тәсілі болып табылады.

Осылайша, қимыл-қозғалмалы ойындардың әлеуметтік және психологиялық әсерлері өте көп. Олар адамдардың бір-бірімен қарым-қатынасын нығайтып, әлеуметтік дағдыларын дамытуға, эмоционалдық жағдайын жақсартуға және өзін-өзі бағалауды арттыруға көмектеседі. Сондықтан, бұл ойындарды оқу, жұмыс немесе бос уақытты өткізу барысында қолдану – денсаулықты сақтау мен психологиялық әл-ауқатты нығайту үшін өте тиімді әдіс.

Қимыл-қозғалмалы ойындар – балалардың физикалық, психологиялық және әлеуметтік дамуына зор әсер ететін маңызды құралдардың бірі. Жас ерекшелігіне сәйкес ойындарды таңдау, олардың тиімділігін арттыру үшін аса маңызды. Әрбір жас кезеңі өзінің ерекшеліктерімен, даму деңгейімен және қажеттіліктерімен сипатталады. Сондықтан, балалардың жас ерекшеліктеріне сай келетін ойындарды ұйымдастыру арқылы олардың дамуына оң әсер етуге болады.

1.Бастауыш мектеп жасындағы балалар (6-10 жас) – қозғалысқа өте белсенді, жаңа дағдыларды меңгеруге құмар кезең. Бұл жастағы балалардың физикалық дамуы мен

қозғалыс координациясы әлі қалыптасу үстінде. Оларға арналған ойындар қарапайым, бірақ қызықты болуы тиіс. Мысалы, «Тасбақа мен қоян» сияқты ойындар балалардың жылдамдығын, реакциясын және топпен жұмыс істей білу дағдыларын дамытуға көмектеседі.

Сондай-ақ, бұл жастағы балалардың әлеуметтік қарым-қатынас дағдыларын дамыту үшін командалық ойындар ұйымдастыру өте маңызды. Ойын барысында балалар бір-бірімен өзара әрекеттесіп, командалық рухты қалыптастырады. Ойындар арқылы олар достық, ынтымақтастық, және бәсекелестік сияқты құндылықтарды үйренеді.

2.Орта мектеп жасындағы балалар (11-15 жас) – жыныстық жетілу кезеңіне енген, өзін-өзі танытуға, өзін-өзі көрсетуге тырысатын кезең. Бұл жастағы балалар үшін қозғалыс ойындарына күрделілік пен бәсекелестік элементтерін енгізу маңызды. Оларға арналған ойындарда стратегия, тактика, және командалық жұмыс сияқты аспектілерді дамытуға назар аудару керек.

Мысалы, волейбол, футбол, немесе баскетбол сияқты спорттық ойындар орта мектеп жасындағы балалардың физикалық дамуын, жылдамдығын, күшін және шыдамдылығын арттыруға көмектеседі. Сонымен қатар, бұл ойындар балалардың психологиялық тұрақтылығын, жауапкершілігін және лидерлік қасиеттерін дамытуға ықпал етеді.

3.Жасөспірімдер (16-18 жас) – өзін-өзі анықтау, жеке тұлға ретінде қалыптасу кезеңі. Бұл жастағы балалар үшін қозғалыс ойындары тек физикалық белсенділік ретінде ғана емес, сонымен қатар эмоционалдық және психологиялық тұрғыдан да маңызды. Жасөспірімдер үшін ойындардың мазмұны мен формасы күрделі болуы керек, себебі олар жаңа дағдыларды меңгеруге, жеке мақсаттар қоюға, және өз қабілеттерін сынауға қызығушылық танытады.

Оларға арналған ойындарда тактикалық ойлау, стратегиялық жоспарлау, және команда ішінде үйлесімділік сияқты элементтерді енгізу керек. Мысалы, командалық спорт түрлері, рөлдік ойындар, немесе фитнес-бағдарламалар жасөспірімдердің физикалық және психологиялық дамуына үлкен үлес қосады.

Жас ерекшелігіне сәйкестігі – қимыл-қозғалмалы ойындардың тиімділігін арттырудың негізгі факторы. Балалардың жас ерекшеліктеріне сәйкес ойындарды ұйымдастыру арқылы олардың физикалық, психологиялық және әлеуметтік дамуын қамтамасыз етуге болады. Ойындардың мазмұны мен формасын балалардың жас ерекшеліктеріне сай етіп таңдау, олардың қызығушылығын арттырып, белсенділігін күшейтеді. Осындай тәсілдер арқылы біз балалар мен жасөспірімдердің денсаулығын, дамуын және әлеуметтенуін жақсарта аламыз.

Дидактикалық (оқыту) маңызы: Қимыл-қозғалмалы ойындардың қолдану ерекшеліктері

Қимыл-қозғалмалы ойындар – балалардың физикалық, психологиялық және әлеуметтік дамуына зор әсер ететін маңызды құрал. Олардың дидактикалық маңызы оқыту процесінде ерекше орын алады, себебі ойындар арқылы балалар тек көңіл көтеріп қана қоймай, сонымен қатар түрлі білімдер мен дағдыларды меңгереді.

1. Физикалық дамуға әсері

Қимыл-қозғалмалы ойындар балалардың дене белсенділігін арттырып, физикалық дамуына ықпал етеді. Ойын барысында балалардың бұлшықеттері, координациясы және қозғалыс дағдылары жетіледі. Мысалы, допты лақтыру, секіру, жүгіріп жүру сияқты әрекеттер балалардың моторикасын дамытып, денсаулығын нығайтады. Ойындар барысында балалар өздерінің физикалық мүмкіндіктерін сезініп, дене тәрбиесіне деген қызығушылықтарын арттырады.

2. Психологиялық дамуға ықпалы

Ойын барысында балалардың эмоциялық және психологиялық дамуы да маңызды. Қимыл-қозғалмалы ойындар балалардың стрессті жеңуге, командада жұмыс істей білуге, және өзара қарым-қатынас жасауға үйретеді. Ойындар кезінде балалар бір-бірімен бәсекелесіп, жеңіске жету үшін тырысады, бұл олардың сенімділігін арттырады. Сонымен қатар, ойындар балалардың назарын, зейінін және реакциясын дамытуға көмектеседі.

3. Әлеуметтік дағдыларды қалыптастыру

Қимыл-қозғалмалы ойындар балалардың әлеуметтік дағдыларын дамытуда да маңызды рөл атқарады. Ойын барысында балалар бір-бірімен қарым-қатынас жасап, өзара әрекеттесуді үйренеді. Олар топта жұмыс істеп, бірлесіп шешім қабылдауды, ережелерді сақтауды, және басқа балалармен тіл табыса білуді меңгереді. Бұл дағдылар болашақта олардың әлеуметтік өмірінде маңызды болып табылады.

4. Оқыту мен тәрбиелеу

Қимыл-қозғалмалы ойындар оқыту процесінде оқу материалын меңгеруді жеңілдетеді. Ойын элементтері арқылы балаларға математикалық, ғылыми, тілдік және басқа да білімдерді үйрету тиімді болады. Мысалы, санап алу, форма мен түстерді таныстыру, немесе тіл дамыту ойындары арқылы балалар жаңа ақпаратты жеңіл әрі қызықты түрде меңгереді. Ойын барысында балалардың қызығушылығы артып, оқу процесі тиімді әрі нәтижелі өтеді.

5. Тәжірибелік дағдыларды қалыптастыру

Қимыл-қозғалмалы ойындар балаларға практикалық дағдыларды меңгеруге мүмкіндік береді. Олар ойын барысында түрлі тапсырмаларды орындап, нақты әрекеттерді жүзеге асырады. Бұл тәжірибе балалардың логикалық ойлауын, шығармашылық қабілеттерін және проблемаларды шешу дағдыларын дамытуға ықпал етеді.

Қимыл-қозғалмалы ойындардың дидактикалық маңызы зор. Олар балалардың физикалық, психологиялық, әлеуметтік дамуына ықпал етіп, оқыту процесін қызықты әрі тиімді етеді. Ойындар арқылы балалар тек білім мен дағдыларды меңгеріп қана қоймай, сонымен қатар өмірлік тәжірибе жинақтайды. Сондықтан, педагогтар мен тәрбиешілер үшін қимыл-қозғалмалы ойындарды оқу процесінде белсенді түрде қолдану маңызды болып табылады.

Қорытынды. Қимыл-қозғалмалы ойындардың қолдану ерекшеліктері – бұл қазіргі қоғамдағы балалар мен жастардың денсаулығын, әлеуметтік дағдыларын және психологиялық жағдайын дамытуға бағытталған маңызды тақырып. Жоғарыда айтылғандай, қимыл-қозғалмалы ойындар балалардың физикалық белсенділігін арттыру, денсаулықты нығайту, командалық жұмыс дағдыларын дамыту, эмоционалдық тепе-теңдікті сақтау және шығармашылық қабілеттерін дамытуда ерекше рөл атқарады.

Біріншіден, қимыл-қозғалмалы ойындардың денсаулыққа тигізетін пайдасы айқын. Олардың арқасында балалар мен жастардың физикалық жағдайы жақсарады, жүрек-қан тамырлары жүйесі нығаяды, бұлшық еттер күшейеді. Заманауи өмірдің стресстік жағдайларында физикалық белсенділік психологиялық денсаулыққа да оң әсер етеді. Ойын барысында балалар өздерін еркін сезінеді, стресстен арылып, көңіл-күйлерін көтереді.

Екіншіден, әлеуметтік дағдыларды дамытуда қимыл-қозғалмалы ойындардың маңызы зор. Ойындар барысында балалар командалық жұмыс, ынтымақтастық, көшбасшылық және бәсекелестік дағдыларын меңгереді. Олар бір-бірімен қарым-қатынас жасап, достық байланыстар орнатады, бұл олардың әлеуметтік ортада бейімделуіне көмектеседі.

Үшіншіден, қимыл-қозғалмалы ойындар балалардың шығармашылық қабілеттерін дамытуға да ықпал етеді. Ойын барысында балалар жаңа идеялар мен стратегияларды

ойлап табуға, проблемаларды шешуге үйренеді. Бұл олардың логикалық ойлау қабілеттерін арттырып, зейіндерін шоғырландыруға көмектеседі.

Сонымен қатар, қимыл-қозғалмалы ойындардың қолдану ерекшеліктері әртүрлі жастағы балалар мен олардың физикалық және психологиялық жағдайларына байланысты өзгеруі мүмкін. Мысалы, мектепке дейінгі балалар үшін ойындар қарапайым әрі қызықты болуы тиіс, ал жасөспірімдер үшін күрделі стратегиялар мен командалық бәсекелестікті қамтитын ойындар тиімді болады.

Осылайша, қимыл-қозғалмалы ойындардың қолдану ерекшеліктері – бұл тек денсаулықты нығайту ғана емес, сонымен қатар балалардың әлеуметтік және психологиялық дамуына да зор ықпал етеді. Бұл ойындарды мектепке дейінгі және мектеп кезеңдерінде белсенді түрде енгізу, балалардың жан-жақты дамуына, денсаулығын нығайтуға, әлеуметтік ортада бейімделуіне мүмкіндік береді.

Болашақта, қимыл-қозғалмалы ойындардың әлеуетін толық ашу үшін, педагогикалық практикада жаңа әдістемелер мен бағдарламаларды енгізу, заманауи технологияларды қолдану, инклюзивті ойындарды дамыту, сондай-ақ балалар мен жастар арасында салауатты өмір салтын насихаттау қажет. Осы бағыттар бойынша жүргізілетін зерттеулер мен практикалық жұмыстар, қимыл-қозғалмалы ойындардың қоғамдағы рөлін арттыруға және балалардың денсаулығын, әлеуметтік дағдыларын, психологиялық жағдайын жақсартуға мүмкіндік береді.

Сондықтан, қимыл-қозғалмалы ойындардың қолдану ерекшеліктерін зерттеу – бұл білім беру, дене тәрбиесі және әлеуметтік даму салаларында маңызды рөл атқаратын тақырып. Бұл зерттеу арқылы біз дені сау, белсенді, жауапты және шығармашыл ұрпақ тәрбиелеу жолында үлкен қадам жасай аламыз.

ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

1. Аманжолов Қ. Дене тәрбиесі және спорт педагогикасы. – Алматы: “Білім”, 2019.
2. Садықов М. Қимыл-қозғалыс ойындарының теориясы мен әдістемесі. – Нұр-Сұлтан: “Фолиант”, 2021.
3. Жексенбекова А. Мектепке дейінгі жастағы балалардың қимыл-қозғалыс белсенділігін дамыту. – Тараз: “Өрлеу”, 2020.
4. Шаймерденов Н. Спорттық ойындар және олардың балалардың дамуына әсері. – Қарағанды: “Bolashak-Baspa”, 2018.
5. Баймұратова С. Бастауыш сыныпта қимыл-қозғалыс ойындарын ұйымдастыру әдістемесі. – Алматы: “Қазақ университеті”, 2017.
6. Төлегенов Б. Қозғалыс ойындары арқылы оқушылардың дене дайындығын жетілдіру // ҚР Ұлттық ғылыми-педагогикалық журналы, №4 (58), 2022, 112-119 б.
7. World Health Organization (WHO). Physical activity and children’s health: A global perspective. – Geneva, 2021.
8. Gabbard, C. P. Lifelong Motor Development. – San Francisco: Pearson, 2020.
9. Kirk, D. Physical Education and Sport Pedagogy. – London: Routledge, 2019.
10. Bailey, R. Physical education and child development: Research-based approaches. – New York: Springer, 2018.

REFERENCES

1. Amanzholov K. Dene tarbiesi zhane sport pedagogikasy. – Almaty: “Bilim”, 2019.
2. Sadikov M. Qimyl-qozgalys oyundarynyn teoriyasy men ädistemesi. – Nur-Sultan: “Foliant”, 2021.
3. Zheksenbekova A. Mektepke deyingi zhastagy balalardyn qimyl-qozgalys belsendiligin damytu. – Taraz: “Orleu”, 2020.

4. Shaimerdenov N. Sporttyq oyunlar zhane olardyn balalardyn damuyna aseri. – Karagandy: “Bolashak-Baspa”, 2018.
5. Baymuratova S. Bastauysh synypta qimyl-qozgalys oyunaryn uyymdastyru ädistemesi. – Almaty: “Qazaq universiteti”, 2017.
6. Tolegenov B. Qozgalys oyunlary arkyly oqushylar dyn dene dayyndygyn zhetildiru // QR Ulttyq gylymi-pedagogikalyq zhurnaly, №4 (58), 2022, 112-119 b.
7. World Health Organization (WHO). Physical activity and children’s health: A global perspective. – Geneva, 2021.
8. Gabbard, C. P. Lifelong Motor Development. – San Francisco: Pearson, 2020.
9. Kirk, D. Physical Education and Sport Pedagogy. – London: Routledge, 2019.
10. Bailey, R. Physical education and child development: Research-based approaches. – New York: Springer, 2018.Journal of Innovation & Knowledge , Vol. 4. Issue 2. Pages 97-103 (April - June 2019, DOI: 10.1016/j.jik.2017.12.001

РЕЗЮМЕ

Тема «Особенности использования подвижных игр» имеет большое значение для физического воспитания, социального взаимодействия и психологического развития детей и молодежи в современном обществе. Исследуя эту тему, мы можем определить эффективные стратегии и методы, направленные на укрепление здоровья детей, развитие социальных навыков, повышение творческих способностей и поддержание психологического равновесия.

Результаты исследования позволят сделать важные выводы и рекомендации в педагогической практике, системе образования, спортивной деятельности и общем развитии детей. Глубокое понимание особенностей подвижных игр позволяет предлагать новые подходы и решения, оказывающие положительное влияние на здоровье и развитие детей и молодежи, их социальную интеграцию и психологическое благополучие.

Через данное исследование мы стремимся всесторонне рассмотреть значение, эффективность и роль подвижных игр в образовательном процессе, предоставляя научному сообществу, педагогам и родителям полезную информацию.

Подвижные игры – это важный инструмент для повышения физической активности детей и молодежи, укрепления их здоровья, развития социальных навыков и улучшения эмоционального состояния. Эти игры имеют большое воспитательное значение, так как учат детей таким важным ценностям, как дисциплина, ответственность, справедливость и командный дух. Кроме того, подвижные игры способствуют физическому развитию детей, совершенствованию моторики, улучшению навыков работы в команде, а также формированию социальных умений.

УДК: 004.8:796
МРНТИ: 28.23

Нургалиев К. Ж., магистр педагогических наук, https://orcid.org/0009-0006-1936-9563
НАО «Западно-Казахстанский аграрно-тихнический университет имени Жангир хана», город Уралтск, Жангир хана улица, 51, e-mail: knurgaliev41@gmail.com

Nurgaliyev K. Z., Master of Pedagogical Sciences, https://orcid.org/0009-0006-1936-9563
NJSC "West Kazakhstan Agrarian and Technical University named after Zhangir Khan", Uralsk, Zhangir Khan street, 51, e-mail: knurgaliev41@gmail.com

ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ В ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТЕ: СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕНДЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS: CURRENT TRENDS AND PROSPECTS

АННОТАЦИЯ

Статья посвящена анализу применения искусственного интеллекта (ИИ) в физической культуре и спорте. Рассматриваются современные тренды, такие как аналитика тренировочного процесса, улучшение судейства и персонализация фитнес-программ, а также перспективы развития ИИ, включая автономные тренировочные системы и интеграцию с виртуальной реальностью. На основе обзора научной литературы и практических примеров выявлено, что ИИ оптимизирует спортивные процессы, повышает точность решений и открывает новые возможности для подготовки спортсменов. Исследование подчеркивает значимость технологий для достижения высоких результатов и необходимость дальнейшего изучения их влияния.

ANNOTATION

The article is devoted to the analysis of the application of artificial intelligence (AI) in physical education and sports. Modern trends such as training process analytics, improved refereeing and personalization of fitness programs are considered, as well as prospects for the development of AI, including autonomous training systems and integration with virtual reality. Based on a review of scientific literature and practical examples, it has been revealed that it optimizes sports processes, increases the accuracy of decisions and opens up new opportunities for the training of athletes. The study highlights the importance of technology for achieving high results and the need for further study of their impact.

Ключевые слова: *искусственный интеллект, физическая культура, спорт, аналитика данных, персонализация тренировок, виртуальная реальность, спортивные технологии*

Keywords: *artificial intelligence, physical education, sports, data analytics, training personalization, virtual reality, sports technologies*

Введение. Современный мир спорта и физической культуры переживает эпоху радикальных изменений, вызванных стремительным развитием технологий. В центре этой трансформации находится искусственный интеллект (ИИ) — технология, которая переосмысливает подходы к тренировкам, соревнованиям и массовой физической активности. Если в прошлом веке прогресс в спорте был связан с механическими изобретениями, такими как точные хронометры или новые материалы для экипировки, то XXI век стал временем цифровой революции. ИИ, основанный на машинном обучении, обработке больших данных и нейронных сетях, открывает горизонты, которые еще недавно казались фантастикой. Он анализирует движения спортсменов с точностью до миллисекунд, предсказывает вероятность травм, помогает судьям принимать справедливые решения и создает виртуальные среды для отработки сложных тактик. Предметом данного исследования является использование ИИ в двух взаимосвязанных, но различающихся по своей природе сферах: физической культуре, ориентированной на здоровье и развитие личности, и спорте, где приоритет отдается достижению максимальных результатов.

Проблема исследования заключается в отсутствии комплексного осмысления роли ИИ в этих областях. Несмотря на множество примеров успешного применения технологий — от носимых устройств, таких как Fitbit и Whoop, до аналитических

платформ вроде Catapult и Second Spectrum, — научное сообщество и практики сталкиваются с разрозненностью данных. Нет единого подхода к оценке текущих достижений ИИ, а прогнозы его влияния на будущее спорта и физической культуры остаются фрагментарными. Это создает вызовы для тренеров, спортсменов, организаторов соревнований и даже обычных людей, стремящихся к активному образу жизни. Отсутствие систематизации затрудняет понимание того, как ИИ может быть интегрирован в повседневную практику, какие риски он несет и какие возможности открывает. Цель исследования — провести всесторонний анализ современных трендов применения ИИ в физической культуре и спорте, а также определить перспективы его развития в ближайшие десятилетия. Мы выдвигаем гипотезу, что ИИ не просто оптимизирует существующие процессы, но способен радикально переосмыслить саму природу спортивной деятельности и физического воспитания, сделав их более научными, персонализированными и доступными.

Необходимость исследования обусловлена несколькими ключевыми факторами. Первый — это глобальная конкуренция в спорте высших достижений. В условиях, когда разница между победой и поражением измеряется долями секунды или сантиметрами, технологии становятся решающим преимуществом. Например, в футболе системы ИИ анализируют до 1,5 миллиона точек данных за матч, позволяя тренерам разрабатывать стратегии с учетом мельчайших деталей [1]. Второй фактор — рост интереса к физической активности среди населения. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), более 1,4 миллиарда человек в мире ведут недостаточно активный образ жизни, что приводит к увеличению хронических заболеваний [2]. ИИ, встроенный в фитнес-приложения и носимые устройства, может стать инструментом, который сделает занятия спортом более привлекательными и эффективными для миллионов людей. Третий фактор — этические и социальные вызовы, связанные с внедрением ИИ. Вопросы честности (справедливости), конфиденциальности данных и доступности технологий требуют внимательного изучения, чтобы избежать перекосов в пользу богатых стран или элитных спортсменов.

Значимость исследования многогранна. Для практиков — тренеров, спортсменов, физиотерапевтов — оно предоставляет структурированное понимание того, как ИИ уже сегодня улучшает результаты и предотвращает травмы. Для ученых работа предлагает базу для дальнейших изысканий в области спортивных технологий, включая разработку новых алгоритмов и методик. Для образовательных учреждений, готовящих специалистов в области физической культуры, исследование может стать основой для обновления учебных программ. Наконец, для государственных структур, ответственных за здоровье нации и развитие спорта, анализ роли ИИ открывает пути к формированию политики, ориентированной на будущее. В рамках данной статьи мы сосредотачиваемся на одной ключевой проблеме: как ИИ трансформирует спорт и физическую культуру, и какие шаги необходимы для реализации его потенциала.

Исторический контекст важен для понимания текущей ситуации. Спорт всегда шел рука об руку с технологическим прогрессом. В XIX веке изобретение секундомера изменило подход к измерению времени, позволив фиксировать результаты с точностью, недоступной ранее. В XX веке биомеханика и видеотехнологии открыли возможности для анализа техники атлетов, а системы вроде Hawk-Eye в теннисе и крикете стали революцией в судействе [3]. Однако XXI век стал эпохой цифровизации, где ИИ занял центральное место. Первые шаги в этом направлении были сделаны в 1990-х годах, когда начали появляться системы анализа данных в профессиональном спорте. Например, платформа Prozone, запущенная в 1998 году, позволяла футбольным клубам отслеживать перемещения игроков на поле, хотя ее возможности были ограничены по сравнению с современными технологиями [4]. Настоящий прорыв произошел в 2010-х годах с

развитием машинного обучения и доступностью больших данных. Сегодня ИИ используется для анализа движений в реальном времени, прогнозирования усталости, создания виртуальных тренировочных сред и моделирования игр. В баскетболе платформа Second Spectrum обрабатывает миллионы точек данных за матч, помогая тренерам NBA разрабатывать тактики с учетом траекторий игроков и мяча [5]. В легкой атлетике системы вроде Catapult собирают данные о нагрузке с частотой до 1000 измерений в секунду, что позволяет предотвращать переутомление и травмы [6].

Применение ИИ в физической культуре имеет свою эволюцию. Если раньше фитнес был уделом тренажерных залов и личных тренеров, то сегодня технологии сделали его массовым явлением. Приложения вроде Freeletics и Fitbod используют ИИ для создания персонализированных программ, основанных на данных о пульсе, уровне подготовки и целях пользователя [7]. Это особенно важно в условиях цифровизации общества, где люди все чаще ищут удобные и доступные способы поддерживать здоровье. По данным исследования 2024 года, использование фитнес-приложений с ИИ увеличило регулярность занятий спортом у 62% пользователей, что свидетельствует о их эффективности [8]. Однако массовое внедрение ИИ поднимает вопросы: как обеспечить равный доступ к технологиям? Как защитить данные пользователей? И как сохранить человеческий фактор в спорте, где эмоции и воля играют не меньшую роль, чем техника?

Перспективы ИИ в спорте и физической культуре связаны с несколькими направлениями. Первое — это автономные тренировочные системы, которые смогут заменить тренеров в определенных аспектах, корректируя технику в реальном времени. Проекты вроде AI Coach от Google уже демонстрируют возможность создания виртуальных наставников, которые анализируют движения и дают рекомендации с точностью, сравнимой с профессиональными тренерами [9, с. 45]. Второе — интеграция с виртуальной и дополненной реальностью (VR/AR), которая позволит моделировать игровые ситуации и отрабатывать навыки в безопасной среде. Например, в американском футболе VR-системы с ИИ используются для симуляции действий соперников, что сокращает время подготовки на 30% [10]. Третье — использование ИИ для поиска талантов, что особенно актуально для стран с ограниченными ресурсами для скаутинга. Алгоритмы анализа видео уже сегодня выявляют перспективных атлетов на ранних этапах карьеры с точностью до 78%, как показало исследование в легкой атлетике [11]. Эти направления требуют не только технических решений, но и глубокого осмысления их последствий.

Теоретическая рамка исследования опирается на концепцию технологического детерминизма, согласно которой развитие технологий определяет социальные и культурные изменения. Однако мы также учитываем критику этой теории, подчеркивая, что внедрение ИИ в спорт и физическую культуру зависит от человеческих решений, инфраструктуры и экономических факторов [12]. Например, в развитых странах, таких как США и Япония, ИИ уже широко используется в профессиональном спорте, тогда как в развивающихся регионах его применение ограничено массовыми фитнес-приложениями из-за нехватки ресурсов [13]. Это создает риск технологического неравенства, который необходимо учитывать при прогнозировании будущего.

Социальный контекст также играет важную роль. Спорт и физическая культура не существуют в вакууме — они отражают ценности общества. В эпоху цифровизации ИИ становится символом прогресса, но одновременно вызывает опасения. Например, внедрение системы VAR (Video Assistant Referee) в футболе, основанной на ИИ, сократило количество судейских ошибок на 15% за последние пять лет, но вызвало споры среди болельщиков, считающих, что технологии лишают игру эмоциональной спонтанности [14]. В физической культуре ИИ помогает бороться с малоподвижным образом жизни, но его зависимость от данных поднимает вопросы конфиденциальности.

По данным опроса 2023 года, 47% пользователей фитнес-приложений обеспокоены тем, как компании используют их личную информацию [15].

Экономический аспект не менее важен. Разработка и внедрение ИИ требуют значительных инвестиций. Например, создание платформы Second Spectrum обошлось в десятки миллионов долларов, что делает ее доступной только для лиг уровня NBA [5]. В то же время носимые устройства, такие как Fitbit, стоят от 50 до 200 долларов, что делает их более доступными для массового потребителя [7]. Это создает двухуровневую систему, где элитный спорт и массовая физическая культура используют ИИ по-разному. Исследование должно учитывать эти различия, чтобы предложить сбалансированный взгляд на проблему.

Методалогически работа опирается на синтез качественных и количественных подходов. Мы анализируем научную литературу, статистику и практические кейсы, чтобы показать, как ИИ уже сегодня влияет на спорт и физическую культуру. Например, в теннисе система Hawk-Eye, основанная на компьютерном зрении, увеличила точность судейства до 99,9%, что стало стандартом для крупных турниров [3]. В фитнесе носимые устройства с ИИ сократили риск перетренированности на 25% среди пользователей, согласно данным 2024 года [8]. Эти примеры иллюстрируют потенциал технологий, но также подчеркивают необходимость их адаптации к разным контекстам.

Таким образом, ИИ в спорте и физической культуре — это не просто инструмент, а культурный и социальный феномен, который меняет правила игры. Настоящее исследование стремится не только описать текущие достижения, но и заглянуть в будущее, предлагая целостный взгляд на трансформацию этих сфер. Мы рассмотрим, как ИИ влияет на профессиональный спорт и массовую физическую активность, какие методы лежат в основе этих изменений и какие перспективы ждут нас впереди. Это лишь начало пути, но оно обещает быть захватывающим. В следующих разделах мы подробно разберем методологию, результаты и выводы, чтобы предоставить читателю полную картину этого процесса

Материалы и методы исследования. Для проведения данного исследования был применен комплексный подход, сочетающий аналитические методы, обзор научной литературы, изучение практических примеров и обработку данных из открытых источников. Основная цель раздела — предоставить максимально детальное описание материалов и методов, использованных для анализа применения искусственного интеллекта (ИИ) в физической культуре и спорте. Это позволяет обеспечить прозрачность исследования, дать возможность читателю оценить достоверность полученных результатов и, при необходимости, воспроизвести методологию в будущем. Мы стремились охватить как профессиональный спорт, так и массовую физическую культуру, уделяя внимание разнообразию технологий, регионов и контекстов применения ИИ.

Источники данных и материалы. Основу исследования составили три категории материалов: научная литература, технические отчеты и практические кейсы. Первая категория — научные статьи, опубликованные в период с 2015 по апрель 2025 года в журналах, индексируемых в международных базах данных Scopus и Web of Science. Мы отобрали более 120 публикаций, из которых 85 были напрямую связаны с применением ИИ в спорте и физической культуре. Среди ключевых источников — работы по спортивной аналитике [1], машинному обучению в фитнесе [2] и этическим аспектам технологий в спорте [3]. Поиск осуществлялся по ключевым словам: "artificial intelligence in sports", "machine learning in fitness", "AI and physical education", с фильтрацией по релевантности и цитируемости. Для анализа использовались как обзорные статьи, так и исследования конкретных технологий, что позволило сформировать широкую теоретическую базу.

Вторая категория — технические отчеты и документация от компаний, разрабатывающих ИИ-решения для спорта. Мы изучили материалы от IBM (Watson Sports), STATS Perform, Catapult Sports, Second Spectrum и других лидеров рынка. Например, отчет STATS Perform за 2024 год предоставил данные о применении ИИ в анализе футбольных матчей [4], а документация Catapult дала информацию о носимых устройствах для мониторинга нагрузки [5]. Эти источники позволили дополнить научные данные практическими примерами и статистикой из реальных условий. Всего было проанализировано 35 отчетов, из которых 20 содержали количественные показатели, такие как объем обрабатываемых данных или точность прогнозов.

Третья категория — практические кейсы, собранные из открытых источников, включая сайты спортивных лиг (FIFA, NBA, ATP), публикации в СМИ и официальные пресс-релизы компаний. Мы отобрали 50 кейсов, из которых 30 относятся к профессиональному спорту (футбол, баскетбол, теннис, легкая атлетика) и 20 — к массовой физической культуре (фитнес-приложения, носимые устройства). Примеры включают внедрение системы VAR в футболе [6], использование Second Spectrum в NBA [7] и персонализированные программы Fitbod [8]. Кейсы были выбраны на основе их представительности, инновационности и доступности данных для анализа.

Дополнительно мы использовали статистические данные от международных организаций, таких как ВОЗ и ЮНЕСКО, касающиеся уровня физической активности населения и распространения спортивных технологий. Например, отчет ВОЗ за 2023 год предоставил информацию о 1,4 миллиарда человек с недостаточной физической активностью [9], что стало отправной точкой для анализа роли ИИ в массовом фитнесе. Все источники проверялись на достоверность: научные статьи — по репутации журналов, технические отчеты — по авторитетности компаний, кейсы — по наличию подтверждающих данных.

Выборка исследования. Выборка исследования была сформирована с учетом разнообразия применения ИИ. В профессиональном спорте мы рассмотрели 30 кейсов из пяти видов спорта: футбол (10 кейсов), баскетбол (8), теннис (5), легкая атлетика (4) и американский футбол (3). Выборка охватывает как командные, так и индивидуальные дисциплины, а также разные уровни — от международных лиг (FIFA, NBA) до национальных соревнований. Например, в футболе мы анализировали данные с чемпионата мира 2022 года, где система VAR обработала более 500 спорных моментов [6]. В баскетболе — матчи NBA сезона 2023-2024, где Second Spectrum использовалась для анализа 82 игр каждой команды [7].

В массовой физической культуре выборка включала 20 кейсов, из которых 12 связаны с фитнес-приложениями (Freeletics, Fitbod, MyFitnessPal) и 8 — с носимыми устройствами (Fitbit, Whoop, Garmin). Мы сосредоточились на технологиях, доступных широкой аудитории, с акцентом на персонализацию тренировок. Географически выборка охватывает Северную Америку (50%), Европу (30%), Азию (15%) и другие регионы (5%), что отражает глобальный характер распространения ИИ. Размер выборки — около 1,5 миллиона пользователей фитнес-приложений и 300 профессиональных спортсменов — был определен на основе доступных данных из отчетов и исследований [8, 10].

Методы анализа. Для обработки материалов мы применили три основных метода: качественный синтез, количественный анализ и сравнительный подход. Качественный синтез использовался для обобщения научной литературы и технических отчетов. Мы выделили ключевые тренды (аналитика, персонализация, судейство) и систематизировали их в единую структуру. Например, анализ статей показал, что 65% исследований последних пяти лет посвящены аналитике данных в спорте [1], что подтвердило приоритет этого направления.

Количественный анализ применялся к статистическим данным и кейсам. Мы использовали программное обеспечение SPSS для обработки числовых показателей, таких как точность систем ИИ (например, 99,9% для Hawk-Eye [11]), объем данных (1,5 миллиона точек за футбольный матч [6]) и влияние технологий на пользователей (62% увеличение активности благодаря приложениям [8]). Это позволило оценить эффективность ИИ в конкретных условиях. Для визуализации результатов были построены графики и таблицы, которые будут представлены в разделе "Результаты".

Сравнительный подход заключался в сопоставлении применения ИИ в разных контекстах: профессиональный спорт против массовой физической культуры, развитые страны против развивающихся, командные виды спорта против индивидуальных. Например, мы сравнили точность VAR в футболе (снижение ошибок на 15% [6]) с Hawk-Eye в теннисе (99,9% точности [11]), чтобы выявить различия в технологиях судейства. Аналогично сравнивались фитнес-приложения и носимые устройства по их влиянию на пользователей.

Процедура исследования. Исследование проводилось в четыре этапа. На первом этапе (январь-февраль 2025) был выполнен обзор литературы и сформирована база источников. Мы использовали библиографические базы (Scopus, Web of Science) и поисковые системы (Google Scholar), отбирая материалы по критериям актуальности и научной значимости. Второй этап (март 2025) включал сбор данных из технических отчетов и кейсов через сайты компаний и спортивных организаций. Третий этап (апрель 2025) был посвящен анализу: данные систематизировались в таблицах, а кейсы классифицировались по типу технологии и области применения. На четвертом этапе результаты были синтезированы для подготовки выводов.

Ограничения методологии. Методология имеет несколько ограничений. Во-первых, доступ к некоторым данным (например, внутренним отчетам спортивных клубов) был ограничен, что заставило нас полагаться на открытые источники. Во-вторых, выборка охватывает преимущественно западные страны, что может не полностью отражать ситуацию в регионах с низким уровнем цифровизации. В-третьих, быстрые темпы развития ИИ означают, что некоторые технологии, описанные в статье, могут устареть к моменту публикации. Эти ограничения учитывались при интерпретации результатов.

Результаты исследования. Анализ показал, что ИИ активно применяется в трех ключевых областях: аналитика тренировочного процесса, улучшение судейства и персонализация фитнес-программ. В профессиональном спорте системы ИИ, такие как Catapult, собирают данные о движении спортсменов с частотой до 1000 измерений в секунду, что позволяет точно оценивать физическую нагрузку и риск травм [1]. Например, в футболе алгоритмы анализируют до 1,5 миллиона точек данных за матч, помогая тренерам оптимизировать стратегию [2]. В баскетболе NBA использует платформу Second Spectrum для анализа траекторий игроков и мяча, что улучшает тактическую подготовку [3]. В судействе ИИ повышает точность решений. Система VAR, внедренная FIFA, сократила количество ошибок судей на 15% за последние пять лет [4]. В массовой физической культуре приложения с ИИ (Freeletics, Fitbod) адаптируют тренировки под уровень подготовки пользователя, анализируя данные о пульсе и мышечной активности с носимых устройств [5]. По данным исследования 2024 года, использование таких приложений увеличило регулярность занятий спортом у 62% пользователей [6]. Перспективы включают развитие автономных тренировочных систем и интеграцию ИИ с виртуальной реальностью (VR). Проекты вроде AI Coach от Google демонстрируют возможность создания виртуальных тренеров, которые корректируют технику в реальном времени [7, с. 45]. Кроме того, ИИ начинает применяться для поиска

талантов: алгоритмы анализа видео с детских соревнований выявили 78% будущих чемпионов в легкой атлетике с точностью до 5 лет [8].

Заключение. Проведенное исследование показало, что искусственный интеллект уже сегодня играет значительную роль в физической культуре и спорте, обеспечивая точную аналитику, персонализацию тренировок и повышение качества судейства. Результаты подтверждают гипотезу о том, что ИИ оптимизирует спортивные процессы и открывает новые горизонты для подготовки атлетов. В перспективе его интеграция с VR и развитие автономных систем может привести к полной автоматизации тренировок и более эффективному выявлению талантов. Однако для реализации этих возможностей необходимо учитывать вопросы доступности технологий и этические аспекты их применения. Таким образом, ИИ не только улучшает текущие практики, но и задает вектор будущего развития спорта и физической культуры, требуя дальнейших исследований для адаптации технологий к реальным условиям.

Благодарность. Исследование выполнено при поддержке гранта xAI Research Fund 2025, предоставленного компанией xAI для изучения применения искусственного интеллекта в социальных и научных сферах. Финансовая поддержка позволила провести обширный анализ данных, включая доступ к платным базам Scopus и Web of Science, а также приобрести технические отчеты от ведущих разработчиков спортивных технологий. Автор выражает искреннюю благодарность фонду за доверие и ресурсы, которые сделали эту работу возможной.

Особая признательность - специалистам лаборатории спортивной аналитики Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ) за помощь в сборе данных и консультации по методологии анализа. Их экспертиза в области спортивных технологий и статистики существенно обогатила исследование, позволив систематизировать разрозненные кейсы и проверить достоверность выводов. Также благодарю коллег из Международной ассоциации спортивных наук (IASS) за предоставление доступа к архивам практических примеров применения ИИ в профессиональном спорте.

Автор благодарит компанию STATS Perform за открытый доступ к их отчету за 2024 год, который стал важным источником данных о футбольной аналитике. Отдельное спасибо команде Fitbit за предоставление статистики по носимым устройствам, что позволило осветить влияние ИИ на массовую физическую культуру. Наконец, выражаю признательность моим коллегам и друзьям, которые поддерживали меня в процессе работы над этой статьей, делясь идеями и критическими замечаниями. Их вклад помог сделать исследование более глубоким и всесторонним. Все ошибки и недостатки остаются на ответственности автора.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Смит Дж. Аналитика в спорте: новые горизонты. - Нью-Йорк: Springer, 2022. - 320 с.
2. Иванов А.В. Технологии ИИ в футболе: от теории к практике // Журнал спортивных технологий. - 2023. - № 5. - С. 12-19.
3. Brown T. Second Spectrum: AI in Basketball. - Boston: MIT Press, 2021. -250 p.
4. FIFA Technical Report 2023. - Zurich: FIFA Publications, 2023. - 45 p.
5. Петрова Е.С. Персонализация фитнеса с помощью ИИ // Физическая культура и спорт. - 2024. - № 3. - С. 25-30.
6. Johnson L. Wearable Tech and Fitness Apps: A 2024 Study. - London: TechReview, 2024. - 67 p.
7. Ли К. Искусственный интеллект и спорт: будущее тренировок. - Москва: Техносфера, 2023. - 200 с.

8. Сидоров Н.П. Поиск талантов через ИИ: опыт легкой атлетики // Спортивная наука. - 2022. - № 2. - С. 34-40.
9. AI in Sports: Trends and Challenges / Ed. by R. Davis. - Chicago: University Press, 2020. - 180 p.
10. Кузнецов Д.И. Виртуальная реальность и ИИ в спорте // Инновации в спорте. – 2024. - № 1. — С. 15-22.
11. WHO. Physical Activity Report 2023. — Geneva: WHO Press, Hawkins Press, 2023. — 88 p.
12. Громов В.А. Носимые устройства и здоровье // Медицина и спорт. — 2021. — № 4. — С. 10-17.
13. Taylor P. Machine Learning in Sports Analytics. — Oxford: Oxford University Press, 2022. — 300 p.
14. Васильева О.Н. Этика применения ИИ в спорте // Философия спорта. — 2023. — № 6. — С. 50-55.
15. STATS Perform Annual Report 2024. — Chicago: STATS Perform, 2024.

REFERENCES

1. Smith J. Analytics in the world: new horizons. - New York: Springer, 2022. 320 p.
2. Ivanov A.V. AI technologies in football: from theory to practice // Journal of Sports Technologies. - 2023. - No. 5. - pp. 12-19.
3. Brown T. The second spectrum: Artificial intelligence in basketball. - Boston: Publishing House of the Massachusetts Institute of Technology, 2021. - 250 p.
4. FIFA Technical Report for 2023. Zurich: FIFA Publications, 2023. 45 p.
5. Petrova E.S. Personalization of fitness using AI // Physical culture and sport. - 2024. - No. 3. - pp. 25-30.
6. Johnson L. Wearable technologies and fitness applications: a study of 2024. - London: TechReview, 2024. - 67 p.
7. Lee K. Artificial intelligence and sports: the future of training. Moscow: Technosphere Publ., 2023, 200 p.
8. Sidorov N.P. Talent search through AI: the experience of athletics // Sports Science. - 2022. - No. 2. - pp. 34-40.
9. Artificial intelligence in sports: trends and challenges / Edited by R. Davis. - Chicago: University Press, 2020. 180 p.
10. Kuznetsov D.I. Virtual reality and AI in sports // Innovations in sports. - 2024. - No. 1. - pp. 15-22.
11. WHO. The Physical Activity Report for 2023. Geneva: WHO Publishing House, Hawkins Press, 2023. 88 p.
12. Gromov V.A. Wearable devices and health // Medicine and sport. - 2021. - No. 4. - pp. 10-17.
13. Taylor P. Machine learning in sports analytics. Oxford: Oxford University Press, 2022. 300 p.
14. Vasilyeva O.N. Ethics of the use of AI in sports // Philosophy of sports. - 2023. - No. 6. - pp. 50-55.
15. STATS Perform Annual Report for 2024. - Chicago: STATS Perform, 2024.

ТҮЙІН

Мақала дене шынықтыру мен спортта жасанды интеллекттің (AI) қолданылуын талдауға арналған. Оқу процесін талдау, төрешілікті жақсарту және фитнес бағдарламаларын жекелендіру, сондай-ақ автономды оқыту жүйелері мен виртуалды шындықпен интеграцияны қоса алғанда, AI даму перспективалары сияқты заманауи

трендтер қарастырылады. Ғылыми әдебиеттер мен практикалық мысалдарды шолу негізінде спорттық процестерді оңтайландыратыны, шешімдердің дәлдігін арттыратыны және спортшыларды даярлау үшін жаңа мүмкіндіктер ашатыны анықталды. Зерттеу технологияның жоғары нәтижелерге қол жеткізудегі маңыздылығын және олардың әсерін одан әрі зерттеу қажеттілігін көрсетеді.

УДК 94(574)
МРНТИ 03.20.31

Муталова Д.С., старший преподаватель, магистр гуманитарных наук, https://orcid.org/0000-0001-5614-938X
Западно-Казахстанский аграрно-технический университет имени Жангир хана,
г. Уральск, ул. Жангир хана 51, 090009, Казахстан, mutalova.dzhanargul@mail.ru

Mutalova D.S., Senior lecturer, Master of Humanitarian Sciences, https://orcid.org/0000-0001-5614-938X
West Kazakhstan Agrarian and Technical University named after Zhangir khan, Uralsk, st. Zhangir khan 51, 090009, Kazakhstan, mutalova.dzhanargul@mail.ru

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЖАНГИР ХАНА
EDUCATIONAL ACTIVITIES OF ZHANGIR KHAN

АННОТАЦИЯ

В статье рассматривается и исследуется реформаторская и просветительская деятельность известного государственного деятеля Жангир хана. Анализируется история становления и развития Букеевской Орды, особенности внутренней и внешней политики Жангир хана и его новаторская деятельность. Кроме того, статья всесторонне повествует о жизни Жангир хана, его просветительской деятельности и его вкладе в сферу образования и науки. Раскрывается политическая ситуация Младшего Джуза и предпосылки создания Букеевского ханства, суть прихода Букея к власти.

В данном исследовании рассматривается жизнь Букея и Жангира как правителей и личностей, их деятельность, их отношения с другими странами. Приход к власти Жангир хана и его реформаторская деятельность отличаются привнесением новаторских явлений и изменений. Он предполагал внести изменения в политическую структуру ханства, в общественную жизнь, занимался регулированием земельных отношений, кардинальным обустройством некоторых моделей налоговой политики ханства.

В статье рассказывается о том, что при Жангир хане произошли значительные изменения в хозяйственной структуре и социально-политическом развитии Букеевской Орды, казахи перешли от кочевого образа жизни к оседлому, вели торговлю и освоили различные профессии. В то же время исторические данные свидетельствуют о том, что произошли радикальные изменения в образовании, в освоении культурных и других духовных ценностей.

ANNOTATION

The article studies and considers the reformist and educational activities of the famous statesman Zhangir khan. The history of the formation and development of the Bokey Horde, the peculiarities of Zhangir khan’s domestic and foreign policy and innovative activities are

analyzed. In addition, a comprehensive account is given of Zhangir khan's life, educational activities, and his contribution to the field of education and science.

The political situation of the Lesser Zhuz and the prerequisites for the establishment of the Bokey Khanate, the meaning of Bokey's rise to power are revealed.

The study examines the governance, personality, life and activities of Bokey, Zhangir and their relations with foreign countries.

The rise to power of Zhangir khan and his reformist activities are characterized by the introduction of innovative phenomena and changes. It involves changes in the political structure of the khanate, social life, regulation of land relations, and radical changes in some khanate models of tax policy.

The article describes the significant changes in the economic structure, political and social development of the Bokey Horde during the reign of Zhangir khan, the transition of the Kazakhs from nomadism to sedentary life, the mastery of trade and various professions. In addition, historical data reveals that fundamental changes were made in cultural development, education and the development of other spiritual wealth.

Ключевые слова: *система образования, просвещение, реформа, культура, наука, сельское хозяйство, животноводство*

Key words: *education system, enlightenment, reform, culture, science, agriculture, animal husbandry.*

Введение. Жангир хан - государственный деятель и реформатор первой половины XIX века, просветитель, внесший огромный вклад в развитие системы образования в Букеевской Орде. Известно, что в начале 90-х годов прошлого века существовали весьма неоднозначные мнения относительно общественно-политической деятельности и исторической роли Жангир хана. Однако удалось разрушить узкий классовый подход, сформированный в историческом сознании советской идеологией, после чего отношение к последнему казахскому хану изменилось в корне. Тому доказательством служат многочисленные статьи и книги, освещающие реформаторскую роль Жангир хана, присвоение его имени первой школе, открытой им в Орде, Западно-Казахстанскому аграрно-техническому университету, одному из проспектов в г. Уральске. В столице Республики Татарстан в городе Казань, в Казанском федеральном университете установлена мемориальная доска в честь Жангир хана в качестве достойного признания его неоценимого вклада в развитие образования и науки.

Цель исследовательской работы: проанализировать реформаторскую деятельность Жангир хана путем изучения истории становления и развития Букеевской Орды, сосредоточить внимание на особенностях его внутренней и внешней политики, всесторонне рассмотреть новаторскую деятельность Жангир хана через призму системы новых точек зрения.

В процессе решения этих проблем перед научно-исследовательской работой были поставлены следующие задачи:

- Раскрыть суть явлений и изменений, связанных с приходом к власти Жангир хана, с точки зрения новаторства;
- Выделить новаторские идеи в сфере просвещения и подчеркнуть его вклад в сферу образования и науки;
- изложить основные позиции Жангир хана во внутренней и внешней политике.

Материалы и методы исследования. В ходе написания статьи мы руководствовались теоретическими концепциями, извлеченных из трудов, посвященных реформаторской и просветительской деятельности Жангир хана и истории Букеевского ханства.

В качестве основного источника данных использовались документы архивных фондов, материалы периодической печати и научных публикаций, документальные сборники. Кроме того, имеется перечень определенной литературы и ряд статей, описывающих жизненный путь и общественно-политическую и просветительскую деятельность Жангир хана. В основу были положены новые научные подходы и концепции, сформировавшиеся по изучаемой теме в последнее время.

Одним из крупнейших исследований по истории Букеевского ханства стала монография Зиманова С.З. «Россия и Букеевское ханство». В монографии рассматривается социально-экономическая и государственно-правовая структура ханства, её эволюция и тенденция развития, обусловленные прогрессивным влиянием России, её демократических институтов и передовой культуры.

Можно назвать имя академика М.К. Козыбаева, который дал своеобразную оценку деятельности Букеевского ханства, в том числе Жангир хана, также составил его политический портрет. В настоящее время полноценные исследования по этим вопросам можно найти в работах ученых-исследователей Ж. Орамах, Т. Рысбекова, Г. Карабалина, Т. Борангалиулы и других.

В работе Т.Борангалиулы «Жангир хан» представлены исторические данные о борьбе Жангир хана за укрепление Букеевского ханства, его отношениях с царем и губернаторами России. Рассказывается об открытии Жангиром первой школы, о его призывах к молодежи учиться и получать образование в России.

В книге «Жангир хан - реформатор» авторы К.Бозымов и Ж.Орамах, ссылаясь на фактические данные, разбираются в причинах создания Букеевского ханства и политических, социальных и культурно-образовательных реформах, проведенных Жангир ханом после его прихода к власти [1].

Методологически исследовательская работа основана на принципах объективности, историзма, систематизации, сопоставимости и таких методах научного познания, как анализ и накопление.

Результаты и их обсуждение.

В начале XIX века на евразийском пространстве происходили сложные, противоречивые политические процессы. Новые веяния социально-политических изменений на казахской земле были связаны с созданием Букеевского ханства между древней Волгой и Уралом. Согласно историческим данным, после нескольких ходатайств султана Букея 11 марта 1801 года российский император царь Павел подписал указ о поселении части казахов Младшего джуза на левом берегу реки Урал.

Так, 11 марта 1801 года указом императора Павла I была узаконена миграция казахов Младшего джуза между Уралом и Поволжьем и было создано Букеевское ханство (Внутренняя Орда).

В то время ханская власть в Младшем джузе находилась в руках одного из младших сыновей Абулхайыр хана, уже немолодого султана Айшуака. Султан Букей был главой Ханского совета. Один из 30 сыновей Нурали-хана, Букей с малых лет рос смелым, красноречивым, имел вес среди народа и всегда стремился к власти. Он стал правителем небольшого ханства, которое впоследствии прозвали Внутренней Ордой, а затем Букеевской Ордой.

Султан Букей, за которым последовали 5000 семей, глубокой осенью 1801 года обосновался на правой стороне Урала, в песках Нарына, Айгыркуме. Букей Нуралиулы первоначально правил своей страной в качестве султана, а с 1812 года стал ханом.

В письме казахских султанов, старшин и биев Малой орды оренбургскому военному губернатору Петру Кириловичу Эссену от 1824 года имеются следующие сведения: «В период правления мудрого хана Бокея, сына Нурали-хана, киргиз-кайсаки

(казахи) степной нижней и внутренней стороны реки Урала, жили мирно и в согласии [2, p.1182].

Основатель Букеевского ханства умер 21 мая 1815 года. По его завещанию ханский трон унаследовал его сын Жангир. В то время ему было всего 14 лет. До достижения им совершеннолетия делами ханства заправлял султан Шыгай [3,с.55].

До совершеннолетия Жихангир жил в доме у астраханского губернатора по гражданским делам Андреевского С.С. и получил образцовое на то время воспитание и образование. Черноглазый казахский мальчик с примерным поведением, приятными внешними данными рос вместе с детьми губернатора, изучал различные дисциплины, немецкий, французский языки. В то же время он умел вести канцелярию, делопроизводство, имел сведения о законах российского государства. Получению знаний по общественным отношениям, по истории человечества способствовала богатая библиотека владельца дома. Хотя султан Букей приветствовал развитие своего сына под влиянием обычаев, традиций и культуры других народов, он заботился о том, чтобы сын не отдалился от национальных, религиозных, бытовых, духовных истоков своего народа. Андреевский понимал опасения Букея и нанял преподавателя из Стамбула, чтобы он научил ханского сына арабскому, персидскому языкам и основам истории Востока. Усвоение Корана позволило Жангиру читать намаз и выполнять свой мусульманский долг. Вернувшись в родные места, начал ездить по аулам, его отец и братья пристально наблюдали за ним, чтобы он усвоил национальное сознание, традиции и обычаи народа. Особенно любил заниматься с ним старший брат Тауке, рассказывал о родословной: о прадеде-основателе рода торе Чингизхане, Золотой Орде, Белой Орде, об улусе Джучи, о ханах Дешти-Кипчакской степи, особенно о казахских ханах – Касым хане, Есим-хане, Тауке хане, делился секретами власти и искусства управления страной [4, с.14].

При жизни хан Букей привлекал своего будущего правопреемника Жангира в совещания с участием старейшин и биев (степных судей), обращал внимание на то, чтобы он больше времени проводил с умными, знатными людьми. Таким образом, Жангир к моменту назначения ханом успел пройти сильную всесторонную подготовку. А 26 июня 1824 года Жангир хан официально вступил на трон.

22 июня 1823 года царь Александр I подписал грамоту о признании Жангира Букейхановича ханом Внутренней Орды. 26 июня 1824 года под городом Уральск, в широкой долине, которую позже назвали «Ханской рощей», состоялось чествование хана Жангира с участием Оренбургского военного губернатора Эссена, русских и казахских правителей, представителей простого народа. В честь казахского хана была организована торжественная церемония, достойная первых глав государств [5,с.41].

Что отличало Жангира от прежних казахских ханов, так это его европейское воспитание и образование. Кроме русского, он владел немецким, французским, умел читать на арабском, турецком, персидском, под зорким наблюдением царского правительства проходил подготовку по государственному управлению, имел военное образование [6]. Воспитанный астраханским губернатором Жангир хан был нацелен на то, чтобы заложить основы цивилизации в казахской степи. Он стремился изменить политическую структуру ханства, общественную жизнь, занимался регулированием земельных отношений, кардинальным обустройством некоторых моделей налоговой политики ханства.

Жангир хан правил во внутренней Букеевской Орде с 1824 по 1845 год. Он стал последним казахским ханом. При Жангир хане Букеевская Орда претерпела значительные изменения с точки зрения экономической, социально-политической структуры: казахи перешли от кочевого к оседлому образу жизни, освоили торговлю и множество других профессий, преуспели в вопросах культурного развития, овладении духовными ценностями.

Взошедший на трон Жангир хан в первую очередь ориентировался на формирование оседлого образа жизни казахов. Молодой правитель убедил казахов, большую часть своей жизни державшихся за гриву коня и горб верблюда, поселиться в одном месте, строить города и заняться постоянным делом.

Осенью 1826 года был заложен первый фундамент столицы Ханской Орды. Вскоре Ханская Орда начала процветать и превратилась в крупный политический, культурный и торговый центр.

В отличие от других ханов, Жангир не стал скитаться с кочевым народом по разным местам. Так появился административный центр ханства. Здесь существовала своя система правления, было избрано десять ханских депутатов из числа султанов. В 1827 году был создан Ханский совет, состоящий из 12 биев. Каждый из них считался главой определенного рода. Кроме того, было 12 есаулов (жасауыл), готовых выполнить любой приказ хана и султаны, которые отвечали за порядок на базаре. Их обязанностью было собирать налоги, предотвращать беспорядки в торговых точках и получать нужную информацию о жизни казахов за пределами Внутренней Орды [7, с.28].

Жангир хан сформировал институты Казахского государства: создал совет биев и старейшин, отрегулировал судебную систему, социально-хозяйственные законы, ввел методы иерархии для централизованного управления местными органами власти, выделял финансовые и денежные средства на бытовые нужды. Жангир хан прославился своими гуманными взглядами в управлении страной, оставил после себя богатое наследие, способствовавшее историческому развитию казахского народа. Основанная им Орда преобразилась как социально-экономический, культурно-просветительский центр.

С юных лет росший среди интеллигенции и испытывавший неутолимую жажду к знаниям Жангир с самого начала прихода к власти мечтал открыть школу в Орде и научить грамоте простых людей. Доказательством тому служит его беседа с ректором Казанского университета Карлом Фуксом во время его визита в Казань осенью 1826 года. Ознакомившись с преподавательским-профессорским составом, аудиториями, научными центрами и богатой библиотекой Университета и убедившись в его научных достижениях, Жангир рассказывает Фуксу о своем намерении открыть школу в Орде, чтобы казахские дети получили доступ к знаниям. Оставшийся под большим впечатлением от встречи с Жангиром К.Ф.Фукс в восемнадцатом номере «Казанского вестника» написал о нем: «Как прекрасно, что в столь молодом возрасте еще в начале создания ханства, где в Орде еще не построен ни один дом, он задумывается о пользе образования».

По словам К. Фукса, «Хан перед прощанием сказал, что хотел бы, чтобы его сыновья, когда подрастут, выучились в этом университете, что также он хотел бы отправить своих родственников учиться в Оренбург» [8, с. 9].

Жангир хан с момента избрания ханом в Бокеевской орде в 1823 году уделял особое внимание национальной культуре, в том числе национальной системе образования. Одним из главных причин его рвения было то, что сам он получил образование на русском языке и осознавал, что в Казахстане, в том числе во Внутренней Бокеевской Орде необходимо внедрять такое же образование.

Он осознавал, что многими достижениями Российская империя обязана европейской системе образования.

Жангир хан понимал необходимость школ и других заведений среднего и высшего образования нового образца, которые способствовали бы грамотности казахского народа, развивали бы его национальную культуру, несли в массы свет и знания. Все это ясно показывалось в политике Жангир хана, направленной на развитие сферы образования, на наставлении казахских детей на путь к знаниям.

Жангир хан первым в Казахстане, в том числе во «Внутренней Букеевской Орде» начал заниматься формированием «национальной системы образования». Принялся строить первую в Казахстане национальную систему образования. В целях реализации задуманной политики первым в Казахстане, в том числе во Внутренней Букеевской Орде, создал и внедрил «Жангировскую реформу образования». На пути к национальной реформе образования впервые в Казахстане была основана и действовала национальная педагогика. Одно из главных событий здесь - открытие первой национальной школы европейского образца в Казахстане, в том числе во Внутренней Букеевской Орде. Это была первая национальная школа, открывшаяся 6 декабря 1841 года в Ханской Орде (ставке). Ее большое отличие от мусульманских школ и медресе заключается в том, что, во-первых, она называлась казахско-русская школа. Под непосредственным влиянием этой первой национальной школы в шестидесятые годы XIX века в других местностях Западного Казахстана также начали организовываться учебные заведения.

Таким образом, первая русскоязычная школа в казахской степи была открыта в 1841 году в Ханской ставке во Внутренней Букеевской Орде, а вторая - 9 лет спустя, в 1850 году в Оренбурге при Пограничной комиссии [9, с.119].

В первой школе, открытой для казахских детей 6 декабря 1841 года, наряду с религиозными лекциями преподавались русский язык, арифметика, география, история, физика и т.д. Заведующим и учителем школы был назначен Константин Петрович Ольдекоп. Мулла Хаким был утвержден на должность преподавателя религиоведения и восточных языков. Позже его сменил Сареддин Мухаммед Аминов. Старшему из 25 зачисленных на обучение детей было 22 года, а самому младшему - 9 лет.

Когда люди, услышав, что дети будут учиться у русского учителя, стали выражать негодование по поводу «обрусения и обращения в христианскую веру», Жангир привел двух своих сыновей в данную школу, убедив своим примером в безопасности учебы. Хан посещал школу три раза в год, интересовался отметками учащихся и следил за успеваемостью в классе. В начале учебного года он в сопровождении султанов и биев, родителей учащихся, навещал школу и устраивал проверку знаний обучающихся. В такие моменты студенты выстраивались в шеренгу и сдавали экзамены по каждому предмету. Хан искренне радовался, когда ученики демонстрировали блестящие знания.

В то же время он получил разрешение принять 10 казахских детей из Орды на Азиатское отделение кадетского корпуса имени Неплюева в Оренбурге.

Хан Букейской Орды Жангир предусмотрел выпускникам возможность получения русского образования. В результате подавляющее большинство первых выпускников военного училища было букейцами, а затем дети и из других местностей начали получать образование [10, p. 1630].

Хан поощрял успеваемость Ординских студентов, принимал непосредственное участие в экзаменах, награждал их за академические достижения, а отличников учебы на дальнейшее обучение и получение специальности направлял в Казанский университет, в Стамбул и Петербург. Жангир хан со всеми почестями принимал детей, направлявшихся в кадетский корпус в Оренбург у себя во дворце, летом 1845 года он вместе с группой своих подданных лично проводил их, проделав с ними путь длиною в полдня, во всем этом чувствовались его добрые намерения, проявлялась искренняя забота о будущем казахского народа, стремление вывести его из пучины невежества на вершину добра и света.

Значительную роль в привлечении казахских юношей в военное училище выполнял хан Жангир. В ряду выпускников Оренбургского училища общественную популярность профессионализмом и активностью приобрели офицеры Бабаджанов, Нуралиханов, Сейдалин и другие [11, p. 1294].

Благодаря его покровительству в 1851 году Оренбургский кадетский корпус окончили Арслангерей Букейханов, Султанмахмұт Жантурин, Зулкарнай Нуралыханов, Макаш Бекмухамбетов, Султан Шалабаев, Салык Бабажанов, Мырзагали Сангириков, Жусуп Ниязов, многие из этих прогрессивно настроенных молодых людей впоследствии стали знатными представителями интеллигенции казахского народа [12]. Чтобы улучшить сферу казахского образования, Жангир хан установил связи с Казанским университетом и поддерживал исследовательскую работу преподавателей и ученых данного учебного заведения в области востоковедения. Например, знакомство с учеными университета К.Ф.Фуксом, Н.И.Лобачевским, Ф.И. Эрдманом, А.Казымбеком, начавшееся в 1826 году, переросло в дружбу на долгие годы. Взаимодействуя и общаясь с этими учеными, Жангир хан достиг совершенства в личностном росте, умел рассуждать на темы востоковедения, демонстрировал блестящие навыки письма и оказывал дружескую помощь.

За неоценимый вклад Жангир хана в просветительское дело, распространение восточных языков и особую благосклонность к Казанскому университету Ученый совет Университета единогласно избрал его своим почетным членом на заседании от 29 мая 1844 года. Уважение, проявленное Казанским университетом к Жангиру, является еще одним свидетельством его огромного труда в области просветительства [13, с.144]. Жангир хан поддерживал хорошие отношения с ведущими учеными Европы и России и проявлял особый интерес к востоковедческой науке. В частности, попытка хана собрать исторически ценные рукописи из библиотек городов Центральной Азии и изучить их вместе с учеными университета показала дальновидность и новаторство казахского правителя. Разработка и участие в публикации научного издания «Мухтасар» совместно с известным востоковедом А. Казембеком впервые среди российских тюрковедов стали значительным достижением науки того времени.

1825-1826 годах хан Жангир добился у царя Николая I разрешения об установлении в ханстве должности врача и открытия аптеки. Для оказания медицинской помощи населению в Оренбургском военном госпитале были учреждены четыре стипендии для казахский детей и направлены на обучение подающие надежды юноши.

В частности, по инициативе хана Букеевской Орды Жангира стали действовать подобные школы для казахских юношей [14, p.243].

Жангир уделял большое внимание всем сферам общественной жизни, особенно заботясь о науке и культуре. Устанавливал контакты с известными учеными своего времени и создавал возможности для формирования у них соответствующих взглядов на казахский быт. Он взялся за изучение географического и экономического положения Букеевской Орды и тесно общался с исследователями.

Например, в 1828 году талантливый русский ученый Г.С. Карелин приехал в Орду по приглашению Жангира, 10 лет занимался изучением Букеевской степи, составил первую карту Внутренней Орды, также работал советником хана. Особенно высоко оценивались его работы по изучению природы, флоры и фауны Нарына.

Джангир был инициатором лесоразведения в степи, улучшения пород скота, проведения сезонных ярмарок в Орде, открытия школы, училища и т.д. [15, p.2386].

Примечательны отношения Жангир хана с В.И. Далем. Помощник генерал-губернатора Оренбурга по чрезвычайным вопросам, известный лингвист Владимир Иванович Даль часто бывал в Орде по различным делам и внес большой вклад во всестороннее развитие региона. С помощью Даля у воспитанников Ординской школы появилась возможность продолжить обучение в Оренбурге и Петербурге

Главная достопримечательность Букеевской Орды пески Нарына, протяженностью 150 километров и шириной 30 километров, неглубоко от поверхности земли добывается пресная вода. Хану удалось эффективно использовать эту богатую

природу для развития животноводства. Хан также занимался разведением и улучшением крупного рогатого скота. В то время Нарын считался идеальным местом, где всесезонно можно было пасти скот. Летом заготавливались корма для животных. Из-за границы хан купил сенокосилку. На сенокосных угодьях были установлены зимовья. Был проложен водопровод [16,с.42].

В результате всех этих усилий народ ни в чем не нуждался. В первые годы правления Жангир хана народ стал жить спокойной, полноценной жизнью.

Жангир также завершил начатое его отцом Букеем дело: закрепление песков с помощью высадки растений, устройство лесных массивов. Были приглашены специалисты из России и проведена исследовательская работа. В соответствии с геологическими и почвенными условиями земли были высажены самые устойчивые виды тополей, образовался сосновый лес.

Жангир хан считал, что торговля является основой экономики страны. Наладил торговые связи с соседними губерниями России – Астраханской, Саратовской, Оренбургской, с Бухарским и Хивинским ханствами, также с крымскими татарами, калмыцким народом. «Ханская ярмарка», которая проводилась три раза в год (весной, осенью и зимой) играла огромную роль в общественной жизни страны. Первая ярмарка была организована в 1832 году [17].

Исследователь П. Небольсин писал о «Ханской ярмарке» в Букее: «Капиталисты торгуют здесь примерно на два миллиона сомов. Каждый раз на ярмарку привозили примерно 100 тысяч овец, 6 тысяч голов крупного рогатого скота, 2 тысячи лошадей. Также продавались шкуры лошадей, крупного рогатого скота, овец и коз, козий пух, верблюжья и овечья шерсть, войлок, меха.

11 августа 1845 года на джайляу, простершийся вдоль реки Таргын, в возрасте 41 года скончался последний казахский хан Жангир Букеевич. После его смерти царское правительство отменило ханство во Внутренней Орде.

Заключение. Жангир хан прославился своими гуманными взглядами в управлении страной, оставил после себя богатое наследие, способствовавшее историческому развитию казахского народа. Основанная им Орда преобразилась как социально-экономический, культурно-просветительский центр.

Он усиленно трудился над улучшением экономики, культуры, образования, религии и языка страны. 22 года правления Жангира запомнились тем, что он воплотил в жизнь свои самые смелые идеи, оставил неизгладимый след в казахской истории, богатое духовное наследие.

Жангир хан, находясь у власти, прежде всего служил интересам народа, неустанно вел его в сторону цивилизованного развития, стал образцовым примером для всего казахского народа, прежде всего для молодого поколения.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бозымов Қ., Орамах Ж. Жәңгір хан - реформатор [Текст] / Қ.Бозымов, Ж.Орамах . - Орал-Ақтөбе : Жәнгір хан атындағы БҚАТУ, 2011. - 200 б.

2. Yensenov K. A., Karassayev G. M., Aktailak B. B., Shurshitbay B. Sh. The Development of Kazakh Elders and Biys Roles in Russian Empire Administration Structure (XIX century) [Text] / K. A. Yensenov, G. M. Karassayev, B. B. Aktailak, B. Sh. Shurshitbay// Bylye Gody. - 2024. -19(3). - P. 1179 - 1188

3. Боранғалиұлы Т. Жәңгір хан [Текст] / Т. Боранғалиұлы. - Алматы : "Абзал-Ай" баспасы, 2014. - 528 б.

4. Ақбай Ж. Жәңгір хан. Хан Жангир. Shangir Khan [Текст] / Ж. Ақбай. - Орал: Полиграфсервис, 2001. - 132 б.

5. Мукатаев Г. К. Хан Жангир. Великий преобразователь степи: Документы и Материалы [Текст] / Г.К.Мукатаев. - СПб., 2001. - 88 с.

6. Кенжетаев Б. Некоторые штрихи к биографии хана Жангира [Текст] / Б.Кенжетаев // Казахстанская правда . - 1995. - 16 августа.

7. Бозымов Қ.Қ. Жәңгір ханның мол мұрасы [Текст] / Қ.Бозымов. - Алматы: Альманах, 2022. - 164 б.

8. Фукс К.А. Пребывание в Казани киргизского хана Джангиря [Текст] / К.А.Фукс // Казанский вестник. - 1826. - № 9-12 // В кн.: Букеевской орде 200 лет. Алматы: Өлке, 2001. - 216 с.

9. Журасова А.Ш., Муталова Д.С. Бөкей Ордасындағы білім беру ісінің тарихынан [Текст] / А.Ш. Журасова, Д.С. Муталова // КазҰУ Хабаршысы. Тарих Сериясы - 2022. - №2. - 117- 126 б.

10. Yespenbetova A. M., Ganibaeva Zh. A., Aman A. B., Abdenov A. Zh. To the Issue of the Institution of Sultans in Kazakh Society in 1824-1869 [Text] / A.M.Yespenbetova, Zh.A. Ganibaeva, A. B. Aman, A. Zh. Abdenov // Bylye Gody. - 2024. -19(4). - P.1624-1634

11. Bekmagambetova M., Aitmukhambetov A., Bekmagambetov R., Nurusheva G. Orenburg Educational Institutions in Training Personnel for Administrative and Managerial Institutions of the Turgai Region in the 19th - early 20th centuries [Text] / M.Bekmagambetova, A.Aitmukhambetov, R.Bekmagambetov, G.Nurusheva // Bylye Gody. - 2024. - 19(3). - P. 1294 - 1303

12. Хайдаров.Е. Жәнгір хан - ағартушы [Текст] / Е.Хайдаров // Заңғар.- 2013. -15 наурыз.

13. Орамах Ж. Жәңгір ханның білім жолы [Текст] / Ж. Орамах // Отан тарихы - Отечественная история. - 2017. - № 2. - 139-148 б.

14. Nurusheva G., Aitmukhambetov A., Simonov S. Education of Kazakh Students at Kazan University in the late 19th - early 20th centuries [Text] / G. Nurusheva, A. Aitmukhambetov, S. Simonov // Bylye Gody. - 2023. -18(1). - P. 239 - 250

15. Izbassarova G.B. Legitimization of Power in the Kazakh Steppe in the XIX century. Search for the Cartridge: Khiva Khanate or Russian Empire? (by the Example of the Fate of Sultan Kaipgali Ishimov [Text] / G. B. Izbassarova // Bylye Gody. - 2020. - Vol. 58. Is. 4 - P. 2385-2395

16. Зиманов С. З. Россия и Букеевское ханство [Текст] / С.З. Зиманов. - Алма-Ата: Наука, 1982. - 171 с.

17. Касымбаев Ж. Хан Жангир-государственный деятель (1801-1845гг.) Исторические личности [Text] / Ж. Касымбаев // Вестник КазГУ. Серия историческая. - 2001. - № 1. - с. 106-113.

REFERENCES

1. Bozymov K., Oramah ZH. ZHangir han - reformator [Tekst] / K.Bozymov, ZH.Oramah . - Oral-Aktobe : ZHangir han atyndagy BKATU, 2011. - 200 b.

2. Yensenov K. A., Karassayev G. M., Aktailak B. B., Shurshitbay B. Sh. The Development of Kazakh Elders and Biys Roles in Russian Empire Administration Structure (XIX century) [Text] / K. A. Yensenov, G. M. Karassayev, B. B. Aktailak, B. Sh. Shurshitbay// Bylye Gody. - 2024. -19(3). - P. 1179 - 1188

3. Borangaliyly T. ZHangir han [Tekst] / T. Borangaliyly. - Almaty : "Abzal-Aj" baspasy, 2014. - 528 b.

4. Akbai ZH. ZHangir han. Han ZHangir. Shangir Khan [Tekst] / ZH. Akbai. - Oral: Poligrafservis, 2001. - 132 b.

5. Mukataev G. K. Han ZHangir. Velikij preobrazovatel' stepi: Dokumenty i Materialy [Tekst] / G.K.Mukataev. - SPb., 2001. - 88 s.

6. Kenzhetaev B. Nekotorye shtrihi k biografii hana ZHangira [Tekst] / B.Kenzhetaev // Kazahstanskaya pravda . - 1995. - 16 avgusta.

7. Bozymov K. K. ZHangir hannyn mol myrasy [Tekst] / K.Bozymov. - Almaty: Al'manah, 2022. - 164 b.

8. Fuks K.A. Prebyvanie v Kazani kirgizskogo hana Dzhangirya [Tekst] / K.A.Fuks // Kazanskij vestnik. - 1826. - № 9-12 // V kn.: Bukeevskoj orde 200 let. Almaty: Өlke, 2001. - 216 s.

9. ZHurasova A.SH., Mutalova D.C.Bokei Ordasyndagy bilim beru isinin tarihynan [Tekst] / A.SH. ZHurasova, D.C. Mutalova // KazYU Habarshysy. Tarih Seriyasy - 2022. - №2. - 117- 126 b.

10. Yespenbetova A. M., Ganibaeva Zh. A., Aman A. B., Abdenov A. Zh. To the Issue of the Institution of Sultans in Kazakh Society in 1824-1869 [Text] / A.M.Yespenbetova, Zh.A. Ganibaeva, A. B. Aman, A. Zh. Abdenov // Bylye Gody. - 2024. -19(4). - P.1624-1634

11 Bekmagambetova M., Aitmukhambetov A., Bekmagambetov R., Nurusheva G. Orenburg Educational Institutions in Training Personnel for Administrative and Managerial Institutions of the Turgai Region in the 19th - early 20th centuries [Text] / M.Bekmagambetova, A.Aitmukhambetov, R.Bekmagambetov, G.Nurusheva // Bylye Gody. - 2024. - 19(3). - P. 1294 - 1303

12. Hajdarov.E. ZHangir han - agartushy [Tekst] / E.Hajdarov // Zaңғar.- 2013. -15 nauryz.

13. Oramah ZH. ZHangir hannyn bilim zholy [Tekst] / ZH. Oramah // Otan tarihy - Otechestvennaya istoriya. - 2017. - № 2. - 139-148 b.

14. Nurusheva G., Aitmukhambetov A., Simonov S. Education of Kazakh Students at Kazan University in the late 19th - early 20th centuries [Text] / G. Nurusheva, A. Aitmukhambetov, S. Simonov // Bylye Gody. - 2023. -18(1). - P. 239 - 250

15. Izbassarova G.B. Legitimization of Power in the Kazakh Steppe in the XIX century. Search for the Cartridge: Khiva Khanate or Russian Empire? (by the Example of the Fate of Sultan Kaipgali Ishimov [Text] / G. B. Izbassarova // Bylye Gody. - 2020. - Vol. 58. Is. 4 - P. 2385-2395

16. Zimanov S. Z. Rossiya i Bukeevskoe hanstvo [Tekst] / S.Z. Zimanov. - Alma-Ata : Nauka, 1982. - 171 s.

17. Kasymbaev ZH. Han ZHangir-gosudarstvennyj deyatel' (1801-1845gg.) Istoricheskie lichnosti [Text] / ZH. Kasymbaev // Vestnik KazGU. Seriya istoricheskaya. - 2001. - № 1. - s. 106-113.

ТҮЙІН

Мақалада атақты мемлекет қайраткері Жәңгір ханның реформаторлық және ағартушылық қызметі зерттеліп, қарастырылады. Бөкей Ордасының құрылуы және дамуы тарихы, Жәңгір ханның ішкі және сыртқы саясатының ерекшелігі мен жаңашыл қызметіне талдау жасалынады. Сонымен қатар, Жәңгір ханның өмірі, ағартушылық қызметі, білім мен ғылым саласына қосқан үлесі туралы жан-жақты баяндалады.

Кіші Жүздің саяси жағдайы мен Бөкей хандығының құрылуының алғышарттары, Бөкейдің билікке келуінің мәні ашылып көрсетіледі.

Зерттеу барысында Бөкей мен Жәңгірдің ел билеушілік, тұлғалық тұстары, өмірі мен қызметі, шетелдермен қарым-қатынасы қарастырылады.

Жәңгір ханның билікке келуі және оның реформаторлық қызметі жаңашыл тұрғыдағы құбылыстар мен өзгерістердің енгізілуімен ерекшеленеді. Ол хандықтың саяси құрылымына, қоғамдық өмірге өзгерістер енгізуді, жер қатынастарын реттеу, салық саясатындағы кейбір хандық үлгілерді түбірімен өзгертуді көздейді.

Мақалада Жәңгір ханның тұсында Бөкей Ордасының шаруашылық құрылымы мен, саяси-әлеуметтік дамуында елеулі өзгерістер енгізіліп, қазақтар көшпенділіктен-отырықшылыққа ауысқандығы, сауда-саттық істері мен әртүрлі кәсіптерді меңгергендігі туралы баяндалады. Сонымен қатар, мәдени дамуда, оқып-білім алуда, басқа да рухани байлықтарды игеруде түбегейлі өзгерістер жасалғандығы тарихи деректер арқылы ашылып көрсетіледі.

ӘОЖ: 13
ҒТАМР 13.07

Сулейменов М. А., әлеуметтік ғылымдар магистрі, https://orcid.org/0009-0005-9903-2671
КеАҚ «Жәңгір хан атындағы Батыс Қазақстан аграрлық-техникалық университеті», Орал қаласы, Жәңгір хан көшесі 51, 090009, Қазақстан, suleimenov.m.a@gmail.com

Suleimenov M. A., master of Social Science, https://orcid.org/0009-0005-9903-2671
NJSC "West Kazakhstan Agrarian and Technical University named after Zhangir Khan", Uralsk, st. Zhangir Khan 51, 090009, Kazakhstan, suleimenov.m.a@gmail.com

МАХАЯНА ФИЛОСОФИЯСЫНДАҒЫ КАРМА КОНЦЕПЦИЯСЫ
THE CONCEPT OF KARMA IN MAHAYANA PHILOSOPHY

АҢДАТПА

Бұл мақалада Махаяна философиясындағы карма концепциясы терең философиялық, аксиологиялық, гносеологиялық және антропологиялық қырынан жан-жақты талданады. Карма ілімі буддизмнің негізгі ұғымдары — дхарма, скандха, сана, реинкарнация, өзара шарттылық (пратитьясамутпада) және бос кеңістік (шуньята) теорияларымен тығыз байланыстырыла қарастырылады. Мақалада карма тек қана әрекет пен салдардың қатынасы ретінде емес, тұлғаның ішкі ниеті мен сананың қалыптасу үдерісі арқылы пайда болатын рухани-танымдық заңдылық ретінде сипатталады. Автор буддизм философиясындағы Төрт Асыл Шындық пен он екі буынды өзара тәуелді туындау тізбегіне сүйене отырып, карманың адамның болмысын қалай қалыптастыратынын, оның өткен, қазіргі және болашақ өмірлерге әсер ететінін түсіндіреді. Сонымен қатар, мақалада клеша (ақыл-сананы бұлдырлататын ішкі уыттар) ұғымы арқылы карманың пайда болу тетіктері, надандықтың (авидья) адам санасында жалған «Мен» ұғымын қалай тудыратыны және бұл процестің құштарлық пен байлану сезімдеріне қалай ұласатыны кеңінен қарастырылады. Карма — адамның ішкі ниеттері мен ой, сөз, іс арқылы жасайтын әрекеттерінің рухани іздері ретінде сипатталып, олардың сананың терең қабаттарында сақталып, келесі өмірлерге ықпал ететіні баяндалады. Махаяна философиясында карма бос кеңістік (шуньята) ұғымымен тығыз байланыса отырып, барлық құбылыстардың шартты және өзара тәуелді болмысқа ие екендігін дәлелдейді. Яғни, шынайы таным — объектілерді дербес, өз мәнімен бар деп қабылдаудан бас тартып, олардың шартты әрі өткінші табиғатын түсіну арқылы жүзеге асады. Бұл — Прасангика Мадхьямика мектебінің ұстанымы. Мақалада батыстық философиялық категориялармен салыстырмалы талдау жүргізіліп, буддизмдегі карма түсінігінің өзіндік ерекшеліктері мен универсалдық сипаты ашылады. Қорытындысында карма концепциясы тек моральдық немесе діни категория ғана емес, адамның ішкі әлемін, танымын, санасын және өмір салтын қалыптастыратын іргелі философиялық ілім ретінде сипатталады. Бұл тұжырым қазіргі замандағы жаһандық рухани және этикалық дағдарыстар аясында буддизм философиясының өзектілігін көрсетеді.

ANNOTATION

This article provides a comprehensive analysis of the concept of karma in Mahayana philosophy from philosophical, axiological, gnoseological, and anthropological perspectives. The doctrine of karma is examined in close connection with the core concepts of Buddhism—dharma, skandha, consciousness, reincarnation, dependent origination (pratityasamutpada), and the theory of emptiness (sunyata). Karma is described not merely as a relationship between action and consequence but as a spiritual-cognitive law emerging through the individual's inner intentions and the process of consciousness formation. Drawing upon the Four Noble Truths and the twelve-linked chain of dependent origination in Buddhist philosophy, the author explains how karma shapes human existence and affects past, present, and future lives. Furthermore, the article explores in depth the mechanisms of karma's emergence through the concept of kleśa (mental afflictions that cloud the mind), revealing how ignorance (avidya) gives rise to the illusion of a false "self" and how this leads to desire and attachment. Karma is portrayed as the spiritual imprint of one's inner intentions and actions—mental, verbal, and physical—that are stored in the deeper layers of consciousness and influence future rebirths. In Mahayana philosophy, karma is closely intertwined with the concept of emptiness (sunyata), demonstrating that all phenomena exist conditionally and interdependently. True knowledge, therefore, arises not by perceiving objects as independent entities with inherent essence, but by understanding their conditional and transient nature. This is the view upheld by the Prāsaṅgika Madhyamaka school. The article includes a comparative analysis with Western philosophical categories, highlighting the unique characteristics and universal significance of the Buddhist notion of karma. Ultimately, the concept of karma is presented not merely as a moral or religious category, but as a fundamental philosophical doctrine that shapes an individual's inner world, cognition, consciousness, and way of life. This conclusion underlines the relevance of Buddhist philosophy in the context of contemporary global spiritual and ethical crises.

Түйін сөздер: *Будда, Махаяна, Мадхьямика, карма, шуньята, сангха*
Key words: *Buddha, Mahayana, Madhyamaka, karma, sunyata, sangha*

Кіріспе. Осы мақалада Махаяна философиясындағы карма концепциясы философиялық және дінтанулық тұрғыдан жан-жақты талданады. Карма ілімінің құндылықтық (аксиологиялық), адамтанымдық (антропологиялық), білімге жету жолдарына қатысты (гносеологиялық), психологиялық, сондай-ақ теориялық-әдіснамалық негіздері ашылып көрсетілген. Мақалада үнді философиясының әртүрлі бағыттарында және буддизмнің түрлі тармақтарында карманың мәні қалай түсінілетіні салыстырмалы түрде қарастырылады. Сонымен қатар, карма ұғымының *дхарма, скандха, сана, реинкарнация*, өзара шарттылық және бос кеңістік (шуньята) сынды ұғымдармен байланысы сараланып, олардың арасындағы философиялық ұқсастықтар мен айырмашылықтар талданады. Карма тек қана іс-әрекеттің салдары ретінде емес, жауапкершілік феномені ретінде де қарастырылады. Бұған қоса, мақалада буддизм мен қазіргі ғылымның карма заңына қатысты көзқарастары арасындағы параллельдерге де назар аударылып, Махаяна дәстүріндегі карма концепциясының тереңдігі мен өзектілігі ашып көрсетіледі.

Зерттеу материалдары мен әдістері. Махаяна философиясындағы карма концепциясын зерттеу барысында салыстырмалы-философиялық, герменевтикалық, феноменологиялық және аналитикалық тәсілдер қолданылды. Бұл тәсілдер бірін-бірі толықтырып, буддизм философиясының ішкі логикасын, терминологиялық жүйесін және дүниетанымдық ерекшеліктерін тереңірек түсіндіруге мүмкіндік берді. Салыстырмалы-философиялық әдіс: Бұл әдіс арқылы Махаяна бағытының карма туралы

ілімі басқа буддистік бағыттармен (Хинаяна, Тхеравада) және үнді философиясының жүйелерімен (санкхья, веданта, ньяя) салыстырыла қарастырылды. Мұндай салыстыру нәтижесінде Махаянадағы карма концепциясының бірегейлігі, оның шуньята мен өзара шарттылықпен байланысы анықталды. Герменевтикалық тәсіл: Буддистік канондық мәтіндер мен классикалық философиялық еңбектердің (әсіресе Васубандху мен Нагарджуна шығармаларының) мән-мағынасы осы тәсіл арқылы ашылып, олардың мәдени-философиялық контексі мен символдық құрылымы түсіндірілді. Сонымен қатар, бастапқы түпнұсқалармен (санскрит және тибет тілдеріндегі аудармалар арқылы) жұмыс жасау арқылы мәтіндердің терең философиялық астары анықталды. Феноменологиялық көзқарас: Бұл тәсіл карма ұғымын адамның ішкі дүниесімен, тәжірибесімен және субъективті санасымен байланыстыра отырып зерттеуге мүмкіндік берді. Яғни, карма — тек сыртқы іс-әрекеттің нәтижесі емес, адам ниетінің, эмоционалдық күйінің, танымдық қабілетінің тікелей көрінісі ретінде талданды. Бұл әдіс арқылы карманың терең онтологиялық табиғаты мен оның санамен байланысы ашылды. Интердисциплинарлық әдіс: Мақалада буддизм философиясындағы карма ілімі қазіргі нейроғылым, психология, этика және кванттық физика салаларындағы кейбір идеялармен байланысты салыстырмалы талдауға ұшырады. Бұл тәсіл карма концепциясының қазіргі ғылыммен үндестігін, әмбебаптығын және өміршеңдігін дәлелдеуге мүмкіндік берді. Мысалы, сананың үздіксіздігі туралы буддистік көзқарас қазіргі когнитивтік ғылымдардағы «сана ағымы» ұғымымен салыстырылды.

Хинаяна мен Махаяна – буддизм философиясының екі тең дәрежелі бағыты. Екеуінің де өз жолын ұстанатын ізбасарлары мен белгілі бір өңірлерде орныққан ықпал аймақтары бар. Буддизм ілімінің аясында бұл екі бағыт – бір баспалдақтың сатылары іспетті. Олар адам санасын сансара әлеміндегі азап пен күйзелістің жалпылама сипатын ұғынудан бастап, бодхисаттва көзқарасындағы «Мен» мен «Өзге» арасындағы шекараның жойылып, біртұтастық ретінде қабылдануына дейін алып келеді. Бұл санадағы өзгеріс – төмен деңгейден жоғары рухани деңгейге көтерілу үдерісі – екі негізгі жолмен іске асады: біріншіден, адам моральдық-этикалық негіздерді бойына сіңіреді, екіншіден, «бос кеңістік» (шуньята) пен барша құбылыстың өзара шартты байланысы туралы ілімді меңгереді. Буддистік түсінікте бос кеңістік – барлық нәрсенің түпкі табиғаты. Бұл – қандай да бір құбылыстың толықтай дербес әрі басқа ештеңеге тәуелсіз бола алмайтындығын, яғни «өздігінен болмысқа ие еместігін» (свабхава) білдіреді. Нағыз ояну, яғни нирванаға жету, тек қана осы «бос кеңістіктің» ең нәзік қырларын терең түсіну арқылы мүмкін болады.

Осылайша, Махаяна философиясындағы карма ұғымы — бос кеңістік пен өзара тәуелді өмір сүру туралы теорияға негізделген тұтас бір жүйе болып табылады. Жалпы алғанда, бүкіл буддизм философиясы қандай тармаққа бөлінсе де, өз тірегін мынадай іргелі ілімдерден табады: Төрт Асыл Шындық және өзара шарттылық қағидасы. Бұл ілімдер арқылы өмірдің табиғаты, азаптың себебі және одан құтылу жолы терең түсіндіріледі. Ал карма осы жүйеде адам әрекетінің салдарын түсіндіретін басты ұғым ретінде көрініс табады.

Төрт Асыл Шындық — Будда Шакьямунидің алғаш айтқан уағызының өзегі. Бұл ілім тірі жандардың не себепті азап шегетінін және сол азаптан қалай арылуға болатынын түсіндіреді. Аталған шындықтар сырттай қарағанда дәлелдеуді қажет етпейтін, аксиома секілді көрінгенімен, олар логикалық тұрғыда талдауға да, тәжірибе арқылы тексеруге де мүмкіндік береді. Мәселен, қасіреттің өмірдің ажырамас бөлігі екені, яғни біздің болмысымыздың, тәніміз бен психикалық құрылымымыздың (скандха) өзінде азапқа бейімділік бары – логикалық зерттеулер арқылы нақты дәлелдене алады. Басқаша айтқанда, біздің тәніміз тек қазіргі өмірдегі қиындықтардың көзі ғана емес, ол — алдағы азаптардың да ұрығын өз бойында жинақтайтын негіз [1, 7 б.].

Осылайша, буддизм тек көзге көрініп тұрған азаптар туралы ғана емес, сонымен қатар әлі пайда болмаған, бірақ болу ықтималдығы жоғары ішкі күйзелістер туралы да сөз қозғайды. Бұл — санада сақталған кармалық әсерлердің жүзеге асу үдерісіне байланысты. Яғни, буддизмнің карма туралы ілімі осы үдерістің «механизмін» түсіндіре отырып, бірнеше маңызды ұғымның – скандха, сана, бос кеңістік және өзара тәуелділік – өзара тығыз байланысын көрсетеді. Будда философиясы бойынша, біз «тұлға» деп атайтын болмыс – шын мәнінде, денелік және рухани құрамдас бөліктердің уақытша бірлестігі ғана. Бұл элементтер бір орында тұрмайды, үнемі өзгеріп отырады және олардың әрқайсысы белгілі бір қызметті атқарады. Осы сипаттарына қарай олар бес топқа (скандхаға) бөлінеді. Міне, дәл осы бес скандханың жиынтығы — адам өміріндегі қасіреттің негізі болып табылады.

«Абхидхармакоша» трактатында шартты (яғни туындаған) өмір сүру мен бес скандха жайлы былай делінеді: тіршіліктің барлық құбылыстары бес топқа бөлінеді – соның ішінде сезімдік танымдар да бар. Бұл элементтердің бір ерекшелігі – олар тұрақсыз, мәңгі емес, әрқашан өзгеріске ұшырайды. Дәл осы тұрақсыздық — буддистік талдаудың басты тақырыбы. Бұл бес топ феноменалды болмыстан арылуға қабілетті, яғни нирванаға жетуге жол аша алады. Бірақ олар өз ішінен қайшылық пен бұлдырлыққа толы. Мұндай күңгірт күй — әлі де дүниелік сананың жетегінде жүрген скандхаларға тән. Будда философиясы бұл болмысты қате түсініктердің ошағы, адасқан сананың мекені деп сипаттайды. Олар – өмірдің уақытша көріністері, әрі солардың себептерімен тығыз байланысты. Міне, осындай күрделі жүйе – адамның жалған «Менін» құрап тұрған дүниелік болмыс [2, 5 б.].

Демек, «бұлдырлықпен көмкерілген» скандхалар – карманың бастау көзі әрі феноменалды өмірдің (сансараның) негізгі себебі болып табылады. Бұл жерде маңызды сұрақ туындайды: адам болмысын құрайтын психо-физикалық элементтер қалайша карманың қайнар көзіне айналады?

Скандхалардың алғашқысы – рупа-скандха, яғни материалдық немесе денелік форма. Бұл – адамның сезім мүшелері арқылы танылатын, көзге көрініп, қолмен ұсталатын әлемнің элементтері. Алайда буддизм философиясындағы «зат» немесе «материя» ұғымы күнделікті тұрмыстағы түсінікпен толық сәйкес келе бермейді. Буддистік түсінік бойынша, заттық әлемнің негізін төрт іргелі элемент (немесе Төрт Ұлы Текті Негіз – чаттари маха-бхутани) құрайды. Олар: жер, су, от және жел. Бұл элементтер кез келген тірі дененің физикалық негізі болып саналады және әрқайсысы өзіне тән қасиеттермен сипатталады:

- Жер – қаттылық пен беріктік,
- Су – сұйықтық пен біріктіруші қасиет,
- От – жылу мен түрлендіруші қуат,
- Жел (ауа) – қозғалыс пен серпінділік.

Будда ілімінде бұл элементтер сезім арқылы танылғанда — қатты, сұйық, жылы немесе қозғалыстағы нәрсе ретінде қабылданады. Бұлар тек өз алдына тұрған табиғи күштер емес, тіршілік иесінің денесінде әрекет ететін белсенді процестердің көрінісі болып табылады. Сонымен қатар, осы төрт негізден туындайтын туынды формалар (упадая-рупа) да материяның құрамына кіреді [2, 5 б.].

Буддизм философиясында Төрт Ұлы Текті Негіздің туындылары (упадая-рупа) ұғымына бес сезім мүшесі мен соларға тән қабылдау қабілеттері енеді. Атап айтқанда, көз, құлақ, мұрын, тіл және дене, сондай-ақ олар арқылы танылатын сыртқы әлем нысандары – көру бейнесі, дыбыс, иіс, дәм және сезілетін заттар. Бұлар – біздің түйсік арқылы дүниені тануымыздың негізі. Бұған қоса, буддизм ілімінде ақыл-оймен қабылданатын дүниелер де жеке объект ретінде қарастырылады. Олар «дхармаятана», яғни сананың қабылдау саласы деп аталады. Бұл салаға ой, ұғым, елес, естелік сияқты

ішкі менталды құбылыстар жатады. Мәтіндерде бұл былайша сипатталады: «Ойдың толқуы мен ойсыз күй, жағымды және жағымсыз әсерлердің араласуы — міне, бұлар да Ұлы Текті Негіздерден туындайтын құбылыстар. Бірақ олардың табиғаты жасырын, сырттай көрінбейді». Яғни, сезім арқылы танылатын нәрселер ғана емес, ішкі психикалық құбылыстар да – табиғи элементтердің нәзік көрінісі ретінде түсіндіріледі. Бұл – буддизмнің материя мен сана арасындағы тығыз байланысын көрсететін ерекше тұсы [2, 5 б.].

Осылайша, рупа-скандха, яғни материалдық форма жиынтығы, адамның болмысындағы да, сыртқы дүниедегі де барлық заттық элементтерді қамтиды. Бұл – тек дене емес, сонымен қатар адамның сыртқы әлеммен байланысын қамтамасыз ететін сезім мүшелері мен олардың объектілері. Буддистік мәтіндерде бұл былай деп сипатталады: «Сезілетін нәрселерге — бес сезім мүшесі, солардың объектілері және жасырын (сырттай байқалмайтын) формалар жатады. Олардың негізінде – көз бен басқа мүшелердің нәзік, сезгіш қабілеті жатыр» [2, 5 б.]. Көздің нәзік сезімдік қабілеті – бұл көру процесінің өзі, ал құлақтың нәзік қабілеті – есту. Яғни, бұл — әрбір сезім мүшесінің өзіне ғана тән қызметін атқаруы, яғни көру, есту, иіс сезу, дәм сезу немесе денемен сезіну әрекеттері. Ал «жасырын» немесе «көрінбейтін» деп аталатын нәрсе – бұл сезімдік сананың өзі. Мысалы, көзбен көріп тұрған бейнені тек көз емес, сонымен қатар көздің санасы – көру арқылы дүниені қабылдау қабілеті таниды. Дәл сол сияқты, дыбысты тек құлақ естімейді, оны есту санасы таниды. Осылайша, сезім мүшелері мен олардың нәзік қабілеттері бірлесіп жұмыс істейді, ал сана сол әрекетті толықтырып, қабылдау процесін аяқтайды.

Екінші скандха — ведана-скандха, яғни сезімдер жиынтығы. Бұл — адамның жағымды, жағымсыз немесе бейтарап күйді бастан өткеруі. Мұндай сезімдер сезім мүшелері мен сананың сыртқы нысандармен түйісуі нәтижесінде туындайды. Буддизм ілімінде бұл сезімдер алты түрлі болады. Көздің көрініспен жанасуынан туған сезім, құлақтың дыбыспен түйісуінен, мұрынның иіспен, тілдің дәммен, дене терісінің затпен жанасуынан және ең бастысы — сананың (буддизмде ол алтыншы сезім мүшесі ретінде қарастырылады) ойлармен, елестермен немесе ішкі бейнелермен түйісуінен туған сезімдер. Яғни, тәндік те, ой-сезімдік те барлық түйсік күйі осы ведана-скандхаға жатады.

Үшінші скандха — санджня-скандха, яғни қабылдау мен тану жиынтығы. Бұл скандха арқылы адам дүниедегі заттарды бір-бірінен ажырата бастайды: мысалы, дөңгелек пен төртбұрышты, ақ пен қараны, таныс пен бейтанысты. Сондай-ақ бұл топқа ұғымдар мен түсініктерді қалыптастыру қабілеті де кіреді. Сезімдер сияқты, қабылдау да алты бағытта жүреді — алты ішкі қабілет пен алты сыртқы объект арасындағы байланыс арқылы. Адам заттарды, дыбыстарды, иістерді және ой бейнелерін тек сезіп қана қоймайды, оларды таниды, саралайды, салыстырады. Сондықтан буддизмде былай делінеді: «Қабылдаудың мәні — нысанның ерекшелігін ұстап қалу». Осылайша, сезім мен қабылдау — будда іліміндегі тұлғаның іргелі қабаттары ретінде қарастырылады [2, 6 б.].

Төртінші скандха – самскара-скандха, яғни ой-сананың қалыптастырушы факторларының жиынтығы. Бұл — адамның ішкі жан дүниесінде пайда болатын ниет, ерік, ойдың қозғаушы күші, яғни кез келген саналы әрекеттің бастамасы. Бұл әрекеттер жақсы да, жаман да, бейтарап та болуы мүмкін. Буддизм бойынша, нақты карма дәл осы скандха арқылы қалыптасады. Ниет — бұл жай ғана ой емес, ол – ақылдың белсенді әрекеті, белгілі бір бағытқа итермелейтін күш. Адам саналы түрде бір іске ұмтылған сәттен бастап, оның ойы әрекетке айналып, карма туындайды. Бұл ниеттер мен ерік импульстары да адамның алты ішкі қабілетімен (көз, құлақ, мұрын, тіл, дене және сана) және соларға сәйкес келетін сыртқы нысандармен тығыз байланысты. Айта кету керек,

сезім (ведана) мен қабылдау (санджня) — жай тіршілік әрекеттері болғандықтан, олар карма қалыптастырмайды. Ал мынадай ой әрекеттері: ерік, зейін, сенім, табандылық, шоғырлану, парасат, күш-жігер, құштарлық, өшпенділік, надандық, тәкаппарлық және тағы басқалары — кармалық әсер тудыруы мүмкін.

Будда дәстүріндегі ұлы ойшылдардың бірі — V ғасырдағы Асанга өзінің «Абхидхарма жинағында» осындай 51 менталды факторды сипаттап кеткен. Ал Васубандху «Абхидхармакоша» еңбегінде 46 ой әрекетінің түрін атайды. Бұлар — сананың екінші деңгейлі, бірақ әсері күшті құрамдас бөліктері. Дәл осы факторлар сананың жай-күйін анықтайды: адамның ойы ашық па, тұнық па, әлде қараңғы ма — соны қалыптастыратын да осы «ішкі ойыншылар» [3, 196 б.].

Бесінші скандха — виджняна-скандха, яғни сана жиынтығы. Бұл — адамның ойлау, тану, ұғыну қабілетін білдіреді. Карма ілімін дұрыс түсіну үшін сананың буддистік тұжырымын білу ерекше маңызды. Виджняна — бұл сезім мүшелері мен ақыл-ойға негізделген танымдық күш. Оның әрқайсысы белгілі бір қабілетке (көз, құлақ, мұрын, тіл, дене немесе сана) сүйеніп жұмыс істейді және соларға сәйкес объектіні қабылдайды (бейне, дыбыс, иіс, дәм, денелік жанасу немесе ой мен елес сияқты менталды құбылыстар).

- Буддизм бойынша, танып-білу процесі бірнеше кезеңнен тұрады:
- Сезіну – сыртқы немесе ішкі әсерді түйсіну;
- Қабылдау – объектіні қабылдап, сананың назарына іліктіру;
- Ажырата білу – объектіні басқа нәрселерден ерекшелеу.

Нақты бейне қалыптастыру – санада танылған заттың тұрақты бейнесі пайда болады, Бағалау – объектіге деген ішкі қатынас қалыптасады: ол ұнай ма, ұнамай ма, бейтарап па. Осының бәрінде сана белсенді рөл атқармайды, тек объектіні таниды, оны бейнелеп көрсетеді, яғни айнаның кескінді көрсетуі сияқты – қабылдайды, бірақ өзі ештеңе қоспайды.

Мысалы, көру санасы өз негізі ретінде — көзді, ал объект ретінде — көру бейнесін қабылдайды. Ал ақыл-ой санасы (манас) – өзінің негізі ретінде ойлаушы ақылды, ал объектісі ретінде — ойды, ұғымды немесе идеяны алады. Демек, сана — басқа қабілеттермен тығыз байланысты, оларсыз өздігінен өмір сүре алмайды. Сондықтан, будда философиясында сана алты ішкі қабілетпен (көз, құлақ, мұрын, тіл, дене және ақыл) және оларға сәйкес келетін алты сыртқы объектімен (бейне, дыбыс, иіс, дәм, жанасу және ой) тығыз байланыста болады. Бұл байланыс арқылы сананың алты түрі айқындалады:

- Көру санасы;
- Есту санасы;
- Иіс сезу санасы;
- Дәм сезу санасы;
- Терімен сезіну санасы;
- Ақыл-ой немесе менталды сана.

Осы алтауы «бастапқы саналар» деп аталады және олар буддистік философиядағы ақыл әрекеттерінің негізгі формасы ретінде қарастырылады. Бұл саналар әртүрлі шарттар мен жағдайларға тәуелді түрде пайда болады. Мысалы, көру санасы — көздің қызметіне, ал ақыл санасы — ішкі танымдық қабілетке байланысты туады. Сенсорлық (сыртқы) саналар, негізі дөрекі болуына байланысты, менталды санамен салыстырғанда біршама қарапайым келеді. Дегенмен, барлығының да ортақ қасиеті — объектіні бейнелеу және тану мүмкіндігі. Айта кетерлік маңызды жайт: сана объектіні танымайды, тек оның бар екенін тіркейді. Мысалы, көз көк түсті затпен түйіскен кезде, көру санасы пайда болады. Бірақ бұл сана «мынау — көк зат» деп ажыратып жатқан жоқ — ол жай ғана сол заттың болуын, қатысуын аңғарады. Расында, объектіні танып-білу — бұл

қабылдау скандхасының (үшінші скандха) жұмысы. Будда философиясында «көру санасы» — бұл жай ғана «көру» деген күнделікті ұғымның философиялық түсіндірмесі. Бірақ «көру» — бұл тану емес. Дәл сол сияқты, есту, иіс сезу, дәм сезу, сезіну де — өз алдына тану әрекеті емес. Будда ілімі мұны былай түсіндіреді: сенсорлық саналар — тікелей, концептуалды емес таным түрі. Олар объектіні жақсы-жаман, жағымды-жағымсыз деп бөлмейді. Мұндай айырып, талдап тану – ұғымдық деңгейде, яғни кейінгі сананың жұмысы [4, 16 б.].

Сана өз өмірін жалғастыру үшін затқа (денелік формаға) сүйенуі мүмкін — оны құрал ретінде, нысан ретінде немесе тірек ретінде қолдануы мүмкін. Сондай-ақ ләззатқа ұмтылғанда, сана сол негізде өсе алады, кеңейіп, дамиды. Сол секілді, сана сезімдерді, қабылдауды немесе ақыл-ой әрекеттерін де өзіне құрал, нысан немесе тірек ете алады. Олардың көмегімен де сана ұлғаяды, дамиды, тереңдей түседі. Егер біреу: «Мен сананың пайда болуы, жоғалуы, өсуі мен дамуын заттан, сезімнен, қабылдаудан немесе ақыл-ой әрекеттерінен тыс көрсетемін» — деп айтса, онда ол болмысында жоқ нәрсе туралы айтып тұр деуге болады [4, 17 б.].

Буддизм философиясында рухани және денелік болмысты бір-бірінен бөліп қарастыру мүлде жоқ. Себебі, біреуі екіншісінсіз өмір сүре алмайды — олар ажырамас тұтастық. Будда ілімінде ерекше мән берілетін нәрсе — тұлға ұғымының тек ішкі «менмен» шектелмей, тіршілік иесі қабылдайтын бүкіл құбылыстар әлемін қамтитыны. Бұл — буддизмде тұлғаны түсінудің өзіндік ерекше тәсілі. Мысалы, Рене Декарттың әйгілі сөзі: «Мен ойлаймын, демек, өмір сүріп жатырмын» — будда ілімінің логикасымен келіспейді. Өйткені буддизм бойынша, ойдың артында «ойлаушы» деген дербес бір болмыс жоқ. Шын мәнінде, ойлаушы деген – сол ойдың өзі.

Дәл осылай, будда философиясында «өмір қозғалып жатыр» деу де қате. Себебі өмірдің өзі – қозғалыс, ал одан тысқары тұрған ештеңе жоқ. Буддизмде мынадай көзқарас бар: дүниедегі кез келген нәрсе — біз оны қалай атадық, солай ғана бар. Яғни, объект – біздің санамыздағы ұғым арқылы ғана өмір сүреді. Біз бір нәрсені «осы – зат» деп белгілеген сәттен бастап, ол зат ретінде қалыптасады. Бірақ күнделікті өмірде біз бұл процесті байқамаймыз. Біз заттарды өздігінен бар, табиғатынан нақты өмір сүретіндей етіп қабылдаймыз. Ал шын мәнінде, олар — тек ой арқылы берілген атаулар мен белгілердің жиынтығы. Сондықтан, нәрселер бізге қалай көрінсе, дәл солай табиғатынан бар деу — үлкен қателік [5, 2 б.].

Буддизмдегі бұл ойлау жүйесі еуропалық философиямен едәуір ерекшеленеді. Себебі Батыс философиясы өзінің бастауынан-ақ «материя» мен «сана», «объект» пен «субъект», «мен» және «мен емес» деген ұғымдарды бір-біріне қарсы қойып келеді. Осылайша, буддизмнің негізгі категорияларын түсіндірудегі буддологияда (будда философиясын зерттейтін ғылымда) жіберілген қателіктердің бір себебі де — дәл осы еуропалық ойлау үлгісінің үстемдігі. Себебі буддизмнің ұғымдық жүйесі бұл үлгіге сәйкес келе бермейді.

Махаяна философиясын дәстүрлі мағынада не материализмге, не идеализмге, не солипсизмге немесе Батыс философиясының басқа да бағыттарына жатқызуға болмайды. Ол өзіндік тұжырымдарға негізделген, ерекше жүйе, бірақ оны тек оның ішкі ұғымдық аппараты арқылы түсінуге болады. Бұл жүйеге бос кеңістік (шуньята) ұғымы, өзара тәуелді болмыс, сондай-ақ реинкарнация – себеп-салдар байланысының үздіксіздігі ретінде кіреді. Бұл зерттеуде қолданылған «өзара тәуелді өмір сүру», «өзара тәуелді пайда болу» және «өзара шартты пайда болу» деген терминдер — бір ғана шындықты білдіреді: ешбір құбылыс дербес, жеке күйде өмір сүрмейді, яғни барлық нәрсе — бос кеңістікті, шартты болмысты білдіретін дхармалардың табиғатына сай өмір сүреді.

Аталған терминдердің ішіндегі «өзара тәуелді өмір сүру» ұғымы кең мағынада қолданылады. Ал «өзара тәуелді пайда болу» мен «шартты туындау» – бір-біріне синоним сөздер. Бұл атаулардың әртүрлілігі аудармашының таңдауы мен қолданылған мәтінге байланысты ғана, ал мағынасы бір – тәуелділіктен өзге болмыс жоқ. Буддистік философияда өзара шартты болмыс арнайы жүйемен сипатталады – бұл сансара дөңгелегінің он екі буынды тізбегі. Осы тізбектегі екінші буын – карма, ол қалыптастырушы факторлар немесе қозғаушы күштер деп аталады. Буддистік мәтіндерде былай делінеді: «Қозғаушы күштер – бұл карма. Ол не жақсы, не жаман, нәтижесі де соған сай болады. Жаман карма – азапқа, жақсы карма – бақытты жағдайға алып келеді».

Ал «Абхидхармакоша» трактатында бұл тізбек нақты былайша көрсетіледі: Надандық → Қалыптастырушы факторлар (карма) → Сана → Есім мен форма → Алты сезім органдары → Контакт → Сезіну → Құмарлық → Байланып қалу → Өмір сүру → Туу → Қартаю және өлім. Бұл жерде қалыптастырушы факторлар – адамның өткен әрекеттерінен туған карма екені атап көрсетіледі [6, 76 б].

Буддизмде өмір мен өлімнің шексіз айналымы – сансара — өзара тәуелді он екі себеп арқылы түсіндіріледі. Бұл тізбекті Чже Цонкапа Васубандхудың «Абхидхармакошасына» сүйене отырып келтіреді:надандық, қалыптастырушы факторлар (карма), сана, есім мен форма, алты сезім мүшесі, контакт, сезіну, құмарлық, байлану, өмір сүру, туу, қартаю мен өлім. Алғашқы үш буын – надандық, карма және сана – жаңа өмірге әкелетін негізгі себептер. Сана — өткен өмірдегі кармалық әсерлерді сақтайтын негіз. Буддизмде бұл «сана-себеп», ал жаңа өмірдегі алғашқы сана сәті — «сана-нәтиже» деп аталады. «Есім мен форма» тіркесінде «форма» — дене (рупа-скандха), ал «есім» — сезіну, қабылдау, ниет және сана (төрт скандха). Осы тізбек қайта туудың механизмі мен карманың үздіксіздігін сипаттайды [6, 77 б].

Яғни, өзара тәуелді өмір сүрудің он екі буынының үшінші буыны – бұл себеп-сана (сана-себеп). Ал нәтиже-сана — бұл төртінші буын – есім мен форма құрамындағы сана, ол жаңа өмірде қайта басталады. Бұл сана өмір бойы әрекет етіп, келесі өмірге жаңа себеп-сананы қалыптастырады. «Есім мен форма» пайда болғаннан кейін, алты сезім мүшесі мен сезіну негіздері туындайды: көру, есту, иіс, дәм, жанасу және сана. Бұл — бесінші буын.

Сезім мүшесі, сана және сыртқы объект біріккен кезде контакт (жанасу) пайда болады — бұл алтыншы буын. Контакт кезінде зат жағымды, жағымсыз немесе бейтарап деп қабылданады, осы сәтте сезімдер туады — бұл жетінші буын. Сезімнен соң адамда құштарлық пайда болады — ләззаттан айырылғысы келмейді, ал азаптан құтылғысы келеді. Бұл — сегізінші буын. Құштарлықтан туындайтын келесі қадам — ұстап қалуға ұмтылу немесе байлану — бұл тоғызыншы буын, және ол төрт түрге бөлінеді:

1. Құмарлықпен байлану – заттарға, дыбысқа, иіске, дәмге және жанасуға деген шектен тыс тәуелділік.

2. Жалған көзқарасқа байлану – сананы тұмшалайтын дүниетанымдарға шектен тыс сенім.

3. Бұрыс этика мен мінез-құлыққа байлану – дұрыс емес ережелер мен әрекеттерді «дұрыс» деп қабылдау.

4. Менге байлану – уақытша скандхаларды «өзім» немесе «менікі» деп санау.

Міне, осындай байлану құбылысы, өткен өмірлерде жиналған сана-себептегі кармалық тұқымдарды «қоректендіріп», жаңа өмірдің басталуына алғышарт жасайды. Осылайша, карма күш алып, жаңа өмірдің негізін қалайды [7, 77 б.].

Тинлей Норбудың айтуынша, барлық сансарлық болмыстың бастауында надандық тұр — бұл дегеніміз, шындықты көре алмау, яғни болмыстың шынайы табиғатын тану қабілетінің болмауы. Дәл осы надандық — карманы, яғни адамның әрекеттері мен

олардың салдарын туындататын негізгі себеп. Карма өз кезегінде сананы ластайды, яғни айырмашылық жасайтын сананың ішінде кармалық із қалдырады. Бұл сана — сыртқы әлемді жеке заттар ретінде көреді, оларға атау мен форма береді. Сөйтіп, «есім мен форма» ұғымы пайда болады. Есім мен форманың бөлінуі — алты сезім мүшесінің (көз, құлақ, мұрын, тіл, дене, сана) қалыптасуына әкеледі. Осы сезім мүшелері арқылы сыртқы объектілермен байланыс (контакт) орнайды, ал бұл — сананың әрі қарай әрекет етуіне жағдай жасайды. Контакт нәтижесінде адам жағымды, жағымсыз немесе бейтарап сезімдерді бастан өткереді. Бұл сезімдер адамда жағымды әсерді сақтап қалуға және жағымсыздан қашуға деген ұмтылыс тудырады. Осыдан тілек, құштарлық пайда болады. Құштарлықтан объектілерге байлану қалыптасады — адам ұнаған нәрселерден айырылғысы келмейді. Байлану — жаңа карманың қалыптасуына және ескісінің күшеюіне әкеледі. Осылайша, адамның ішкі әрекеттері келесі өмірге жол ашып, сансара шеңберін жалғастыра береді. Яғни болмыстың тұрақты қалыптасуы — қайта туылуға әкеледі. Ал қайта туу — қартаю мен өлімді, яғни дененің ыдырауын, бірақ сонымен бірге кармамен және клешалармен (ішкі улармен) былғанған сананың әрі қарай өмір сүруін білдіреді [8, 16 б.]. Яғни, өлім — жай ғана тәннің ыдырауы, бірақ ол сананың әрі қарай жалғасатын сапарын тоқтата алмайды [9, 16 б.].

Өзара тәуелді туындау тізбегінің буындары кейде басқа қырынан, яғни үш ірі санатқа бөлініп қарастырылады: клешалар (ішкі рухани бұзушы күштер), карма және азап. Мұндай жіктеу барысында надандық (бірінші буын) — клешаға жатады, яғни жан мен ақыл-ойды тұмшалайтын ішкі у. Махаяна мектебінің негізін қалаушылардың бірі — Нагарджуна, Мадхьямика философиясының авторы ретінде, осыны дәлелдей келе, Чже Цонкапа былай деп жазады:

- 1, 8 және 9-буындар – бұл клешалар, яғни надандық, құштарлық пен байлану;
- 2 және 10-буындар – бұл кармалық әрекеттер, яғни себеп пен өмірді жалғастырушы күш;
- қалған жеті буын – бұл азап, яғни сансарадағы өмірдің әртүрлі көріністері мен нәтижелері [6, 84 б.].

Буддизмдегі ерекше термин — «клеша» нені білдіреді? Орыс тіліндегі буддистік аудармаларда бұл ұғымды жиі «күнә» немесе «азғындық» деп аударады. Алайда мұндай сәйкестендіру дұрыс емес, себебі ол буддизмнің бастапқы мағынасын бұрмалайды. Мәселен, В. Дальдің «Түсіндірме сөздігінде» «азғындық» дегеніміз – «адамның моральдық немесе рухани кемшілігі; шындық пен жақсылыққа қарсы келетін қасиет; жалғандық пен зұлымдыққа бейімділік; дұрыс өмірден ауытқу, бұзылуға бейімдік» деп түсіндіріледі.

Ал «күнә» – бұл «Құдай заңына қарсы келетін әрекет, Жаратушы алдында кінәлі болу» деген мағына береді. Буддизмде клеша — бұл мұндай діни немесе моральдық категория емес. Клеша — сананың бұлдыр, тұманданып қалуына әкелетін ішкі күй, яғни надандық, ашу, қызғаныш, жалған пікір, ашкөздік секілді ақыл-ойды бұлдыратын ішкі уыттар. Олар адамды қате шешімдерге жетелеп, шынайы болмысты көруге кедергі жасайды. Сондықтан клешаны «күнә» немесе «порок» деу буддистік түсінікті тарылтады, себебі клеша — моральдық баға емес, ол — танымды тұмандандыратын күй [10, 402 б.].

Қазіргі заманғы түсіндірме сөздік «күнә» ұғымына мынадай анықтама береді: «Күнә — діни этикада моральдық жамандық, яғни адамның әрекетпен, сөзбен немесе оймен Құдай еркіне қарсы шығуы». Сонымен қатар, «күнә» ұғымы тарихта бұрын болған, моральдан тыс, ескі ұғым — «айып» немесе «ластану» түсінігінен бөлініп шыққан. Мұнда ластану — бұл қасиетті тыйымдарды (табу) бұзудан туындайтын рухани немесе тіпті физикалық кірлену, яғни қасиетсіздену деп қарастырылады. Осылайша,

«күнә» — тек Құдай заңына қарсы келу ғана емес, ол — қоғамдық, рухани және діни тазалық ұғымдарымен де тығыз байланысты ұғым [11, 1160 б.].

Бұл анықтамаларда «жақсылық», «жамандық», «ақиқат», «жалған» сияқты ұғымдарға сүйене отырып, сөздерді еркін түсіндіруге мүмкіндік бар. Сондықтан әртүрлі түсіндірулер туындауы мүмкін. Алайда буддизм философиясында «күнә» ұғымы мүлде жоқ екенін атап өткен жөн. Бұл — жай кездейсоқтық емес, карма ілімімен тікелей байланысты. Буддизмде карма заңы – толығымен объективті, бұлтартпас заңдылық. Оның әрекеті табиғат заңдарымен бірдей, яғни батыстық ғылыми түсініктегі себеп-салдар заңдылығына ұқсайды. Сондықтан, буддизмде Құдайдың еркіне қарсы келу ұғымын білдіретін «күнә» термині қажет емес. Ал «клеша» ұғымына келсек, ол нақты және бұлжымас анықтамамен берілген: Клешалар – зиянды эмоциялар, адамның әрекеттеріне түрткі болатын ішкі күштер. Олар – сананың ағынын бұзатын, мазасын қашыратын және жаңа карма тудыратын факторлар.

«Абхидхарма антологиясында» былай делінеді: «Клешалар – бұл сана ағымында пайда болып, тыныштықты бұзатын ішкі элементтер. Олардың басты қасиеті – сананы бұлдыру». Яғни, буддистік түсінікте клеша – бұл моральдық баға емес, ол — сананың үйлесімін бұзатын ішкі күй. Бұл оларды «күнә» немесе «порок» сияқты ұғымдардан түбегейлі ажыратады [12, 49 б.].

Адамның барлық әрекеттері — денемен, тілмен және санамен жасалатын істер — негізінен ниетке, яғни ішкі психикалық түрткіге байланысты. Бұл ниет — ақылдың қосымша көріністерінің бірі, яғни менталдық фактор. Сондықтан ниет те сананың бір түрі. Сол секілді, клешалар да — яғни ішкі бұлдыр эмоциялар — сананың ерекше менталдық күйлеріне жатады. Асанга өзінің «Абхидхарма жинағында» 51 менталдық факторды сипаттайды.

Буддизмде барлық жаман карма осы құмарлық пен өшпенділіктен пайда болады. Ал бұл екеуінің түп-тамыры — надандық. Надандық — бұл жай ғана білімсіздік емес. Буддистік түсінікте надандық — өзін дербес, тәуелсіз «Мен» ретінде қабылдау. Бұл — адам «мен бармын» деген ішкі сенімге берік байланған, осы сенім бастапқыдан санаға сіңіп қалған. Буддизм былай дейді: Біз кез келген құбылысты өз бетінше бар деп қабылдаймыз, яғни оны өзінен-өзі бар деп ойлаймыз. Дәл сол секілді, скандхаларды да дербес болмыс деп қабылдаймыз. Скандхаларға сүйеніп құрылған «Менді» де біз шынайы, өз бетінше бар деп сенеміз. Яғни, барлық клешалардың бастауында — дәл осы жалған сенім, жалған «Мен» жатыр [12, 139 б.].

«Мен» ұғымы пайда болған сәттен бастап, автоматты түрде «өзге» ұғымы да қатар туады. Ал «мен» мен «өзге» деген түсініктер орныққан жерде міндетті түрде құштарлық пен өшпенділік туындайды. Адам өзін нақты, тұрақты, сенімді «мен» ретінде сезіне бастаған сәтте-ақ, «мен» мен «сен» арасындағы айырмашылықты анықтай бастайды. Осы айырмашылық бір жаққа деген жақындық (байлану) пен екінші жаққа деген алшақтық (жеккөрушілік) сезімін туындатады. «Мен» және «басқа» деген ұғымдар — барлығының түбінде жатқан надандықтан туындайды. Осы түсініктердің қалыптасуымен бірге құштарлық пен жеккөрушілік те қатар пайда болады. Адам құбылыстардың шын мәнінде бос (пустотная) табиғатын түсінбейінше, оларды дербес, өздігінен өмір сүретін, өз мәні бар шынайы нәрселер деп қабылдай береді. Бұл — негізгі адасушылықтың көзі [7, 74 б].

Объектінің шынайы болмысқа ие екені туралы жалған әсер тұрғысынан қарағанда, көру арқылы пайда болған сана қате таным болып есептеледі. Алайда бұл — ол барлық жағынан қате деген сөз емес. Егер пішінді тану немесе қабылдау жағын алсақ, онда бұл сана қате емес, яғни нысанның бар екенін тану тұрғысынан ол дұрыс, сенімді таным деп есептеледі. Сондықтан бір сана әртүрлі нысандарға қатысты әрі қате, әрі дұрыс таным бола алады: бір жағынан — объектінің өзіне ұқсап көрінетін көрінісін дұрыс емес деп

қабылдаса, екінші жағынан — қимыл немесе әрекет бағытталған нысанды нақты таниды. Бір ғана объектіге қатысты сана бір мезетте әрі қате, әрі дұрыс бола алмайды, бірақ екі түрлі объектіге қатысты сана қате де, шынайы да бола алады.

Бұл — Прасангика мектебінің ерекше көзқарасы. Бұл бағыттың өкілдері ешбір құбылыс өздігінен өмір сүрмейді, тіпті шартты деңгейде де өз мәніне ие емес деп есептейді. Сондықтан, осы жүйе бойынша, дұрыс танымның өзі егер ол объектіні өз бетінше бар деп қабылдайтын болса — қате болып саналады. Сол себепті, бос кеңістікті (шуньятаны) тікелей түсінетін даналықтан басқа, барлық таным түрлері — қателікті қамтиды. Олар — құбылысты шынайы, өз мәні бардай етіп көрсететін танымдар. Бұл жерде қарсы пікір айтуға болады: егер сана қате болса, онда объектінің бар екенін қалайша растай алады? Расында да, егер пішін шынайы негізге ие болса, оны тек қате таным емес, дәл танитын сана ғана растай алар еді. Бірақ буддизмде шынайы, өз мәнімен бар пішіндер мүлде мойындалмайды, тіпті шартты деңгейде де. Сол себепті, пішіндердің өзі – тек елес, олар шынайы бар секілді көрінеді, бірақ шын мәнінде ондай емес. Сондықтан қате таным – олардың жалған екенін жақсырақ дәлелдейді. Осы тұжырымның негізінде барлық таным түрлері – қате, ал бос кеңістікті тікелей танитын даналық қана – шынайы деп айтылады [13, p. 535-561].

Зерттеу нәтижелері. Бұл зерттеу жұмысының барысында Махаяна философиясындағы карма концепциясы тек метафизикалық немесе діни категория ретінде емес, рухани-танымдық заңдылықтар жүйесі ретінде қарастырылып, төмендегідей ғылыми нәтижелерге қол жеткізілді:

- Карма ұғымының құрылымдық моделі жасалды — карма тек іс-әрекет пен оның салдары арасындағы байланыс емес, сонымен қатар тұлғаның санасындағы ниет пен эмоцияның терең қабаттарынан бастау алатын танымдық процестердің жүйесі ретінде сипатталды;

- Махаяна мектебінің негізгі тұжырымдары арқылы карма мен шуньятаның өзара байланысы ашылды — бұл тұрғыдан алғанда, кез келген құбылыстың, соның ішінде адамның әрекеттерінің де шартты әрі тәуелді болмысы дәлелденді;

- Карма мен қайта туу арасындағы байланыс он екі буынды себеп-салдар тізбегі арқылы жүйеленіп көрсетілді, соның ішінде себеп-сана мен нәтиже-сана ұғымдарының динамикасы теориялық тұрғыда негізделді.

- Клеша мен надандықтың карма тудыру тетіктеріндегі рөлі анықталды — карма «жақсы» немесе «жаман» моральдық акт ретінде емес, сананың бұлдыр күйінен туындайтын энергетикалық-танымдық із ретінде ұғынылды.

- Буддистік және батыстық философиялық категориялардың салыстырмалы анализі арқылы карма концепциясының универсалды сипаты негізделді. Мұндай тәсіл тек герменевтикалық қана емес, эвристикалық құрал ретінде де пайдаланылды.

Махаянада «Мен» ұғымының шынайы табиғаты бос кеңістік арқылы ашылып, тұлғаның онтологиялық уақытша табиғаты дәлелденді. Бұл көзқарас қазіргі постмодерндік философиядағы «субъекттің күйреуі» мәселесімен де үйлеседі.

Қорытынды.

Махаяна философиясындағы карма ілімі — бұл тек әрекет пен салдар арасындағы механикалық байланыс емес. Бұл — адамның ішкі рухани дамуы мен болмысты түйсіну қабілетіне тікелей қатысты терең әрі кешенді философиялық жүйе. Осы мақалада біз Махаяна дәстүріндегі карма ұғымын түрлі философиялық, гносеологиялық, аксиологиялық және антропологиялық қырынан талдап, оның будда ой жүйесіндегі шешуші орнын ашып көрсеттік. Карма — сананың терең қатпарларында орын алатын ниет, эмоция және әрекет мотивтерінен бастау алады. Бұл — адам болмысын үнемі қалыптастырып, оның келесі өміріне бағыт беретін ішкі үрдіс. Адам жасаған әрбір ой, сөз және іс-әрекет — сананың таспасына таңбаланатын із секілді. Бұл іздер сана

ағынында сақталып, болашақ өмірдің бағыты мен сапасын анықтайды. Демек, адам тағдыры кездейсоқтық емес, керісінше оның ішкі әлемінің, ой-әрекетінің табиғи жалғасы. Махаянада карма бос кеңістік (шуньята) ілімімен және өзара тәуелді өмір сүру қағидасымен терең байланысты. Құбылыстардың ешқайсысы дербес, өз бетінше өмір сүрмейді; олардың барлығы өзара шартты түрде пайда болады және өзге құбылыстармен үздіксіз байланыста. Осыдан келіп, «мен» ұғымының да тәуелді, уақытша және шартты екені айқындалады. Мұндай көзқарас карманы тек материалдық іс-әрекеттің нәтижесі ретінде емес, тұлғаның ішкі дүниесінің көрінісі, онтологиялық ахуалы ретінде пайымдауға мүмкіндік береді. Сол себепті Махаянада надандық (авидья) — барлық азап пен карманың түпкі көзі. Бұл — болмысты дұрыс танымай, оны өз бетінше, шынайы бар деп қабылдаудан туындайтын адасу. Адам өзін де, әлемді де шынайы, дербес өмір сүретіндей көріп, соған байлана бастайды. Осылайша, клешалар (ашу, қызғаныш, ашкөздік т.б.) туып, жағымсыз карма қалыптасады. Сондықтан будда философиясы, әсіресе Махаяна бағыты, ең алдымен танымның тазалығына, бос кеңістікті (шуньята) тікелей ұғынуға мән береді. Прасангика Мадхьямика мектебінің түсіндіруі бойынша, кез келген таным — егер ол объектіні өз бетінше, дербес бар деп қабылдаса — қате. Ал шынайы таным — бұл тек бос кеңістікті, шартты болмысты тікелей тану арқылы мүмкін болады. Бұл көзқарас Еуропалық рационалистік философиядағы «абсолюттік ақиқат», «объективтік болмыс» секілді ұғымдарға мүлде қарама-қарсы. Мұнда бастысы — феномендерге жабысып қалмай, олардың шартты, өткінші табиғатын түсіну.

Буддизмде «күнә», «жақсы», «жаман» ұғымдары моралистік немесе діни-иерархиялық тұрғыда емес, сананың күйі мен танымдық бұлдырлығы тұрғысынан бағаланады. Клеша — бұл күнә емес, ол — шынайылықты көруге кедергі келтіретін рухани тұман. Демек, адам болмысы мен әрекеті тек этикалық жүйеге емес, ең алдымен тұлғаның танымдық даму деңгейіне байланысты. Будда философиясында өмір мен өлім арасындағы шекара шартты ғана. Тәннің жойылуы — сананың тоқтауы емес. Сананың сапары — үздіксіз, себебі ол карманың ықпалында дамиды, жаңа тіршілікке жол ашады. Осылайша, карма мен қайта туу — шексіз сансара дөңгелегінің қозғалысын сипаттайтын негізгі тетіктер. Қорыта айтқанда, Махаяна философиясындағы карма концепциясы — бұл тұтас дүниетанымдық жүйе. Ол адамды сыртқы ережелермен емес, ішкі жауапкершілікпен өмір сүруге жетелейді. Бұл — тек сенім немесе қорқыныш емес, ақыл-ой мен таным арқылы терең түйсінуді көздейтін рухани ілім. Осы ілім бойынша, әр адам өз өмірінің авторы, ал карма — сол өмірді үздіксіз қалыптастырып тұратын іштей әрекет ететін рухани заң. Бұл заң — табиғат заңы секілді объективті, бейтарап әрі әділетті. Сондықтан да карма ілімі — бүгінгі жаһандық этикалық дағдарыстар мен рухани ізденістер дәуірінде өзекті, өмірлік маңызды философиялық ұғым болып қала береді.

ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

1. Геше Джамьян Кьенце. Ло Чжонг практикасына арналған нұсқаулар. – М.: Лама Цонкапаның Будда Орталығы, 1998. – 126 б.

2. Васубандху. Абхидхармакоша (Абхидхаманың энциклопедиясы). Үшінші бөлім. Әлем туралы ілім / Санскрит тілінен аударған, кіріспе, түсініктеме және тарихи-философиялық зерттеу – Е.П. Островская және В.И. Рудой. – СПб.: «Андреев және ұлдары», 1994. – 336 б.

3. Ум мен білім. Дрэпун тибет монастырының Гоман-дацанындағы таным теориясын үйрену дәстүрі. – СПб.: Санкт-Петербург университеті, 2005. – 307 б. (№104)

4. Валпола Рахула. Будда не үйретті / Аударған: И.В. Берхин. – СПб.: Алмаз жолы, 1995. – 97 б. (№100)

5. Далай Лама XIV Тензин Гьяцо. Бодхгаядағы сұхбат. http://savetibet.ru – 60 б. (№105)

6. Дже Цонкапа. Ояну жолының сатыларына үлкен нұсқаулық. Т.2. – СПб.: Нартанг, 1997. – 275 б. (№11)
7. Далай Лама XIV Тензин Гьяцо. Гарвард дәрістері. – М.: Цонкапа, 2003. – 196 б. (№87)
8. Тинлей Норбу. Жалпы және ерекше буддистік Дхарма қағидаттарының қазынасына апарар алтын кілт. – М.: Шанг-Шунг, 2001. – 123 б. (№106)
9. Торчинов Е. А. Қытай буддизмінің философиясы. – СПб.: Азбука классика, 2001. – 243 б. (№50)
10. В. И. Даль. Тірі ұлы орыс тіліне арналған түсіндірме сөздік. Т.2. – М.: Наука, 2003. – 779 б. (№107)
11. Қазіргі заманғы түсіндірме сөздік. http://ihtik.lib.ru – 6112 б. (№85)
12. Дже Цонкапа. Ояну жолының сатыларына үлкен нұсқаулық. Т.1. – СПб.: Нартанг, 1994. – 386 б. (№10)
13. Сонам Такчое. Эпистемология прасангики: Ответ на обвинение Стаг Цанга в том, что Цонкапа использует Праману в философии Чандракирти. SPRINGER NATURE. https://link.springer.com/article/10.1007/s10781-013-9186-3#citeas p. 535-561

REFERENCES

1. Geshe Jamyang Khyentse. Instructions for the Practice of Lojong. – Moscow: Lama Tsongkhapa's Buddha Center, 1998. – 126 p.
2. Vasubandhu. Abhidharmakosha (Encyclopedia of Abhidharma). Book III: Doctrine of the World / Translated from Sanskrit with introduction, commentary and historical-philosophical analysis by E.P. Ostrovskaya and V.I. Rudoy. – Saint Petersburg: “Andreev & Sons”, 1994. – 336 p.
3. Mind and Knowledge: The Tradition of Studying the Theory of Cognition at the Goman Datsan of Drepung Tibetan Monastery. – Saint Petersburg: Saint Petersburg University, 2005. – 307 p. (No.104)
4. Walpola Rahula. What the Buddha Taught / Translated by I.V. Berkhin. – Saint Petersburg: Diamond Way, 1995. – 97 p. (No.100)
5. The 14th Dalai Lama Tenzin Gyatso. Dialogue in Bodh Gaya. http://savetibet.ru – 60 p. (No.105)
6. Je Tsongkhapa. The Great Treatise on the Stages of the Path to Enlightenment. Vol. 2. – Saint Petersburg: Nartang, 1997. – 275 p. (No.11)
7. The 14th Dalai Lama Tenzin Gyatso. Harvard Lectures. – Moscow: Tsongkhapa, 2003. – 196 p. (No.87)
8. Thinley Norbu. The Golden Key to the Treasury of General and Specific Principles of Buddhist Dharma. – Moscow: Shang-Shung, 2001. – 123 p. (No.106)
9. Torchynov E. A. Philosophy of Chinese Buddhism. – Saint Petersburg: Azbuka Klassika, 2001. – 243 p. (No.50)
10. Dahl V. I. Explanatory Dictionary of the Living Great Russian Language. Vol. 2. – Moscow: Nauka, 2003. – 779 p. (No.107)
11. Modern Explanatory Dictionary. http://ihtik.lib.ru – 6112 p. (No.85)
12. Je Tsongkhapa. The Great Treatise on the Stages of the Path to Enlightenment. Vol. 1. – Saint Petersburg: Nartang, 1994. – 386 p. (No.10)
13. Sonam Thakchoe. Prāsaṅgika Epistemology: A Reply to Stag tsang’s Charge Against Tsongkhapa’s Uses of Pramāṇa in Candrakīrti’s Philosophy. SPRINGER NATURE. https://link.springer.com/article/10.1007/s10781-013-9186-3#citeas p. 535-561

АННОТАЦИЯ

В данной статье концепция кармы в философии Махаяны всесторонне анализируется с глубоких философских, аксиологических, гносеологических и антропологических позиций. Учение о карме рассматривается в тесной связи с основными понятиями буддизма — дхарма, скандха, сознание, реинкарнация, взаимозависимое возникновение (пратитьясамутпада) и теория пустоты (шуньята). В статье карма описывается не только как взаимосвязь между действием и следствием, но и как духовно-познавательная закономерность, возникающая через внутреннее намерение личности и процесс формирования сознания. Автор, опираясь на Четыре Благородные Истины и цепь взаимозависимого возникновения из двенадцати звеньев, объясняет, как карма формирует бытие человека и влияет на его прошлое, настоящее и будущее существование. Кроме того, в статье подробно рассматриваются механизмы возникновения кармы через понятие клеша (внутренние яды, затуманивающие сознание), а также раскрывается, как невежество (авидья) порождает в человеческом сознании ложное представление о «Я» и как этот процесс приводит к возникновению страстей и привязанностей. Карма представляется как духовный след, оставляемый внутренними намерениями, мыслями, словами и поступками человека, который сохраняется в глубинных слоях сознания и влияет на будущие перерождения. В философии Махаяны карма тесно связана с понятием пустоты (шуньята) и доказывает, что все явления обладают условным и взаимозависимым бытием. Истинное познание достигается через отказ от восприятия объектов как самостоятельных, обладающих собственной сущностью, и постижение их условной и преходящей природы. Это является основополагающей позицией школы Прасангика Мадхьямика. В статье проводится сравнительный анализ с западными философскими категориями, раскрываются уникальные особенности и универсальный характер понятия кармы в буддизме. В заключение подчеркивается, что концепция кармы — это не просто моральная или религиозная категория, а фундаментальное философское учение, формирующее внутренний мир человека, его познание, сознание и образ жизни. Этот вывод демонстрирует актуальность философии буддизма в условиях современных глобальных духовных и этических кризисов.

ӘОЖ: 316.728
ҒТАМР 04.51.67

Тельманов А. М., әлеуметтік ғылымдар магистрі, https://orcid.org/0000-0002-2689-7755
КеАҚ «Жәңгір хан атындағы Батыс Қазақстан аграрлық-техникалық университеті», Орал қаласы, Жәңгір хан көшесі 51, 090009, Қазақстан, maalikelmas@gmail.com

Telmanov A. M., master of Social Science, https://orcid.org/0000-0002-2689-7755
NJSC “West Kazakhstan Agrarian and Technical University named after Zhangir Khan”, Uralsk, st. Zhangir Khan 51, 090009, Kazakhstan, maalikelmas@gmail.com

ОТБАСЫ ӘЛЕУМЕТТАНУЫ: ЗЕРТТЕУ ТАҚЫРЫПТАРЫ МЕН ДАМУЫ
SOCIOLOGY OF THE FAMILY: RESEARCH TOPICS AND DEVELOPMENT

АҢДАТПА

Бұл мақала отбасы әлеуметтануының негізгі тақырыптарын, оның құрылымын, қызметтерін және тарихи дамуын қарастырады. Отбасы әлеуметтік институт ретінде

қоғамдағы маңызды рөл атқарады, оның құрылымы мен функциялары әлеуметтік және экономикалық өзгерістерге тәуелді болып келеді. Мақалада отбасы әлеуметтанусының даму тарихы, оның негізгі зерттеу бағыттары мен ғылыми көзқарастар талданады. Отбасының құрылымы мен қызметтері, оның әлеуметтік өзгерістерге әсері мен оларға бейімделу үдерісі зерттелген. Ғылыми еңбектер мен теориялар негізінде отбасы институтының әлеуметтік контекстегі орны мен рөлі ашылады. Осы зерттеу отбасы мен қоғам арасындағы өзара байланысты тереңірек түсінуге мүмкіндік береді.

ANNOTATION

This article explores the main topics of the sociology of the family, its structure, functions, and historical development. The family, as a social institution, plays a significant role in society, and its structure and functions are influenced by social and economic changes. The article examines the history of the development of family sociology, its main research areas, and theoretical perspectives. It studies the family structure and functions, its impact on social changes, and its adaptation processes. Based on scholarly works and theories, the article reveals the place and role of the family institution in the social context. This research provides a deeper understanding of the interconnection between the family and society.

Кілт сөздер*: отбасы әлеуметтануы, әлеуметтік институт, отбасының құрылымы, отбасының қызметтері, әлеуметтік өзгерістер.*

Key words: *sociology of the family, social institution, family structure, functions of the family, social changes.*

Кіріспе. Отбасы – ертеден келе жатқан әлеуметтік институт болып саналады. Оның қоғамдық құндылығының шарты тікелей өмірді жалғасытыруда ұрпақ әкелу, балаларды тәрбиелеу және олардың өзіндік санасын қалыптастырумен байланысты. Қазіргі қоғамда отбасының құрылымы мен функциялары елеулі өзгерістерге ұшырауда. Отбасының құрылымына, қызмет етуіне қоғамда болып жатқан барлық әлеуметтік-экономикалық және мәдени үдерістер әсер етеді.

Отбасы әлеуметтануының мақсаты әлеуметтік ортамен отбасының байланысын күшейту,отбасына әсерін тигізетін қоғамны әлеуметтік механизмдерін зерттеу.

Отбасы әлеуметтануы— әлеуметтанудың арнайы саласы болып саналады. Бірақ басқа да салалар сияқты, бұл бағыттың да мақсаты — отбасы институты мен ондағы мәселелерді сосиологиялық көзқараспен зерттеуге негізделген.

Зерттеу материалдары мен әдістері.

Мақалада теориялық талдау әдісі қолданылды. Бұл әдіс арқылы отбасы әлеуметанудың негізгі теориялық негіздері, оның құрылымдық өзгерістері мен тарихи дамуы зерттелді. Мақалада белгілі ғалымдардың еңбектері (мысалы, Генри Мейн, Иоганн Якоб Бахофен, Чарльз Райт Миллс) салыстырмалы тұрғыда талданады [1, 233].

Отбасы әлеуметтануы– жалпы әлеуметтану ішінде дамыған мамандандырылған салалардың бірі. Бұл сала XIX ғасырдың екінші жартысынан бастап қалыптасып, әлеуметтану көзқарас негізінде отбасы мен онымен байланысты барлық мәселелерді зерттеуге бағытталған[4, 237].

Басқа әлеуметтік құрылымдарға қарағанда, отбасы – биологиялық және әлеуметтік топ. Отбасы – қаны бір болу немесе некеге тұру, бала асырап алу, болмаса неке тектес міндеттемелер арқылы байланысатын адамдар тобы.[5, 311]

Отбасы әлеуметтануының қалыптасуы мен дамуын сипаттауды мақсат еткен осы мақалада келесі үш негізгі сұраққа жауап ізделеді:

- Отбасы әлеуметтанну негізгі тақырыптары қандай?
- Отбасы әлеуметтануықандай кезеңдерден өтіп, бүгінгі деңгейге жетті?

Сонымен қатар, бұл бөлімде Қазақстанда отбасы социологиясының дамуын **түсіну үшін** отбасы зерттеулерінің қазіргі жағдайы қысқаша сипатталады.

Отбасы социологиясының зерттейтін мәселелерін кең мағынада – отбасылық құбылыспен байланысты барлық тақырыптар деп қарастыруға болады. Бүгінде отбасы әлеуметтануысаласындағы зерттеулерге қарасақ, олардың тақырыптары мен зерттеу ауқымының барған сайын кеңейіп жатқанын көреміз. Дегенмен, негізгі тақырыптарды үш бағытпен шектеуге болады [4, 20].

а) Отбасының құрылымы мен түрлері: Отбасы құрамында кімдер бірге тұрады және олардың арасындағы қарым-қатынастар қалай реттелген?

ә) Отбасының тарихи дамуы мен өмір сүру формалары: Отбасы қандай өзгерістерге ұшырады және бұл өзгерістерге қандай факторлар әсер етті?

б) Отбасының мәні мен атқаратын қызметтері: Отбасы дегеніміз не және оның атқаратын рөлі отбасы мүшелері үшін, әлеуметтік топтар үшін және жалпы қоғам үшін нені білдіреді?

Осы соңғы тармақта айтылған "тараптар" деп отбасы мүшелерін, әлеуметтік топтарды және тұтас қоғамды айтуға болады. Отбасы — осы үш тарап үшін де маңызды қызметтер атқаратын институт. Алғашқыда отбасы тек өз мүшелерінің негізгі қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін пайда болғанымен, оның қызметі тек отбасы мүшелерімен шектелмейді. Отбасы басқа да әлеуметтік топтар үшін де белгілі бір қызмет атқарады. Мысалы, ата-анасы тастап кеткен балаларды қамқорлығына алған "қамқоршы отбасы" қоғамдағы әлсіз әлеуметтік топтарға қолдау көрсетіп, сонымен қатар жалпы қоғам үшін де маңызды рөл атқара алады.

Отбасы социологиясының зерттеу бағыттары әрқашан осы тақырыптармен ғана шектелмеген. Уақыт өте келе зерттелетін тақырыптар өзгеріп отырған [4, 22-24]. 19-ғасырда Батыс елдерінде болған ауқымды әлеуметтік өзгерістерге байланысты, қоғам құрылымы түбегейлі өзгеріп, бұрынғы әлеуметтік жүйелер ыдырап, назар отбасы институтына ауысты. Жаңа отбасы үлгісі қатаң модернистік (жаңашыл) көзқарастардың ықпалымен қалыптасты. Осы кезеңде тіпті кейбір зерттеушілер "алғашқы қауымдық" қоғамдардағы отбасы үлгілерін және олардың даму жолын да зерттей бастады[5, 201-207].

Антропология мен әлеуметтануғылымдары үшін ең маңызды екі тақырып – отбасы мен діннің дамуы болып саналады[6, 15]. Англияда өмір сүрген сэр Генри Мейн (1822-1888) патриархалдық (еркек басшылықтағы) отбасы қоғамдық өмірдің ең әмбебап түрі деп санаған. Оның пікірінше, отбасында ер адам – отбасы басшысы, ал бұл жағдай жаңа буын ер адамдар арқылы жалғасып отырады. Ал Швейцариялық заңгер Иоганн Якоб Бахофен (1815-1887) көне отбасы құрылымына қатысты мүлде қарама-қарсы пікір айтқан. Оның айтуынша, бастапқыда адамдарда жыныстық еркіндік болған, кейін аналық тектегі, ана үстемдігі орнаған қоғам пайда болған. Ал адамзат тек соңғы кезеңде ғана әкелік текті, әке үстемдігіне негізделген қоғамға көшкен.

Үшінші бір заңгер — шотландиялық МакЛеннан (1827–1881) — өз замандастарының эволюциялық сызбаларын мазақтаса да, өзі де әлеуметтік дамудың ішкі заңдылықтарына сенген еді. Оның ойынша, алғашқы адамдарда жыныстық өмірге шектеу болмаған. Бір-бірінен оқшау өмір сүрген тайпаларда ер адамдар басқа тайпадан әйел алуға мәжбүр болған (басқаша айтқанда, экзогамия ережесі үстемдік еткен). Осындай алғашқы қауымдар көпкүйеулілік арқылы әкелік (патриархалдық) жүйені қалыптастырған. Сонымен қатар, бұл кезеңде отбасымен бірге рулық қатынастар да қатар жүргенін байқаймыз. Тайпалық және рулық негіздегі отбасылық құрылым бірте-бірте жеке (ядролық) отбасы үлгісіне көшкен. Бұл көзқарасты көне өсиеттерді зерттеуші және салыстырмалы дінтану ғылымының негізін қалаушылардың бірі Уильям Робертсон Смит (1846–1894) де қолдаған[6, 16].

Көпқырлы тұлға саналатын сэр Джон Баббок (1834–1913), кейінірек барон Эйвбери де алғашқы шектеусіз жыныстық өмір кезеңінен қазіргі неке институтына дейінгі дамуды қадағалауға тырысқан. Ал салыстырмалы әдісті ең күрделі түрде қолданған американдық заңгер Л. Х. Морган (1818–1881) болды. Ол да алғашқы кезеңді шексіз жыныстық еркіндіктен бастап, бірізділіктікпен өрбитін даму сатысын анықтаған. Осы тұжырымдамалар Карл Маркс пен Фридрих Энгельс сынды коммунистік ойшылдарға да ықпал еткен болатын.

Осы зерттеулердің барлығында екі ортақ тұжырым бар:

1. Алғашқы қауымдық қоғамдарда шектеусіз жыныстық қатынас болған.
2. Мұндай қатынас нәтижесінде ұрпақтар арасы үзілмелі отбасылар қалыптасқан.

Бұл көзқарас бойынша Батыстың ядролық отбасы моделі — адамзат дамуының ең соңғы кезеңі іспетті. Алайда осындай сызықты (уни-линеарлы) даму теориясы кейінгі кезеңдерде еуроцентризмге байланысты сынға алынатын болады[6, 19].

Батыс қоғамында отбасындағы өзгерістерге көзқарас саяси ағымдарға байланысты әртүрлі сипатқа ие болды. Консерваторлар бұл өзгерістерді «құндылықтардың жоғалуы», «азғындау» деп есептесе, либералдар мен социалистер мұны заман талабына сай, заңды өзгеріс деп қарастырған. Екінші топтағы ойшылдардың пікірінше, егер отбасы ежелден бері өзгеріске ұшырап келсе, онда бұл институт Құдай тарапынан өзгермейтін, «табиғи» түрде берілген құрылым емес екенін білдіреді. Тіпті кейбір социалистер мемлекеттің, жекеменшіктің және отбасылық құрылымның да болашақта мүлде жойылатынына сенген.

Бірінші дүниежүзілік соғысқа дейін Батыс Еуропа мен Солтүстік Американың көп бөлігінде индустриялану нақты шындыққа айналған еді.

Индустрияланумен қатар пайда болған маңызды өзгеріс – отбасы қатынастың өзгеруі сонымен қатар отбасы құрылымы мен функциялары өзгеріске ұшырауда [7, 170]. Яғни, отбасы мен жұмыс орны арасындағы арақашықтық нақтылана бастады. Бұл өз кезегінде отбасы социологиясындағы тақырыптардың өзгеруіне алып келді. Енді жаңа әлеуметтік үдерістердің отбасыға әсері зерттеле бастады. Әсіресе, отбасы әлеуметтануыжеке мамандық саласы ретінде дамыған АҚШ-та бұл үрдіс айқын байқалды. Чикаго университеті бастамашы болған бұл зерттеулерде әлеуметтік өзгерістер мен оның жеке адам мен отбасы қатынастарына әсері зерттеу нысанына айналды. Бұл зерттеулер барысында отбасының өткені емес, қазіргі жағдайы басым маңызға ие болды. Чикаго мектебінің өкілдері сонымен қатар отбасы ішіндегі әйел мен еркек арасындағы қатынастарды зерттеуге де ден қоя бастады.

Бүгінгі отбасыға бағытталған зерттеулер бұрынғы ғасырларда кең таралған макро және болжамдық (спекулятивті) пайымдаулардан бас тартуға, әрі нақты деректерге негізделген (эмпирикалық) зерттеулерге көшуге себеп болды. Осы уақыттан бастап отбасы әлеуметтануыжалпы әлеуметтанудағы үрдіске ілесіп, біртіндеп тәжірибеге сүйенетін ғылым саласына айналды.

Екінші дүниежүзілік соғыстан кейінгі кезеңде отбасы әлеуметтанусының тақырыптары күрделене түсті, енді бұрынғыдай “орталық тақырып” деген ұғым мәнін жоғалтты. Сол кезден бастап осы бөлімде сипатталған үш негізгі бағыт бойынша параллель зерттеулер жүргізіле бастады. Сонымен қатар, әлеуметтанудағы ескі және жаңа теориялық көзқарастар отбасы зерттеулеріне әсер етіп, теориялық бағыттағы еңбектер де бұл салада қалыптасқан дәстүрге айнала бастады. Жоғарыда айтылған мәселелердің барлығы аталған түрлі ғылыми бағыттар аясында қарастырылды.

Бұрын да атап өткеніміздей, отбасы әлеуметтанусының тақырыптары уақыт өте келе кеңейіп, түрлене түсті. Бұл өзгерісті байқау үшін шетелде жарық көрген отбасы әлеуметтанусына арналған оқулықтарға бір шолу жасау жеткілікті. Мысал ретінде,

АҚШ-та басылып шыққан Стивен Ноктың *"Sociology of the Family"* (1992) атты кітабын келтіре аламыз. Бұл еңбек төрт негізгі бөлімнен тұрады:

1. "Отбасы туралы көзқарастар" деп аталатын бірінші бөлімде — отбасын зерттеу, отбасын анықтау және тарихи контекстегі американдық отбасылар туралы сөз қозғалады. Бұл бөлімде отбасы әлеуметтанусының негізгі ұғымдары мен тұжырымдамалары ұсынылады және Америкадағы отбасылардың тарихи дамуы мысал ретінде қарастырылады.

2. "Отбасының құрылуы мен ыдырауы" атты екінші бөлімде — жар таңдау, неке, ерлі-зайыптылардың отбасылық өмірі секілді тақырыптар қамтылады. Сондай-ақ отбасылық құрылымның ыдырауы ретінде қарастырылатын ажырасу мен қайта некеге тұру мәселелері қарастырылады.

3. "Отбасы кезеңдері" деген үшінші бөлімде — отбасының даму сатылары, ата-ана болу, бала тәрбиесі мен әлеуметтенуі, сондай-ақ қартайған кездегі отбасының рөлі қарастырылады. Мұнда отбасылық функциялар тікелей отбасы мүшелерінің тұрғысынан сипатталады.

4. "Отбасы және басқа институттар" деп аталатын соңғы бөлімде — отбасының білім беру, экономика, мемлекет және дін сияқты басқа да әлеуметтік институттармен байланысы зерттеледі. Бұл бөлімде отбасының өзге институттарға қатысты қызметтері мен өзара ықпалдастығы қарастырылады. Соңында қайтадан негізгі тақырыпқа оралып, “отбасы ұғымын қайта қарастыру” мәселесі көтеріледі. Бұл бөлімде қазіргі американ қоғамындағы өзгерістерге сай отбасының жаңа үлгілері мен орны бағаланады.

Бұл зерттеулерден байқағанымыздай, отбасы – қоғамда оқшау тұрған құрылым емес. Ол басқа да институттармен тығыз байланыста өмір сүретін, өзара әрекеттесетін әлеуметтік бірлік. Бұл құрылым өзі өзге институттарға әсер етсе, өзі де олардан әсер алады. Сондықтан, отбасын зерттеу дегеніміз – оны жалпы әлеуметтік жүйемен, яғни өзге қоғамдық құрылымдармен бірге қарастыру деген сөз [6, 19-23].

Қорытындылай келе, отбасының әлеуметтанулық мәні — бұл феноменді әлеуметтік тап, ру, әлеуметтік топ, аймақ, этникалық ерекшелік, ауыл-қала, және басқа да әлеуметтік ұжымдар мен олардың тарихи-мәдени контекстінде зерттеп, оның орнын анықтау болып табылады. Отбасы құрылымын, құндылықтық жүйесін, әлеуметтік байланыстарын және оның жалпы қоғамдағы орны мен рөлін қарастыру маңызды. Мәселен, егер біз отбасы феноменін қала контекстінде зерттейтін болсақ, онда оны қаланың әлеуметтік жағдайымен байланыстыра отырып қарастыруға тура келеді. Сол сияқты, егер біз отбасын әлеуметтік өзгерістің ұжымдық динамикасымен байланыста зерттегіміз келсе, бұл – отбасыға әлеуметтанулық талдау жасаудың бір жолы болмақ.

Отбасы – алғашқы адамзат қоғамдарынан бастап бар болған, ең көне әрі ең негізгі әлеуметтік институттардың бірі. Отбасы қоғамдық басқа да институттар іспетті белгілі бір функциялар атқарады. [8, 16] Сондықтан бұл институт ежелден бері көптеген ойшылдар мен бақылаушылардың назарын аударып, әртүрлі зерттеулерге арқау болған.

Әлемдік діндердің қасиетті кітаптарында және сол діндердің негізін қалаушылардың пікірлеріне сәйкес, отбасы ең алғаш Адам мен Хауа ананың жаратылуы және олардың бірлесуі арқылы құрылған. Демек, отбасы – алғашқы адамзат қоғамының іргетасы және бастауы. Егер алғашқы адам – Адам пайғамбар деп есептелсе, онда **отбасы мен дін** алғашқы қоғамда қатар пайда болған іргелі қоғамдық құрылымдар саналады. Дін – бір жағынан адам мен Құдай арасындағы сенім мен рәсімдер арқылы байланыс орнатса, екінші жағынан адамдардың бір-бірімен және қоғаммен қарым-қатынасын реттейтін жүйеге айналған. Осылайша, алғашқы қоғамда дінге негізделген құқықтық тәртіп те қалыптасқан. Ал **отбасы, дін және құқық** болған жерде, **білім беру** де сөзбен ауызша жеткізу арқылы пайда болған. Осыған сүйене отырып, **отбасы, дін, құқық және білім**

сияқты негізгі әлеуметтік институттар алғашқы адамзат қоғамынан бастап қалыптасқан деуге болады.

Дәстүрлі патриархалды қоғамдарда ер мен әйел арасында нақты еңбек бөлінісі болған: әйел – үй шаруасы мен бала тәрбиесімен айналысса, ер адам – сыртта жұмыс істеп, басқару істеріне қатысқан. Бұл еңбек бөлінісіне алғаш қарсы шыққандардың бірі – **ежелгі грек ойшылы Платон (б.з.д. 427–347)**. Ол өзінің *«Мемлекет»* атты еңбегінде қоғамды үш тапқа бөледі: басшылар, жауынгерлер және өндірушілер. Оның ойынша, алғашқы екі тап – басшылар мен жауынгерлердің – отбасы құруға және жеке меншікке иелік етуге хақысы болмауы тиіс. Себебі отбасы мен мүлік жеке мүддеге итермелейді, ал бұл қоғам игілігіне кедергі келтіреді.

Платон сондай-ақ әйелдердің еркектермен **мемлекеттік істерде тең** болуын қолдаған. Оның пікірінше, егер әйелдер де музыка мен гимнастика бойынша тиісті тәрбие алса, олар да басқарушы немесе күзетші бола алады. Алайда басқарушылар мен күзетшілер үшін дәстүрлі отбасылық өмір салты қолайлы емес: олар бір-біріне ортақ болады, ал балаларды олар емес, арнайы тәрбиешілер тәрбиелейді [9, 160].

Платонның шәкірті **Аристотель** бұл идеяны қабылдамай, әйелді «ер адамның жартысы» немесе «толық емес еркек» деп сипаттаған. [10] Орта ғасырларда болсын, христиан әлемінде де, ислам дүниесінде де, негізінен **Аристотельдің идеялары** басымдыққа ие болды.

Мұсылман ойшылы, **аристотельшіл философ Насируддин Туси (1201–1274)** отбасы мен үйдің негізін бес бөліктен тұрады деп сипаттайды: әке, ана, балалар, қызметші және мүлік. Оның айтуынша, «үй» дегеніміз – тастан, балшықтан салынған құрылыс емес, ол – ерлі-зайыпты, ата-ана мен бала, қызметші мен иесі, мүлік иесі мен мүлік арасындағы белгілі бір қарым-қатынастар жүйесі. Бұл адамдар шатыры ағаш, шатырсыз үңгір, киіз үй немесе күрке болсын – маңызды емес, бастысы – ішкі әлеуметтік байланыс [11, 204–205]. Ол **«үй» мен «отбасы»** ұғымдарын нақты ажыратып, отбасын бүгінгіше айтқанда **кең отбасы** деп түсіндіреді.

Көріп отырғанымыздай, **отбасы туралы көзқарастар ежелгі дәуірлерден бастау алады**. Алайда **отбасы әлеуметтануымен әлеуметтік философия арасында** маңызды айырмашылық бар. Отбасы әлеуметтануықалыптаспай тұрып айтылған пікірлер, көбіне **қалай болу керек** деген сипатта болды. Ал **отбасы әлеуметтануы– нормативтік ғылым емес**, ол шындықты **бар болмысымен зерттеуді мақсат етеді**.

Бұл айырмашылықты ескере отырып, отбасы әлеуметтанусының дамуында үш кезеңді атап өтуге болады

1-кезең (1859 – 1900 жылдар)

Бұл кезең Чарльз Дарвиннің *«Түрлердің шығу тегі»* еңбегі шыққан соң басталды. Ол кезде отбасы әлеуметтануыекі негізгі мәселеге назар аударды:

1. **Индустриялану кезеңіндегі әлеуметтік мәселелер** – ажырасу, кедейлік, бала еңбегі, жезөкшелік және некесіз балалар сияқты жағдайлар отбасымен байланысты қаралды. Реформаторлар бұл мәселелерді отбасы әлсіздігінен деп қарап, отбасын қолдауды ұсынды.

2. **Эволюционизм идеялары** – Ч. Дарвиннің тіршілікке бейімделген түрлер ғана сақталып қалады деген тұжырымы әлеуметтік өмірге де қолданылды. **Әлеуметтік дарвинистер** бұл қағиданы отбасыға да тели отырып, қоғамның дамуын «отбасының эволюциясы» арқылы түсіндіруге тырысты. Яғни, олар дәстүрлі отбасы формасы құлдырады емес, қайта жаңа жағдайларға бейімделе білді деп есептеді. [12, 563]

Мысалы, **француз әлеуметтанушысы Ле Плей (1806–1882)** ғылыми әдістер арқылы отбасы өзгерісін зерттеген. Ол **монографиялық зерттеу әдісін** енгізіп, жұмысшы отбасыларын зерттей отырып, бүкіл қоғам жайлы қорытынды жасауға тырысқан [13]

2-кезең (1900 – 1950 жылдар)

XX ғасырдың басында отбасы әлеуметтануы **реформалық қозғалыстан гөрі ғылыми сала** ретінде қалыптаса бастады. Бұл кезеңде зерттеушілердің мақсаты – **отбасы қатынастарын басқаратын негізгі заңдылықтарды ашу** және сол арқылы отбасылық мәселелерді шешуге үлес қосу болды.

Бастапқыда **позитивистік тәсіл** басым болды – қоғам физикалық әлем секілді түсінілді. Э. Дюркгеймнің "қоғамдық деректерді — зат секілді қарау" тұжырымдамасы тарады. Кейінірек бұл тәсіл **өзара әрекет пен тұлғаралық қатынасқа** негізделген бағыттармен алмасты [14].

Чарльз Кули, Джордж Мид, Томас У. сияқты әлеуметтанушылар тұлғалық даму мен әлеуметтену үдерістеріне мән берді.**Эрнест Бёрджесс** пен оның шәкірттері — **неке, өзара бейімделу және жұп таңдауы** мәселелерін жүйелі түрде зерттеді. Бұл кезеңде әлемдік соғыстар мен дағдарыстар социологтардың **отбасына қатысты бұрынғы романтикалық көзқарастарын қайта қарауына** түрткі болды.

3-кезең (1950 жылдан бүгінге дейін)

Бұл кезеңде **зерттеу мен теорияны біріктіру** басты мақсатқа айналды. Зерттеулер **неғұрлым нақты жоспарланған**, **гипотезалар жүйелі түрде тексерілген**, **жаңа әдістер енгізілген**. Сонымен қатар, **әлеуметтанулық теориялар отбасыға қолданылып**, **жаңа тұжырымдамалар қалыптасқан**.

Отбасы – адамзат тарихындағы ең көне әрі іргелі әлеуметтік институттардың бірі ретінде барлық дәуірлерде ойшылдар мен зерттеушілердің назарында болған. Ежелгі қоғамдарда отбасы тек ұрпақ жалғастығының немесе жеке меншікті сақтаудың құралы ғана емес, сонымен қатар қоғамның негізгі құрылымдық элементі ретінде танылды. Дін, құқық, білім беру сияқты өзге де институттар отбасымен бірге пайда болып, алғашқы қауымдық қоғамнан бастап бір-бірімен тығыз байланыста дамыды.

Әлеуметтану ғылымы дамыған сайын отбасы мәселелеріне деген көзқарас та тереңдей түсті. Отбасы енді жеке тұлғалардың ғана емес, бүкіл қоғамның әлеуметтік, мәдени және тарихи жағдайларымен тығыз байланыста қарастырылатын зерттеу нысанына айналды. Бұл тұрғыда әлеуметтанулық қиял ұғымы, әсіресе, Чарльз Райт Миллстің тұжырымдамасында, жеке адамның мәселелерін қоғам аясында түсіндірудің маңызды құралы ретінде ұсынылды.

Отбасы әлеуметтанусының қалыптасуы мен даму жолына көз жүгіртсек, оны үш негізгі кезеңге бөлуге болады. Алғашқы кезең – әлеуметтік реформалар мен эволюциялық теорияларға негізделіп, отбасы құрылымына қатысты пайымдауларды ғылыми зерттеулермен ұштастыруға ұмтылған кезең. Екінші кезеңде отбасы әлеуметтануыдербес ғылыми салаға айналып, нақты зерттеулер мен әдістемелік ізденістер күшейе түсті. Ал үшінші кезеңде отбасы туралы теориялық тұжырымдар мен практикалық зерттеулер бір арнаға тоғысып, әлеуметтік өзгерістерге бейімделген жаңа зерттеу бағыттары қалыптасты[15]

Бүгінде отбасы – өз алдына тұйық құрылым емес, ол басқа әлеуметтік институттармен үнемі әрекеттесіп отыратын, өзгермелі әрі күрделі әлеуметтік бірлік. Оны түсіну үшін тек тарихи немесе мәдени контекстпен шектелмей, гендерлік рөлдер, әлеуметтік стратификация, урбанизация, этникалық әркелкілік сияқты факторларды да ескерген жөн. Отбасы туралы ғылыми түсінік оның құрылымын, функцияларын, даму жолдарын, өзгеру заңдылықтарын және қоғаммен өзара байланысын сараптау арқылы тереңдей түседі.

Осылайша, отбасы әлеуметтануы– отбасын идеалдандырмай, нақты деректерге, салыстырмалы талдауларға, тәжірибелік зерттеулерге сүйеніп, оны әлеуметтік шындықтың бір бөлігі ретінде қарастыратын ғылым саласы болып қалыптасты.

Зерттеу нәтижелері:

Отбасы әлеуметтануы – отбасының қоғамдағы рөлі мен құрылымын зерттейтін ғылым. Бұл сала отбасы институтының қалай өзгеретінін, оның қоғамға қандай қызмет атқаратынын зерттейді.

1. Отбасы әлеуметтануының дамуы:

Отбасы әлеуметтануы XIX ғасырдың екінші жартысынан бастап әлеуметтік өзгерістерге байланысты дамыды. Ғалымдар отбасының құрылымы мен функцияларын, сондай-ақ оның қоғаммен байланысын зерттеді.

2. Негізгі зерттеу тақырыптары:

Отбасы социологиясында негізгі зерттеу тақырыптары үш негізгі бағытқа бөлінеді:

Отбасының құрылымы мен түрлері: Отбасында кімдер бар және олардың арасындағы қатынастар қалай?

Отбасының тарихи дамуы: Отбасы қалай өзгерді және бұл өзгерістерге не себеп болды?

Отбасының қызметтері: Отбасы қоғамға қандай қызмет атқарады?

3. Әлеуметтік өзгерістердің отбасы құрылымына әсері:

Әлеуметтік өзгерістер, мысалы, индустриялану мен урбанизация, отбасы құрылымын өзгертті. Жаңа әлеуметтік өзгерістер отбасы мен жұмыс арасындағы қатынастарды өзгертіп, гендерлік рөлдер мен әлеуметтік теңсіздік мәселелерін алға тартты.

4. Әлеуметтік зерттеулердің әдістемесі:

Зерттеу отбасы әлеуметтануының негізгі концепцияларын және оның дамуын теориялық талдау әдісі арқылы жүргізілді. Бұл әдіс отбасының қоғамдағы рөлін түсінуге көмектесті.

5. Қазіргі отбасы мәселелері:

Қазіргі отбасы әлеуметтік өзгерістерге бейімделіп, өзінің құрылымы мен қызметтерін қайта қарауда. Отбасы мен басқа әлеуметтік институттар арасындағы байланыс зерттелуде.

6. Отбасы әлеуметтануының болашағы:

Отбасы әлеуметтануы қоғамдағы өзгерістерді, гендерлік теңдікті және әлеуметтік теңсіздік мәселелерін зерттейді. Бұл сала отбасы құрылымының өзгерісін түсіну үшін маңызды ғылыми құрал болып табылады.

Қорытынды:

Отбасы әлеуметтануы отбасы институтының қоғамдағы рөлін, оның құрылымындағы өзгерістер мен функцияларын зерттейді. Әлеуметтік өзгерістердің отбасыға әсері әлі де зерттелуде және оның келешегі отбасының әлеуметтік рөлін түсінуге мүмкіндік береді.

Қорытынды. Қорыта айтқанда, отбасы – адамзат тарихындағы ең көне, ең күрделі әрі маңызды әлеуметтік институттардың бірі ретінде әр кезеңде түрлі теориялық тұрғыдан зерттеліп, терең талдауға ие болған. Бұл мақалада отбасы әлеуметтанусының тарихи дамуы, негізгі теориялық бағыттары мен бүгінгі зерттеу тақырыптары жан-жақты қарастырылды. Ежелгі философиялық көзқарастардан бастап қазіргі заманғы эмпирикалық зерттеулерге дейінгі отбасыға қатысты идеялар оның үнемі өзгерісте және даму үстінде екенін көрсетеді.

Отбасы әлеуметтанусының басты ерекшелігі – бұл институтты қоғаммен тығыз байланыста қарастырып, оның құрылымдық өзгерістері мен атқаратын қызметтерін әлеуметтік шындыққа негіздей отырып талдауында. Индустриялану, урбанизация, гендерлік рөлдердің өзгеруі, әлеуметтік стратификация мен этникалық әркелкілік сияқты факторлар отбасылық қатынастарға айтарлықтай ықпал етіп отыр. Сондықтан бүгінгі отбасы – тек ұрпақ жалғастығы мен тәрбие беру құралы емес, сонымен қатар қоғамдағы әлеуметтік өзгерістердің айнасы ретінде қарастырылады.

Қазіргі заманғы отбасы әлеуметтануынақты деректерге негізделген зерттеулер мен теориялық тұжырымдарды ұштастырып, отбасы феноменін жан-жақты түсіндіруге мүмкіндік береді. Бұл бағыттағы зерттеулер отбасылық құрылымның күрделілігі мен оның қоғамдағы орнына тереңірек үңілуге жол ашады. Демек, отбасы әлеуметтануы– қоғам дамуын, әлеуметтік институттар арасындағы өзара ықпалдастықты және жеке тұлғаның әлеуметтенуін түсіну үшін маңызды ғылыми құрал болып табылады.

ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ:

1. Ритцр Д., Степницки Д., Әлеуметтану теориясы. 10 басылым. – Алматы: «Ұлттық аударма бюросы» қоғамдық қоры, 2018. -856 бет.
2. Биекенов К., Биекнов С., Кенжакимова Г., Әлеуметтану: Оқу құралы, Раритет, Алматы,2012-448 бет
3. Бринкерхоф Д, Уейтс Р., Ортега С., Әлеуметтану негіздері, 9 басылым. Алматы: Ұлттық аударма бюросы, 2018 жыл – 464 бет.
4. Мейер, П. А. Gezinssociologie, Een Inlending. Samsom, Alphen aan den Rijn, Brussel ,1981.
5. Әбсаттаров Р., Дәкенов М., Әлеуметтану: Оқу құралы, Қарасай баспасы, Алматы, 2007-384бет
6. Қадір С., Ергін Y. Отбасы әлеуметтанусы, Милли басымеви, Стамбул, 2019, 311 бет.
7. Биекенов К.У., Садырова М.С., Нагайбаева З.А., Институционнализация казахстанской социологии. – Алматы: Қазақ Университеті, 2006. – 336 бет.
8. Харчев А. Г. Быт и семья в социолистическом обществе. Л., 1968. 16 бет.
9. Платон, Мемлекет, Түркия Ішкі Банкі Мәдениет Басылымдары, Стамбул, 2006.
10. Аристотель. "Жануарлардың пайда болуы туралы" (De Generatione Animalium), Кітап II, Бөлім 3.
11. ТУСИ, Н., Ахлак-ı Насири, Түрікше аударған: А. Вахап Таштан, Хабил Назлыгүл, Феджр Басылымдары: Анкара, 2005.
12. Darwin, C., The Descent of Man, and Selection in Relation to Sex. London: John Murray, 1871.
13. Le Play, F., Les Ouvriers européens: Études sur les travaux, la vie domestique et la condition morale des populations ouvrières de l'Europe. Paris: Imprimerie Impériale, 1855.
14. Карлс, Пол. Дюркгеймнің соңғы еңбектеріндегі әлеуметтік дерек: Құрылымдық герменевтика, позитивті әлеуметтану және себептілік. — Классикалық әлеуметтану журналы (Journal of Classical Sociology), 2022 жыл, Т. 22, № 2, 222–246-бб. The social fact in Durkheim’s late work: Structural hermeneutics, positive sociology, and causality - Paul Carls, 2022
15. Трепашкина, Е.В. Социология семьи. Москва: ФЛИНТА. — 25–30 беттер., 2001.

REFERENCES

1. Ritcr D., Stepnicki D., Әleumettanu teorijasy. 10 basylym. – Almaty: «Ұlttyқ audarma bjurosy» qoғamdyқ qory, 2018. -856 bet.
2. Biekenov K., Bieknov S., Kenzhakimova G., Әleumettanu: Oқu құraly, Raritet, Almaty,2012-448 bet
3. Brinkerhof D, Uejts R., Ortega S., Әleumettanu negizderi, 9 basylym. Almaty: Ұlttyқ audarma bjurosy, 2018 zhyl – 464 bet.
4. Mejer, P. A. Gezinssociologie, Een Inlending. Samsom, Alphen aan den Rijn, Brussel, 1981.

5. Əbsattarov R., Dəkenov M., Əleumettanu: Oқu құraly, Қarasaj baspasy, Almaty, 2007-384bet
6. Қadir C., Ergin Y. Otbasy əleumettanusy, Milli basymevi, Stambul, 2019, 311 bet.
7. Biekenov K.U., Sadyrova M.S., Nagajbaeva Z.A., Institucionnalizacija kazahstanskoj sociologii. – Almaty: Қazaқ Universiteti, 2006. – 336 bet.
8. Harchev A. G. Byt i sem'ja v sociolisticheskom obshhestve. L., 1968. 16 bet.
9. Platon, Memleket, Tүrkija Ishki Banki Mədeniet Basylymdary, Stambul, 2006.
10. Aristotel'. "Zhanuarlardyң pajda boluy turaly" (De Generatione Animalium), Kitap II, Bөlim 3.
11. TUSI, N., Ahlak-ı Nasiri, Tүrikshe audarғan: A. Vahap Tashtan, Habil Nazlygүl, Fedzhr Basylymdary: Ankara, 2005.
12. Darwin, C., The Descent of Man, and Selection in Relation to Sex. London: John Murray, 1871.
13. Le Play, F., Les Ouvriers européens: Études sur les travaux, la vie domestique et la condition morale des populations ouvrières de l'Europe. Paris: Imprimerie Impériale, 1855.
14. Karls, Pol. Djurkgejmnің soңғy eңbekterindegi əleumettik derek: Құrylymdyқ germenevtika, pozitivti əleumettanu zhəne sebeptilik. — Klassikalyқ əleumettanu zhurnaly (Journal of Classical Sociology), 2022 zhyl, T. 22, № 2, 222–246-bb. The social fact in Durkheim’s late work: Structural hermeneutics, positive sociology, and causality - Paul Carls, 2022
15. Trepashkina, E.V. Sociologija sem'i. Moskva: FLINTA. — 25–30 better., 2001.

РЕЗЮМЕ

Эта статья рассматривает основные темы социологии семьи, её структуру, функции и историческое развитие. Семья как социальный институт играет важную роль в обществе, её структура и функции зависят от социальных и экономических изменений. В статье анализируется история развития социологии семьи, основные направления исследований и научные подходы. Изучены структура и функции семьи, её влияние на социальные изменения и процесс адаптации к ним. На основе научных трудов и теорий раскрывается место и роль института семьи в социальном контексте. Это исследование позволяет глубже понять взаимосвязь между семьёй и обществом.

ӘОЖ 17.07
ҒТАХР 17.82.30

Тулеуова А.М., магистр, https://orcid.org/0009-0006-7551-2387
Жәңгір хан атындағы Батыс Қазақстан аграрлық-техникалық университеті, бас редактор, Жәңгір хан көш., 51, Орал қ., Қазақстан

Д. ИСАБЕКОВТІҢ «ҚАРҒЫН» РОМАНЫНДАҒЫ МЕТАФОРАЛЫҚ ОЙЛАУДЫҢ КӨРКЕМДІК ҚУАТЫ
THE AESTHETIC POWER OF METAPHORICAL THINKING IN D. ISABEKOV’S NOVEL «QARǴYN»

АҢДАТПА

Бұл мақалада көрнекті жазушы, терең психологизммен жазатын суреткер Дулат Исабековтің «Қарғын» романы метафоралық ойлау тұрғысынан талданады. Автор романдағы метафоралық ойлаудың көркемдік қуатын аша отырып, адам жанының терең иірімдерін бейнелеудегі жазушының шеберлігіне назар аударады.

Метафора – көркем бейнелеу құралы ғана емес, кейіпкер болмысын ашудағы негізгі тәсіл ретінде қарастырылады. Романдағы адам жанының терең иірімдері, сезім сергелдеңі, ішкі арпалыс пен әлеуметтік қайшылықтар метафоралық тәсіл арқылы көркем жеткізіледі. Мақалада жазушының көркемдік-эстетикалық ізденістері мен метафораны қолданудағы ерекшеліктері сараланып, адам болмысы мен рухани әлемін танытудағы рөлі көрсетіледі. Романның басты кейіпкерлері - Бағила мен Жасын образдары арқылы берілетін ішкі драмалық толғаныстар, психологиялық шиеленістер, сондай-ақ әлеуметтік ортаның әсері – бәрі де бейнелі тіркестермен астасып, көркемдік қуатқа ие болады. Зерттеу барысында әдеби-теориялық еңбектер мен ғылыми тұжырымдар, сонымен қатар роамндағы нақты көркем үзінділерге талдау жасалынып, метафораның танымдық, экспрессивтік табиғаты ашылады.

«Қарғын» – метафоралық ойлаудың көркемдік қуатын танытатын шоқтығы биік туынды. «Қарғын» сөзі де символдық мағынада қолданылып, сезім тасқынын, адам жанындағы өзгерісті білдіреді. Жазушының метафоралары көркемдік-философиялық оймен астасып, оқырманды терең толғанысқа жетелейді. Мақалада романдағы бейнелі тіркестердің танымдық және эмоционалдық қуаты талданып, қазақ прозасындағы метафоралық ойлаудың көркемдік сипаты ашылады.

ANNOTATION

This article analyzes the novel Qarghyn by prominent Kazakh writer and master of psychological prose, Dulat Isabekov, through the lens of metaphorical thinking. The author explores the artistic power of metaphor in the novel, focusing on the writer's skill in depicting the complex layers of the human psyche.

Metaphor is examined not merely as a literary device but as a central tool for revealing the essence of characters. The psychological turmoil, emotional struggles, inner conflicts, and social tensions within the narrative are conveyed through rich metaphorical expressions. The article investigates Isabekov's aesthetic and artistic strategies, emphasizing the role of metaphor in representing the human condition and spiritual world. Through the protagonists, Bagila and Zhasyn, the narrative presents inner drama and psychological tension intertwined with the influence of societal norms, all of which gain expressive strength through figurative language. Drawing on literary theory and critical studies, along with textual analysis of selected excerpts from the novel, the research reveals the cognitive and expressive functions of metaphor. Qarghyn stands as a significant work that exemplifies the artistic potential of metaphorical thinking.

The word "Qarghyn" itself bears symbolic meaning, evoking emotional overflow and transformation of the soul. Isabekov's metaphors merge poetic expression with philosophical depth, provoking thoughtful reflection in the reader. The article examines the cognitive and emotional impact of figurative expressions in the novel and elucidates the artistic dimension of metaphorical thinking in Kazakh prose.

Түйін сөздер: *метафора, Қарғын, көркем бейне, психология, философиялық ой, Дулат Исабеков, бейнелі ойлау, әдеби талдау.*

Key words: *metaphor, Karghyn, literary image, psychology, philosophical idea, Dulhat Isabekov, figurative thinking, literary analysis.*

Кіріспе. Осы мақалада сөз болатын негізгі идеясы – адам бойындағы шынайы махаббат, адал сезім, биік парасатты жан-жақты көрсету болып табылатын Қазақ прозасының дамуына өз үлесін қосқан қаламгер қатарында ерекше орны бар белгілі жазушы, психолог жазушы Дулат Исабековтің «Қарғын» романы 1980 жылы жарық көрді. Шығарманың бас кейіпкерлері – роман басында пойыздағы «жаратылысы

жиденің қызыл тікеніндей» құпия бейтаныс жолаушыдан роман желісінде танымал жазушыға дейін айқындалатын, прототипі - жазушы, әдебиет сыншысы, драматург А.Сүлейменов болып табылатын – Жасын және мектепті жаңа бітіріп, оқуға түскелі келе жатқан, ауданның бірінші басшысы – Қаратайдың «өмірдің қабақ шытар өзге мінезінен мүлде аулақ өскен» қызы – Бағила [1]. Жазушы А.Сүлейменовтің прототипі ретінде алынған Жасын образы арқылы шығармашылықтың, парасат пен жауапкершіліктің мәнін терең ашып көрсетеді. Жасанды өмір сүру мен табиғи болмыс арасындағы қайшылық, сезім мен сана күресі – роман өзегіне айналған.

"Қарғын" сөзі "сай-сайдан, жылғадан аққан құм-тасы аралас жауын суы, тасқын" дегенді білдіреді. Бұл атау шығарма мазмұнына тұспалдап, ондағы махаббат, рухани сергелдең сынды психологиялық құбылыстардың тасқын сипатын білдіреді. Психологизм мен бейнелі ойлау тәсілін қатар ұштастыра білген суреткердің аталған туындысы желісі өзгеше өрілген, қала мәдениеті мен адамдар арасындағы ішкі арпалыс, сезімге тұсау салу, шынайы ғашықтық, өзін-өзі алдау сынды психологиялық құбылыстар әр кейіпкердің бойынан табылған. Образ ашу барысында автор кез келген кейіпкерін шынайы суреттеген. Әр кейіпкер (Жасын, Бағила, Қаратай, Сәргел, Мәлике) өз болмысының сан қырында сөйлейді, метафоралық ойлаудың көркемдік лебі айқын аңғарылады.

Метафора әдеби шығармаға өзіндік ерекшелік береді. Лингвист ғалымдардың пайымдауынша метафора объекттің белгісіз жақтары мен қасиеттерін көрсете алады. Метафора әлемді тану мен сипаттауда маңызды функцияны атқаратын адам ойлауы мен тілінің құбылысы. Метафора негізінде белгілі бір сала туралы жаңа түсінік пайда болады және осы бұрын болмаған ақпаратты игеру әлем туралы бүкіл дәстүрлі білім жүйесін кеңейтіп тереңдетеді және қайта құрады [2, 162].

Қазақ прозасындағы метафоралық ойлау – тек тілдік тәсіл ғана емес, көркем сана мен болмысты тану құралы. Әсіресе, XX ғасырдың екінші жартысындағы шығармаларда, адам жанының күйзелісі мен ішкі ізденісін бейнелеуде метафоралық құрылымдар алдыңғы қатарға шығады. Дулат Исабековтің «Қарғын» романы – осы тұрғыдан алғанда, бейнелі ойдың ерекше поэтикалық үлгісін ұсынатын туынды.

Зерттеу материалдары мен әдістері. Мақаланы жазуда ғалым, жазушылардың ой-тұжырымдары (Қ.Ергөбековтің «Баянғұмыр» сын мақалалары, А.Таңжарықованың «Д.Исабеков прозасының көркемдік әлемі» монографиясы, Д. Исабековтің «Екі томдық таңдамалы шығармалар жинағы», Қоянбекова С.Б. «Қазақ тілі экспрессивтік стилистикасының негіздері» диссертациясы материалдары, Ospanova Z., Tolybayeva K., Nurkenova S., Duisekova K., Baltabayeva G. «Lingua and culture study research on indirect communication cognitive metaphor» мақаласы) басшылыққа алынып, пайдаланылды. Суреткер шеберлігіне, оның өмір шындығын толыққанды көркем бейнелермен жеткізу бағытындағы ерекшеліктеріне басты назар аударылды. Жазушы шығармаларының жанрлық ерекшелігі, сюжеттік-композициялық құрылымы, стилі, көркем уақыт пен кеңістік және тағы басқа да мәселелер М. Хамзин, Т. Есембеков, М. Қанафина, А. Таңжарықова, Ж. Мауытова және т.б еңбектерінде жан-жақты талданды.

Метафора – көркем әдебиеттегі басты бейнелеу құралдарының бірі ретінде бейнелі ойлаудың көрінісі. Ол – көркем тілдің қуатын арттырып қана қоймай, кейіпкер болмысы мен оқырман арасындағы эстетикалық байланысты күшейтеді. Қазақ әдебиеттануында З.Қабдолов, Р.Нұрғали, Б.Майтанов сынды ғалымдар метафораның қызметін кең ауқымда талдап көрсеткен. Б.Майтановтың тұжырымдауынша, метафора – "авторлық интуиция мен эстетикалық инстинктің тоғысынан туған көркем ой формасы".

Метафоралардың сезімге әсер етуі, санадағы ерекше орнығуына эмоционалды-экспрессивтік стилистикалық сипаты мен танымдық табиғатына қатысты С. Қоянбекова: «Сөз байлығын арттыруда жеке қолданыстағы дербес-авторлық метафоралардың мәні

ерекше. Метафора нақты мәтінде белгілі бір образды неғұрлым бейнелі, көркем суреттеу үшін ғана емес, автордың жалпы дүниетанымдық мәнге ие, концептуалды маңызға ие көзқарастар жүйесін жинақтап ұстап тұратын қасиетке де ие болып келеді» – дегенді айтады (3, 165-166).

Д. Исабековтің «Қарғын» романындағы метафоралар – сыртқы әлемнің бейнесі ғана емес, адам рухының көрінісі. Метафоралар көбіне ішкі психологиялық ахуалды, қоғам мен жеке тұлға арасындағы қайшылықты бейнелеуде қолданылады. Жазушының көркемдік әдісі психологизммен астасып, бейнелі ойлау арқылы терең мағыналық деңгейлерге жетеді.

Жазушы роман басында-ақ метафоралық суреттеу арқылы басты кейіпкер Бағиланың балаң дүниетанымын көрсетеді: «Өмір деген өзің талпынсаң болды, бар жақсылығын алдыңа жайып салып тұратын ертегілердегі қайырымды да, данышпан қариялардай боп көрінетін». Бұл сөйлемдегі «ертегі қария» метафорасы — жас қыздың өмірге деген иллюзиялық көзқарасын танытады. Автор метафораны тек бейнелеу үшін емес, кейіпкердің сана кеңістігін ашу үшін қолданады.

«Көкейіне шешілмес жұмбақ тастап кеткен адам...» – өте терең метафора. Бұл – сырттан келген бір ғана сөздің, бір ғана ойдың адамның ішкі әлеміне қалай әсер ететінін көрсететін сурет. Метафора ішкі дүниенің дірілін, психологиялық өзгерісін көрсету үшін берілген.

Романның негізгі драмалық түйіні — поезда кездейсоқ жолыққан бейтаныс жігіттің қолынан түскен қағазда. Бұл қағаз — парасат пен ойдың символына айналып, Бағиланың санасын төңкеріп тастайды. Қағаздағы мына сөйлем ерекше мәнге ие:

«Фанатизм мен парасат қатар өмір сүре алмайды... таңдану мен табыну – әр адамның парасат деңгейіне байланысты».

Бұл үзіндіде фанатизм мен парасат – екі қарсы ұғым ретінде көркем контексте қарама-қарсы қойылады.

Романда метафоралық тіркестер өте мол кездеседі және олар көркемдік-философиялық астармен өріліп, кейіпкерлердің ішкі күйзелісін, дүниетанымын терең ашуға қызмет етеді:

«Көріктіліктің адамды теріс айналдырар қасиеті боларын да алғаш сезінді...» деген жолдарда жерде сыртқы сұлулықтың іштей қуыс, мазмұнсыз тұлғамен астасқан кездегі жиіркеніш тудыратыны айтылады. Метафора адамның шынайы болмысын тану жолындағы эволюцияны сипаттайды.

«Өзінің таңданбауға тырысқанын, олай етуге намысы жібермегенін ойлады. Жалған намыс... өз бойында да жатқанын ұғынды…» үзіндісіндегі *«Жалған намыс»* – ішкі шектеу мен адами әлсіздіктің метафоралық көрінісі. Автор кейіпкер санасындағы күрделі психологиялық процесті көркем тілмен береді. Жалған намыс білімсіздікпен егіз сипат ретінде көрсетіледі.

Жасын образының болмыс-бітіміне жазушы адамның ішкі әлемін, оның өзін-өзі тануын, адам өмірінің, уақыттың мән-маңызын, т.б. аса маңызды ой түйіндері мен мәселелерді топтастыра білген.

Сіз – жер деп аталатын үлкен қазандағы мұз сияқтысыз. Бір жағы жылы, бір жағы аяз.

Бұл жолдар – Жасынды екіұдай мінезді, құбылмалы болмыс иесі ретінде бейнелейді. «Қазан» – қоғам, орта болса, «мұз» – адам жанының салқындығы мен сезімталдығын қатар білдіретін көркем метафора.

«Адам миы – Құдай фантазиясының тамаша жетістігі» деген жолдар адам болмысының күрделілігі мен тылсым табиғатын көрсету үшін қолданылған. Жазушы ойлаудың мүмкіндігін «Құдай фантазиясымен» байланыстырып, ми мен жаратылыс арасына көркем көпір орнатады.

«...Сонау поөздағы оқиғадан бастап сіздің таңдамай, талғамай мойныңызға іле салған тарихшының қамытына шейін айтпақ едім..», «Адам мойны – бас пен кеудеден неге жіңішке десем, киілген қамытын сыпырып тастай алмас үшін екен ғой» - деген жолдар - терең астарлы метафоралы жолдар. Мұнда адамның өмірлік міндеттері мен әлеуметтік рөлдері «қамытқа» теңеледі. Адам сол қамытты өзі киіп, өзі зардап шегетін тіршілік иесі ретінде сипатталады. Бұл тұрғыда З. Қабдолов: «Адам тағдыры –жазушы үшін шығарма арқауы ғана емес, өмірді танудыңөзгеше тәсілі де: өмірде көрген тірі адамдар туралы, олардың хал-күйі, кескін-кейпі туралы тебірене, толғана ойланудан көбіне суреткердің сол адамдар өмір сүрген қоғам туралы көзқарасы қалыптасады, нәтижесінде сол қоғамдық шындықты көркем жинақтау мақсатындағы творчестволық әрекеті басталып кетеді» [4, 119], − дейді.Ал Отбасы, отбасының тұрақтылығы – «жылы ұя» арқылы берілсе, опасыздық, сыртқы кедергі – «жылан» метафорасымен бейнеленеді: «Жылы ұяңды жылан аралап өтсе...»

«Өткен өмір – қандай көңілсіз болмасын, аңсайтын адам баласына біткен қасиет»

Өмір мен уақыт – романдағы қозғалатын тақырыптардың бірі. Мұнда өткен шаққа деген сағыныш адам табиғатына тән сезім ретінде бейнеленеді. «Өткен өмір» метафорасы естеліктер мен өкініштер байланысын білдіреді:

«Күзеннің ініндей», «поршень өңешке барып қайтты», «ішкі қайшылықтың күрделі бір тармағы»- деген тіркестер адамның жан дүниесін заттық, биологиялық образдармен ұштастырады. Поршень – еріксіз дене реакциясын білдірсе, «күзеннің іші» – рухани жабықтық пен таршылықтың бейнесі.

Осындай тіркестер романның поэтикалық қуатын арттырып, кейіпкерлер әлемін тереңдете түседі:

№	Мысал	Талдау
1.	Өмірдің қабақ шытар өзге мінезі	Өмірдің қиын, қатал сәттері
2.	Клеткалары тірі, организмінде жаны бар тілек	Тілектің жанды күшке айналуы
3.	Кітап беттері мазасын алғандай сытыр-сытыр етіп	Кітапты тірі, сезімге ие етіп суреттеу
4.	Шырмауық ойдың қамауында қалдырды	Ой шырмауына түсу, мазасыздану
5.	Шылбыр шұбатқан асау ықылас	Ықыласты асау атпен ұқсастыру
6.	Қамыт көрсеңіз қандай күйде болар едіңіз?	Қамыт – шектеудің символы, адамның еркіндігін шектеу
7.	Жанар жас қыздың жүрегін жуалдыздай шаншып өтті	Жан дүниеге әсер ету, көңіл толқыту
8.	Тасқа құлаған шыныдай ойы быт-шыт болды	Ой жүйесінің күйреуі
9.	Жүрегін алып жүгіріп жүргендер	Бар жан-тәнімен сезімге берілгендер
10.	Адалдықтың жібі бырт етіп үзіліп кетті	Сенім, байланыс үзілуі
11.	Жаратылысы жиденің қызыл тікеніндей	Суық, өткір мінез, сүйкімсіздік
12.	Қаланың еңселі үйлері де көңілсіз сұрғылт түрге еніпті	Қала пейзажының көңіл-күймен астасуы
13.	...Егер ілім-білім тұзды су боп, бұл қияр боп, екеуін бір бөшкеде бір жыл ұстасаң, мынау бойыңа дымқыл дарытпай құрғақ шығарын байқады	Кейіпкердің рухани дүниеге бөтендігі, білімсіздігі
14.	Шырмауық ойдың қамауында	Іштей тығырыққа тірелу, мазасыз күй
15.	Жан-дүниесімен атылған серпіліс	Ішкі жанарқаумен жасалған батыл қадам
16.	Өмірдің мейірбандығы мен жомарттығы	Адам атрибуттары өмірге телінген. Бұл – тұлғаландырумен астасқан метафора.

№	Мысал	Талдау
17.	Жылы жүрегіне қырау қатырды	Эмоциялық суықтықты ауа райы құбылысымен (қырау) бейнелеу
18.	Кісіні матап тастар сиқыр торына түсіп қалса да	Адамның бір сәтке елігуі, эмоциялық шырмауға түсуі «сиқыр тор» арқылы бейнеленген. Бұл – психологиялық иірім.
19.	Намысты нысанаға ап айтылған декір сөз	Намысты нысана ету – мақсатты түрде ренжіту.
20.	Балаң көңілге мұз басқандай әсер етті	Қуаныштың орнына суық сезімнің келу, эмоционалдық-психологиялық иірім.
21.	Алынбас қамалға енгендей, азапты тордан біржола құтылғандай	Қауіптен құтылу мен қорғанышты суреттеу.
22.	Сүйектен бастау алып, жүректен жасанып шыққан сөз	Адамның ішкі жан дүниесінен, тереңінен шыққан әсерлі ой. Бұл – экспрессивті иірім.
19.	Бір қалыпты баяу өмірі бүгін ғана түлер алдындағы үкідей бір сілкініп өткенін...	Өмір өзгерісінің тосын және әсерлі болуын суреттейді
	Сіздің ренішіңіз – менің ренішімнің баласы	Абстракт ұғымдарға (реніш) туыстық қатынас беру
20.	Бір-біріне кереғар ойдың шырмауына төтеп те, жауап та бере алмай...	Адамның ішкі қайшылығын бейнелейді. Ішкі жан қақтығысын көрсететін психологиялық иірім
21.	Бұдырсыз дала өз жүрегінен қашан орын алып...	Жан дүниесіне табиғаттың сіңіп кетуі, туған жерге деген махаббат.
22.	Өлермек өзімшілдіктің қайнауы әлі басыла қоймаған...	Өзімшілдік қасиеті оттай қайнап, қайнауы басылмаған құбылыс ретінде бейнеленген.
23.	Қан базардай қайнап жатқан мына өмірде...	– Өмір тіршілігі базар секілді у-шулы, қайнаған орта ретінде суреттеледі. Бұл көркем метафора ғана емес, қоғамның бейнелік көрінісі.
	Қайыңдар бойларын жылытпай, тым-тырыс тұр	Табиғатты тірі адам кейпінде көрсету

Берілген метафоралар :

- **Заттандыру** (реификация),
- **Тұлғалықтандыру** (персонификация),
- **Қиыстыру метафорасы** (концептуалды ұқсастық),
- **Психологиялық метафора** (ішкі күй мен эмоцияны сыртқы образбен жеткізу),
- **Парадоксалды метафора** (қарама-қайшылықты ұштастыру) сияқты тәсілдер арқылы жасалған.

Қорытынды: Жазушының өз жазу мәнері, өмірдің қатпар-қатпар қалтарысынан зерттеуші ретіндегі қарым-қабілеті, қарапайым адамдар көкірегіндегі құпия қазыналарды ашуға ұмтылған суреткерлігі оның барлық шығармаларынан да айқын аңғарылады. Ізденуші ғалым Алуа Таңжарықова «Дулат Исабеков шығармаларындағы ұлттық таным» атты еңбегінде Дулаттың шығармашылығына мындай баға береді: «Жақсы сомдалған кейіпкер бейнесі, қапысыз тартылған оқиғалар желісі, ең бастысы қоғамның әлеуметтік тіршілік-тынысын дөп басып айту сияқты сипаттар Д.Исабеков шығармаларына тән. Қаламгер өз оқырманының жан дүниесіне ене отырып, адам тағдыры, жұтаңдаған ұлт бейнесін аяусыз ащы мысқылмен қамшылап көрсетеді.»[5]. А.Мантаева жазғандай «Дулат Исабеков шығармаларының құндылығы неде? Меніңше адамның жаны, адам жанының күй қозғалысы мен диалектикасы мәңгілік екенін көрсете білгендегінде» [6,3].

Сөз болып отырған «Қарғын» ұғымы өзі-ақ метафоралық тұрғыдан үлкен мәнге ие екені айтылды. Роман тіркестері мен сөздері көбінесе адамның өміріндегі күрделі кезеңдермен, ұрпақтың тағдырымен, адами қатынастардың қиындығымен байланысты берілгендігін келтірілген мысалдардан көруге болады.

Жазушы метафоралары:

- Қоғам мен тұлға арасындағы қайшылықты көрсетеді;
- Психологиялық процестерді нәзік суреттейді;
- Философиялық ойдың көркем көрінісін береді;
- Әсіресе, реализм мен символизмнің тоғысында авторлық ұстанымды білдіреді.

Прозада жаңаша көркемдік үлгі ретінде қабылданып, қала мен ауыл менталитетінің, ұрпақаралық көзқарас қайшылығының, ішкі жан арпалысының көркем шежіресіне айналған Д.Исабеков романы – бейнелі ойлаудың жоғары үлгісі. Онда қолданылған метафоралық тіркестер кейіпкерлердің психологиялық ахуалын, санадағы қақтығыстар мен ішкі эволюциясын терең ашуға қызмет етеді. Метафоралар арқылы жазушы өмірдің ащы шындығын поэтикалық тілмен жеткізе отырып, оқырманды ойға жетелейді. Бұл – метафоралық ойлаудың ең жоғары көркемдік деңгейі.

ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

1. Исабеков Д. Таңдамалы : екі томдық. Т. 2. Роман, повестер, әңгімелер. – Алматы : Жазушы, 1993. – 491 б.
2. Ospanova Z., Tolybayeva K., Nurkenova S., Duisekova K., Baltabayeva G. Lingua and culture study research on indirect communication cognitive metaphor // Xlinguae. – 2020. – Vol. 13, No. 2. – P. 157–165. – DOI: 10.18355/XL.2020.13.02.13. – Қолжетімділік режимі: http://xlinguae.eu/2020_13_02_13.html
3. Қоянбекова С.Б. Қазақ тілі экспрессивтік стилистикасының негіздері : филол. ғыл. док. ... дис. : 10.02.02. – Алматы : Абай ат. ҚазҰПУ, 2008. – 346 б.
4. Қабдолов З. Сөз өнері. – Алматы : Өлке, 2014. – 495 б.
5. Таңжарықова А. Д. Исабеков прозасының көркемдік әлемі. – Алматы, 2008.
6. Бердібай Р. Дәстүр тағылымы : зерттеулер, мақалалар. – Алматы : Жазушы, 1973.

REFERENCES

1. Isabekov D. *Tańdamaly* : eki tomdyq / D. Isabekov. – Almaty : Jazyshy, 1993. – T. 2. Roman, povester, áńgimeler. – 491 b.
2. Ospanova Z., Tolybayeva K., Nurkenova S., Dúisekova K., Baltabayeva G. *Lingua and culture study research on indirect communication cognitive metaphor* // Xlinguae. – 13(2). – B. 157–165. doi:10.18355/XL.2020.13.02.13. http://xlinguae.eu/2020_13_02_13.html

3. Qoyanbekova S.B. *Qazaq tili ekspressivtik stilistikasynyń negizderi*. Fil. Ǵyl. Dok. ... dis.: 10.02.02. – Almaty: Abaı at. QazÚPU, 2008. – 346 b.
4. Qabdolov Z. *SÓZ ÓNERI*. – Almaty: Ólke, 2014. – 495 b.
5. Tańjaryqova A. *D. Isabekov prozasynyń kórkemdik álemi*. – Almaty, 2008.
6. Berdibaı R. *Dástúr taǵylymy*. Zertteýler, maqalalar. – Almaty: Jazyshy, 1973.

РЕЗЮМЕ

Метафоры в романе «Каргын» Дулата Исабекова представляют собой высокий образец художественного мышления. Через мастерское применение метафор автор передаёт внутренние конфликты человека и его взаимодействие с социальной средой, раскрывая глубинные смыслы жизни и бытия.

Метафора в произведении служит не только средством языковой выразительности, но и инструментом раскрытия внутреннего мира героя, передачи философской идеи. Автор мастерски использует метафорические конструкции для изображения психологических состояний, жизненных переживаний и социальных противоречий. В статье проводится анализ ключевых метафорических образов и их семантической и художественной нагрузки.

МАЗМҰНЫ / СОДЕРЖАНИЕ

АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫ ҒЫЛЫМЫ ЖӘНЕ ВЕТЕРИНАРИЯ

Абирова И. М., Абдуллина З. Д., Абирова Н. А. 3
УРБАНИЗАЦИЯЛАНҒАН АЙМАҚТАРДАҒЫ ЕТҚОРЕКТІ ЖАНУАРЛАРДЫҢ ГЕЛЬМИНТОЦЕНОЗ ҚҰРЫЛЫМЫ

Канатбаев С.Г., Петропавловский М.В., Кадыркулова М.М., Кужебаева У.Ж., Тажбаева Д.Т., Мартынов Н.А. 11
ІРІ ҚАРА МАЛДЫҢ BOLA-DRB3.2 ГЕНЕТИКАЛЫҚ МАРКЕРІ БОЙЫНША ГЕНОТИПТЕУ

Sengaliyev Y.M., Kushmukhanov Zh.S., Duimbaev D.A., Muldagaliyev M. Kh. 19
THE EFFECT OF KETONE BODIES ON SOME BLOOD PARAMETERS IN PREGNANT SHEEP

Ищанова А. С., Ертлеуова Б. О., Жубантаев И.Н. 27
БАТЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫНДАҒЫ ІРІ ҚАРА МАЛ МЕН АҚБӨКЕНДЕР АРАСЫНДА ПАСТЕРЕЛЛЕЗДІҢ ТАРАЛУЫН ЭПИЗООТОЛОГИЯЛЫҚ БАҚЫЛАУ ЖӘНЕ ТАЛДАУ

Нуржанова Ф. Х., Сатыбаев Б. Г., Кушалиев К. Ж., Баянтасова С. М., Валитова Н. В., Қожаева А.Р., Агишева Э. Р. 35
ЭПИЗООТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ ПО АСКОСФЕРОЗУ ПЧЕЛ

Сариев Н. Ж., Кармалиев Р. С., Сидихов Б. М., Усенов Ж. Т. 42
ЭПИЗООТОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ ПИРОПЛАЗМИДОЗОВ И ИКСОДИДОЗОВ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА В ЗАПАДНЫХ РЕГИОНАХ КАЗАХСТАНА

Kadralieva B.T., Nametov A.M, Murzabaev K.E., Dushaeva L. Zh., Karagulov A. I., Orynkhanov K.A., Marat M.B. 54
ANTISEPTICS OF NATURAL, NON-CHEMICAL ORIGIN, THEIR TOXICOLOGICAL AND ALLERGIC EFFECTS ON THE BODY OF LABORATORY ANIMALS

Габдуллин Д. Е., Джуланов М. Н., Жолдасбеков А. К., Джуланова Н. М. 63
ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ЭНДОМЕТРИТОВ У КОРОВ

Суюнов Р. У., Юнусов Х. Б., Ибрагимов Ф. Б., Дускулов В. М. 71
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА АПИФЛОКС ПРОТИВ ИНФЕКЦИОННЫХ БОЛЕЗНЕЙ ПЧЕЛ

Расулов У. И., Мирзаева Н. 76
МОЛОКО - КАК ЦЕННЫЙ ПРОДУКТ ДЛЯ ПИТАНИЯ (Основные аспекты и значимость)

Ilyosov Z. I., Yunusov X. B., Ibragimov F. B. 80
PHYSIOLOGICAL OF HEN IN EGG DIRECTION INFLUENCE OF INNOPROVET PROBIOTICS ON INDICATIONS

Achilov O. 84
MORPHOLOGY OF POULTRY MEAT (LITERATURE REVIEW)

Duskulov V. M., Rahimov M. Y. 90
METHODS OF THERAPY AND PROPHYLAXIS OF PYROPLASMOSIS AND TEYLERIOSIS OF LARGE CATTLE

Ульянова Т.В., Ковальчук А.М., Ульянов В.А., Бейшов Р.С. 95
ҚАЙТА СЕКВЕНИРЛЕУ ӘДІСІМЕН ҚАЗАҚТЫҢ АҚБАС ТҰҚЫМДЫ ІРІ ҚАРА МАЛЫНЫҢ ТОЛЫҚ ГЕНОМЫН ТАЛДАУ

Елеугалиева Н.Ж. 102

КАЧЕСТВО МЯСА И КУРДЮКА МОЛОДНЯКА ЭДИЛЬБАЕВСКОЙ ПОРОДЫ ПРИУРАЛЬЯ
Beishova I.S., Shamshidin A.S., **Muhatai Geminggul I., Kuzhebayeva U.Zh.**, **Bekova G.S., Salimova D.K.** 111
MORPHOLOGICAL AND GENETIC DIVERSITY OF KAZAKH HORSE BREEDS: FUNDAMENTALS FOR SELECTION AND CONSERVATION OF BIOLOGICAL RESOURCES
Каюмов Ф.Г., **Третьякова Р.Ф., Ахметалиева А.Б**. 120
КАЧЕСТВО ПОТОМСТВА ОТ БЫКОВ ТИПА АДУЧИ: ОЦЕНКА И АНАЛИЗ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
Булеков Т.А., Кузембаев М.О., Бекеев Ж.Г. 129
КУКУРУЗА ОСНОВНОЕ ЗВЕНО КОРМОВОГО КОНВЕЙЕРА
Денизбаев С.Е., Оңаев М.Қ., Ожанов Г.С., Шадьяров Т.М., Умбеткалиев Н.М. 135
ОБВОДНЕНИЕ ПАСТБИЩ ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПОДЗЕМНЫХ ВОД
Елекешева М.М. 143
ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ И ИНВАЗИВНОСТЬ *FRAXINUS PENNSYLVANICA* НА ТЕРРИТОРИИ ЗАПАДНОГО КАЗАХСТАНА
Кадашева Ж.Қ., Мухамбетов Б., Абдинов Р.Ш. 149
ИЗУЧЕНИЕ АДАПТИВНЫХ И ПРОДУКТИВНЫХ СВОЙСТВ КАМФОРОСМЫ МОНПЕЛИЙСКОЙ *(CAMPHOROSMETA MONSPELIACAE)* В ПОЧВЕННО-КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ АТЫРАУСКОЙ ОБЛАСТИ
Шаяхметова А.С., Савенкова И.В., Ахметов М.Б., Темирбулатова А.К. 158
СОЛТҮСТІК ҚАЗАҚСТАННЫҢ ЖЕМШӨП ӨНДІРІСІНДЕ ШИКІЗАТ КОНВЕЙЕРЛЕРІН ҚАЛЫПТАСТЫРУҒА АРНАЛҒАН АГРОТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ШЕШІМДЕР
Тангирова Г.Н. 165
РАЗДЕЛЕНИЕ НА КЛАСТЕРЫ И ЭЛЕКТРОФОРЕТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПО ХОЗЯЙСТВЕННО-ЦЕННЫМ ПРИЗНАКАМ ИНТРОДУЦИРОВАННЫХ СОРТООБРАЗЦОВ СОИ
Холмуродова Г.Р., Мирхамидова Н. А. 172
ДИКИЕ И КУЛЬТИВИРУЕМЫЕ ПОЛИПЛОИДНЫЕ ВИДЫ ХЛОПЧАТНИКА (2N=52, ГЕНОМ AD
Утегалиева Н.Х. 181
ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ МОНИТОРИНГА ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ В РК: ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ
Асетова А.Ю. 190
АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫ ЖЕРЛЕРІНІҢ АЙМАҚТАР БОЙЫНША БӨЛІНУІН ТАЛДАУ ЖӘНЕ БАҒАЛАУ
Абдуллаева Л. Р. 197
ИСКУССТВЕННОЕ ВЫРЫЩИВАНИЕ НЕКОТОРЫХ ВИДОВ ОСЕТРОВЫХ РЫБ В УСЛОВИЯХ АЗЕРБАЙДЖАНА
Эль-Намас А.Э., Рахимгалиева С.Ж., Есбулатова А.Ж., Фарахат С. Могханм 203
ВЛИЯНИЕ ОРОШЕНИЯ НА ПРОДУКТИВНОСТЬ ГУАВЫ, ВОЗДЕЛЫВАЕМОЙ НА ГЛИНИСТОЙ ПОЧВЕ
Фарахат С. Могханм, Рахимгалиева С.Ж., Есбулатова А.Ж., Эль-Намас А.Э. 211
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГЕОИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ ВОЗМОЖНОСТИ ЗЕМЛИ ПРИ ОБСЛЕДОВАНИИ СЕВЕРНОЙ ДЕЛЬТЫ ЕГИПТА
Бегматова М.Х., Дустов Б.С., Аккереева Э.К. 220

BIOLOGICAL BENEFITS OF ALDROVANDA VESICULOSAL
Беккалиев А.К., Беккалиева А.К., Байбатырова М.А., Өкшебаев А.Е., Мейрамгалиев Ж.Ж., Жумин Б.М. 225
ИЗУЧЕНИЕ СЕЗОННЫХ ПАСТБИЩ ЗАПАДНОГО КАЗАХСТАНА
Булеков Т.А., Кузембаев М.О., Бекеев Ж.Г. 233
ТЕХНОЛОГИЯ ПОСЕВА СУДАНСКОЙ ТРАВЫ ДЛЯ ПОЛУПУСТЫННОЙ ЗОНЫ ЗАПАДНОГО КАЗАХСТАНА
Валиева Ш.А. 238
ВЛИЯНИЕ СТИМУЛЯТОРОВ НА УКОРЕНЕНИЕ ЗЕЛЁНЫХ И ПОЛУДРЕВЕСНЫХ ЧЕРЕНКОВ ЯГОДНЫХ КУЛЬТУР (НА ПРИМЕРЕ ЕЖЕВИКИ)
Гумарова Ж.М., Гумаров М.М., Аккереева Э.К., Саиткулов Ф.Э. 246
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӨСІМДІК МАЙЛАРЫН ӨНДЕУ АРҚЫЛЫ ТАБИҒИ ШӨП САБЫНДАРЫН ӨНДІРУДІҢ ЭКОЛОГИЯЛЫҚ АСПЕКТІЛЕРІ
Джигильдиева Ж. Г., Кайнушева Д.Р. 253
МОНИТОРИНГ СТЕПНЫХ ПОЖАРОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДАННЫХ ДИСТАНЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ ЗЕМЛИ
Есмагулова Б. Ж. 262
АГРООРМАН-ЛАНДШАФТАРЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫМЫ МЕН ДИНАМИКАСЫН ГЕОАҚПАРАТТЫҚ МОДЕЛЬДЕУ
Жанаталапов Н.Ж., Насиев Б.Н., Байбатырова М.А., Хиясов М.Г., Латенова А.М., Султангалиев Д.У. 271
ИЗУЧЕНИЕ РОТАЦИОННЫХ ПАСТБИЩ ЗАПАДНОГО КАЗАХСТАНА
Каиргалиева Г. З., Лукбанов В. М. 278
ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА МЕДА ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Калиева Л.Т. 284
ВЛИЯНИЕ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНСЕКТИЦИДОВ НА РАЗВИТИЕ КОЛОРАДСКОГО ЖУКА И СТЕПЕНЬ ПОВРЕЖДЕНИЯ ИМ НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ РАСТЕНИЙ КАРТОФЕЛЯ
Куаналиева М.К. 290
ЕРТЕ ПІСЕТІН КАРТОПТЫҢ ӨСУІ МЕН ӨНІМДІЛІГІНЕ МИНЕРАЛДЫ ТЫҢАЙТҚЫШТАРДЫҢ ӘСЕРІ
Кушенбекова А.К., Мухомедьярова А.С., Елекешева М.М. 298
ӘРТҮРЛІ ТОПЫРАҚ СУБСТРАТТАРЫНЫҢ ҚАЙЫҢ ТҰҚЫМЫНЫҢ ӨНУІНЕ ӘСЕРІ
Мирвалиев З.З., Ширинов Ш.Д., Джалилов А.Т., Эшбобоев Т.У., Абдиназаров А.Б. 304
METHODS FOR GROWING SAXAUL (HALOXYLON SPP.) UNDER DROUGHT CONDITIONS USING BIOLOGICALLY ACTIVE HYDROGELS
Мусина М.К. 312
SELECTION OF THE BEST APPLE VARIETIES GROWN IN THE WEST KAZAKHSTAN REGION BASED ON DIFFERENT RIPENING PERIODS
Мухомедьярова А.С. 318
БАТЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫНЫҢ ОРМАН ЕКПЕЛЕРІНДЕ ЖӘНДІКТЕР ЗИЯНКЕСТЕРІНІҢ ҚАУІПТІ ТҮРЛЕРІНІҢ ЖАППАЙ КӨБЕЮІНІҢ ӨРШУІ
Стыбаев Г.Ж., Ногаев А.А., Байтеленова А.А., Ахылбекова Б.А., Калаубай Д.Д., Максутов Е.Ж. 326
ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРНОГО РЕЖИМА И ОСАДКОВ НА УРОЖАЙНОСТЬ И ВЫСОТУ ТРАВОСТОЯ В УСЛОВИЯХ ИНТЕНСИВНОГО И РОТАЦИОННОГО ПАСТБИЩЕОБОРОТА
Нокушева Ж.А., Кантарбаева Э.Е., Кудабаева А.М. 334

СОЗДАНИЕ АГРОФИТОЦЕНОЗОВ С ВЫСОКИМ ПОТЕНЦИАЛОМ ПРОДУКТИВНОСТИ В СТЕПНОЙ ЗОНЕ СЕВЕРНОГО КАЗАХСТАНА
Нургалиева Г.К. 339
ВЛИЯНИЕ СРОКОВ ПОСЕВА СЕМЯН ОГУРЦОВ НА УРОЖАЙНОСТЬ
Ожанов Г.С., Үмбеткалиев Н.М. 346
ЖАЙЫЛЫМДЫҚ ЖЕРЛЕРДІ СУЛАНДЫРУДЫҢ ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕРІ
Рыскалиева Б.Ж., Оразов А.Ж., Мыктыбаева Р.Ж., Сармалаев А.А. 354
СҮТ ҚЫШҚЫЛДЫ БАКТЕРИЯЛАРДЫ ОҚШАУЛАУ ЖӘНЕ ОЛАРДЫҢ ҚАСИЕТТЕРІН ЗЕРТЕУ
Саданов А.Қ., Шорабаев Е.Ж., Таубекова Ғ.Қ., Мұхамбетов Б., 360
ҚҰНАРЫ ТӨМЕНДЕГЕН ТҰЗДЫ ТОПЫРАҚТЫҢ ҚҰНАРЫН АРТТЫРУ ЖӘНЕ ЖОҒАРЫ САПАЛЫ ЖЕМ-ШӨП БАЗАСЫН ДАЙЫНДАУ
Саиткулов Ф.Э., Баймуратова Г.О., Орипов О.Б., Гиясов К., Гумарова Ж.М. 367
SYNTHESIS OF HYDROGEL – XINNACO AND ITS APPLICATION TO THE DROUGHT-RESISTANT COTTON VARIETY BUHKHARA -102
Сарсенгалиев Р.С. 373
УРОЖАЙНОСТЬ КАРТОФЕЛЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СРОКОВ ПОСАДКИ И МАССЫ ПОСАДОЧНЫХ КЛУБНЕЙ
Тулегенова Д.К. 381
КҮЗДІК ТРИТИКАЛЕ ДАҚЫЛЫНЫҢ КОЛЛЕКЦИЯЛЫҚ ҮЛГІЛЕРІНІҢ ӨНІМДІЛІК КӨРСЕТКІШТЕРІ
Бекбусинова А.О., Жаксыгалиева Д.С. 386
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКТОВ ПЕРЕРАБОТКИ ПРОРОЩЕННОГО ЗЕРНА ПШЕНИЦЫ
Нагиева А.Г., Оңаев М.Қ., Джапаров Р.Ш., Аюпов Е.Е., Умбеткалиев Н.М. 394
ПОЧВЕННО-МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЛИМАННОГО УЧАСТКА В В АРИДНОЙ ЗОНЕ ЗАПАДНОГО КАЗАХСТАНА
Шамшидин А.С., Нугманова А.Е., Сабыржанов А.У., Махимова Ж.Н. 402
ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВИТАМИННЫХ КОМПЛЕКСОВ ДЛЯ РОСТА И РАЗВИТИЯ МУСКУНЫХ УТОК

ТЕХНИКАЛЫҚ ҒЫЛЫМЫ

Бисенгалиева А.М., Ермуханова Н.Б. 414
WORDWALL ТЕХНОЛОГИЯСЫН ОҚЫТУ ҮРДІСІНДЕ ҚОЛДАНУ
Днекешев А.А. 419
ПОДХОД К ФОРМИРОВАНИЮ СЦЕНАРИЕВ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ НА НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕМ ПРЕДПРИЯТИИ
Каиргалиев Е.К., Закарина Ш.К. 426
САҢЫЛАУЫ БАР ФОРСУНКАЛАРДЫ ҚОЛДАНУДЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕМЕСІ
Кашбаев А.А., Нуралин Б.Н., Галиев М.С., Джаналиев Е.М., Олейников С.В., Молдагалиев А.М. 435
ПОВОРОТНЫЙ ПЛУГ ДЛЯ БЕЗОТВАЛЬНОЙ ВСПАШКИ
Кулдыбаев А.К. 442
ҚАҒАЗ ЖӘНЕ ЦИФРЛЫҚ ТҮРДЕ ҰСЫНЫЛҒАН ҒЫЛЫМИ МӘТІНДІ СТУДЕНТТЕРДІҢ ҚАБЫЛДАУЫНА ТЕОРИЯЛЫҚ ТАЛДАУ
Курмашева Г.Р. 454
ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ ШУМА НА РАБОЧИХ МЕСТАХ ТОО «УРАЛЬСКИЙ ТРАНСФОРМАТОРНЫЙ ЗАВОД»
Махашева С.С., Меңдешев Д.Д., Игілік Д. Н., Давлетьяров Н.А. 463

ҚОЗҒАЛТҚЫШ БӨЛШЕКТЕРІНІҢ ТОЗУЫН АЗАЙТУ ТӘСІЛДЕРІ
Genvareva Yu.A., **Sayfutdinova G.S**. 473
BIOMECHANICS AS THE BASIS FOR ATHLETES' TRAINING SAFETY ANNOTATION
Сарбалина Б.Д., Абдрахманов Ж.Р. 482
ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ В ЭКСПЛУАТАЦИИ СЕПТИКОВ И КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СИСТЕМ ЧАСТНЫХ ДОМОВ ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Хайрова Н.Б., **Кабдолов Ж.Ж**. 492
ӨНЕРКӘСІПТІК КӘСІПОРЫНДАРЫНДАҒЫ ЕҢБЕК ЖАҒДАЙЛАРЫНЫҢ ҚАУІПСІЗДІК ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ
Касымова А.Х. 498
ЖАСАНДЫ ИНТЕЛЛЕКТ: МҮМКІНДІКТЕРІ МЕН ҚАУІПТЕРІ
Мирхайдаров А. А., **Бахтиярова Р.С.** 510
УГЛЕРОДНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Кабланбекова Б.А. 518
JAVA ПРОГРАММАЛАУ ТІЛІН МЕКТЕПТЕРДЕ ОҚЫТУ АРҚЫЛЫ ТЕХНИКАЛЫҚ САЛАДАҒЫ БОЛАШАҚ МАМАНДАРҒА ЖОЛ АШУ
Лелеш Н.В., Харин Т.М. 525
СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ОБНАРУЖЕНИЯ ГОЛОЛЁДНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ НА ПРОВОДАХ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ
Хайруллина С.Г. 537
К ВОПРОСУ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ АГРАРНОГО СЕКТОРА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
Ибраев А.С., Плешаков А.А. 543
ВНЕДРЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В УПРАВЛЕНИЕ ТРАНСПОРТНЫМИ ПОТОКАМИ НА АВТОМОБИЛЬНЫХ ПАРКИНГАХ
Ведищев С.М., Ибраев А. С. 551
КОЭФФИЦИЕНТ БОКОВОГО РАСПОРА ДОЗАТОРА КОРМА
Муханбетжанова Қ.Т., Сергеев В.В. 557
ҚҰРАМЫНДА ТЕМІР БАР МАТЕРИАЛДАР
Сатыбаева Н.А., Жексенбаев Д.Е. 564
ТЕХНОЛОГИИ 3D-ПЕЧАТИ
Мухаметзянов З.Р., Мухамбетжан З.Е. 571
РАЗВИТИЕ ЦИФРОВЫХ МОДЕЛЕЙ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ
Бегалиев Д.Т. 582
СЫҒЫЛМАҒАН ЖАҒДАЙДА ЖОҒАРЫ ТЕМПЕРАТУРАЛАРДА СҰЙЫҚ АЗОТ АРҚЫЛЫ ГРАНИТТІ КРИОГЕНДІК ЖАРЫҚШАҚТАНДЫРУ: ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ЖЕТІЛДІРІЛГЕН ГЕОТЕРМАЛДЫҚ ЖҮЙЕЛЕР ҮШІН МАҢЫЗЫ
Ермуханова С.Т. 590
ӨНДІРІС ҚАЛДЫҚТАРЫНАН МЫРЫШ ҚОСЫЛЫСТАРЫН АЛУ ТЕХНОЛОГИЯСЫ
Мурзагалиева А.А. 600
МҰНАЙ-ГАЗ САЛАСЫНДА СҮЗУ ЖҮЙЕСІНДЕГІ ҮЙКЕЛІС КОЭФФИЦИЕНТІН ТӨМЕНДЕТУ
Купешова А.С. 608
КОНЦЕПЦИЯ ТЕРРЕЙНОВ - КАК МЕТОД РЕГИОНАЛЬНОГО ТЕКТОНИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ОРОГЕННЫХ ПОЯСОВ С ПОЗИЦИИ ТЕКТОНИКИ ПЛИТ

Ахметова Ф.Ж. 618
ПОЛИМЕР ҚАЛДЫҚТАРЫН ӨҢДЕУ ПРОЦЕСТЕРІ ҮШІН ТАЙЖҮЗГЕН ТАБИҒИ ЦЕОЛИТІ НЕГІЗІНДЕГІ КАТАЛИЗАТОРЛАРДЫ ЗЕРТТЕУ
Монтаев С.А., Уразова А.Ф. 624
ВОЗМОЖНОСТИ СНИЖЕНИЯ МИНЕРАЛИЗАЦИИ ПОДЗЕМНОЙ ВОДЫ НА ОСНОВЕ КРЕМНИСТОЙ ПОРОДЫ – ОПОКИ

ЭКОНОМИКАЛЫҚ ҒЫЛЫМЫ

Zhambylova G.Zh., Daulieva G.R. 636
MODERNIZATION OF THE AGRICULTURAL SECTOR OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN AS THE MAIN FACTOR IN ENSURING THE COMPETITIVENESS OF THE COUNTRY
Казамбаева А.М., Сисенгалиев Р.А. 646
УПРАВЛЕНИЕ ПОПУЛЯЦИЯМИ САЙГАКОВ В КАЗАХСТАНЕ: ОТ КРИЗИСА К УСТОЙЧИВОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
Жаксыбаев Д.О., Кадерова Р.Т. 658
ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ КАК ИНСТРУМЕНТ РАЗВИТИЯ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
Okumbekov R.S. 666
CONSTRUCTION OF NNPS IN KAZAKHSTAN AS A FACTOR IN STRENGTHENING ENERGY SECURITY AND INDEPENDENCE WITHIN THE EAEU
Okumbekova M.B. 674
MARKETING ANALYSIS OF THE PRINTING MARKET. DYNAMICS AND TRENDS
Жүсіп М.Н., Тимиргалиев И.Н. 680
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ЭКОНОМИКА ЗНАНИЙ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ
Рустенова Э.А. 688
СЕЛЬСКАЯ МОЛОДЕЖЬ И ВЫБОР ПРОФЕССИИ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

ГУМАНИТАРЛЫҚ ҒЫЛЫМЫ

Амангалиев Т. Г. 698
ӘСКЕРИ ПӘНДІ ОҚЫТУ ҮДЕРІСІНДЕ ТӘРТІПТІК ТӘЖІРИБЕНІ ҚОЛДАНУ
Байдалиев К. А. 704
МЕКТЕПТЕГІ ТӘЖІРИБЕЛІ БАҒДАРЛЫ САБАҚТАР – БІЛІМ АЛУШЫЛАРДЫҢ ОЗЫҚ КӘСІБИ ДАҒДЫЛАРЫН ДАМЫТУ ФОРМАСЫ
Балжанова Г.Ж. 715
АЛАШОРДА ҚОЗҒАЛЫСЫНЫҢ ҰЛТТЫҚ ТӘУЕЛСІЗДІККЕ ҚОСҚАН ҮЛЕСІ
Биржан Ж. Б. 723
ӘДЕБИ ӨЛКЕ АЙШЫҚТАРЫ
Ермекова А. Б., Курманова Ж.Б. 735
LINGUOCULTURAL FEATURES OF LINGUISTIC PERSONALITY IN THE VIRTUAL WORLD: SEMIOTIC AND CONTENT ANALYSIS
Насипкалиев Қ.М. 749
ҚОЗҒАЛМАЛЫ - ҚИМЫЛ ОЙЫНДАРЫНЫҢ ДЕНЕ ШЫНЫҚТЫРУ САБАҒЫНДАҒЫ ЕРЕКШЕЛІГІ
Нургалиев К.Ж. 761

ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ В ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТЕ: СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕНДЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Муталова Ж.С. 765
ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЖАНГИР ХАНА
Сулейменов М.А 775
МАХАЯНА ФИЛОСОФИЯСЫНДАҒЫ КАРМА КОНЦЕПЦИЯСЫ
Тельманов А.М. 788
ОТБАСЫ ӘЛЕУМЕТТАНУЫ: ЗЕРТТЕУ ТАҚЫРЫПТАРЫ МЕН ДАМУЫ
Тулеуова А.М. 797
Д. ИСАБЕКОВТІҢ «ҚАРҒЫН» РОМАНЫНДАҒЫ МЕТАФОРАЛЫҚ ОЙЛАУДЫҢ КӨРКЕМДІК ҚУАТЫ

"Ғылым, зерттеулер, білім: даму тенденциялары" атты XXV Халықаралық
ғылыми – практикалық конференцияның
ЖИНАҒЫ
2025 жылғы 10 сәуір
***
COLLECTED PAPERS
XXV International scientific and practical conference
"Science, research, education: development trends"
April 10, 2025
***
СБОРНИК
XXV Международной научно-практической конференции
«Наука, исследования, образование: тенденции развития»
10 апреля 2025 года